

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU DAN ASUPAN MAKANAN  
DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH  
KERJA PUSKESMAS PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG  
TANAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2010**



*Skripsi*  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan  
Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
Uin Alauddin Makassar

**OLEH:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
IMAFTUHA  
70200106033  
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

## LEMBAR PENGESAHAN HASIL

Naskah ini telah kami periksa dan setuju untuk diajukan pada Seminar Hasil Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Makassar, Agustus 2010

Pembimbing I

Tim Pembimbing

Pembimbing II

Dr.drg.Andi Zulkifli, MS  
Nip: 196301051990031002

Syarfaini, SKM, M.Kes  
Nip: 150 408 653

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Mengetahui :

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat  
FIK UIN Alauddin Makassar

Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.  
Nip: 198001142 000604 2 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Landasan Teori .....	7
B. Kerangka Teori .....	27
BAB III KERANGKA KONSEP .....	29
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti .....	29
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti .....	32
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	32
D. Hipotesis Penelitian .....	35
BAB IV METODE PENELITIAN .....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	37

D. Instrument Penelitian .....	38
E. Pengumpulan Data .....	38
F. Pengolahan dan Analisis Data .....	38
G. Metode Pengujian Hipotesis .....	40
H. Penyajian Data .....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan .....	53
BAB VI PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi responden menurut umur ibu .....	52
Tabel 2	Distribusi responden menurut pendidikan .....	52
Tabel 3	Distribusi responden menurut umur ibu .....	53
Tabel 4	Distribusi responden menurut pekerjaan ibu .....	53
Tabel 5	Distribusi responden menurut pendidikan ibu .....	54
Tabel 6	Distribusi responden menurut pendidikan ibu .....	54
Tabel 7	Distribusi responden menurut Asupan Fe ibu .....	55
Tabel 8	Distribusi responden menurut Kadar Hb ibu .....	55
Tabel 9	Hubungan umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu .....	56
Tabel 10	Hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil .....	56
Tabel 11	Hubungan pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu .....	57
Tabel 12	Hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian anemia pada ibu .....	58
Tabel 13	Hubungan Asupan Fe dengan kejadian anemia pada ibu .....	59

## ABSTRAK

**Nama :Imaftuha**  
**NIM :7020106033**  
**Judul : Hubungan karakteristik ibu dan asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang kecamatan ujung tanah kota makassar tahun 2010**

---

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Pattingalloang diperoleh jumlah ibu hamil yang mengalami Anemia sebanyak 221 bumil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu dan asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Populasi adalah seluruh ibu hamil yang terregister pada bulan Januari-Juli 2010 sejumlah 221 bumil. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *total sampling* yaitu semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya baik anemia maupun yang tidak anemia sebanyak 221. Variabel dalam penelitian ini adalah umur ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, asupan makanan ( Fe), dan kejadian anemia sebagai variabel bebas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengukuran kadar Hb, 2) Kuesioner, 3) Formulir recall 2x24 jam. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS dan dianalisis dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-square* dengan  $\alpha = 0,050$ .

Dari hasil analisis bivariat hubungan karakteristik ibu dan asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil antara lain: umur ibu  $p = 0,00$ , pekerjaan ibu  $p= 0,003$ , pendidikan ibu  $p= 0,1$ , pengetahuan ibu  $p= 0,01$  dan asupan Fe  $p= 0,976$ , dan yang tidak berhubungan yaitu pendidikan dan asupan Fe.

Saran yang dapat penulis ajukan terkait penelitian ini adalah peningkatan pembinaan ke Puskesmas dalam menangani kasus Anemia pada ibu hamil terutama Puskesmas yang terdapat kasus anemia paling tinggi dan hendaknya memberikan penyuluhan secara rutin tentang kesehatan ibu agar dapat mendeteksi secara dini keadaan kesehatan ibu. Hendaknya kaum ibu sering-sering mengikuti perkembangan informasi kesehatan khususnya menyangkut ibu hamil melalui kegiatan penyuluhan maupun dari media cetak dan elektronik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil yang belum di teliti dalam penelitian ini.

**Daftar Pustaka: 1996-2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anemia defisiensi zat besi merupakan masalah gizi yang paling lazim di dunia dan menjangkiti lebih dari 600 juta manusia. Perkiraan prevalensi anemia secara global sekitar 51%. Bandingkan dengan prevalensi untuk anak balita sekitar 43%, anak usia sekolah 37%, lelaki dewasa hanya 18%, dan wanita tidak hamil 35%. Di tahun 1990, prevalensi anemia kurang besi pada wanita hamil justru meningkat sampai sebesar 55% (WHO,1990); yang menyengsarakan sekitar 44% wanita di seluruh negara sedang berkembang (kisaran angka 13,4-87,5%). Angka tersebut terus membengkak hingga 74% (1997) yang bergerak dari 13,4% (Thailand) ke 85,5% (India).

Anemia defisiensi zat besi lebih cenderung berlangsung di negara sedang berkembang ketimbang negara yang sudah maju. Tiga puluh enam persen (atau kira-kira 1400 juta orang) dari perkiraan populasi 3800 juta orang di negara sedang berkembang menderita anemia jenis ini, sedangkan prevalensi di negara maju hanya sekitar 8% (atau kira-kira 100 juta orang) dari perkiraan populasi 1200 juta orang (Arisman, MB.2004:144).

Anemia karena defisiensi zat besi menyerang lebih dari 2 milyar penduduk di dunia. Di negara berkembang terdapat 370 juta wanita yang menderita anemia karena defisiensi zat besi. Prevalensi rata-rata lebih

tinggi pada ibu hamil (51%) dibandingkan pada wanita yang tidak hamil (41%). Prevalensi di antara ibu hamil bervariasi dari 31% di Amerika Selatan hingga 64% di Asia bagian selatan. Gabungan Asia Selatan dan Tenggara turut menyumbang hingga 58% total penduduk yang mengalami anemia di negara berkembang.

Di Amerika Utara, Eropa, dan Australia jarang dijumpai anemia karena defisiensi zat besi selama kehamilan. Bahkan di AS hanya terdapat sekitar 5% anak kecil dan 5-10% wanita dalam usia reproduktif yang menderita anemia karena defisiensi zat besi. Ada sekitar 20-30% ibu hamil dari strata sosioekonomi rendah di AS yang memperlihatkan defisiensi zat besi selama trimester ketiga kehamilan. Sejumlah survey yang diselenggarakan di Amerika Utara dan Eropa menunjukkan bahwa prevalensi anemia di antara ibu-ibu yang hamil berkisar antara 10% dan 30%. Di Negara berkembang, permasalahan defisiensi zat besi cukup tinggi. Di India terdapat sekitar 88% ibu hamil yang menderita anemia dan pada wilayah Asia lainnya ditemukan hampir 60% wanita yang mengalami anemia, (Gibney., et all 2009 : 276-277).

WHO melaporkan bahwa setengah ibu hamil mengalami anemia, secara global 55% dimana secara bermakna trimester III lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan trimester I dan II. Masalah ini disebabkan kurangnya defisiensi zat besi dengan defisiensi zat gizi lainnya (Mc Carthy dan Maine, 1992).



Di Amerika, terdapat 12% wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun, 11% wanita hamil usia subur mengalami anemia. Sementara persentase wanita hamil dari keluarga miskin terus meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan ( 8% anemia di trimester I, 12% anemia di trimester II, dan 29% anemia pada trimester III). Anemia pada wanita masa nifas (pascapersalinan) juga umum terjadi, sekitar 10% dan 22% terjadi pada wanita *postpartum* dari keluarga miskin. (Fatmah, 2007:214-215).

Di Indonesia, anemia gizi masih merupakan salah satu masalah gizi (di samping tiga masalah gizi lainnya, yaitu: kurang kalori protein, defisiensi vitamin A, dan gondok endemic) yang utama di Indonesia. Dampak kekurangan zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lahir rendah. Penyebab utama kematian maternal antara lain pendarahan *pascapartum* (disamping eklampsia, dan penyakit infeksi) dan *plasenta previa* yang kesemuanya bersumber pada anemia defisiensi (Arisman, MB.2004:144)

Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 menunjukkan bahwa 26,4% wanita usia subur (WUS) di Indonesia mengalami anemia (Hb < 12 g/dl). Prevalensi anemia tertinggi pada WUS yang lebih tua, umur 40 – 49 tahun (28,7%), kemudian diikuti oleh WUS umur 15 – 19 tahun (26,5%). Data ini menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada WUS masih tinggi dan masih berada di atas target nasional

yaitu sebesar 20% dengan persentase bumil mendapatkan tablet Fe sebesar 70%, jumlah tersebut tertinggi pada wilayah Sumatera, Jawa dan Bali serta wilayah Sulawesi dan wilayah Kawasan Timur(Depkes RI, 2004).

Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SKRT pada tahun 1992 prevalensi anemia gizi khususnya pada ibu hamil berkisar 45,5-71,2% dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 76,17%. 14,3% di Kabupaten Pinrang dan 28,7% di Kabupaten Soppeng dan tertinggi adalah di Kabupaten Bone 68,6% (1996) dan kabupaten Bulukumba sebesar 67,3%(1997). Sedangkan laporan data di kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Bantimurung anemia ibu hamil pada tahun 1999 sebesar 31,73%, pada tahun 2000 meningkat menjadi 76,74% dan pada 2001 sebesar 68,65% (Ridwan Amiruddin, 2004)

Puskesmas Pattingalloang Makassar merupakan salah satu puskesmas yang cukup ramai dikunjungi masyarakat di Jl. Barukang, dengan jumlah ibu hamil sebanyak 345 orang. Di Kelurahan Pattingalloang Baru 58 bumil, Anemia 28 bumil. Pattingalloang lama sebanyak 82 bumil dengan jumlah Anemia sebanyak 43 bumil, Cambayya 136 bumil, Anemia sebanyak 84, Camba Berua 68 bumil, Anemia sebanyak 32 bumil. Jadi jumlah bumil yang menderita Anemia berdasarkan data tahun 2009 sebanyak 186 bumil (Data Puskesmas Pattingalloang Barukang, 2009).

Untuk data tahun 2010, jumlah ibu hamil sebanyak 289, anemia sebanyak 217, di Kelurahan Pattingalloang baru 53 bumil, anemia 38.

Pattingalloang lama 38 bumil, anemia 30. Kelurahan Cambayya 90 bumil, anemia 54. Kelurahan Camba Berua 40 bumil, anemia 37. Luar wilayah 68 bumil dengan anemia 58 (Data Puskesmas Pattingalloang Barukang, 2010).

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah umur ibu berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil?
2. Apakah pekerjaan ibu berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil?
3. Apakah pendidikan ibu berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil ?
4. Apakah pengetahuan ibu berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil?
5. Apakah asupan Fe ibu berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu dan asupan makanan dengan kejadian Anemia Defisiensi Besi pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattingalloang.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan kejadian anemia ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattinggaloang
- b) Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattinggaloang
- c) Untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattinggaloang
- d) Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattinggaloang
- e) Untuk mengetahui hubungan asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pattinggaloang



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan dalam menentukan kebijaksanaan dalam perencanaan program, khususnya peningkatan status gizi pada ibu hamil.

##### **2. Bagi Pihak Puskesmas Pattingalloang Makassar**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola program gizi dan program KIA untuk perbaikan di masa yang akan datang khususnya di Puskesmas Pattingalloang Makassar.

### **3. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat**

Sebagai bahan pustaka dalam rangka menambah informasi tentang ilmu kesehatan masyarakat.

### **4. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat berguna bagi ibu hamil agar mereka mengetahui pentingnya mengatur pola makan yang baik untuk meningkatkan status gizi agar supaya dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi dan berguna bagi masyarakat setempat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Pattingalloang yang selama ini kurang memperhatikan kesehatan.

### **5. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi peneliti dan memperoleh informasi dan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan memperluas pengetahuan.



## **A. Tinjauan Umum Tentang Anemia Ibu Hamil**

### **1. Pengertian Anemia Pada Ibu Hamil**

Anemia didefinisikan sebagai keadaan dimana level Hb rendah karena kondisi patologis. Defisiensi Fe merupakan salah satu penyebab anemia, tetapi bukanlah satu-satunya penyebab anemia. Penyebab lainnya adalah infeksi

kronik, khususnya malaria dan defisiensi asam folat. Sementara defisiensi Fe diartikan sebagai keadaan biokimia Fe yang abnormal disertai atau tanpa keadaan anemia. Biasanya defisiensi Fe merupakan akibat dari rendahnya bioavailabilitas intake Fe, peningkatan kebutuhan Fe selama periode kehamilan dan menyusui, dan peningkatan kehilangan darah karena penyakit cacingan atau *schistosomiasis*, (W.P.T. James. 2007:217-218).

Anemia gizi adalah keadaan dimana kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah lebih rendah dari nilai normal, sebagai akibat dari defisiensi salah satu atau beberapa unsure makanan esensial yang dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi tersebut (Dr.Arisman,MB,2004).

Anemia juga diartikan kekurangan salah satu zat atau lebih zat gizi yaitu zat besi, asam folat, vitamin B12, protein dan zat esensial lainnya. Zat gizi yang paling berperan dan penyebab utama anemia adalah zat besi (Fe). Itulah sebabnya anemia sering diidentikkan dengan gizi besi (Maryam H, 2004).

Anemia dapat terjadi bila keluarnya eritrosit dari sirkulasi maupun penghancuran eritrosit meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kadar produksi atau bila pelepasan eritrosit ke dalam sirkulasi menurun. Demikian pula bila kedua proses di atas terjadi bersamaan (Maryam H, 2004).

## **2. Penyebab Anemia**

Anemia umumnya disebabkan :

- a. Kekurangan zat besi, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C dan asam folat. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan zat besi dalam darah

rendah, praktik pemberian makanan yang kurang baik dan social ekonomi yang rendah.

- b. Kebutuhan zat besi tinggi yang disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kehamilan dan menyusui.
- c. Kerusakan pada sumsum tulang atau ginjal.
- d. Perdarahan kronik.
- e. Penghancuran sel darah merah.
- f. Kehilangan darah akibat perdarahan dalam atau siklus haid wanita.
- g. Penyakit kronik : TBC, paru, Cacing Usus.
- h. Penyakit darah yang bersifat genetic: hemofilin, Thalasemia.
- i. Parasit dan penyakit lain yang merusak darah: malaria.
- j. Terlalu sering menjadi donor darah.
- k. Gangguan penyerapan nutrisi (malabsorpsi)
- l. Infeksi HIV

Wanita yang sedang hamil memang memiliki kecenderungan untuk mengalami anemia, hal ini disebabkan oleh beberapa fakta seperti:

- a. Janin menggunakan dan mengambil cadangan protein, besi dan asam folat ibu untuk membentuk sel-sel tubuh dan sel darah janin, padahal ibu juga membutuhkannya untuk membentuk sel darah merahnya sendiri.
- b. Kehamilan menyebabkan peningkatan volume darah. Saat hamil, hormon-hormon akan mengondisikan calon ibu untuk mengalami peningkatan berat badan dan penambahan volume cairan tubuh



hingga mencapai 50%. Hal ini menyebabkan konsentrasi sel darah merah menurut akibat efek pengenceran sehingga terjadi kondisi relative anemia.

- c. Ibu hamil yang sering/ pernah mengalami perdarahan pervagina selama kehamilan (misalnya pada *plasenta previa* atau perdarahan hamil muda lainnya) harus berhati-hati. Walau sedikit-sedikit, namun bila berlangsung lama, bisa menyebabkan anemia.
- d. Kebiasaan diet/pola makan yang buruk pada ibu hamil perlu dihindari.

### 3. Gejala Anemia

Untuk mengenali adanya anemia kita dapat melihat dengan adanya gejala-gejala seperti : keluhan letih, lemah, lesu, dan loyo yang berkepanjangan karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ termasuk otot jantung dan rangka ini merupakan gejala khas yang menyertai anemia. Selain gejala-gejala tersebut biasanya juga akan muncul keluhan sering sakit kepala akibat berkurangnya darah ke otak, sulit konsentrasi, muka-bibir-kelopak mata dan kulit tampak pucat karena berkurangnya oksigenasi, telapak tangan tidak merah, nafas terasa pendek atau peningkatan kecepatan pernapasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen kepada darah, penurunan kualitas rambut dan kulit, kehilangan selera makan serta daya kekebalan tubuh yang rendah sehingga mudah terserang penyakit. Jika anemia bertambah berat bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Pada hamil mudah sering

terjadi mual muntah yang lebih hebat akibat penurunan aliran darah saluran cerna dan susunan saraf pusat.

Apabila sel darah merah dan trombosit juga terkena, maka gejala-gejala bertambah dengan; perdarahan dan mudahnya timbul memar, infeksi berulang, luka kulit dan selaput lendir yang sulit sembuh.

#### **4. Klasifikasi Anemia Ibu Hamil**

Berdasarkan klasifikasi WHO tahun 1972, anemia pada wanita hamil dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Normal :  $> 11 \text{ gr\%}$
- b. Anemia ringan :  $8-11 \text{ gr\%}$
- c. Anemia berat :  $< 8 \text{ gr\%}$

Menurut mekanisme patofisiologinya, anemia terbagi atas tiga bagian:

- a. Menurunnya produksi sel darah merah
  - 1. Faktor nutrisi (metabolic)
    - 1) Defisiensi besi
    - 2) Defisiensi asam folat
    - 3) Defisiensi B12
  - 2. Gangguan sumsum tulang
- b. Meningkatnya destruksi sel darah merah
  - c. Abnormalitas sel darah merah
  - d. Abnormalitas ekstrin sel
- e. Pendarahan (akut dan kronis)

Berdasarkan Purnawan dkk tahun 1982, anemia dalam kehamilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Anemia defisiensi besi : 62,5%
- b) Anemia megaloblastik : 29,0%
- c) Anemia hipoplastik : 8,0%
- d) Anemia hemolitik : 0,7%

Khusus pada wanita hamil, Hoo Swie Tjiong membagi anemia berdasarkan umur kehamilan dalam trimester dan criteria anemia menurut kadar hemoglobin, yaitu :

- a. Trimester I : 11,5 gr %
- b. Trimester II dan III : 10 gr %
- c. Anemia ringan : 8-10 %
- d. Anemia sedang : 6-8 gr %
- e. Anemia berat : < 6 gr %

##### **5. Patofisiologi Anemia Dalam Kehamilan**

Terjadinya anemia dalam kehamilan disebabkan karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang.

Darah bertambah banyak dalam kehamilan, yang lazim disebut *hidremia* atau *hipervolemia*. Akan tetapi, bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding sebagai berikut : plasma 30 %, sel darah 18 % dan hemoglobin 19 %.

Pengenceran darah dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita. Pertama-tama pengenceran itu meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat dalam masa hamil karena sebagai akibat hidremia cardiac output meningkat. Kerja jantung lebih ringan apabila viskositas darah rendah. Resistensi perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, pada pendarahan waktu persalinan, banyaknya unsure besi yang hilang lebih sedikit dibandingkan dengan apabila darah itu tetap kental.

Bertambahnya darah dalam kehamilan ini sudah dimulai sejak umur kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antara 32 dan 36 minggu. Jadi dengan pengenceran darah ini saja sudah menimbulkan anemia dalam kehamilan, apabila ditambah dengan penyebab anemia, maka akan memperberat anemia tersebut.

Sebagai suatu keadaan khusus, kehamilan, persalinan, dan laktasi cukup menguras cadangan zat besi ibu. Oleh karena itu jarak minimum antara persalinan yang satu dengan kehamilan berikutnya sebaiknya 2 tahun. Jarak ini dianggap adekuat untuk menggantikan  $\pm 1000$  mg zat besi yang terkuras selama kehamilan, persalinan dan laktasi dengan syarat diet harus seimbang. Namun, untuk daerah yang keadaan gizinya kurang baik dianjurkan mengambil jarak 3 tahun.

## **6. Cara Diagnosis**

Untuk menentukan adanya anemia perlu diperiksa terlebih dahulu kadar hemoglobin kemudian mencari penyebab anemia. Untuk mencari penyebab

anemia harus dilakukan pendekatan diagnosis secara bertahap dengan mencari data klinis pemeriksaan fisik dan laboratorium, dapat pula dilakukan dengan anamnesa. Pada anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Gejala klinis yang lain biasanya sesak nafas yang timbul setelah kegiatan fisik dan sakit kepala.

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan pertimbangan bahwa setiap ibu hamil mengalami anemia, maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet pada ibu-ibu hamil di puskesmas.

## **7. Metode Penetapan Kadar Hemoglobin Darah**

Untuk mengetahui seseorang menderita anemia perlu diperiksa terlebih dahulu kadar hemoglobin dalam darah, apabila kadar hemoglobinnya berada dibawah batasan nilai yang telah ditetapkan maka ia menderita anemia.

Batasan kadar nilai Hb untuk menentukan seseorang menderita anemia atau tidak bagi orang dewasa berbeda dengan anak-anak dan juga berbeda bagi wanita hamil dan tidak hamil, karena itu WHO {1972} telah menetapkan batasan nilai kadar Hb yang dianjurkan untuk digunakan sebagai standar internasional:

- a. Anak pra sekolah : 11 gr%
- b. Anak sekolah : 12gr%
- c. Laki-laki dewasa : 13gr%
- d. Wanita dewasa : 12gr%

e. Wanita hamil :11gr%

Metode untuk menentukan Hb saat ini banyak macamnya, masing-masing mempunyai Kelemahan dan kelebihan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada keadaan suatu fasilitas yang tersedia. Beberapa metode untuk menentukan kadar hemoglobin yaitu :

a. Metode Kertas Lakmus

Metode ini praktis dan sederhana serta tidak memerlukan pereaksi ataupun peralatan tertentu karena yang digunakan adalah kertas lakmus yang khusus untuk menentukan kadar Hb. Caranya, setelah darah ditetaskan di atas permukaan kertas lakmus, kemudian didiamkan sebentar pada suhu ruangan hingga darah menjadi kering sekitar 5 menit. Setelah kering warna darah yang terbentuk dibandingkan secara visual di tempat yang cukup terang dengan sederetan warna standar yang disediakan. Deretan warna yang ada pada standar sudah dikalibrasi sedemikian rupa secara kualitatif sehingga setiap warna menunjukkan nilai kadar Hb. Dengan demikian warna standar yang sebanding dengan darah yang diuji menunjukkan kadar Hb darah.

b. Metode Sahli

Prinsipnya membandingkan warna darah secara visual akan tetapi memerlukan peralatan dan pereaksi tertentu. Peralatan digunakan sangat sederhana, ringan sehingga memungkinkan dibawa di lapangan. Cara kerjanya kira-kira 5 tetes HC1 0,1 N dimasukkan ke dalam tabung khusus yang disebut tabung hemometer. Darah yang akan ditentukan kadar Hb-nya dipipet sebanyak 20 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung hemometer tadi, lalu

ditempatkan ke dalam tabung hemometer. Pada alat tersebut terdapat 2 tabung pertama berisikan contoh darah yang akan ditentukan kadar Hbnya dan tabung kedua berisikan larutan standar. Posisi kedua tabung tersebut berdampingan dan isi kedua tabung dapat dilihat dari sisi yang sama. Kemudian tabung yang berisikan contoh darah ditambah aquadest secara perlahan sehingga warna larutan menyamai warna larutan standar yang ada pada tabung sebelahnya. Setelah persamaan warna tercapai kadar Hb dapat diketahui dengan membaca batas permukaan larutan yang berimpit dengan skala tertera pada alat hemometer dekat dengan tabung contoh darah tadi, metode Sahli ini dianggap subyektif karena perbandingan warna dilakukan secara visual.

c. *Sianmethemoglobin*

Berbeda dengan metode kertas lakmus, metode *sianmethemoglobin* memerlukan peralatan dan pereaksi khusus tetapi hasil yang diperoleh lebih teliti. Darah dipipet dengan menggunakan pipet makro sebanyak 20 mikroliter kemudian dilarutkan dalam 5,0 ml larutan Dradkin (1g NaHCO<sub>3</sub>, 0,05 g KCN, 0,2 g KF(CN)) dalam satu liter aquadest yang sudah disediakan sebelumnya dalam suatu tabung reaksi. Larutan Dradkin dikocok untuk menyempurnakan kelarutan darah sehingga diperoleh warna larutan dibaca menggunakan alat *spectrophotometer* pada panjang gelombang 540 nm.

Hasil pembacaan menunjukkan kadar Hb, dihitung berdasarkan hasil pembacaan alat pada larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Metode ini sangat dianjurkan oleh WHO (1968) karena sampai saat ini dinilai

dapat menghasilkan data yang paling teliti. Kelemahannya adalah ketergantungan pada alat spectrophotometer yang masih terbatas pada instansi tertentu selain sukarnya pemeliharaan photometernya sendiri.

## 8. Pengaruh Anemia Pada Ibu Hamil

Ibu hamil yang menderita anemia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi bagi dirinya dan janin dalam kandungannya. Adapun pengaruh anemia Pada kehamilan dan janin, yaitu :

### a. Pengaruh anemia terhadap kehamilan :

#### 1) Bahaya selama kehamilan :

- a) Dapat terjadi abortus
- b) *Missed abortus*
- c) Kelainan kongenital
- d) Persalinan prematuritas
- e) Hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim
- f) Mudah terjadi infeksi
- g) Mudah dekompensasi cordis ( $Hb < 6g\%$ )
- h) *mola hidatidosa*
- i) *Hiperemesis gravidarum*
- j) Perdarahan antepartum
- k) Ketuban pecah dini (KPD)

#### 2) Bahaya saat persalinan



- a) Gangguan HIS, kekuatan mengejan
  - b) Kala pertama dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar
  - c) Kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelehkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan
  - d) kala uri dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan post partum karena *atonia uteri*.
  - e) Kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri
  - f) Hipoksia akibat anemia dapat menyebabkan syok dan kematian ibu pada persalinan sulit, walaupun tidak terjadi pendarahan.
- 3) Pada Masa Nifas
- a) Terjadi *sub inversio uteri* menimbulkan perdarahan post partum
  - b) Memudahkan infeksi purperium
  - c) Pengeluaran ASI berkurang
  - d) Terjadi dekompensasi cordis mendadak setelah persalinan
  - e) Anemia kala nifas
  - f) Mudah terjadi infeksi mammae

- b) Pengaruh anemia terhadap janin :

Hasil konsepsi membutuhkan zat besi dalam jumlah besar untuk Pembuatan butir-butir darah merah dan pertumbuhannya, sekalipun tampaknya janin mampu menyerap berbagai kebutuhan dari ibunya, tetapi dengan anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.

Anemia dapat menyebabkan gangguan dalam bentuk :

- 1) Abortus
- 2) Terjadi kematian intra uterin
- 3) Persalinan prematuritas tinggi
- 4) Berat badan lahir rendah
- 5) Kelahiran dengan anemia
- 6) Dapat terjadi cacat bawaan
- 7) Bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal
- 8) Intelegensia rendah
- 9) Cadangan besi kurang

#### **9. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia ibu hamil**

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

*Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya*

*(Shahih al-Bukhori dan Muslim)*

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada dasarnya adalah mencari dan mengatasi penyebabnya. Pada anemia berat (kadar Hb < 8 gr % ) biasanya terdapat penyakit yang melatarbelakangi antara lain penyakit TBC, infeksi cacing atau malaria, sehingga selain penanggulangan pada anemianya, harus pula dilakukan pengobatan terhadap penyakit tersebut. Pencegahan dan penanggulangan anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- 1) Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan

Mengonsumsi makanan sumber hewani (*heme iron*) seperti daging, hati, ikan dan telur dalam gizi yang cukup dapat mencegah anemia gizi besi. Mengonsumsi makanan kaya protein, zat besi dan asam folat seperti hati sebagai sumber protein yang baik bagi tubuh. Hati juga banyak mengandung zat besi, vitamin A dan berbagai mineral lainnya. Kacang-kacangan, gandum/beras yang masih ada kulit arinya, beras merah, dan sereal merupakan bahan tanaman yang kaya protein nabati dan asam folat atau vitamin B lainnya. Sayuran hijau, bayam, kangkung, jeruk dan berbagai buah-buahan kaya akan mineral baik zat besi maupun zat lain yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah dan hemoglobin.

Vitamin C diperlukan untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh, peningkatan penyerapan zat besi dalam tubuh, peningkatan konsumsi vitamin C sebanyak 25,50,100 dan 250 mg dapat memperbesar penyerapan zat besi sebesar 2, 3, 4, dan 5 kali. Konsumsi bahan pangan zat-zat penghambat absorpsi besi harus dikurangi. Zat inhibitor seperti fitat, kistat, tannin dan beberapa jenis serat makanan harus dihindari karena zat ini bersama zat besi membentuk senyawa yang tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat diabsorpsi. Teh mengandung tannin, jika dikonsumsi bersama-sama pada saat makan akan mengurangi penyerapan zat besi sampai 50%. Bahan lain yang mengandung penghambat absorpsi besi diantaranya kopi, kedelai, fitat dan fosfat yang banyak terdapat pada sereal.

## 2) Suplemen zat besi

Di Indonesia, pil besi yang umum digunakan dalam suplementasi zat besi adalah *ferrous sulfat*, senyawa ini tergolong murah, dapat diabsorpsi sampai 20%. Dosis yang digunakan beragam, tergantung pada status besi seseorang yang mengkonsumsinya. Biasanya ibu hamil yang rawan anemia diberi dosis yang lebih tinggi dibanding dengan wanita biasa. Pada wanita hamil, pil besi mulai diberikan pada trimester 11. Berlangsung setiap hari sampai melahirkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wanita hamil yang mendapatkan pil besi dan tambahan asam folat serta vitamin B12 kadar Hbnya naik lebih tinggi dibandingkan wanita hamil yang mendapat pil besi saja dalam konsentrasi yang sama.

### 3) Fortifikasi zat besi

Fortifikasi adalah penambahan suatu jenis gizi ke dalam bahan makanan untuk meningkatkan kualitas makanan suatu kelompok masyarakat. Keuntungan fortifikasi diantaranya dapat ditempatkan pada populasi yang besar dan biasanya relatif murah.

#### b) Pengobatan anemia

Apabila kadar Hbnya kurang dari 11gr%, maka ibu hamil dapat dianggap menderita anemia. Pengobatan dapat dinilai dengan preparat besi oral, biasanya diberikan *sulfat ferrous* atau *glukosa ferrous* sebanyak 600-1000 mg per hari. Secara umum, hal-hal berikut harus diperhatikan untuk menghindari anemia :

1. Sertakan makanan sumber vitamin C setiap kali makan
2. Sertakan juga daging, ayam atau ikan jika memungkinkan

3. Hindari meminum kopi atau teh saat makan
4. Makanlah beragam untuk meningkatkan ketersediaan zat besi
5. Hindari senyawa EDTA (*Ethylenediamine Tetracetic Acid*) pada makanan dengan memeriksa label makanan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Umur Ibu**

Umur ibu yang terlalu muda atau terlalu tua (< 20 tahun dan > 35 tahun) mempunyai resiko untuk melahirkan bayi yang kurang sehat, sedangkan ibu tersebut membutuhkan kalori yang banyak untuk dibagi pada janinnya ( Bidjang RF, 1992).

Wanita yang hamil pada usia muda dari segi biologis, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal, dari segi social ekonomi belum siap mandiri dan dari segi medis sering mendapatkan gangguan kesehatan, mudah mengalami abortus, pendarahan dalam kehamilan, lahir prematur, kematian janin dalam kandungan, mati saat lahir dan resiko BBLR (Zudi, 1989).

Menurut Depkes (1996), umur ibu mempunyai pengaruh yang erat dengan alat reproduksi wanita. Umur reproduksi yang ideal bagi wanita untuk hamil dan melahirkan adalah 20-35 tahun keadaan ini disebabkan karena pada umur kurang dari 20 tahun rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik dan belum cukup dewasa untuk menjadi ibu sedangkan pada umur 35 tahun ke atas elastisitas otot-otot panggul dan sekitarnya serta alat-alat reproduksi pada umumnya telah mengalami kemunduran sehingga dapat mempersulit persalinan dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian bayi dan ibu.

Perkembangan reproduksi ibu hamil yang berumur kurang dari 19 tahun masih belum optimal, jiwa masih labil sehingga pada kehamilannya sering menimbulkan komplikasi (Titiek, 1994). Pada umur muda mempunyai masalah kompetitif antara ibu dan janinnya, di mana selain kebutuhan besi oleh janin tinggi, ibu tersebut juga masih membutuhkan nutrisi untuk tumbuh ke arah kematangan tubuhnya. Adanya tekanan-tekanan jiwa dan metabolisme kehamilan yang berat memungkinkan terjadinya anemia. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan tentang persiapan dan pemeliharaan kehamilan masih rendah, serta telah mengalami anemia sebelum perkawinan (Rachmeilda, B.T. 1996).

Pada umur di atas 35 tahun, terjadinya anemia di sebabkan kemunduran terhadap fungsi faal tubuh dan juga munculnya kelainan-kelainan yang bersifat degenerative seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lainnya sehingga terjadi gangguan pendarahan serta menurunnya metabolisme tubuh dan absorbs tubuh terhadap zat besi. Hal ini diperberat dengan interval kehamilan yang pendek dan paritas yang tinggi (Maryam H,2004).

### C. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan Ibu

Allah berfirman :

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌۭٔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui, (Qs. Az Zumar : 39).

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktifitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada sesuatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya.(Pandji Anoraga, 2001:11)

Ibu yang bekerja mempunyai waktu kerja sama seperti dengan pekerjaan lainnya. Adapun waktu kerja bagi pekerja yang dipekerjakan yaitu waktu siang 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau dengan 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Sisa waktu 16-18 jam digunakan untuk kehidupan dalam keluarga, masyarakat, tidur, dan lain-lain.(Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003 : 13).

Bagi pekerja wanita, bagaimanapun juga mereka adalah ibu rumah tangga yang sulit lepas begitu saja, dari lingkungan keluarga. Wanita mempunyai beban dan hambatan lebih berat dibandingkan rekan prianya. Dalam arti wanita harus lebih dulu mengatasi urusan keluarga, suami, anak, dan hal-hal yang menyangkut tetek bengek rumah tangganya (Pandji Anoraga, 2001:121).

Pada kenyataannya banyak wanita yang tidak cukup mampu membatasi hambatan itu, sekalipun mereka mempunyai kemampuan teknik yang cukup tinggi jika mereka tidak mampu menyeimbangkan peran gandanya tersebut akhirnya mereka akan keteteran (Pandi Anoraga, 1998:121). Akan

tetapi bukan berarti wanita yang tidak bekerja merupakan jaminan bahwa anak-anaknya akan menjadi lebih baik di banding dengan anak-anak dari wanita yang bekerja (Pandi Anoraga,2001:125).

Pekerjaan merupakan suatu status yang dimiliki oleh suatu keluarga yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan keluarga. Ibu yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk kesehatan.

Ibu hamil yang mempunyai pekerjaan sebagai Ibu RT dan pegawai negeri sipil umumnya mereka mempunyai komsumsi makanan yang lebih baik dibandingkan dengan ibu-ibu hamil yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. Kurang baiknya komsumsi makanan ibu hamil yang berpekerjaan sebagai petani di pengaruhi oleh lamanya waktu yang dipergunakan oleh mereka untuk bekerja dan membantu suami berladang.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah:172)*

Pendapatan adalah hasil pencarian atau perolehan usaha (Departemen Pendidikan Nasional, 2002 : 236). Menurut Mulyanto Sumardi dan Hars Dieter Evers (1982 : 20), pendapatan yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri,



jadi yang dimaksud pendapatan adalah suatu tingkat penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer maupun sekunder (Soetjiningsih, 1995:10).

Jumlah adalah banyaknya (bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) (Departemen Pendidikan Nasional. 2002:480). Jumlah anak adalah banyaknya keturunan dalam satu keluarga. Jumlah anak yang banyak pada keluarga akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima, lebih-lebih jika jarak anak terlalu dekat. Pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan selain berkurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak, juga kebutuhan primer seperti makanan, sandang dan perumahan yang tidak terpenuhi. (Soetjiningsih, 1995:10).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Ibu**

Dalam UU RI. No. 2 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 disediakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa datang. Suatu tingkat pendidikan yang cukup merupakan dasar dalam mengembangkan wawasan serta sarana untuk memudahkan seseorang menerima pengetahuan, sikap dan perilaku baru yang diterimanya.

Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani.

Menurut Sir Godfrey Thopshon, pendidikan adalah suatu pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan, tingka laku, peikiran dan sikapnya (Notoatmojo, 1983)

Pendidikan di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh di sekolah secara teratur dan sistimatis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (dimulai dari TK sampai Perguruan tinggi)
- b. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati, di dalam keluarga, pekerjaan atau pergaulan sehari-hari.
- c. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, terarah, disengaja tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik untuk perbaikan taraf hidup mereka.

Nilai pendidikan dalam pembangunan dapat tersalurkan melalui sikap dan pola tingkah laku orang ketika berhadapan dengan berbagai kesempatan.

Nilai pendidikan itu antara lain:

- a. Disiplin yaitu kesediaan membagi waktu secara efisien dan efektif sehingga apapun yang dikerjakan dapat selesai secara memuaskan, tepat pada waktu yang ditentukan
- b. Sikap kritis yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu permasalahan secara teliti dan dari berbagai segi
- c. kerajinan dan ketekunan
- d. Kecerdasan dan keterampilan

Berdasarkan nilai pendidikan yang baru disebutkan, di dalam proses perkembangan saling kait mengait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya yang amat erat hubungannya dengan perilaku seseorang.

Menurut Abdullah (1984 dalam Nurlina, 2003) bahwa ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima ide baru atau lebih mudah menerima pesan dan lebih mudah terjadi pergeseran nilai-nilai baru karena pada pendidikan yang lebih tinggi tidak sekuat memegang nilai-nilai lama disebanding dengan pendidikan yang lebih rendah.

Termasuk di dalamnya antara lain tingkat pendidikan (wanita yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memperhatikan kesehatan diri dan keluarganya), pekerjaan (ibu yang bekerja di sector formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk kesehatan). Keberdayaan wanita (*woman empowerment*) yang memungkinkan wanita lebih aktif dalam menentukan sikap dan lebih mandiri dalam memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya ( termasuk kesehatan atau kehamilannya ). ( *safe motherhood* ).

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan. Maka transformasi pengetahuan, teknologi dan budaya yang sifatnya pembaruan akan mudah dan dapat diterima.

Pengertian pendidikan oleh Hamilton S. adalah proses pengembangan kepribadian dan intelektual seseorang yang dilaksanakan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai yang sesuai dengan sasaran penduduk. Selain itu, menurut Ngatimin., dan jalan untuk memudahkan seseorang untuk menerima motivasi (selvia, 2000)

Dari masa perkembangan peradaban kuno sampai munculnya abad pencerahan (*renaissance*) di Eropa, bidang pendidikan mendapat tempat utama dan strategis dalam kehidupan pemerintahan. Pendidikan merupakan yang paling utama, hal itu dapat kita lihat dari pendapat beberapa ahli berikut ini; Jean Jaques Rosseau, seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, Semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi melalui pendidikan. Aristoteles, ahli filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Van de venter, tokoh politik ETIS atau balas budi, yang menjadi tonggak awal perkembangan munculnya golongan terpelajar Indonesia juga mengatakan, Pendidikan yang diberikan kepada rakyat pribumi, akan dapat merubah nasib pribumi, Tokoh Pendiri nasional yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan

bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan.

Menurut UNESCO, badan PBB yang menangani bidang pendidikan menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dari pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan terhadap peradaban. Oleh karena itu UNESCO merumuskan bahwa pendidikan itu adalah: *Learning how to think* (Belajar bagaimana berpikir), *Learning how to do* (Belajar bagaimana melakukan), *Learning how to be* (Belajar bagaimana menjadi), *Learning how to learn* (Belajar bagaimana belajar), *Learning how to live together* (Belajar bagaimana hidup bersama).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak bagi umat manusia. Oleh karena itu, tidaklah sekedar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Tujuan pendidikan sesungguhnya menciptakan pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif. Sikap dan kepribadian yang positif antara lain:

- Memiliki dan bangga berkompetensi, yakni memiliki ilmu pengetahuan
- Bangga berdisiplin
- Tahan mental menghadapi kesulitan hidup
- Jujur dan dapat dipercaya (memiliki karakter yang baik dan integritas yang baik atau suka bekerjasama dalam tim)
- Memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah
- Bangga bertanggung jawab

- Terbiasa bekerja keras
- Mengutamakan kepedulian terhadap sesama
- Mengutamakan berdiskusi dari pada berdebat (not conflict but consensus)
- Hormat pada aturan
- Menghormati hak-hak orang lain
- Memiliki moral dan etika yang baik
- Mencintai pekerjaan
- Suka menabung

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Ibu**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui setelah melihat dan menyaksikan, mengalami atau diajarkan (Purwadaminta, 1982). Menurut Benyamin Bloom, pengetahuan merupakan bagian dari domain kognitif yang mempunyai enam tingkatan, yaitu :

##### 1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah diterima.

##### 2. Memahami (*comprehension*)

Memahami yaitu suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunkan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek kedalam komponen-komponen yang masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis yaitu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan kata lain kemampuan menganalisa dan juga mampu menyusun kembali baik bentuk semula maupun kebentuk yang lain.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Menurut Bloom, pengetahuan merupakan domain yang paling penting dalam terbentuknya perilaku seseorang. Perilaku yang didasarkan dengan pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Pengetahuan sangat penting dalam memberikan wawasan terhadap sikap dan perbuatan seseorang.

Masalah gizi lebih jelas merupakan maslah perilaku konsumen yang keliru, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat merupakan resultansi dari kurangnya penyuluhan tentang perilaku gizi baik

dan gencarnya promosi makanan *trendy fast food* dan *healthy food* di pihak lain. (Kodyat, 1994).

Alan Berg, pengetahuan tentang kesehatan terutama gizi, akan memberrikan pengaruh terhadap perilaku kebiasaan makan. Walaupun pengetahuan merupakan bagian dari kawasan perilaku, namun tidak menjamin bahwa seseorang dengan pengetahuan cukup memiliki perilaku yng sama. (Thaha, 1999).

Ketidaktahuan ditentukan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan gizi dan pangan yang rendah, serta tradisi dan kepercayaan. Penelitian Friedmen menunjukkan bahwa makanan keluarga yang berpenghasilan relatif baik, tidak hanya berbeda mutunya jika dibandingkan dengan makan keluarga yang berrpenghasilan rendah.hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan faedah makanan bagi kesehatan tubuh merupakan salah satu sebab kurangnya mutu gizi yang dikonsumsi.(Moehji,1992).

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan Ibu**

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ﴿٢٤﴾

*Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya (QS'abasa:24)*

Asupan makanan yang juga dikenal dengan istilah konsumsi makanan adalah jumlah total dari makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. (Damayanti, 2003).



Makanan yang dikonsumsi adalah informasi tentang jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat makanan yang dikonsumsi dapat ditinjau dari aspek jenis makanan yang dikonsumsi yang mencakup ragam jenis makanan dan jumlah makanan yang dikonsumsi serta frekuensi dan waktu makan.(Nursiang, 2002).

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas. Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh didalam susunan hidangan dan perbandingan yang satu terhadap yang lain. Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Kalau susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh baik dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang sebaik-baiknya, disebut konsumsi adequate.(Soediatama, 2000).

Asupan zat besi merupakan komponen yang paling penting dalam pernapasan. Zat besi merupakan bagian yang berguna untuk pengikat oksigen dalam eritrosit. Zat ini dibutuhkan oleh tubuh 15-30 mg per hari. Penyerapan zat besi dipermudah oleh asam klorida dalam lambung. (Irianto dan Waluyo, 2004:33).

Zat besi (Fe) lebih mudah diserap dari usus halus dalam bentuk *ferro*, penyerapan ini mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar feritin yang terdapat di dalam sel-sel mukosa usus. Pada kondisi Fe yang baik

hanya sekitar 10% dari Fe yang dapat diserap untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam sel, zat besi bekerjasama dengan rantai protein pengangkut electron, yang berperan dalam langkah-langkah akhir *metabolism energy*. Menurunnya produktifitas kerja pada kekurangan zat besi disebabkan oleh dua hal, yaitu (a) berkurangnya enzim-enzim mengandung besi dan besi sebagai kofaktor enzim-enzim yang terlibat dalam *metabolism energy*, (b) menurunnya hemoglobin darah. Akibatnya, *metabolism energy* di dalam otot terganggu dan terjadi penumpukan asam laktat yang menyebabkan rasa lelah. Defisiensi besi terutama menyerang golongan rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan menyusui serta pekerja berpenghasilan rendah. Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan penyembuhan luka. Disamping itu kemampuan mengatur suhu tubuh menurun. (Almatsier, 2004:45).

Kehamilan yang disertai dengan perubahan anatomi dan fisiologik yang mempengaruhi hampir semua organ tubuh, sebagian besar dari pengaruh ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut bukan merupakan respon terhadap janin semata, tetapi merupakan bagian integral dari sistem ibu dan anak (*maternal-fetal*) guna memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan janin. Seluruh pertumbuhan yang terjadi diperlukan untuk mengatur metabolisme ibu, perubahan pertumbuhan janin, persalinan dan menyusui. Dalam masa kehamilan, kebutuhan gizi meningkat dengan meningkatnya

umur kehamilan ibu. Tetapi pada umumnya pola konsumsi ibu hamil tetap atau bertambah sedikit. Pola makan ibu hamil di pengaruhi oleh selera, kebiasaan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan gizi dan pengetahuan keluarga.

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan gizi, karena selama kehamilan diperlukan berbagai unsur gizi yang jauh lebih banyak daripada masa tidak hamil. Hal tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan ibu itu sendiri, juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam kandungannya (Sjahmien, 1986). Oleh sebab itu bilamana selama masa kehamilan ibu tidak mengkonsumsi makanan yang cukup kualitas maupun kuantitas maka resiko untuk menderita gizi kurang akan lebih besar. Tujuan penataan gizi pada wanita hamil adalah untuk menyiapkan :

- (1) Cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu, janin, serta plasenta.
- (2) Makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh bukan lemak.
- (3) Cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat baku selama kehamilan.
- (4) Perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan

bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energy untuk menyusui serta merawat bayi kelak.

- (5) Perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan reaksi yang tidak diinginkan seperti mual dan muntah.
- (6) Perawatan gizi yang dapat membantu pengobatan penyakit yang terjadi selama kehamilan(diabetes kehamilan).
- (7) Mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik dan dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup (Arisman, 2004).

Menurut Ali Khosman dkk, (1994) ada beberapa faktor yang saling berhubungan dalam mempengaruhi konsumsi pangan. Faktor yang dominan adalah pengetahuan gizi dan pendapatan keluarga. Sekalipun daya beli termasuk factor penentu dalam menyediakan pangan, namun sebagian kekurangan gizi dapat teratasi jika orang tahu bagaimana memanfaatkan dengan benar segala sesuatu yang dimilikinya.

Jadi pola makan yang seimbang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan menyusun menu sehari-hari yang menjamin gizi yang baik. Untuk mencapai gizi yang baik diperlukan makanan yang beraneka ragam, agar menjamin terpenuhinya kecukupan sumber tenaga, sumber zat pembangun.

Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester II dan III. Sementara Widya karya pangan Nasional dan Gizi V 1993 mematok angka

285 kkal perhari. Angka ini tentu saja tidak termasuk penambahan akibat perubahan temperature ruangan kegiatan fisik, dan pertumbuhan. Patokan ini bagi mereka yang tidak mengubah kegiatan fisik semasa mengandung (Arisman, 2004).

Sementara untuk kebutuhan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi menganjurkan penambahan 12gr/hari sehingga dalam satu hari dapat mencapai 75-100 gram. Perkiraan besaran zat besi yang perlu ditimbun selama hamil adalah 1040 mg.

Meskipun kenaikan berat badan ibu kecil selama trimester I kehamilan, namun sangat penting artinya karena pada waktu inilah janin dan plasenta dibentuk. Kegagalan kenaikan berat badan ibu pada trimester I dan II akan meningkatkan bayi BBLR. Hal ini disebabkan adanya KEP akan menghasilkan ukuran plasenta kecil dan kurangnya suplai zat-zat makanan ke janin. Bayi BBLR mempunyai resiko kematian lebih tinggi daripada bayi cukup bulan. Kekurangan gizi pada ibu lebih cenderung mengakibatkan BBLR atau kelainan yang bersifat umum daripada menyebabkan kelainan anatomic yang spesifik. Kekurangan gizi pada ibu yang lama dan berkelanjutan selama masa kehamilan akan berakibat lebih buruk pada janin daripada malnutrisi akut (soetjningsih, 2004).

Gizi ibu pada waktu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya karena akan sangat berkaitan dengan berat bayi lahir. Angka kejadian BBLR lebih tinggi dinegara berrkembang, daripada Negara yang sudah maju (Soetjningsih, 1995).

Gizi adalah bahan makanan yang mengandung zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia ini tidak akan berlangsung lebih lama apabila tidak tersedia bahan makanan. Disamping itu makanan merupakan kepentingan yang utama bagi kelangsungan hidup manusia, Allah SWT. Menyediakan berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Al-An'am ayat 95 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۗ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah.*

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka kebutuhan manusia akan bahan makanan, maka Allah SWT telah menciptakan bumi untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia baik yang berupa butiran, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, daun-daunan semua itu di ciptakan oleh Allah SWT. Untuk dinikmati oleh manusia.

*“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Alloh berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun: 51).*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172).*

### **Allah Itu Thoyyib Tidak Menerima Kecuali Yang Thoyyib**

Thoyyib adalah suci, tidak ada kekurangan dan cela. Demikian juga Allah, Dia itu thoyyib. Dia suci, tidak ada kekurangan dan cela pada diri-Nya. Dia sempurna dalam seluruh sisi. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang thoyyib. Thoyyib dalam aqidah, thoyyib dalam perkataan dan thoyyib dalam perbuatan. Tidak menerima artinya tidak ridho, atau tidak memberi pahala. Dan ketidakridhoan Allah terhadap sebuah amal biasanya melazimkan tidak memberi pahala pada amalan tersebut.

### **Pengaruh Makanan Yang Thoyyib**

Mengonsumsi sesuatu yang thoyyib merupakan karakteristik para rasul dan kaum mukminin. Makanan yang thoyyib sangat berpengaruh terhadap kebagusan ibadah, terkabulnya doa dan diterimanya amal.

## BAB III

### KERANGKA KONSEP

#### A. Kerangka Konsep Penelitian

##### 1. Dasar Pemikiran variabel yang diteliti

Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik pada janin dan ibu, baik selama kehamilan, persalinan maupun dalam masa nifas. Dan kebutuhan zat besi meningkat pada usia kehamilan karena pertumbuhan janin, perkembangan plasenta dan ekspansi volume darah bertambah. Selain itu wanita dalam memasuki masa kehamilan sering tidak mempunyai cukup deposit zat besi, malah sebagian telah menderita anemia walaupun ringan.

Gangguan selama kehamilan dapat menyebabkan terjadinya abortus, terjadi persalinan *immature* dan *premature*, daya tahan tubuh menurun, mudah lelah dengan konsekuensi rawan terhadap infeksi dan jika anemia berat dapat terjadi dekompensasi kardis.

Defisiensi zat besi dan anemia menurunkan kapasitas kerja individual dan keseluruhan populasi dengan membawa akibat ekonomi yang serius dan menjadi penghalang bagi perkembangan nasional.

Masalah anemia merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial ekonomi, biomedis ibu, asupan gizi, lingkungan, pengetahuan dan budaya. Berdasarkan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian, maka variabel yang akan diteliti dari kejadian anemia pada ibu hamil adalah sebagai berikut:



a. Umur Ibu

Umur ibu adalah lamanya ibu hidup sampai sekarang, umur berkembang sejalan dengan perkembangan biologi alat-alat tubuh manusia di mana pada usia tertentu terdapat perubahan-perubahan fisiologis tubuh. Dalam kurun waktu reproduksi sehat diketahui bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-35 tahun. Anemia biasanya terjadi pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun, hal ini dapat terjadi karena berhubungan dengan fisiologis tubuh, kemampuan tubuh yang semakin rendah.

b. Pekerjaan Ibu

Ibu yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi kesehatan.

c. Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu berkaitan dengan tingkat pengetahuan ibu, semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin luas dan dalam pengetahuannya sehingga semakin besar kemungkinan memiliki atau mendapat sumber informasi sehingga pemilihan terhadap bahan makanan sumber zat gizi, penggunaan tablet besi dan factor pendukung lainnya akan semakin baik.


d. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan gizi ibu hamil akan mempengaruhi kebiasaan makan ibu hamil yang tercermin dari pemilihan makanan.

e. Asupan Makanan

Gizi Ibu pada waktu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya karena akan sangat berkaitan dengan berat bayi lahir.

2. Model hubungan antara variabel



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang diteliti

**B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

1) Kejadian Anemia Ibu Hamil

Ditemukannya kadar Hb dari seorang ibu hamil pada saat pemeriksaan dengan jumlah Hb kurang dari 11 gr% berdasarkan catatan di Puskesmas.

Kriteria Objektif :

Anemia : Kadar Hb ibu  $< 11$  gr %

Tidak anemia : Kadar Hb ibu  $\geq 11$  gr %

2) Umur Ibu

Lamanya ibu hidup dihitung sejak lahir sampai kehamilan terakhir dan dinyatakan dalam tahun berdasarkan catatan puskesmas.

Kriteria Objektif :

Resiko Tinggi : Umur ibu  $< 20$  tahun atau  $> 35$  tahun

Resiko Rendah : Umur ibu 20-35 tahun

3) Status Pekerjaan Ibu

Adalah aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh ibu dan mendapatkan penghasilan tetap dan bernilai ekonomi.

Kriteria Obyektif :

Bekerja : jika ibu bekerja secara tetap dan meninggalkan rumah

Tidak bekerja : jika ibu tidak bekerja secara tetap dan tidak meninggalkan rumah.

4) Pendidikan Ibu

Pendidikan adalah strata pendidikan ibu yang ditamatkan

Kriteria obyektif :

Tinggi : jika pendidikan ibu minimal tamat SMP

Rendah : jika ibu tidak menamatkan pendidikan SMP

5) Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu adalah apa yang diketahui dan diingat oleh ibu tentang anemia, gejala, serta pengaruhnya pada ibu hamil dan makanan apa saja yang mengandung zat besi.

Kriteria obyektif :

Cukup : bila ibu mampu menjawab 50% dari seluruh pertanyaan yang diajukan

Kurang : bila tidak memenuhi kriteria diatas

6) Asupan Fe

Adalah makanan yang mengandung Fe yang biasanya dikonsumsi oleh ibu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Kriteria Obyektif :

Cukup : jika asupan Fe lebih besar dari 80-100% AKG

Kurang : jika asupan Fe kurang dari 80-100% AKG

### C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan umur ibu dengan kejadian anemia ibu hamil
- b. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan kejadian anemia ibu hamil

- c. Tidak ada hubungan pendidikan dengan kejadian anemia ibu hamil
- d. Tidak ada hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia ibu hamil
- e. Tidak ada hubungan asupan makanan dengan kejadian anemia ibu hamil

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan umur dengan kejadian anemia ibu hamil
- b. Ada hubungan pekerjaan dengan kejadian anemia ibu hamil
- c. Ada hubungan pendidikan dengan kejadian anemia ibu hamil
- d. Ada hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia ibu hamil
- e. Ada hubungan asupan makanan dengan kejadian anemia ibu hamil



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Rancangan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah survey analitik dengan menggunakan rancangan *cross sectional study*. Survey analitik adalah jenis penelitian dimana data yang diidentifikasi telah terjadi atau sedang berlangsung tanpa adanya manipulasi variabel dari penelitian. Sedangkan rancangan *cross sectional study* lebih diarahkan untuk mendesain suatu penelitian dimana dalam hal ini variabel dependen dan independen diteliti dalam kurun waktu bersamaan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Puskesmas Pattingaloang Makassar dengan mempertimbangkan bahwa dilokasi tersebut prevalensi ibu hamil yang menderita anemia terus meningkat setiap tahunnya.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Pattingalloang periode 2010.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara total sampling yaitu semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya baik anemia maupun yang tidak anemia sebanyak 221 orang.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan data sekunder dan primer yaitu meliputi pengambilan data pada bagian tata usaha di Puskesmas Patingalloang Makassar tahun 2010 dan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel penelitian.

### E. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan program *W-Food* dan SPSS 15.0, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel disertai penjelasan.

**Tabel 4.1 Analisis Statistik**

Variabel Independen	Variabel Dependen		Jumlah
	Kategori 1	Kategori 2	
Kategori 1	A	b	a+b
Kategori 2	C	d	c+d
<b>Jumlah</b>	a+c	b+d	a+b+c+d

Keterangan:

a = banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif.

b = banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit akan tetapi menunjukkan hasil yang positif.

c = banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes negatif.

d = banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif.

## F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan semua karakteristik responden dan variabel dalam bentuk table narasi.

### 1. Analisis Univariat

Yaitu analisis varian untuk satu variabel dependent oleh dua atau lebih factor atau variabel atau dengan kata lain masing-masing variabel dianalisis sendiri (Cornelius 2005, 163).

### 2. Analisis Bivariat

Yaitu suatu bentuk analisis data untuk mencari keeratan hubungan dan arah hubungan (Cornelius 2005, 201). Pada analisis bivariat, variabel tersebut akan dikaitkan dengan variabel lainnya (Triton 2006, 12).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square dengan tingkat kemaknaan ( $\alpha$ ) = 0,05 dengan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{f=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :



$O_{ij}$  = Banyaknya kasus yang diobservasi yang dikategorikan dalam baris ke- $i$  pada kolom ke- $j$ .

$E_{ij}$  = Banyaknya kasus diharapkan di bawah  $H_0$  untuk dikategorikan dalam baris ke- $i$  dan kolom ke- $j$ .

Interpretasi:  $H_0$  ditolak jika nilai  $X^2 > X^2$  tabel.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Hasil Penelitian

##### a. Karakteristik Responden

##### 1) Umur

Umur responden pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**

Distribusi responden menurut umur ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Umur (thn)	Jumlah (n)	Persen (%)
< 20	56	26.7
21-30	104	49.5
31-40	50	23.8
Total	210	100.0

Tabel 1 menunjukkan distribusi responden menurut umur ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar dimana umur terendah berada pada umur 31 – 40 sebanyak 50 bumil (23.8%) sedang umur tertinggi berada pada umur 21 – 30 tahun sebanyak 104 bumil (49.5).

##### 2) Pendidikan

**Tabel 2**

Distribusi responden menurut pendidikan ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pendidikan	Jumlah (n)	(%)
Tidak sekolah	3	1.4
SD	36	17.1
SLTP	89	42.4
SLTA	66	31.4
PT/Akademik	16	7.6
Total	210	100.0

Tabel 2 menunjukkan distribusi responden menurut pendidikan ibu di wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar dimana pendidikan responden yang terbanyak adalah SLTP sebanyak 89 bumil (42.4%) dan terdapat 3 bumil (1.4%) yang tidak sekolah.

## b. Analisis Univariat

### 1) Umur

Distribusi responden menurut umur ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
Distribusi responden menurut umur ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Umur	Jumlah (n)	Persen (%)
Resiko tinggi	83	39.5
Resiko rendah	127	60.5
Total	210	100.0

Tabel 3 menunjukkan masih terdapat 83 bumil (39.5%) yang berumur kurang (terlalu muda dan terlalu tua) dan sebanyak 127 bumil (60,5%) Yang berumur cukup.

### 2) Pekerjaan

Distribusi responden menurut pekerjaan ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**

Distribusi responden menurut pekerjaan ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pekerjaan Ibu	Jumlah (n)	Persen (%)
Bekerja	101	48.1
tidak bekerja	109	51.9
Total	210	100.0

Tabel 4 menunjukkan terdapat 109 bumil (51.9%) yang tidak bekerja dan 101 bumil (48.1%) yang bekerja.

### 3) Pendidikan

Distribusi responden menurut pendidikan ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**

Distribusi responden menurut pendidikan ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pendidikan	Jumlah (n)	Persen (%)
Tinggi	172	81.9
Rendah	38	18.1
Total	210	100.0

Tabel 5 menunjukkan terdapat 38 bumil (18.1%) yang pendidikan rendah dan 172 bumil (81.9%) yang pendidikan tinggi.

### 4) Pengetahuan

Distribusi responden menurut pengetahuan ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 6**  
Distribusi responden menurut pendidikan ibu di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pengetahuan	Jumlah (n)	Persen (%)
Cukup	112	53.3
Kurang	98	46.7
Total	210	100.0

Tabel 6 menunjukkan terdapat 98 bumil (46.7%) yang pengetahuan kurang dan 112 bumil (53.3%) yang mempunyai pengetahuan cukup.

#### 5) Asupan Fe

Distribusi responden menurut Asupan Fe ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 7**  
Distribusi responden menurut Asupan Fe ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Asupan Fe	Jumlah (n)	Persen (%)
Cukup	124	59,0
Kurang	86	41,0
Total	210	100.0

Tabel 7 menunjukkan terdapat 86 bumil (64.8%) yang Asupan Fe kurang dan 124 bumil (35.2%) yang mempunyai asupan Fe cukup.

#### 6) Kadar Hb

Distribusi responden menurut Kadar Hb ibu pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8**  
Distribusi responden menurut Kadar Hb ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Kadar Hb	Jumlah (n)	Persen (%)
tidak anemia	16	7.6
Anemia	194	92.4
Total	210	100.0

**c. Analisis Bivariat**

**1) Hubungan Umur dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil**

**Tabel 9**  
Hubungan umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Umur	Kadar Hb				Total		P
	Tidak Anemia		Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Resiko rendah	7	5.5	120	94.5	127	100.0	0.00
Resiko tinggi	9	10.84	74	89.16	83	100.0	
Total	16	7.6	194	92.4	210	100.0	

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 127 bumil yang berumur cukup, ada sebanyak 120 (94,5%) bumil yang anemia dan sebanyak 7 (5,5%) bumil yang tidak anemia. Sedangkan dari 83 bumil yang berumur kurang, ada 74 (89,16%) bumil yang anemia dan sebanyak 9 (10,84%) bumil yang tidak anemia.

Dari hasil uji chi-square yang telah dilakukan diperoleh nilai  $p=0,00$  lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Interpretasi: ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

## 2) Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

**Tabel 10**

Hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pekerjaan Ibu	Kadar Hb				Total		P
	Tidak anemia		Anemia		n	%	
	n	%	N	%			
Bekerja	14	13.9	87	86.1	101	100.0	0.003
Tidak bekerja	2	1.8	107	98.2	109	100.0	
Total	16	7.6	194	92.4	210	100.0	

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari 101 bumil yang bekerja, ada sebanyak 87 (86,1%) bumil yang menderita anemia dan 14 (13,9%) bumil yang tidak anemia. Sedangkan dari 109 bumil yang tidak bekerja ada sebanyak 107 (98,2%) bumil yang menderita anemia dan 2 (1,8%) bumil yang tidak anemia.

Dari hasil uji chi-square yang telah dilakukan diperoleh nilai  $p=0,03$  lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Interpretasi: ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

## 3) Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

**Tabel 11**

Hubungan pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pendidikan	Kadar Hb				Total		P
	Tidak anemia		Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Tinggi	16	9.3	156	90.7	172	100.0	0.83
Rendah	0	0	38	100	38	100.0	
Total	16	7.6	194	92.4	210	100.0	

Tabel 11 menunjukkan bahwa dari 172 bumil yang pendidikan tinggi, ada sebanyak 156 (90,7%) bumil yang menderita anemia dan 16 (9,3%) bumil yang tidak anemia. Sedangkan dari 38 bumil yang pendidikan rendah ada sebanyak 38 (100 %) bumil yang menderita anemia.

Dari hasil uji chi-square yang telah dilakukan diperoleh nilai  $p=0,83$  lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima.

Interpretasi: tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

#### 4) Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

**Tabel 12**

Hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Pengetahuan	Kadar Hb				Total		P
	Tidak anemia		Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	14	12.5	98	87.5	112	100.0	0.01
Kurang	2	2.0	96	98.0	98	100.0	
Total	16	7.6	194	92.4	210	100.0	

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 112 bumil yang pengetahuan cukup, ada sebanyak 98 (87,5%) bumil yang menderita anemia dan 14 (12,5%) bumil yang tidak anemia. Sedangkan dari 98 bumil yang pengetahuan kurang ada sebanyak 96 (98,0 %) bumil yang menderita anemia dan 2 (2,0%) yang tidak anemia.

Dari hasil uji chi-square yang telah dilakukan diperoleh nilai  $p=0,01$  lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.



Interpretasi: ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

### 5) Hubungan Asupan Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

**Tabel 13**

Hubungan Asupan Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pattingalloang makassar tahun 2010

Asupan Fe	Kadar Hb				Total		P
	Tidak anemia		Anemia		N	%	
	n	%	n	%			
Cukup	10	8.1	114	91.9	124	100.0	0.978
Kurang	6	7.0	80	93.0	86	100.0	
Total	16	7.6	194	92.4	120	100.0	

Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 124 bumil yang Asupan Fe cukup, ada sebanyak 114 (91,9%) bumil yang menderita anemia dan 10 (8,1%) bumil yang tidak anemia. Sedangkan dari 86 bumil yang Asupan Fe kurang ada sebanyak 80 (93,0 %) bumil yang menderita anemia dan 6 (7,0%) yang tidak anemia.

Dari hasil uji chi-square yang telah dilakukan diperoleh nilai  $p=0,978$  lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima.

Interpretasi: tidak ada hubungan antara Asupan Fe ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

## 2. Pembahasan

### a) Hubungan Umur dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

Umur ibu mempunyai pengaruh yang erat dengan alat reproduksi wanita. Umur reproduksi yang ideal bagi wanita untuk hamil dan

melahirkan adalah 20-35 tahun keadaan ini disebabkan karena pada umur kurang dari 20 tahun rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik dan belum cukup dewasa untuk menjadi ibu sedangkan pada umur 35 tahun ke atas elastisitas otot-otot panggul dan sekitarnya serta alat-alat reproduksi pada umumnya telah mengalami kemunduran sehingga dapat mempersulit persalinan dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian bayi dan ibu (Depkes RI, 2002)

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan ada hubungan antara variabel umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu  $p = 0,00$  lebih kecil dari  $0,05$  artinya ibu hamil yang umurnya kurang, memiliki resiko menderita anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang berumur cukup.

Muhilal et al (1991) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat kecendrungan semakin tua umur ibu hamil maka presentasi anemia semakin besar. Pada penelitian ini belum menunjukkan adanya kecendrungan semakin tua umur ibu hamil maka kejadian anemia semakin besar. Karena 80% ibu hamil berusia tidak berisiko yaitu antara 20 tahun hingga 35 tahun. Hal ini juga dibuktikan dari hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang tidak bermakna antara usia ibu hamil dengan kejadian anemia ( $p > 0.05$ ). Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil. Karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya, berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia. Wintrobe (1987) menyatakan

bahwa usia ibu dapat mempengaruhi timbulnya anemia, yaitu semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya.

#### b) Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil

Pekerjaan merupakan suatu status yang dimiliki oleh suatu keluarga yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan keluarga. Ibu yang bekerja disektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, termasuk kesehatan.

Allah berfirman :

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۤ اَعْمِلُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٦١﴾

Terjemahannya :

*Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui"*

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya suatu pekerjaan, setiap manusia butuh pekerjaan, kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan sering kali tidak disadari, olehkarenanya bekerjalah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan agar kita dapat mensyukurinya.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu  $P= 0,03$  lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Depkes RI (2003), Pekerjaan mempengaruhi status sosial ekonomi dan ini akan berpengaruh dalam

mendapatkan pelayanan antenatal yang adekuat dan pemenuhan gizi. Ibu yang bekerja dapat menambah pendapatan rumah tangga sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan selama hamil secara rutin dan cukup di dalam pemenuhan gizi sehingga kejadian anemia ibu hamil dapat teratasi dibandingkan jika hanya suami yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari data diperoleh bahwa pekerjaan ibu sebagian besar masih tergolong kurang. Ada sebagian ibu yang pekerjaannya baik namun masih menderita anemia. Hal ini dikarenakan faktor ketidakperhatian ibu terhadap asupan makanannya, ibu yang terlalu sibuk bekerja di luar rumah sehingga mengabaikan kondisi saat hamil.

Dalam ajaran islam tidak melarang maupun mengharamkan perempuan bekerja di luar rumah seperti hadits “ *menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)*” (HR. Ibnu majah).

Akan tetapi perempuan jangan sampai melupakan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

c) **Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil**

Pendidikan ibu merupakan modal utama dalam menunjang ekonomi keluarga juga berperan dalam penyusunan makan keluarga, serta pengasuhan dan perawatan anak. Bagi keluarga dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan khususnya di bidang gizi, sehingga dapat

menambah pengetahuannya dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Depkes RI, 2000)

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu  $p= 0,1$  lebih besar dari  $0,05$ .

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Suhardjo (2003 : 113) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Hal ini bisa dijadikan landasan untuk membedakan metode penyuluhan yang tepat. Dari kepentingan gizi keluarga, pendidikan diperlukan agar seseorang lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi didalam keluarga dan bisa mengambil tindakan secepatnya.

Dari data diperoleh bahwa ibu yang berpendidikan tinggi lebih banyak menderita anemia, hal ini dikarenakan faktor ketidakperhatian ibu terhadap asupan makanannya.

**d) Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil**

Pengetahuan gizi dan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dan harus dimiliki oleh ibu sebagai orang yang mempunyai peranan besar dalam menentukan konsumsi makanan keluarga khususnya ibu hamil.

Tingkat pengetahuan ibu tentang gizi yang tinggi dapat mempengaruhi pola makan ibu saat hamil. Dengan pengetahuan yang baik, seorang ibu dapat memilih dan memberikan makan yang baik bagi pertumbuhan janin baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang memenuhi angka kecukupan gizi bagi ibu hamil. Asupan makanan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan ada hubungan antara variabel pengetahuan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu  $P = 0,01$  lebih kecil dari  $0,05$  artinya tingkat pengetahuan gizi ibu yang kurang berakibat buruknya status gizi ibu hamil.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Suhardjo (2003:11) yang mengatakan bahwa dalam penyediaan makanan keluarga dalam hal ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu, banyak yang tidak memanfaatkan bahan makanan yang bergizi, hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya pengetahuan akan bahan makanan yang bergizi. Dalam penyediaan makanan untuk keluarga khususnya bagi balita yang masih dalam proses pertumbuhan harus diperhatikan aspek gizinya sehingga kebutuhan akan zat-zat gizi yang penting bagi tubuh dapat terpenuhi.

Penelitian ini sejalan dengan ajaran agama Islam, sebagaimana dalam Q.S.al-Mujaadillah (58): 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita mengetahui hal-hal yang baik dilakukan untuk menjaga kesehatan diri dan yang dapat membahayakan kesehatan diri kita, hal-hal yang baik dalam rumah tangga kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan sehingga Allah swt akan meninggikan derajat orang-orang berilmu pengetahuan di banding orang-orang yang tidak berilmu.

e) **Hubungan Asupan Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil**

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kondisi status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang akan digunakan secara efisien,

sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal (Depkes RI, 2003).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan tidak ada hubungan antara Asupan Fe ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu  $P= 0,119$  lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Achmad Djaeni Sediaoetama (2000 : 25) yang berpendapat bahwa tingkat kesehatan gizi sesuai dengan konsumsi pangan, tingkat kesehatan gizi terbaik adalah kesehatan gizi optimum. Tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya kerja dan efisiensi yang sebaik-baiknya, serta mempunyai daya tahan setinggi-tingginya.

Dari data diperoleh bahwa asupan fe masih tergolong kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu tentang makanan yang tergolong baik untuk dikonsumsi. Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.
2. Ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar
3. Tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.
4. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.
5. Tidak ada hubungan antara Asupan Fe ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pattingalloang Makassar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar  
Peningkatan pembinaan ke Puskesmas dalam menangani kasus Anemia pada ibu hamil terutama Puskesmas yang terdapat kasus anemia paling tinggi.
2. Bagi Puskesmas Patingalloang  
Hendaknya memberikan penyuluhan secara rutin tentang kesehatan ibu (asupan Fe) agar dapat mendeteksi secara dini keadaan kesehatan ibu.

3. Bagi Masyarakat Terutama Kaum Ibu

Hendaknya kaum ibu sering-sering mengikuti perkembangan informasi kesehatan khususnya menyangkut ibu hamil melalui kegiatan penyuluhan maupun dari media cetak dan elektronik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil yang belum di teliti dalam penelitian ini



## DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Arisman, MB. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC, 2007.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suhardjo. *Perencanaan Pangan Dan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Supariasa, I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri dan Ibnu Fajar. *Penilaian Status Gizi*. EGC: Jakarta, 2002.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi penelitian Kesehatan*. Rineke Cipta, Jakarta :2002
- Gibney, Michael J., *et al. Public Health Nutrition*. Diterjemahkan oleh dr. Andry Hartono dengan judul *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2009.
- Stang. *Biostatistik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2005.
- Khumaidi, M. *Bahan Pangan Gizi Masyarakat*. PT BPK Gunung Muluk, Jakarta : 1994
- Khomsan, A. *Pangan dan Gizi Untuk kesehatan*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2003
- Wahyuni. *Hubungan factor Sosial, Ekonomi dan Budaya dengan Asupan Makanan Ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Barandasi Kec. Lau Kab. Maros*. Skripsi FKM Unhas, Makassar : 2006.
- Intern. Nurt. An. Consultative Group (INACG). 1979. *Iron In Fancy and Chilhood*. Nutrition Foundation, New York, 1979
- Anonymous. *Obstetri Patologi Kehamilan*. Elstar Offset : Bandung, 1984.

Anonymous. *Revitalisasi “ POSYANDU “ dalam Pembangunan Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. IPB : Bogor, 2004.

WHO Region Office For The Western Pasific. 1979. *The Health Aspects Of Food and Nutrition*. Edisi ketiga : Manila, 1979.

