

**ANALISIS KADAR VITAMIN C DALAM PRODUK OLAHAN BUAH
SALAK (*Salacca zalacca*) SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

INAYATI BUHARI
NIM. 701 001 06 079


**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010
Penyusun

INAYATI BUHARI
NIM: 70100106079



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Kadar Vitamin dalam Produk Olahan Buah Salak (*Salacca zalacca*) secara Spektrofotometri UV-VIS”, yang disusun oleh INAYATI BUHARI NIM: 70100106079, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2010, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 23 Agustus 2010

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing pertama : Rusli, S.Si., M.Si., Apt.
Pembimbing kedua : Haeria, S.Si.,
Penguji I : Abdul Rahim S.Si., M.Si., Apt
Penguji II : Drs. Darsul S. Puyu, M. Ag.

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc.Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba yang beriman selain puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta' ala. Tuhan Yang Maha Mengetahui. Pemilik segala ilmu, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis skripsi yang berjudul “**Analisis Kadar Vitamin C dalam Produk Olahan Buah Salak (*Salacca zalacca*) secara Spektrofotometri UV-VIS**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan yang bersifat moril maupun material dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rusli, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing I dan Ibu Haeria, S.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus ikhlasnya meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.DR. H. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak dr. H.M. Furgaan Naiem, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Gemy Nastity Handayany. S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Jurusan Farmasi Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Bapak Abdul Rahim. S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Jurusan Farmasi Periode 2008/2009 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf Karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Kepala Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin yang telah bersedia menerima dengan tulus untuk melakukan penelitian.
7. Kak Fibiyanthy selaku Asisten Kepala Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin yang dengan sabar membimbing menyelesaikan Penelitian.
8. Buat Kakakku Siti Amina A.Md Kom, dan adikku tersayang Gusniyati Buhari, Sulhasni, dan Muh. Hidayat serta saudara- saudaraku Darsia S.Kep, serta mahasiswa/i Massenrempulu yang selalu menemani dan memberikan dorongan serta motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Buat sahabat- sahabatku Indah, Fua, Amriani, Iffa, Fitri, Dita, Tati, Riswadi, Rasdiana, Arul, Mency, Arul, Nini, kiki, iyank n sukma yang telah menumbuhkan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat teman – teman KKN angkatan 45 (Ria, Hasna, Hera, Hikma, Adi, Edi, Agusri, Luke, Amar, Niar, Zul, Kifli, Jusman, Ica, juarni) yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Jurusan Farmasi angkatan 2006 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan partisipasinya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai selesainya skripsi ini.

Sujud hormat dan ungkapan terima kasih tak terhingga penulis kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda H. Buhari. M.Pd** dan **Ibunda Hj. Husniyati** serta seluruh keluarga yang tercinta, yang telah memberikan perhatian, dorongan dan bantuan material yang sangat berharga serta doa restunya dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada pada penulis, kesempurnaan hanyalah milik yang maha sempurna Allah SWT, olehnya itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tegur sapa dan kritikan yang sifatnya membangun senantiasa penulis nantikan dengan penuh keterbukaan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan penulis selanjutnya dan kepada semua pihak yang berkenan membacanya. Amin

Makassar, 23 Agustus 2010
Penyusun

INAYATI BUHARI
NIM: 70100106079

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-3
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	3
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4-15
A. <i>Uraian Tanaman</i>	4
B. <i>Uraian Umum Vitamin C</i>	5
C. <i>Uraian Spektrofotometri UV – VIS</i>	10
D. <i>Prinsip Reaksi</i>	14

E.	<i>Tinjauan Islam Mengenai Kandungan Buah-buahan</i>	15
BAB	III METODOLOGI PENELITIAN	20-23
A.	<i>Alat dan Bahan</i>	20
B.	<i>Penyiapan Sampel</i>	20
C.	<i>Analisis Kualitatif Sampel</i>	22
D.	<i>Analisis Kuantitatif Sampel</i>	22
1.	<i>Pembuatan Larutan Standar Vitamin C.....</i>	22
2.	<i>Penentuan Panjang Gelombang Maksimum.....</i>	23
3.	<i>Pembuatan Larutan Sampel.....</i>	23
4.	<i>Pengukuran Vitamin C dalam Produk Olahan Salak.....</i>	23
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A.	<i>Hasil Penelitian</i>	24
B.	<i>Pembahasan</i>	24
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	28
A.	<i>Kesimpulan</i>	28
B.	<i>Saran</i>	28
DAFTAR PUSTAKA.....		29

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Analisi Vitamin C dalam Produk Olahan Dengan Uji Warna.....	31
Tabel 2	Hasil Pengukuran Serapan Larutan Baku Vitamin C pada Panjang Gelombang 490- 530 nm	32
Tabel 3	Hasil Pengukuran Serapan Larutan Vitamin C Baku pada Panjang Gelombang 500	33
Tabel 4	Hasil Pengukuran Serapan Vitamin C Sampel pada Panjang Gelombang 500 nm	35
Tabel 5	Hasil Perhitungan Kadar Vitamin C Sampel	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Panjang Gelombang Maksimum Vitamin C.....	33
Gambar 2	Serapan Larutan Baku Vitamin C pada panjang Gelombang 500 nm	27
Gambar 3	Kurva Kalibrasi Vitamin C	29
Gambar 4	Produk Olahan Buah Salak	42
Gambar 5	Uji Kuantitatif Sampel	43
Gambar 6	Uji Kualitatif Sampel	44
Gambar 7	Larutan 2,6-Diklorofenol indofenol	45
Gambar 8	Penambahan Larutan 2,6-Diklorofenol indofenol ke dalam Sampel	46
Gambar 9	Spektrofotometri UV-VIS	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Skema Kerja	37
Lampiran B Perhitungan Kadar Sampel	38
Lampiran C Dokumentasi Penelitian	42



ABSTRAK

Nama Penyusun : Inayati Buhari
NIM : 70100106079
Judul : Analisis Kadar Vitamin C Dalam Produk Olahan Buah Salak (*Salacca zalacca*) Secara Spektrofotometri UV-VIS

Telah dilakukan penelitian Analisis Kadar Vitamin C dalam Produk Olahan Buah Salak (*Salacca zalacca*) secara Spektrofotometri UV – Vis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar vitamin C yang terdapat dalam produknya. Penelitian yang dilakukan dengan pemeriksaan kualitatif dengan reaksi warna dan secara kuantitatif dengan metode kolorimetri menggunakan spektrofotometri UV - Vis.

Tiga jenis olahan buah salak yaitu manisan, selai, dan sari buah menjadi obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin C dari manisan, selai, dan sari buah masing -masing adalah 8,6432 mg/100 g, 0,8,6451 mg/100 g, 7,8008 mg/100 g

Kata Kunci : Vitamin C, Buah salak, spektrofotometri UV-Vis



ABSTRACT

Author : Inayati Buhari
Student Reg. Number : 70100106079
Title : Analysis of content vitamine C in salak fruit
(*Salacca zalacca*) spektrofotometric UV-Vis

An assay of vitamine C content in processed product of salak (*Salacca zalacca*) has been done. The aim of this investigation was to determine qualitative and quantitatively ascorbic acid content in fresh fruit and its product by colorimetric method use visible spektrofotometer.

The object of this study were jam, sweets and essence were from of salak. The ascorbic acid content from jam, sweets, and essence were 8,6432 mg/100 g, 0,8,6451 mg/100 g, 7,8008 mg/100 g

Key words: Vitamine C, salak fruit, UV - Vis spektrofotometric



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuhan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup makhluk di atas bumi ini. Tumbuhan sebenarnya merupakan pabrik kimia yang canggih, setiap saat dapat memproduksi senyawa kimia secara teratur dan seimbang baik sebagai produk metabolit primer maupun sekunder. Manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin, yang dapat memenuhi kebutuhan dalam tubuh. Vitamin yang menjadikan tubuh menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit (Fauziah, 1995).

Salak merupakan tanaman tropis dari Indonesia yang dikenal dalam bahasa ilmiah *Salacca zalacca* merupakan tanaman buah yang digemari oleh masyarakat. Salak yang pernah ditemukan di dunia hingga kini jumlahnya 20 dan sebagian besar tumbuh secara alami di wilayah negara Indonesia. Nama buah salak biasanya diambil dari nama tempat seperti salak Pondoh, Swaru, Kacuk, Enrekang, Bangkalan dan salak Bali.

Salak dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan minuman. Secara tradisional seduhan daun salak dapat digunakan untuk mengobati gagal ginjal kronis. Buah salak dapat diolah tergantung jenisnya dan dibuat sari buah, dodol, manisan, selai, wine, cuka, nectar, dan leather. Kandungan buah salak meliputi air, tanin, serat, gula, mineral, dan vitamin (Sofia, 2007).

Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karenanya harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Vitamin pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu vitamin yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E dan K serta vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari vitamin C dan B (Winarno, 1986).

Teknologi industri semakin berkembang, maka bentuk dan macam dari pengolahan makanan semakin bervariasi seperti buah kaleng, sirup dan sari buah yang mengandung vitamin C. Dalam bentuk senyawa vitamin C sangat stabil dalam bentuk kering. Akan tetapi dalam bentuk larutan seperti halnya dalam bentuk pangan vitamin C paling tidak stabil dibanding dengan zat gizi lainnya. Mengetahui faktor yang membantu melindungi kestabilan vitamin C adalah penting guna memproses dan mengolah makanan yang mengandung vitamin C (Suhardjo, 1986).

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kadar vitamin C didalam makanan antara lain lama penyimpanan, cahaya matahari dan pemanasan yang terlalu lama. Kadar vitamin C dipengaruhi oleh faktor-faktor mekanis seperti pemotongan, penghancuran juga dipengaruhi oleh pH, oksigen dan katalisator logam. Adanya oksigen akan menyebabkan vitamin C terdegradasi (Moehji, 1982).

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang analisis kadar vitamin C dalam produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) secara spektrofotometri UV-Vis.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka masalah yang timbul adalah berapa kandungan vitamin C dalam produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kadar vitamin C yang terdapat dalam produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) berupa selai, manisan, dan sari buah.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan, peneliti lainnya dan mahasiswa tentang kandungan vitamin C pada produk hasil olahan buah salak (*Salacca zalacca*).
2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kandungan vitamin C pada produk hasil olahan buah salak, sehingga penggunaannya lebih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman*

1. Klasifikasi Tanaman (Heyne, 1987)

Regnum	:	Plantae
Divisio	:	Magnoliophyta
Class	:	Liliopsida
Ordo	:	Arecales
Family	:	Arecacea
Genus	:	Salacca
Spesies	:	<i>Salacca zalacca</i>

2. Nama Daerah (Heyne, 1987)

Sumatra	:	Sala (Minangkabau) Salak (Melayu)
Jawa	:	Salak (Sunda) Salak (Jawa Tengah)
Bali	:	Salak
Sulawesi	:	Salak (Makassar) Sala (Bugis)
Kalimantan	:	Tusun (Kalimantan Selatan)

3. Morfologi Tanaman (Heyne, 1987)

Habitat	:	Perdu, tahunan, tinggi 2-3,5 m
Batang	:	Tegak, bulat, coklat.
Daun	:	Majemuk, bertangkai, berduri, anak daun tidak bertangkai, bentuk lanset, ujung runcing, tepi daun pangkal rata, permukaan bawan berlapis

lilin, panjang 50-75 cm, lebar 7-10 cm.

- Buah : Sangat manis, manis, daging buah relative tebal
- Bunga : Tonggol, bertangkai, panjang bunga 7-15 cm, coklat muda.
- Biji : Keras, kecil, coklat kehitaman
- Kulit : Bersisik kecil-kecil
- Akar : Serabut coklat muda

4. Manfaat Tanaman

Daging buah *Salacca zalacca* berkhasiat sebagai obat mencret. Untuk obat mencret dipakai \pm 20 gram daging buah yang masih muda. *Salacca zalacca*, dikupas, buahnya dimakan sekaligus. Secara tradisional seduhan daun dapat digunakan untuk mengobati gagal ginjal kronis. (Heyne, 1987).

5. Kandungan Kimia

Kandungan kimia buah salak meliputi tanin, saponin dan flavonoid (Heyne, 1987).

B. Uraian Umum Vitamin C

1. Sejarah Vitamin C

Vitamin C adalah vitamin antisariawan, oleh karena itu digunakan untuk pencegahan dalam pengobatan sariawan. Vitamin C mulai dikenal setelah dipisahkan dari air jeruk pada tahun 1928. Penyakit karena defisiensi vitamin C telah menghantui masyarakat para pelaut untuk beberapa abad sebelum dikenal adanya vitamin.

Penyakit yang ditimbulkan oleh defisiensi vitamin C adalah skorbut, telah merenggut sejumlah besar jiwa diantara para pelaut yang melakukan pelayaran jarak jauh dan untuk waktu lama tidak menyinggahi suatu pelabuhan untuk mendapatkan bahan yang segar.

Walaupun vitamin C telah diisolasi pada tahun 1982 oleh Albert Szent Gyorgyi, namun tidak digunakan untuk mencegah dan mengobati sariawan pada relawan sampai dilakukan isolasi kembali. Komponen lemon oleh C.Gleen King dari Universitas Pittburgh pada tahun 1932, setelah itu ditemukan rumus bangun yang benar dari vitamin C dan sintesanya disempurnakan. Vitamin C juga dikenal dengan nama L-askorbat dalam bentuk reduksi dan sebagai asam dehidroaskorbat dalam bentuk oksidasi (Sediaoetama,1987).

2. Biosintesa Vitamin C

Tumbuh-tumbuhan dan hewan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan biosintesis vitamin C. Di dalam jaringan tumbuhan dan hewan tertentu vitamin C disintesis dari beberapa jenis gula yaitu D-glukosa, fruktosa, sukrosa, dan D-galaktosa. Pada binatang percobaan seperti tikus dapat mensintesis vitamin C dari D- glukosa menjadi bentuk intermediate D-asam glukuronat, L-asam gulonat dan L-glukonolakton dan akhirnya menjadi L-asam askorbat. Manusia, monyet, marmut, dan kelelawar tidak mampu

untuk mensintesis vitamin C karena kekurangan enzim hepatic yang diperlukan untuk mengubah L-gulonolakton menjadi asam askorbat dan karenanya mereka harus mendapatkannya dari luar tubuh yaitu melalui makanan (Belitz, 1987).

3. Uraian Bahan Vitamin C (FI, 1979)

Nama resmi	: Acidum Ascorbicum
RM	: $C_6H_8O_6$
BM	: 176,13
Pemerian	: Serbuk atau hablur, putih atau agak kuning, tidak berbau, rasa asam
Kelarutan	: Mudah larut dalam air,agak sukar larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam kloroform.
Penyimpanan	: Dalam wadah tertutup rapat,terlindung dari cahaya.
Khasiat	: Antiskorbut

4. Fungsi Vitamin C (Andarwulan, 1992)

Vitamin C adalah salah satu vitamin yang sangat diperlukan tubuh kita penting dalam membentuk kolagen, serat, struktur protein. Kolagen dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi dan juga untuk membentuk jaringan bekas luka. Vitamin C juga berperan dalam meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi dan membantu tubuh menyerap zat besi.

5. Sumber Vitamin C

Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah jeruk, nenas, jambu, tomat, bayam, brokoli, cabe hijau, mangga, dan sebagainya (Winarno, 1986).

6. Stabilitas Vitamin C dan Penguraian Vitamin C

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena adanya udara (oksidasi) terutama apabila terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam keadaan asam. Pangan dapat kehilangan vitamin C sejak dipanen hingga sampai dimeja makan. Keadaan yang menyebabkan hilangnya vitamin C adalah lama disimpan, perendaman dalam air, dimasak dengan suhu tinggi untuk waktu lama, dimasak dalam panci besi atau tembaga, dan dibiarkan lama sesudah dimasak pada suhu kamar atau suhu panas sebelum dimakan (Andarwulan, 1992).

7. Analisis Vitamin C

Pengukuran vitamin dengan menggunakan 2,6 -diklorofenol indofenol pertama kali dilakukan oleh Tillmans pada tahun 1972. Metode ini pada saat sekarang merupakan cara yang paling banyak untuk menentukan kadar vitamin C dalam bahan pangan.

Dalam larutan vitamin C terdapat juga bentuk asam dihidroaskorbat yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dengan senyawa indofenol. Agar dapat menghitung jumlah dehidroaskorbat diperlukan perlakuan pendahuluan untuk mengubah bentuk dehidro menjadi asam askorbat. Karena jumlah asam dehidroaskorbat dalam jaringan segar sangat kecil tetapi dalam bahan-bahan yang disimpan jumlahnya cukup besar maka kadar vitamin C dapat ditentukan dengan titrasi secara langsung menggunakan indofenol. Jaringan segar yang akan diukur kandungannya diekstrak dengan asam kuat secara cepat. Asam-asam yang dapat digunakan antara lain asam asetat, asam trikloroasetat, asam metafosfat dan asam oksalat. Penggunaan asam dimaksudkan untuk mengurangi oksidasi vitamin C oleh enzim-enzim oksidasi dan pengaruh yang terdapat dalam jaringan tanaman. Asam yang paling baik digunakan adalah asam metafosfat karena dapat memisahkan vitamin C yang terikat pada protein.

Indofenol sering pula disebut "dye" yang berwarna biru dalam larutan basa dan merah dalam larutan asam direduksi oleh asam askorbat membentuk dehidroaskorbat dan indofenol tereduksi yang tidak berwarna yaitu dehidro 2,6- dikloroindofenol. Metode "dye" spesifik untuk membentuk asam askorbat tereduksi dalam larutan. Perubahan warna dapat dilihat secara fotometri atau secara

kolorimetri. Cara kolorimetri didasarkan pada pengukuran jumlah larutan 2,6-diklorofenol indofenol yang dihilangkan warnanya oleh asam askorbat (Muchtadi, 1989).

C. Uraian Spektrofotometri UV-Vis


Spektrofotometri adalah suatu instrument untuk mengukur transmittan atau absorban suatu contoh sebagai fungsi panjang gelombang, pengukuran terhadap sederetan sampel pada suatu panjang gelombang tunggal dapat dilakukan (Underwood, 1995).

Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorpsi pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak. Dalam instrument ini suatu sinar cahaya terpecah sebagian cahaya diarahkan melalui sel transparan yang mengandung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu senyawa yang mengandung ikatan-ikatan rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diabsorpsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorpsi, tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur senyawa. Absorpsi radiasi disebabkan oleh pengurangan energi cahaya radiasi ketika elektron dalam orbital dari daerah tereksitasi keorbital energi tinggi (Mulja, 1990).

1. Instrumental Spektrofotometer Visebel (Mulja, 1950).

a. Sistem Optik

Pada umumnya konfigurasi dasar setiap spektrofotometer berupa susunan peralatan optic terkonstruksi sebagai berikut:



Gambar 1. Skema kerja spektrofotometri UV-Vis

Keterangan:

SR: Sumber radiasi
 M : Monokromator
 SK: Sampel kompartemen
 D : Detektor
 A : Amplifier/penguat
 VD : Visual Display/Meter

b. Sumber Radiasi

Sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium ,lampu tungstein dan lampu merkuri,lampu deuterium dapat dipakai pada daerah panjang gelombang 180-370 nm karena pada rentang panjang gelombang tersebut memberikan gambaran energi radiasi yang lurus sedangkan pada panjang gelombang tersebut memberikan gambaran energi radiasi yang lurus sedangkan

pada panjang gelombang 486-651,1 nm memberikan 2 garis yang dapat dipakai untuk mengecek ketepatan panjang gelombang pada spektrofotometer sedangkan lampu tungstein dipakai pada sumber radiasi pada panjang gelombang 380-900 nm dan lampu merkuri dipakai pada panjang gelombang 380-900 nm dan lampu merkuri dipakai pada panjang gelombang 365 nm yang dipergunakan untuk kalibrasi panjang gelombang dan mengecek resolusi dari monokromator pada spektrofotometer.

c. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator biasanya terdiri dari susunan celah (slit) masuk, filter, prisma, kisi, dan celah keluar.

d. Celah (Slit)

Celah monokromator adalah bagian pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator spektrofotometer. Celah dibuat dari logam yang kedua ujungnya diasah dengan cermat hingga sama lebar celah masuk dan keluar harus sama yang dapat diatur dengan memutar tombol mekanik atau diatur dengan sistem elektronik.

e. Filter Optik

Cahaya tampak merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan filter optik yang dipakai.

f. Prisma dan Kisi (Grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatik.

g. Sel / Kuvet

Sel atau kuvet merupakan wadah sampel yang dianalisa. Ditinjau dari pemakaiannya kuvet ada 2 macam yaitu kuvet permanen terbuat dari bahan gelas atau leburan silica dan kuvet untuk satu kali pemakaian yang terbuat dari Teflon atau plastik.

h. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting. Oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer. Fungsi detektor

didalam spektrofotometer adalah merubah signal radiasi yang diterima menjadi signal elektronik.

i. Amplifier

Digunakan untuk memperkuat signal listrik yang berasal dari detektor.

j. Visual Display/Meter

Visual display digunakan untuk melihat hasil yang diperoleh secara tertulis.

D. Prinsip Reaksi

Vitamin C dapat dianalisis dengan cara bioassay atau prosedur kimiawi. Prosedur yang biasa digunakan dalam metode kimia didasarkan pada salah satu dari 2 prinsip: (1) Pengukuran laju reduksi dari bahan pengoksidasi tertentu seperti biru metilen, 2,6-diklorofenol indofenol. (2) Pengukuran kompleks berwarna yang dihasilkan dari asam dehidroaskorbat dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin.


Zat warna biru, 2,6-diklorofenol indofenol, pada keadaan stoikiometri direduksi menjadi komponen tidak berwarna oleh vitamin C (bentuk reduksi). Jumlah vitamin C digambarkan oleh laju atau tingkat perubahan ini yang dapat diukur dengan cara titrasi atau dengan kolorimetri fotoelektrik. Terdapat sejumlah metode analisis untuk vitamin C.

Metode kimia tergantung dari :

- 1.) Bahan pereduksi dari gugus 1,2 enediol yang memungkinkan perubahan absorben.
- 2.) Bentuk hidrazon

Pegukuran vitamin C dengan menggunakan 2,6-diklorofenol indofenol pertama kali dilakukan oleh Tillmans pada tahun 1972. Indofenol sering pula disebut "dye" yang berwarna biru dalam larutan basa dan merah dalam larutan asam. Vitamin C akan mereduksi zat warna dan terbentuk dehidroaskorbat dan indofenol tereduksi yang tidak berwarna. Metode ini spesifik didalam larutan dengan kisaran pH 1-3,5.

Perubahan warna dapat dilihat secara fotometri atau cara klorimetri. Cara klorimetri didasarkan pada pengukuran jumlah larutan 2,6-diklorofenol yang dihilangkan warnanya oleh vitamin C.



Gambar 2. Reaksi 2,6- diklorofenol indofenol (Higuchi, 1961)

E. Tinjauan Islam Mengenai Kandungan Buah-buahan

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Sehingga salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut, sebagaimana dalam Q.S. AnNahl (16) : 11

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Departemen Agama RI, 268)

Salak termasuk tanaman **لِزَّرْعٍ** jangka panjang artinya selain buah zaitun, kurma dan anggur ada buah-buahan dalam hal ini termasuk buah salak.

Allah SWT menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu tanaman-tanaman dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga

kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan halal atau minuman yang haram dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan.

Ayat di atas menunjuk buah kurma dengan nama (النَّخِيل) an-

nakhil yang digunakan untuk menunjuk pohon dan buahnya secara keseluruhan. Hal ini, menurut al-Biqai'i, untuk mengisyaratkan bahwa terdapat banyak sekali manfaat pada pohon kurma. Semuanya itu sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. (Quraish shihab, 2008 vol 7,198)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Terjemahannya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Departemen Agama RI, 122)

Makna dari surah Al- Maidah menyarankan kepada manusia untuk makan makanan yang halal, dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti buah salak yang merupakan buah yang *Thayyibah* makanana yang halal mengandung nilai gizi, salah satunya adalah vitamin

C. Vitamin ini berperan dalam menjaga struktur kolagen, sejenis protein yang mengandung semua jaringan serabut, kulit, urat, tulang rawan, dan jaringan lain ditubuh manusia.

Q.S. An-Nahl (16) : 69 Allah SWT berfirman :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahannya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Departemen Agama RI, 274)

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa lebah dapat melakukan aneka kegiatan yang bermanfaat dengan sangat mudah, bahkan bermanfaat untuk manusia. Manfaat itu antara lain adalah senantiasa keluar dari dalam perutnya setelah menghisap sari kembang-kembang, sejenis minuman yang sungguh lezat yaitu madu yang bermacam-macam warnanya sesuai dengan waktu dan jenis sari kembang yang dihisapnya. Di dalamnya, yakni madu itu terdapat obat penyembuhan شِفَاءً bagi manusia walaupun

kembang yang dimakannya ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Kata *auwha* terambil dari kata wahy/wahyu yang dari segi bahasa berarti isyarat yang cepat. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah potensi yang bersifat naluriyah yang dianugerahkan Allah kepada lebah sehingga secara sangat rapi dan mudah melakukan kegiatan-kegiatan serta memproduksi hal-hal yang mengagumkan. (Quraish shihab, 2008 vol 7, 2008). Salak termasuk tanaman Ma'rusifat karena tidak membutuhkan penopang dalam proses tumbuhnya.

Q.S. Al An-aam (6) : 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahannya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Departemen Agama RI, 146)

Ayat ini menjelaskan bahwa, dialah tidak ada selain-Nya yang menjadikan dari tiada, kebun-kebum anggur atau lainnya yang berjunjung, yakni yang disanggah tiang dan yang tidak berjunjung. Hanya Allah juga yang menciptakan pohon kurma, dan tanam-tanaman dalam keadaan yang

bermacam-macam rasa bentuk dan aroma-aromanya. Allah jugalah yang menciptakan buah-buahan seperti zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama. Makanlah sebagian buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah dari sebagian yang lain haknya di hari memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang butuh dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal, yakni jangan menggunakan sesuatu, atau memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak merestui dan melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan. (Quraish shihab, 2008)

Perintah makan dalam firman-Nya: Makanlah sebagian buahnya bila ia berbuah, bermakna izin memakannya, bukan anjuran apalagi kewajiban. Ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta benda. Sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-A'la : 2-3)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۗ

Terjemahannya:

“(Maha Suci Allah) Yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. (Departemen Agama RI : 591)

Allah menciptakan dan menyempurnakan فَسْوَى karena masing- masing tanaman sudah diciptakan sedemikian rupa yang berbeda dengan ciptaan lain, buah salak merupakan tanaman yang mengandung vitamin di dalamnya, kalimat قَدَّرَ berarti telah di ciptakan sesuai dengan tipe dan spesies tanaman tersebut, kadar besarnya, kadar manis-asamnya. Salak ditanam pada perkebunan durian atau mangga tetap akan hidup dalam bentuk ukuran salak dan kadar vitamin salak. Kalimat أَفْهَدَى , tuhan memberi petunjuk dan hidayah, tuhan memberi petunjuk untuk mencari makanan dalam unsur hara yang sesuai dengan varietas salak. Semuanya itu merupakan bukti bahwa Allah adalah penciptanya, tanpa sekutu baginya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat gelas, blender, Spektrofotometri UV-Vis, timbangan analitik, kertas saring, dan kain penyaring.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Air suling, asam metafosfat, gula pasir, larutan besi (II) sulfat, larutan natrium hidroksida, larutan tembaga (II) sulfat, natrium bikarbonat, 2,6- diklorofenol indofenol, produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) dan vitamin C standar.

B. Penyiapan Sampel

1. Pengambilan sampel

Sampel berupa buah salak (*Salacca zalacca*) diambil dari Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Pengolahan sampel

Buah salak diolah dalam beberapa produk yaitu selai, manisan, dan sari buah.

a. Selai

Komposisi

Daging buah salak	300 gram
-------------------	----------

Gula pasir	30 gram
------------	---------

Air 300 ml

Cara membuat :

Daging buah salak yang cukup masak dikupas kulitnya, dipisahkan daging dan bijinya kemudian diblender, ditambahkan gula dan dipanaskan hingga massa selai tercapai.

b. Manisan

Komposisi

Daging buah salak 300 gram

Gula pasir 30 gram

Air 300 ml

Cara membuat :

Air dimasak kemudian masukkan gula sampai mendidih, masukkan buah salak beserta kulitnya, rendam hingga tenggelam. Biarkan selama kurang lebih 3 hari.

c. Sari buah

Komposisi

Daging buah salak 300 gram

Gula pasir 30 gram

Air 300 ml

Cara membuat :

Daging buah salak yang sudah masak dikupas kulitnya, dipisahkan daging dan bijinya kemudian tambahkan air lalu

diblender sampai lumat kemudian disaring. Hasil saringan kemudian ditambahkan gula pasir.

C. Analisis Kualitatif Sampel

Ditimbang 1 g untuk selai, manisan, dan sari buah. Tabung reaksi pertama berisi filtrat ditambahkan dengan larutan tembaga (II) sulfat dan natrium hidroksida akan terbentuk warna biru keunguan. Tabung kedua berisi filtrat ditambahkan larutan natrium hidroksida dan 1 tetes larutan besi (II) sulfat akan terbentuk biru keunguan. Tabung III berisi filtrat ditambah larutan 2,6- diklorofenol indofenol akan terbentuk warna merah keunguan (Anonim,1982).

D. Analisis Kuantitatif Sampel

1. Pembuatan larutan standar vitamin C

Ditimbang 50 mg vitamin C dan dilarutkan dalam larutan asam metafosfat 6% dalam labu takar 100 ml, dicukupkan volumenya batas dengan asam metafosfat 6%. Sebanyak 4 ml larutan tersebut diencerkan sampai 50 ml dengan larutan asam metafosfat 6%. Dari larutan ini dibuat larutan baku dengan konsentrasi 1, 2, 4, 6, 8, dan 10 bpj.

2. Penentuan panjang gelombang maksimum

Larutan vitamin C baku dipipet 2 ml lalu diencerkan dengan asam metafosfat 6% sebanyak 10 ml. Dipipet 5 ml larutan tersebut lalu

ditambahkan dengan cepat pereaksi 2,6 diklorofenol indofenol, dikocok dan segera dilakukan pengukuran pada panjang gelombang 480-530 nm.

3. Pembuatan larutan sampel

Ditimbang selai 1 gram, manisan 1 gram, sari buah 1 gram kemudian masing-masing ditambah 5 ml larutan asam metafosfat 6 % lalu dihomogenkan dan disaring. Hasil saringan dicukupkan volume sampai 10 ml dengan larutan asam metafosfat 6 %. Masing-masing dipipet 1 ml lalu dimasukkan kedalam labu takar 10 ml lalu dicukupkan volumenya sampai batas dengan larutan asam metafosfat 6%.

4. Pengukuran Vitamin C dalam produk olahan buah salak

Dipipet 1 ml larutan sampel dengan pipet volume dengan cepat ditambahkan pereaksi 2,6- diklorofenol indofenol, kemudian diukur serapannya pada spektrofotometri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penentuan panjang gelombang maksimum larutan vitamin C baku diperoleh dari serapan terbesar pada panjang gelombang (λ) 500 nm. Pengukuran serapan larutan vitamin C baku dilakukan pada konsentrasi 1, 2, 4, 6, 8, dan 10 bpj (hasilnya dapat dilihat pada tabel 3).


Kadar rata-rata vitamin C dalam produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) yaitu selai, manisan, dan sari buah berturut-turut adalah 8,6451 mg/100g, 8,6432 mg/100g, 7,8008 mg/100 g. (Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4).


B. Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan analisis kandungan vitamin C pada produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) secara spektrofotometri UV- Vis. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengambilan dan pengamatan terhadap sampel sebelum diolah yaitu buah salak (*Salacca zalacca*). Buah yang dipilih untuk diolah yaitu buah yang segar, bentuk buah normal (tidak mengkerut), dan kulit buah agak merah kehitaman.

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Terlebih dahulu dilakukan pengolahan terhadap buah salak (*Salacca zalacca*) berupa selai, manisan dan sari buah. Buah salak dikupas kulitnya dan dipisahkan dari bijinya, daging buah dipotong-potong kemudian ditimbang, untuk sari buah dan selai diblender dan manisan mengalami perendaman kurang lebih tiga hari dan dilarutkan dengan menggunakan asam metafosfat 6 %. Asam metafosfat berguna sebagai pelarut untuk memisahkan vitamin C yang terikat pada protein.

Analisis kualitatif dengan menggunakan pereaksi dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya vitamin C pada selai, manisan dan sari buah. Hasil analisis kualitatif terhadap vitamin C dengan menggunakan pereaksi CuSO_4 , NaOH , FeSO_4 dan pereaksi Tillmans (2,6 diklorofenol indofenol). Dengan pereaksi 2,6- diklorofenol indofenol terbentuk merah keunguan, reaksi ini didasarkan atas sifat mereduksi asam askorbat terhadap zat warna 2,6-diklorofenol indofenol. Adapun reaksi sebagai berikut :





Asam askorbat akan mereduksi indikator warna 2,6-diklorofenol indofenol membentuk larutan yang tidak berwarna. Pada titik akhir titrasi, kelebihan zat warna yang tidak tereduksi akan berwarna merah muda dalam larutan asam.

Hasil positif berupa perubahan warna dan terbentuknya endapan berwarna biru kekuningan dan tembaga (II) sulfat terjadi perubahan warna biru. Adapun penggunaan 2,6- diklorofenol indofenol, larutan ini berwarna sehingga penambahan akan memberikan titik akhir berupa hilangnya warna.

. Penggunaan pereaksi 2,6-diklorofenol indofenol, reaksi ini didasarkan atas pengukuran jumlah larutan 2,6-diklorofenol indofenol yang dihilangkan warnanya oleh vitamin C. Intensitas warna dari 2,6-diklorofenol indofenol sangat tergantung terhadap waktu karena hasil reaksi dari 2,6 diklorofenol indofenol semakin lama semakin hilang.

Hal ini dapat mempengaruhi pada absorbansi yang dipilih dan secara langsung yang akan mempengaruhi dalam penetapan kadar. Sampel dilarutkan dengan menggunakan asam metafosfat 6 %. Asam metafosfat ini berguna untuk mencegah pengaruh ion tembaga sehingga dapat bereaksi dengan 2,6-diklorofenol indofenol yang akan teroksidasi menjadi vitamin C, dalam hal ini yang akan teroksidasi setara dengan 2,6-diklorofenol indofenol, yang tereduksi diperoleh dari hasil pengurangan 2,6-diklorofenol indofenol awal dengan diklorofenol indofenol yang bereaksi sehingga tidak berwarna.

Kadar rata-rata vitamin C yang diperoleh pada produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*) adalah untuk selai 8,6451 mg/100 gr, manisan 8,6432 mg/100 gr dan sari buah adalah 7,8008 mg/100 gr. Dari hasil tersebut diperoleh kadar vitamin C selai jauh lebih besar dibanding kadar vitamin C pada manisan dan sari buah.

Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa produk olahan buah salak ini mengandung vitamin C. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya perbedaan waktu panen, iklim, tanah dan perbedaan tempat tumbuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kadar rata-rata vitamin C yang diperoleh pada buah salak (*Salacca zalacca*) yaitu untuk sari buah 7,8008 mg/100 g, manisan yaitu 8,6432 mg/100 g dan selai yaitu 8,6451 mg/100 g.
2. Kadar vitamin C terdapat pada selai lebih besar dibanding dengan kadar vitamin C pada manisan dan sari buah.
3. Buah salak (*Salacca zalacca*) mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia, dan halal untuk dikonsumsi. Penjelasan dalam al-qur'an tentang makanan yang halal terdapat pada surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya "*dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan yang kamu beriman kepadanya*". Dan pada surah al-A'la ayat 2-3 yang artinya "*maha suci Allah yang mencipta lalu menyempurnakannya dan yang menentukan kadarnya (masing-masing) lalu memberi petunjuk*".

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian pengaruh pengolahan terhadap kadar zat gizi lain yang terdapat dalam buah salak (*Salacca zalacca*)

DAFTAR PUSTAKA


- Andarwulan, N., Koswara, S., 1992 *''Kimia Vitamin''*, Rajawali Press.Jakarta.
- Anonim, 1982, *''Card System dan Reaksi Warna''*, Sie Kesejahteraan Himpunan Mahasiswa Farmasi, ITB.
- Ahmad, S.A.,1980, *Kimia Organik Bahan Alam*. Penerbit Karunia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal POM.1979, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, Depkes RI. Jakarta.
- Direktorat Jenderal POM., 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV. Depkes RI. Jakarta
- Department Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta. PT.
- Fauziyah, M.1995. *Tanaman Obat Keluarga(TOGA)*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Florey, K., 1982, *Analytical, Profiles of Drug Substances*, Vol 11, Academi Press, New Jersey.
- Ganiswara, S.G., 1995. *''Farmakologi dan Terapi''* ,Edisi IV.Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, UI. Jakarta.
- Heyne, k., 1987, *''Tumbuhan Berguna Indonesia''*, Jilid III, Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Hendayana, S., Kadarahman, A., Sumana A., Supriatna, A., 1994, *Kimia Analitik Instrumen*, Edisi 1, IKIP Semarang Press.
- Higuchi, T., 1961, *Pharmaceutical Analysis*, Volume III.
- Jacobs, M.B., 1958, *''The Chemical Analysis of Foods and Food Product''*, Third Edition, D.Van Nortrand Company, Inc., New York.

- Krause, M. V., and Mahen, L. K., 1984. *Sevent Edition*. W.B., Scanders Company, Philadelphia.
- Muchtadi, D., 1989, "*Petunjuk Laboratorium Evaluasi Nilai Gizi Pangan*", Antar Universitas Pangan dan Gizi, IPB. Bandung.
- Mulja., M dan Syahrani, A. 1990. *Aplikasi Analisis Spektrofotometri UV-Vis*. Chriso Grafika, Surabaya.
- Shihab, M. Quraish, 2008. *Tafsir Al- Mishbah*, Vol 4 dan 7, Jakarta, Lentera Hati.
- Sofia. E. *Makanan Lezat Berbahan Salak*, Universitas Brawijaya, Teknologi Hasil Pertanian.
<http://canopi.brawijaya.ac.id>.(Februari 2007)
- Sri Mulyani.D. *Uji Organoleptik dan Kadar Vitamin C*, Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2008.
<http://www.eprints.ums.ac.id>.(2 Februari 2008).
- Underwood, A.L.,1995. *Analisis Kimia Kualitatif*, Erlangga. Jakarta.
- Winarno, L.G., 1986 , "*Kimia Pangan dan Gizi*", Gramedia. Jakarta.

Lampiran A

SKEMA KERJA

Buah salak




Tabel 1. Hasil Analisis Kualitatif Vitamin C Dalam Produk Olahan dengan Uji Warna

Sampel	Pereaksi	Warna	Ket
Manisan	CuSO ₄ dan NaOH NaOH dan FeSO ₄ 2,6- diklorofenol indofenol	Biru Biru kekuningan Merah keunguan	+ + +
Selai	CuSO ₄ dan NaOH NaOH dan FeSO ₄ 2,6- diklorofenol indofenol	Biru Biru kekuningan Merah keunguan	+ + +
Sari buah	CuSO ₄ dan NaOH NaOH dan Fe SO ₄ 2,6- diklorofenol indofenol	Biru Biru kekuningan Merah kekuningan	+ + +

Tabel 2. Hasil pengukuran serapan larutan baku vitamin C pada panjang gelombang 490 nm- 530 nm

Panjang gelombang (nm)	Serapan (A)
490	0,125
495	0,131
500	0,134
515	0,130
520	0,127
530	0,122

Gambar 3. Penentuan Panjang gelombang maksimum (λ) vitamin C



Gambar 4. Pengukuran vitamin C pada panjang gelombang 500 nm

Peak		Valley	
nm	Abs	nm	Abs
485.0	0.129	490.0	0.125
500.0	0.134	510.0	0.129
515.0	0.130		

Tabel 3. Hasil pengukuran serapan larutan vitamin C baku pada panjang gelombang maksimum 500 nm

Konsentrasi Sampel (bpj)	Serapan (A)
1	0,035
2	0,065
4	0,142
6	0,240
8	0,315
10	0,381

Persamaan garis regresi

$$Y = a + bx$$

Dimana :

$$Y = \text{Serapan (A)}$$

$$X = \text{Konsentrasi (bpj)}$$

$$A = \text{Intersep}$$

B = Slope kemiringan

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$a = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[\sum x^2 - (\sum x)^2][\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Diperoleh :

$$a = -0,008$$


$$b = 0,039$$

$$R^2 = 0,996$$

Sehingga persamaan garis regresi :

$$y = bx + a$$

$$y = 0,039x - 0,008$$



Gambar 5. Kurva Standar Vitamin C

Tabel 4. Hasil analisis kuantitatif Vitamin C pada sampel secara spektrofotometri UV-Vis.

Sampel	Berat Contoh (g)	Absorban (A)	Kadar (mg/100 g)	Kadar rata-rata (mg/100g)
Selai	1,0685	0,373	7523,631	8,64517
	1,0681	0,376	9218,378	
	1,0682	0,375	9193,514	
Manisan	1,0868	0,363	8757,889	8,64326
	1,0857	0,361	8714,681	
	1,0854	0,350	8457,232	
Sari buah	1,0223	0,436	1113,626	7,80086
	1,0221	0,434	11088,279	
	1,0210	0,438	11200,675	

Lampiran B. Contoh perhitungan kadar vitamin C pada produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*)

Jenis sample : selai

Serapan : 0,376

Volume sample : 100 v ml

Berat sample : 1,0681 g

Fp : 100 x

Dari perhitungan diperoleh persamaan regresi linear untuk vitamin C sebagai berikut :

$$Y = 0,039x - 0,008$$

Sehingga :

$$x = \frac{y + a}{b}$$

$$= \frac{0,376 + 0,008}{0,039}$$

$$= \frac{0,384}{0,039}$$

$$= 9,84615 \text{ bpj}$$

$$= 9,84615 \text{ mg/L}$$

$$= 9,84515 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}$$

Kadar vitamin C dalam 1 gram sampel :


$$K = \frac{\text{Konsentrasi } (\mu\text{g/ml}) \times \text{Vol sampel } (\text{ml}) \times Fp}{\text{Berat Sampel } (\text{g})}$$

$$= \frac{9,84615 \times 10^{-3}}{1,0681 \text{ g}} \times 100 \text{ ml} \times 100$$

$$= \frac{98,4615 \text{ mg}}{1,0681 \text{ g}}$$

$$= 92,18378 \text{ mg/g}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar vitamin C untuk 100 g} &= 92,18378 \text{ mg/g} \times 100 \text{ g} \\ &= 9218,378 \text{ mg} \end{aligned}$$



Lampiran C. Dokumentasi penelitian

A



B



C

Gambar 6. Produk olahan buah salak (*Salacca zalacca*)**Keterangan :**

- A. Sari buah
- B. Selai
- C. Manisan

Gambar 7. Hasil uji kualitatif sampel Salak (*Salacca zalacca*)



A



B



C

Keterangan :

- A. Manisan
- B. Selai
- C. Sari buah

**Sampel + 2,6 diklorofenol indofenol
Larutan Merah Keunguan**





Gambar 8. Spektrofotometri UV-VIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 9. Buah Salak (*Salacca zalacca*)

