

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III
TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI (IMD)
DI PUSKESMAS BONTOMARANNU
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :

HIJRIYAH

NIM: 70400113026

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul "**Gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusui dini di puskesmas bontomarannu tahun 2016**" yang disusun oleh **Hijriyah, Nim : 70400113026**, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah pada hari Jum'at, 26 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H.Andi Armyrn Nurdin, M.sc (.....)

Sekretaris : Firdayanti , S.Si.T. ,M.Keb (.....)

Pembimbing : dr. Dewi setiawati Sp.OG M.kes, (.....)

Penguji 1 : dr. Darmawansyih M.kes (.....)

Penguji 2 : Dr. Firdaus Muhammad M.ag (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr.dr.H.Andi Armyrn Nurdin, M.sc
NIP.:19550203 198312 1 001

ABSTRAK

“Gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusui dini di puskesmas bontomarannu tahun 2016” Hijriyah , Dewi setiawati

Pilar pertama dalam proses menyusui adalah inisiasi menyusui dini (IMD). IMD harus dilakukan langsung saat bayi lahir, tanpa boleh ditunda. Inisiasi Menyusui Dini meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif dan lama menyusui sampai 2 tahun. Kegagalan IMD disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya IMD

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa pada bulan Juli 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 38 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 32 responden (84,2%) memiliki pengetahuan yang baik tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD), sebanyak 26 responden (68,4) mengetahui tentang pengertian Inisiasi Menyusui Dini (IMD), sebanyak 33 responden (86,8%) mengetahui tentang manfaat inisiasi menyusui dini (IMD), sebanyak 25 responden (65,8%) mengetahui tentang manfaat ASI, sebanyak 30 responden (78,9%) mengetahui tentang ASI eksklusif dan sebanyak 26 responden (68,4%) mengetahui tentang cara menyusui yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan dan konseling agar informasi mengenai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dapat terlaksana dengan baik dan benar dan dilaksanakan oleh ibu dengan bimbingan tenaga kesehatan

Kata Kunci : Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Pengetahuan, Ibu Hamil

ABSTRACT

“Description of third trimester pregnant womans knowledge about early breastfeeding ini puskesmas bontomarannu 2016”

Hijriyah, Dewi setiawati

The first pillar in the process of breastfeeding is the early initiation of breastfeeding (EIB). EIB should be done immediately at birth, without be delayed. Early Initiation of Breastfeeding increases the success of exclusive breastfeeding and duration of breastfeeding up to 2 years. EIB failure is caused by several factors, one of which is the lack of knowledge of mothers on the importance of EIB.

This study aim to know description third trimester pregnant women knowledge about Early Initiation of Breastfeeding (EIB). This type of research is descriptive. This research was conducted in Puskesmas Bontomarannu sub-district Sombaopu district Gowa in July 2016. The sampling technique used purposive sampling with 38 respondents. The data analysis was performed univariate analysis.

The result of this research obtained that there were 32 respondents had a good knowledge of Early Initiation of Breastfeeding (EIB), there were 26 respondents (68.4) know about the definition of Early Initiation of Breastfeeding (EIB), as many as of 33 respondents (86, 8%) know about the benefits of early initiation of breastfeeding (EIB), as many as 25 respondents (65.8%) know about the benefits of breastfeeding, as many as 30 respondents (78.9%) know about exclusive breastfeeding and as many as 26 respondents (68.4%) know how to breastfeed properly.

Based on these results, we recommend that health workers, especially midwives cooperate with health authorities conduct health education and counseling so that information regarding Early Initiation of Breastfeeding (EIB) can be done well and properly and carried out by the mother with the guidance of health professionals

Keyword : Early initiation of breastfeeding (EIB), Knowledge, Pregnant Woman

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan Karya Tulis Ilmiah ini. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Akhirul Anbiyaa Muhammad SAW Nabi yang memiliki Akhlakul Karimah Suri Tauladan bagi ummat manusia.

Tiada daya dan kekuatan melainkan milik Allah SWT dengan berkat pertolongan dan keridhaan-nyalah sehingga sesuatu berjalan sesuai dengan kodratnya dimuka bumi ini. Begitu pula yang penulis rasakan dalam kehidupan sampai detik ini, senantiasa pertolongan itu datang darinya kadang lalai dari mengingatnya.

Dalam menempuh proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari selain berkat kehendak dan pertolongan Allah SWT juga tak dapat dipungkiri banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat serta dukungan moral maupun materil oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Kaembo dan ibunda mardiah yang senantiasa mengiringi langkahku dengan disetiap shalat dan hembusan nafanya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapan. Serta kepada seluruh keluargaku tercinta atas segala

dukungannya baik berupa moril dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan karya tulis ilmiah ini.

2. Bapak Prof. Dr. musafir pababbari, M.Si, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberkan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc selaku dekan Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M,Keb, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan konstribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu dr. Dewi setiawati Sp.OG M.Kes, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr. Darmawansyih M.kes , selaku penguji I yang telah memberikan masukan kepada peneliti.
7. Bapak Dr. firdaus Muhammad , M.A, selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan bimbingan baca Al-Qur'an kepada peneliti.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddun Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.

9. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.
 10. Para staf dan pegawai Puskesmas bontomarannu memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
 11. Semua teman-teman mahasiswi angkatan 2013 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
- Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Olehnya iyu penulis berharan Karya Tulis Ilmiah menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. AMIN...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, agustus 2016

penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan | 6 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) | 11 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Air Susu Ibu (ASI) | 25 |
| D. Tinjauan Islam Tentang Pengetahuan, ASI dan IMD | 43 |
| E. Kerangka Konsep | 48 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 50 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 50 |
| C. Populasi dan Sampel | 50 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 52 |

| | |
|--|-----------|
| E. Metode Pengolahan dan Analisis Data | 53 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 55 |
| B. Pembahasan | 62 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN | 71 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 55 |
| Tabel 2 | Distribusi Responden Berdasarkan Agama Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 56 |
| Tabel 3 | Distribusi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 57 |
| Tabel 4 | Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 57 |
| Tabel 5 | Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 58 |
| Tabel 6 | Distribusi responden berdasarkan item pernyataan pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini di Puskesmas Bontomarannu kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa | 59 |


DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Anatomi payudara | 26 |
| Gambar 2.2 | Macam-macam bentuk putting susu | 27 |
| Gambar 2.3 | Posisi menyusui secara berbaring | 42 |
| Gambar 2.4 | Posisi menyusui secara duduk | 43 |
| Gambar 2.5 | Posisi menyusui secara berdiri | 43 |
| Gambar 2.6 | Kerangka konsep | 48 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2** Output Hasil Analisis SPSS
- Lampiran 3** Surat Izin Penelitian dari Kepala UPT P2T BKPM Provinsi
Sulawesi Selatan
- Lampiran 5** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6** Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan penelitian WHO di enam negara berkembang, resiko kematian bayi antara usia 9 sampai 12 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia dibawah 2 bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 48%. Sekitar 40% kematian balita terjadi pada 1 bulan pertama kehidupan bayi. Inisiasi Menyusu Dini meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif dan lama menyusui sampai 2 tahun. Dengan demikian, dapat menurunkan kematian anak secara keseluruhan. (*The lancet*, 2000:355)

Menurut *The World Health Report* 2005, angka kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah 20 per 1000 kelahiran hidup. Jika angka kelahiran hidup di Indonesia sekitar 5 juta per tahun dan angka kematian bayi adalah 20 per 1000 kelahiran hidup, berarti sama halnya dengan setiap hari, 246 bayi meninggal, setiap 1 jam, 10 bayi Indonesia meninggal. Jadi, setiap 6 menit, 1 bayi indonesia meninggal (Rusli,2008).

Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan penurunan persentase bayi yang menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan hanya 15,3%. Pemberian ASI kurang dari 1 jam setelah bayi lahir tertinggi di Nusa Tenggara Timur (56,2%) dan terendah di Maluku (13%) dan di Sulawesi Selatan hanya 30,1%. Sebagian besar proses menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1- 6 jam setelah bayi lahir, namun masih ada 11,1 % yang dilakukan setelah 48 jam (Riskesdas, 2010).

Di Indonesia saat ini tercatat angka kematian bayi masih sangat tinggi yaitu 35 tiap 1000 kelahiran hidup, itu artinya setiap hari 250 bayi meninggal dan sekitar 175.000 bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Menurut penelitian yang dilakukan di Ghana dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah "pediatrics", 22% kematian bayi yang baru lahir, yaitu kematian bayi yang terjadi dalam satu bulan pertama- dapat dicegah apabila bayi disusui oleh ibunya dalam satu jam pertama kelahiran. Mengacu pada hasil penelitian itu, maka diperkirakan program IMD dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal dalam bulan pertama kelahiran.. Dengan pemberian ASI pada jam pertama, bayi akan mendapat zat-zat gizi penting dan mereka terlindung dari berbagai penyakit berbahaya pada masa yang paling rentan dalam kehidupannya. Menurut dr. Benny Soeginto MPH, ASI adalah sumber imunitas tubuh bagi bayi. Di dalam ASI terkandung sel darah putih dan antibodi yang berfungsi menangkal penyakit. (Nurul Chomaria 2011)

Pilar pertama dalam proses menyusui adalah inisiasi menyusui dini (IMD). IMD di definisikan sebagai proses membiarkan bayi menyusui sendiri setelah kelahiran. Bayi diletakan di dada ibunya dan bayi itu sendiri dengan segala upayanya mencari puting untuk segera mungkin setelah melahirkan. IMD sangat penting tidak hanya untuk bayi, namun juga bagi si ibu. Dengan demikian, sekitar 22% angka kematian bayi setelah lahir pada 1 bulan pertama dapat ditekan. Bayi disusui selama 1 jam atau lebih di dada ibunya segera setelah lahir. Hal tersebut juga penting dalam menjaga produktivitas ASI. Isapan bayi penting dalam meningkatkan kadar hormon prolaktin, yaitu hormon yang merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI (Nurheti Yulianti, 2010)

Program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu dan membiarkan bayi merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusui. IMD harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Juga tidak boleh dibersihkan hanya dikeringkan saja, kecuali bagian tangannya, proses ini harus berlangsung *skin to skin* bayi dan ibu. (Nurul Chomaria, S.Psi 2011).

Kegagalan IMD disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya IMD, sikap ibu yang menolak pelaksanaan IMD, kurangnya dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, kurang tersedianya sarana kesehatan yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pelaksanaan IMD, yang menyebabkan ibu kurang percaya diri untuk melakukan IMD dan bayi akan kehilangan sumber makanan yang vital. Selain itu, terdapat beberapa intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan IMD seperti penggunaan anestesi umum pada persalinan Caesar (syamsuriani 2013).

Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), masih banyak ibu yang belum mengerti bagaimana cara menyusui yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dalam hal menyusui bayi masih rendah. *U.S Preventive Service Task Force* menjelaskan bahwa pengetahuan adalah factor intervensi yang paling efektif dalam IMD. Oleh karena itu, pengetahuan ibu mengenai IMD adalah salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan pelaksanaan IMD. Untuk itu diperlukan paparan informasi yang baik agar pengetahuan ibu mengenai IMD juga adekuat dan IMD dapat terlaksana (syamsuriani 2013).

Masih rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya IMD di temukan juga di Puskesmas Bontomarannu kabupaten gowa.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang IMD di Puskesmas Bontomarannu tahun 2016”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang dapat menjadi permasalahan adalah “bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang IMD di Puskesmas Bontomarannu ?.

C. TUJUAN

1. Tujuan umum

- A. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusui dini di Puskesmas Bontomarannu.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian inisiasi menyusui dini.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat inisiasi menyusui dini.
- c. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat ASI.
- d. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang ASI eksklusif.
- e. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang cara menyusui yang benar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Dengan diketahuinya mamfaat IMD diharapkan pelaksanaan IMD dapat dilakukan dengan benar dan secara terus menerus .

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat digunakan untuk praktek kebidanan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam hal ini pelaksanaan IMD minimal 1 jam pertama kelahiran .

3. Manfaat institusi

Diharapkan dapat menjadi tambahan dalam memberikan pengetahuan dan informasi dari hasil penelitian untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga (Soekidjo Notoatmojo, 2011).

2. Tingkat pengetahuan

Menurut Rogers, pengetahuan di cakup di dalam domain kognitif 6 tingkatan (Soekidjo Notoatmojo, 2011).

a. Tahu (Know)

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap situasi yang sangat spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (Comprehention)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham harus dapat menjelaskan, menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari. Misalnya dapat menjelaskan mengapa harus makan makanan yang bergizi.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata. Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode-metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan.

d. Analisis (Analysis)

Suatu kemampuan menjabarkan materi atau kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat diteliti dari penggantian kata seperti dapat menggambarkan (menurut bagian), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (Syntesis)

Menunjukan kepada suata komponen untuk meletakkan atau menggabungkan bagian-bagian di dalam satu bentuk keseluruhan yang baru. Merupakan kemampuan menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori –teori atau rumusan yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Berkaitan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada misalnya : dapat membandingkan antara anak-anak yang cukup gizi dengan anak-anak yang kekurangan gizi, dapat

menanggapi terjadinya wabah diare di suatu tempat, dapat menafsirkan sebab ibu-ibu tidak mau ikut KB dan sebagainya.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :

- 1) Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus objek.
- 2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- 3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau buruknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- 4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- 5) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. (Soekidjo Notoatmodjo, 2011)

3. Cara memperoleh pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2011) pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran.

4. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut berbagai sumber dari berbagai literatur yang berhubungan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal :

a. Umur

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

b. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sehingga sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan lebih baik daripada orang yang hidup di lingkungan yang berpikiran sempit.

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan biasanya sebagai simbol status sosial di masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang dengan penuh penghormatan apabila pekerjaannya sudah pegawai negeri atau pejabat di pemerintahan.

e. Sosial Ekonomi

Variabel ini sering dilihat angka kesakitan dan kematian, variabel ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang yang ditentukan unsur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan banyak contoh serta ditentukan pula oleh tempat tinggal karena hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan.

f. Informasi yang diperoleh

Informasi dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga organisasi, media cetak dan tempat pelayanan kesehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Jika pengetahuan berkembang sangat cepat maka informasi berkembang sangat cepat pula. Adanya ledakan pengetahuan sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka semakin banyak pengetahuan baru bermunculan. Pemberian informasi seperti cara-cara pencapaian hidup sehat akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menambah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

g. Pengalaman

Merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu. Orang yang memiliki pengalaman akan mempunyai pengetahuan yang baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengalaman dalam segi apapun

5. Pengukuran tingkat pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket, menyatakan isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden.

1. Pengetahuan baik = 76 – 100%
2. Pengetahuan Kurang = < 60% (Arikunto, 2006)

6. Dasar-dasar pengetahuan

- 1) Tradisi
- 2) Otoriter
- 3) Meminjam dari disiplin orang lain
- 4) Pengalaman trial dan error
- 5) Alasan yang logis
- 6) Metode ilmiah (soekidjo notoadmojo 2011).

B. Tjauan khusus tentang inisiasi menyusui dini (IMD)

1. Pengertian inisiasi menyusui dini

- a) Inisiasi menyusui dini adalah adalah proses menyusui bayi segera setelah bayi dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu), inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif)

dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun, dan mencegah anak kurang gizi), (anik maryuni 2012)

- b) Inisiasi menyusui dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Cara bayi merangkak mencari payudara ibunya sendiri disebut the beast crawl. Ketika bayi baru lahir, bayi segera diberikan atau diletakan di dada ibunya untuk dilakukan kontak kulit ke kulit, biarkan bayi merangkak sendiri mencari puting susu ibunya. (dr. andi sitti rahma, S.ked 2012)
- c) Inisiasi menyusui dini merupakan program yang sedang gencar dianjurkan pemerintah. Menyusu dan bukan menyusui merupakan gambaran bahwa IMD bukan program ibu menyusui bayi tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. (program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuku menemukan puting susu ibu untuk menyusu. IMD harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Ayi juga tidak boleh dibersihkan kecuali tangannya. Proses ini harus berlangsung secara skin to skin antara bayi dan ibu (anik maryuni 2012)
- d) Inisiasi menyusui dini adalah perilaku mencari puting payudara ibu sesaat setelah bayi lahir. Ketua umum sentra laktasi Indonesia, dr. Utami Roesli, Sp.A, MBA, IBCLC., menjelaskan bahwa pada IMD, bayilah yang diharapkan berusaha untuk menyusu. Pada jam pertama, bayi berhasil menemukan payudara ibunya. Inilah awal hubungan menyusui antara bayi dan ibunya, yang akhirnya berkelanjutan dalam kehidupan ibu dan bayi. (Dwi Sunar Prasetyo 2009).

2. Tahap-tahap inisiasi menyusui dini

- a) Setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan verniks (kulit putih). Verniks meyamankan kulit bayi.
- b) Bayi kemudian di tengkurapkan di dada atau perut ibu, dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi. Kemudian jika perlu, bayi dan ibu diselimuti
- c) Bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu, dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya (bayi tidak dipaksakan ke puting susu). Pada dasarnya, bayi memiliki naluri yang kuat utk mencari puting susu ibunya.
- d) Saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusui. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengamati dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi.
- e) Bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu sampai proses menyusui pertama selesai.
- f) Setelah selesai menyusui awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamini K dan tetes mata
- g) Ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung memungkinkan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkannya, karena kegiatan menyusui tidak boleh dijadwal. Rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batina antara ibu dengan bayinya, bayi jadi jarang menangis karena selalu merasa

dekat dengan ibu, dan selain itu dapat memudahkan ibu beristirahat dan menyusui. (dewi martalia 2012)

1. Kejadian-kejadian penting selama pelaksanaan inisiasi menyusui dini

- a. Akan terjadi banyak peristiwa mengejutkan sekaligus mengharukan apabila dapat melakukan IMD secara alami.
- b. Sesaat setelah diletakan didada ibunya, bayi akan terdiam untuk beberapa saat.
- c. Meski tubuh bayi terlentang sushu badan ibu akan berperan dengan aktif.
- d. Rata-rata dalam waktu 20 hingga 30 menit, bayi akan menggerakkan seperti hendak akan merangkak
- e. Ternyata gerakan kaki yang menekan perut ibunya merupakan cara alami untuk menekan dan mengurangi perdarahan ibunya.
- f. Kemudian tangan bayi juga akan mencoba mencari dan memegang payudara ibunya, dan memasukan puting ibunya ke mulut bayi.

Bayi baru lahir yang mendapat kontak kulit ke kulit segera setelah lahir, akan melalui lima tahapan perilaku sebelum ia berhasil menyusui. Lima tahapan tersebut:

- a) Dalam 30-45 menit pertama:
 1. Bayi akan diam dalam keadaan siaga.
 2. Sesekali matanya membuka lebar dan melihat ke ibunya.

3. Masa ini merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan keluar kandungan dan merupakan dasar pertumbuhan rasa aman bayi terhadap lingkungannya
 4. Hal ini juga akan meningkatkan rasa percaya diri ibu akan kemampuannya menyusui dan mendidik anaknya.
 5. Demikian pula halnya ayah, dengan melihat bayi dan istrinya dalam suasana menyenangkan ini, akan tertanam rasa percaya diri ayah untuk ikut membantu keberhasilan ibu menyusui dan mendidik anaknya.
- b) Antara 45-60 menit pertama
1. Bayi akan menggerakkan mulutnya seperti mau minum, mencium, kadang mengeluarkan suara dan menjilat-jilat tangannya.
 2. Bayi akan mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada ditangannya.
 3. Bau ini sama dengan bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu dan bau serta rasa ini yang akan membimbing bayi untuk menemukan payudara dan putting susu ibu.
 4. Itulah sebabnya tidak dianjurkan mengeringkan tangan bayi pada saat bayi baru lahir.
- c) Mengeluarkan liur
- Saat bayi siap dan menyadari ada makanan di sekitarnya, bayi mulai akan mengeluarkan liur.
- d) Bayi bergerak ke arah areola
1. Areola payudara akan menjadi sasarannya dengan kaki bergerak menekan perut ibu

2. Bayi akan menjilat kulit ibu, menghentakan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta menyentuh dan mremas daerah puting susu dan sekitarnya dengan tangannya.

e) Menyusu

Akhirnya bayi menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar-lebar dan meletakkan dengan baik serta mulai menyusu. (atikah proverawati dan eni rahmawati 2010).



Gambar 1.1 Tahap-Tahap IMD
Sumber : Anik Maryuni 2012

3. Cara pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD)

a) Pelaksanaan IMD secara umum

1. Dianjurkan suami atau keluarga, mendampingi ibu saat melahirkan
2. Dalam menolong ibu saat melahirkan, disarankan untuk tidak atau mengurangi mempergunakan obat kimiawi.

3. Bayi dikeringkan, kecuali tangannya, tanpa menghilangkan lemak putih (verniks caseosa).
 4. Bayi ditengkurapkan di perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Keduanya diselimuti. Bayi diberi topi.
 5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang bayi mendekati puting. Biarkan mencari puting susu sendiri.
 6. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama paling tidak 1 jam menyusui atau lebih sampai proses menyusui awal selesai.
 7. Bila dalam 1 jam menyusui awal belum terjadi, dekatkan bayi keputing, tapi jangan memasukkan puting ke mulut bayi. Beri waktu 30 menit atau 1 jam lagi.
 8. Tunda menimbang, mengukur, suntikan vitamin K dan tetes mata sampai proses menyusui awal selesai (Setyo Retno Wulandari 2010).
- b) Pelaksanaan IMD pada persalinan melalui operasi seksio caesaria
1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu dikamar operasi atau di kamar pemulihan.
 2. Begitu lahir letakan di meja resusitasi untuk dinilai, dikeringkan secepatnya terutama kepala tanpa menghilangkan verniks; kecuali tangannya. Dibersihkan mulut, hidung, bayi, tali pusat di ikat atau dijepit.
 3. Kalau bayi tak perlu diresusitasi, bayi dibedong, dibawa ke ibu. Di perlihatkan kelaminnya pada ibu kemudian mencium ibu.
 4. Tengkurapkan bayi di dada ibu dengan kulit bayi melekatkan pada kulit ibu. Kaki bayi agak sedikit serong/melintang menghindari sayatan operasi. Bayi dan ibu diselimuti. Bayi diberi topi

5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang bayi mendekati puting. Biarkan bayi mencari puting sendiri
 6. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu paling tidak selama 1 jam, tetap kontak kulit ibu-bayi selama setidaknya 1 jam
 7. Bila bayi menunjukkan kesiapan untuk minum, bantu ibu dengan medekatkan bayi ke puting susu tapi tidak memasukan puting ke mulut bayi. Bila dalam 1 jam belum bisa menemukan puting ibu, beri tambahan waktu melekat pada dada ibu ib, minimal 30 menit atau 1 jam lagi.
 8. Bila operasi telah selesai, ibu dapat dibersihkan dengan bayi tetap melekat di dadanya dan dipeluk erat oleh ibu. Kemudian ibu di pindahkan dari meja operasi ke ruang pulih (RR) dengan bayi tetp didadanya
 9. Bila ayah tidak dapat menyertai ibu di kamar operasi, diusulkan untuk mendampingi ibu dan mendoakan anaknya saat di kamar pulih
 10. Rawat gabung ibu dan bayi dalam satu kamar, bayi dalam jangkauan ibu selama 24 jam
- c) Pelaksanaan pada bayi kembar (gemeli)
1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu dikamar bersalin
 2. Bayi pertama lahir, segera keringkan secepatnya terutama kepala, kecuali tangan, tanpa menghilangkan verniks caseosa, mulut dan hidung di bersihkan, tali pusat diikat
 3. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang biarkan bayi mencarai puting susu ibu.

4. Bila ibu akan merasa melahirkan bayi kedua, berikan bayi pertama pada ayah . ayah memeluk bayi dengan kulit bayi melekat pada kulit ayah seperti pada perawatan metode kanguru. Keduanya ditutupi baju ayah.
 5. Bayi kedua lahir, segera dikeringkan secepatnya terutama kepala, kecuali tangannya, tanpa menghilangkan verniks, mulut dan hidung dibersihkan, tali pusat diikat
 6. Bila bayi kedua tidak memerlukan resusitasi, bayi kedua ditengkurapkan di dada-perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu
 7. Letakan kembali kedua bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama paling tidak 1 jam, bila menyusu awal terjadi sebelum 1 jam, tetap biarkan kulit ibu dan bayi bersentuhan paling tidak 1 jam.
 8. Bila dalam 1 jam menyusu awal belum terjadi, dekatkan bayi keputing, tapi jangan memasukkan puting ke mulut bayi. Beri waktu 30 menit atau 1 jam lagi.
 9. Rawat gabung ibu dan bayi dalam satu kamar, bayi dalam jangkauan ibu selama 24 jam
 10. Berikan ASI saja tanpa meminumkan minuman atau makanan lain kecuali atas tindakan medis. Tidak dianjurkan diberi dot atau empeng.
- d) Pelaksanaan IMD pada bayi prematur
1. Segera berikan ASI secepatnya setelah periode postpartum.
 2. Tetapkan jadwal pemberian ASI, 8-10 kali dalam 24 jam, dengan interval tidak lebih dari 6 jam.

3. Gunakan sumber non-kimiawi untuk mengoptimalkan produksi ASI, misalnya massage payudara, hand expression, kontak kulit ke kulit.
4. Cadangan ASI yang kuranga harus diperhatikan setidaknya samapai hari ke- 10 (nurheti yuliarti 2010).

4. Inisiasi menyusui dini yang kurang tepat

Ada beberapa cara menyusui yang tidak benar, antara lain:

- a. Begitu lahir, bayi diletakan di perut ibu yang dialasi dengan kain kering.
- b. Bayi segera di keringkan dengan kain kering. Tali puat dipotong lalu di ikat.
- c. Karena takut kedinginan, bayi dibungkus atau di bedong dengan selimut.
- d. Dalam keadaan dibedong, diletakan di dada ibu (tidak terjadi kontak kulit ibu). Bayi dibiarkan di dada ibu, (bonding) untuk beberapa lama (10-15 menit) atau sampai tenaga selesai menjahit perineum ibu.
- e. Selanjutnya, diangkat dan didususkan pada ibu dengan cara memasukan putting susu ibu ke mulut bayi. (membantu ibu menyusui dengan memasukan putting susu ke mulut bayi).
- f. Setelah itu, bayi dibawa di kamar transisi atau kamar pemulihan (recovery room) untuk di timbang, di ukur, di cap, di azankan oleh ayahnya, diberi tetes mata. (roesli utami 2008). Hal ini berarti memisahkan bayi dari ibunya.
- g. Bayi yang sama pada usia 30-40 menit menunjukan ke siapan menyusui tapi ibunya tidak ada di dekatnya (mirz maulana 2007).

5. Manfaat IMD

1. Manfaat untuk ibu

- a. Meningkatkan hubungan khusus ibu dan bayi.
- b. Merangsang kontraksi otot rahim sehingga mengurangi resiko perdarahan sesudah melahirkan.
- c. Memperbesar peluang ibu untuk memantapkan dan melanjutkan kegiatan menyusui selama masa bayi.
- d. Mengurangi stress ibu setelah melahirkan.
- e. Mencegah kehamilan
- f. Menjaga kesehatan ibu
- g. Mamfaat untuk bayi
- h. Mempertahankan suhu bayi tetap hangat
- i. Menenangkan ibu dan bayi serta meregulasi pernafasan dan detak jantung.
- j. Kolonisasi bakterial di kulit dan usus bayi dengan bakteri badan ibu yang normal (bakteri yang berbahaya dan menjadikan tempat yang baik bagi bakteri yang menguntungkan) dan mempercepat pengeluaran kolostrum sebagai antibody bayi).
- k. Mengurangi bayi menangis sehingga mengurangi stress dan tenaga yang di pakai bayi.
- l. Memungkinkan bayi untuk menemukan sendiri payudara ibu untuk untuk mulai menyusui.
- m. Mengatur tingkat kadar gula dalam darah, dan biokimia lain dalam tubuh bayi.

- n. Mempercepat keluarnya meconium (kotoran bayi berwarna hijau agak kehitaman yang pertama keluar dari bayi karena meminum air ketuban.
 - o. Bayi akan terlatih motoriknya saat menyusui, sehingga mengurangi kesulitan menyusui.
 - p. Membantu perkembangan persyarafan bayi (nervous sistem)
 - q. Memperoleh kolostrum yang sangat bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh.
 - r. Mencegah terlewatnya puncak 'refleks mengisap' pada bayi yang terjadi 20-30 menit setelah lahir. Jika bayi tidak disusui, refleks akan berkurang cepat, dan hanya akan muncul kembali dalam kadar secukupnya 40 jam kemudian.
2. Manfaat secara psikologi
- a. Adanya ikatan emosi (emotional bonding)
 - b. Hubungan ibu dan bayi lebih erat dan penuh kasih sayang
 - c. Ibu merasa lebih bahagia
 - d. Bayi lebih jarang menangis
 - e. Ibu berperilaku lebih peka (affectionately)
 - f. Lebih jarang menyiksa bayi (child abused)
 - g. Perkembangan anak; anak menunjukkan uji kepintarannya lebih baik di kemudian hari.
3. Manfaat bagi keluarga
- a. Mudah dalam proses pemberiannya
 - b. Mengurangi biaya rumah tangga
 - c. Bayi yang mendapat ASI jarang sakit, sehingga dapat menghemat biaya untuk berobat (sitti saleha 2009)

6. Penghambat inisiasi menyusui dini

a) Bayi kedinginan

Berdasarkan penelitian Dr. niels bregman 2005:

1. Ditemukan bahwa suhu dada ibu melahirkan menjadi 1° C lebih panas dari suhu badan ibu yang tidak melahirkan.
2. Jika bayi yang di letakan di dada ibu ini kepanasan suhu dada ibu akan turun 1° C
3. Jadi, dada ibu yang melahirkan merupakan tempat terbaik bagi bayi yang baru lahir dibandingkan tempat tidur yang bagus dan mahal.

b) Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya

1. Seorang ibu jarang lelah untuk memeluk bayinya sgera setelah lahir.
2. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusui dini membantu menenangkan ibu.

c) Tenaga kesehatan tersedia

1. Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya.
2. Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu.
3. Libatkann ayah atau keluarga terdekat untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu.

d) Kamar bersalin, atau kamar operasi sibuk

1. Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat di pindahkan ke ruang pulih atau kamar perawatan.
2. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai payudara dan menyusui.

e) Ibu harus dijahit

1. Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area payudara

2. Yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu.
- f) Suntikan vit K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonore yang harus diberikan setelah lahir Menurut american college of obstetrics and gynecology Dan Academy Breastfeeding Medicine (2007), tindakan pencegahan ini dapat di tunda setidaknya selama 1 jam sampai bayi menyusu sendiri tanpa membahayakan bayi.
- g) Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur
1. Menunda memandikan bayi berarti mehindarkan hilangnya panas badan bayi.
 2. Selain itu, kesempatan verniks meresap, melunakan dan melindungi kulit bayi lebih besar.
 3. Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir.
 4. Penimbangan dan pengukuran dapat ditunda sampai menyusu awal selesai.
- h) Bayi kurang siaga
1. Justru pada 1-2 jam pertama kelahirannya, bayi sangat siaga (alert).
 2. Setelah itu, bayi tidur dalam waktu yang lama.
 3. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup ibu, kontak kulit akan lebih penting lagi karena bayi memerlukan bantuan lebih untuk bonding.
- i) Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain (cairan preklaktal)
1. Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir.
 2. Bayi dilahirkan dengan membawa bekal yang dapat dipakai pada saat itu.

3. Kolostrum tidak baik, bahkan berbahaya untuk bayi
4. Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi.
5. Selain sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, kolostrum melindungi dan metangkan dinding usus yang masih muda. (sri adiningsi 2010).

7. Faktor pendukung inisiasi menyusui dini

1. kesiapan fisik dan psikologi ibu yang sudah dipersiapkan sejak awal kehamilan.
2. Informasi yang diperoleh ibu mengenai inisiasi menyusui dini
3. Tempat bersalin dan tenaga kesehatan

C. Tinjauan khusus tentang air susu ibu (ASI)


1. Pengertian ASI

- a. ASI adalah makanan terbaik dan sempurna untuk bayi kandungan gizinya yang tinggi dan adanya zat kebal di dalamnya membuat ASI tidak tergantikan oleh susu formula yang paling mahal sekalipun. (Nurheti yuliarti 2010).
- b. Asi merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mengandung kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. (Setyo Retno Wulandari, Sri Handayani 2011).

2. Anatomi payudara

Payudara, kejar mammae manusia, mulai terbentuk pada minggu kelima kehidupan embrionik dari lapisan susu, lapisan jaringan glandar. Kadang-kadang, jaringan residu dari sisa lapisan susu dan jaringan mammae aksesorius dapat terbentuk di mana saja sepanjang lapisan ini. Kelenjar mammae adalah satu-satunya organ yang tidak terbentuk secara

lengkap dalam kehidupan janin dengan pertumbuhan lanjut saat pubertas menjadi tahap duct and bud dan pertumbuhan lebih lanjut dalam kehamilan dan laktasi (Reni Heryani 2010)



Gambar 2.1 Anatomi payudara
Sumber :Dwi Sunar Prasetyo, 2009


Secara vertikal payudara terletak di antara kosta II da IV, secara horizontal mulai dari pinggir sternum sampai linea aksilaris medialis. Kelenjar susu berada di jaringan sub kutan, tepatnya di antara jaringan sub kutan superficial dan profundus, yang menutupi muskulus pectorial.

Ukuran normal 10-12 cm dengan beratnya pada wanita hamil adalah 200 gram, pada wanita hamil aterm 400-600 gram dan pada masa laktasi sekitar 600-800 gram. Bentuk dan ukuran payudara akan bervariasi menurut aktivitas fungsionalnya. Payudara menjadi besar saat hamil dan menyusui dan biasanya mengecil setelah menopause pembesaran ini terutama di sebabkan oleh pertumbuhan struma jaringan penyangga dan penimbunan jaringan lemak.

Ada 3 bagian utama payudara, korpus (badan), areola, papila atau puting. Areola mammae (kalung payudara) letaknya mengelilingi puting

susu dan berwarna kegelapan yang disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulitnya. Perubahan warna tergantung dari corak kulitnya, kuningnya langsung akan berwarna jingga kemerahan, bila kulitnya kehitaman maka warnanya akan lebih gelap dan kemudian menetap.

Putting susu terletak setinggi interkosta IV, tetapi berhubungan adanya variasi bentuk dan ukuran payudara maka letaknya pun akan bervariasi pada. Pada tempat ini terdapat lubang-lubang kecil yang merupakan muara dari duktus laktiferus, ujung-ujung serat otot polos yang tersusun secara sirkuler sehingga bila ada kontraksi maka duktus laktiferus akan memadat dan menyebabkan putting susu ereksi. Sedangkan serat-serat otot yang longitudinal akan menarik kembali putting susu tersebut. Ada empat bentuk putting susu yang normal/umum, pendek datar, panjang dan terbenam (inverted). (Elisabet Siwi Walyani, Th Endang Purwoastuti)



Gambar 2.2 macam-macam bentuk putting susu
Sumber : Reni Heryani, 2010

3. Fisiologi laktasi

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI di produksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi

merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI sampai anak 2 tahun secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. (Heryani Reni 2010)

Pada proses laktasi (menyusui), terdapat dua gerakan reflex penting yaitu reflex prolaktin dan refleksi aliran. Kedua refleksi tersebut bersumber dari pengaruh rangsangan oleh puting susu akibat hisapan bayi. Hisapan bayi pada kelenjar susu dapat merangsang reseptor (syaraf) peraba yang terdapat di sekitar puting, sehingga oksitosin dilepaskan, dan air susu diperas kedalam rongga-rongga, siap untuk mengalir ke dalam mulut bayi yang sedang menetek. Hisapan bayi juga dapat mempertahankan dan memperbesar pengeluaran ASI, karena hisapan bayi mampu merangsang sekresi (pengeluaran hormon). Rangsangan oleh mulut bayi juga akan menimbulkan implus (aliran listrik) yang menuju hipotalamus, selanjutnya menuju kelenjar hipofisis bagian depan sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormone prolaktin. Hormon inilah yang memegang peran utama dalam merangsang produksi ASI pada tingkat alveolus. Dengan demikian semakin teratur bayi mengisap (menetek) maka semakin banyak air susu yang dihasilkan payudara. (dr. sunardi 2008)

Dengan menyusui lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terjadi bentuklah prolaktin oleh hifofisis, sehingga sekresi ASI lebih lancar. Dua refleksi pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu refleksi prolaktin dan refleksi aliran timbul akibat akibat perangsangan puting susu akibat perangsangan hisapan puting susu oleh hisapan bayi (Reni Heryani 2010).

Refleksi yang penting bagi dalam proses laktasi yaitu sebagai berikut :

a. Refleksi prolaktin

Refleksi ini secara hormonal untuk memproduksi ASI. Waktu bayi menghisap payudara ibu, terjadi rangsangan neurohormonal pada puting susu dan areaola ibu, rangsangan ini diteruskan melalui nervus vagus, terus ke lobus anterior, dari lobus ini akan mengeluarkan hormone prolaktin, masuk ke peredaran darah dan sampai pada kelenjar-kelenjar pembuat ASI, dan kelenjar ini akan terangsang untuk menghasilkan ASI. (anik maryuni 2013)

b. Refleksi aliran (let down refleksi)

Rangsangan puting susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofisis bagian belakang yang mengeluarkan hormone oksitosin. Hormone itu berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan dinding saluran, sehingga ASI di pompa keluar. Refleksi oksitosin bekerja sebelum atau setelah menyusui untuk menghasilkan aliran air susu dan menyebabkan kontraksi uterus, semakin sering menyusui, semakin baik pengosongan alveolus sehingga semakin kecil kemungkinan terjadinya bendungan ASI sehingga proses semakin lancar. (Juraidi Roito H, Hj. Nurmailis nor, Mardiah 2013).

Ada tiga refleksi intrinsik pada bayi yang mendukung keberhasilan untuk memperoleh asi .

a. Refleksi menangkap (rooting refleksi)

Refleksi ini timbul saat bayi baru lahir tersentuh pipinya dan bayi akan menoleh ke arah sentuhan. Bila bibir bayi dirangsang dengan papilla mammae atau jari, maka bayi akan membuka mulut dan berusaha menangkap puting susu.

b. Refleks menghisap (sucking refleks)

Refleks ini timbul apabila langit-langit mulut bayi tersentuh oleh puting susu. Agar puting mencapai pallatum, maka sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Dengan demikian sinus lakteferus yang berada di bawah areola, tertekan antara gusi, lidah dan pallatum sehingga ASI keluar.

c. Refleks menelan (swallowing refleks)

Refleks ini timbul apabila mulut bayi terisi oleh ASI, maka ia akan menelannya. (Dewi maritalia 2012).

Untuk mengetahui banyaknya produksi ASI, beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai patokan untuk mengetahui jumlah ASI cukup atau tidak adalah sebagai berikut :

- a. ASI yang banyak dapat merembes keluar melalui puting.
- b. Sebelum disusukan, payudara terasa tegang.
- c. Berat badan naik sesuai dengan usia
- d. Jika ASI cukup, setelah menyusu bayi akan tertidur/tenang selama 3-4 jam
- e. Bayi lebih sering berkemih, sekitar 8 kali sehari.

4. Klasifikasi ASI

a. Kolostrum

1. Merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar payudara, mengandung tissue debris dan residual material yang terdapat dalam alveoli dan duktus dari kelenjar payudara sebelum dan setelah masa puerperium
2. Disekresi oleh kelenjar payudara dari hari ke 1 sampai hari ke 3

3. Komposisi dari kolostrum ini dari hari kehari selalu berubah
4. Merupakan cairan viscous kental dengan warna kekuning-kuningan lebih kuning dibanding dengan susu matur
5. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang.
6. Lebih banyak mengandung protein dibandingkan ASI matur, pada kolostrum protein yang utama adalah globulin (gamma globulin)
7. Lebih banyak mengandung antibody dibanding dengan ASI matur, dan dapat memberikan perlindungan bagi bayi samapi umur 6 bulan.
8. Kadar karbohidrat dan lemak rendah jika di bandingkan dengan ASI Matur.
9. Mineral, terutama natrium kalium dan klorida lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu matur.
10. Total energi rendah jika dibandingkan dengan susu matur hanya 58 kal/100 ml kolostrum.
11. Vitamin yang larut dalam lemak lebih tinggi jika dibandingkan dengan ASI matur, sedangkan vitamin yang larut dalam air dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
12. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak.
13. pH lebih alkalis dibandingkan dengan ASI matur
14. lipidnya lebih banyak mengandung kolesterol dan lesitin dibanding ASI matur.

15. Terdapat tripsin inhibitor sehingga hidrolisis protein di dalam usus bayi menjadi kurang sempurna. Hal ini akan lebih banyak menambah kadar antybody pada bayi.

16. Volume berkisar 150-300 ml\24 jam

b. Air susu peralihan

1. Merupakan ASI peralihan dari kolostrum smapai menjadi ASI matur.

2. Disekresi dari hari ke 4 sampai ke 10 dari masa laktasi, tetapi ada pendapat ASI matur terjadi pada minggu ke 3 sampai minggu ke 5

3. Kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin tinggi dan volume juga semakin meningkat

4. Komposisi ASI menurut klien I.S dan Osten J.M dalam satuan gram\100 ml

c. Air susu matur

1. Merupakan ASI yang disekresi pada hari ke 10 dan seterusnya. Komposisi relative konstan (ada pendapat menyatakan komposisi ASI relative konstan mulai minggu ke 3 sampai minggu ke 5).

2. Merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari ca-casein, riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya

3. Tidak menggumpal jika dipanaskan

4. Terdapat antimicrobial factor, anatra lain:

a. Antibody terhadap bakteri dan virus

b. Sel (fogosit granulosit dan makrofag serta limfosit tipe T)

c. Enzim (lisosom, laktoperoside, lipase, katalase, fosfase, amylase, fosfodieterase, alkalifosfatase).

d. Protein (laktoferin, B12 biding protein).

- e. Resistanse factor terhadap stafiiokokus
- f. Komplemen
- g. Interferon producing cell
- h. Sifat biokimia yang khas, kapasitas buffer yang rendah dan adanya factor bifidus.
- i. Hormon-hormon
 - a) Laktoferin merupakan suatu binding protein yang bersifat bakteriostatik kuat terhadap eschereciacholi dan juga menghambat pertumbuhan candida albicans.
 - b) Laktobacillusbifidus merupakan koli kuman yang memetaboliser laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan rendahnya pH sehingga pertumbuhan kuman pathogen dapat dihambat.
 - c) Immunoglobulin memberikan mekanisme pertahanan yang efektif terhadap bakteri dan virus (terutama Ig) dan bila bergabung komplemen dan lisosin merupakan suatu anti bacterial non spesifik yang mengatur pertumbuhan flora usus.
 - d) Factor lekosit pada pH asi mempunyai pengaruh mengca pertumbuhan kuman pathogen (efek bakteri statis dicapai pada pH sekitar

Tabel 2.1 komposisi ASI

| Kandungan | Kolostrum | Transisi | ASI matur |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Energi (kg kla) | 57,0 | 63,0 | 65,0 |
| Laktosa (gr/100 ml) | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Lemak (gr/100 ml) | 2,9 | 3,6 | 3,8 |
| Protein (gr/100 ml) | 1,195 | 0,965 | 1,324 |
| Mineral (gr/100 ml) | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Immunoglobulin: | | | |
| Ig A (mg/100 ml) | 335,9 | - | 119,6 |
| Ig G (mg/100 ml) | 5,9 | - | 2,9 |
| Ig M (mg/100 ml) | 17,1 | - | 2,9 |
| Lisosim (mg/100 ml) | 14,2-16,4 | - | 24,3-27,5 |
| Laktoferin | 420-520 | - | 250-270 |

Tabel 2.2 Perbedaan komposisi ASI, susu sapi dan susu formula

| Komposisi/100 ml | ASI matur | Susu sapi | Susu formula |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| kalori | 75 | 69 | 67 |
| Protein | 1,2 | 3,5 | 1,5 |
| Lactabulin (%) | 80 | 18 | 60 |
| Kasein (%) | 20 | 82 | 40 |
| Air (ml) | 87,1 | 87,3 | 90 |
| Lemak (gr) | 4,5 | 3,5 | 3,8 |
| Karbohidrat | 7,1 | 4,9 | 6,9 |
| Ash (gr) | 0,21 | 0,72 | 0,34 |

Tabel 2.3 Mineral

| | | | |
|-----------|------|-------|------|
| Na | 16 | 50 | 21 |
| K | 53 | 144 | 69 |
| Ca | 33 | 128 | 46 |
| P | 14 | 93 | 32 |
| Mg | 4 | 13 | 5,3 |
| Fe | 0,05 | Trace | 1,3 |
| Zn | 0,15 | 0,04 | 0,42 |

Table 2.4 Vitamin

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------|
| A (iu) | 182 | 140 | 210 |
| C (mg) | 5 | 1 | 5,3 |
| D (iu) | 2,2 | 42 | 42 |
| E (iu) | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Thiamin (mg) | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Riboflavin (mg) | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Niacin (mg) | 0,2 | 0,17 | 0,7 |
| Ph | Alkaline | Acid | Acid |
| Bacteria iontent | Sterile | Nonsterile | Sterile |

Sumber: Setyo Retno Wulandari 2011

5. Kandungan gizi dalam ASI

Susu menjadi salah satu sumber nutrisi bagi manusia, komponen ASI sangat rumit dan berisi lebih dari 100.000 biologi komponen unik, yang memainkan peran utama dalam perlawanan penyakit bayi. Eriikut komponen-komponen pada ASI ;

a) Kolostrum

Cairan susu kental berwarna kekuning-kuningan yang dihasilkan pada sel alveoli payudara ibu. Sesuai untuk kapasitas pencernaan bayi dan kemampuan ginjal baru lahir yang belum mampu menerima makanan dalam volume besar. Jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi kaya akan gizi dan sangat baik bagi bayi. Kolostrum mengandung koroten dan vitamin A yang sangat tinggi.

b) Protein

Protein dalam ASI terdiri dari casein (protein yang sulit dicerna) dan whey (protein yang mudah dicerna). ASI lebih banyak mengandung whey daripada casein sehingga sehingga protein ASI mudah dicerna. Sedangkan pada susu sapi kebalikannya. Untuk itu pemberian ASI eksklusif wajib diberikan sampai bayi berumur 6 bulan.

c) Lemak

Lemak ASI adalah penghasil kalori (energi) utama dan merupakan komponen zat gizi yang bervariasi. Lebih mudah dicerna karena sudah dalam bentuk emulsi. Penelitian OSBORN membuktikan, bayi yang tidak mendapatkan ASI lebih banyak menderita penyakit jantung koroner di usia muda.

d) Laktosa

Merupakan karbohidrat utama pada ASI. Fungsinya sebagai sumber energy, meningkatkan absorbs kalsium dan merangsang pertumbuhan *lactocillus bifidus*.

e) Vitamin A

Konsentrasi vitamin A berkisar pada 200 IU\dl

f) Zat besi

Meskipun ASI mengandung sedikit zat besi (0,5-1,0 mg/liter), bayi yang menyusui jarang kekurangan zat besi (anemia). Hal ini dikarenakan zat besi pada ASI yang lebih mudah diserap.

g) Taurin

Berupa asam amino dan berfungsi sebagai neurotransmitter, berperan penting dalam maturasi otak bayi. DHA dan ARA merupakan bagian dari kelompok molekul yang dikenal sebagai omega fatty acids. DHA (docosahexaenoic acid) adalah sebuah blok bangunan utama di otak sebagai pusat kecerdasan dan di jala mata. Akumulasi DHA di otak lebih dari dua tahun pertama kehidupan. ARA (arachidonic acid) yang ditemukan diseluruh tubuh dan bekerja bersama-sama dengan DHA untuk mendukung visual dan perkembangan mental bayi.

h) *Lactobacillus*

Berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri *E. Coli* yang sering menyebabkan diare pada bayi.

i) Lactoferin

Sebuah besi batas yang mengikat protein ketersediaan besi untuk bakteri dalam intestines, serta memungkinkan bakteri sehat tertentu untuk berkembang. Memiliki efek langsung pada antibiotik berpotensi berbahaya seperti bakteri staphylococci dan *E. coli*. Hal ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam kolostrum, tetapi berlangsung sepanjang seluruh tahun pertama bermamfaat menghambat bakteri staphylococcus.

j) Lisozim

Dapat memecah dinding bakteri sekaligus mengurangi insidens *caries dentis* dan *maloklusi* (kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusu dengan botol dan dot). Enzim pencernaan yang kuat yang ditemukan dalam air susu ibu pada tingkat 50 kali lebih tinggi dari pada dalam rumus. Lysozyme menghancurkan bakteri berbahaya dan akhirnya mempengaruhi keseimbangan rumit bakteri yang menghuni usus yang sistem. (Dwi Sunar Prasetyono 2009).

6. Lama pemberian ASI

WHO, unicef dan departemen kesehatan republik Indonesia melalui SK menkes NO. 450/men.kes/SK/IV/2004 tanggal 7 april 2004 telah menetapkan rekomendasi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dalam rekomendasi tersebut, dijelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan yang optimal, bayi harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Selanjutnya, demi

tercukupinya nutrisi bayi, maka ibu mulai memberikan makanan pendamping ASI dan ASI hingga tahun lamanya (prasetyo 2009).

Al Qur'an menganjurkan pemberian ASI selama dua tahun (QS. Al baqarah: 233). Dengan demikian menyusui bisa dikatakan sebagai sebuah kewajiban bagi seorang ibu berkaitan dengan berbagai kepentingan, kemuliaan, dan keutamaan bagi ibu maupun si bayi. Dan, Allah sudah mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, pasti ada akibat bagi mereka yang tidak mematuhi (mengabaikan perintah ini/tidak menyusui bayinya lebih dikeranakan mereka yang sengaja dengan pertimbangan dan alasan yang sifatnya bukan hal yang prinsip dan sejati. (Arini H, 2012).

7. Manfaat pemberian ASI

ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. ASI bermamfaat bukan hanya untuk bayi saja, tetapi juga untuk ibu, keluarga dan Negara.

1) Manfaat untuk bayi

a. Nutrizen (zat gizi)

dalam ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Zat gizi merupakan terdapat dalam ASI antara lain : lemak, protein, karbohidrat, garam dan mineral serta vitamin. ASI memberikan seluruh kebutuhan nutrisi dan energi selama 1 bulan pertama, separuh atau lebih nutrisi selama 6 bulan kedua dalam tahun pertama dan 1/3 nutrisi atau lebih selama tahun kedua.

b. ASI mengandung zat protektif

Dengan adanya zat protektif yang terdapat dalam ASI, maka bayi jarang mengalami sakit.

c. Mempunyai efek psikolog yang menguntungkan

Kontak kulit yang dini ini akan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan bayi kelak. Interaksi yang timbul waktu menyusui antara ibu dan bayi akan menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan aman ini penting untuk menimbulkan dasar kepercayaan pada bayi (basic sense of trust), yaitu dengan mulai dapat mempercayai orang lain (ibu) maka akan timbul rasa percaya kepada diri sendiri.

d. Menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi baik.

Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki tumbuh kembang yang baik. Hal ini dilihat dari kenaikan berat badan bayi dan kecerdasan otak baik.

e. Mengurangi kejadian karies dentis

Insidens karies pada bayi yang mendapat susu formula jauh lebih tinggi di bandingkan yang mendapat ASI, karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan susu formula sehingga gigi menjadi lebih asam.

f. Mengurangi keadaan moluksi

Telah dibuktikan bahwa salah satu penyebab moloklusi rahang adalah kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusui dengan dot atau botol.

2) Manfaat untuk ibu

a. Aspek kesehatan ibu

Hisapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan, dapat mengurangi prevalensi anemia dan mengurangi kejadian karsinoma indung telur dan

mamae, mengurangi angka kejadian osteoporosis dan patah tulang panggul setelah menopause, serta menurunkan kejadian obesitas karena kehamilan.

b. Aspek keluarga berencana

Menyusui secara murni (eksklusif) dapat menjarangkan kehamilan. Ditemukan rata-rata jarak kelahiran ibu menyusui 24 bulan, sedangkan tidak menyusui 11 bulan, hormone yang mempertahankan laktasi, bekerja menekan hormon untuk ovulasi sehingga dapat menunda kesuburan. Menyusui secara eksklusif dapat digunakan sebagai kontrasepsi alamiah yang disebut metode amenorea laktasi (MAL).

c. Aspek psikologis

Keuntungan menyusui bukan hanya bermamfaat untuk bayi, tetapi juga untuk ibu, ibu akan merasa bangga dan dibutuhkan sehingga tercipta hubungan atau ikatan batin antara ibu dan bayi.

3) Manfaat untuk keluarga

a. Aspek ekonomi

ASI tidak perlu dibeli, selain itu penghematan juga dapat dilakukan karena ASI jarang membuat anak sakit, biayaya berobat kurang.

b. Aspek psikologi

Dengan memeberikan ASI, maka kebahagiaan keluarga bertambah, karena kelahiran lebih jarang , sehingga suasana kejiwaan ibu baik dapat tercipta kedekatan hubungan antara ibu dan bayi dengan anggota keluarga lain.

c. Aspek kemudahan

Menyusui sangat praktis karena dapat diberikan dimana saja dan kapan saja. Tidak repot untuk menyiapkannya.

4) Manfaat untuk Negara :

a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak

Kandungan ASI yang berupa zat protektif dan nutrient di dalam ASI yang sesuai kebutuhan bayi, menjamin status gizi bayi menjadi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun.

b. Mengurangi subsidi untuk RS

Subsidi RS berkurang, karena rawat gabung akan memperpendek lama perawatan ibu dan bayi di rumah sakit. Selain itu juga mengurangi komplikasi persalinan dan infeksi nosokomial serta mengurangi biaya perawatan anak sakit di rumah sakit.

c. Mengurangi devisa untuk membeli susu formula

ASI dapat dianggap sebagai kekayaan nasional. Jika semua ibu menyusui diperkirakan menghemat devisa sebesar 8,6 milyar/tahun yang dipakai untuk membeli susu formula.

d. Meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa

Anak yang mendapatkan ASI dapat tumbuh kembang secara optimal, sehingga kualitas generasi penerus bangsa terjamin (Reni Heryani 2010)

8. Peran bidan dalam pemberian ASI

Bidan mempunyai peranan yang sangat penting dan istri mewa dalm menunjang pemberian ASI dan keberhasilan menyusui. Peran bidan dapat membantu ibu untk memberikan ASI dengan baik dan mencegah maslah-masalah yang umumnya sering terjadi pada ibu .

Peran awal bidan dalam pemberian ASI :

1. Meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibunya.

2. Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri.

Bentuk dukungan bidan dalam pemberian ASI :

- a. Biarkan ibu bersama bayinya segera sesudah dilahirkan selama beberapa jam pertama.
- b. Ajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul.
- c. Bantulah ibu pada awal pertama kali member ASI.
- d. Memberikan ASI pada bayi sesering mungkin
- e. Hanya berikan ASI dan ASI saja
- f. Hindari susu botol dan dot empeng (Reni Heryani 2010)

9. Cara menyusui yang benar

1) Berbaring miring

Berbaring miring merupakan posisi yang amat baik untuk pemberian ASI yang pertama kali atau bila ibu merasakan lelah atau nyeri. Ini biasanya dilakukan pada ibu menyusui yang melahirkan melalui operasi sesar. Yang harus diwaspadai dari teknik ini adalah pertahanan jalan nafas bayi agar tidak tertutup oleh payudara ibu. Oleh karena itu, ibu harus selalu didampingi oleh orang lain ketika menyusui.



Gambar 2.3 posisi menyusui secara berbaring

2) Duduk

Untuk menyusui dengan duduk, ibu dapat memilih beberapa posisi tangan dan bayi yang paling nyaman.



Gambar 2.4 posisi menyusui secara duduk

3) Berdiri

Terdapat berbagai macam posisi menyusui. Cara menyusui yang tergolong biasa dilakukan adalah dengan berdiri. (jurnal rekam medis dan informatika kesehatan 2012).



Gambar 2.5 posisi menyusui secara berdiri

D. Tinjauan Islam tentang pengetahuan, ASI dan IMD

Ilmu pengetahuan adalah sebaik-baiknya sesuatu yang disukai, terpenting-penting sesuatu yang dicari merupakan sesuatu yang paling bermanfaat dari pada selainnya kemuliaan akan didapat bagi pemiliknya dan keutamaan akan diperoleh orang-orang yang memburunya. Allah SWT berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لِيُنذَرُوا

artinya:

Katakanlah (wahai Muhammad) adakah sama orang-orang yang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(QS. AZ-Zumar:9-10)

Dengan ayat diatas allah SWT menjelaskan bahwa tidak mau menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri dan manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu.

Manusia menurut hukum islam manusia merupakan makhluk Allah SWT, yang syarat dengan berbagi dimensi hidup. Secara fitrah adalah makhluk yang mempunyai martabat paling istimewa manakala dibandingkan dengan makhluk yang paling disayang allah SWT, bahkan sejak nenek moyangnya Adam dan Hawa ketika manusia berada di bumi ini, telah dalam keadaan suci. Dari keparipurnaan manusia itu, juga dilengkapi dengan seperangkat kemampuan untuk menjalankan amanah dan sekaligus mempertanggung jawabkannya.

Dengan beban pertanggung jawaban itu pada prinsipnya untuk memelihara potensi atau martabat manusia agar jangan jatuh kelmbah

yang nista, bahkan akan lebih hina dari makhluk lainnya. Salah satu bentuk pemeliharaan kedudukan manusia itu, adalah dengan adanya proses kelahiran dari generasi kegenerasi berikutnya. Untuk itu, yang pertama menjemput dan memikul tanggung jawab kelahiran anak dan selanjutnya menyusui, memelihara dan membina menjadi manusia bermartabat adalah orang tua.

Tanggung jawab orang tua itu disebabkan karena, pertama, secara kodrati merekalah penyebab kelahiran anak itu, kedua, tanggung jawab agama, bahwa tanggung jawab berdasarkan aturan-aturan agama. Tanggung jawab inilah yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kewajiban orang tua untuk menyusui, memelihara dan membina anaknya. Sehubungan dengan itu orang tua mulai memperhatikan kebutuhan hidup anak sejak lahir. oleh sebab itu, salah satu hak seorang anak dari orang tuanya yaitu memperoleh nafkah sejak anak dilahirkan, yang diistilahkan hal *radha'ah*.

Sehubungan dengan itu, Zakariah Ahmad Al-barriy mengatakan bahwa bayi berhak menyusu, semata-mata dengan kelahiran agar supaya ia bertambah besar, tumbuh mendapat makanan (nafkah), yaitu air susu ibunya yang dialirkan Allah SWT kepada ibu menjdai makanan yang penuh gizi bagi anaknya.

Al-Quran menjelaskan aturan-aturan penyusuan ini sebagai mana disebutkan dalam QS. Al-baqarah/2;233

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan arispun berkewajiban demikian. Apabila kedua ingni menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusui orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah SWT dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan “(QS.AL-baqarah :233)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan tidak boleh menolak hak anaknya yang membutuhkan dan menikmati air susu ibu (ASI) itu selama dua tahun dan menyapihnya boleh sebelum selesai masa dua tahun dengan syarat bahwa keputusan itu diambil atas persetujuan bersama antara ayah dan ibu setelah mempertimbangkan baik buruknya dan cara terbaik dalam perawatan.

Secara etimologis, “menyusui” berasal dari “susu” yang berarti organ tubuh yang terletak di dada wanita atau betina yang dapat menghasilkan makanan untuk bayi berupa cairan, payudara. Menyusui (*ar-radha'ah*) adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu berupa anak kecil (bayi) atau bukan.

Adapun dalam pengertian terminology, sebagaimana ulama fikih mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai berikut :

وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين.

Artinya : *Sampainya atau masuknya air susu ibu manusia (perempuan) ke Dalam seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun.*

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penyusuan adalah merupakan suatu proses dimana seorang ibu memberikan zat makanan secara alami yang terdapat pada susu seorang ibu sebagai alat dalam penyusuan anak yang telah dilahirkan agar dapat mencapai proses kehidupan yang lebih sehat menuju kedewasaan dari sebelumnya.

Sudah diketahui bersama bahwa tugas yang paling utama seorang ibu dalam hal pemeliharaan anak dari sejak lahir sampai beranjak dewasa adalah penyusuan anak, mendidik anak dan membesarkannya. Dalam hal ini ditekankan pada penyusuan seorang ibu kepada anaknya, karena sang anak tidak akan cukup merasakan kasih sayang jika ibunya sering terpisah dengannya (tidak menyusuinya).

Dengan demikian, tugas seorang perempuan muslimah yang paling asasi adalah peranannya sebagai ibu dalam mengurus, memelihara dan membina anaknya. Perlu disadari bahwa peranan keibuan bukan hanya sekedar menjadi istri yaitu mengandung dan melahirkan ana sebagaimana halnya terdapat pada hewan, akan tetapi lebih dari pada itu, peranan keibuan berarti mempunyai jiwa seorang ibu yang baik, yang penyabar, penyayang, lemah lembut untuk menyusukan anak atau bayi yang dilahirkan. Karena bayi yang baru lahir paling pertama sekali mendapat zat makanan adalah air susu ibu (ASI) yang dialirkan melalui payudara seorang ibu, sesuai ketentuan ajaran dalam hukum islam (mahir taloko 2013).

E. Kerangka konsep

1. Dasar pemikiran variabel

a. Pengertian IMD

Inisiasi menyusui dini (IMD) yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang IMD berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

1. Skema kerangka konsep



Gambar 2.6. Kerangka konsep

2. Definisi oprasional

a. Pengetahuan

Yang dimaksud pengetahuan adalah kemampuan responden menjawab pertanyaan tentang inisiasi menyusui dini

b. Ibu hamil trimester III

Merupakan usia kehamilan antara 28 – 42 minggu, waktu untuk menyiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orangtua seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi, sehingga disebut sebagai periode penantian (*Kusmiyati. 2009*)

c. Inisiasi menyusui dini (IMD).

Inisiasi menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Cara bayi merangkak mencari payudara ibunya sendiri disebut *the breast crawl*. Ketika bayi baru lahir, bayi segera diberikan atau diletakan di dada ibunya untuk dilakukan kontak kulit ke kulit, biarkan bayi merangkak sendiri mencari puting susu ibunya. (dr. Andi Sitti Rahma, S.Ked 2012)

Kriteria objektif

1. Baik : jika responden mengetahui sebagian besar atau seluruhnya tentang inisiasi menyusui dini. Skor jawaban responden > 50% (menjawab 7-12 pertanyaan).
2. Kurang : Jika responden mengetahui sebagian kecil tentang makna inisiasi menyusui dini. Skor jawaban responden kurang dari < 50% (menjawab salah 0-6).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yang merupakan sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang ditelitinya, menggambarkan besarnya masalah yang diteliti (swarjana, 2012:51). Dalam bidang kesehatan masyarakat metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang terkait dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu (Notoadmojo.2012:36).

Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusui dini” di Puskesmas Bontomarannu.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Bontomarannu gowa di kelurahan bontomarannu kecamatan sombaopu.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2016.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Populasi penelitian adalah keseluruhan jumlah objek penelitian atau objek yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012: 115).

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil trimester III yang berkunjung di Puskesmas Bontomarannu kecamatan sombaopu kabupaten gowa sebanyak 61 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (notoadmojo, 2005). Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah ibu hamil trimester III yang ada pada saat penelitian dan bersedia menjadi responden di

Puskesmas Bontomarannu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 38 orang.

a. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu hamil trimester III dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan

n = Besar sampel

N = 61

d = 0,1 → d² = 0,01

$$n = \frac{61}{1 + 61(0,001)}$$

$$n = \frac{61}{1 + 0,061} \quad n = \frac{61}{1,061} = 38$$

a. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yakni pengambilan sampel pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri dimana semua ibu hamil trimester III yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel. Jumlah sampel adalah

a) kriteria inklusi

1. Ibu hamil trimester III yang menjalani pemeriksaan antenatal care di Puskesmas Bontomarannu selama penelitian berlangsung.

2. Bisa membaca dan menulis.
 3. Ibu bersedia menjadi responden.
- b) kriteria eksklusif
1. Ibu hamil yang usia kehamilannya dibawah trimester III di Puskesmas Bontomarannu dan tidak bersedia untuk menjadi responden.

D. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, informasi yang dapat diperlukan didapat melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dengan mewawancarai responden secara langsung untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusui dini. .

E. Metode pengolahan data analisis data

1. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan

S = Skor yang diperoleh

R = jawaban yang benar

2. Analisis data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase dan yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi

kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepastakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

Keterangan

P = Presentase yang dicari

F = frekuensi factor variabel

n = Jumlah sampel

3. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diperoleh secara benar sehingga pengolahan data di kelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisis data dan pengolahan serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, agama pendidikan terakhir dan pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Umur

Umur responden bervariasi mulai umur 18 – 33 tahun. Penyajian data umur responden berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| Kelompok Umur (Tahun) | Ibu Hamil Trimester III | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| 18 – 21 tahun | 8 | 21,1 |
| 22 – 25 tahun | 12 | 31,6 |
| 26 – 29 tahun | 9 | 23,7 |
| 30 – 33 tahun | 9 | 23,7 |
| Total | 38 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 38 responden, kelompok umur dengan responden terbanyak berada pada kelompok dengan rentang umur 22 – 25 tahun yaitu sebanyak 12 responden (31,6%), sedangkan kelompok umur dengan responden yang paling sedikit jumlahnya

adalah kelompok dengan rentang umur 18 – 21 tahun yaitu sebanyak 8 responden (21,1%).

b. Agama

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan agama ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Agama Ibu Hamil Trimester III di
Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| Agama | Ibu Hamil Trimester III | |
|-------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Islam | 38 | 100 |
| Total | 38 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 38 responden, seluruh responden (100%) beragama islam.

c. Pendidikan terakhir

Pendidikan ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa bervariasi mulai dari SD sampai S1. Penyajian data pendidikan responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Distribusi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| Pendidikan Terakhir | Ibu Hamil Trimester III | |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| SD | 6 | 15,8 |
| SMP | 14 | 36,8 |
| SMA | 14 | 36,8 |
| S1 | 4 | 10,5 |
| Total | 38 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 38 responden, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa adalah SMP dan SMA dengan jumlah masing-masing sebanyak 14 responden (36,8%) dan hanya terdapat sebanyak 4 responden (10,5%) dengan pendidikan terakhir S1.

d. Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| Pekerjaan | Ibu Hamil Trimester III | |
|-----------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| IRT | 35 | 92,1 |
| PNS | 1 | 2,6 |
| Honorar | 2 | 5,3 |
| Total | 38 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan

Sombaopu adalah ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebanyak 35 responden (92,1%), sedangkan responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) hanya 2 responden (5,3%) dan responden yang bekerja sebagai pegawai honorer yaitu hanya 1 responde (2,6).

2. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah metode yang dilakukan untuk melihat gambaran umum hasil penelitian dari tiap-tiap variabel yang digunakan yakni melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait dengan tujuan penelitian.

- a. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang inisiasis menyusui dini (IMD)

Variabel pengetahuan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden terhadap inisiasi menyusui dini. yang dikategorikan menjadi baik dan kurang. Adapun distribusi lengkap mengenai pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarrannu berdasarkan hasil penelitian dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 5.

Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| Pengetahuan | Ibu hamil trimester III | |
|-------------|-------------------------|----------------|
| | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Baik | 32 | 84,2 |
| Kurang | 6 | 15,8 |
| Total | 38 | 100 |

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan

Sombaopu Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 32 responden (84,2%) dan hanya 6 responden (15,8%) yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang inisiasi menyusui dini.

Variabel pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini dianalisis lebih dalam berdasarkan 11 item pernyataan. Distribusi frekuensi berdasarkan setiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6.
Distribusi responden berdasarkan item pernyataan pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini di Puskesmas Bontomarannu kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

| No | item pernyataan Pengetahuan Tentang Inisiasi Menyusui Dini | Ibu hamil Trimester III | | | |
|----|---|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | Tahu | | Tidak tahu | |
| | | Jumlah (n) | Persentase (%) | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| 1 | Inisiasi menyusui dini/menyusui pertama adalah proses bayi menyusui sendiri setelah bayi lahir | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 |
| 2 | Cara yang benar dalam proses inisiasi menyusui dini adalah ibu membiarkan bayinya mencari puting susu sampai berhasil menyusui sendiri. | 26 | 68,4 | 12 | 31,6 |
| 3 | Bayi akan sering sakit bila diberikan inisiasi menyusui dini. | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 |
| 4 | Salah satu manfaat inisiasi menyusui dini adalah meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi untuk lebih erat dan penuh kasih sayang. | 33 | 86,8 | 5 | 13,2 |
| 5 | Inisiasi menyusui dini dapat membantu kelancaran proses menyusui. | 27 | 71,1 | 11 | 28,9 |

Sumber : Data Primer, 2016

| No | item pernyataan Pengetahuan Tentang Inisiasi Menyusui Dini | Ibu hamil Trimester III | | | |
|----|---|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | Tahu | | Tidak tahu | |
| | | Jumlah (n) | Persentase (%) | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| 6 | Kontak kulit ibu dan bayi sangat bermanfaat bagi bayi karena dada ibu dapat menghangatkan bayi saat proses inisiasi menyusui dini berlangsung. | 33 | 86,8 | 5 | 13,2 |
| 7 | Kelelahan ibu pada saat melahirkan merupakan penghambat dalam penatalaksanaan inisiasi menyusui dini. | 21 | 55,3 | 17 | 44,7 |
| 8 | ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan kaya akan zat gizi. | 25 | 65,8 | 13 | 34,2 |
| 9 | Cairan yang pertama kali dihasilkan payudara dan berwarna kekuning-kuningan itu atau disebut kolostrum sangat bermanfaat bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. | 28 | 73,7 | 10 | 26,3 |
| 10 | Pemberian ASI eksklusif yaitu tanpa memberikan makanan dan minuman lain selain ASI selama 6 bulan | 30 | 78,9 | 8 | 21,1 |
| 11 | Berbaring, duduk, dan berdiri merupakan cara menyusui yang benar. | 26 | 68,4 | 12 | 31,6 |

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil trimester III yang memeriksakan kandungan di Puskesmas Bontomarannu memiliki pengetahuan yang baik seputar inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif dan cara menyusui yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar responden yaitu 31 responden (81,6%) mengetahui pengertian inisiasi dini yang terlihat pada item pernyataan “*Inisiasi menyusui dini/menyusui pertama adalah proses bayi menyusui sendiri setelah bayi lahir*”, terdapat 26 responden

(68,4%) mengetahui bahwa “*Cara yang benar dalam proses inisiasi menyusui dini adalah ibu membiarkan bayinya mencari puting susu sampai berhasil menyusui sendiri*”.

Pengetahuan ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu tentang manfaat inisiasi menyusui dini diperoleh bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui “*bayi akan sering sakit bila diberikan inisiasi menyusui dini*” adalah pernyataan yang salah yaitu sebanyak 20 responden (52,6%), responden yang mengetahui bahwa “*salah satu manfaat inisiasi menyusui dini adalah meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi untuk lebih erat dan penuh kasih sayang*” yaitu sebanyak 33 responden (86,8%), responden yang mengetahui bahwa “*inisiasi menyusui dini dapat membantu kelancaran proses menyusui*” yaitu sebanyak 33 responden (86,8%), responden yang mengetahui bahwa “*kontak kulit ibu dan bayi sangat bermanfaat bagi bayi karena dada ibu dapat menghangatkan bayi saat proses inisiasi menyusui dini berlangsung*” yaitu sebanyak 33 responden (86,8%), sedangkan untuk item pernyataan “*cairan yang pertama kali dihasilkan payudara dan berwarna kekuning-kuningan itu atau disebut kolostrum sangat bermanfaat bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit*” terdapat 28 responden (73,7%) yang mengetahui hal tersebut.

Selain manfaat inisiasi menyusui dini, sebagian responden juga mengetahui penghambat dari inisiasi menyusui dini yang terlihat dari item pernyataan “*Kelelahan ibu pada saat melahirkan merupakan penghambat dalam penatalaksanaan inisiasi menyusui dini*” dimana terdapat 21 responden (55,3%) mengetahui pernyataan tersebut salah.

Selain pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini, responden ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu juga mengetahui hal-hal seputar ASI eksklusif. Lebih lanjut dapat dijelaskan, sebagian responden yaitu sebanyak 30 responden (78,9%) mengetahui pengertian ASI eksklusif bahwa "*Pemberian ASI eksklusif yaitu tanpa memberikan makanan dan minuman lain selain ASI selama 6 bulan.*", Sebagian besar responden yaitu sebanyak 25 responden (65,8%) juga mengetahui manfaat ASI eksklusif bahwa "*ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan kaya akan zat gizi*" dan sebagian besar responden yaitu sebanyak 26 responden (68,4%) mengetahui pula cara menyusui bahwa "*Berbaring, duduk, dan berdiri merupakan cara menyusui yang benar*"

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester III di Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 32 responden (84,2%) dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 6 responden (15,8%).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartatik (2012) pada 35 ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di BPS Syah Sumarmo Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil memiliki pengetahuan yang cukup tentang inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 20 orang (57,15) dan hanya terdapat 6 orang ibu hamil (17,2%) yang memiliki pengetahuan yang baik tentang inisiasi menyusui.

Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Primihastuti (2014) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini di BPS Ny.Arifin jalan Wonorejo Kota Surabaya didapatkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup tentang inisiasi menyusui dini yaitu 14 responden (50%).

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil pengideraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata).

Menurut pendapat Ngantimin (2004), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif tahu diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan memahami (*Comprehension*) suatu objek bukan sekedar tahu terhadap obyek tersebut, tetapi orang tersebut, tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang inisiasi menyusui dini (IMD).

Menurut Roesli (2008), Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah bayi menyusu sendiri segera setelah lahir, sebenarnya bayi manusia seperti juga

bayi mamalia lain mempunyai kemampuan untuk menyusu sendiri. Salah satu faktor keberhasilan inisiasi menyusu dini adalah pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusu dini. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu segera setelah lahir dengan mencari sendiri payudara ibunya. Jadi, sebenarnya bayi manusia seperti juga bayi mamalia lain mempunyai kemampuan menyusu sendiri, asalkan dibiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibunya, setidaknya selama satu jam segera setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi menyusu dini ini, dinamakan the breast crawl atau merangkak mencari payudara (Roesli, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang IMD berpengatahuan baik, akan tetapi terdapat 12 responden (31,6%) yang kurang paham tentang tatalaksanaan IMD. Tatalaksana IMD menurut Roesli (2008) adalah suami atau keluarga dianjurkan mendampingi ibu saat persalinan, pada saat persalinan untuk dapat mengurangi penggunaan obat kimiawi, dan dapat diganti dengan cara pijat, aromaterapi, gerakan. Menganjurkan ibu untuk menentukan cara melahirkan yang diinginkan misalnya melahirkan normal, di dalam air, atau dengan jongkok, dan setelah seluruh badan bayi lahir kemudian dikeringkan secepatnya, kecuali kedua tangan. Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu agar kulit bayi melekat pada kulit ibu, posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum satu jam atau setelah menyusu awal selesai. Keduanya diselimuti, jika perlu diberi topi. Biarkan bayi mencari puting susu ibu dan ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu. Kemudian bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur dan dicap setelah satu jam atau menyusu awal selesai, suntikkan vitamin K dan sebagainya, dan dilakukan rawat gabung ibu dan

bayi dalam satu kamar dalam jangkauan ibu selama 24 jam. Berikan ASI saja tanpa minum yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 responden (52,6%) yang menganggap jika bayi akan sering sakit jika diberikakan inisiasi menyusui dini. Selain itu terdapat 11 responden (28,9%) yang tidak mengetahui IMD dapat membantu kelancaran proses menyusui, terdapat 5 responden (13,2%) yang tidak mengetahui bahwa kontak kulit ibu dan bayi sangat bermanfaat bagi bayi karena dada ibu dapat menghangatkan bayi saat proses inisiasi menyusui dini berlangsung dan terdapat 5 responden (13,2%) juga yang tidak mengetahui Salah satu manfaat inisiasi menyusui dini adalah meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi untuk lebih erat dan penuh kasih sayang.

Manfaat inisiasi menyusui dini menurut Asuhan persalinan Normal (APN) (2008), yaitu manfaat bagi ibu adalah meningkatkan hubungan kasih sayang ibu dan bayi, meningkatkan produksi ASI, membantu ibu mengatasi stress terhadap berbaai rasa kurang nyaman saat melahirkan, memberikan efek relaksasi pada ibu setelah bayi selesai menyusui, meningkatkan keberhasilan menyusui secara eksklusif dan lamya bayi menyusui, meningkatkan keberhasilan menyusui secara eksklusif dan lamanya bayi disusui, serta dapat merangsang produksi ASI. Sedangkan mnaffat bagi bayi adalah meningkatkan kecerdasan bayi, membantu abyu mengkoordinasikan kemampuan hisap, menelan, dan nafas, dapat juga meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi, mencegah bayi kehilangan panas, meningkatkan keterampilan bayi untuk menyusui lebih cepat dan efektif, kemudian mengurangi 22% kematian bayi yang berusia 28 hari dan memperkuat refleks menghisap bayi pada awal yang paling kuat dalam

beberapa jam setelah lahir. Menurut Suryoprajogo (2010), manfaat dari Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah sebagai berikut anak yang menyusui dini dapat mudah sekali menyusui kemudian, sehingga kegagalan menyusui akan jauh sekali berkurang.

Menurut Hidayat (2012), pengetahuan ibu mengenai IMD adalah salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan pelaksanaan IMD, untuk itu diperlukan informasi yang baik agar pengetahuan ibu tentang IMD tinggi dan IMD dapat terlaksana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang IMD memiliki hubungan yang signifikan terhadap pelaksanaan IMD. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2012) yang menyatakan ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang IMD dengan pelaksanaan IMD. IMD dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif dan lama menyusui (Roesli, 2008). Hal ini sesuai dengan penelitian Legiwati, Dasuki dan Julia (2011) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara inisiasi menyusui dini (IMD) dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi secara tidak langsung pengetahuan ibu tentang IMD akan mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 30 responden (78,9%) yang mengetahui pengertian dari ASI eksklusif, terdapat 13 responden (34,2%) yang tidak mengetahui bahwa manfaat ASI yakni ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan kaya akan zat gizi. Selain itu

terdapat 12 responden (31,6%) yang tidak mengetahui cara menyusui yang benar.

ASI merupakan sumber makanan utama bagi bayi. Selama 6 bulan pertama, bayi tidak membutuhkan makanan tambahan lain karena segala kebutuhan nutrisi telah dapat terpenuhi dari ASI. Selain itu pemberian ASI saja pada 6 bulan pertama berkaitan dengan kondisi bayi sendiri seperti belum sempurnanya sistem pencernaan. Bayi yang umur nol sampai enam bulan hanya diberikan ASI saja karena ASI mengandung zat gizi yang ideal dan untuk menjamin tumbuh kembang sampai umur enam bulan. Bayi di bawah usia enam bulan juga belum mempunyai enzim pencernaan yang sempurna, sehingga belum mampu mencerna makanan dengan baik (Nadesul, 2004).

Pemberian ASI saja mempunyai manfaat yang sangat baik bayi. Pemberian ASI secara eksklusif dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga mendukung pertumbuhan maupun perkembangan bayi. Manfaat pemberian ASI bagi bayi yaitu ASI sebagai nutrisi yaitu merupakan sumber gizi yang sangat ideal untuk pertumbuhan bayi, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi (Suradi, 2008).

Pengetahuan ibu tentang keunggulan ASI dan cara pemberian ASI yang benar dapat menunjang keberhasilan ibu dalam menyusui. Hal ini karena ketidaktahuan ibu tentang keunggulan ASI dan resiko pemberian makanan tambahan lebih awal dapat memberi pengaruh buruk pada bayi yaitu bayi rentan terhadap penyakit infeksi dan diare. Pada saat ini angka pemberian ASI cenderung menurun karena ASI sudah banyak diganti dengan susu botol. Hal tersebut tidak perlu terjadi bila ibu cukup mengetahui keunggulan ASI

sebagai makanan terbaik bayi dan bahaya yang dapat timbul akibat mengganti ASI dengan makanan tambahan lainnya (Purwanti, 2004).

Islam juga meyakini air susu ibu sebagai makanan terbaik bagi anak, dan merupakan sebuah hak alami. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as berkata, *"Tidak ada satu pun susu yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai bagi anak dari air susu ibu"*. Sedemikian pentingnya kedudukan air susu ibu dalam Islam, sehingga para ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya dan bagi mereka disediakan pahala yang besar manakala melakukannya. Rasulullah saw bersabda, *"Ketika seorang wanita menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu yang diisap anak dengan pahala memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail, dan manakala wanita itu selesai menyusui anaknya malaikat pun meletakkan tangannya ke atas sisi wanita itu seraya berkata, 'Mulailah hidup dari baru, karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu.'"*

Oleh karena itu, para ibu yang menginginkan pendidikan yang benar bagi anaknya sedapat mungkin ia harus menyusui anaknya, karena hal itu akan sangat membantu bagi kesehatan fisik dan jiwa anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Puskesmas Bontomarannu tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu memiliki pengetahuan yang baik tentang inisiasi menyusui dini (IMD) yaitu sebanyak 32 responden (84,2%), sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang inisiasi menyusui dini (IMD) yaitu sebanyak 6 responden (15,8%).
2. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu mengetahui tentang pengertian inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 26 responden (68,4%), sedangkan responden yang tidak mengetahui tentang pengertian inisiasi menyusui dini (IMD) yaitu sebanyak 12 responden (31,6%).
3. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu mengetahui tentang manfaat inisiasi menyusui dini yaitu sebanyak 33 responden (86,8%), sedangkan responden yang tidak mengetahui tentang manfaat inisiasi menyusui dini (IMD) yaitu sebanyak 5 responden (13,2%).
4. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu mengetahui tentang manfaat ASI yaitu sebanyak 25 responden (65,8%), sedangkan responden yang tidak mengetahui tentang manfaat ASI yaitu sebanyak 13 responden (34,2%).
5. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu mengetahui tentang ASI eksklusif yaitu sebanyak 30 responden (78,9%), sedangkan

responden yang tidak mengetahui tentang ASI eksklusif yaitu sebanyak 8 responden (21,1%).

6. Sebagian besar responden di Puskesmas Bontomarannu mengetahui tentang cara menyusui yang benar yaitu sebanyak 26 responden (68,4%), sedangkan responden yang tidak mengetahui tentang cara menyusui yang benar yaitu sebanyak 12 responden (31,6%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Kegunaan Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sehingga dapat mempersiapkan dalam pemahaman bagi ibu hamil dalam praktik Inisiasi Menyusui Dini
2. Bagi Petugas Kesehatan
Diharapkan petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan dan konseling agar informasi mengenai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dapat terlaksana dengan baik dan benar dan dilaksanakan oleh ibu dengan bimbingan tenaga kesehatan
3. Bagi Institusi Pendidikan
Hendaknya Karya Tulis Ilmiah ini digunakan sebagai sumber referensi atau bahan informasi meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan khususnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

Daftar Pustaka

- Adiningsih, Sri. *Waspada! Gizi Balita Anda*, Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2010.
- Anjasmara, Jana, Dkk. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Dengan Partisipasi Ibu Melakukan IMD*. Vol.07, No.01, April 2015.
- Chomaria, Nurul. *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta: Info Media, 2013.
- H, Arini. *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui*, Yogyakarta: Flashbooks, 2012.
- Hartatik. *Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Inisiasi Menyusui Dini di BPS Dyah Sumarmo Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2012*. Karya Tulis Ilmiah. Program Studi Diploma III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta, 2012.
- Heryani, Reni. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Menyusui*, Jakarta: CV Trans Info Media, 2012.
- Hidayat, K. *Perbandingan Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil*. Skripsi. Semarang: Fakultas Kedokteran. UNDIP, 2012.
- Legiwati, Dasuki.D, Julia,M. *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini Terhadap Praktik Menyusui 1 Bulan Pertama*. Jurnal Klinis Indonesia. Vol 8.No 02, 2011.
- Martalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Maulana, Mirza. *What A Woman Wants*, Yogyakarta: 2007.
- Maryuni, Anik. *Menyusui Dini, ASI Eksklusif Dan Manajemen Laktasi*, Jakarta: Cv Trans Info Media, 2012.
- Maloko, Tahir. *Ar-Radha 'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Allauddin University, 2013.

- Mahmud, Syamsuriani, Dkk. *Pengaruh Pendidikan Inisiasi Menyusui Dini Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Trimester Iii*. Jurnal Stikes Nani Hasanuddin Makassar Vol 2. No 5 Tahun 2013.
- Nadesul. *Makanan Sehat Untuk Bayi*. Jakarta: Puspa Swara, 2004.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Notoadmojo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Prasetyono, Dwi Sunar. *ASI Eksklusif*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Primihastuti, Dianita. *Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Bps Ny. Arifin Jalan Wonorejo Kota Surabaya*. [Http://Ejournal.Stikeswilliambooth.Ac.Id](http://Ejournal.Stikeswilliambooth.Ac.Id) Vol 3, No 1 (2014), 2014.
- Proverawati, Atikah., Eni Rahmawati. *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Purwanti, H. S. *Konsep Penerapan ASI Eksklusif Buku Saku Bidan*. Jakarta: Egc, 2004.
- Rahma, Andi Sitti. *Fisiologi LaktASI*, Makassar: Alauddin University, 2012.
- Raharjo, Bambang Budi. *Profil Ibu Dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusui Dini Dan ASI Eksklusif*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 10 (1) (2014) 53 – 63.
- Roesli, U. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2008.
- Sunardi. *Ayah Beri Aku ASI*, Solo: Aqwa Medika, 2008.
- Suradi, R. *Manfaat ASI Dan Menyusui*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesi, 2008.
- Suryoprajogo. *Keajaiban Menyusui*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.

Tihardimantoro,A. *Sistem Reproduksi*, Makassar: Alauddin University, 2012.

Wahyuningsih. *Hubungan Pengetahuan Ibu Bersalin Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di Bidan Praktek Swasta Benis Jayanto Ceper Klaten*. Jurnal Klinis Kesehatan Vol 3.No 01, 2012.

Wulandari, Setyo Retno, Sri Handayani. *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*, Yogyakarta: Gosyeng Publishing, 2011.

Yuliarti, Nurheti. *Keajaiban ASI*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBARAN KUESIONER

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG INISIASI MENYUSUI DI PUSKESMAS BONTOMARANNU

PETUNJUK

Isilah identitas diri dengan lengkap

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama ibu :

Umur ibu :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. ALAT UKUR PENGETAHUAN

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah tanda pada kolom jawaban BENAR jika anda menyatakan benar, dan pada kolom SALAH jika anda meyatakan pernyataan tersebut salah.

Makassar 27 Maret 2016

(Responden)

| NO | PERNYATAAN-PERNYATAAN | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1. | Inisiasi menyusui dini/menyusui pertama adalah proses bayi menyusui sendiri segera setelah bayi lahir. | | |
| 2. | Cara yang benar dalam proses inisiasi menyusui dini adalah ibu membiarkan bayinya mencari puting susu sampai berhasil menyusui sendiri. | | |
| 3. | Bayi akan sering sakit bila diberikan inisiasi menyusui dini. | | |
| 4. | Salah satu manfaat inisiasi menyusui dini adalah meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi untuk lebih erat dan penuh kasih sayang. | | |
| 5. | Inisiasi menyusui dini dapat membantu kelancaran proses menyusui. | | |
| 6. | Kontak kulit ibu dan bayi sangat bermanfaat bagi bayi karena dada ibu dapat menghangatkan bayi saat proses inisiasi menyusui dini berlangsung. | | |
| 7. | Kelelahan ibu pada saat melahirkan merupakan penghambat dalam penatalaksanaan inisiasi menyusui dini. | | |
| 8. | ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan kaya akan zat gizi. | | |
| 9. | Cairan yang pertama kali dihasilkan payudara dan berwarna kekuning-kuningan itu atau disebut kolostrum sangat bermanfaat bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. | | |
| 10. | Pemberian ASI eksklusif yaitu tanpa memberikan makanan dan minuman lain selain ASI selama 6 bulan. | | |
| 11. | Berbaring, duduk, dan berdiri merupakan cara menyusui yang benar. | | |

LAMPIRAN HASIL SPSS

UMUR RESPONDENN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 18-21 TAHUN | 8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| | 22-25 TAHUN | 12 | 31,6 | 31,6 | 52,6 |
| | 26-29 TAHUN | 9 | 23,7 | 23,7 | 76,3 |
| | 30-33 TAHUN | 9 | 23,7 | 23,7 | 100,0 |
| | Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

AGAMA RESPONDEN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | ISLAM | 38 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

PENDIDIKAN RESPONDENN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SD | 6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| | SMP | 14 | 36,8 | 36,8 | 52,6 |
| | SMA | 14 | 36,8 | 36,8 | 89,5 |
| | S1 | 4 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| | Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

PEKERJAAN RESPONDEN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | IRT | 35 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| | HONORER | 1 | 2,6 | 2,6 | 94,7 |
| | PNS | 2 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| | Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

PENGETAHUAN TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Baik | 32 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| Kurang | 6 | 15,8 | 15,8 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Inisiasi menyusui dini/menyusui pertama adalah proses bayi menyusui sendiri segera setelah bayi lahir.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| tahu | 31 | 81,6 | 81,6 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Cara yang benar dalam proses inisiasi menyusui dini adalah ibu membiarkan bayinya mencari puting susu sampai berhasil menyusui sendiri.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 12 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| tahu | 26 | 68,4 | 68,4 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Bayi akan sering sakit bila diberikan inisiasi menyusui dini.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 20 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| tahu | 18 | 47,4 | 47,4 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Salah satu manfaat inisiasi menyusui dini adalah meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi untuk lebih erat dan penuh kasih sayang.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| tahu | 33 | 86,8 | 86,8 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Inisiasi menyusui dini dapat membantu kelancaran proses menyusui.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 11 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| tahu | 27 | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Kontak kulit ibu dan bayi sangat bermanfaat bagi bayi karena dada ibu dapat menghangatkan bayi saat proses inisiasi menyusui dini berlangsung.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| tahu | 33 | 86,8 | 86,8 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Kelelahan ibu pada saat melahirkan merupakan penghambat dalam penatalaksanaan inisiasi menyusui dini.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 17 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| tahu | 21 | 55,3 | 55,3 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan kaya akan zat gizi.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 13 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| tahu | 25 | 65,8 | 65,8 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Cairan yang pertama kali dihasilkan payudara dan berwarna kekuning-kuningan itu atau disebut kolostrum sangat bermanfaat bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 10 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| tahu | 28 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Pemberian ASI eksklusif yaitu tanpa memberikan makanan dan minuman lain selain ASI selama 6 bulan.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| tahu | 30 | 78,9 | 78,9 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

Berbaring, duduk, dan berdiri merupakan cara menyusui yang benar.

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak tahu | 12 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| tahu | 26 | 68,4 | 68,4 | 100,0 |
| Total | 38 | 100,0 | 100,0 | |

MASTER TABEL

| NO | KARAKTERISTIK RESPONDEN | | | | | PENGETAHUAN | | | | | | | | | | | KATEGORI | |
|----|-------------------------|------|-------|------------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----------|--------|
| | NAMA | UMUR | AGAMA | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | skor |
| 1 | NM | 21 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63,63 | baik |
| 2 | W | 22 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | baik |
| 3 | N | 24 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72,72 | baik |
| 4 | N | 31 | ISLAM | SMP | IRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63,63 | baik |
| 5 | F | 23 | ISLAM | S1 | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | baik |
| 6 | HK | 19 | ISLAM | SD | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54,54 | baik |
| 7 | NJ | 31 | ISLAM | SD | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45,45 | kurang |
| 8 | K | 23 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63,63 | baik |
| 9 | M | 23 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36,36 | kurang |
| 10 | WH | 24 | ISLAM | S1 | HONORER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72,72 | baik |
| 11 | MJ | 18 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,54 | baik |
| 12 | I | 21 | ISLAM | SMP | IRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63,63 | baik |
| 13 | SR | 28 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63,63 | baik |
| 14 | RA | 26 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,45 | kurang |
| 15 | MDN | 33 | ISLAM | SD | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,90 | baik |
| 16 | DK | 30 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45,45 | kurang |
| 17 | M | 27 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,72 | baik |
| 18 | A | 29 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81,81 | baik |
| 19 | K | 33 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,54 | baik |
| 20 | A | 28 | ISLAM | S1 | PNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81,81 | baik |
| 21 | NJ | 19 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,90 | baik |
| 22 | J | 33 | ISLAM | SMP | IRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45,45 | kurang |
| 23 | HK | 29 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63,63 | baik |
| 24 | KK | 25 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | baik |
| 25 | J | 29 | ISLAM | SMP | IRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,54 | baik |
| 26 | A | 27 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,36 | kurang |
| 27 | NA | 20 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,90 | baik |
| 28 | J | 23 | ISLAM | SD | IRT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,72 | baik |
| 29 | SR | 24 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81,81 | baik |
| 30 | A | 25 | ISLAM | S1 | PNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81,81 | baik |
| 31 | H | 30 | ISLAM | SD | IRT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,72 | baik |
| 32 | AA | 22 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81,81 | baik |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| 33 | I | 31 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,90 | baik |
| 34 | NADP | 31 | ISLAM | SD | IRT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,90 | baik |
| 35 | A | 19 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,90 | baik |
| 36 | F | 24 | ISLAM | SMA | IRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,72 | baik |
| 37 | FA | 18 | ISLAM | SMA | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72,72 | baik |
| 38 | HS | 26 | ISLAM | SMP | IRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,90 | baik |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R