

**GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN
SEKSIO SESAREA DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TAHUN 2009**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**Karya Tulis Ilmiah
(KTI)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
OLEH
MAKASSAR

HARYATI NINGSIH
70400007013

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Kampus II: jalan sultan alauddin no.36 samata-gowatelp(0411)424835fax.424836

PERSETUJUAN JUDUL KTI

NAMA : HARYATI NINGSIH
NIM : 70400007013
JUDUL : GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN
SEKSIO SESAREA DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TAHUN 2009

Makassar, 25 Agustus 2010

Mengetahui

PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
KETUA PRODI

dr. Dewi Setiawati, S.Ked
Nip.19810621 200604 2 005

Siti Saleha, S.Si.T, SKM. M.Keb
Nip.19760126 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengawali ucapan terima kasih, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan penghargaan yang teristimewa kepada Ayahanda Baharuddin.T dan Ibunda Sanawiah yang telah melahirkan, memelihara, mendidik dengan penuh kasih sayang, do'a restu, serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada Om dan Tante serta pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a, serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Selama penelitian ini berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi, namun berkat petunjuk, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak maka hambatan dan kesulitan dilalui. Untuk itu ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M. Sc, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Sitti Saleha, S. SiT, SKM, M. Keb. Selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. dr. Dewi Setiawati, S. Ked. selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan karya tulis ilmiah
5. dr. Riny Fitriani, S.Ked selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingannya dalam menyusun KTI ini.
6. Burhanuddin, Lc, M.Th.I selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan KTI ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. dr. H. Leo Prawirodihardjo, Sp. OG(K), M.Kes, M.M, PhD selaku kepala RSIA Siti Fatimah Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 khususnya (Qq, Tari, Ina, Kasma, Husni, Fitto, Nila, Ana, Ila, Ida) dan semua teman-teman yang tak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya semoga apa yang penulis kerjakan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Dan kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah yang maha pemurah memberikan imbalan yang setimpal padanya, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	5
C. Tujuan Penelitian.	5
D. Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan.....	7
1. Definisi Persalinan.....	7
2. Karakteristik Persalinan Normal.....	7

3. Tanda-Tanda Persalinan.....	7
4. Penatalaksanaan Persalinan Normal.....	8
B. Tinjauan Khusus Tentang Seksio Sesarea.....	9
1. Definisi Seksio Sesarea.....	9
2. Etimologi Seksio Sesarea.....	10
3. Sejarah Seksio Sesarea.....	11
4. Jenis-jenis Seksio Sesarea.....	13
5. Indikasi Seksio Sesarea.....	14
6. Keuntungan dan Kerugian Seksio Sesarea.....	19
7. Efek Samping Seksio Sesarea.....	19
8. Komplikasi Seksio Sesarea.....	23
C. Tinjauan Tentang Variabel Penelitian.....	25
1. Umur ibu.....	25
2. Paritas	25
3. Indikasi.....	25
4. Pekerjaan.....	26
D. Tinjauan Menurut Pandangan Islam.....	27

BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.	29
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti.....	31
C. Definisi Operasional Variabel yang diteliti.....	31

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 34

C. Populasi dan Sampel..... 34

D. Teknik Pengambilan Sampel..... 35

E. Pengelohan dan Penyajiaan Data..... 35

F. Analisis Data..... 35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 36

B. Pembahasan..... 39

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Distribusi Umur Terhadap Kejadian Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.....	36
2.	Distribusi Paritas Terhadap Kejadian Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.....	37
3.	Distribusi Indikasi Terhadap Kejadian Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.....	38
4.	Distribusi Pekerjaan Terhadap Kejadian Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabulasi Data Pasien Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar
Tahun 2009
- Lampiran 2 : Lembar Kegiatan Konsul
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
- Lampiran 4 : Surat Izin Pengambilan Data di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan
- Lampiran 5 : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
(BALITBANGDA)
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di RSIA Siti Fatimah
Makassar



ABSTRAK

PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2010

Hayati Ningsih, Nim: 70400007013

Pembimbing : dr. Dewi Setiawati, S.Ked

“Gambaran karakteristik ibu Bersalin dengan Seksio Sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009”

Xiii + 6 Bab + 45 Halaman + 4 Tabel + 6 Lampiran

Angka seksio sesarea di Negara-negara maju meningkat dari 5% pada 25 tahun yang lalu menjadi 15%. Adapun pada tahun 1985 WHO mengusulkan bahwa angka seksio sesarea secara nasional tidak melebihi angka 10% dari seluruh persalinan. Persalinan dengan seksio sesarea sangat berbeda dengan persalinan per vagina. Sebagian ibu-ibu beranggapan bahwa persalinan dengan operasi berguna dalam membantu mereka menghindari persalinan, mengetahui kapan bayinya akan lahir sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perencanaan dan secara psikologis mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi dan pemulihannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana jumlah populasi sebanyak 3705 orang dan sampel sejumlah 498 orang, menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan sumber data diperoleh melalui data sekunder dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan tabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seksio sesarea yang terbanyak terjadi pada umur 20-34 tahun yaitu 358 orang (71,89%). Pada paritas yaitu paritas 0 sebanyak 314 orang (63,05%). Pada indikasi yaitu dengan riwayat seksio sesarea sebelumnya sebanyak 105 orang (21,08%). Pada pekerjaan yaitu sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 475 orang (95,38%).

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian seksio sesarea berdasarkan umur yaitu lebih banyak pada umur 20-34 tahun yaitu 358 orang (71,89%). Pada paritas lebih banyak terjadi pada paritas 0 yaitu sebanyak 314 orang (63,05%). Pada indikasi lebih banyak terjadi pada indikasi dengan riwayat seksio sesarea sebelumnya sebanyak 105 orang (21,08%). Pada pekerjaan lebih banyak sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 475 orang (95,38%).

`BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seksio sesarea (bahasa Inggris: *caesarean section* atau *cesarean section* dalam Inggris-Amerika), disebut juga dengan *c-section* (disingkat dengan *cs*) adalah proses persalinan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Dimana seksio sesarea umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta bidan. (Lestari, 2009).

Persalinan dengan seksio sesarea sangat berbeda dengan persalinan per vagina. Sebagian ibu-ibu beranggapan bahwa persalinan dengan operasi berguna dalam membantu mereka menghindari persalinan, mengetahui kapan bayinya akan lahir sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perencanaan dan secara psikologis mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi dan pemulihannya. Sedangkan ibu-ibu lainnya mungkin merasa ditipu oleh pengalaman melahirkan dan merasa sangat tertekan untuk melahirkan secara operasi. (Johnson, 2004: 358).

Seksio sesarea berkembang sejak akhir abad ke-19 sampai tiga dekade terakhir pada abad ke-20. Selama periode itu terjadi penurunan angka kematian

ibu dari 100% menjadi 2%. Seksio sesarea pertama kali disebut sebagai cara melahirkan bayi dalam dunia kedokteran di tahun 1794, namun pada saat itu melahirkan dengan seksio sesarea memiliki risiko kematian ibu yang besar. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya peralatan, obat bius, antibiotik, maupun teknik pembedahan yang baik. (Kiki, 2009).

WHO memperkirakan bahwa seksio sesarea ada diantara 10% dan 15% dari seluruh kelahiran di negara-negara berkembang. Sedangkan angka yang lebih tinggi tidak secara langsung berkaitan dengan hasil-hasil kelahiran yang lebih baik bagi ibu dan bayi. Tahun 2004 laju seksio sesarea di Inggris adalah sekitar 20% dan 29,1% selama 2001-2003, laju seksio sesarea di Kanada adalah 22,5%. (Yusmiati, 2007: 87).

Adapun pada tahun 1985 WHO mengusulkan bahwa angka seksio sesarea secara nasional tidak melebihi angka 10% dari seluruh persalinan, namun laporan dari beberapa negara justru melebihi angka tersebut. Sebagai contoh angka nasional Amerika Serikat pada tahun 1986 adalah 24,1%, di Amerika Latin seperti Puerto Rico sebesar 28,7%, di Benua Asia seperti di Nanjing (daratan Cina) mencapai 26,6%. (Aris, 2008).

Di Negara-negara maju, angka seksio sesarea meningkat dari 5% pada 25 tahun yang lalu menjadi 15%. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh 'mode', sebagian karena ketakutan timbul perkara jika tidak dilahirkan bayi yang 'sempurna' sebagian lagi karena perubahan pada kehamilan, wanita menunda kehamilan anak pertama dan membatasi jumlah anak. (Hadianto, 2001: 152).

Di Indonesia menurut data survey nasional pada tahun 2007, angka kejadian seksio sesarea adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh persalinan. (Anita, 2009).

Secara umum jumlah seksio sesarea di rumah sakit Pemerintah adalah sekitar 20-25% dari total persalinan, sedangkan di rumah sakit swasta jumlahnya sangat tinggi yaitu sekitar 30-80% dari total persalinan. (Nunung, 2009).

Adapun data untuk wilayah Provinsi Makassar yang telah tercatat di Dinas Kesehatan pada tahun 2008, angka kejadian seksio sesarea yaitu 1976 dari 191.648 persalinan atau sekitar 1,03%. Sedangkan pada tahun 2009, angka kejadian seksio sesarea yaitu 1785 dari 180.081 persalinan atau sekitar 0,99% dari seluruh persalinan. (Dinkes, 2010).

Data yang diperoleh dari rekam medis RSIA Siti Fatimah Makassar mulai periode Januari-Desember tahun 2009 adalah sebanyak 4321 ibu yang melakukan persalinan, 544 diantaranya dilakukan seksio sesarea atau sekitar 12,58% dari seluruh persalinan. (Rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar).

Pada seksio sesarea yang direncanakan angka komplikasinya kurang lebih 4,2% sedangkan untuk seksio sesarea darurat(*section caesar emergency*) berangka kurang lebih 19%. Setiap tindakan seksio sesarea memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Pada operasi kasus persalinan macet dengan kedudukan kepalajanan pada akhir jalan lahir misalnya, sering terjadi cedera pada rahim bagian bawah atau cedera pada kandung kemih(robek). Sedangkan pada kasus bekas operasi sebelumnya dimana dapat ditemukan perlekatan

organ dalam panggul sering menyulitkan saat mengeluarkan bayi dan dapat pula menyebabkan cedera pada kandung kemih dan usus. (Nunung, 2009).

Dengan menghitung angka, Enkin (2000) menyatakan bahwa resiko mengalami seksio darurat untuk kondisi akut serius dalam persalinan (Misalnya gawat janin, perdarahan antepartum atau prolaps tali pusat) adalah 2,7% atau 30 kali lebih sering dari ruptur uteri pada kelahiran pervaginam yang direncanakan setelah seksio sesarea sebelumnya. (Chapman, 2006: 174).

Resiko untuk wanita yang mengalami seksio sesarea berulang adalah peningkatan angka morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan seksio sesarea sebagai operasi abdomen mayor. Penyebab morbiditas dan mortalitas mencakup resiko anesthesia, cedera pada kandung kemih dan usus yang terjadi karena tidak hati-hati, perdarahan, infeksi luka dan peningkatan masalah pernapasan pada bayi baru lahir. (Varney, 2007: 780).

Adapun faktor-faktor yang berhubungan atau yang merupakan indikasi dilakukan seksio sesarea yaitu faktor ibu seperti panggul sempit absolut, tumor-tumor jalan lahir, plasenta previa, disproporsio sefalopelvik, dll. Sedangkan faktor janin, seperti kelainan letak dan gawat janin. (Wiknjosastro, 2007: 133-134).

Mengingat bahaya yang ditimbulkan, maka menghindari persalinan melalui seksio sesarea adalah penting, untuk itu perlu diperhatikan faktor-faktor risiko yang kiranya semakin meningkatkan kejadian seksio sesarea tersebut, sehingga dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut diharapkan ibu yang sedang hamil dan terutama memiliki risiko untuk menjalani persalinan

melalui seksio sesarea dapat lebih menjaga dan memelihara kesehatan diri dan kandungannya utamanya melalui pelayanan kesehatan yang optimal. (Nunung, 2009).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umur ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
2. Bagaimana gambaran paritas ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
3. Bagaimana gambaran indikasi ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
4. Bagaimana gambaran pekerjaan ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Memperoleh gambaran karakteristik ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

2. Tujuan Khusus

a. Memperoleh gambaran umur ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

b. Memperoleh gambaran paritas ibu bersalin dengan seksio sesarea di

RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

- c. Memperoleh gambaran indikasi ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.
- d. Memperoleh gambaran pekerjaan ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program baik di Departemen Kesehatan maupun pihak RSIA Siti Fatimah Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Memberikan konfirmasi ilmiah tentang faktor-faktor resiko seksio sesarea pada ibu bersalin.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang pendidikan program Diploma Tiga Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
- b. Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang seksio sesarea.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Definisi Persalinan

- a. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke jalan lahir. (Sumarah, 2008: 98).
- b. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, sehingga janin masuk ke dalam jalan lahir. (Saifuddin, 2006: 100).
- c. Persalinan adalah peristiwa keluarnya janin dari uterus. (Widjanarko, 2009).
- d. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. (Wiknjosastro, 2005: 865).

2. Karakteristik Persalinan Normal

- a. Persalinan kala I : Mulai saat inpartu sampai dilatasi lengkap.
- b. Persalinan kala II : Mulai dilatasi lengkap sampai janin lahir.
- c. Persalinan kala III : Kala pengeluaran plasenta.
- d. Persalinan kala IV : 2 jam pasca persalinan. (Widjanarko, 2009).

3. Tanda-Tanda Persalinan

- a. Perubahan serviks, kepastian persalinan dapat ditentukan hanya jika serviks secara progresif menipis dan membuka.

- b. Kontraksi yang cukup dan adekuat, kontraksi dianggap adekuat jika :
- 1) Kontraksi terjadi teratur, minimal 3 kali dalam 10 menit, setiap kontraksi berlangsung sedikit 40 detik.
 - 2) Uterus mengeras selama kontraksi, sehingga tidak bisa menekan uterus dengan menggunakan jari tangan. (Sumarah, 2008: 100).

4. Penatalaksanaan Persalinan Normal

Faktor yang perlu dinilai dan dicatat dalam persalinan :

- a. Waktu terjadinya kontraksi uterus pertama kali, frekuensi kontraksi uterus, keadaan selaput ketuban, riwayat perdarahan atau gangguan pada gerakan janin.
- b. Riwayat alergi, medikasi, saat makan terakhir.
- c. Tanda vital ibu, protein urine dan glukosa serta pola kontraksi uterus.
- d. Denyut jantung janin, presentasi dan tafsiran berat janin.
- e. Keadaan selaput ketuban, dilatasi dan pendataran serviks dan derajat penurunan bagian terendah janin melalui pemeriksaan dalam (Vaginal Toucher) kecuali bila terdapat kontraindikasi melakukan VT (perdarahan antepartum). (Rusda, 2004).

B. Tinjauan Umum Tentang Seksio Sesarea

1. Definisi Seksio Sesarea

Ada beberapa pengertian mengenai seksio sesarea, yaitu sebagai berikut:

- a. Seksio sesarea adalah Persalinan melalui pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari Rahim lewat suatu irisan/sayatan pada perut

bagian bawah dan Rahim. (Walley, 2008: 188).

- b. Seksio sesarea adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram. (Wiknjosastro, 2007: 133).
- c. Seksio sesarea adalah persalinan dimana bayi dikeluarkan dari uterus yang intake melalui operasi abdomen. (Hadianto, 2001: 157).
- d. Seksio sesarea adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. (Mansjoer, 2000: 344).
- e. Seksio sesarea adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. (Lestari, 2009).
- f. Seksio sesarea adalah lahirnya janin melalui insisi di dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi). (Cunningham, 2005: 592).
- g. Seksio sesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut. (Ningri, 2009).

Sesuai pengertian di atas maka penulis mengambil kesimpulan, seksio sesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan janin lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus persalinan buatan, sehingga janin dilahirkan melalui perut dan dinding perut dan dinding rahim agar anak lahir dengan keadaan utuh dan sehat.

Antara 20 sampai 25% kehamilan sekarang dilahirkan melalui seksio sesarea. Kurang lebih dua pertiganya dilakukan setelah partus mulai dan

sudah dalam keadaan darurat. (Rayburn, 2001: 191).

Karena seksio sesarea merupakan operasi besar, maka biasanya prosedur ini dilakukan hanya bila ada alasan medis. Bila tidak ada alasan medis bagi seksio sesarea, kelahiran normal lewat vagina merupakan jalan lebih aman bagi ibu dan bayinya. (Whalley, 2005: 188).

Ibu yang melahirkan bayi dengan seksio dianjurkan untuk tidak mengandung kembali kurang dari 18 bulan dari tindakan seksio. Karena mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya robekan rahim. Dimana kemungkinan rahimnya robek adalah sebesar tiga kali lipat dibandingkan mereka yang menunggu lebih lama sebelum melaahirkan kembali. Hal ini karena belum selesainya penyembuhan luka rahim karena operasi seksio yang pertama. (Maulana, 2008: 188).

2. Etimologi Seksio Sesarea

Ada beberapa unsur yang dapat menjelaskan asal kata "caesar".

- a. Istilah dapat diambil dari kata kerja bahasa Latin *caedere* yang berarti "membedah". Dengan demikian "seksio sesarea" menjadi gaya bahasa retorik.
- b. Istilah yang mungkin diambil dari pemimpin Romawi kuno Julius Caesar yang disebut-sebut dilahirkan dengan metode tersebut. Dalam sejarah, hal ini sangat tidak memungkinkan karena ibunya masih hidup ketika ia mencapai usia dewasa (seksio sesarea tidak mungkin dilakukan pada masa tersebut terkait dengan teknologi yang tidak mendukung), tetapi legenda tersebut telah bertahan sejak abad ke-2 SM.

c. Hukum Romawi yang menjelaskan bahwa prosedur tersebut perlu dilakukan pada ibu hamil yang meninggal untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Hal ini dikenal dengan istilah *lex caesarea*, sehingga hukum Romawi mungkin menjadi asal usul istilah ini.

Secara umum, istilah "seksio sesarea" merupakan gabungan dari hal-hal tersebut di atas. Kata kerja *caedo* dalam kalimat *a matre caesus* ("membedah ibunya") digunakan pada masa Romawi untuk mendeskripsikan operasi tersebut. (Lestari, 2009).

3. Sejarah Seksio Sesarea

Pada 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan seksio sesarea, ibunya Marjorie Bruce, kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat dari seksio sesarea adalah di Siegershausen, Swiss tahun 1500: Jacob Nufer, seorang pedagang babi, harus membedah istrinya setelah proses persalinan yang lama. Prosedur seksio sesarea di waktu lampau mempunyai angka kematian yang tinggi. Di Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat seksio sesarea pada 1865 adalah 85%. (Lestari, 2009).

Beberapa penemuan yang membantu menurunkan angka kematian antara lain :

- a. Pengembangan prinsip-prinsip aseptis.
- b. Pengenalan prosedur penjahitan rahim oleh Max Sänger pada 1882. Perkembangan metode penjahitan rahim dengan benang untuk menghentikan perdarahan.

- c. Extrapertoneal seksio sesarea dilanjutkan dengan sayatan mendatar rendah.
- d. Perkembangan teknik anestesi. Anestesi umum mempunyai pengaruh depresif pada pusat pernapasan janin, sehingga kadang-kadang bayi lahir dalam keadaan apneu yang tidak dapat diatasi dengan mudah. Selain itu ada pengaruh terhadap tonus uterus, sehingga kadang- timbul perdarahan post partum karena atonia uteri. Anestesi spinal aman buat janin akan tetapi selalu ada kemungkinan bahwa tekanan darah penderita menurun dengan akibat yang buruk bagi ibu dan janin. Cara yang aman adalah anestesi lokal, akan tetapi tidak selalu dapat dilakukan berhubung dengan sikap mental penderita.
- e. Transfusi darah. Pada umumnya perdarahan pada seksio sesarea lebih banyak dibandingkan dengan persalinan pervaginam. Perdarahan tersebut disebabkan oleh insisi pada uterus, ketika pelepasan plasenta, mungkin juga karena terjadinya atonia uteri postpartum. Berhubung dengan itu pada tiap seksio sesarea perlu diadakan persediaan darah.
- f. Antibiotik. Walaupun pemberian antibiotika sesudah seksio sesarea elektif dapat dipersoalkan, namun pemberiannya dianjurkan. (Wiknjosastro, 2005: 865-866).

Pada 5 Maret 2000, Inés Ramírez melakukan seksio sesarea pada dirinya sendiri dan berhasil mempertahankan nyawanya dan juga bayinya, Orlando Ruiz Ramírez. Ia dipercaya sebagai satu-satunya wanita yang melakukan seksio sesarea pada dirinya sendiri. (Lestari, 2009).

4. Jenis-Jenis Seksio Sesarea

Menurut Mochtar (1998), arah sayatan operasi seksio sesarea dibagi:

a. Seksio sesarea klasik (Corporal)

Seksio sesarea dilakukan dengan membuat sayatan memanjang pada korpus uteri kira-kira 10 centimeter.

1) Kelebihannya :

- a) Mengeluarkan janin lebih cepat.
- b) Tidak mengakibatkan komplikasi kandung kemih tertarik.
- c) Sayatan bisa di perpanjang proksimal atau distal.

2) Kekurangannya :

- a) Infeksi mudah menyebar secara intra abdominal.
- b) Untuk persalinan selanjutnya sering terjadi ruptur uteri spontan.

b. Seksio sesarea ismika (Profunda)

Seksio sesarea dilakukan dengan membuat sayatan melintang konfak pada segmen bawah rahim (Low Servic Transversal) kira-kira 10 centimeter.

1) Kelebihannya :

- a) Penjahitan luka lebih mudah.
- b) Perdarahan berkurang dibandingkan cara klasik.
- c) Kemungkinan ruptur uteri spontan kecil.

2) Kekurangannya :

Luka dapat melebar kekiri, kekanan sehingga menyebabkan arteri uterine putus sehingga mengakibatkan perdarahan lebih banyak.

(Ningri, 2010).

5. Indikasi Seksio Sesarea

Indikasi dilakukannya seksio sesarea, terbagi menjadi atas:

a. Indikasi ibu

1) Panggul sempit absolut.

Dalam obstetrik yang terpenting bukan panggul sempit secara anatomi melainkan panggul sempit secara fungsional artinya perbandingan antara kepala dan panggul. Kesempitan panggul dibagi sebagai berikut:

- (a) Kesempitan pintu atas panggul.
- (b) Kesempitan bidang tengah panggul.
- (c) Kesempitan pintu bawah panggul.
- (d) Kombinasi kesempitan pintu atas panggul, bidang tengah dan pintu bawah panggul.

Adapun pengaruh panggul sempit pada persalinan:

- (a) Persalinan lebih lama dari biasa.
- (b) Gangguan pembukaan.
- (c) Menggunakan banyak waktu untuk moulage kepala anak.

(Ningri, 2010).

2) Stenosis serviks/vagina.

Stenosis serviks biasa juga disebut dengan penyempitan ruang pada serviks.

3) Plasenta previa

Plasenta previa merupakan plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh

pembukaan jalan lahir (ostium uteri internum). Secara harfiah berarti plasenta yang implantasinya (nempelnya) tidak pada tempat yang seharusnya, yaitu dibagian atas rahim dan menajuhi jalan lahir. Cara deteksinya tentu saja dengan pemeriksaan USG. (Arifin, 2009).

4) Solusio Plasenta

Solusio plasenta merupakan pelepasan plasenta sebagian atau seluruh plasenta pada implantasi normal sebelum janin lahir. Kelainan ini ditandai dengan adanya perdarahan. Klasifikasi berdasarkan tanda klinis dan derajat pelepasan plasenta yaitu:

- (a) Ringan: Perdarahan <200 cc, uterus tidak tegang, belum ada tanda renjatan, janin hidup, pelepasan plasenta $<1/6$ bagian permukaan, kadar fibrinogen plasma >120 mg%.
- (b) Sedang: Perdarahan >200 cc, uterus tegang, terdapat tanda pre renjatan, gawat janin atau janin telah mati, pelepasan plasenta $1/4$ sampai $2/3$ bagian permukaan, kadar fibrinogen plasma 120-150mg%.
- (c) Berat: Uterus tegang dan berkontraksi tetanik, terdapat tanda renjatan, janin mati, pelepasan plasenta bias terjadi $>2/3$ bagian atau keseluruhan.

Pada keadaan solusio plasenta sedang dan berat penanganan dilakukan dengan mengatasi renjatan, memperbaiki anemia, menghentikan perdarahan dan mengosongkan uterus salah satunya dengan tindakan seksio sesarea.

5) Preeklampsia

Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini terjadi pada triwulan ke-3 kehamilan, tetapi biasa terjadi sebelumnya, misalnya mola hidatidosa. Penyebab dari keduanya sampai saat ini belum diketahui.

6) Eklampsia

Eklampsia merupakan preeklampsia yang diikuti dengan kejang-kejang.

7) Riwayat SC

8) Gemelly

Beberapa tahun belakangan kehamilan kembar atau lebih dari satu sedang meningkat. Secara umum, hal ini karena peningkatan penggunaan obat untuk fertilitas (kesuburan), tapi kehamilan kembar juga dikarenakan sebab lainnya, seperti usia ibu saat kehamilan, wanita dengan riwayat persalinan yang sering, wanita yang hamil segera setelah berhenti minum pil KB dan juga lebih tinggi pada orang yang memiliki keturunan atau genetik kembar.

9) Kala II Lama

Kala II dalam persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Adapun tanda dan gejala dari kala II yaitu:

(a) Ibu merasa ingin mengedan bersamaan dengan terjadinya

kontraksi.

- (b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vagina.
- (c) Perineum menonjol.
- (d) Vulva, vagina dan spingter ani membuka.
- (e) Meningkatnya pengeluaran lender bercampur darah.

Apabila terjadi keadaan yang patologis seperti tidak ada kemajuan dalam kala II yang nantinya dapat mengancam jiwa maka harus selalu disampaikan pada ibu dan keluarga bahwa persalinan ini harus diakhiri dengan tindakan operatif yaitu seksio sesarea.

10) Primi tua

Umur terbagi menjadi:

- (a) Umur muda : <20 tahun (primi muda)
- (b) Umur ideal : 20-34 tahun
- (c) Umur tua : > 35 tahun

Ibu yang hamil terlalu muda, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal. Sebaliknya pada ibu yang terlalu tua, fungsi alat reproduksinya telah mengalami kemunduran. Selain itu, pada usia tua komplikasi dari kehamilan semakin besar. Hal inilah yang menjadi indikasi medis untuk dilakukannya seksio sesarea. (Wiknjosastro, 2007: 133-134).

11) Serotinus

Kehamilan lewat waktu yang berarti kehamilan yang melampaui usia 292 hari atau 42 minggu dengan gejala kemungkinan komplikasinya. Kehamilan lewat waktu disebut juga sebagai kehamilan serotinus, *prolonged pregnancy*. Penyebab terjadinya kehamilan lewat waktu adalah ketidakpastian tanggal haid terakhir, adanya kelainan kongenital dll.

b. Indikasi janin

1) Kelainan letak (lintang, sungsang, dll)

Gambar kedudukan letak janin dalam uterus dapat berupa letak kepala, sungsang maupun lintang. Sebab terjadinya letak sungsang diantaranya terdapatnya plasenta previa, makrosemia, hidrocefalus, hidramnion, oligohidramnion, keadaan tali pusat yang melilit dan keadaan kehamilan ganda. Penyebab letak lintang sendiri tidak jauh berbeda dengan letak sungsang, dari sudut maternal adanya panggul sempit, multiparitas, kehamilan ganda, hidramnion atau oligohidramnion, serta tumor pada daerah pelvis, prematuritas, kelainan kongenital dan penyakit-penyakit intrauteri adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan otak jika ditinjau dari sisi janin. Seksio sesarea pada kasus ini merupakan tindakan paling aman, khususnya pada bayi aterm.

2) Gawat janin.

Gawat janin dapat diidentifikasi dengan tanda-tanda yaitu Denyut

Jantung Janin (DJJ) kurang dari 100/menit atau lebih dari 180/menit dan air ketuban hijau kental.

3) Bayi terlalu besar

Berat bayi sekitar 4000 gram atau lebih, menyebabkan bayi sulit keluar dari jalan lahir.

6. Keuntungan dan Kekurangan Seksio Sesarea

a. Keuntungan dari seksio sesarea yaitu:

Membuat persalinan menjadi lebih singkat, tidak ada kompresi jalan lahir, tidak ada sepsis dari jalan lahir, menurunkan resiko ruptur uterus setelah riwayat seksio sesarea.

b. Kerugian dari seksio sesarea yaitu:

Kemungkinan merusak kandung kemih dan usus, thrombosis dan emboli, gangguan penyembuhan luka, kekhawatiran terjadinya ruptur pada seksio sesarea berikutnya. (Rabe, 2002: 163).

7. Efek-efek Samping Seksio Sesarea

Seksio sesarea adalah pilihan teraman ketika masalah tertentu muncul. Sebagian wanita berpikir bahwa persalinan akan berjalan lebih cepat dan lebih mudah lewat seksio sesarea, sekalipun tidak ada masalah. Namun, seksio sesarea sebenarnya tidak mudah bagi sang ibu maupun bayinya, seperti yang Anda pikirkan. Ketika Anda dan bayi Anda sehat, kelahiran normal adalah pilihan terbaik. Adapun beberapa resiko yang mungkin muncul dari seksio sesarea:

a. Bagi ibu:

- 1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan anestesi yang digunakan untuk pembedahan.
- 2) Rasa sakit selama beberapa minggu pasca persalinan.
- 3) Resiko infeksi dan kehilangan darah lebih besar daripada kelahiran via vagina.
- 4) Lebih sulit bagi Anda untuk merawat bayi.
- 5) Lebih banyak masalah dengan kehamilan selanjutnya (termasuk masalah untuk hamil kembali dan memiliki plasenta yang sehat).
- 6) Resiko seksio sesarea yang lebih besar untuk persalinan berikutnya.
(Whalley, 2005: 193).

b. Bagi janin

- 1) Gangguan pernapasan

TTNB (*Transient Tachypnea of the New Born*) adalah gangguan pernapasan yang paling sering dikhawatirkan terjadi pada bayi sesar. Gangguan ini terjadi akibat cairan yang memenuhi paru-paru janin selama berada dalam rahim tidak terkompresi mengingat bayi sesar tinggal "terima jadi". Padahal, proses persalinan per vaginam melewati jalan lahir inilah yang memungkinkan cairan yang memenuhi paru-paru semasa janin berada dalam rahim dipompa habis keluar.

Selain itu, proses kompresi juga terjadi berkat kontraksi rahim ibu secara berkala. Kontraksi yang lama-kelamaan semakin kuat ini

akan menekan tubuh bayi, sehingga otomatis cairan dalam paru-parunya ikut keluar. Nah, pada bayi sesar, kedua proses kompresi tadi tidak terjadi dengan sempurna.

2) Rendahnya sistem kekebalan tubuh

Data berdasarkan *evidence base* memang belum ada. Namun pada proses persalinan normal, bayi berpindah dari rahim yang nyaris steril ke lingkungan luar melalui proses yang berlangsung lama dan melibatkan kontraksi selama berjam-jam. Saat lahir pun, mulut bayi tidak tertutup sehingga banyak kuman yang masuk ke dalam mulut, bahkan sampai ke pencernaan. Imbasnya, bayi mengalami kontak alami dengan mikroba floral dalam jalan lahir ibunya yang kemudian berkoloni di ususnya. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pematangan sistem kekebalan tubuhnya.

3) Rentan alergi

Baik dari kondisi "kotor" di jalan lahir yang tidak dilalui si bayi yang dilahirkan secara sesar, maupun tertundanya pemberian ASI sesegera mungkin, membuat risiko alergi pada bayi jadi lebih tinggi. Belum lagi paparan antibiotik yang biasanya diberikan kepada bayi sesar sebagai langkah berjaga-jaga dari kemungkinan infeksi, juga meningkatkan risiko alergi.

4) Emosi cenderung rapuh

Meski belum terbukti melalui penelitian ilmiah, kondisi psikologis bayi sesar diduga cenderung lebih rapuh dibanding bayi

yang dilahirkan secara normal. Faktanya, bayi yang lahir normal memang dihadapkan pada kondisi tidak nyaman dimana ia harus melewati jalan lahir yang sempit dan berliku disertai tekanan hebat akibat kontraksi rahim. Perjuangan inilah yang diyakini dapat melatih mental si kecil sejak dini. Boleh jadi faktor ini memberi kontribusi tersendiri terhadap kepribadian si anak kelak.

Akan tetapi pola asuh yang diberikan orangtua dan bagaimana pengaruh lingkungan terbukti lebih ikut memberi warna apakah seseorang lebih tahan banting atau tidak ketika menghadapi stres kehidupan.

5) Terpengaruh anestesi

Kondisi ini mungkin saja terjadi. Karenanya, tim dokter yang terdiri dari dokter kebidanan dan kandungan, dokter anak, dan dokter anestesi harus berhitung secermat mungkin agar pembiusan pada bayi berpengaruh seminim mungkin. Untuk itu, umumnya anestesi yang digunakan adalah anestesi spinal yang berdosisi rendah. Penggunaan bius total membuat bayi terlihat agak ngantuk karena dikeluarkan saat masih di bawah pengaruh anestesi.

6) Minim peluang IMD

Bayi sesar kurang mendapatkan kesempatan untuk menjalani IMD alias inisiasi menyusui dini. Ini karena kondisi bayi sesar berbeda dari kondisi bayi lahir normal yang bisa langsung ditempelkan di dada ibunya dengan refleks yang cukup kuat untuk mencapai payudara ibu.

Sementara pada seksio sesarea, hal yang tak bisa segera dilakukan mengingat bayi biasanya langsung dipasang infus dan selang oksigen guna membantu pernapasannya. Si ibu pun umumnya masih dalam keadaan "teler" akibat pengaruh obat anestesi. (Alaudine, 2009).

8. Komplikasi Seksio Sesarea

a. Pada ibu

Telah dikemukakan bahwa dengan kemajuan teknik pembedahan. Dengan adanya antibiotika, dan dengan persediaan darah yang cukup, seksio sesarea sekarang jauh lebih aman daripada dahulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi morbiditas dan mortalitas pembedahan ialah kelainan atau gangguan yang menjadi indikasi untuk melakukan pembedahan, dan lamanya persalinan berlangsung. Tentang faktor pertama, niscaya seorang wanita dengan plasenta previa dan perdarahan banyak memikul resiko yang lebih besar daripada seorang wanita lain yang mengalami seksio sesarea elektif karena disproporsi sefalopelvik. Demikian pula makin lama persalinan berlangsung, makin meningkat bahaya infeksi postoperatif, apalagi ketuban pecah. Komplikasi-komplikasi yang bisa timbul ialah sebagai berikut:

1) Infeksi puerperal.

Komplikasi ini bisa bersifat ringan, seperti kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas; atau yang bersifat berat, seperti peritonitis, sepsis, dan sebagainya. Infeksi *postoperative* terjadi apabila sebelum pembedahan sudah ada gejala-gejala infeksi

intrapartum atau ada faktor-faktor yang merupakan predisposisi terhadap kelainan itu (partus lama khususnya setelah ketuban pecah, tindakan vaginal sebelumnya).

Bahaya infeksi sangat diperkecil dengan pemberian antibiotika, akan tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali; terutama seksio sesarea klasik dalam hal ini lebih berbahaya daripada seksio sesarea transperitonealis profunda.

2) Perdarahan

Perdarahan banyak bisa timbul pada waktu pembedahan jika cabang-cabang arteri uteri ikut terbuka atau karena atonia uteri.

3) Komplikasi-komplikasi lain seperti luka kandung kencing, embolisme paru-paru dan sebagainya sangat jarang terjadi.

4) Suatu komplikasi yang baru kemudian tampak ialah kurang kuatnya parut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi ruptur uteri. Kemungkinan peristiwa ini lebih banyak ditemukan sesudah seksio sesarea klasik.

b. Pada Anak

Seperti halnya pada anak yang dilahirkan dengan seksio sesarea banyak tergantung dari keadaan yang menjadi alasan untuk melakukan seksio sesarea. (Wiknjosastro, 2005: 870).

C. Tinjauan Tentang Variabel Penelitian

1. Umur Ibu

Umur adalah lamanya waktu hidup sejak dilahirkan sampai waktu ia datang ke rumah sakit yang dihitung berdasarkan tanggal kelahirannya dan dinyatakan dalam tahun. Umur seorang merupakan hal penting sebab umur mempunyai hubungan dengan tingkat keterpaparan dan besarnya resiko. Umur ibu yang terlalu mudah (< 20 tahun) atau terlalu tua (> 35 tahun) mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan persalinan karena ibu yang hamil terlalu mudah, pertumbuhan alat-alat reproduksinya belum terlalu matang, sedangkan ibu yang hamil pada umur yang terlalu tua fungsi alat reproduksinya mengalami kemunduran. Hal inilah yang menjadi indikasi untuk dilakukannya seksio sesarea.

2. Paritas

Paritas merupakan jumlah persalinan yang pernah dialami seorang ibu. Paritas yang terlalu tinggi dan jarak kehamilan yang terlalu dekat akan mempengaruhi kondisi ibu dan janin. Hal ini dapat diterangkan bahwa setiap kehamilan yang disusul persalinan akan menyebabkan kelainan-kelainan pada uterus. Oleh karena itu, seksio sesarea pada keadaan tersebut dapat dipertimbangkan.

3. Indikasi Seksio Sesarea

Berbagai indikasi yang ada pada ibu dan janin yang dikandungnya menentukan apakah seksio sesarea dapat dilakukan atau tidak yaitu berupa

indikasi medis. Indikasi dilakukannya seksio sesarea, terbagi menjadi atas:

- a. Panggul sempit absolut
- b. Stenosis serviks/vagina
- c. Plasenta previa
- d. Solusio plasenta
- e. Preeklampsi
- f. Eklampsi
- g. Riwayat SC sebelumnya
- h. Gemelly
- i. Kala II memanjang
- j. Primi tua
- k. Serotinus
- l. Gawat janin
- m. Kelainan letak/situs janin (lintang, sungsang, dll).

4. Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Adapun Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan ibu sehari-hari yang tercatat pada kartu status.

D. Tinjauan Menurut Pandangan Islam

Manusia adalah makhluk Allah Swt, yang diciptakan melalui proses sunnatullah, yakni: Berasal dari air yang terpecar yang keluar dari laki-laki dan perempuan lalu terjadi pertemuan diantara keduanya, sehingga membuahkan janin, lalu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging dan tulang belulang akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Faathir/35: 11 yaitu:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menciptakan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan), dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfush). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Begitupun dalam Q.S. An-Nahl/16: 78 yang menjelaskan tentang persalinan dengan ayat sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ بَصَرًا وَأَلْفِيدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahan:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt selain menciptakan manusia dalam beberapa proses, Allah Swt juga menjadikan bagi manusia beberapa instrumen berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Instrumen tersebut menjadi amanah yang besar disisi Allah Swt, sebab harus digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan ini, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Swt.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Saat ini prosedur seksio sesarea merupakan salah satu alternatif yang sering dilakukan dibidang kedokteran obstetrik dan ginekologi dalam pelaksanaan kelahiran, terutama bila terdapat komplikasi, misalnya *cephalo pelvic disproportion* (CPD), *fetal distress*, distosia karena kelainan tenaga ibu yang melahirkan, atau ibu dengan penyakit jantung. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kemajuan kedokteran anestesi, peningkatan strata perekonomian, maka seksio sesarea trend saat ini.

Pada penatalaksanaan ibu melahirkan angka operasi semakin naik, dan ini bila dikaitkan dengan angka pelayanan pemantauan ibu hamil (*antenatal care/ANC*), merupakan gagalnya ANC. Pada masyarakat seksio sesarea ini banyak dilakukan dengan dipertimbangkan dalam bidang medis misalnya, umur ibu, paritas, indikasi baik pada ibu maupun pada janin, namun banyak factor yang juga ikut berperan, antara lain: sosial ekonomi, ingin bebas dari rasa sakit, rasa nyaman, dan mungkin ini menjadi fenomena sosial dalam proses melahirkan saat ini.

Karakteristik-karakteristik tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Umur ibu

Umur adalah lamanya waktu hidup sejak dilahirkan sampai waktu ia datang

ke rumah sakit yang dihitung berdasarkan tanggal kelahirannya dan dinyatakan dalam tahun. Umur seorang merupakan hal penting sebab umur mempunyai hubungan dengan tingkat keterpaparan dan besarnya resiko. Umur ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) atau terlalu tua (lebih 35 tahun) mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan persalinan, karena ibu yang hamil terlalu muda, pertumbuhan alat-alat reproduksinya belum terlalu matang, sedangkan ibu yang hamil pada umur yang terlalu tua fungsi alat reproduksinya mengalami kemunduran. Hal inilah yang menjadi indikasi untuk dilakukannya seksio sesarea.

2. Paritas

Paritas merupakan jumlah persalinan yang pernah dialami seorang ibu. Paritas yang terlalu tinggi dan jarak kehamilan yang terlalu dekat akan mempengaruhi kondisi ibu dan janin. Hal ini dapat diterangkan bahwa setiap kehamilan yang disusul persalinan akan menyebabkan kelainan-kelainan pada uterus. Oleh karena itu, seksio sesarea pada keadaan tersebut dapat dipertimbangkan.


3. Indikasi seksio sesarea

Berbagai indikasi yang ada pada ibu dan janin yang dikandungnya menentukan apakah seksio sesarea dapat dilakukan atau tidak, yaitu berupa indikasi medis.


4. Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan ibu sehari-hari yang tercatat pada kartu status.

B. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti



Keterangan:



C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Seksio Sesarea

Seksio sesarea merupakan persalinan melalui pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim lewat suatu irisan/sayatan pada perut bagian bawah dan rahim.

Kriteria objektif

Sesarea : Jika ibu mengalami seksio sesarea berdasarkan catatan pada buku status.

Normal : Jika ibu tidak mengalami seksio sesarea berdasarkan catatan pada buku status.

2. Umur ibu

Umur ibu pada penelitian ini adalah umur ibu ketika melahirkan yang dilihat berdasarkan catatan pada buku status.

Kriteria objektif

a. Umur muda : < 20 tahun (primi muda)

b. Umur ideal : 20-34 tahun

c. Umur tua : 35 tahun.

3. Paritas

Paritas ibu pada penelitian ini adalah jumlah persalinan yang pernah dialami ibu, baik bayi meninggal maupun masih hidup yang tercatat dalam buku status.

Kriteria objektif

a. Paritas 0 : Belum pernah melahirkan

b. Paritas 1 : Jumlah anak yang telah dilahirkan adalah 1

c. Paritas 2 : Jumlah anak yang telah dilahirkan adalah 2 atau lebih.

4. Indikasi seksio sesarea

Indikasi medis seksio sesarea adalah kriteria dalam bidang kedokteran obstetrik dan ginekologi untuk dilakukan seksio sesarea. Dalam penelitian

ini yang dimasukkan dalam indikasi medis untuk seksio sesarea, antara lain:

- a. Panggul sempit absolut
 - b. Stenosis serviks/vagina
 - c. Plasenta previa
 - d. Solusio plasenta
 - e. Preeklamsi
 - f. Eklamsi
 - g. Riwayat SC sebelumnya
 - h. Gemelly
 - i. Kala II memanjang
 - j. Primi tua atau muda
 - k. Serotinus
 - l. Gawat janin
 - m. Kelainan letak/situs janin (lintang, sungsang, dll)
5. Pekerjaan
- Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan ibu sehari-hari yang tercatat pada kartu status.
- Kriteria objektif
- a. Ibu rumah tangga
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - c. Pegawai swasta/wiraswasta.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar yang bertempat di Jl. Gunung Merapi No.75 dengan alasan RSIA Siti Fatimah merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Rumah Sakit pendidikan yang memiliki Rekam Medik yang lengkap.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2010.

C. Populasi dan Sampul

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang bersalin di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yaitu sebanyak 4321 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yaitu sebanyak 498 orang..

D. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel untuk tujuan tertentu dengan kriteria ibu bersalin dengan seksio sesarea, yang memiliki kelengkapan data yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* dalam penelitian ini adalah ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan tabel.

F. Analisis Data

Keseluruhan data diolah secara manual untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan rumus persentasi yaitu:

$$P = f/N \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Presentase data yang dicari

f : Jumlah pengamatan

N : Jumlah populasi

Berdasarkan uraian diatas tentang metode penelitian, maka akan dibahas mengenai hasil penelitian pada bab selanjutnya.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian selama dua minggu mengenai gambaran karakteristik ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009, maka diperoleh sampel sebanyak 498 orang.

Dari hasil penelitian, terdapat 538 orang yang terdaftar di rekam medis, namun terdapat data sebanyak 40 orang yang tidak lengkap, sehingga sampel yang diteliti hanya sebanyak 498 orang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Tabel 5.1
Distribusi Umur Terhadap Kejadian Seksio Sesarea
di RSIA Siti Fatimah Makassar
Tahun 2009

Umur (Tahun)	N	f(%)
< 20 Tahun	29	5,82
20-34 Tahun	358	71,89
35 Tahun	111	22,29
Jumlah	498	100%

Sumber : Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar 2009.

Dari tabel 5.1, tampak ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang tertinggi adalah pada kelompok umur 20-34 tahun yaitu sebanyak 358 kasus (71,89%).

Tabel 5.2
Distribusi Paritas Terhadap Kejadian Seksio Sesarea
di RSIA Siti Fatimah Makassar
Tahun 2009

Paritas	N	f(%)
P 0	314	63,05
P 1	35	7,03
P 2	149	29,92
Jumlah	498	100%

Sumber : Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar 2009.

Dari tabel 5.2, tampak ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang tertinggi adalah pada kelompok paritas 0(P 0) sebanyak 314 orang (63,05%).

Tabel 5.3
Distribusi Indikasi Terhadap Kejadian Seksio Sesarea
di RSIA Siti Fatimah Makassar
Tahun 2009

Indikasi	N	f(%)
Riwayat SC	105	21,08%
Kelainan Letak	63	12,65%
CPD	45	9,04%
Preeklamsi	42	8,43%
Plasenta Previa	42	8,43%
Gawat Janin	41	8,23%
Kala II Lama	38	7,63%
KPD	27	5,42%
Anak Besar	21	4,22%
Primi Tua	14	2,81%
Gemelly	12	2,42%
Oligohiramnion	11	2,21%
Anak Mahal	9	1,81%
APS	8	1,61%
Oedema Portio	7	1,41%
Serotinus	6	1,20%
Gagal Induksi	3	0,60%
Eklamsi	3	0,60%
Solusio Plasenta	1	0,20%
Jumlah	498	100%

Sumber : Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar 2009.

Dari tabel 5.3, tampak ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang tertinggi adalah riwayat SC sebelumnya yaitu sebanyak 105 orang (21,08%), disusul kelainan letak sebanyak 63 orang (12,65%).

Tabel 5.4
Distribusi Pekerjaan Terhadap Kejadian Seksio Sesarea
di RSIA Siti Fatimah Makassar
Tahun 2009

Pekerjaan	N	f(%)
IRT	475	95,38%
Swasta	13	2,62%
PNS	10	2%
Jumlah	498	100%

Sumber : Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar 2009.

Dari tabel 5.4, tampak ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang tertinggi adalah ibu rumah tangga sebanyak 475 orang (95,38%).

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian mengenai gambaran karakteristik ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA St Fatimah Makassar Tahun 2009, maka hasilnya dapat dibahas berdasarkan variabel yang diteliti.

1. Umur Ibu

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 498 orang yang seksio sesarea yang paling banyak terjadi pada kelompok usia reproduksi (20-34 tahun) yaitu sebanyak 358 kasus (71,89%).

Menurut peneliti, hal tersebut disebabkan karena ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga

kebanyakan orang tua tidak menikahkan anaknya pada usia < 20 tahun dan meningkatnya pengetahuan wanita tentang hamil pada usia > 35 tahun karena termasuk risiko tinggi untuk hamil dan bersalin.

Terdapat kesesuaian antara teori dan hasil penelitian, dimana teori mengatakan bahwa risiko tinggi untuk hamil yaitu < 20 tahun dan > 35 tahun. Dimana dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman dalam kehamilan, persalinan dan kelahiran adalah pada umur 20-34 tahun.

Dari hasil penelitian, umur 20-34 tahun banyak terjadi seksio sesarea yang disebabkan karena adanya riwayat seksio sesarea sebelumnya setelah itu disebabkan karena kelainan letak. Sebab terjadinya kelainan letak seperti letak sungsang diantaranya terdapatnya plasenta previa, makrosemia, hidrosefalus, hidramnion, oligohidramnion, keadaan tali pusat yang melilit dan keadaan kehamilan ganda. Sedangkan penyebab letak lintang sendiri tidak jauh berbeda dengan letak sungsang, dari sudut maternal adanya panggul sempit, multiparitas, kehamilan ganda, hidramnion atau oligohidramnion, serta tumor pada daerah pelvis, prematuritas, kelainan kongenital dan lain-lain. (Wiknjastro 2007, 133).

Pada remaja wanita (<20 tahun) merupakan populasi risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan. Penyulit ini terjadi karena para remaja biasanya masih tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kebutuhan kalori yang lebih besar dari wanita yang lebih tua. Sebagai akibatnya, mortalitas dan morbiditas prenatal dan maternal sangat tinggi pada remaja wanita hamil disbanding dengan wanita pada usia 20-an. (Hamilton. 2000:

28).

Hal ini membuktikan bahwa setiap wanita hamil mempunyai risiko komplikasi dan harus mempunyai akses terhadap asuhan ibu bersalin yang berkualitas. Sebagai petugas kesehatan mendeteksi dan menatalaksana komplikasi medis, bedah ataupun obstetri selama kehamilan sangat penting dalam mengembangkan persiapan persalinan dan rencana kesiagaan dalam menghadapi komplikasi. Dalam obstetri modern terdapat pengertian Potensi Risiko, dimana suatu kehamilan dan persalinan selalu dapat menyebabkan kemungkinan adanya risiko rendah maupun risiko tinggi akan terjadi kematian. (Kharisma, 2008).

2. Paritas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 498 kasus seksio sesarea, yang paling banyak terjadi pada kelompok paritas 0 (P 0) atau nullipara yaitu sebanyak 314 kasus (63,05%). Dibandingkan dengan ibu yang paritas tinggi sebanyak 149 orang (29,92%).

Pada paritas 0 atau biasa disebut primigravid atau primipara, dimana seorang ibu belum pernah melahirkan atau kehamilan pertama. Angka seksio sesarea lebih banyak ditemukan pada primigravid karena primigravid berisiko tinggi terhadap partus tak maju maupun hipertensi dalam kehamilan. Hal ini sesuai dengan penelitian di Amerika tahun 1991, wanita primipara pada semua umur memiliki komplikasi baik pada kehamilan maupun proses persalinan dan angka seksio sesarea lebih tinggi daripada wanita multipara. (<http://www.findarticles.com>).

3. Indikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 498 orang seksio sesarea, yang paling banyak terjadi pada riwayat SC sebelumnya yaitu sebanyak 21,08%, disusul kelainan letak sebanyak 12,65%.

Menurut Enkin (2000) menyatakan bahwa ibu yang menjalani tiga atau lebih seksio sesarea sebelumnya hanya mengalami peningkatan resiko pemisahan asimtomatik jaringan parut uterus. Ibu yang pernah menjalani seksio sesarea, yang berikutnya memilih kelahiran pervaginam, memiliki kemungkinan 0,09% sampai 0,8% mengalami ruptur jaringan parut. Tetapi faktanya, ada beberapa kontraindikasi untuk mencoba persalinan, dimana faktor-faktor yang tampaknya membawa resiko ruptur bermakna meliputi insisi tidak diketahui, klasik atau vertikal rendah atau ibu sebelumnya menjalani histerektomi, atau dipakainya teknik penutupan jahitan tunggal. (Chapman, 2006: 146-147).

Menurut Wikjonosastro (2000) bahwa indikasi dari janin dilakukannya seksio sesarea diantaranya adalah gawat janin, kelainan letak, kelainan tali pusat, mengingat risiko kematian janin yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Roeshadi RH tahun 2000 di RSIA Rosiva Medan bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea tertinggi 21,7% berdasarkan faktor janin adalah letak sungsang.

4. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea tertinggi 95,38% dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan proporsi terendah 2% dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini bukan merupakan indikasi keterkaitan pekerjaan dengan seksio sesarea atau tidak ada hubungan seksio sesarea dengan pekerjaan, namun hanya menunjukkan jumlah kunjungan ibu yang mengalami persalinan dengan seksio sesarea yang mayoritas sebagai ibu rumah tangga.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran karakteristik ibu bersalin dengan seksio sesarea, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang terbanyak pada kelompok usia reproduksi sehat (20-34 tahun) yaitu sebanyak 358 orang (71,89%).
2. Ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 yang terbanyak didapatkan pada kelompok paritas 0(P 0) sebanyak 314 orang (63,05%).
3. Ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 berdasarkan indikasinya yang terbanyak adalah riwayat seksio sesarea sebanyak 105 orang (21,08%), disusul kelainan letak sebanyak 63 orang (12,65%).
4. Ibu bersalin dengan seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 berdasarkan pekerjaannya yang terbanyak adalah pada kelompok ibu rumah tangga sebanyak 475 orang (95,38%).

B. SARAN

1. Mengingat kecenderungan tingginya angka seksio sesarea di RSIA Siti Fatimah Makassar, maka perlu kiranya memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care pada ibu-ibu hamil utamanya bagi ibu hamil dengan seksio sesarea sebelumnya demi kesehatan ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi baik saat kehamilan maupun persalinan.
2. Diharapkan adanya fasilitas pelayanan dan pemeriksaan penunjang yang memadai dan dapat menjangkau pusat-pusat kesehatan masyarakat sehingga dapat dilakukan deteksi dini penyakit pada kehamilan ibu baik bagi kelompok resiko rendah maupun tinggi pada kehamilannya.
3. Diharapkan bagi pihak kelengkapan dan keseragaman pengisian data pada status penderita diperhatikan untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan tentang keadaan ibu-ibu melahirkan secara seksio sesarea sehingga didapatkan data yang lebih akurat mengenai beberapa faktor yang menjadi indikasi dilakukannya seksio sesarea.
4. Diharapkan kepada pihak rumah sakit mempertimbangkan indikasi seksio sesarea agar dapat dihindarkan persalinan seksio sesarea yang tanpa indikasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaudine. 2009. *Risiko Bayi Dilahirkan*. <http://hazzanstudio-blogspot.com>. Diakses tanggal 08 April 2010.
- Anita. 2009. *Info Seksio sesarea*. <http://www.idi.com>. Diakses tanggal 27 Maret 2010.
- Arifin. 2009. *Plasenta Previa*. <http://www.plasenta-previa.pdf>. Diakses 17 April 2010.
- Aris. 2008. *Plus Minus Melahirkan secara Caesar*. <http://www.stasiunbidan.com>. Diakses tanggal 08 April 2010.
- Asse, Ambo. 2006. *Sebuah Pengantar Memahami Islam Sebagai Agama*. Makassar: Daar al Hikmah wa al Uluum. Hal: 54.
- Chapman, Vicky. 2006. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*. Jakarta: EGC. Hal: 174.
- Cunningham, F. G, et al. 2005. *Obstetri Williams*, Ed. 21, Vol. 1; Jakarta: EGC. Hal: 592.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus sunnah. Hal: 697.
- Hadianto. 2001. *Dasar-Dasar Obstetri dan Ginekologi*. Ed. 6; Jakarta: Hipokrates. Hal: 152-157.
- Hamilton PM. 2000. *Dasar-Dasar Perawatan Maternitas*. Jakarta: EGC. Hal: 28.
- Johnson, Ruth. 2004. *Buku Ajar Praktek Kebidanan*. Cet. I; Jakarta: EGC. Hal: 358.
- Kharisma, Dara. 2008. *Antenatal Care*. <http://www.Blogger Hadijanto.com>. Diakses tanggal 27 Maret 2010.
- Kiki. 2009. *Seksio Sesarea dan Kuretase*. <http://medicom.blogdetik.com>. Diakses tanggal 07 April 2010.
- Lestari. 2009. *Bedah Caesar*. <http://id.Wikipedia.com>. Diakses tanggal 7 April 2010.

- Mansjoer, Arif. 2000. *Kapita Selekta Kedokteran*. Ed. 3, Cet. I; Jakarta: Media Aesculapius. Hal: 344.
- Manuaba, I.B.G. 2002. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC. Hal: 277.
- Maulana, Mirza. 2008. *Penyakit Kehamilan dan Pengobatannya*. Jogjakarta: Katahati. Hal: 188-189.
- Ningri. 2009. *Askep Sectio Panggul Sempit*. <http://rusari.com>. Diakses tanggal 07 April 2010.
- Nunung. 2009. *Seputar Sectio Caesaria*. <http://himapid.blogspot.com>. Diakses tanggal 27 Maret 2010.
- Rabe, Thomas. 2002. *Buku Saku Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Hipokrates. Hal: 163.
- Rayburn, Williams F. 2001. *Obstetri dan Ginekologi*. Cet. I; Jakarta: Widya Medika. Hal: 191.
- Rusda. 2004. *Anastesi Infiltrasi pada Persalinan*. <http://www.ellimufwordpress.com>. Diakses 17 April 2010.
- Saifuddin. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal*. Ed.I, Cet.IV ; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal: 100.
- Sumarah. 2008. *Perawatan Ibu Bersalin*. Yogyakarta: Fitramaya. Hal: 98-100.
- Varney, Helen. 2007. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Ed.4, Vol. 2; Jakarta: EGC. Hal: 780.
- Whalley, Janet. 2008. *Panduan Praktis bagi Calon Ibu kehamilan dan Persalinan*. Cet. II; Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hal: 188.
- Widjanarko, B. 2009. *Pendidikan Klinik Obstetri Ginekologi*. <http://www.gynekeologi.co.id>. Diakses 17 April 2010.
- Wiknjosastro, Hanifa. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Ed.3, Cet.VII; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal: 865-866.
- . 2007. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Ed. 1, Cet. VII; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal: 133-134.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Haryati Ningsih
Nim : 70400007013
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/ 18 Desember 1989
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : - Jl. Minasa Sari 2 Griya Minasa Sari Blok B/3
- Sanrego Desa Tellongeng
Kec : Mare
Kab : Bone
No Ponsel : 081242798987

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Cahaya Sapran Kabupaten Sidrap Tahun 1995.
2. Tamat SD Negeri 12 Pangsid Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Tahun 2001.
3. Tamat SLTP Negeri 1 Mare Kabupaten Watampone Tahun 2004.
4. Tamat SMA Negeri 1 Mare Kabupaten Watampone Tahun 2007.
5. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi D3 Kebidanan Tahun 2007-2010.