



**ASUPAN MAKANAN DAN STATUS GIZI PENDERITA KUSTA RFT  
(RELEASE FROM TREATMENT) DI RT.2 RW.2 KELURAHAN  
TAMALANREA JAYA MAKASSAR**



Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**OLEH:**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**YULIA CICILIA**  
**70 200 10 60 22**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2010**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 31 Agustus

2010

Penyusun,

Yulia Cicilia

Nim : 70200106022



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Asupan Makanan dan Status Gizi Penderita Kusta RFT (Release from Treatment) RT.2 RW.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kilometer 10 Makassar” yang disusun oleh Yulia Cicilia, NIM: 70200106022, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Agustus 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 Agustus 2010 M  
24 Ramadhan 1431 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : DR.dr.Burhanuddin Bahar,MS (.....)

Sekretaris : M.Fais Satrianegara,SKM,MARS (.....)

Penguji I : dr. H.M. Furqaan Naiem, M.Sc.,Ph.D (.....)

Penguji II : Drs. Hamzah Hasan M.HI (.....)

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D  
Nip. 19580404 198903 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi pada Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan yang berjudul “*Asupan Makanan dan Status Gizi Penderita Kusta RFT (Release From Treatment) di RT.2 RW. 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kilometer 10 Makassar*”. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Sebagai manusia biasa, kita hanyalah berusaha dan setiap usaha senantiasa ada ujian dan hambatannya. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang tidak lepas dari hambatan dan rintangan yang akhirnya dapat dilewati oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Suharni dan Ayahanda Mansyur Ahmad, Kakanda Taufiqurrahman, Kakanda Fadhlur Rahman dan Istrinya Yulia Aditama serta Adinda Saadatul Husna. Perhatian, harapan, kasih sayang dan do'a mereka dalam kehidupan penulis senantiasa menjadi pendorong untuk tetap melangkah melanjutkan pendidikan, walaupun penulis menyadari bahwa persembahan penyelesaian tugas akhir ini tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Namun, semoga ini menjadi bekal untuk hari esok dan dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.

Kemudian penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu pembimbing, Bapak DR.dr.Burhanuddin



Bahar,MS selaku Pembimbing I dan Bapak M.Fais Satrianegara,SKM,MARS selaku Pembimbing II, yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan menghasilkan yang terbaik.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan juga berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat FIK UIN Alauddin Makassar.
4. BAPak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D selaku Penguji I dan Bapak Drs. Hamzah Hasan M.HI selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Bapak Kepala Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kesbang Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah mengeluarkan surat izin penelitian dan Ibu Kepala Puskesmas Pattingalloang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.



7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan '06 yang selalu menemani dan memberikan dorongan serta motivasi bagi penulis.
8. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan ide yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis bersimpuh dan berdo'a semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas, terutama mereka yang telah membantu penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Yaa Rabbal Aalamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
Makassar, Agustus 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kusta .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Makanan .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi .....	29
BAB III KERANGKA KONSEP .....	32
A. Dasar Variabel yang Diteliti .....	32
B. Pola Fikir Variabel yang Diteliti .....	34
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	34
BAB IV METODE PENELITIAN .....	37



A. Jenis Penelitian ..... 37

B. Lokasi Penelitian ..... 37

C. Populasi dan Sampel ..... 37

D. Instrumen Penelitian ..... 38

E. Pengumpulan Data ..... 38

F. Pengolahan dan Penyajian Data ..... 39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN







## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel
<b>Tabel 2.1.</b>	Distribusi Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan (perorang/hari).
<b>Tabel 5.1.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
<b>Tabel 5.2.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
<b>Tabel 5.3.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
<b>Tabel 5.4.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Karbohidrat di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
<b>Tabel 5.5.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
<b>Tabel 5.6.</b>	Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Recall Makanan
2. Hasil Pengolahan Data Program SPSS (Statistical Package for the Social Science)
3. Master Tabel
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Surat Keterangan Izin Meneliti dari Kelurahan Tamalanrea Jaya
7. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kelurahan Tamalanrea Jaya
8. Dokumentasi pada saat penelitian.





## ABSTRAK

**Nama** : Yulia Cicilia  
**Jurusan** : Kesehatan masyarakat/Gizi  
**Judul** : **Asupan Makanan dan Status Gizi Penderita Kusta RFT  
(*release from treatment*) di Kelurahan Tamalanrea Jaya RW.  
2 RT. 2 Km. 10 Kota Makassar**

---

Penyakit Kusta termasuk penyakit menular yang penularannya bisa lewat kontak langsung (lewat kulit yang luka) atau lewat droplet yang keluar dari hidung penderita. Penyakit kusta sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan dunia terutama di Negara-negara berkembang antara lain Indonesia. Prevalensi penderita kusta adalah 1 : 1000 penduduk. Laporan resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selama tahun 2008 dari 118 negara dan teritori, prevalensi terdaftar kusta global pada awal tahun 2008 berdiri di 212.802 kasus, sedangkan jumlah kasus baru terdeteksi selama 2007 adalah 254.525 (tidak termasuk sejumlah kecil kasus di Eropa) . Jumlah kasus baru terdeteksi secara global telah menurun 11.100 kasus (penurunan 4%) pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Sementara itu distribusi penderita kusta di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 yaitu jumlah penderita kusta sebanyak 1.597 orang. Penderita kusta yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sebanyak 1.351 orang yang terdiri dari 224 penderita type PB dan 1.127 type MB. Sementara untuk tahun 2008, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 1.148 orang yang terdiri dari 117 penderita type PB dan 1.031.

Di Rumah Sakit Kusta Regional Makassar jumlah kunjungan pasien rawat jalan penderita kusta tahun 2009 sebanyak 27.883 orang dan pasien yang tidak semua berasal dari Makassar. Rawat inap sebanyak 34.894 orang pasien, dan pasien RFT sebanyak 1820 orang, belum lagi yang belum datang berobat yang berarti belum terdaftar. Ini menunjukkan bahwa frekuensi penderita kusta dari tahun ke tahun di Sulawesi Selatan tidak tetap akan tetapi berubah-ubah.

Data dari KPD Tamalanrea (Kelompok Perawatan Diri) kilometer 10 Makassar tahun 2010, jumlah masyarakat yang pernah melalui perawatan kusta (RFT) adalah 77 orang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang asupan makanan dan status gizi penderita kusta RFT.

Tujuan peneliti ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai asupan makanan (energi, karbohidrat, protein dan lemak) dan status gizi penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya RW.2 RT.2 Km. 10 Makassar.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan populasi adalah seluruh penderita kusta RFT di kelurahan Tamalanrea Jaya RW.2 RT.2 Km. 10 Makassar, dan besar sampel ditarik secara *purposive sampling* dengan kriteria sampel adalah penderita kusta RFT yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan bersedia diwawancarai. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa lembar recall makanan, timbangan injak dan



microtise. Kemudian data diolah dengan menggunakan komputerisasi program SPSS versi 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 responden, tidak ada responden yang memiliki asupan energi, karbohidrat, dan lemak yang cukup. Asupan protein responden yang memiliki asupan protein cukup sebanyak 8 orang (26,7%) dan yang kurang sebanyak 22 orang (73,3%). Sedangkan status gizi responden terdapat yang berstatus gizi normal sebanyak 14 (53,3%) dan tidak normal (kurus) sebanyak 16 orang (46,7%).

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada responden untuk lebih memperhatikan kebutuhan asupan makanan yang dapat menunjang kesembuhan dari penyakit itu sendiri dan peran pemerintah dan masyarakat ikut memastikan para penderita kusta agar dapat berobat dengan rutin dan senantiasa dapat mengikuti petunjuk para petugas kesehatan sehingga mempercepat penyembuhannya. Dengan demikian, hidupnya bisa produktif kembali.





## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Arah pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 adalah bagian integral dalam pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan yang telah memperhitungkan dengan seksama berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan memberikan prioritas kepada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat (Rachmat, 2004).

Salah satu program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan adalah pemberantasan dan pencegahan penyakit menular. Penyakit menular yang masih menimbulkan masalah kesehatan masyarakat adalah penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman kusta *Mycobakterium leprae* dan menyerang syaraf tepi, kulit maupun bagian tubuh lainnya (2aeria, 2006 dalam Basariah Hutabarat, 2007).

Penyakit Kusta termasuk penyakit menular yang penularannya bisa lewat kontak langsung (lewat kulit yang luka) atau lewat droplet yang keluar dari hidung penderita. Droplet yang mengandung kuman ini masuk ke dalam saluran nafas calon penderita kusta setelah itu baru menyebar keseluruh tubuh dan kemudian berkembang biak di dalam organ tubuh yang cocok. Setelah masuk ke dalam tubuh calon penderita kusta kuman ini tidak langsung menyebabkan sakit



tapi membutuhkan waktu antara 2,5 bulan – 40 tahun. Sebagian besar orang mempunyai kekebalan alami terhadap penyakit Kusta, jadi manakala kuman ini masuk ke dalam tubuh segera dihancurkan oleh sel darah putih kita. Tapi bila daya tahan tubuh sangat buruk atau malah tidak mempunyai kekebalan sama sekali terhadap penyakit kusta, maka basil lepra akan berkembang biak tanpa kendali ([http://www.berita8.com/penyakit kusta di Indonesia](http://www.berita8.com/penyakit_kusta_di_Indonesia), diakses 5 Juni 2010).

Penyakit kusta sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan dunia terutama di Negara-negara berkembang antara lain Indonesia. Prevalensi penderita kusta adalah 1 : 1000 penduduk. Kusta menyebar luas diseluruh dunia, dengan sebagian besar kasus terdapat di daerah tropis dan subtropis, tetapi dengan adanya perpindahan penduduk maka penyakit biasa menyerang dimana saja. Diseluruh dunia, dua hingga tiga juta orang diperkirakan menderita kusta. Distribusi penyakit kusta dunia pada tahun 2003 menunjukkan India sebagai Negara jumlah penderita terbesar, diikuti oleh Brazil dan Myanmar. Pada tahun 1999 insidensi penyakit kusta di dunia diperkirakan 640.000, pada tahun 2000, 738.284 kasus ditemukan. Pada tahun 1999, 108 kasus terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 2000 WHO membuat daftar 91 Negara endemik kusta. 70% kasus dunia terdapat di India, Myanmar dan Nepal ([http : // 4kesmas4.blogspot.com/2008/makalah kustaku](http://4kesmas4.blogspot.com/2008/makalah_kustaku). diakses 21 juni 2010).

Kusta kebanyakan ditemukan di Afrika Tengan dan Asia Tenggara, dengan angka kejadian di atas 10 per 1.000. Hal ini disebabkan meningkatnya mobilitas penduduk, misalnya imigrasi, pengungsi dan sebagainya. (WHO, 2006)



115 negara dan teritori dalam *Weekly Epidemiological Record*, prevalensi terdaftar kusta pada awal tahun 2006 adalah 219.826 kasus.

Menurut laporan resmi yang diterima selama tahun 2008 dari 118 negara dan teritori, prevalensi terdaftar kusta global pada awal tahun 2008 berdiri di 212.802 kasus, sedangkan jumlah kasus baru terdeteksi selama 2007 adalah 254.525. Jumlah kasus baru terdeteksi secara global telah menurun 11.100 kasus (penurunan 4%) pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006.

Penyakit ini diduga menyebar ke seluruh dunia lewat perpindahan penduduk ini disebabkan karena perang, penjajahan, perdagangan antar benua dan pulau-pulau. Berdasarkan pemeriksaan kerangka-kerangka manusia di Skandinavia diketahui bahwa penderita kusta ini dirawat di Leprosaria secara isolasi ketat. Penyakit ini masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke IV-V yang diduga dibawa oleh orang-orang India yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya dan berdagang.

Kasus penyakit lepra di Indonesia masih tinggi, menduduki peringkat tiga di dunia. Setiap tahun tercatat 17 ribu hingga 20 ribu kasus lepra baru. Itu yang terdeteksi, belum termasuk yang tidak lapor dan tidak diobati (A.B. Susanto, 2009). Jumlah penderita di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Cina yang memiliki penduduk lebih banyak. Kasus lepra barunya hanya 16.500. Dibandingkan negara miskin seperti Nigeria dan Etopia juga masih lebih tinggi, kasus barunya hanya sekitar 4.000-5.000 per tahun.

Penyakit kusta di Indonesia bersifat endemis dengan penyebaran yang tidak merata dan prevalensi tertinggi di daerah Aceh (NAD) dan Indonesia bagian timur. Pada tahun 1990 jumlah penderita kusta yang terdaftar adalah 121.000



orang, tetapi diperkirakan jumlah yang sebenarnya 2-3 kali lebih besar, sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ke tiga di dunia setelah India, Brasil (Paulus dan Matondang, 1997).

Sampai akhir tahun 2002 di Indonesia masih terdapat 13 propinsi dan 111 kabupaten yang belum dapat dieliminasi atau angka prevalensi rate masih diatas 1 per 10.000 penduduk. Distribusi penderita kusta di Indonesia pada tahun 2005 yaitu jumlah penderita 19.986 orang.

Distribusi penderita kusta di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 yaitu jumlah penderita kusta sebanyak 1.597 orang (Media Madising Makassar, 2007). Penderita kusta yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sebanyak 1.351 orang yang terdiri dari 224 penderita type PB dan 1.127 type MB. Sementara untuk tahun 2008, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 1.148 orang yang terdiri dari 117 penderita type PB dan 1.031. Terjadi penurunan penemuan penderita sebesar 17,68% jika dibandingkan dengan jumlah penderita pada tahun 2007. Jumlah penderita 3 (tiga) kabupaten/kota terbanyak ditemukan di Kab. Bone sebanyak 181 orang (15,76%), Kota Makassar sebanyak 163 orang (14,19%), dan Kab. Jeneponto sebanyak 91 orang (7,9%).

Menurut data rekam medis, di Rumah Sakit Kusta Regional Makassar jumlah kunjungan pasien rawat jalan penderita kusta tahun 2009 sebanyak 27.883 orang dan pasien yang tidak semua berasal dari Makassar. Rawat inap sebanyak 34.894 orang pasien, dan pasien RFT sebanyak 1820 orang, belum lagi yang belum datang berobat yang berarti belum terdaftar. Ini menunjukkan bahwa frekuensi penderita kusta dari tahun ke tahun di Sulawesi Selatan tidak tetap akan tetapi berubah-ubah.





Data dari KPD Tamalanrea (Kelompok Perawatan Diri) kilometer 10 Makassar tahun 2010, jumlah masyarakat yang pernah melalui perawatan kusta (RFT) adalah 77 orang.

Penyakit yang bermula dari serangan bakteri yang bernama *Micobakterium leprae* tersebut, bisa dihilangkan asalkan masyarakat Indonesia tidak mengalami kekurangan gizi. Palsunya, bakteri-bakteri kusta hanya akan menyerang orang-orang dengan gizi buruk. Dengan gizi yang kurang seimbang membuat daya tahan tubuh melemah (<http://www.sasak.net2009/forum/viewtopic.com>. diakses 7 Juni 2010).

Menurut Wakil Direktur RS Kusta Sitanala Tangerang (Handoko Soewarno, 2009) Jika masyarakat kurang mendapat asupan gizi, secara otomatis kekebalan tubuhnya akan berkurang. Bukanlah suatu yang mengherankan jika penyakit kusta banyak ditemukan di negara-negara berkembang.

Menurut Prof. Indropo, setiap orang mempunyai antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap semua penyakit yang masuk. Ketika ada virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, antibodi tersebut segera bereaksi dan melakukan perlawanan. Peluang seseorang terkena penyakit kusta sangat kecil karena *Mycobacterium leprae* tidak akan bisa menyerang manusia dengan sistem kekebalan alamiah normal dan 90-95 persen manusia lahir dengan kekebalan alamiah normal.

Kekebalan alamiah seseorang bisa tidak normal jika selama dalam kandungan janin tidak mendapatkan asupan nutrisi cukup dan sang ibu tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk. Gizi kurang dan sanitasi yang buruk sangat erat hubungannya dengan kemiskinan.



Menurut dr. JP Handoko Soewono, peningkatan kasus penyakit kusta di tanah air lebih disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi masyarakat.

Kemiskinan adalah masalah paling serius yang dihadapi dunia pada tahun 2010, demikian hasil jajak pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 25.000 orang di 23 negara diwawancarai secara langsung, online, atau melalui telepon dalam jajak pendapat (Lembaga *Riset GlobeScan*, 2010).

Indonesia dalam hasil riset menyebutkan ancaman terorisme sebagai akibat kemiskinan yang melanda masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kemiskinan juga dapat mengakibatkan lemahnya masyarakat mengontrol masalah kesehatan untuk keluarga, atau bahkan untuk dirinya sendiri.

Hubungan kemiskinan dengan masalah kesehatan sangat erat. Karena terbatasnya biaya untuk merawat kesehatan, akan menimbulkan berbagai penyakit, termasuk penyakit kusta.

Penyebab kusta adalah akibat kebiasaan hidup yang tidak menjaga pola makan sehari-hari, termasuk kesehatan dirinya (kebersihan tubuh) maupun lingkungan yang tidak bersih. Penyakit kusta itu, pada dasarnya bisa menularkan kepada orang lain apabila penyebab dari penyakit itu mendukung perkembangan virus itu ada di lingkungan tersebut.

Untuk bisa sembuh dari penyakit kusta membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, penderita kusta harus dirawat secara rutin setiap saat. Untuk mempercepat proses penyembuhan para penderita kusta, juga perlu adanya asupan gizi yang optimal bagi para penderita kusta untuk menunjang perbaikan gizi yang secara tidak langsung dapat membantu perbaikan sistem imun atau kekebalan tubuh seseorang.



Umumnya dan hampir semua para penderita kusta mencari nafkah hanya menjadi pengemis sekedar untuk bertahan hidup. Pendapatan dari mengemis tentu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk memenuhi gizi seimbang salah satu penunjang hidup sehat.

Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan masyarakat ikut memastikan para penderita kusta agar dapat berobat dengan rutin dan senantiasa dapat mengikuti petunjuk para petugas kesehatan sehingga mempercepat penyembuhannya. Dengan demikian, hidupnya bisa produktif kembali. ([http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta tumbuh di atas kemiskinan](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta_tumbuh_di_atas_kemiskinan). Diakses 2 Juni 2010).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana gambaran asupan makanan dan status gizi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran asupan energi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar?
2. Bagaimana gambaran asupan karbohidrat penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar?
3. Bagaimana gambaran asupan protein penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar?
4. Bagaimana gambaran asupan lemak penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar?



5. Bagaimana gambaran status gizi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran asupan makanan dan status gizi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW. 2 RT. 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Kota Makassar

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran asupan energi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar
- b. Untuk mengetahui gambaran asupan karbohidrat penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar
- c. Untuk mengetahui gambaran asupan protein penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar
- d. Untuk mengetahui gambaran asupan lemak penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar
- e. Untuk mengetahui gambaran status gizi penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) di RW.2 RT.2 Kelurahan Tamalanrea Jaya Km.10 Makassar



#### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Praktis

Merupakan pengalaman akademis yang mengantarkan peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan cara berfikir ilmiah dalam melakukan penelitian di bidang Gizi Kesehatan Masyarakat.

2. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya mengenai gambaran asupan makanan dan status gizi penderita RFT kusta (*Release From Treatment*).

3. Manfaat Institusi Kesehatan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak rumah sakit dalam mengambil kebijakan dan penyusunan program-program kesehatan dalam merunkan prevalensi penyakit kusta.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Kusta (Lepra)*

##### 1. *Penyakit Kusta (Lepra)*

Penyakit lepra (kusta) adalah penyakit menular yang paling tidak menular. Penyakit Kusta atau *Morbus Hansen* adalah penyakit sistematik yang mempunyai predileksi pada kulit dan saraf yang disebabkan oleh *Mycobacterium Leprae* yang mempunyai sifat neurotropis, yang biasa ditemukan intra neural dan ekstra neural yang akan mengakibatkan kerusakan saraf. Penyakit kusta penularannya bisa lewat kontak langsung (lewat kulit yang luka) atau lewat droplet yang keluar dari hidung penderita. Droplet yang mengandung kuman ini masuk ke dalam saluran nafas calon penderita kusta setelah itu baru menyebar keseluruhan tubuh dan kemudian berkembang biak di dalam organ tubuh yang cocok. (Muh.Dali Amiruddin, 2001).

##### 2. *Klasifikasi Kusta dan Jenis Penyakit kusta*

###### a. *Klasifikasi Penyakit Kusta*

Suatu sistem klasifikasi mempunyai nilai yang penting dalam berbagai penyakit. Ini sangat penting dalam penyakit kronis, misalnya penyakit kusta yang mempunyai manifestasi klinis yang sangat bervariasi yang berhubungan dengan perbedaan dalam immunologis, histologist, evolusi dan epidemiologis.

Sampai saat ini untuk klasifikasi yang dipakai pada penelitian terbanyak adalah klasifikasi Ridley dan Jopling. Klasifikasi ini berdasarkan gambaran



klinis, *bakteriologis histopatologis* dan mempunyai korelasi dengan tingkat *immunologis*, yaitu membagi penyakit kusta dalam 5 tipe yaitu :

- *Tipe tuberkuloid* (TT)
- *Tipe borderline tuberkuloid* (BT)
- *Tipe borderline* (BB)
- *Tipe borderline lepromatous* (BL)
- *Tipe lepromatous* (LL)

WHO mengelompokkan penyakit kusta atas dua kelompok yaitu :

1. Tipe *pausibasiler* (PB) terdiri atas tipe indeterminate (I), tuberkuloid (TT), borderline tuberkuloid (BT) dengan hasil pemeriksaan basil tahan asam (BTA) negative.
2. Tipe *multibasiler* (MB) terdiri atas tipe borderline (BB), borderline lepromatous (BL), Lepromatous (LL). Semua kasus tipe apapun dengan hasil pemeriksaan BTA positif.

**b. Jenis penyakit kusta**

Jenis Penyakit Kusta (Kusno Waluyo, 2004) :

**a. Jenis Kusta Kering**

1. Tanda-tandanya :

- a) Bercak keputihan seperti panu.
- b) Bercak keputihan tersebut mati rasa, artinya bila disentuh dengan kaus tidak terasa.
- c) Permukaan bercak kering dan kasar
- d) Permukaan bercak kering berkeruput
- e) Batas (pinggir) bercak jelas dan sering ada bintil-bintil kecil.



2. Penyakit kusta kering. Pada awalnya penderita kusta tidak merasa terganggu, karena seperti orang panu saja.
3. Bila tidak segera diobati dan dibiarkan saja, akan timbul cacat.

b. Jenis Kusta Basah

Tanda-tandanya :

- a) Bercak putih yang kemerahan yang tersebar satu-satu
- b) Terjadi penebalan dan pembengkakan bercak
- c) Pada permukaan bercak, sering-sering masih ada rasa bila disentuh dengan kapas
- d) Pada permulaan, tanda dari jenis kusta basah sering terdapat pada kuping telinga dan wajah.

c. *Gejala Kusta*

Gejala kusta berkembang sangat lambat. Gejala pertamanya berupa penebalan pada kulit yang berubah warnanya berupa bercak keputih-putihan (*macula hypopigmentasi*) yang kurang atau hilang perasaannya (*anaesthesia*). Pengenalan tanda pertama ini sangat penting untuk berhasilnya pengobatan dan pencegahan kecacatan akibat lepra.

Terkenanya system syaraf ditandai dengan terjadinya gangguan perasaan (tuna rasa), gangguan tropik terhadap tulang dan otot, kelumpuhan dan borok-borok karena terganggunya pengedaran zat. Gerakan anggota badan (lengan dan kaki) terganggu dan menimbulkan kecacatan (Indan Entjang 2000: 55 ).

d. *Penyebab Kusta*

Penyebab penyakit kusta adalah Bakteri *Mycobacterium leprae*. Cara penularan lepra belum diketahui secara pasti. Jika seorang penderita lepra berat





dan tidak diobati bersih, maka bakteri akan menyebar ke udara. Sekitar 50% penderita kemungkinan tertular karena berhubungan dekat dengan seseorang yang terinfeksi. Infeksi juga mungkin ditularkan melalui tanah, armadillo, kutu busuk dan nyamuk.

Sekitar 95% orang yang terpapar oleh bakteri lepra tidak menderita lepra karena sistem kekebalannya berhasil melawan infeksi. Penyakit yang terjadi bisa ringan (lepra tuberkuloid) atau berat (lepra lepromatosa). Penderita lepra ringan tidak dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Lebih dari 5 juta penduduk dunia yang terinfeksi oleh kuman ini. Lepra paling banyak terdapat di Asia, Afrika, Amerika Latin dan kepulauan Samudra Pasifik. Infeksi dapat terjadi pada semua umur, paling sering mulai dari usia 20an dan 30an. Bentuk lepromatosa 2 kali lebih sering ditemukan pada pria.

Beberapa faktor yang diduga merupakan faktor risiko kusta antara lain adalah kontak dengan penderita kusta, tipe kusta, keteraturan minum obat, kontak dengan lingkungan, umur, jenis kelamin, genetik, gizi dan entik. (Ineke Tri Sulistyowaty, 2005).

Penyebab pendukung terjadinya penyakit kusta adalah masalah sosial ekonomi. Kemiskinan salah satu masalah yang menjadi pemicu terjadinya penyakit kusta sebab dalam kondisi miskin seseorang tidak dapat memenuhi gizi seimbang yang dibutuhkan setiap tubuh manusia. Dimana gizi seimbang dapat membantu pembentukan kekebalan tubuh menjadi lebih baik dan tidak mudah terserang penyakit, termasuk kusta. Untuk mempercepat proses penyembuhan para penderita, perlu adanya asupan gizi yang optimal bagi para



penderita kusta ([http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta tumbuh di atas kemiskinan](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta_tumbuh_di_atas_kemiskinan).Diakses 2 Juni 2010).

### ***B. Tinjauan Umum Tentan Asupan Makanan***

Menurut *The American Heritage Dictionary*, Perilaku asupan makanan sama dengan “kebiasaan makan” yaitu tindakan manusia terhadap makanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, perasaan dan persepsi tentang hal itu (Khumaidi, 1994 dalam Nurmi Rahmita 2002). Konsumsi makanan adalah jumlah total dari makanan yang tersedia untuk dikonsumsi (Hadju,1997).

Perilaku itu sendiri dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Notoatmodjo, 1993).

Intake makanan adalah semua makanan dan minuman dimakan dan diminum (Masuk kedalam tubuh) seseorang dalam jangka waktu tertentu, biasanya 24 jam. (Soeharjo,dkk,1986).

Asupan makanan merupakan faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap status gizi, rendahnya konsumsi atau tidak seimbangny makanan bergizi yang dikonsumsi mengakibatkan kurang gizi, pertumbuhan terhambat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

### ***C. Konsep islam Tentang Gizi***

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup ciptaan Allah awt selalu membutuhkan bahan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Bahan makanan ini



bersumber dari tumbuhan tumbuhan dan hewan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Nahl ayat 5:

وَاللّٰنَعْمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

*Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu:padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya untuk kamu makan.*

Didalam tubuh makanan mengalami proses pengolahan yang meliputi proses pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Zat makanan ini diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme tubuh dan untuk memperbaiki atau mengganti sel jaringan tubuh yang telah tua. Kebutuhan zat makanan tidak sama bagi setiap orang, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: usia, tinggi badan, berat badan jenis kelamin, jenis kerja/kegiatan Maupun keadaan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka perlu batas minimal yang variasi pengaruh individunya sudah diperhitungkan, yaitu kecukupan gizi yang dianjurkan (Eko Budi Minarno, 2008).

Apabila kebutuhan zat gizi makanan ini tidak terpenuhi dalam jangka waktu beberapa lama, maka akan timbul sindroma atai gejala-gejala yang bisa menimbulkan penyakit.

Zat-zat gizi yang umum kita konsumsi adalah zat-zat gizi makro yang merupakan zat gizi yang paling utama untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Yang termasuk zat-zat gizi makro adalah :



**a. Energi**

Energi didefinisikan sebagai suatu kapasitas untuk melakukan pekerjaan, Energi dibutuhkan oleh tubuh berasal dari zat gizi yang merupakan sumber utama yaitu, karbohidrat, lemak, dan protein. Energi yang diperlukan dinyatakan dalam satuan kalori (Sediaoetama,2000). Banyak sedikitnya energi yang dibutuhkan seseorang tergantung dari banyaknya hal yaitu, umur, berat badan, jenis kegiatan, jenis kelamin, kesehatan tubuh dan sebagainya.

**b. Karbohidrat**

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Karbohidrat terdiri atas unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O).

Ada beberapa fungsi Karbohidrat dalam tubuh antara lain :

1. Sumber Energi

Karbohidrat merupakan sumber Karbohidrat utama energi dari seluruh penduduk di dunia. Satu gram Karbohidrat menghasilkan 4 kkalori. Sebagian Karbohidrat dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi didalam jaringan lemak.

2. Pemberi rasa manis pada makanan

Hal ini terkhusus pada jenis Karbohidrat mono dan disakarida.



### 3. Penghemat Protein

Bila Karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, dengan mengalahkan fungsi utama sebagai zat pembangun. Sebaliknya bila karbohidrat makanan mencukupi, protein terutama akan digunakan sebagai zat pembangun.

### 4. Pengatur Metabolisme Lemak

Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yaitu tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan Keton yang bias menyebabkan ketidak seimbangan Natrium, dehidrasi, dan pH cairan tubuh menurun. Keadaan ini menimbulkan ketosiada atau asidosis yang dapat merugikan tubuh,.

### 5. Membantu Mengeluarkan Feses

Dengan cara mengatur peristaltik usus dan member bantuan pada feses. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian. Kacang-kacangan kering dan gula. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai sumber energi pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas dan sagu. Jumlah karbohidrat yang dianjurkan WHO (1990) adalah 60-75% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana.

Al-qur'an mengungkapkan tentang bahan makanan padi-padian itu dalam surat al-An'am ayat 99 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ  
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ



طَلْعَهَا قِنَوَانَ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا  
 وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ  
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

*Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tak serupa. Perhataikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.*

Pengertian butir yang banyak dari ayat di atas sesungguhnya adalah serelia (padi-padian). Dalam konteks ini, firman Allah dalam al-Quran surat Yasin ayat 33 mengungkapkan pula tentang bahan makanan biji-bijian:

وَأَيُّهُمْ أَلْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ  
 يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

*Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan.*

Dari ayat tersebut di atas, para mufasir mengisyaratkan bahwa Allah swt menurunkan hujan dan mengubah tanah yang tandus menjadi tanah subur, yang memberikan hasil bumi yang berlimpah berupa an utama yang dianggap



kebutuhan manusia dan ternaknya. Sebagian besar dari bahan makanan sumber karbohidrat itu merupakan bahan makanan pokok. Definisi makanan pokok (staple food) adalah bahan makanan utama yang dianggap paling penting dan harus selalu ada dalam hidangan sehari-hari makanan pokok ini menghasilkan sekitar 70-80% dari jumlah kalori total yang di butuhkan per hari.

**c. Protein**

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya berada didalam otot, seperlima didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh didalam kulit dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormone, pengangkutan zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler dan sebagainya adalah protein (Almatsier, 2003.)

Protein dalam makanan terlibat dalam pembentukan jaringan dan berbagai fungsi metabolisme yang spesifik. Sebagai sumber energi, protein sama dengan karbohidrat dalam memberikan 4 kkal/g (Hadju, 1996).

Ada beberapa fungsi protein yang lain, yaitu (Almatsier,2003) :

1. Pertumbuhan dan pemeliharaan
2. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh
3. Mengatur keseimbangan air
4. Memelihara netralitas tubuh
5. Pembentukan antibodi
6. Mengangkut zat-zat gizi



Dalam kualifikasi protein berdasarkan sumbernya, telah kita ketahui protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam seperti prankeas, hati, ginjal dan paru. Susu dan telur termasuk pula sumber sumber protein hewani yang berkualitas tinggi. Sedangkan sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan yang lain. (Sediaoetama, 2000).

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh manusia, karena berperan sebagai zat pembangun dan pengatur metabolisme dalam tubuh. Protein dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Allah swt telah memberikan petunjukNya tentang protein hewani khususnya yang berasal dari darat dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 79:

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya :

Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagainya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.

Di samping protein hewani, al-Qur'an juga memberikan petunjuk tentang tumbuh-tumbuhan terutama kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati sebagaimana tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 61 sebagai berikut:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا

Terjemahnya:





*Dan ingatlah, ketika kamu berkata: “ Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.*

#### **d. Lemak**

Lemak merupakan sumber energi paling padat, yang menghasilkan 9 kkalori untuk tiap gram, yaitu 2½ kali besar yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak merupakan cadangan energi tubuh paling besar simpanan itu berasal dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat energi : karbohidrat, protein dan lemak. Lemak tubuh pada umumnya disimpan sebagai berikut. 50% dari jaringan bawah kulit (subkutan), 45% disekililing organ-organ dalam rongga perut, dan 5% dijaringan intra muskuler. (Almatsier, 2003)

Beberapa fungsi lemak antara lain :

1. Sumber energi bersama-sama karbohidrat dan protein
2. Sumber asam lemak esensial
3. Alat angkut vitamin larut lemak
4. Penghemat protein
5. Memberi rasa kenyang dan kelezatan
6. Membantu mengeluarkan sisa pencernaan
7. Memelihara suhu tubuh
8. Melindungi organ tubuh

Sumber lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai dan sebagainya), mentega margarine dan



lemak hewan (lemak daging dan ayam). Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO (1990) menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 10-25% kebutuhan energi total.

Di Negara-negara kaya, sebagian energi yang bersal dari lemak mencapai 30-40% dari kaloro total. Jumlah ini dianggap terlalu tinggi karena masyarakat menunjukkan kesehatan yang tidak optimal (Sediaoetama, 2000).

Al-Qur'an sebagai acuan pertama mengisyaratkan penggunaan minyak dalam makanan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mu'minin ayat 20:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلَّالِكِينَ

Terjemahnya :

*Dan pohon kayu keluar dari Thursina (poho zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.*

Untuk mengukur konsumsi makanan individu atau perorangan, terdapat beberapa metode yang digunakan antaralain : Recall 24 jam, *Estimated dan records. Food weighing, dietary history, dan Food frecuency* (Hadju, 2004). Akan tetapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya satu yaitu recall 24 jam.

Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan denga mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Hal penting yang perlu diketahui bahwa dengan recall 24 jam, data yang diperoleh cenderung bersifat kuantitatif oleh karena itu, untuk mendapatkan kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan induvidu dinyatakan secara mendetail dan teliti menggunakan alat URT (sendok, gelas, piring dan lain-lain) atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari. (Nyoman, 2001)



Recall 24 jam sebaiknya digunakan berulang-ulang dan hari yang tidak berturut-turut (minimal 2 kali), agar dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi lebih optimal dan memeberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian individu (Sanjur, 1997). Recall 24 jam ini mudah dilakukan, murah, cepat,serta dapat digunakan untuk responden yang buta huruf. Namun salah satu kelemahan dari metode ini adalah adanya “*The flat Slope Syndrome*”. Yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak (*over estimated*) dan bagi responden yang gemuk cenderung melaporkan lebih sedikit (*under estimated*)





*Tabel 2.1*

*Distribusi Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan (perorang/hari).*

<b>Golongan Umur</b>	<b>Berat Badan (Kg)</b>	<b>Tinggi Badan (Cm)</b>	<b>Energi (Kkal)</b>	<b>Protein (Gram)</b>
Pria				
10-12 thn	30	135	2000	45
13-15 thn	45	150	2400	64
16-19 thn	56	160	2500	66
20-45 thn	62	165	2800	55
46-59 thn	62	165	2500	55
≥ 60 thn	62	165	2200	55
Wanita				
10-12 thn	35	140	1900	54
13-15 thn	46	153	2100	62
16-19 thn	50	154	2000	51
20-45 thn	54	156	2200	48
46-59 thn	54	156	2100	48
≥ 60 thn	54	154	1850	48

*Sumber : Prinsip dasar ilmu gizi, Sunita Almatsier 2001 hal 302.*

Berbicara masalah gizi erat kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Di dalam tubuh makanan mengalami proses pengolahan yang meliputi proses pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Zat makanan ini diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme tubuh dan untuk memperbaiki atau mengganti sel jaringan tubuh yang telah tua. Kebutuhan zat makanan tidak sama bagi setiap orang, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, jenis kerja/kegiatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka perlu batas minimal yang variasi pengaruh individunya sudah dipehitungkan, yaitu kecukupan gizi yang dianjurkan. Apabila kebutuhan zat makanan ini tidak



terpenuhi dalam jangka waktu beberapalama, maka akan timbul sindroma atau gejala-gejala penyakit.

#### ***D. Tinjauan Umum tentang Status gizi***

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik-buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kesehatan. (Djoko Pekik Irianto, 2006 : 65)

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih (Sunita Almatsier, 2005).

Menurut Supriasa (2002), pada dasarnya penilaian status gizi dapat dibagi dua yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu antropometri.

Pengukuran antropometri adalah pengukuran dari berbagai dimensi fisik tubuh dan komposisi tubuh secara kasar pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi. Pada prakteknya ukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah ukuran berat badan (BB), dan tinggi badan (TB) atau panjang badan kadang-kadang dipergunakan pada ukuran lingkaran lengan atas (LLA), lingkaran kepala. Untuk mengukur status gizi pada pasien stroke dipakai pengukuran BBR (Berat Badan Relatif).

##### **1. Berat Badan**

Berat badan merupakan salah satu ukuran tubuh yang paling banyak digunnakan yang memeberikan gambaran tentang massa jaringan tubuh. Berat



badan sangat dipengaruhi oleh keadaan yang mendadak, seperti konsumsi makanan yang menurun.

## 2. Tinggi Badan

Tinggi badan memeberikan gambaran pertumbuhan tulang yang sejalan dengan penambahan umur berbeda dengan berat badan. Tinggi badan tidak banyak terpengaruh oleh suatu keadaan yang bersifat mendadak tinggi badan pada waktu merupakan hasil pertumbuhan secara komulatif semenjak lahir karena itu memberiakan gambaran riwayat status gizi pada masa lalu.

Masalah kekurangan dan kelebihan pada orang dewasa merupakan masalah penting, karena selain mempunyai resiko penyakit-penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan, salah satu cara adalh dengan mempertahankan berat badan yang ideal atau normal.

FAO/WHO/UNU (1985) menyatakan bahwa batas berat badan normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai *Body Mass Index* (BMS) atau Indeks Massa Tubuh (IMT). Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut :

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi badan}}$$

Kategori ambang batas IMT untuk Indonesia (Depkes 1994 dalam Supariasa, 2001).

Kurus : Kekurang berat badan tingkat berat < 17,0


Kekurang berat badan tingkat ringan 17,0-18,5



Normal : > 18,5- 25,0

Gemuk : Kelebihan berat badan tingkat ringan > 25,0-27,0

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0





### BAB III

#### KERANGKA KONSEP

##### A. *Dasar Variabel Yang Diteliti*

Pada masa sulit seperti ini, tingkat kesehatan sangat penting. Terutama bagi masyarakat pada umumnya, karena masyarakat merupakan sumber daya manusia menjadi tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Begitupula bagi kelompok para penderita kusta ini, mereka perlu mendapat perhatian yang serius karena berhubungan dengan status gizi mereka yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan mereka sendiri.

##### 1. Konsumsi Makanan

##### a. Konsumsi Energi

Energi merupakan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan. Adanya kebiasaan makan dan mengkonsumsi energi yang kurang atau yang lebih banyak dari kebutuhan akan mempengaruhi kapasitas kita untuk melakukan kegiatan.

##### b. Konsumsi Karbohidrat

Karbohidrat merupakan zat gizi utama sebagai sumber energi bagi tubuh, terpenuhinya kebutuhan tubuh akan menentukan jumlah energi yang tersedia bagi tubuh setiap hari (Suyatmi M dalam Ika Dwi Sartika, 2006).

Karbohidrat dalam tubuh terutama berfungsi dalam bentuknya sebagai glukosa, walaupun ada beberapa diantaranya berperang sebagai zat





pembangun. Karbohidrat adalah sumber energy utama, setiap gramnya menghasilkan 4 kkal (Hadju, 2001).

c. Konsumsi Protein

Protein adalah zat gizi yang didalam tubuh berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Fungsi utama protein adalah untuk pertumbuhan, akan tetapi bila tubuh kekurangan zat energi, fungsi protein adalah untuk menghasilkan energi atau untuk membentuk glukosa akan didahulukan.

d. Konsumsi Lemak

Lemak merupakan zat gizi yang padat kalori, dimana setiap gram lemak mengandung energi sebesar 9 kkal/gram.

Lemak yang terdapat dalam makanan berguna untuk meningkatkan jumlah energy membantu penyerapan vitamin A, D, E, K serta menambah lezatnya hidangan (Hadju, dalam Nursiah Khalik, 2003).


2. Status gizi

Status gizi adalah tanda-tanda atau penampakan yang diakibatkan oleh *nutriture* (Keseimbangan antara pemasukan gizi disuatu pihak dan pengeluaran, metabolisme dilain pihak) dan terlihat melalui variable-variabel tertentu. Dari keadaan gizi dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, penentuan status gizi menggambarkan status kesehatan akibat dari konsumsi makanan.



## B. Pola Fikir Variabel yang Diteliti

Berdasarkan dasar pemikiran variable yang telah diuraikan sebelumnya, maka pola pikir variable yang diteliti sebagai berikut :



## C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. Konsumsi makanan adalah semua makanan dan diminum yang dikonsumsi oleh responden dengan metode recall 24 jam dan *food frequency*.
  - a. Konsumsi energi adalah jumlah energi yang dikonsumsi masyarakat berdasarkan kecukupan gizi yang dianjurkan.

Criteria objektif

Kurang : jika konsumsi energi < 80% dari AKG

Cukup : jika konsumsi energi  $\geq$  80% dari AKG
  - b. Konsumsi karbohidrat adalah jumlah karbohidrat yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan kecukupan gizi yang dianjurkan (WHO, 1990).

Criteria objektif

Kurang : jika konsumsi karbohidrat < 80% dari total kalori



Cukup : jika konsumsi karbohidrat  $\geq 80\%$  dari total kalori

- c. Konsumsi protein adalah jumlah protein yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan kecukupan gizi yang dianjurkan.

Criteria objektif

Kurang : jika konsumsi protein  $< 80\%$  dari AKG

Cukup : jika konsumsi protein  $\geq 80\%$  dari AKG

- d. Konsumsi lemak adalah jumlah lemak yang dikonsumsi masyarakat berdasarkan angka kecukupan gizi.

Criteria objektif

Kurang : jika konsumsi lemak  $< 80\%$  dari total kalori

Cukup : jika konsumsi lemak  $\geq 80\%$  dari total kalori

## 2. Status Gizi

Yang dimaksud dengan status gizi dalam penelitian keadaan gizi masyarakat dengan melakukan pengukuran meter berdasarkan indikator IMT.

IMT Ditentukan berdasarkan kategori ambang bebas Indonesia (Depkes, 1994 dalam Supriasa 2001).

Penilaian status gizi dilakukan dengan mengukur berat badan dan tinggi badan.

Kurus : Jika 17,0- 18,5

Normal : Jika  $> 18,5$ - 27,0

Gemuk : Jika  $> 25,0$ - 27,0.



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran asupan makanan dan status gizi Kusta RFT (*Release From Treatment*).

#### B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian dilakukan di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kilometer 10 kota Makassar.

#### C. *Populasi dan Sampel*

##### 1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kilometer 10 sebanyak 77 orang.

##### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden yang ditarik secara *purposive sampling* dengan kriteria responden adalah penderita kusta RFT (*Release From Treatment*), yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan bersedia diwawancarai.



#### ***D. Instrumen Penelitian***

1. Lembar Recall Makanan untuk mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu..
2. Timbangan Inja, untuk mengukur berat badan responden.
3. Microtoise, untuk mengukur tinggi badan responden.

#### ***E. Pengumpulan Data***

1. Data Primer

Data primer mengenai asupan gizi diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan masyarakat kusta RFT (*Release From Treatment*) menggunakan Recall Makanan dengan mencatat jenis, dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Sedangkan data status gizi masyarakat Kusta diperoleh melalui pengukuran antropometri yaitu berat badan menggunakan timbangan injak dan dengan mengukur tinggi badan menggunakan *microtoise*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini, bagian administrasi dan rekam medis Rumah Sakit Kusta Regional Makassar, dan hasil penelusuran dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian.

#### ***F. Pengolahan dan Penyajian Data***

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi Program SPSS (*Statistic Package For Social Science*) versi 16 jenis program analisis deskriptif dan analisis *cross table*. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang ditujukan untuk menghasilkan tabel frekuensi dari variable independent dan



variable dependent atau disebut juga analisis *bivariate*. Adapun langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

1. Editing

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh merupakan informasi yang benar. Pada tahap ini dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan data primer yang diperoleh dari hasil data primer serta didukung oleh data sekunder.

2. Tabulasi

Pada tahap ini data yang sudah diolah dengan komputer program SPSS versi 16 jenis program analisis deskriptif dan analisis *cross table* dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang disertai dengan narasi dan pembahasan.





**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di RT. II RW. II Kelurahan Tamalanrea jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dilaksanakan dari tanggal 10-22 Agustus 2010, dengan mengambil data langsung dari respondendan data umum yang diperoleh dari Pemerintah setempat. Yang menjadi responden pada penelitian ini adalah penduduk yang menderita kusta RFT (Release From Treatment) sebanyak 30 responden.

1. Hasil Identifikasi responden

Dari hasil penelitian kami melakukan identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan.

a. Jenis Kelamin Variabel Responden

**Tabel 1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar**  
**Tahun 2010**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Laki-laki	11	36,7
Perempuan	19	63,3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer 2010*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 19 orang (63,3%) dan laki-laki sebanyak 11 orang (36.7%).



b. Jenis Pekerjaan Responden

**Tabel 2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar Tahun 2010**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Pengemis	8	26,7
Tukang becak	4	13,3
Tukang ojek	2	6,7
Wirasuwasta	1	3,3
Pengangguran	15	50,0
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penderita kusta RFT terdiri dari pengemis 8 orang (26,7%), tukang becak 4 orang (13,3%), tukang ojek 2 orang (6,7%), wiraswasta 1 orang (3,3%), pengangguran 15 orang (50,0%).

2. Asupan Makanan dan Status Gizi Kusta RFT (Release from Treatment)

Dari hasil penelitian, keadaan asupan makanan dan status gizi penderita kusta RFT (Release From Treatment) di RW. 2 RT. 2 kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan asupan energi, asupan karbohidrat, asupan protein dan asupan lemak diperoleh gambaran sebagai berikut :





**Tabel 3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Energi**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar Tahun 2010**

Asupan Energi	N	%
Cukup	0	0
Kurang	30	100
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki asupan energi kurang sebanyak 30 orang (100%) yang berarti tidak ada responden yang memiliki asupan energi cukup.

**Tabel 4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Karbohidrat**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar Tahun 2010**

Asupan Karbohidrat	N	%
Cukup	0	0
Kurang	30	100
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki asupan karbohidrat kurang sebanyak 30 orang (100%) yang berarti tidak ada responden yang memiliki asupan karbohidrat cukup.

**Tabel 5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar**  
**Tahun 2010**

Asupan Protein	N	%
Cukup	8	26,7
Kurang	22	73,3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2010



Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki asupan protein kurang sebanyak 22 orang (73,3%) dan yang cukup sebanyak 8 orang (26,7%).

**Tabel 6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Lemak**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar Tahun 2010**

Asupan Lemak	N	%
Cukup	0	0
Kurang	30	100
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki asupan lemak kurang sebanyak 30 orang (100%) yang berarti tidak ada responden yang memiliki asupan karbohidrat cukup.

**Tabel 6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi**  
**Di RW.II RT.II Kel. Tamalanrea jaya Kec. Tamalanrea Kota**  
**Makassar Tahun 2010**

Status Gizi	N	%
Kurus	16	53,3
Normal	14	46,7
Gemuk	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki status gizi termasuk golongan kurus sebanyak 16 orang (53,3%) dan yang berstatus gizi normal sebanyak 14 orang (46,7%).



## **B. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec Tamalanrea Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) yang ada di RW. 2 RT. 2 sebanyak 30 responden.

### **1. Asupan Makanan**

Makanan memegang peranan penting sejak permulaan terjadinya pembuahan terhadap sel telur dalam rahim ibu karena setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya, berarti fungsi dan peranan makanan dalam daur kehidupan manusia merupakan suatu proses yang berkelanjutan, tidak terpisah antara masing-masing kurun usia.

Makanan yang tebaik merupakan makanan yang dapat menyokong pertumbuhan dan penjagaan kekuatan otot dan kekuatan tulang. Makanan yang cukup untuk keperluan kita dapat mencegah kita dari berbagai penyakit. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan zat gizi, diperlukan asupan makanan yang seimbang dalam hal jumlah dan kualitas.

Yang dimaksud makanan dalam ilmu kesehatan adalah setiap substrat yang dapat dipergunakan untuk proses di dalam tubuh. Terutama untuk membangun dan memperoleh tenaga bagi kesehatan sel. Agar dapat digunakan dalam reaksi biologis, makanan harus masuk ke dalam sel. Zat makanan diperlukan tubuh untuk: membuna tubuh, mengatur fungsi tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, membangun protoplasma, menghasilkan energi dan kalor dan melindungi tubuh dari serangan penyakit.(Irianto, 2004).

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang bahan makanan yang bergizi, di mana gizi adalah bahan makanan yang mengandung



zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia ini tidak akan berlangsung lebih lama apabila tidak tersedia bahan makanan. Disamping itu makanan merupakan kepentingan yang utama bagi kelangsungan hidup manusia, Allah SWT. Menyediakan berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6: 95 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۗ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝۹۵﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah.

Dan Surah Al-an'am/6:99 yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۹۹﴾

Terjemahnya:



*dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*

Bahan pangan yang dimaksud di atas mengandung sejumlah komponen zat makanan yang digolongkan menjadi enam kelompok, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Unsur-unsur zat gizi juga tak luput dari penjelasan dalam al-Qu'ran sebab zat-zat gizi itu sendiri banya faedahnya untuk manusia.(Minarno, 2008).

a. Asupan Energi

Asupan energi dari makanan dibutuhkan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kebutuhan energi pada makanan selain aktifitas juga terjadi proses pertumbuhan fisik yang pesat serta perubahan bentuk dan susunan jaringan tubuh.

Dari hasil penelitian didapatkan asupan energi penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya, semua responden memiliki asupan energi kurang. Asupan energi kurang disebabkan mayoritas responden mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit dan hampir semua responden tidak pernah sarapan pagi yang berarti frekuensi makan hanya 2 kali sehari.



Rendahnya asupan energi responden disebabkan karena pada pagi hari hanya mengonsumsi teh atau kopi bahkan sebahagian responden tidak terbiasa sarapan pada pagi hari.

b. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia. Nilai energi setiap gramnya adalah 4 kkal. Konsumsi karbohidrat dianjurkan 60-70% dari total kalori. Karbohidrat dalam tubuh terutama dalam bentuk glukosa yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi integritas dari jaringan saraf dan pada keadaan normal merupakan sumber satu-satunya energi untuk otak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden, asupan karbohidrat tidak ada yang mencapai kategori cukup.

Rendahnya asupan karbohidrat pada penderita kusta RFT disebabkan karena mereka tidak sarapan pagi dan kurang mengonsumsi nasi. Terbukti dari pekerjaan responden rata-rata berprofesi pengemis dan tukang becak, yang dalam sehari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Asupan Protein

Protein sebagai zat pembangun yaitu merupakan bahan pembangun jaringan baru, memelihara serta mengatur proses-proses yang berlangsung didalam tubuh. Dengan demikian protein amatlah penting bagi semua taraf kehidupan mulai dari masa anak-anak, remaja, dan dewasa. Protein dapat



juga berfungsi sebagai energi bila konsumsi karbohidrat tidak mencukupi, protein dalam makanan dibutuhkan 10-15% dari total kalori.

Dari hasil penelitian responden yang memiliki asupan protein kurang sebanyak 22 orang (73,3%) dan yang cukup sebanyak 8 orang (26,7%).

Rendahnya asupan protein responden disebabkan karena kurang setiap hari responden umumnya mengkonsumsi ikan atau sumber protein yang lain dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan perhari, sebab tidak cukupnya biaya dari hasil pekerjaan mereka yang tukang becak, pengemis bahkan pengangguran. Mayoritas mereka mengkonsumsi sumber protein hanya sekedar saja bahkan tidak sama sekali terbukti pada saat penelitian terdapat keluarga yang mengkonsumsi nasi dan asam saja tanpa lauk dan sayur, hal ini menunjukkan penyebab mengapa asupan protein mereka kurang.

#### d. Asupan Lemak

Lemak merupakan penghasil energi terbesar dimana 1 gram lemak menghasilkan 9 Kkal. Lemak dalam tubuh makanan dibutuhkan sebanyak 10-25%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki asupan lemak kurang. Asupan lemak kurang disebabkan kurang mengkonsumsi bahan makanan sumber lemak. Pada umumnya responden memasak bahan makanan seperti ikan hanya dengan dimasak saja yang berarti sumber lemaknya kurang, beda halnya ketika digoreng dimana minyak yang digunakan merupakan salah satu sumber lemak.



e. Status Gizi

Status gizi adalah keadaan kesehatan individu-individu yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampaknya diukur secara antropometri (Almatsier, 2001). Sedangkan menurut Beck (1993) status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan dan keseimbangan antara masukan nutrient.

Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan perkembangan mental. Tingkat keadaan gizi normal tercapai bila kebutuhan zat gizi normal terpenuhi (Budiyanto, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki status gizi termasuk golongan kurus sebanyak 16 orang (53,3%), dan yang termasuk golongan normal sebanyak 14 orang (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan status gizi tidak normal lebih banyak dibanding yang normal.

Status gizi tidak normal bisa dilihat dari asupan makanan responden dimana asupan makanan responden umumnya kurang dari kecukupan gizi seharusnya.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Asupan makanan adalah rata-rata jumlah asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh penderita kusta RFT (*Release From Treatment*) untuk memenuhi kebutuhan tubuh meliputi asupan energi, karbohidrat, protein dan lemak yang diukur dengan menggunakan metode recall selama 2 kali dengan hasil sebagai berikut :

1. Asupan energi penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), dimana seluruh responden memiliki asupan energi kurang.
2. Asupan karbohidrat penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), dimana seluruh responden memiliki asupan karbohidrat kurang.
3. Asupan protein penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), dimana responden yang memiliki asupan protein kurang sebanyak 22 orang (73,3%) dan yang memiliki asupan protein cukup sebanyak 8 orang (26,7%).
4. Asupan lemak penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), dimana seluruh responden memiliki asupan lemak kurang.
5. Status gizi penderita kusta RFT di Kelurahan Tamalanrea Jaya berdasarkan), pengukuran IMT dimana responden yang berstatus gizi tidak normal (kurus)



sebanyak 16 orang (53,3%) dan yang berstatus gizi normal sebanyak 14 orang (46,7%).

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penderita kusta RFT lebih memperhatikan kebutuhan makanan bagi tubuh seperti halnya energi, karbohidrat, lemak, protein maupun zat-zat gizi lainnya yang diperlukan oleh tubuh apabila terpenuhi bagaimana semestinya secara tidak langsung dapat membantu proses pemulihan penyakit.
2. Bagi pemerintah setempat, upaya untuk lebih memperhatikan kondisi para penderita kusta dengan mengembangkan pengetahuan dan peranan makanan yang bergizi bagi kesehatan serta rutin berobat hingga benar-benar pulih.
3. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang terkait dengan status gizi para penderita kusta.
4. Bagi instansi kesehatan setempat, perlu lebih memperhatikan pengobatan para penderita kusta serta pembinaan seputar kesehatan. Bagi masyarakat pada umum diharapkan tidak terlalu mengucilkan para penyandang kusta sebab mereka bisa pesimis untuk sembuh. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan masyarakat ikut memastikan para penderita kusta agar dapat berobat dengan rutin dan senantiasa dapat mengikuti petunjuk para petugas kesehatan sehingga mempercepat penyembuhannya. Dengan demikian, hidupnya bisa produktif kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Akhas, Syamsu daha,. Nur S Kamardy, 2007, *Studi Deskriptif Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kecatatan Penderita Kusta Di Rumah Sakit Kusta Daya Makassar*, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Kedokteran Komunikasi Fakultas Kedokteran Unhas 2007.

Basaria Hutabarat, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Kusta di Kabupaten Asahan Tahun 2007*, Medan : 2008, Ilmu Kesehatan Masyarakat Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Amiruddin, Muh Dali, 2001, *Ilmu Penyakit Kusta*, Hasanuddin University Press, Makassar.

Almatsier, Sunita, 2005, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Almatsier, sunita, 2005, *Penuntun Diet Edisi Baru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Arisman, MB, 2004, *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.

Dinkes SulSel, 2009. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*, 2008, Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Entjang, Indan. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Hadju, V, *Diktat Penentuan Status Gizi*, Makassar : jurusan gizi , jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar 2004.



-----*. Diktat Gizi Dasar*, jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar 2001.

<http://datinkessulsel.wordpress.com/2009/07/22/derajat-kesehatan-di-sulsel-tahun-2008/>, Deajat Kesehatan Sulsel Tahun 2008, diakses Jumat, 26 Juni 2010, 18:00 WIB.

<http://www.berita8.com/news.php>) , Penderita Kusta di Indonesia 20 Ribu Pertahun, diakses Kamis, 25 Juni 2009, 17:04 WIB.

[http://www.berita8.com/penyakit\\_kusta\\_di\\_Indonesia](http://www.berita8.com/penyakit_kusta_di_Indonesia), diakses 5 Juni 2010.

<http://4kesmas4.blogspot.com/2008/makalah>), Kusta-ku, diakses 21 Juni 2010.

[http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta tumbuh di atas kemiskinan](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/kusta_tumbuh_di_atas_kemiskinan).diakses 2 Juni 2010.

Irianto, Kus. Waluyo, Kusno. *Gizi dan Pola Hidup Sehat*, Irama Wydy, Bandung, 2004.

Irianto, Djoko Pekik, 2007, *Panduan Gizi Lengkap dan Olah Ragawan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ika Dwi Sartika, *Gambaran Konsumsi Makanan Terhadap Status Gizi Anak Usia 9-12 Tahun di SDN 50 kel. Luvvmpue. Kec. Baccukiki pere-pare* 2006. Fakultas kesehatan masyarakat unhas Makassar.

Media Madising Makassar, 2007.

Minarto, Eko Budi,. Hariani Liliek, 2008, *Gizi Dan Kesehatan Perspektif Al-Quran Dan Sains*, UIN Malang Press, Malang.

Nurmi Rahmita, *Konsumsi Makanan Dan Status Gizi Pemulung Usia 7-15 Tahun Di Tpa Sampah Antang Kota Makassar*, 2002, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas hasanuddin Makassar.

Opini, *Media Medising Makassar*, Rumah Sakit Kusta Daya, Makassar.



Supariasa, I Dewa Nyoman, dkk, 2002, *Penilaian Status Gizi*, Buku Kedokteran,EGC, Jakarta.





### FORMULIR METODE RECALL 24 JAM

Hari ke :

Waktu Makan	Nama Masakan	Bahan Makanan		
		Jenis	Banyaknya	
			URT	g
Pagi/Jam				
Siang/Jam				
Malam/Jam				





### Frequency Table

		Nama			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	abd.wahid	1	3.3	3.3	3.3
	dg.buang	1	3.3	3.3	6.7
	dg.halima	1	3.3	3.3	10.0
	dg.mangga	1	3.3	3.3	13.3
	dg.olo	1	3.3	3.3	16.7
	dg.rannu	1	3.3	3.3	20.0
	dg.sayang	1	3.3	3.3	23.3
	Fatimada	1	3.3	3.3	26.7
	Hading	1	3.3	3.3	30.0
	Hasni	1	3.3	3.3	33.3
	Johara	1	3.3	3.3	36.7
	Kanang	1	3.3	3.3	40.0
	M.kasim	1	3.3	3.3	43.3
	Maemunah	1	3.3	3.3	46.7
	Makku	1	3.3	3.3	50.0
	Masni	1	3.3	3.3	53.3
	Muliati	1	3.3	3.3	56.7
	Nannang	1	3.3	3.3	60.0
	Nikma	1	3.3	3.3	63.3
	Nurisa	1	3.3	3.3	66.7
	Rabia	1	3.3	3.3	70.0
	Rahman	1	3.3	3.3	73.3
	Rahmiati	1	3.3	3.3	76.7
	Rina	1	3.3	3.3	80.0
	Rudding	1	3.3	3.3	83.3
	Samsiah	1	3.3	3.3	86.7
	Sulaeman	1	3.3	3.3	90.0



Sumiati	1	3.3	3.3	93.3
Supia	1	3.3	3.3	96.7
Upe	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 23	1	3.3	3.3	3.3
28	2	6.7	6.7	10.0
30	1	3.3	3.3	13.3
34	1	3.3	3.3	16.7
35	2	6.7	6.7	23.3
37	1	3.3	3.3	26.7
40	1	3.3	3.3	30.0
41	1	3.3	3.3	33.3
42	2	6.7	6.7	40.0
43	2	6.7	6.7	46.7
45	6	20.0	20.0	66.7
50	1	3.3	3.3	70.0
52	1	3.3	3.3	73.3
55	2	6.7	6.7	80.0
57	1	3.3	3.3	83.3
60	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

jeniskelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perempuan	19	63.3	63.3	63.3
Lakilaki	11	36.7	36.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	





**Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pengemis	8	26.7	26.7	26.7
tukang becak	4	13.3	13.3	40.0
Ojek	2	6.7	6.7	46.7
pengangguran	15	50.0	50.0	96.7
Wiraswasta	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**BB**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 34	1	3.3	3.3	3.3
36	2	6.7	6.7	10.0
37	1	3.3	3.3	13.3
38	3	10.0	10.0	23.3
39	2	6.7	6.7	30.0
40	8	26.7	26.7	56.7
45	6	20.0	20.0	76.7
47	1	3.3	3.3	80.0
50	3	10.0	10.0	90.0
52	1	3.3	3.3	93.3
55	1	3.3	3.3	96.7
60	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	



**TB**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	132	1	3.3	3.3	3.3
	139	1	3.3	3.3	6.7
	140	1	3.3	3.3	10.0
	141	1	3.3	3.3	13.3
	142	3	10.0	10.0	23.3
	143	3	10.0	10.0	33.3
	144	1	3.3	3.3	36.7
	145	1	3.3	3.3	40.0
	149	2	6.7	6.7	46.7
	150	3	10.0	10.0	56.7
	152	1	3.3	3.3	60.0
	153	1	3.3	3.3	63.3
	158	3	10.0	10.0	73.3
	160	3	10.0	10.0	83.3
	165	1	3.3	3.3	86.7
	168	2	6.7	6.7	93.3
	170	1	3.3	3.3	96.7
	180	1	3.3	3.3	100.0
Total		30	100.0	100.0	

**Statusgizi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurus	16	53.3	53.3	53.3
	normal	14	46.7	46.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	



energi1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	257.5	2	6.7	6.7	6.7
	365	1	3.3	3.3	10.0
	441	1	3.3	3.3	13.3
	467	1	3.3	3.3	16.7
	481	1	3.3	3.3	20.0
	507	1	3.3	3.3	23.3
	510.5	2	6.7	6.7	30.0
	515	1	3.3	3.3	33.3
	556.5	2	6.7	6.7	40.0
	592.5	1	3.3	3.3	43.3
	602	1	3.3	3.3	46.7
	603	2	6.7	6.7	53.3
	668	1	3.3	3.3	56.7
	692.5	1	3.3	3.3	60.0
	694	1	3.3	3.3	63.3
	732.5	2	6.7	6.7	70.0
	751	1	3.3	3.3	73.3
	766	1	3.3	3.3	76.7
	778	1	3.3	3.3	80.0
	788	1	3.3	3.3	83.3
	794	1	3.3	3.3	86.7
	812	1	3.3	3.3	90.0
	966.5	1	3.3	3.3	93.3
	1060.7	2	6.7	6.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	



Energi2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	257.9	1	3.3	3.3	3.3
	259.5	1	3.3	3.3	6.7
	365	1	3.3	3.3	10.0
	441.4	1	3.3	3.3	13.3
	470	1	3.3	3.3	16.7
	481	1	3.3	3.3	20.0
	509	1	3.3	3.3	23.3
	510.3	1	3.3	3.3	26.7
	518	1	3.3	3.3	30.0
	556.7	2	6.7	6.7	36.7
	592.9	1	3.3	3.3	40.0
	603	2	6.7	6.7	46.7
	605	1	3.3	3.3	50.0
	610.5	1	3.3	3.3	53.3
	668	1	3.3	3.3	56.7
	692.5	1	3.3	3.3	60.0
	696	1	3.3	3.3	63.3
	732.3	1	3.3	3.3	66.7
	740.5	1	3.3	3.3	70.0
	750	1	3.3	3.3	73.3
	764	1	3.3	3.3	76.7
	778	1	3.3	3.3	80.0
	786	1	3.3	3.3	83.3
	796	1	3.3	3.3	86.7
	913	1	3.3	3.3	90.0
	966.3	1	3.3	3.3	93.3
	1060.7	2	6.7	6.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	



energi3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	168.5	1	3.3	3.3	3.3
	257.7	1	3.3	3.3	6.7
	258.5	1	3.3	3.3	10.0
	441.45	1	3.3	3.3	13.3
	481	1	3.3	3.3	16.7
	508	1	3.3	3.3	20.0
	510.4	1	3.3	3.3	23.3
	516.5	1	3.3	3.3	26.7
	556.6	2	6.7	6.7	33.3
	560.5	1	3.3	3.3	36.7
	592.7	1	3.3	3.3	40.0
	603	2	6.7	6.7	46.7
	603.5	1	3.3	3.3	50.0
	665	1	3.3	3.3	53.3
	668	1	3.3	3.3	56.7
	692.5	1	3.3	3.3	60.0
	695	1	3.3	3.3	63.3
	732.4	1	3.3	3.3	66.7
	736.5	1	3.3	3.3	70.0
	750.5	1	3.3	3.3	73.3
	765	1	3.3	3.3	76.7
	778.15	1	3.3	3.3	80.0
	787	1	3.3	3.3	83.3
	795	1	3.3	3.3	86.7
	862.5	1	3.3	3.3	90.0
	966.4	1	3.3	3.3	93.3
	1060.7	2	6.7	6.7	100.0



energi3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	168.5	1	3.3	3.3	3.3
	257.7	1	3.3	3.3	6.7
	258.5	1	3.3	3.3	10.0
	441.45	1	3.3	3.3	13.3
	481	1	3.3	3.3	16.7
	508	1	3.3	3.3	20.0
	510.4	1	3.3	3.3	23.3
	516.5	1	3.3	3.3	26.7
	556.6	2	6.7	6.7	33.3
	560.5	1	3.3	3.3	36.7
	592.7	1	3.3	3.3	40.0
	603	2	6.7	6.7	46.7
	603.5	1	3.3	3.3	50.0
	665	1	3.3	3.3	53.3
	668	1	3.3	3.3	56.7
	692.5	1	3.3	3.3	60.0
	695	1	3.3	3.3	63.3
	732.4	1	3.3	3.3	66.7
	736.5	1	3.3	3.3	70.0
	750.5	1	3.3	3.3	73.3
	765	1	3.3	3.3	76.7
	778.15	1	3.3	3.3	80.0
	787	1	3.3	3.3	83.3
	795	1	3.3	3.3	86.7
	862.5	1	3.3	3.3	90.0
	966.4	1	3.3	3.3	93.3
	1060.7	2	6.7	6.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	



asupanenergi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	30	100.0	100.0	100.0

protein1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5.55	2	6.7	6.7	6.7
5.6	1	3.3	3.3	10.0
6.95	1	3.3	3.3	13.3
7	1	3.3	3.3	16.7
7.2	1	3.3	3.3	20.0
7.9	1	3.3	3.3	23.3
10	1	3.3	3.3	26.7
10.5	1	3.3	3.3	30.0
11.9	1	3.3	3.3	33.3
16	1	3.3	3.3	36.7
27	1	3.3	3.3	40.0
27.3	2	6.7	6.7	46.7
27.5	2	6.7	6.7	53.3
29.6	1	3.3	3.3	56.7
31.3	1	3.3	3.3	60.0
31.6	1	3.3	3.3	63.3
33.5	1	3.3	3.3	66.7
35.3	1	3.3	3.3	70.0
39	2	6.7	6.7	76.7
39.8	1	3.3	3.3	80.0
43.5	2	6.7	6.7	86.7
44.1	1	3.3	3.3	90.0
58.3	1	3.3	3.3	93.3



94	1	3.3	3.3	96.7
102.3	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

protein2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5.4	1	3.3	3.3	3.3
5.65	1	3.3	3.3	6.7
6.94	1	3.3	3.3	10.0
7	1	3.3	3.3	13.3
7.5	1	3.3	3.3	16.7
7.55	1	3.3	3.3	20.0
8.1	1	3.3	3.3	23.3
10.9	1	3.3	3.3	26.7
13.9	1	3.3	3.3	30.0
15	1	3.3	3.3	33.3
18	1	3.3	3.3	36.7
27.3	2	6.7	6.7	43.3
28	1	3.3	3.3	46.7
28.3	2	6.7	6.7	53.3
30.6	1	3.3	3.3	56.7
31.4	1	3.3	3.3	60.0
31.9	1	3.3	3.3	63.3
33.5	1	3.3	3.3	66.7
36.3	1	3.3	3.3	70.0
39.2	2	6.7	6.7	76.7
39.7	1	3.3	3.3	80.0
43	1	3.3	3.3	83.3
43.5	1	3.3	3.3	86.7
44	1	3.3	3.3	90.0





67.3	1	3.3	3.3	93.3
97	1	3.3	3.3	96.7
102.2	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

protein3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5.5	1	3.3	3.3	3.3
5.6	1	3.3	3.3	6.7
5.85	1	3.3	3.3	10.0
6.55	1	3.3	3.3	13.3
6.945	1	3.3	3.3	16.7
7	1	3.3	3.3	20.0
8	1	3.3	3.3	23.3
10.7	1	3.3	3.3	26.7
12.5	1	3.3	3.3	30.0
12.9	1	3.3	3.3	33.3
17	1	3.3	3.3	36.7
27.3	2	6.7	6.7	43.3
27.5	1	3.3	3.3	46.7
27.9	2	6.7	6.7	53.3
30.1	1	3.3	3.3	56.7
31.34	1	3.3	3.3	60.0
31.75	1	3.3	3.3	63.3
33.5	1	3.3	3.3	66.7
35.8	1	3.3	3.3	70.0
39.2	2	6.7	6.7	76.7
39.75	1	3.3	3.3	80.0
43.25	1	3.3	3.3	83.3
43.5	1	3.3	3.3	86.7



44.05	1	3.3	3.3	90.0
62.8	1	3.3	3.3	93.3
95.5	1	3.3	3.3	96.7
102.25	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**asupanprotein**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	22	73.3	73.3	73.3
cukup	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**karbihidrat1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 69.4	2	6.7	6.7	6.7
93.4	1	3.3	3.3	10.0
98.1	1	3.3	3.3	13.3
102	1	3.3	3.3	16.7
125.1	2	6.7	6.7	23.3
128	1	3.3	3.3	26.7
128.1	1	3.3	3.3	30.0
130.8	1	3.3	3.3	33.3
131.5	1	3.3	3.3	36.7
140	2	6.7	6.7	43.3
143.2	1	3.3	3.3	46.7
144	1	3.3	3.3	50.0
148	1	3.3	3.3	53.3
148.1	1	3.3	3.3	56.7
153.2	2	6.7	6.7	63.3
160.7	1	3.3	3.3	66.7



175.1	1	3.3	3.3	70.0
178.4	1	3.3	3.3	73.3
182.2	2	6.7	6.7	80.0
188	1	3.3	3.3	83.3
190.8	3	10.0	10.0	93.3
204	1	3.3	3.3	96.7
205.4	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

karbohidrat2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 69.6	1	3.3	3.3	3.3
71.4	1	3.3	3.3	6.7
93.2	1	3.3	3.3	10.0
98.05	1	3.3	3.3	13.3
105	1	3.3	3.3	16.7
128	1	3.3	3.3	20.0
130	2	6.7	6.7	26.7
131.7	1	3.3	3.3	30.0
139	1	3.3	3.3	33.3
140.8	1	3.3	3.3	36.7
142.4	1	3.3	3.3	40.0
144.3	1	3.3	3.3	43.3
150	1	3.3	3.3	46.7
153.2	2	6.7	6.7	53.3
158.1	1	3.3	3.3	56.7
160.9	1	3.3	3.3	60.0
170.8	1	3.3	3.3	63.3
175.1	1	3.3	3.3	66.7
178.6	1	3.3	3.3	70.0



180.7	1	3.3	3.3	73.3
184.2	2	6.7	6.7	80.0
189	1	3.3	3.3	83.3
190.5	1	3.3	3.3	86.7
205.3	1	3.3	3.3	90.0
206	1	3.3	3.3	93.3
1125.3	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

karbohidrat3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 69.5	1	3.3	3.3	3.3
70.4	1	3.3	3.3	6.7
93.3	1	3.3	3.3	10.0
98.3	1	3.3	3.3	13.3
103.5	1	3.3	3.3	16.7
128.05	1	3.3	3.3	20.0
129	1	3.3	3.3	23.3
131.6	1	3.3	3.3	26.7
135	1	3.3	3.3	30.0
135.8	1	3.3	3.3	33.3
139.5	1	3.3	3.3	36.7
142.8	1	3.3	3.3	40.0
144.15	1	3.3	3.3	43.3
149	1	3.3	3.3	46.7
153.1	1	3.3	3.3	50.0
153.2	2	6.7	6.7	56.7
160	1	3.3	3.3	60.0
175.1	1	3.3	3.3	63.3
178.5	1	3.3	3.3	66.7



180.8	1	3.3	3.3	70.0
183.2	2	6.7	6.7	76.7
185.75	1	3.3	3.3	80.0
188.5	1	3.3	3.3	83.3
190.65	1	3.3	3.3	86.7
205	1	3.3	3.3	90.0
205.35	1	3.3	3.3	93.3
625.2	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

asupankarbohidrat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	30	100.0	100.0	100.0

lemak1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.207	1	3.3	3.3	3.3
5	1	3.3	3.3	6.7
6.25	1	3.3	3.3	10.0
6.5	1	3.3	3.3	13.3
6.6	2	6.7	6.7	20.0
6.85	1	3.3	3.3	23.3
6.95	1	3.3	3.3	26.7
7.3	1	3.3	3.3	30.0
9.45	3	10.0	10.0	40.0
9.5	1	3.3	3.3	43.3
9.8	1	3.3	3.3	46.7
11.7	2	6.7	6.7	53.3
12.05	1	3.3	3.3	56.7
12.9	2	6.7	6.7	63.3



13.15	2	6.7	6.7	70.0
16.25	1	3.3	3.3	73.3
18	1	3.3	3.3	76.7
20.2	1	3.3	3.3	80.0
25.6	2	6.7	6.7	86.7
30.5	1	3.3	3.3	90.0
32.1	1	3.3	3.3	93.3
36.1	1	3.3	3.3	96.7
92.4	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**lemak2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.206	1	3.3	3.3	3.3
6.24	1	3.3	3.3	6.7
6.6	2	6.7	6.7	13.3
6.7	1	3.3	3.3	16.7
6.94	1	3.3	3.3	20.0
7	1	3.3	3.3	23.3
7.15	1	3.3	3.3	26.7
7.5	1	3.3	3.3	30.0
9.3	3	10.0	10.0	40.0
9.4	1	3.3	3.3	43.3
9.6	1	3.3	3.3	46.7
11.5	2	6.7	6.7	53.3
12.08	1	3.3	3.3	56.7
14.05	2	6.7	6.7	63.3
14.9	2	6.7	6.7	70.0
17.25	1	3.3	3.3	73.3
19.8	1	3.3	3.3	76.7



20.5	1	3.3	3.3	80.0
25.6	1	3.3	3.3	83.3
25.9	1	3.3	3.3	86.7
30.5	1	3.3	3.3	90.0
32.3	1	3.3	3.3	93.3
36.3	1	3.3	3.3	96.7
92.2	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

lemak3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.2065	1	3.3	3.3	3.3
6	1	3.3	3.3	6.7
6.24	1	3.3	3.3	10.0
6.6	2	6.7	6.7	16.7
6.7	1	3.3	3.3	20.0
6.945	1	3.3	3.3	23.3
7	1	3.3	3.3	26.7
7.4	1	3.3	3.3	30.0
8.45	1	3.3	3.3	33.3
9.375	3	10.0	10.0	43.3
9.7	1	3.3	3.3	46.7
11.6	2	6.7	6.7	53.3
12.065	1	3.3	3.3	56.7
13.3	1	3.3	3.3	60.0
13.6	2	6.7	6.7	66.7
13.9	2	6.7	6.7	73.3
16.75	1	3.3	3.3	76.7
20.5	1	3.3	3.3	80.0



25.6	1	3.3	3.3	83.3
25.75	1	3.3	3.3	86.7
30.5	1	3.3	3.3	90.0
32.2	1	3.3	3.3	93.3
36.2	1	3.3	3.3	96.7
92.3	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Asupanlemak**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	30	100.0	100.0	100.0









Lokasi penelitian ( perumahan Penderita Kusta )

