


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “R” KEHAMILAN
26-28 MINGGU DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
19-21 JUNI 2010**



**Karya Tulis Ilmiah
(KTI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K O L E H : S A R

HILMIAH

70400007016

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 30 Juli 2010

Penyusun,

HILMIAH

NIM: 70400007016



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Hilmiah
Nim : 70400007016
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. “R” Kehamilan 26-28
Minggu dengan Plasenta Previa Totalis di RSIA Siti Fatimah
Makassar Tanggal 19-21 Juni 2010.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk dipertahankan dalam seminar hasil dihadapan Tim Penguji Program Studi Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2010.



Samata-Gowa, 22 Juli 2010

Mengetahui,

Pembimbing KTI,

Ketua Prodi Kebidanan,

dr. Syatirah Jalaluddin, S. Ked
Nip: 150 377 949

Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb.
Nip. 197601262006042001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. “R” Kehamilan 26-28 Minggu dengan Plasenta Previa Totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar Tanggal 19-21 Juni 2010**” yang disusun oleh **HILMIAH, NIM: 70400007016**, mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Sya’ban 1431 H

30 Juli 2010 M

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : dr.Syatirah Jalaluddin, S.Ked. (.....)

Penguji I : dr. Nadyah, S. Ked. (.....)

Penguji II : Drs. H. Syamsul Bahri, M. Si (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D.
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang elah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. “R” Kehamilan 26-28 Minggu dengan Plasenta Previa Totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar Tanggal 19-21 Juni 2010”**.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madyah Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang teristimewa kepada **Ayahanda Andi Kamaluddin** dan **Ibunda Andi Sitti**

Rusnah Baso, atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu, serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada saudara-saudaraku **Zuchriyah** dan **Najamuddin Baso M**, serta pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a, serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Sitti Saleha, S. SiT, SKM, M. Keb. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. dr. Syatirah Jalaluddin, S.Ked. selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
5. dr. Nadyah, S. Ked selaku penguji karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. Drs. H. Syamsul Bahri, M. Si. selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. dr. H. Prawirodihardjo, Sp. OG(K), M.Kes, M.M, Ph.D selaku Kepala RSIA Siti Fatimah Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 khususnya Nila, Unhi, Ekha, Ninda, Ridha, Husni, dan Senab atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 30 Juli 2010

Penyusun,

HILMIAH
NIM: 70400007016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	3
C. Tujuan Penulisan	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	4
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penulisan	6
F. Sistemika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Perdarahan Antepartum.....		11
1. Definisi Perdarahan Antepartum	12

2.	Klasifikasi Perdarahan Antepartum	12
3.	Frekuensi Perdarahan Antepartum	14
4.	Pengawasan Antenatal	14
5.	Penanganan Umum Perdarahan Antepartum.....	16
B.	Tinjauan Umum tentang Plasenta	16
1.	Definisi plasenta	16
2.	Perkembangan Plasenta	17
3.	Sirkulasi Melalui Plasenta	18
4.	Fungsi Plasenta Matur	19
C.	Tinjauan Khusus tentang Plasenta Previa	21
1.	Definisi Plasenta Previa	22
2.	Klasifikasi Plasenta Previa	23
3.	Frekuensi Plasenta Previa	27
4.	Etiologi Plasenta Previa	28
5.	Tanda dan gejala Plasenta Previa	29
6.	Diagnosis Plasenta Previa	31
7.	Pengaruh Plasenta Previa terhadap Kehamilan.....	34
8.	Pengaruh Plasenta Previa terhadap Partus	34
9.	Komplikasi Plasenta Previa	34
10.	Pemantauan pada Ibu dan Janin	35
11.	Penatalaksanaan Plasenta Previa	36
D.	Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan	39
1.	Definisi Manajemen Asuhan Kebidanan	39

2. Prinsip Proses Manajemen Kebidanan	39
3. Tahapan dalam Manajemen Kebidanan	40
4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	44
E. Tinjauan Islam tentang Kehamilan	50
BAB III. STUDI KASUS	54
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	54
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosis/ Masalah Aktual.....	62
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosis/ Masalah Potensial.....	71
D. Langkah IV : Tindakan Segera/ Kolaborasi.....	74
E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	74
F. Langkah VI : Implementasi	78
G. Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan	81
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	83
BAB IV. PEMBAHASAN	101
BAB V. PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1. Menggambarkan keterkaitan manajemen kebidanan dan SOAP 49



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1. Plasenta Previa Totalis	24
Gambar 2. Plasenta Previa Totalis	24
Gambar 3. Plasenta Previa Parsialis	25
Gambar 4. Plasenta Previa Parsialis	25
Gambar 5. Plasenta Previa Marginalis	26
Gambar 6. Plasenta Previa Marginalis	26
Gambar 7. Plasenta Previa Letak Rendah	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kegiatan Konsul

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR SINGKATAN

- AKI: Angka Kematian Ibu.....(3).
- BAP: Bergerak Atas Panggul.....(61, 63, 64, 65, 66).
- BB: Berat Badan.....(60).
- BT: Blodding Time.....(62).
- CT: Clotting Time.....(62).
- DJJ: Denyut Jantung Janin.....(36, 61, 63).
- DM: Diabetes mellitus.....(56).
- G P A: Gravida, Paritas, Abortus.....(62).
- HB: Hemoglobin.....(31, 62).
- IV: Intra Vena.....(35, 36).
- KB: Keluarga Berencana.....(57).
- KU: Keadaan Umum.....(60).
- Lila: Lingkar lengan atas.....(60).
- PAP: Pintu Atas Panggul.....(30).
- PD: Pemeriksaan Dalam.....(32, 33).
- PDMO: Pemeriksaan Dalam Meja Operasi.....(37).
- PMI: Palang Merah Indonesia.....(77).
- PMS: Penyakit Menular Seksual.....(57).
- PPN: Proses Persalinan Normal.....(56).
- RL: Ringer Laktat.....(74, 79).
- SBR: Segmen Bawah Rahim.....(13, 22, 23, 30).

SOAP: S: Subjective, O: Objective, A: Assesment, P: Planning....(5, 9, 44, 47).

TB: Tinggi Badan.....(60).

TFU: Tinggi Fundus Uteri.....(61, 63, 64, 65, 66).

TT: Tetanus Toksoid.....(56).

UK: Usia Kehamilan.....(56).

USG: Ultrasonografi.....(36,62)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal, plasenta terletak di bagian atas uterus (Winkjosastro, 2005).

Salah satu penyebab penting kematian maternal ialah perdarahan. Sebab-sebab perdarahan yang penting ialah perdarahan antepartum (plasenta previa dan solusio plasenta) dan perdarahan postpartum (retensio plasenta, atonia uteri, dan trauma kelahiran), selanjutnya abortus dan kehamilan ektopik (Winkjosastro, 2005).

Kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir, sejak lama menjadi masalah, khususnya di negara-negara berkembang. Menurut perkiraan WHO, saat ini setiap tahun terjadi 500.000 kematian ibu yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, 99 persen diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Lebih dari separuhnya (300.000) terjadi di ASIA, yang hampir $\frac{3}{4}$ -nya terjadi di ASIA Selatan. Risiko kematian maternal di negara maju adalah 1 diantara 4000-10.000, sedang di negara berkembang 1 diantara 15-50, yang berarti peningkatan 200-250 kali. Tingkat kematian maternal di Indonesia saat ini diperkirakan 450 per100.000 kelahiran

hidup, yang merupakan angka paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, kematian maternal diperkirakan masih merupakan masalah potensial kesehatan wanita 25 tahun mendatang (Martaadisoebrata, 2005).

Penyebab terpenting kematian maternal di Indonesia adalah perdarahan (40-60%), infeksi (20-30%), dan keracunan kehamilan (20-30%), serta sisanya sekitar 5% disebabkan penyakit lain yang memburuk saat kehamilan atau persalinan. Perdarahan sebagai penyebab kematian ibu terdiri atas perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum. Perdarahan antepartum merupakan kasus gawat darurat yang kejadiannya berkisar 3% dari semua persalinan, penyebabnya antara lain plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya (<http://www.kalbe.co.id>).

Data yang diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 adalah Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat berjumlah 114 orang. Penyebab utama adalah perdarahan sejumlah 59 orang, kemudian disusul oleh pre-eklampsia/ eklampsia berjumlah 35 orang, infeksi 8 orang, dan 12 orang yang disebabkan oleh penyebab lainnya (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan).

Data yang diperoleh dari *Medical Record* RSIA Siti Fatimah Makassar pada bulan Januari-Desember 2009 tercatat jumlah penderita Plasenta Previa sebanyak 33 orang di RSIA Siti Fatimah Makassar (Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar).

Untuk mendeteksi terjadinya plasenta previa maka perlu dilakukan

pelayanan antenatal yang berkesinambungan. Hal ini juga merupakan cara penting untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil serta mendeteksi kemungkinan adanya komplikasi-komplikasi lain yang terjadi selama masa kehamilan (Wiknjostro, 2005).

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, Departemen Kesehatan melakukan strategi agar semua asuhan antenatal dan sekitar 60% dari keseluruhan persalinan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih. Strategi ini dilaksanakan untuk dapat mengenali dan menanggulangi gangguan kehamilan dan persalinan sedini mungkin. Penyiapan sarana pertolongan gawat darurat merupakan langkah antisipasi terhadap komplikasi yang mungkin mengancam keselamatan ibu (Saifuddin, 2006).

Sehubungan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) karena perdarahan, termasuk perdarahan akibat plasenta previa maka penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis ilmiah ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010 dengan penerapan manajemen 7 langkah Varney.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah manajemen asuhan kebidanan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Memperoleh pengalaman dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010 dengan menggunakan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dapat melaksanakan pengumpulan data dasar pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- b. Dapat merumuskan diagnosis/ masalah aktual pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- c. Dapat mengantisipasi diagnosis/ masalah potensial pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- d. Dapat melaksanakan tindakan segera/ kolaborasi pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.

- e. Dapat merumuskan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- g. Dapat mengevaluasi tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010.
- h. Dapat mendokumentasikan hasil temuan dan tindakan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada Ny. “R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, tanggal 19-21 Juni 2010, dalam Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teori, diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan terhadap penulis/ peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktek, proses pembuatan karya tulis ilmiah ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan, dan menambah wawasan, serta keterampilan tentang gambaran yang berhubungan dengan Plasenta Previa.

3. Manfaat institusi, sebagai bahan masukan terhadap institusi dalam pengembangan program pendidikan Diploma III Kebidanan, sehingga dapat melahirkan alumni yang bermutu dan profesional.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan dasar teori yang dipadukan dengan praktek. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mempelajari beberapa literatur yang relevan, profil kesehatan, dan mengakses data melalui internet dalam pembahasan karya tulis ini.

2. Studi Kasus

Melakukan studi kasus dengan plasenta previa di RSIA Siti Fatimah Makassar. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan adalah identifikasi data dasar, identifikasi diagnosis/ masalah aktual dan potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi tindakan, serta mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan.

Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan teknik:

- a. Anamnesis

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, suami, dan keluarga yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisis

Pemeriksaan fisis dilakukan secara sistematis yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan pemeriksaan diagnostik lainnya.

c. Pengkajian Psikososial

Meliputi pengkajian status sosial emosional, pola interaksi ibu terhadap keluarga, tetangga, petugas kesehatan lingkungan, dan pengetahuan tentang kesehatan, serta respon terhadap keadaan yang dialaminya.

d. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

e. Diskusi

Penulis mengadakan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan/ dokter yang menangani langsung klien tersebut, serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Studi kasus ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Ruang Lingkup
- C. Tujuan Penulisan
 - 1. Tujuan Umum
 - 2. Tujuan Khusus
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistemika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perdarahan Antepartum
 - 1. Definisi Perdarahan Antepartum
 - 2. Klasifikasi Perdarahan Antepartum
 - 3. Frekuensi Perdarahan Antepartum
 - 4. Pengawasan Antenatal terhadap Perdarahan Antepartum
 - 5. Penanganan Umum Perdarahan Antepartum
- B. Tinjauan Umum tentang Plasenta
 - 1. Definisi plasenta
 - 2. Perkembangan Plasenta
 - 3. Sirkulasi Melalui Plasenta
 - 4. Fungsi Plasenta Matur
- C. Tinjauan Khusus tentang Plasenta Previa
 - 1. Definisi Plasenta Previa
 - 2. Klasifikasi Plasenta Previa
 - 3. Frekuensi Plasenta Previa

4. Etiologi Plasenta Previa
5. Tanda dan gejala Plasenta Previa
6. Diagnosis Plasenta Previa
7. Pengaruh Plasenta Previa terhadap Kehamilan
8. Pengaruh Plasenta Previa terhadap Partus
9. Komplikasi Plasenta Previa
10. Pemantauan pada Ibu dan Janin
11. Penatalaksanaan Plasenta Previa

D. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Definisi Manajemen Asuhan Kebidanan
2. Prinsip Proses Manajemen Kebidanan
3. Tahapan dalam Manajemen Kebidanan
4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

E. Tinjauan Islam tentang Kehamilan

BAB III: STUDI KASUS

- A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar
- B. Langkah II : Identifikasi Diagnosis/ Masalah Aktual
- C. Langkah III : Identifikasi Diagnosis/ Masalah Potensial
- D. Langkah IV : Tindakan Segera/ Kolaborasi
- E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan
- F. Langkah VI : Implementasi
- G. Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan keadaan nyata yang terjadi di tempat praktek klinik. Pembahasan dilakukan secara sistematis mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perdarahan Antepartum

Salah satu masalah penting dalam bidang obstetri dan ginekologi adalah masalah perdarahan. Walaupun angka kematian maternal telah menurun secara dramatis dengan adanya pemeriksaan dan perawatan kehamilan, maupun persalinan di rumah sakit, serta adanya fasilitas transfusi darah yang lebih baik. Namun, kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan masih tetap merupakan faktor utama dalam kematian maternal.

Perdarahan dalam bidang obstetri hampir selalu berakibat fatal bagi ibu maupun janin, terutama jika tindakan pertolongan terlambat dilakukan, atau jika komponennya tidak dapat segera digunakan. Oleh karena itu, tersedianya sarana dan perawatan sarana yang memungkinkan penggunaan darah dengan segera, merupakan kebutuhan mutlak untuk pelayanan obstetri yang layak.

Perdarahan obstetri dapat terjadi setiap saat, baik selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Oleh karena itu, setiap perdarahan yang terjadi dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas harus dianggap sebagai suatu keadaan akut dan serius, karena dapat membahayakan ibu dan janin. Setiap wanita hamil dan nifas yang mengalami perdarahan, harus segera dirawat dan ditentukan penyebabnya, untuk selanjutnya dapat diberikan pertolongan yang

sesuai dengan diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan tanda atau gejala yang ditemukan (<http://www.kalbe.co.id>).

Perdarahan pada kehamilan muda disebut keguguran atau abortus, sedangkan pada kehamilan tua disebut perdarahan antepartum. Batas teoritis antara kehamilan muda dan kehamilan tua ialah kehamilan 22 minggu, mengingat kemungkinan hidup janin di luar uterus (Wiknjosastro, 2005).

1. Definisi Perdarahan Antepartum

- a. Definisi perdarahan antepartum menurut WHO adalah perdarahan pervaginam yang terjadi setelah 29 minggu kehamilan atau lebih (<http://belajarbersama-nafida.blogspot.com>).
- b. Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 22 minggu, walaupun patologi yang sama dapat pula terjadi pada kehamilan sebelum 22 minggu (Wiknjosastro, 2005).
- c. Perdarahan antepartum adalah perdarahan pada kehamilan setelah 22 minggu sampai sebelum bayi dilahirkan (Saifuddin, 2002).
- d. Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada trimester III dan berkaitan dengan kehamilan (Manuaba, 2004).

2. Klasifikasi Perdarahan Antepartum

Perdarahan antepartum yang berbahaya umumnya bersumber pada kelainan plasenta, sedangkan perdarahan yang tidak bersumber pada kelainan plasenta umpamanya kelainan servik biasanya tidak seberapa berbahaya. Pada setiap perdarahan antepartum pertama-tama harus selalu

dipikirkan bahwa hal itu bersumber pada kelainan plasenta. Perdarahan antepartum yang bersumber pada kelainan plasenta, yang secara klinis biasanya tidak terlampau sulit untuk menentukannya (Wiknjastro, 2005).

Oleh karena itu klasifikasi klinis perdarahan antepartum yang bersumber pada kelainan plasenta adalah sebagai berikut:

a. Plasenta previa, yaitu:

Implantasi plasenta di bagian bawah sehingga dapat menutupi ostium uteri internum, serta menimbulkan perdarahan saat pembentukan Segmen Bawah Rahim (SBR).

b. Solusio plasenta, yaitu:

Perdarahan yang terjadi karena lepasnya plasenta sebelum waktunya pada implantasi normal.

c. Pecahnya sinus marginalis:

Perdarahan yang terjadi dari sinus marginalis saat inpartu atau pembentukan SBR.

d. Perdarahan pada vasa previa:

Perdarahan yang terjadi segera setelah ketuban pecah karena pecahnya pembuluh darah yang berasal dari insersio filamentosa dan melintasi pembukaan (Manuaba, 2004).

Perdarahan yang bersumber pada kelainan serviks dan vagina biasanya dapat diketahui apabila dilakukan pemeriksaan dengan spekulum yang seksama. Kelainan-kelainan yang mungkin tampak ialah sebagai berikut:

- a. Erosio porsionis uteri
- b. Karsinoma porsionis uteri
- c. Polipus servisis uteri
- d. Varises vulva
- e. Trauma (Wiknjosastro, 2005).

3. Frekuensi Perdarahan Antepartum

Frekuensi perdarahan antepartum kira-kira 3% dari seluruh persalinan, yang terbagi kira-kira rata antara plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya (Wiknjosastro, 2005).

4. Pengawasan Antenatal

Kunjungan antenatal untuk pemantauan dan pengawasan ibu dan janin minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut: kehamilan trimester pertama (< 14 minggu) satu kali kunjungan, kehamilan trimester kedua (14-28 minggu) satu kali kunjungan, dan kehamilan trimester ketiga (28-36 minggu dan sesudah minggu ke-36) dua kali kunjungan.

Walaupun demikian, disarankan kepada ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dengan jadwal sebagai berikut: sampai dengan kehamilan 28 minggu, periksa empat minggu sekali, kehamilan 28-36 minggu perlu pemeriksaan dua minggu sekali, kehamilan 36-40 minggu satu minggu sekali.

Bila ada masalah atau gangguan kehamilannya, ibu dianjurkan agar segera menemui petugas kesehatan profesional (bidan atau dokter) untuk penanganan lebih lanjut (Salmah, 2006).

Pengawasan antenatal sebagai cara untuk mengetahui atau menanggulangi kasus-kasus dengan perdarahan antepartum memegang peranan yang terbatas. Walaupun demikian, beberapa pemeriksaan dan perhatian yang biasa dilakukan pada pengawasan antenatal dapat mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi. Pemeriksaan dan perhatian yang dimaksud ialah penentuan golongan darah ibu dan golongan darah calon donornya, pengobatan anemia pada kehamilan, seleksi ibu untuk bersalin di rumah sakit, memperhatikan kemungkinan adanya plasenta previa, dan mencegah, serta mengobati penyakit hipertensi menahun dan pre-eklampsia (<http://medlinux.blogspot.com>).

Penentuan golongan darah ibu dan golongan darah calon donornya, akan sangat memudahkan untuk mendapatkan darah yang cocok apabila sewaktu-waktu diperlukan. Tidak pada semua tempat di tanah air kita terdapat bank donor darah.

Walaupun rumah sakit yang terdekat letaknya jauh, para ibu hamil yang dicurigai akan mengalami perdarahan antepartum, hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk mengawaskan kehamilannya dan bersalin di rumah sakit tersebut (Wiknjosastro, 2005).

5. Penanganan Umum pada Perdarahan Antepartum

- a. Siapkan fasilitas tindakan gawat darurat karena perdarahan antepartum merupakan komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu.
- b. Setiap tingkat fasilitas pelayanan harus dapat mengenali, melakukan stabilisasi, merujuk dan menatalaksana komplikasi pada ibu dan anak sesuai dengan jenjang kemampuan yang ada.
- c. Setiap kasus perdarahan antepartum memerlukan rawat inap dan penatalaksanaan segera.
- d. Lakukan restorasi cairan dan darah sesuai dengan keperluan untuk memenuhi defisit dan tingkat gawat darurat yang terjadi.
- e. Tegakkan diagnosis, kerja secara cepat dan akurat karena hal ini sangat mempengaruhi hasil penatalaksanaan perdarahan antepartum.
- f. Tindakan konservatif dilakukan selama kondisi masih memungkinkan dan mengacu pada upaya untuk memperbesar kemungkinan hidup bayi yang dikandung.
- g. Pada kondisi yang sangat gawat, keselamatan ibu merupakan pertimbangan utama (Saifuddin, 2006).

B. Tinjauan Umum tentang Plasenta

1. Definisi Plasenta

Plasenta merupakan organ yang luar biasa. Plasenta berasal dari lapisan trofoblas pada ovum yang dibuahi, lalu terhubung dengan sirkulasi ibu untuk melakukan fungsi-fungsi yang belum dapat dilakukan oleh janin itu sendiri

selama kehidupan intrauterin. Keberhasilan janin untuk hidup tergantung atas keutuhan dan efisiensi plasenta (Salmah, 2006).

Plasenta berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15 sampai 20 cm dan tebal lebih kurang 2,5 cm. Beratnya rata-rata 500 gram. Tali pusat berhubungan dengan plasenta biasanya di tengah, keadaan ini disebut insersio sentralis. Bila hubungan ini agak ke pinggir, disebut insersio lateralis, dan bila di pinggir plasenta, disebut insersio marginalis. Kadang-kadang tali pusat berada di luar plasenta, dan hubungan dengan plasenta melalui selaput janin, jika demikian disebut insersio velamentosa (Wiknjosastro, 2005).

2. Perkembangan Plasenta

Awalnya ovum tampak dilapisi oleh rambut halus, yang berisi penonjolan dari lapisan trofoblastik. Berproliferasi dan membentuk cabang-cabang dalam 3 minggu setelah pembuahan, membentuk *vili korionik*. Vili-vili paling banyak terdapat pada daerah yang kaya akan suplai darah yaitu di desidua basal. Bagian dari trofoblas ini disebut *korion frondosum* dan akhirnya akan berkembang menjadi plasenta. Vili di bawah desidua kapsular, kurang mendapat makanan, perlahan-lahan berdegenerasi dan membentuk *korion leave* (korion tanpa rambut), yang merupakan asal dari membran korion.

Vili melarutkan dinding pembuluh darah maternal saat memasuki desidua, membuka dinding untuk membentuk semacam kolam tempat berkumpulnya darah maternal, tempat vili mengapung. Pembukaan pada pembuluh darah diketahui sebagai sinus, dan area di sekitar vili adalah ruang darah. Sirkulasi darah maternal itu lambat, memungkinkan vili menyerap

makanan dan oksigen serta mengekskresi sisa buangan. Vili-vili ini dinamakan sebagai vili nutritif. Beberapa vili lebih menempel pada desidua dan dinamakan vili pengikat.

Setiap vili korionik merupakan susunan bercabang yang berasal dari satu badan. Pusatnya terdiri atas mesoderm dan pembuluh darah janin, lalu bercabang ke arteri umbilikus dan vena. Bagian yang dilipisi oleh lapisan tunggal sel sitotrofoblas dan lapisan eksternal vili adalah sintiotrofoblas. Hal ini berarti empat lapisan jaringan maternal tersebut memisahkan darah maternal dari darah janin, serta memungkinkan dua sirkulasi tidak bercampur kecuali ada kerusakan pada vili.

Plasenta terbentuk secara lengkap dan dapat berfungsi secara sempurna mulai minggu ke-10 setelah pembuahan. Awalnya susunan masih longgar, tetapi semakin matur menjadi semakin padat. Di antara minggu ke-12 dan minggu ke-20 usia gestasi, berat plasenta lebih dari janin, karena perkembangan organ-organ janin belum sempurna untuk mengatasi proses metabolisme nutrisi. Pada kehamilan usia selanjutnya beberapa organ janin seperti hati, sudah mulai berfungsi, sehingga sitotrofoblas dan sintiotrofoblas berdegenerasi secara perlahan-lahan dan hal ini memungkinkan lebih mudah terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida (Salmah, 2006).

3. Sirkulasi Melalui Plasenta

Darah janin mengandung sedikit oksigen, dipompa oleh jantung janin menuju ke plasenta melalui arteri umbilikus dan diangkut sepanjang cabang ke

pembuluh darah kapiler vili korionik. Setelah membuang karbon dioksida dan menyerap oksigen, darah kembali ke janin melalui vena umbilikus.

Darah maternal diangkut ke dasar plasenta dalam desidua oleh arteri spiral dan mengalir ke dalam ruang darah di sekitar vili. Diyakini bahwa arah aliran mirip mata air, darah mengalir ke atas dan membasahi vilus saat disirkulasikan disekelilingnya dan mengalir kembali ke dalam cabang-cabang vena uterin (Salmah, 2006).

4. Fungsi Plasenta Matur

Plasenta matur memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Respirasi

Selama kehidupan intrauterin tidak terjadi pertukaran gas pulmonal, sehingga janin harus mendapat oksigen dan mengekskresi karbon dioksida melalui plasenta. Oksigen dari hemoglobin ibu masuk ke dalam darah janin dengan cara difusi, dan dengan cara yang sama, janin melepaskan karbon dioksida ke dalam darah maternal.

b. Nutrisi

Janin membutuhkan zat gizi sama seperti orang lain, dan memperolehnya dengan cara perpindahan aktif melewati plasenta. Asam amino dibutuhkan untuk pembentukan tubuh, sejumlah besar glukosa untuk energi dan pertumbuhan, kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi, serta zat besi dan mineral lainnya untuk pembentukan darah. Makanan janin diperoleh dari makanan yang dimakan ibu dan sudah dipecah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, selama waktu yang diperlukan untuk mencapai

plasenta. Plasenta mampu memilih zat-zat yang dibutuhkan oleh janin, bahkan dalam hal ini mengurangi suplai ibu itu sendiri. Plasenta juga mampu memecah zat makanan yang kompleks menjadi campuran yang dapat digunakan oleh janin. Protein di transfer melalui plasenta sebagai asam amino, karbohidrat sebagai glukosa, dan lemak sebagai asam lemak. Air, vitamin, dan mineral juga lewat ke janin. Lemak dan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, dan E) sedikit sulit menembus plasenta dan biasanya terjadi pada tahapan kehamilan selanjutnya. Beberapa zat, termasuk asam amino, dijumpai kadarnya lebih tinggi dalam darah janin daripada dalam darah ibu.

c. Penyimpanan

Plasenta melakukan metabolisme glukosa, menyimpannya dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa sesuai kebutuhan. Plasenta juga dapat menyimpan zat besi dan vitamin yang larut dalam lemak.

d. Ekskresi

Zat utama yang diekskresi dari janin adalah karbon dioksida. Bilirubin juga diekskresi karena sel darah merah diganti relatif sering. Terdapat sedikit pemecahan jaringan yang terpisah, serta jumlah urea dan asam urat yang diekskresi sangat sedikit.

e. Perlindungan

Plasenta memberikan perlindungan yang terbatas terhadap infeksi. Kecuali treponema yang merupakan bakteri sifilis, dan basilus tuberkel,

hanya sedikit bakteri yang dapat menembusnya. Meskipun demikian virus dengan bebas dapat menembusnya dan menyebabkan anomali kongenital, seperti pada kasus virus rubella. Diasumsikan bahwa obat-obatan juga akan masuk sampai ke janin walaupun ada pengecualian, contohnya heparin. Beberapa obat diketahui menyebabkan kerusakan, walaupun banyak juga yang memberikan keuntungan positif.

Pada masa akhir kehamilan, imunoglobulin G (IgG), ditransfer kepada janin dan akan memberi imunitas kepada bayi selama 3 bulan pertama setelah kelahiran. Penting diketahui bahwa hanya antibodi yang dimiliki sendiri oleh ibu yang dapat masuk ke dalam plasenta (Salmah, 2006).

C. Tinjauan Khusus tentang Plasenta Previa

Plasenta merupakan organ ekstrakorporal yang menghubungkan ibu dan janin serta memiliki fungsi yang unik dan kompleks. Gambaran sonografis plasenta penting dievaluasi sebagai bagian dari asuhan antenatal. Kelainan plasenta akan mempengaruhi kesejahteraan janin, kesehatan ibu, serta manajemen kehamilan, persalinan, dan nifas. Adanya kelainan implantasi plasenta pada kehamilan awal harus disikapi dengan bijaksana karena letak tersebut masih mungkin berubah dengan terbentuknya segmen bawah uterus (SBU) mulai kehamilan 28 minggu (Endjun, 2007).

Plasenta merupakan suatu organ yang terbentuk pada dinding sebelah dalam uterus segera setelah terjadi pembuahan. Zat-zat makanan dan oksigen akan di distribusikan dari ibu ke janinnya melalui plasenta serta membawa

sisa-sisa metabolisme ke luar dari tubuh janin. Normalnya, plasenta melekat pada dinding atas uterus. Bagaimanapun, kurang dari 1 % kelahiran, plasenta terbentuk pada bagian bawah uterus dan sebagiannya menutupi serviks. Penutupan jalan lahir (*serviks*) disebut sebagai plasenta previa (<http://yienmail.wordpress.com>).

Plasenta biasanya melekat pada dinding belakang atau depan rahim dekat fundus. Jonjot-jonjot menyerbu ke dalam dinding rahim hanya sampai lapisan atas dari stratum spongiosum. Kalau implantasinya rendah, yaitu di segmen bawah rahim dan menutup sebagian atau seluruh ostium uteri internum maka disebut sebagai plasenta previa (*prae: depan, vias: jalan*), jadi artinya di depan jalan lahir atau menutup jalan lahir (Wiknjosastro, 2005).

1. Definisi Plasenta Previa

- a. Plasenta Previa adalah uri yang melekat pada segmen bawah rahim, sehingga menutupi mulut rahim sebagian/ seluruhnya (Suseno, 2009).
- b. Plasenta Previa adalah plasenta yang tempat implantasinya abnormal, yaitu di daerah segmen bawah uterus pada kehamilan 20 minggu (Endjun, 2007).
- c. Plasenta Previa adalah lokasi abnormal plasenta di segmen bawah uterus, yang sebagian atau keseluruhannya menutupi os serviks (Chapman, 2006).
- d. Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir (Wiknjosastro, 2005).

- e. Implantasi plasenta dibagian bawah sehingga dapat menutupi ostium uteri internum, serta menimbulkan perdarahan saat pembentukan SBR (Manuaba, 2004).
- f. Plasenta Previa adalah keadaan di mana implantasi plasenta terletak pada atau di dekat serviks (Saifuddin, 2002).
- g. Plasenta Previa adalah implantasi plasenta pada segmen bawah rahim, menutupi atau mencapai serviks (Scott JR, 2002).

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Plasenta Previa didefinisikan sebagai suatu keadaan seluruh atau sebagian plasenta ber-insersi di ostium uteri internum, sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari jalan lahir.

2. Klasifikasi Plasenta Previa

Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal, plasenta terletak di bagian atas uterus.

Klasifikasi plasenta previa tidak didasarkan pada keadaan anatomik melainkan fisiologik. Sehingga klasifikasinya akan berubah setiap waktu. Umpamanya, plasenta previa totalis pada pembukaan 4 cm mungkin akan berubah menjadi plasenta previa parsialis pada pembukaan 8 cm (Wiknjastro, 2005).


Didasarkan atas terabanya jaringan plasenta melalui pembukaan jalan lahir pada waktu tertentu, maka klasifikasi plasenta previa adalah:

- a. Plasenta previa totalis bila seluruh pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta.



Gambar 1. Plasenta Previa Totalis

(Sumber: Perdarahan Antepartum, <http://medlinux.blogspot.com>)




Gambar 2. Plasenta Previa Totalis

(Sumber: Gambar Plasenta Previa, <http://www.google.co.id/images?hl=id&q=plasenta+previa>)

- b. Plasenta previa parsialis bila sebagian pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta.



Gambar 3. Plasenta Previa Parsialis
(Sumber: Perdarahan Antepartum, <http://medlinux.blogspot.com>)




Gambar 4. Plasenta Previa Parsialis
(Sumber: Gambar Plasenta Previa,
<http://www.google.co.id/images?hl=id&q=plasenta+previa>)

- c. Plasenta previa marginalis bila pinggir plasenta berada tepat pada pinggir pembukaan.




Gambar 5. Plasenta Previa Marginalis
(Sumber: Perdarahan Antepartum, <http://medlinux.blogspot.com>)



Gambar 6. Plasenta Previa Marginalis
(Sumber: Gambar Plasenta Previa,
<http://www.google.co.id/images?hl=id&q=plasenta+previa>)

d. Plasenta letak rendah adalah plasenta yang letaknya abnormal di segmen bawah uterus, akan tetapi belum sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Pinggir plasenta berada kira-kira 3 atau 4 cm di atas pinggir pembukaan, sehingga tidak akan teraba pada pembukaan jalan lahir (<http://medlinux.blogspot.com>).



Gambar 7. Plasenta Previa Letak Rendah
(Sumber: Gambar Plasenta Previa,
<http://www.google.co.id/images?hl=id&q=plasenta+previa>)

3. Frekuensi Plasenta Previa

Angka kematian maternal karena plasenta previa berkisar 0,03%. Bayi yang lahir dengan plasenta previa cenderung memiliki berat badan yang rendah dibandingkan bayi yang lahir tanpa plasenta previa. Risiko kematian

neonatal juga tinggi pada bayi dengan plasenta previa, dibandingkan dengan bayi tanpa plasenta previa (<http://medlinux.blogspot.com>).

Plasenta Previa terjadi pada kira-kira 1 di antara 200 persalinan (Norwitz, 2008). Dari semua kejadian plasenta previa, frekuensi plasenta previa totalis (complete) sebesar 20-45%, plasenta previa parsialis sekitar 30%, dan plasenta previa marginalis sebesar 25-50% (<http://www.kabarindonesia.com>).

4. Etiologi Plasenta Previa

Mengapa plasenta yang tumbuh pada segmen bawah uterus tidak selalu dapat diterangkan. Bahwasannya vaskularisasi yang berkurang, atau perubahan atrofi pada desidua akibat persalinan yang lampau dapat menyebabkan plasenta previa, tidaklah selalu benar, karena tidak nyata dengan jelas bahwa plasenta previa didapati untuk sebagian besar pada penderita dengan paritas tinggi. Memang dapat dimengerti bahwa apabila aliran darah ke plasenta tidak cukup atau diperlukan lebih banyak seperti pada kehamilan kembar, plasenta yang letaknya normal sekalipun akan memperluas permukaannya, sehingga mendekati atau menutupi sama sekali pembukaan jalan lahir (Wiknjosastro, 2005).

Penyebab Plasenta Previa belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor risiko yang diduga dapat memicu terjadinya plasenta previa antara lain:

a. Umur dan paritas.

- 1) Pada primigravida yang berumur lebih dari 35 tahun kira-kira 10 kali lebih sering dibandingkan dengan primigravida yang berumur kurang dari 25 tahun.
 - 2) Pada grande multipara yang berumur lebih dari 35 tahun kira-kira 4 kali lebih sering dibandingkan dengan grande multipara yang berumur kurang dari 25 tahun (Wiknjosastro, 2005).
- b. Multiparitas dengan jarak kehamilan yang pendek.
 - c. Bekas dilatasi dan kuretase
 - d. Ibu dengan gizi rendah (Manuaba, 2001).
 - e. Penggunaan kokain. Kemungkinan karena akibat hipertrofi plasenta (Sinclair, 2009).
 - f. Riwayat plasenta previa sebelumnya
 - g. Riwayat persalinan dengan bedah sesar sebelumnya
 - h. Merokok (Norwitz, 2008).

5. Tanda dan Gejala Plasenta Previa

Tanda dan gejala plasenta previa adalah:

- a. Pendarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa, perdarahan pertama biasanya tidak banyak, sehingga tidak akan berakibat fatal. Perdarahan berikutnya hampir selalu banyak dari pada sebelumnya, apalagi kalau sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dalam.
- b. Sumber perdarahan ialah sinus uterus yang robek karena terlepasnya

plasenta dari dinding uterus, atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan, tidak sebagaimana serabut otot uterus menghentikan perdarahan pada kala III dengan plasenta yang letaknya normal. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi. Oleh karena itu, perdarahan pada plasenta previa totalis akan terjadi lebih dini dari pada plasenta letak rendah, yang mungkin baru berdarah setelah persalinan mulai (Wiknjostro, 2005).

- c. Sering terjadi pada malam hari saat pembentukan SBR (Manuaba, 2004).
- d. Bentuk perdarahan
 - 1) Sedikit tanpa menimbulkan gejala klinis
 - 2) Banyak disertai gejala klinik ibu dan janin.
- e. Gejala klinik ibu
 - 1) Tergantung keadaan umum dan jumlah darah yang hilang.
 - 2) Terjadi gejala kardiovaskuler dalam bentuk:
 - a) Nadi meningkat dan tekanan darah menurun
 - b) Anemia
 - c) Perdarahan banyak menimbulkan syok sampai kematian
- f. Gejala klinik janin
 - 1) Bagian terendah belum masuk PAP atau terdapat kelainan letak
 - 2) Perdarahan mengganggu sirkulasi retroplasenter, menimbulkan asfiksia intra uterin sampai kematian janin

- 3) HB sekitar 5 gr/dl dapat menimbulkan kematian janin dan ibunya (Manuaba, 2001).

6. Diagnosis Plasenta Previa

Pada setiap perdarahan antepartum, pertama kali harus dicurigai bahwa penyebabnya ialah plasenta previa sampai kemudian ternyata dugaan itu salah.

a. Anamnesis/ keluhan:

- 1) Gejala pertama yang membawa ibu hamil ke dokter atau rumah sakit ialah perdarahan pada kehamilan setelah 22 minggu (Winkjosastro, 2005).
- 2) Sifat perdarahannya adalah:
 - a) Tanpa sebab (*causeless*): Perdarahan timbul sekonyong-konyong tanpa sebab apapun. Kadang-kadang perdarahan terjadi sewaktu bangun tidur misalnya pada pagi hari tanpa disadari tempat tidur sudah penuh darah.
 - b) Tanpa nyeri (*painless*)
 - c) Berulang (*recurrent*): Perdarahan cenderung berulang dengan volume yang lebih banyak dari sebelumnya.

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Inspeksi
 - a) Dapat dilihat perdarahan yang keluar pervaginam: banyak, sedikit, darah beku dan sebagainya.
 - b) Kalau telah berdarah banyak maka ibu kelihatan pucat/anemis.

2) Palpasi

- a) Janin sering belum cukup bulan, jadi fundus uteri masih rendah
- b) Sering dijumpai kesalahan letak janin
- c) Bagian terbawah janin belum turun , apabila letak kepala, biasanya kepala masih goyang atau terapung (*floating*) atau mengolok di atas pintu atas panggul
- d) Bila cukup pengalaman, dapat dirasakan suatu bantalan pada segmen bawah rahim terutama pada ibu yang kurus
(<http://irwanashari.blogspot.com>).

c. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam sangat berbahaya sehingga kontraindikasi untuk dilakukan kecuali fasilitas operasi segera tersedia.

1) Bahaya pemeriksaan dalam:

- a) dapat menyebabkan perdarahan yang hebat
- b) Infeksi
- c) Menimbulkan his, dan kemudian terjadilah partus prematurus.

2) Teknik dan persiapan pemeriksaan dalam

- a) pasang infus dan persiapkan donor darah
- b) PD dilakukan di kamar bedah
- c) Dilakukan secara hati-hati dan lembut
- d) Jangan langsung masuk ke dalam canalis servikalis tapi raba dulu bantalan antara jari dan kepala janin pada forniks (uji forniks)
- e) Bila ada darah beku, keluarkan sedikit-sedikit dan pelan

- 3) Kegunaan PD dalam perdarahan antepartum
 - a) menegakan diagnosa
 - b) menentukan jenis dan klasifikasi plasenta previa
- 4) Indikasi PD pada perdarahan antepartum
 - a) perdarahan banyak, >500 cc
 - b) perdarahan berulang (recurrent)
 - c) perdarahan sekali, banyak, HB < 8 g%
 - d) his ada dan janin viable (<http://adilla-itsme.blogspot.com>)

d. Pemeriksaan dengan alat

1) Pemeriksaan inspekulo

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perdarahan berasal dari ostium uteri eksternum atau dari kelainan serviks dan vagina, seperti erosio porsionis uteri, karsinoma porsionis uteri, polipus servisis uteri, varises vulva, dan trauma. Apabila perdarahan berasal dari ostium uteri eksternum, adanya plasenta previa harus dicurigai.

2) Pemeriksaan radiografi dan radioisotopi

Penentuan letak plasenta secara tidak langsung dapat dilakukan dengan radiografi dan radioisotopi. Nilai diagnostiknya cukup tinggi di tangan yang ahli, akan tetapi ibu dan janin pada pemeriksaan ini masih dihadapkan pada bahaya radiasi yang cukup tinggi, sehingga cara ini mulai ditinggalkan.

3) Ultrasonografi

Penentuan letak plasenta dengan cara ini ternyata sangat tepat, tidak menimbulkan bahaya radiasi bagi ibu maupun janinnya, dan tidak menimbulkan rasa nyeri (Winkjosastro, 2005).

7. Pengaruh Plasenta Previa terhadap kehamilan

Karena dihalangi oleh plasenta maka bagian terbawah janin tidak terfiksir kedalam pintu atas panggul. Sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan letak janin (letak kepala mengantung, letak sungsang, dan letak lintang).

Sering terjadi partus prematurus karena adanya rangsangan koagulum darah pada serviks. Selain itu, jika banyak plasenta yang lepas, kadar progesteron turun dan dapat terjadi his, juga lepasnya plasenta sendiri dapat merangsang his. Dapat juga karena pemeriksaan dalam (<http://askep-askeb.cz.cc>).

8. Pengaruh Plasenta Previa terhadap partus

- a. Letak janin yang tidak normal, menyebabkan partus akan menjadi patologik.
- b. Bila pada plasenta previa lateralis, ketuban pecah atau dipecahkan dapat terjadi prolaps funikuli.
- c. Sering dijumpai inersia primer.
- d. Perdarahan (<http://adilla-itsme.blogspot.com>).

9. Komplikasi Plasenta Previa

- a. Prolaps tali pusat

- b. Prolaps plasenta
- c. Plasenta melekat, sehingga harus dikeluarkan manual dan kalau perlu dibersihkan dengan kerokan
- d. Robekan-robekan jalan lahir karena tindakan
- e. Perdarahan postpartum
- f. Infeksi karena perdarahan yang banyak
- g. Bayi prematur atau lahir mati (<http://medlinux.blogspot.com>).

10. Pemantauan Ibu dan Janin

- a. Tanda vital

Pantau dengan ketat tanda vital ibu, takikardia biasanya tanda pertama gangguan janin karena kehilangan darah.

- b. Infus intravena

Untuk mengganti cairan, pastikan cairan IV berjalan lancar, dokter mungkin mempertimbangkan pemberian produk darah.

- c. Pengukuran kehilangan darah

Gantilah dan amankan balutan yang basah dengan bijaksana namun pastikan privasi ibu saat melakukannya, jagalah perbandingan yang selalu diperbaharui dan perkiraan kehilangan darah terukur pada kartu cairan.

- d. Kemungkinan diperlukan anestesi

Pastikan bahwa dokter telah di beri informasi dan dapat mengkaji situasi ibu tentang kemungkinan memerlukan anestesi.

e. Pantau denyut jantung janin

Perubahan DJJ mendadak atau abnormal (seperti peningkatan/takikardia) bisa menunjukkan adanya gangguan yang disebabkan oleh kehilangan darah berat. Lakukan respon segera terhadap pola abnormal (Chapman, 2006).

11. Penatalaksanaan Plasenta Previa

a. Terapi Spesifik

1) Terapi ekspektatif

- a) Tujuan supaya janin tidak terlahir premature, penderita dirawat tanpa melakukan pemeriksaan dalam melalui kanalis servikalis.

Syarat-syarat terapi ekspektif :

- (1) Kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti.
- (2) Belum ada tanda-tanda inpartu.
- (3) Keadaan umum ibu cukup baik.
- (4) Janin masih hidup.

- b) Rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotik profilaksis.

- c) Lakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui implantasi plasenta.

- d) Berikan tokolitik bila ada kontraksi :

- (1) MgSO₄ 4 gram IV dosis awal tunggal, dilanjutkan 4 gram setiap 6 jam.
- (2) Nifedipin 3 x 20 mg perhari.

- (3) Betamethason 24 mg IV dosis tunggal untuk pematangan paru janin.
 - e) Uji pematangan paru janin dengan tes kocok dari hasil amniosentesis.
 - f) Bila setelah usia kehamilan diatas 34 minggu, plasenta masih berada disekitar ostium uteri interim.
 - g) Bila perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37 minggu masih lama, pasien dapat dipulangkan untuk rawat jalan.
- 2) Terapi aktif (tindakan segera).

Wanita hamil diatas 22 minggu dengan perdarahan pervaginam yang aktif dan banyak, harus segera ditatalaksanakan secara aktif tanpa memandang maturitas janin. Lakukan PDMO jika :

- a) Infus/ transfusi telah terpasang, kamar dan tim operasi telah siap.
- b) Kehamilan > 37 minggu (berat badan 2500 gram) dan inpartu.
- c) Janin telah meninggal atau terdapat anomali kongenital mayor, seperti aneasefali.
- d) Perdarahan dengan bagian terbawah janin telah jauh melewati pintu atas panggul (2/5 atau 3/5 pada palpasi luar).

(<http://yuwielueninet.wordpress.com>).

b. Cara Menyelesaikan Persalinan dengan Plasenta Previa

1) Melahirkan pervaginam

Perdarahan akan berhenti jika ada penekanan pada plasenta. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Amniotomi dan akselerasi

Umumnya dilakukan pada plasenta previa lateralis/ marginalis dengan pembukaan > 3 cm serta presentasi kepala. Dengan memecah ketuban, plasenta akan mengikuti segmen bawah rahim dan ditekan oleh kepala janin. Jika kontraksi uterus belum ada atau masih lemah, akselerasi dengan infus oksitosin

b) Versi Braxton Hicks

Tujuan melakukan versi Baxton Hicks ialah mengadakan tamponade plasenta dengan bokong (dan kaki) janin. Versi Braxton Hicks tidak dilakukan pada janin yang masih hidup.

c) Traksi dengan Cunam Willet

Kulit kepala janin dijepit dengan Cunam Willet, kemudian beri beban secukupnya sampai perdarahan berhenti. Tindakan ini kurang efektif untuk menekan plasenta dan seringkali menyebabkan perdarahan pada kulit kepala. Tindakan ini biasanya dikerjakan pada janin yang telah meninggal dan perdarahan tidak aktif (<http://irwanashari.blogspot.com>).

2) Cara menyelesaikan persalinan dengan plasenta previa seksio sesarea:

a) Prinsip utama adalah menyelamatkan ibu, walaupun janin meninggal atau tidak punya harapan untuk hidup, tindakan ini tetap dilakukan.

b) Tujuan seksio sesarea :

(1) Melahirkan janin dengan segera sehingga uterus dapat segera berkontraksi dan menghentikan perdarahan.

- (2) menghindarkan kemungkinan terjadi robekan pada serviks uteri, jika janin dilahirkan pervaginam.
- c) Siapkan darah pengganti untuk stabilisasi dan pemulihan kondisi ibu (Saifuddin, 2006).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, dan ketrampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Salmah, 2006).

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Hidayat, 2009).

2. Prinsip Proses Manajemen Kebidanan

- a. Secara sistematis mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengumpulkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.
- b. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosis berdasarkan interpretasi data dasar.

- c. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kebidanan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kebidanan bersama klien.
- d. Memberi informasi dan support, sehingga klien dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya.
- e. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien.
- f. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individu.
- g. Melakukan konsultasi, perencanaan, dan melaksanakan manajemen dengan kolaborasi, serta merujuk klien untuk mendapatkan asuhan selanjutnya.
- h. Merencanakan manajemen terhadap komplikasi tertentu, dalam situasi darurat dan bila ada penyimpangan dari keadaan normal.
- i. Melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan (Hidayat, 2009).

3. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Langkah I: Identifikasi/ Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Anamnesis
- 2) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan TTV
- 3) Pemeriksaan khusus
- 4) Pemeriksaan penunjang

Bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter dalam penatalaksanaan maka bidan perlu melakukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya, sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus yang komprehensif meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan. Sehingga dapat menggambarkan kondisi/ masukan klien yang sebenarnya dan valid. Kaji ulang data yang sudah dikumpulkan apakah sudah tepat, lengkap, dan akurat.

b. Langkah II: Identifikasi Diagnosis/ Masalah Aktual

Pada langkah ini identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosis dan masalah, keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis, tetapi tetap membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan.

c. Langkah III: Antisipasi Diagnosis/ Masalah Potensial

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi.

d. Langkah IV: Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/ dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan. Jadi, penatalaksanaan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus.

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/ kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa/ masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan emergency/ segera untuk segera ditangani baik ibu maupun bayinya. Dalam rumusan ini yang termasuk

tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, yakni kolaborasi atau yang bersifat rujukan.

e. Langkah V: Merencanakan Asuhan Kebidanan/ Intervensi

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut, seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural atau masalah psikologi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif, karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date, serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

f. Langkah VI: Melaksanakan Asuhan Kebidanan/ Implementasi

Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara aman dan efisien.

Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam kondisi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penatalaksanaan asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Pelaksanaan yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien.

g. Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosis dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan, serta berorientasi pada proses klinis, karena proses penatalaksanaan tersebut berlangsung di dalam situasi klinik dan dua langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik (Salmah, 2006).

4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pengertian dokumentasi menurut Ellen Thomas (1994) adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim

kesehatan yang mencatat tentang hasil pemeriksaan prosedur, pengobatan pada pasien, dan pendidikan kepada pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan (Salmah, 2006).

a. S: Subjective

- 1) Menggambarkan pendokumentasian yang hanya meliputi pengumpulan data klien melalui anamnesis.
- 2) Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat menarche, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikososial, dan pola hidup).
- 3) Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosis. Pada orang yang bisu, dibagian data dibelakang "S" diberi tanda "0" atau "X". Ini menandakan orang itu bisu. Data subjektif menguatkan diagnosis yang akan dibuat.

b. O: Objective

- 1) Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan fisis klien, serta hasil lab, dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assessment.
- 2) Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, vital sign, fisik, khusus, kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium,

dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi.

- 3) Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil Laboratorium, sinar X, rekaman CTG, dan lain-lain). Informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam kategori ini. Apa yang diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosis yang akan ditegakkan.

c. A: *Assesment*

- 1) Masalah atau diagnosis yang ditegakkan, berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif, dan sering diungkapkan secara terpisah, maka proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. Sering menganalisa adalah sesuatu yang penting dalam mengikuti perkembangan pasien, menjamin suatu perubahan baru akan cepat diketahui, dan dapat diikuti sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat.
- 2) Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi.
 - a) Diagnosis/ masalah

- (1) Diagnosis adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi klien: hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat.
 - (2) Masalah adalah segala sesuatu yang menyimpang, sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan/ kesehatan, tetapi tidak masuk dalam diagnosis.
- b) Antisipasi masalah lain/ diagnosis potensial.
 - c) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/ kolaborasi, dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney.

d. P: *Planning*

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan Assesment. SOAP untuk perencanaan, implementasi dan, evaluasi dimasukkan dalam "P".

1) Perencanaan

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang. Untuk mengusahakan tercapainya kondisi klien yang sebaik mungkin, atau menjaga mempertahankan kesejahteraannya. Proses ini termasuk kriteria tujuan tertentu dari kebutuhan klien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu, tindakan yang diambil harus membantu klien mencapai kemajuan dalam kesehatan dan harus sesuai dengan instruksi dokter.

2) Implementasi


Pelaksanaan rencana tindakan untuk menghilangkan dan mengurangi masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh klien, kecuali bila tidak

dilaksanakan akan membahayakan keselamatan klien. Oleh karena itu klien harus sebanyak mungkin menjadi bagian dari proses ini. Bila kondisi klien berubah, intervensi mungkin juga harus berubah atau disesuaikan.

3) Evaluasi

Tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil merupakan hal penting untuk menilai keefektifan asuhan yang diberikan. Analisis dari hasil yang dicapai menjadi fokus dari ketepatan nilai tindakan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif untuk penanganan yang lebih baik, sehingga tujuan yang telah ditargetkan dapat segera tercapai (<http://akbidypsDMI.net/download/pdf/dokSoap.pdf>).

Bagan 1. Menggambarkan keterkaitan manajemen kebidanan dan SOAP



Bagan 1. Keterkaitan manajemen kebidanan dan SOAP (Salmah, 2006).

E. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan

Manusia diciptakan dari dua jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan dikaruniai daya tarik dan saling mencintai antar lawan jenis. Oleh karena itu untuk melegitimasi hal tersebut, agama Islam mengaturnya dalam proses pernikahan. Dalam pernikahan inilah akan terjadi proses pembuahan/ kehamilan (Thalbah, 2009. Jilid 3).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Kehamilan berasal dari satu sel mikroskope yang telah dibuahi. Sel ini terbentuk apabila salah satu sperma bersatu dengan satu sel telur di dalam pipa (saluran fallopi) yang bersambung dengan rahim, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kehamilan.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Abasa (80): 19

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾

Terjemahannya:

“Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya”.

Ayat di atas menginformasikan bahwa makhluk itu berasal dari sperma pria yang bercampur dengan sperma wanita (sel telur). Hanya satu spermatozoa saja yang berhasil menembus sekat-sekat penghalang yang mengitari sel telur. Ia masuk ke dalam sitoplasma (*cytoplasm*) sel telur yang berjalan cepat dengan memisahkan enzim-enzim lainnya yang dapat menghalangi spermatozoa lainnya dalam menembus sel telur (Thalbah, 2009. Jilid 2).

Makna dari kata “*menentukannya*” dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT. menentukan bagaimana fase kejadian seorang manusia, apakah berjalan dengan normal atau disertai dengan komplikasi yang dapat mempersulit proses kejadiannya. Selain itu kata “*menentukannya*” juga bermakna bahwa pada proses penciptaan manusia, Allah SWT. telah menentukan bagaimana rizki, umur, dan nasib setiap individu.

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, 2006).

Masa kehamilan seorang wanita bervariasi. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi wanita tersebut berada (Thalbah, 2009, jilid 3).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Lukman (31): 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur (Wiknjosastro, 2007).

Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan adalah suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Sebab, hal tersebut bermula dari satu sel mikroskope yang telah dibuahi, yang mengandung berbagai macam fungsi alat tubuh calon manusia baru, dalam kurung waktu kurang lebih 9 bulan. Perkembangan janin dalam kandungan adalah melalui beberapa fase atau periode (Thalbah, 2009.jilid 3).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Mukminun (23): 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدَشْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرًا فَتَبَارَكَ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahannya:

“Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.

Ayat di atas menjelaskan proses kejadian manusia. Dikemukakan juga tujuh tahap proses kejadian manusia, sehingga ia lahir di pentas bumi ini. Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan, mengingatkan akan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Hal itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi (Shihab, 2002).

Apabila manusia mau memikirkan dan merenungkan segala sesuatu yang terkait dengan penciptaannya, pasti dia akan mendapati petunjuk yang sangat jelas bahwa semua itu ada yang menciptakan, mengatur, dan membentuknya (Thalbah, 2009, jilid 2).

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “R” KEHAMILAN 27
MINGGU 5 HARI DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR

TANGGAL 19 JUNI 2010

No Register : 049284
Tgl Kunjungan : 19 Juni 2010, jam 12.50 Wita
Tgl Pengkajian : 19 Juni 2010, jam 14.30 Wita
Pengkaji : Hilmiah

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas istri/ suami

Nama : Ny “R” / Tn”K”
Umur : 35 tahun / 43 tahun
Nikah/ lamanya : 1x / ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Lure, No. 58

2. Data biologis

- a. Keluhan utama: ibu mengeluh ada pengeluaran darah dari jalan lahir secara tiba-tiba.
- b. Riwayat keluhan utama:
 - 1) Keluhan dialami sejak tanggal 19 Juni 2010, jam: 11.30 Wita
 - 2) Ibu mengatakan pernah keluar darah dari jalan lahir pada waktu umur kehamilan 23 minggu dalam jumlah yang hanya sedikit.
 - 3) Ibu mengatakan kali ini keluar darah berwarna merah segar, ada gumpalan tanpa disertai rasa nyeri.
 - 4) Darah yang keluar tidak terlalu banyak, tapi ibu tetap merasa sangat cemas karena perdarahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya.

3. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya
- b. HPHT: 7 Desember 2009
- c. HTP: 14 September 2010
- d. Ibu mengatakan kehamilannya memasuki usia 7 bulan
- e. Pergerakan janin dirasakan ibu sejak umur kehamilan 16 minggu sampai sekarang.
- f. Pergerakan janin dirasakan ibu terutama pada perut sebelah kanan.
- g. Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut yang hebat selama hamil.
- h. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya
- i. Ibu mengeluh agak pusing ketika terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir.

j. Ibu sudah mendapatkan imunisasi TT 2x (lengkap) di puskesmas

1) TT1 tanggal 27 Februari 2010

2) TT2 tanggal 1 April 2010

4. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

No	Tahun Persalinan	UK	Penolong Persalinan	Jenis Persalinan	Jenis Kelamin	Berat Badan Lahir	Tempat Persalinan	Nifas
1	2000	Aterm	Dokter	PPN	L	2800 gr	RS	Normal
2	2007	Aterm	Dokter	PPN	L	3000 gr	RS	Normal
3	2010	Kehamilan Sekarang						

5. Riwayat kesehatan ibu dan keluarga

a. Riwayat penyakit

Ibu tidak pernah menderita penyakit yang serius seperti jantung, hipertensi, hepar, DM, malaria, TBC, gangguan mental dan operasi. Dalam keluarga tidak ada penyakit keturunan.

b. Perilaku kesehatan

Ibu tidak pernah meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sejenisnya, serta tidak pernah meminum jamu ataupun merokok, pencucian vagina dilakukan dengan menggunakan sabun setiap kali mandi, BAK dan BAB.

6. Riwayat menstruasi

a. Menarche : 13 tahun

b. Siklus Haid : 28-30 hari

- c. Durasi Haid : 5-7 hari
- d. Perlangsungan : Tidak ada

7. Riwayat ginekologi

Ibu tidak pernah menderita Penyakit Menular Seksual (PMS) ataupun penyakit infeksi dan tumor pada alat reproduksi.

8. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntikan depo progestin selama \pm 2 tahun yang lalu. Penggunaan dihentikan karena ibu ingin mempunyai anak lagi.

9. Data sosial ekonomi

- a. Ibu mengatakan ini pernikahannya yang pertama dengan suaminya yang sekarang
- b. Keluarga sangat senang dengan kehamilan ibu.
- c. Ibu berencana melahirkan di RSIA Siti Fatimah Makassar.
- d. Ibu tinggal bersama suami dan keluarga, pekerjaan rumah tangga dibantu keluarga
- e. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
- f. Penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari

10. Data spiritual dan psikososial

- a. Ibu terus berdo'a untuk keselamatan diri dan bayinya
- b. Ibu dan keluarga senantiasa pasrah tentang keadaannya dan bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Ibu selalu didampingi oleh suaminya untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas atau RS.

- d. Ibu biasanya selalu senang dan bahagia menjalani kehamilannya, tapi dengan keadaannya yang sekarang ibu merasa sangat cemas dan khawatir.
- e. Keadaan emosi ibu tetap stabil

11. Pola pemenuhan kebutuhan dasar

a. Kebutuhan nutrisi

1) Sebelum hamil

- a) Makan : nasi dan lauk-pauk (ikan, sayur, tempe) serta buah-buahan
- b) Frekuensi: 3 kali/ hari
- c) Minum : 6-8 gelas/ hari

2) Selama hamil

- a) Makan : nasi dan lauk-pauk (ikan, sayur, tempe) serta buah-buahan
- b) Frekuensi: 3 kali/ hari
- c) Minum: 6-8 gelas/ hari

3) Perubahan selama di RS

Makan dan minum berubah, makanan tidak dihabiskan dan minum hanya sedikit saja.

b. Kebutuhan eliminasi

1) Sebelum hamil

- a) BAK 5-6 kali/ hari, warna kuning jernih, berbau amoniak
- b) BAB 1 kali/ hari, warna kuning kecoklatan, konsistensi padat

2) Selama hamil

- a) BAK 5-6 kali/ hari, warna kuning jernih, berbau amoniak

- b) BAB 1 kali/ hari, warna kuning kecoklatan, konsistensi padat
- 3) Perubahan selama di RS
 - a) BAK sering, warna kuning jernih, berbau amoniak
 - b) BAB belum pernah
- c. Personal hygiene
 - 1) Sebelum hamil
 - a) Mandi 2 kali/ hari dengan menggunakan sabun mandi
 - b) Gosok gigi 2 kali/ hari dengan menggunakan pasta gigi
 - c) Keramas 2 kali/ hari dengan menggunakan shampo
 - 2) Selama hamil
 - a) Mandi 2 kali/ hari dengan menggunakan sabun mandi
 - b) Gosok gigi 2 kali/ hari dengan menggunakan pasta gigi
 - c) Keramas 2 kali/ hari dengan menggunakan shampo
 - 3) Perubahan selama di RS
 - a) Ibu belum pernah mandi
- d. Kebutuhan istirahat
 - 1) Sebelum hamil
 - a) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - b) Tidur malam 7-8 jam/ hari
 - 2) Selama hamil
 - a) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - b) Tidur malam 6-8 jam/ hari
 - 3) Perubahan selama di RS

- a) Selama pengkajian ibu belum pernah tidur dan hanya berbaring saja, karena masih khawatir dengan keadaanya.

12. Pemeriksaan fisik

a. KU ibu cukup baik, kesadaran komposmentis

b. TB: 148 cm

c. Lila: 23 cm

d. BB: 53 Kg

e. Tanda-tanda Vital:

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 88 x/ menit

Pernapasan : 24 x/ menit

Suhu : 36,6⁰ C

f. Kepala

1) Inspeksi: Rambut hitam dan lurus

2) Palpasi: Tidak ada massa dan nyeri tekan

g. Wajah

1) Inspeksi: Tidak tampak adanya oedema, konjungtiva tampak sedikit pucat, sklera putih dan tidak ikterus, ekspresi wajah ibu tampak cemas.

h. Leher

1) Inspeksi: tidak tampak adanya pembesaran kelenjar tyroid, pembuluh limfe, dan vena jugularis.

- 2) Palpasi: Tidak teraba adanya pembesaran pada kelenjar limfe, kelenjar tyroid dan vena jugularis, tidak ada nyeri tekan.

i. Payudara

- 1) Inspeksi: Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk dan bersih, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.
- 2) Palpasi: Tidak teraba adanya massa, kolostrum belum ada.

j. Abdomen

- 1) Inspeksi: Tampak *striae livide* dan *striae albicantes*, dinding perut sudah kendur, tidak ada luka bekas operasi dan pembesaran perut sesuai dengan umur kehamilan.
- 2) Palpasi abdomen:
Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus
Leopold II : Punggung kiri
Leopold III : Kepala
Leopold IV : BAP
- 3) Auskultasi: DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah dengan frekuensi 142x/menit.
- 4) Perkusi: terdengar bunyi timpani pada perkusi abdomen

k. Ekstremitas

- 1) Inspeksi: Tidak tampak ada oedema dan varises
- 2) Palpasi: tidak teraba adanya oedema.
- 3) Perkusi: Refleks patella positif kiri dan kanan

1) Data subjektif:

- (a) Ibu mengatakan ini kehamilannya yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya.
- (b) Pergerakan janin dirasakan ibu sejak umur kehamilan 16 minggu sampai sekarang.

2) Data objektif:

- (a) Dinding perut tampak kendur
- (b) Tampak *striae livide* dan *striae albicantes*.
- (c) Palpasi abdomen:

Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

- (d) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

- (a) Pada ibu multigravida, tonus otot perut tampak kendur karena telah mengalami peregangan pada kehamilan sebelumnya. Serta tidak jarang dijumpai kulit perut seolah retak-retak, warnanya berubah agak hiperemik dan kebiru-biruan, disebut *striae livide*. Setelah partus, *striae livide* ini berubah warna menjadi putih dan disebut *striae albicantes*. Pada seorang multigravida sering tampak *striae livide* dan *striae albicantes* (Winkjosastro, 2005).

(b) Dengan terabanya bagian-bagian janin, dan terdengarnya DJJ, serta dirasakannya gerakan janin merupakan tanda pasti kehamilan yang menandakan bahwa ibu dalam keadaan hamil (Winkjosastro, 2005).

b. Gestasi 27 minggu 5 hari

1) Data subjektif:

(a) Ibu mengatakan umur kehamilannya memasuki usia 7 bulan

(b) HPHT tanggal 7 Desember 2009

2) Data objektif:

(a) Tanggal pengkajian: 19 Juni 2010

(b) Leopold I: TFU 3 jari atas pusat, 28 cm

(c) HTP tanggal 14 September 2010

3) Analisis dan interpretasi data:

(a) Dari HPHT tanggal 7 Desember 2009 sampai tanggal pengkajian 19 Juni 2010, masa gestasi ibu 27 minggu 5 hari.

(b) TFU: 3 jari atas pusat dengan gestasi 27 minggu 5 hari merupakan kehamilan yang normal.

c. Situs memanjang

1) Data subjektif:

(a) Pergerakan janin dirasakan oleh ibu terutama pada perut sebelah kanan sejak kehamilan 16 minggu sampai sekarang.

2) Data objektif:

(a) Palpasi abdomen:

Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

(b) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

(a) Berdasarkan hasil palpasi leopold II, didapatkan sumbu panjang janin memanjang terhadap sumbu panjang ibu yang biasa disebut situs memanjang (<http://ibu-dan-bayi.blogspot.com>).

d. Tunggal

1) Data subjektif:

(a) Pergerakan janin dirasakan oleh ibu terutama pada perut sebelah kanan sejak kehamilan 16 minggu sampai sekarang.

2) Data objektif:

(a) Palpasi abdomen:

Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

(b) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

- (a) Pembesaran perut sesuai umur kehamilan, teraba satu bokong, satu punggung, satu kepala, dan DJJ terdengar hanya pada satu titik, serta pergerakan janin dirasakan hanya pada satu sisi perut ibu, menandakan janin tunggal.

e. Hidup

1) Data subjektif:

- (a) Pergerakan Pergerakan janin dirasakan oleh ibu pada perut sebelah kanan sejak kehamilan 16 minggu sampai sekarang.

2) Data objektif:

(a) Palpasi abdomen:

Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

- (b) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

- (a) Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibu pada kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida pada gestasi 16 minggu. Dan gerakan janin pada kehamilan 20 minggu kadang-kadang dapat diraba secara objektif oleh pemeriksa.

- (b) Dengan stetoskop *Laennec* bunyi jantung janin baru dapat didengar pada kehamilan 18-20 minggu. Dan pada umur kehamilan

selanjutnya gerakan janin lebih gesit serta dapat pula didengar lebih jelas. Dengan dirasakannya gerakan janin oleh ibu dan diraba oleh pemeriksa, serta terdengarnya DJJ menandakan janin hidup (Winkjosastro, 2005).

f. Intrauterine

1) Data subjektif:

(a) Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut yang hebat selama hamil

2) Data objektif:

(a) Palpasi abdomen:

Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

(b) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

(a) Bagian dari uterus yang merupakan tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri, dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa menimbulkan rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam kavum uteri yang disebut dengan kehamilan intrauterine.

g. Keadaan janin baik

1) Data subjektif:

- (a) Pergerakan janin dirasakan oleh ibu sejak kehamilan 16 minggu sampai sekarang.

2) Data objektif:

- (a) Auskultasi DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/ menit.

3) Analisis dan interpretasi data:

- (a) Frekuensi DJJ dalam batas normal (120-160 x/menit) dan pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu, serta pertumbuhan dan pembesaran perut sesuai umur kehamilan menandakan janin dalam keadaan baik (<http://zulkiplithamrin.blogspot.com>).

i. Keadaan ibu dengan plasenta previa totalis

1) Data subjektif:

- (a) Ibu mengeluh ada pengeluaran darah segar dari jalan lahir secara tiba-tiba, tanpa disertai rasa nyeri.
- (b) Pengeluaran darah terjadi untuk yang kedua kalinya.

2) Data objektif:

- (a) Tampak pengeluaran darah segar pervaginam disertai gumpalan.
- (b) Gestasi 27 minggu 5 hari
- (c) G_{III} P_{II} A₀
- (d) Hasil pemeriksaan USG: plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus dan menutupi ostium uteri internum.

3) Analisis dan interpretasi data:

- (a) Dari hasil pemeriksaan USG, diketahui bahwa plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus dan menutupi ostium uteri internum atau biasa disebut dengan plasenta previa totalis.
- (b) Pendarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa, perdarahan pertama biasanya tidak banyak, sehingga tidak akan berakibat fatal. Perdarahan berikutnya hampir selalu banyak dari pada sebelumnya, apalagi kalau sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dalam (Wiknjosostro, 2005).
- (c) Sumber perdarahan ialah sinus uterus yang robek karena terlepasnya plasenta dari dinding uterus, atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi. Oleh karena itu, perdarahan pada *plasenta previa totalis* akan terjadi lebih dini dari pada plasenta letak rendah, yang mungkin baru berdarah setelah persalinan mulai (Wiknjosostro, 2005).

2. Masalah:

a. Anemia ringan

1) Data subjektif:

- (a) Ibu mengeluh keluar darah segar dari jalan lahir secara tiba-tiba.

(b) Ibu mengeluh agak pusing ketika terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir.

2) Data objektif:

(a) Konjungtiva ibu tampak agak pucat

(b) Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 110/ 70 mmHg

Nadi : 88 x/ menit

Pernapasan : 24 x/ menit

Suhu : 36,6⁰ C

(c) HB: 10 gr%

3) Analisis dan interpretasi data:

(a) Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan. Hal tersebut disebabkan karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan dalam darah dan sumsum tulang.

(b) Perdarahan atau pengeluaran darah dari jalan lahir dapat menyebabkan terjadinya anemia dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya syok.

(c) Darah bertambah banyak dalam kehamilan, yang lazim disebut hidremia atau hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah, yang menyebabkan kadar Hb dalam darah berkurang. Seorang wanita hamil yang memiliki Hb 10-12 gr% ml,

dikatakan anemia fisiologik, sedangkan apabila Hb < 10 gr% ml dikatakan menderita anemia patologik (Wiknjostro, 2005).

b. kecemasan

1) Data subjektif:

(a) Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya

2) Data objektif:

(a) Ekspresi wajah ibu tampak cemas

3) Analisis dan interpretasi data:

Kecemasan dapat didefinisikan suatu keadaan perasaan keprihatinan, rasa gelisah, ketidaktentuan, atau takut dari kenyataan atau persepsi ancaman sumber aktual yang tidak diketahui atau dikenal (<http://perawatpskiatri.blogspot.com>).

C. LANGKAH III: ANTISIPASI DIAGNOSIS/ MASALAH POTENSIAL

1. Antisipasi terjadinya perdarahan antepartum

1) Data subjektif:

(a) Ibu mengeluh keluar darah berwarna merah segar dari jalan lahir secara tiba-tiba.

(b) Ibu mengeluh agak pusing ketika terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir.

(c) Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya

2) Data objektif:

(a) Ekspresi wajah ibu tampak cemas.

(b) Konjungtiva ibu tampak agak pucat.

- (c) Gestasi 27 minggu 5 hari
- 3) Analisis dan interpretasi data:
- (a) Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 22 minggu, walaupun patologi yang sama dapat pula terjadi pada kehamilan sebelum 22 minggu.
 - (b) Pendarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa, perdarahan pertama biasanya tidak banyak, sehingga tidak akan berakibat fatal. Perdarahan berikutnya hampir selalu banyak dari pada sebelumnya, apalagi kalau sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dalam (Wiknjosostro, 2005).
 - (c) Sumber perdarahan ialah sinus uterus yang robek karena terlepasnya plasenta dari dinding uterus, atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi. Oleh karena itu, perdarahan pada *plasenta previa totalis* akan terjadi lebih dini dari pada plasenta letak rendah, yang mungkin baru berdarah setelah persalinan mulai (Wiknjosostro, 2005).
2. Antisipasi terjadinya syok hipovolemik
- 1) Data subjektif:
 - (a) Ibu mengeluh keluar darah segar dari jalan lahir secara tiba-tiba.

- (b) Ibu mengeluh agak pusing ketika terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir.
 - (c) Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya
- 2) Data objektif:
- (a) Ekspresi wajah ibu tampak cemas
 - (b) Konjungtiva ibu tampak agak pucat
- 3) Analisis dan interpretasi data:
- (a) Perdarahan timbul sekonyong-konyong tanpa sebab apapun, perdarahan cenderung berulang dengan volume darah yang lebih banyak dari sebelumnya, sedikit atau banyaknya perdarahan tergantung pada besar dan banyaknya pembuluh darah yang robek dan plasenta yang terlepas, jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dari anemia ringan akan menyebabkan anemia sedang sampai berat dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik yang dapat meningkatkan mortalitas ibu dan janin.
 - (b) Keadaan syok dapat ditimbulkan oleh bermacam sebab, diantaranya yang terbanyak adalah hipovolemia, yaitu adanya kekurangan volume darah yang beredar akibat perdarahan atau dehidrasi (Wiknjosastro, 2005).
3. Antisipasi terjadinya asfiksia intrauterin
- 1) Data subjektif:
- (a) Ibu mengeluh keluar darah segar dari jalan lahir secara tiba-tiba.

- (b) Ibu mengeluh agak pusing ketika terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir.
 - (c) Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya
- 2) Data objektif:
- (a) Ekspresi wajah ibu tampak cemas
 - (b) Hasil USG: plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus dan menutupi ostium uteri internum.
 - (c) DJJ: 142 x/menit
- 3) Analisis dan interpretasi data:
- (a) Akibat terjadinya perdarahan dapat mengganggu retroplasenter sehingga menimbulkan sifksia intra uterin yakni keadaan dimana janin dan rahim kekurangan oksigen dan kemudian diikuti oleh penimbunan asam asetat dan karbondioksida (CO₂), sehingga dapat mengakibatkan kematian janin (Achadiat, 2004).

D. LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tanggal 19 Juni 2010, jam: 12.55 Wita

1. Pasang infus RL 28 tetes/ menit
2. Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan USG.

E. LANGKAH V: MERENCANAKAN ASUHAN KEBIDANAN/ INTERVENSI

1. Diagnosa: G_{III} P_{II} A_O, gestasi 27 minggu 5 hari, situs memanjang, tunggal, hidup, intrauterine, keadaan janin baik, ibu dengan plasenta previa totalis.
2. Masalah aktual: anemia ringan dan kecemasan.

3. Masalah potensial:

- a. Antisipasi terjadinya perdarahan antepartum
- b. Antisipasi terjadinya syok hipovolemik
- c. Antisipasi terjadinya asfiksia intrauterin

4. Tujuan:

- a. Kehamilan berlangsung tanpa komplikasi
- b. Perdarahan dapat teratasi
- c. Anemia dapat teratasi
- d. Kecemasan berkurang atau teratasi.
- e. Ekspresi wajah tampak ceria

5. Kriteria:

- a. Keadaan ibu baik ditandai dengan TTV dalam batas normal

Tekanan darah: Sistole: 90-130 mmHg

Diastole: 60-90 mmHg

Suhu : 36,5 °C – 37,2 °C

Nadi : 80-100 kali/ menit

Pernapasan : 16-24 kali/ menit

- b. Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sesuai umur kehamilan.
- c. Janin tetap dalam keadaan baik, ditandai dengan DJJ dalam batas normal (120-160 kali/ menit), serta dengan adanya pergerakan janin yang tetap dirasakan oleh ibu.
- d. Tidak terdapat tanda-tanda bahaya kehamilan.

- e. Tidak ada pelepasan darah pervaginam
 - f. HB dalam batas normal (Normal HB dalam kehamilan: > 11 gr%).
6. Intervensi tanggal 19 Juni 2010
- a. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap penting.

Rasional: penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui keadaan yang sedang dialaminya serta mengetahui perkembangan kehamilannya, dan hal ini juga merupakan tujuan utama pelayanan antenatal yang berkualitas.

- b. Anjurkan ibu untuk istirahat total (tirah baring).

Rasional: dengan istirahat memungkinkan otot untuk berrelaksasi dan mengurangi beban kerja jantung yang meningkat selama kehamilan serta dapat mengurangi frekuensi perdarahan, dimana pada saat istirahat baring, sum-sum tulang belakang bekerja menghasilkan sel-sel darah merah.

- c. Observasi dengan ketat DJJ, tanda-tanda vital, dan perdarahan

Rasional: untuk memantau keadaan janin, keadaan ibu, serta jumlah darah yang keluar pervaginam.

- d. Observasi jumlah tetesan cairan infus

Rasional: dengan mengobservasi jumlah tetesan cairan infus, maka dapat dipantau pemasukan cairan.

e. Ambil sampel darah

Rasional: untuk pemeriksaan laboratorium dan persiapan transfusi darah dari PMI jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

f. Bekerja sama dengan anggota keluarga untuk memberikan dukungan psikologis pada ibu.

Rasional: dukungan psikologis sangat dibutuhkan ibu untuk menghadapi keadaannya, serta untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang sedang dirasakan ibu.

g. Anjurkan ibu untuk makan sedikit-sedikit tapi sering.

Rasional: untuk memulihkan tenaga atau energi ibu.

h. Jelaskan pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan:

1) Mengonsumsi makanan yang bergizi dan sumber makanan yang mengandung zat besi.

Rasional: Dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi

2) *Personal hygiene*

Rasional: kebersihan diri dan daerah genitalia dapat memberikan rasa nyaman pada ibu, serta dapat mencegah terjadinya infeksi.

3) Istirahat yang cukup

Rasional: Istirahat yang cukup terutama disiang hari dapat mengurangi beban kerja jantung yang mengalami peningkatan kerja karena kehamilan.

- i. Diskusikan tentang 9 tanda bahaya kehamilan.

Rasional: Dengan memberitahukan ibu tentang tanda bahaya kehamilan, ibu akan mengerti dan melaksanakan anjuran bidan bila ibu mengalami salah satu dari tanda bahaya kehamilan.

- j. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan.

Rasional: dengan mendapatkan penanganan dan pengobatan yang cepat dan tepat, maka dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang kemungkinan besar dapat lebih memperburuk keadaan.

- k. Anjurkan ibu untuk rawat inap

Rasional: agar keadaan ibu tetap berada dalam pengawasan petugas, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera mendapat penanganan yang sesuai.

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 19 Juni 2010, Jam: 15.00 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting bahwa saat ini ibu sedang mengalami komplikasi kehamilan yang berhubungan dengan kelainan plasenta yakni plasenta terletak di segmen bawah uterus dan menutupi jalan lahir, sehingga menyebabkan pengeluaran darah segar pervaginam yang disertai gumpalan tanpa rasa nyeri.
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat total (tirah baring), karena dengan istirahat memungkinkan otot untuk berrelaksasi dan mengurangi beban kerja jantung

yang meningkat selama kehamilan serta dapat mengurangi frekuensi perdarahan, dimana pada saat istirahat baring, sum-sum tulang belakang bekerja menghasilkan sel-sel darah merah.

3. Mengobservasi dengan ketat DJJ, tanda-tanda vital, dan perdarahan
 - a. DJJ terdengar kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/menit.

- b. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 88 x/ menit

Pernapasan : 24 x/ menit

Suhu : 36,6⁰ C

- c. Masih ada darah yang keluar sedikit

4. Mengobservasi jumlah tetesan cairan infus

Infus RL 28 tetes/ menit (botol II) tetap mengalir dengan baik.

5. Mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dan persiapan transfusi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

HB: 10 gr%

6. Bekerja sama dengan anggota keluarga untuk memberikan dukungan psikologis pada ibu, karena dukungan psikologis sangat dibutuhkan ibu untuk menghadapi keadaannya, serta untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang sedang dirasakan ibu.

7. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit-sedikit tapi sering.

8. Menjelaskan pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan:

- a. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta makanan yang banyak mengandung zat besi.
 - b. *Personal hygiene*, agar kebersihan diri dan daerah genitalia ibu dapat tetap terjaga, sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada ibu, serta dapat mencegah terjadinya infeksi.
 - c. Istirahat yang cukup:
 - 1) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - 2) Tidur malam 7-8 jam/ hari
9. Diskusikan tentang 9 tanda bahaya kehamilan.
- a. Sakit kepala hebat
 - b. Nyeri abdomen
 - c. Kejang
 - d. Demam
 - e. Perdarahan pervaginam
 - f. Janin kurang bergerak
 - g. Bengkak pada muka dan tangan
 - h. Perubahan visual
 - i. Muntah hebat dan pelepasan air
10. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan.
- a. Antibiotik (Amoxicilin: 3 x 500 mg).
 - b. Anti fibrinolitik (Asam Tranexamat: 3 x 1)
 - c. Multivitamin (Prenatin: 1 x 1)

11. Menganjurkan ibu untuk rawat inap.

G. LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

1. Ibu mengerti tentang kondisi kehamilannya saat ini, yakni ibu sedang mengalami komplikasi kehamilan yang berhubungan dengan kelainan plasenta yakni plasenta terletak di segmen bawah uterus dan menutupi jalan lahir, sehingga menyebabkan pengeluaran darah segar pervaginam yang disertai gumpalan tanpa rasa nyeri.

2. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan TTV dalam batas normal:

Tekanan Darah	: 110/70 mmHg
Nadi	: 88 x/ menit
Pernapasan	: 24 x/ menit
Suhu	: 36,6 ⁰ C

3. Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sesuai umur kehamilan.

4. Janin tetap dalam keadaan baik, ditandai dengan DJJ dalam batas normal (120-160 kali/ menit), serta dengan adanya pergerakan janin yang tetap dirasakan oleh ibu.

5. Masih ada sedikit pelepasan darah pervaginam

HB 10 gr%

6. Anemia ringan belum teratasi dan kecemasan ibu sudah sedikit berkurang.

7. Ibu mengerti apa yang ia lakukan jika terjadi perdarahan atau komplikasi kembali dan ibu mengerti tentang perdarahan yang ia alami

8. Ibu mengerti tentang pentingnya istirahat total atau tirah baring untuk

mengurangi terjadinya perdarahan

9. Ibu mengerti tentang kebutuhan nutrisi dan gizi bagi ibu hamil
10. Ibu mengerti tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi
11. Transfusi tidak dilakukan, tapi ibu masih dalam pengawasan ketat dan ibu bersedia untuk dirawat inap.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “R” KEHAMILAN
27 MINGGU 5 HARI DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TANGGAL 19 JUNI 2010**

No Register : 049284
Tgl Kunjungan : 19 Juni 2010, jam 12.50 Wita
Tgl Pengkajian : 19 Juni 2010, jam 14.30 Wita
Pengkaji : Hilmiah

A. SUBJECTIVE (S)

1. Identitas istri/ suami

Nama : Ny “R” / Tn”K”
Umur : 35 tahun / 43 tahun
Nikah/ lamanya : 1x / ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Lure, No. 58

2. ibu mengeluh ada pengeluaran darah dari jalan lahir secara tiba-tiba.
3. Keluhan dialami sejak tanggal 19 Juni 2010, jam: 11.30 Wita
4. Ibu mengatakan pernah keluar darah dari jalan lahir pada waktu umur kehamilan 23 minggu dalam jumlah yang hanya sedikit.

5. Ibu mengatakan kali ini keluar darah berwarna merah segar, ada gumpalan tanpa disertai rasa nyeri.
6. Darah yang keluar tidak terlalu banyak, tapi ibu tetap sangat merasa cemas karena ini perdarahan yang terjadi untuk yang kedua kalinya.
7. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya.
8. HPHT: 7 Desember 2009
9. Ibu mengatakan kehamilannya memasuki usia 7 bulan
10. Pergerakan janin dirasakan ibu sejak umur kehamilan 16 minggu sampai sekarang.
11. Pergerakan janin dirasakan ibu terutama pada perut sebelah kanan.
12. Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama hamil.
13. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kehamilannya
14. Ibu mengeluh sedikit pusing waktu terjadi pengeluaran darah dari jalan lahir
15. Ibu sudah mendapatkan imunisasi TT 2x (lengkap) di puskesmas
 - a. TT1 tanggal 27 Februari 2010
 - b. TT2 tanggal 1 April 2010

B. OBJECTIVE (O)

1. HTP: 14 September 2010
2. KU ibu cukup baik, kesadaran komposmentis
3. TB: 148 cm
4. Lila: 23 cm

5. BB: 53 Kg

6. Tanda-tanda Vital:

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 88 x/ menit

Pernapasan : 24 x/ menit

Suhu : 36,6⁰ C

7. Kepala

a. Inspeksi: Rambut hitam dan lurus

b. Palpasi: Tidak ada massa dan nyeri tekan

8. Wajah

a. Inspeksi: Tidak tampak adanya oedema, konjungtiva tampak sedikit pucat, sklera putih dan tidak ikterus, ekspresi wajah ibu tampak cemas.

9. Leher

a. Inspeksi: tidak tampak adanya pembesaran kelenjar tyroid, pembuluh limfe, dan vena jugularis.

b. Palpasi: Tidak teraba adanya pembesaran pada kelenjar limfe, kelenjar tyroid dan vena jugularis, tidak ada nyeri tekan.

10. Payudara

a. Inspeksi: Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

b. Palpasi: Tidak teraba adanya massa, kolostrum belum ada.

11. Abdomen

- a. Inspeksi: Tampak *striae livide* dan *striae albicans*, dinding perut sudah kendur, tidak ada luka bekas operasi dan pembesaran perut sesuai dengan umur kehamilan.
- b. Palpasi:
 - Leopold I : TFU 3 jari atas pusat, 28 cm, teraba bokong pada fundus
 - Leopold II : Punggung kiri
 - Leopold III : Kepala
 - Leopold IV : BAP
- c. Auskultasi: DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah dengan frekuensi 142x/menit.
- d. Perkusi: terdengar bunyi timpani pada perkusi abdomen.

12. Ekstremitas

- a. Inspeksi: Tidak tampak ada oedem dan varises
- b. Palpasi: tidak teraba adanya odema.
- c. Perkusi: Refleks patella positif kiri dan kanan

13. Vulva/ vagina

- a. Inspeksi: tampak pengeluaran darah segar pervaginam.

14. Pemeriksaan penunjang, tanggal 19 Juni 2010, jam: 13.30 Wita

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a. HB: 10 gr% | Normal: : 13-16 gr% |
| | Normal: : 12-14,9 gr% |
| b. Leukosit: 7.500 /mm ³ | Normal: 5.000-10.000 /mm ³ |
| c. Eritrosit: 3,88 Juta | Normal: : 4,5-5,5 Juta |

darah segar pervaginam yang disertai gumpalan tanpa rasa nyeri.

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat total (tirah baring), karena dengan istirahat memungkinkan otot untuk berrelaksasi dan mengurangi beban kerja jantung yang meningkat selama kehamilan serta dapat mengurangi frekuensi perdarahan, dimana pada saat istirahat baring, sum-sum tulang belakang bekerja menghasilkan sel-sel darah merah.
3. Mengobservasi dengan ketat DJJ, tanda-tanda vital, dan perdarahan
 - a. DJJ terdengar kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 142 x/menit.
 - b. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah	: 110/70 mmHg
Nadi	: 88 x/ menit
Pernapasan	: 24 x/ menit
Suhu	: 36,6 ⁰ C
 - c. Masih ada darah yang keluar sedikit
4. Mengobservasi jumlah tetesan cairan infus
Infus RL 28 tetes/ menit (botol II) tetap mengalir dengan baik.
5. Mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dan persiapan transfusi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
HB: 10 gr%
6. Bekerja sama dengan anggota keluarga untuk memberikan dukungan psikologis pada ibu, karena dukungan psikologis sangat dibutuhkan ibu untuk meghadapi keadaannya, serta untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran

yang berlebihan yang sedang dirasakan ibu.

7. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit-sedikit tapi sering.
8. Menjelaskan pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan:
 - a. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta makanan yang banyak mengandung zat besi.
 - b. *Personal hygiene*, agar kebersihan diri dan daerah genitalia ibu dapat tetap terjaga, sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada ibu, serta dapat mencegah terjadinya infeksi.
 - c. Istirahat yang cukup
 - 1) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - 2) Tidur malam 7-8 jam/ hari
9. Diskusikan tentang 9 tanda bahaya kehamilan.
 - a. Sakit kepala hebat
 - b. Nyeri abdomen
 - c. Kejang
 - d. Demam
 - e. Perdarahan pervaginam
 - f. Janin kurang bergerak
 - g. Bengkak pada muka dan tangan
 - h. Perubahan visual
 - i. Muntah hebat dan pelepasan air

10. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan.

- a. Antibiotik (Amoxicilin: 3 x 500 mg).
- b. Anti fibrinolitik (Asam Tranexamat: 3 x 1)
- c. Multivitamin (Prenatin: 1 x 1)

11. Menganjurkan ibu untuk rawat inap.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “R” KEHAMILAN
27 MINGGU 6 HARI DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TANGGAL 20 JUNI 2010**

No Register : 049284
Tgl MRS : 19 Juni 2010, jam 12.50 Wita
Tgl Pengkajian : 20 Juni 2010, jam 10.00 Wita
Pengkaji : Hilmiah

A. SUBJECTIVE (S)

1. Identitas istri/ suami

Nama : Ny “R” / Tn”K”
Umur : 35 tahun / 43 tahun
Nikah/ lamanya : 1x / ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Lure, No. 58

2. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat terutama disebelah kanan perut ibu
3. Ibu mengeluh masih sedikit pusing
4. Ibu mengatakan perdarahan sudah tidak terjadi lagi, tapi masih merasa sedikit cemas dan khawatir jika pengeluaran darah kembali terjadi.

B. OBJECTIVE (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Konjungtiva masih tampak sedikit pucat
3. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit.
4. Pengeluaran darah tidak ada lagi.
5. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 x/ menit

Pernapasan : 20 x/ menit

Suhu : 36,5⁰ C

6. Pemeriksaan laboratorium tanggal 20 Juni 2010, jam: 10.20 Wita

HB: 10 gr%

C. ASSESSMENT (A)

1. Diagnosa: G_{III} P_{II} A_O, gestasi 27 minggu 6 hari, situs memanjang, tunggal, hidup, intrauterine, keadaan janin baik, ibu dengan plasenta previa totalis.
2. Masalah aktual: anemia ringan dan kecemasan.
3. Masalah potensial:
 - a. Antisipasi terjadinya perdarahan antepartum
 - b. Antisipasi terjadinya syok hipovolemik
 - c. Antisipasi terjadinya asfiksia intrauterin

D. PLANNING (P)

Planning tanggal 20 Juni 2010, Jam: 10.30 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting bahwa saat ini keadaan ibu sudah lebih baik dari sebelumnya. Perdarahan sudah tidak terjadi lagi, sehingga ibu tidak perlu merasa cemas dan khawatir lagi.
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat total (tirah baring), dan ibu masih beristirahat dengan tirah baring.
3. Tetap mengobservasi dengan ketat DJJ, tanda-tanda vital, dan perdarahan
 - d. DJJ terdengar kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit.
 - e. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah	: 110/80 mmHg
Nadi	: 80 x/ menit
Pernapasan	: 20 x/ menit
Suhu	: 36,5 ⁰ C
 - f. Pengeluaran darah tidak terjadi lagi
4. Lanjut mengobservasi jumlah tetesan cairan infus

Infus RL 28 tetes/ menit (botol IV) tetap mengalir dengan baik.
5. Tetap memberikan support pada ibu dan keluarga agar ibu tetap semangat dalam menjalani perawatan.
6. Mengingatkan kembali ibu tentang pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan:

- d. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta makanan yang banyak mengandung zat besi.
 - e. *Personal hygiene*, agar kebersihan diri dan daerah genitalia ibu dapat tetap terjaga, sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada ibu, serta dapat mencegah terjadinya infeksi.
 - f. Istirahat yang cukup:
 - 1) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - 2) Tidur malam 7-8 jam/ hari
7. Mengingatkan ibu tentang 9 tanda bahaya kehamilan.
- a. Sakit kepala hebat
 - b. Nyeri abdomen
 - c. Kejang
 - d. Demam
 - e. Perdarahan pervaginam
 - f. Janin kurang bergerak
 - g. Bengkak pada muka dan tangan
 - h. Perubahan visual
 - i. Muntah hebat dan pelepasan air
8. Lanjut penatalaksanaan pemberian obat-obatan.
- a. Antibiotik (Amoxicilin: 3 x 500 mg)
 - b. Anti fibrinolitik (Asam Tranexamat: 3 x 1)
 - c. Multivitamin (Prenatin: 1 x 1)

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menjalani perawatan dan mengikuti semua anjuran yang telah diberikan oleh petugas.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “R” KEHAMILAN
28 MINGGU DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TANGGAL 21 JUNI 2010**

No Register : 049284
Tgl MRS : 19 Juni 2010, jam 12.50 Wita
Tgl Pengkajian : 21 Juni 2010, jam 10.00 Wita
Pengkaji : Hilmiah

A. SUBJECTIVE (S)

1. Identitas istri/ suami

Nama : Ny “R” / Tn”K”
Umur : 35 tahun / 43 tahun
Nikah/ lamanya : 1x / ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Lure, No. 58

2. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat terutama disebelah kanan perut ibu
3. Ibu sudah tidak merasa pusing lagi
4. Ibu mengatakan perdarahan sudah tidak terjadi lagi

5. Ibu megatakan rasa cemas dan khawatirnya sudah tidak terasa lagi, dan sekarang merasa lebih tenang dan nyaman.

A. OBJECTIVE (O)

1. Keadaan umum ibu lebih baik
2. Konjungtiva masih tampak sedikit pucat
3. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

4. Pengeluaran darah tidak ada lagi.

5. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 82 x/ menit

Pernapasan : 20 x/ menit

Suhu : 36⁰ C

6. Pemeriksaan laboratorium tanggal 20 Juni 2010, jam: 10.00 Wita

HB: 10,4 gr%

B. ASSESSMENT (A)

1. Diagnosa: G_{III} P_{II} A_O, gestasi 28 minggu, situs memanjang, tunggal, hidup, intrauterine, keadaan janin baik, ibu dengan plasenta previa totalis.
2. Masalah aktual: anemia ringan.
3. Masalah potensial:
 - a. Antisipasi terjadinya perdarahan antepartum
 - b. Antisipasi terjadinya syok hipovolemik

c. Antisipasi terjadinya asfiksia intrauterin

C. PLANNING (P)

Planning tanggal 21 Juni 2010, Jam: 10.30 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting bahwa saat ini keadaan ibu sudah membaik. Perdarahan sudah tidak terjadi lagi, dan ibu kelihatan lebih sehat.
2. Menganjurkan ibu untuk tetap istirahat total (tirah baring), dan ibu masih beristirahat dengan tirah baring.
3. Mengobservasi dengan ketat DJJ, tanda-tanda vital, dan perdarahan
 - a. DJJ terdengar kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.
 - b. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah	: 120/80 mmHg
Nadi	: 82 x/ menit
Pernapasan	: 20 x/ menit
Suhu	: 36,7 ⁰ C
 - c. Tidak ada pengeluaran darah pervaginam
4. Tetap mengobservasi jumlah tetesan cairan infus

Infus RL 28 tetes/ menit (botol VI) tetap mengalir dengan baik.
5. Tetap memberikan support pada ibu dan keluarga agar ibu tetap semangat dalam menjalani perawatan.
6. Mengingatkan kembali ibu tentang pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan:

- a. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta makanan yang banyak mengandung zat besi.
 - b. *Personal hygiene*, agar kebersihan diri dan daerah genitalia ibu dapat tetap terjaga, sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada ibu, serta dapat mencegah terjadinya infeksi.
 - c. Istirahat yang cukup:
 - 3) Tidur siang 1-2 jam/ hari
 - 4) Tidur malam 7-8 jam/ hari
7. Mengingatkan kembali ibu tentang 9 tanda bahaya kehamilan.
- a. Sakit kepala hebat
 - b. Nyeri abdomen
 - c. Kejang
 - d. Demam
 - e. Perdarahan pervaginam
 - f. Janin kurang bergerak
 - g. Bengkak pada muka dan tangan
 - h. Perubahan visual
 - i. Muntah hebat dan pelepasan air
8. Lanjut penatalaksanaan pemberian obat-obatan.
- a. Antibiotik (Amoxicilin: 3 x 500 mg).
 - b. Anti fibrinolitik (Asam Tranexamat: 3 x 1)
 - c. Multivitamin (Prenatin: 1 x 1)

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menjalani perawatan dan mengikuti semua anjuran yang telah diberikan oleh petugas.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membandingkan antara hasil tinjauan kasus Ny”R” kehamilan 26-28 minggu dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar tanggal 19-21 Juni 2010. Untuk membandingkan hal tersebut, maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LANGKAH I : PENGUMPULAN/ IDENTIFIKASI DATA DASAR

Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Anamnesis
- 2) Pemeriksaan KU dan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan
- 3) Pemeriksaan khusus
- 4) Pemeriksaan penunjang (Salmah, 2006).

Pada kasus yang dialami oleh Ny. “R”, langkah I yakni identifikasi data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti pada saat pengumpulan data. Karena baik klien, suami, maupun keluarga dalam hal ini terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan keadaan klien sehingga memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Demikian pula pada pemeriksaan fisik, pemantauan TTV, dan pemeriksaan lainnya, tidak ditemukan adanya hambatan karena klien senantiasa siap untuk diperiksa, karena pada prinsipnya, semua pemeriksaan

yang dilakukan untuk mengontrol keadaan klien itu sendiri.

Pada kasus ny. “R” dengan plasenta previa totalis, penulis memperoleh hasil pengkajian dimana semua keluhan yang diutarakan oleh Ny. “R”, ditemukan pula pada teori yaitu plasenta previa terjadi setelah kehamilan 22 minggu. Sifat perdarahannya adalah tanpa sebab (*causeless*), tanpa nyeri (*painless*), dan berulang (*recurrent*). (<http://irwanashari.blogspot.com>).

Berdasarkan data yang di peroleh dalam studi kasus Ny “R” dengan plasenta previa menunjukkan adanya kesamaan dengan penjelasan tanda dan gejala plasenta previa. Hal ini berarti antara konsep dasar dan studi kasus tidak tampak ada kesenjangan.

B. LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSIS/ MASALAH AKTUAL

Pada langkah ini identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Salmah, 2006).

Pada konsep dasar, diagnosis lebih sering diidentifikasi pada apa yang dialami oleh klien, sedangkan Ny. “R” dengan kasus plasenta previa totalis di ruang kebidanan, diagnosis yang dapat ditegakkan yaitu: GIII PII AO, gestasi 27 minggu 5 hari, situs memanjang, tunggal, hidup, intrauterine, keadaan janin baik, ibu dengan plasenta previa totalis.

Sedangkan masalah yang dialami oleh Ny. “R” adalah anemia ringan yang ditandai dengan ibu mengeluh sedikit pusing, konjungtiva tampak pucat, Hb: 10 gr%. Dan masalah yang lain adalah kecemasan, yang disebabkan

karena rasa khawatir dan ketidaktahuan ibu tentang keadaan yang dialaminya, yang tergambar jelas dari wajah ibu yang sedang mengisyaratkan kecemasan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori bahwa kecemasan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan perasaan keprihatinan, rasa gelisah, ketidaktentuan, atau takut dari kenyataan atau persepsi, ancaman, sumber aktual yang tidak diketahui atau dikenal (<http://perawatpskiatri.blogspot.com>).

Berdasarkan hal tersebut, maka antara teori dan studi kasus ada kesamaan dalam membuat diagnosis/ masalah aktual, dan tidak tampak adanya kesenjangan. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan, sedangkan masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian (Salmah, 2006).

C. LANGKAH III: ANTISIPASI DIAGNOSIS/ MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan (Salmah, 2006).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian, tidak ada perbedaan masalah potensial antara konsep dasar dengan kasus yang ditemukan. Adapun masalah potensial tersebut adalah antisipasi terjadinya perdarahan antepartum, di mana dalam teori di katakan perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 22 minggu, walaupun patologi yang

sama dapat pula terjadi pada kehamilan sebelum 22 minggu. Pendarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa. Perdarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa, perdarahan pertama biasanya tidak banyak, sehingga tidak akan berakibat fatal. Perdarahan berikutnya hampir selalu banyak dari pada sebelumnya, apalagi kalau sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dalam (Wiknjosastro, 2005).

Masalah potensial yang lain adalah antisipasi terjadinya syok hipovolemik, karena keadaan syok dapat ditimbulkan oleh bermacam sebab, diantaranya yang terbanyak adalah hipovolemia, yaitu adanya kekurangan volume darah yang beredar akibat perdarahan atau dehidrasi (Wiknjosastro, 2005). Selain itu antisipasi terjadinya asfiksia intrauterin, dimana pada konsep dasar dikatakan bahwa plasenta previa disertai perdarahan mengganggu sirkulasi retroplasenter sehingga dapat menimbulkan asfiksia intrauterin, keadaan dimana janin dalam rahim kekurangan oksigen (Achadiat, 2004).

Dengan demikian antara teori dan studi kasus ada keseimbangan sehingga tidak ditemukan adanya perbandingan.

D. LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/ dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan (Salmah, 2006).

Pada konsep dasar dikatakan bahwa beberapa data menunjukkan adanya suatu situasi yang menuntut tindakan segera selagi menunggu intervensi dari

bidan atau dokter. Pada studi kasus Ny. “R” dengan plasenta previa totalis dilakukan tindakan segera dan kolaborasi yaitu pasang infus RL 28 tetes/ menit dan kolaborasi dengan dokter tindakan USG, tindakan ini dilakukan karena terjadi perdarahan sebelum klien masuk rumah sakit.

Dengan demikian antara konsep dasar dan studi kasus ada kesamaan dalam upaya melakukan tindakan dan kolaborasi sehingga tidak ditemukan adanya perbandingan.

E. LANGKAH V: MERENCANAKAN ASUHAN KEBIDANAN/ INTERVENSI

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosis yang telah teridentifikasi atau diantisipasi.

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang serta antisipasi diagnosis dan masalah lain yang mungkin terjadi. Namun lebih dahulu harus dirumuskan tujuan yang akan dicapai beserta kriteria keberhasilan yang telah disepakati bersama oleh klien dan keluarga (Salmah, 2006).

Pada konsep dasar perencanaan tindakan klien dengan plasenta previa dengan kehamilan kurang dari 37 minggu, keadaan umum ibu cukup baik, dan janin masih hidup, maka dilakukan terapi ekspektatif yaitu rawat inap, tirah baring, perbaiki anemia, dan observasi, DJJ, TTV, serta perdarahan yang terjadi (Saifuddin, 2002).

Berdasarkan studi kasus pada Ny “R” dengan kehamilan 27 minggu 5

hari, intrvensi juga dilakukan seperti pada teori: rawap inap, istirahat, tirah baring, pasang infus, dan observasi DJJ, TTV, dengan demikian antara konsep dasar dan studi kasus mengenai intervensi yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara aman dan efisien. Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan dan melakukan kolaborasi jika ada hal yang membutuhkan penanganan dokter atau anggota tim kesehatan lainnya, serta adapun hal-hal yang dilakukan oleh klien itu sendiri sesuai dengan anjuran dari petugas kesehatan (Salmah, 2006).

Pada kasus Ny. "R" dengan plasenta previa totalis implementasi yang dilakukan secara mandiri oleh bidan termasuk kolaborasi oleh dokter yang telah direncanakan semuanya dapat terlaksana, diantaranya memasang infus, dan mengobservasi DJJ, TTV, merawat inap, menganjurkan ibu untuk istirahat total (tirah baring). Dengan demikian antara konsep dasar dan studi kasus tidak ditemukan ada kesenjangan yang berarti.

G. LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan, berhasil atau tidak asuhan yang telah diberikan oleh petugas kesehatan kepada klien. Hasil evaluasi studi kasus pada Ny. "R" selama tiga hari yaitu:

Hari pertama, plasenta previa dapat dievaluasi dengan pemeriksaan USG, pemantauan TTV, DJJ dan pergerakan janin serta perdarahan. Hasil: positif plasenta di SBR menutupi OUI (plasenta previa totalis). TTV dalam batas normal yaitu: tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi: 88 x/ menit. Pernapasan: 24 x/menit, suhu: 36,6°C, DJJ dalam batas normal 136 x/ menit dengan pergerakan janin minimal 1x dalam 1 jam. Perdarahan masih ada yang keluar sedikit tetapi ibu tetap dalam pengawasan ketat.

Hari kedua, anemia belum teratasi ditandai dengan konjungtiva masih tampak agak pucat dan ibu masih sedikit pusing, dan pemeriksaan laboratorium tanggal 20 Juni 2010 jam 10.00 wita Hb: 10 gr%. TTV dalam batas normal, DJJ dalam batas normal, perdarahan sudah tidak ada lagi yang keluar dari jalan lahir, tapi ibu masih dalam pengawasan petugas rumah sakit.

Hari ketiga, keadaan umum ibu jauh lebih baik dengan Hb: 10,4 gr%, kecemasan dan kekhawatiran ibu sudah teratasi, dan ibu sudah merasa lebih aman dan nyaman, tapi tetap dianjurkan untuk beristirahat yang cukup. Dengan demikian secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus Ny "R" dengan plasenta previa totalis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari tinjauan pustaka dan pengalaman langsung dari lahan praktek melalui studi kasus, serta membandingkan antara teori dengan praktik berdasarkan hasil pengkajian mengenai manajemen asuhan kebidanan pada Ny “R” kehamilan 27 Minggu 5 hari dengan plasenta previa totalis di RSIA Siti Fatimah Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal, plasenta terletak di bagian atas uterus.
2. Perdarahan yang terjadi pada Ny. “R” disebabkan karena plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus, tepatnya menutupi jalan lahir, sehingga terjadi pengeluaran darah segar pervaginam yang disertai gumpalan tanpa menimbulkan rasa nyeri.
3. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan teknik 7 langkah Varney. Selama pengkajian mulai tanggal 19-21 Juni 2010, di peroleh hasil dari evaluasi asuhan kebidanan yaitu perdarahan yang dialami oleh ibu sudah berhenti, kecemasan teratasi, anemia ringan belum teratasi ditandai dengan konjungtiva masih sedikit pucat dan kadar Hb: 10,4 gr%.
4. Pendokumentasian yang dilakukan pada Ny. “R” mengacu pada manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan pola fikir Varney.

5. Dalam upaya penerapan dokumentasi kebidanan penting untuk dilaksanakan, karena merupakan alat pembuktian untuk pertanggungjawaban bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien.
6. Perdarahan yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik dapat membahayakan keselamatan ibu dan janinnya.

B. Saran

1. Terhadap Klien
 - a. Menganjurkan pada klien agar rajin memeriksakan kehamilannya di rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas lengkap apabila terjadi komplikasi yang dapat membahayakan klien.
 - b. Keterlibatan anggota keluarga sangat diperlukan untuk lebih memfokuskan perhatian terhadap klien.
2. Terhadap Bidan
 - a. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan, diharapkan agar dapat memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan kebutuhan akan masalah yang sedang dialami oleh klien.
 - b. Sebagai seorang bidan, diharapkan dapat mengetahui secara pasti batas wewenang seseorang bidan, serta tidak melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan klien maupun diri sendiri serta profesinya.
 - c. Sebagai seorang bidan dalam melakukan tindakan diharapkan dapat membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga klien, agar

tercapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada klien akan pelayanan yang telah diberikan.

3. Terhadap Institusi

Diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembelajaran terhadap mahasiswi kebidanan baik teori maupun praktek, sehingga setiap tahunnya dapat melahirkan alumni kebidanan yang profesional, intelektual, dan terampil dalam bidang kebidanan, khususnya penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam rangka pemecahan masalah yang dialami oleh klien, sehingga dapat menciptakan kepuasan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan seorang bidan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*. 2002. Departemen Agama RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Anonymous. *Perdarahan Antepartum*. <http://medlinux.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2010.
- Anurogo, D. *Plasenta Previa*. <http://www.kabarindonesia.com>, diakses tanggal 27 Maret 2010.
- Azwar, Nurlie. *Pendokumentasian Asuhan Kebidanan*. <http://akbidypsDMI.net/download/pdf/dokSoap.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2010.
- Chapman, Vicky. 2006. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Kelahiran*. Jakarta: EGC.
- Dilla. *Latar Belakang Plasenta Previa*. <http://adilla-itsme.blogspot.com>, diakses tanggal 01 Mei 2010.
- Endjun, J.J. 2007. *Ultrasonografi Dasar Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Hidayat A, & Mufdlilah. 2009. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Pres.
- Indras. *Pengaruh Plasenta Previa terhadap Kehamilan*. <http://askep-askeb.cz.cc>, diakses tanggal 01 Mei 2010.
- Irwan, Ashari. *Plasenta Previa*. <http://irwanashari.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Maret 2010.
- Khoman, Jhon Slamet. *Perdarahan Hamil Tua dan Perdarahan Postpartum*. <http://www.kalbe.co.id>, diakses tanggal 9 Maret 2010.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 2004. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 2001. *Penatalaksanaan Rutin Obstetri dan Ginekologi, dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Arcan.
- Martaadisoebrata. 2005. *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Nafida. *Perdarahan Antepartum*. <http://belajarbersama-nafida.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2010.
- Norwitz, Errol. 2008. *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Edisi 1. Cetakan 4. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Salmah, dkk. 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC.
- Scott, JR. 2002. *Danforth Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Widya Medika.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinclair, Constance. 2009. *Buku Saku Kebidanan (A Midwife's Handbook)*. Jakarta: EGC.
- Suseno, Tutu A. 2009. *Kamus Kebidanan*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta. Hal. 162.
- Thalbah, dkk. 2009. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Kemukjizatan Penciptaan Manusia)*. Jilid 2. Jakarta: PT. Sapta Sentosa.
- Thalbah, dkk. 2009. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis (Kemukjizatan Pengobatan dan Makanan)*. Jilid 3. Jakarta: PT. Sapta Sentosa.
- Winkjosastro, Hanifa. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 3. Cetakan 7. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Yienmail. Plasenta Previa. <http://yienmail.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Maret 2010.
- Yuwienueninet. Plasenta Previa. <http://yuwienueninet.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Maret 2010.