

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN DENGAN PARTUS LAMA
DI RSIA SITTI FATIMAH
MAKASSAR**



Karya Tulis Ilmiah

(KTI)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH

Sri Yoelinda Sari S.

70400007047


FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2010

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



KATA PEGANTAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Partus lama di RSIA Sitti Fatimah Makassar** ”.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madyah Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki , oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda Safaruddin, S.Pd. dan Ibunda Nurhayati, S.Pd. atas segala perhatian, kasih sayang, do’a restu, serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada pihak keluarga khususnya om Syarifuddin, Aslan,

dan Salman Nambung yang senantiasa memberikan nasehat, do'a, serta bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Sitti Saleha, S. Sit, SKM, M. Keb. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. dr. Nadyah, S. Ked. selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
5. dr. Rini Fitriani, S. Ked. selaku penguji karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. M. Sabir Maidin, S.Ag., M.ag. selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.

8. dr. H. Leo Prawirodihardjo, Sp. OG(K), M.Kes, M.M, Ph.D. selaku Kepala RSIA Sitti Fatimah Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 khususnya sahabatku Ummy, Syla, Pitto, Incha, Khasma, dan Any atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, Amin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata-Gowa, 11 Agustus 2010



Penyusun

SRI YOELINDA SARI S

70400007047

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi.....	viii
Daftar tabel.....	x
Daftar gambar.....	xi
Daftar lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. ruang lingkup pembahasan	5
C. tujuan penulisan.....	5
D. manfaat penulisan.....	6
E. metode penulisan	7
F. sistematika penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan Normal	11
1. Pengertian Persalinan	11
2. Sebab-sebab Persalinan.....	12
3. Tahapan Persalinan Normal	15
4. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persalinan.....	19

B. Tinjauan Umum Tentang Partus lama.....	20
1. Pengertian Partus Lama.....	20
2. Diagnosis Partus Lama.....	21
3. Tanda dan Gejala Klinik Partus Lama	22
4. Penanganan Partus Lama	23
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	28
D. Tinjauan Islam tentang Terjadinya Persalinan dengan Partus Lama	34
BAB III STUDI KASUS.....	37
A. Langkah 1. Pengumpulan Data dan Analisa Data dasar	63
B. Langkah 2. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Aktual	64
C. Langkah 3. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Potensial	66
D. Langkah 4. Melaksanakan Tindakan Segera dan Kolaborasi	66
E. Langkah 5. Merencanakan Tindakan Asuhan kebidanan	66
F. Langkah 6. Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan.....	70
G. Langkah 7. Evaluasi Asuhan Kebidanan	73
H. Dokumentasi Kebidanan.....	74
BAB IV PEMBAHASAN.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Diagnosis Persalinan Lama.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : tahapan persalinan normal..... 18



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar kegiatan konsul

Lampiran 2: Izin Pengambilan Data/Kasus

Lampiran 3: Izin rekomendasi Penelitian

Lampiran 4: Surat Izin telah melakukan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian maternal merupakan kematian dari setiap wanita selama masa kehamilan, bersalin atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan, oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan oleh kecelakaan atau insidental (faktor kebetulan). Hal ini sesuai dengan definisi Internasional Statistical Classification of Disease and Related Health Problems (ICD). Angka kematian maternal kemudian didefinisikan sebagai jumlah kematian maternal selama satu periode waktu dalam 100.000 kelahiran hidup. (Saifuddin, 2005, hal.7).

Data organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa setiap tahun sejumlah 500 orang perempuan meninggal dunia akibat kehamilan dan persalinan, fakta ini mendekati terjadinya satu kematian setiap menit. Diperkirakan 99 % kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang (WHO,2007). (Himapid,<http://www.himapid@yahoo.co.id>).

Kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin, dan nifas masih merupakan masalah besar di negara berkembang termasuk Indonesia. Di negara miskin, sekitar 25-50 % kematian usia subur disebutkan masih terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. (Saifuddin, 2006, hal 3).

Lembaga kesehatan dunia World Health Organization (WHO) memperkirakan di seluruh dunia setiap tahun lebih dari 585 ribu meninggal

pada saat hamil atau bersalin. Berkaca dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 (SDKI), derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. SDKI mengungkapkan, angka kematian ibu (AKI), yaitu 228 per 100 ribu kelahiran hidup. (BKKBN, <http://www.metrotvnews.com>).

Pada tahun 2008, 4.692 jiwa ibu. Angka kematian Ibu di Indonesia diakibatkan masalah seputar kehamilan, nifas dan persalinan. Adapun penyebab langsung dari kematian ibu adalah perdarahan 28 %, eklamsi 24 %, infeksi 11 %, partus lama 5 %, dan abortus 5 %. (BKKBN, <http://www.metrotvnews.com>).

Di tinjau dari pandangan islam, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Anatomi biologis antara keduanya jelas berbeda. Berbeda dengan kaum laki-laki (kaum Adam), kaum perempuan dianugerahi Allah suatu hak istimewa, yaitu hak reproduksi. Reproduksi adalah sebuah proses yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk menjaga keberlangsungan spesies manusia di muka bumi ini. (Hisham Thalbah, 2009).

Dalil-dalil yang menunjukkan reproduksi telah banyak disebutkan dalam al-Quran. Terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang proses perkembangan janin sampai proses persalinan. Sebutan basyar di dalam al-Quran Mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk biologis yang proses kejadiannya melalui beberapa tahapan. (Hisham Thalbah, 2009).

Reproduksi manusia terjadi melalui proses kehamilan dan persalinan. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan lahir. Proses ini memungkinkan terjadi komplikasi–komplikasi dan menghambat terjadinya proses persalinan yang berdampak pada persalinan lama.

Partus lama merupakan fase laten lebih dari 8 jam dengan persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih bayi belum lahir, ditandai dengan dilatasi serviks di kanan garis waspada pada persalinan fase aktif. (Saifuddin, 2006 hal 184).

Propinsi di Indonesia dengan kasus kematian ibu melahirkan tertinggi adalah Propinsi Papua, yaitu sebesar 730/100.000 kelahiran hidup, diikuti Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 370/100.000 kelahiran hidup, Propinsi Maluku sebesar 340/100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Sulawesi Selatan berdasarkan profil kesehatan Sulawesi Selatan jumlah kejadian kematian maternal yang dilaporkan pada Tahun 2007 yaitu sebesar 104/100.000 kelahiran hidup (Dinkes Propinsi Sulawesi-Selatan, 2008).

Data yang di peroleh dari medical record Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Fatimah Makassar menunjukkan bahwa dari 2849 kelahiran pada bulan januari sampai Desember 2009 tercatat 131 kasus partus lama. Penanganan kejadian partus lama rata–rata dilakukan di Rumah sakit rujukan seperti di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Fatimah Makassar. Di mana kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas dan unit pelayanan lainnya merujuk ke Rumah Sakit tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi partus lama adalah penggunaan partograf pada setiap persalinan sehingga bidan dapat

segera mengambil keputusan klinik untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi pada Ibu dan bayinya. (Saifuddin, 2006, hal M-55).

Persalinan lama dapat meningkatkan morbiditas janin. Namun, pandangan ini tertantang dalam persalinan normal dan tidak dikeluarkan berdasar bukti terkini. Intervensi untuk mempercepat persalinan semuanya membawa risiko dan meningkatkan morbiditas untuk ibu maupun bayinya. Intervensi persalinan hendaknya tidak mencegah seorang bidan untuk selalu waspada dalam mengidentifikasi ibu yang persalinannya tidak maju dan yang memerlukan bantuan. (Vicky Chapman, 2006 hal.90).

Kemajuan persalinan antara satu Ibu dengan Ibu yang lain tidak sama. Pengkajian dan definisi kemajuan, serta kapan harus melakukan intervensi sangat bervariasi. Crowther et al mengatakan bahwa kecepatan dilatasi serviks 0,5 cm/jam mungkin lebih tepat (daripada yang biasanya diterapkan 1 cm/jam) sebagai batas bawah menentukan kemajuan. Crowther et al juga mengatakan bahwa, penggunaan dalam konteks kesehatan maternal, mengkaji dilatasi serviks yang lebih lambat dari 0,5 cm/jam bisa berakibat tidak perlunya intervensi persalinan. (Vicky Chapman, 2006 hal. 90).

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengambil Asuhan kebidanan intra natal pada klien dengan kasus partus lama dengan mengkaji dan memaparkannya lewat karya tulis ini guna mencari solusi terbaik atas permasalahan di atas.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan karya tulis ini. Penerapan manajemen asuhan kebidanan pada klien dengan kasus partus lama di Rumah Sakit ibu dan anak Sitti Fatimah Makassar.

C. Tujuan Penulisan

Bagaimana cara mengatasi intranatal patologi pada klien tentang partus lama di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Fatimah.

1. Tujuan Umum

Melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada klien dengan kasus partus lama di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Fatimah.

2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar, pengkajian, analisa, dan merumuskan diagnosa kebidanan pada klien dengan kasus partus lama.
- b. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar, kemungkinan timbulnya diagnosa/masalah potensial pada klien dengan kasus partus lama.
- c. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk melakukan tindakan segera dan kolaborasi pada klien dengan kasus partus lama.
- d. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk merumuskan rencana tindakan komprehensif pada klien dengan kasus partus lama.

- e. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk melaksanakan rencana tindakan komprehensif pada klien dengan kasus partus lama.
- f. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi tentang efektifitas tindakan yang telah dilakukan pada klien dengan partus lama.
- g. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk mendokumentasikan Manajemen Asuhan Kebidanan Dalam kasus partus lama.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang pendidikan Diploma III Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
 - b. Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan dapat menambah pengetahuan dalam penerapan asuhan kebidanan dengan kasus partus lama serta dapat mempraktekkan teori – teori yang telah dipelajari.
2. Bagi Institusi

Diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan dan merupakan bekal bagi Mahasiswi agar berhasil dalam menerapkan Asuhan Kebidanan pada klien dengan Kasus partus lama.

3. Bagi Instansi

Memberikan masukan bagi instansi kesehatan khususnya pihak Rumah Sakit Sitti Fatimah Makassar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada klien dengan penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan kasus partus lama.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari buku-buku dari literature lain (internet) yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teoritis yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ini.

2. Studi Kasus

Studi kasus ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah Asuhan kebidanan meliputi pengkajian dan analisa data, menentukan diagnosa/ masalah aktual.

a. Wawancara

Wawancara langsung dengan klien, bidan dan dokter diruangan kebidanan yang berhubungan dengan masalah klien.

b. Observasi selama perawatan

Observasi keadaan umum klien, kemajuan persalinan, tanda-tanda vital klien (TTV), denyut jantung janin (DJJ), dan pemenuhan kebutuhan klien.

c. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik pada klien secara sistematis pada klien mulai dari inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang (Ultrasonografi dan Rontgen).

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan klien, baik yang bersumber dari perawatan klien maupun dari sumber lain yang menunjang seperti status klien melalui rekam medik.

4. Diskusi

Diskusi dengan pembimbing karya tulis ini, dan bidan dilahan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini dapat dilihat secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Ruang Lingkup Pembahasan

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

2. Tujuan Khusus

D. Manfaat Penulisan

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan normal

1. Pengertian
2. Sebab-sebab persalinan
3. Tahapan persalinan normal
4. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan

B. Tinjauan umum tentang partus lama

1. Pengertian partus lama
2. Diagnosis partus lama
3. Tanda dan gejala klinik partus lama
4. Penanganan partus lama

C. Proses manajemen asuhan kebidanan

D. Tinjauan islam tentang terjadinya persalinan dengan partus lama

BAB III STUDI KASUS

- A. Langkah I : Pengumpulan dan analisa data dasar
- B. Langkah II : Merumuskan diagnosa/masalah aktual
- C. Langkah III : Merumuskan diagnosa/masalah potensial
- D. Langkah IV : Melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi
- E. Langkah V : Merencanakan tindakan asuhan kebidanan
- F. Langkah VI : Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan
- G. Langkah VII : Evaluasi asuhan kebidanan
- H. Dokumentasi Kebidanan

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan normal

1. Pengertian

- a. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. (Hanifa Wiknjosastro, 2005 hal. 180).
- b. Persalinan adalah suatu perubahan yang dramatik, otot harus berkontraksi untuk menghasilkan tekanan pada dinding uterus, guna mendilatasi serviks. (Christine Henderson, 2006 hal. 278).
- c. Persalinan adalah proses multifaset, kompleks karena kejadian psikologis dan fisiologis saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. (Vicky Chapman, 2006 hal. 88).
- d. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam jalan lahir atau proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. (Saifuddin, 2006 hal. 100).
- e. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. (Azrul Azwar, 2007 hal. 37).

- f. Persalinan adalah proses alamiah ketika terjadi pembukaan serviks serta pengeluaran janin dan plasenta dari uterus ibu. (Maimunah, 2005 hal. 138).

2. Sebab – sebab mulainya persalinan

Terjadinya persalinan sampai kini masih merupakan teori yang kompleks. Faktor-faktor hormonal, pengaruh saraf dan nutrisi disebut sebagai pemicu di mulainya persalinan, dengan demikian dapat dikemukakan beberapa teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan :

a. Penurunan kadar progesterone.

Progesterone menimbulkan relaksasi otot-otot rahim, sebaliknya estrogen meninggikan kerenggangan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesterone dan estrogen di dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan kadar progesterone menurun sehingga timbul his.

b. Teori oxytocin

Oksitosin memiliki peranan penting dalam proses persalinan sebagai stimulator poten dari kontraksi. Oksitosin membantu untuk melebarkan leher rahim sehingga janin dapat bergerak sampai bayi dilahirkan. Oksitosin juga membantu melahirkan plasenta dan membatasi perdarahan di lokasi plasenta. Selama persalinan dan kelahiran, tekanan janin terhadap serviks dan kemudian terhadap jaringan di dasar panggul dapat merangsang pelepasan oksitosin sehingga timbul kontraksi.

c. Ketegangan otot-otot

Dalam proses persalinan, bayi di dorong keluar dari rahim karena adanya kontraksi dari otot pubococcygeus yang melakukan pekerjaan penting lainnya seperti mengendalikan aliran air seni dan posisi kepala bayi dengan benar selama persalinan.

Nyeri pada proses persalinan di bagi tiga tahap :

- 1) Bagian atas otot-otot rahim mulai berkontraksi. Akibatnya leher rahim mulai menipis dan membesar karena tekanan pada pembuluh darah leher rahim. Kontraksi terjadi dengan interval lima menit. Ketika serviks membesar, kontraksi terjadi pada setiap tiga menit yang berarti frekuensi meningkat. Ketika frekuensi kontraksi meningkat, leher rahim menjadi lebih lebar. Setelah itu terjadi kontraksi setiap dua menit dan leher rahim yang melebar menjadi penuh. Ketika serviks dilatasi penuh, maka kepala bayi sudah nampak di perineum.
- 2) Setelah terjadi perubahan pada kontraksi rahim, maka dianjurkan untuk mengambil nafas dan menahan nafas tersebut di setiap kontraksi timbul dan ketika merasakan dorongan untuk buang air besar serta menahan rasa sakit dengan nafas dalam-dalam sampai bayi keluar sepenuhnya dari rahim.
- 3) Kontraksi rahim berhenti dan otot-otot uterus rileks. Setelah beberapa menit, kontraksi mulai lagi dan meningkat secara bertahap sampai plasenta juga dikeluarkan.

d. Teori prostaglandin

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua, disamping itu pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim dan prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan.

e. Teori induksi partus (induction of labor)

Induksi persalinan adalah suatu usaha agar persalinan mulai berlangsung sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan jalan merangsang timbulnya his, persalinan anjuran (induksi persalinan) dapat dilakukan dengan jalan :

1) Memecahkan ketuban

Pemecahan ketuban ini dapat mengurangi beban rahim sebesar 40 % sehingga tenaga kontraksi rahim dapat lebih kuat untuk membuka serviks dan menyebabkan kepala dapat langsung menekan dinding serviks. Di dinding serviks terdapat banyak syaraf-syaraf yang merangsang kontraksi rahim.

2) Induksi persalinan secara hormonal/kimiawi

Pemberian oksitosin menurut tetesan perinfus. Tetesan infusnya dimulai dari 8 mU (1 mU = 2 tetes) permenit dinaikkan 4 mU setiap 30 menit. Tetesan maksimalnya 30-40 mU. (Hanifa Wiknjosastro 2005 hal.181 ; Cilog [,http://www.childbirthconnection.com](http://www.childbirthconnection.com) ; Harnawati <http://www.iulren.com>).

3. Tahapan Persalinan Normal

Proses persalinan di bagi menjadi 4 kala :

a. Kala I (kala pembukaan serviks)

Kala ini di mulai sejak timbulnya his dan mengeluarkan lendir yang bercampur darah (bloody show). Lendir yang bercampur darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau mendatar. Sedangkan darahnya berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis itu pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka.

Proses ini di bagi 2 fase yaitu :

- 1) Fase laten, berlangsung selama 8 jam, di mulai dari pembukaan nol sampai 3 cm dan his masih lemah dengan frekuensi his jarang jika melebihi dari 8 jam di sebut fase laten memanjang.
- 2) Fase aktif (4-10) cm dengan kecepatan pembukaan 1 cm atau lebih (per jam berlangsung 7 jam).

Pada fase aktif di bagi dalam 3 fase :

- a) Fase akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm.
- b) Fase dilatasi maksimal. Dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.

- c) Fase deselerasi. Pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. (Hanifa Wiknjosastro, 2005 hal. 182 ; Saifuddin, 2006 hal. 100).

b. Kala II (Kala Pengeluaran)

Dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir dengan adanya dilatasi penuh serviks dan sempurna. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali, lamanya 60-90 detik.

Tanda dan gejala kala dua :

- 1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi
- 2) Ibu merasakan meningkatnya tekanan pada rectum atau vagina dan hendak buang air besar.
- 3) Perineum terlihat menonjol
- 4) Vulva dan anus terlihat membuka
- 5) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah
- 6) Kepala telah turun di dasar panggul.

Diagnosis pasti kala dua adalah bila dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

- a) Primigravida kala II berlangsung kira-kira 2 jam
- b) Multigravida berlangsung kira-kira 1 jam

c) Multipara berlangsung kira-kira 0,5 jam.

(Ayurai, <http://www.wordpress.com> ; Hanifa Wiknjosastro, 2005 hal. 184 ; Saifuddin, 2006 hal. 100).

c. Kala III (Kala Pengeluaran Plasenta)

Dimulai sejak lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta berlangsung 6 sampai 15 menit setelah janin keluar dan di sertai dengan pengeluaran darah.

Tanda-tanda pelepasan plasenta

- 1) Tali pusat bertambah panjang
- 2) Semburan darah tiba-tiba
- 3) Bentuk uterus menjadi lebih bulat. (Hanifa Wiknjosastro, 2005 hal. 185 ; Saifuddin, 2006 hal. 117).


d. Kala IV (Kala Pengawasan)

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum.

Pemantauan pada kala IV :

- 1) Periksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-30 menit selama jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, masase uterus sampai menjadi keras.
- 2) Periksa tanda-tanda vital dan perdarahan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua
- 3) Anjurkan Ibu untuk minum demi mencegah dehidrasi
- 4) Bersihkan perineum Ibu dan kenakan pakaian Ibu yang bersih dan kering.
- 5) Biarkan Ibu beristirahat.

- 6) Bayi segera diberi ASI, ini dapat membantu uterus berkontraksi.
- 7) Jika Ibu perlu ke kamar mandi, Ibu boleh bangun, pastikan Ibu dibantu karena masih dalam keadaan lemah atau pusing setelah persalinan. Pastikan Ibu sudah buang air kecil dalam 3 jam pascapersalinan. (saifuddin, 2006 hal. N-21).



Gambar 1.1 Tahapan persalinan normal

(Sumber : Jane Coad, 2007)

4. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan

Tiga faktor dalam persalinan adalah :

a. Powers (tenaga)

- 1) Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu.
- 2) Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim.
- 3) His adalah kontraksi otot-otot rahim dalam persalinan.
- 4) Kontraksi adalah gerakan memendek dan menebalnya otot-otot rahim yang terjadi diluar kesadaran (involuter) dan dibawah pengendalian syaraf simpatik.

b. Passages (jalan lahir)

Passage adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal. Rongga-rongga panggul yang normal adalah : pintu atas panggul hampir berbentuk bundar, sacrum lebar dan melengkung, promontorium tidak menonjol ke depan, kedua spina ischiadica tidak menonjol kedalam, sudut arcus pubis cukup luas (90-100), ukuran conjugate vera (ukuran muka belakang pintu atas panggul yaitu dari bawah simpisis ke promontorium) adalah 10-11 cm, ukuran diameter transversa (ukuran melintang pintu atas panggul) 12-14 cm, pintu bawah panggul ukuran 10-10,5 cm.

c. Passanger (janin)

Passanger terdiri dari janin dan plasenta, janin merupakan passanger utama, dan bagian janin yang paling penting adalah kepala karena kepala janin mempunyai ukuran yang paling besar. Kelainan-kelainan yang sering menghambat dari pihak passanger adalah kelainan ukuran dan bentuk kepala anak seperti hydrocephalus ataupun anensephalus, kelainan letak seperti letak muka ataupun letak dahi, kelainan kedudukan anak seperti kedudukan lintang atau pun letak sungsang. (Wayan, <http://www.wordpress.com>).

B. Tinjauan umum tentang partus lama

1. Pengertian

- a. Partus lama merupakan fase laten lebih dari 8 jam yang persalinannya telah berlangsung 12 jam atau lebih bayi belum lahir, disertai dengan dilatasi serviks di kanan garis waspada pada persalinan fase aktif. (Saifuddin, 2006 hal. 184).
- b. Partus lama adalah berlangsung lebih dari 24 jam yang dinyatakan lama jika terjadi keterlambatan 2-3 jam di belakang partograf normal. (David, 2008 hal. 169).
- c. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primi, dan lebih dari 18 jam pada multi. (Rizkaharni, <http://www.wordpress.com>).
- d. Partus lama adalah proses persalinan yang melebihi waktu yang normal. (Maimunah, 2005 hal. 133).

2. Diagnosis persalinan lama

Tanda dan gejala	Diagnosis
Pembukaan serviks tidak membuka (kurang dari 3 cm) Tidak didapatkan kontraksi uterus	Belum in partu, false labor
Pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam in partu	Prolonged latent phase
Pembukaan serviks melewati garis waspada partograf :) Frekuensi dan lamanya kontraksi kurang dari 3, kontraksi per 10 menit dan kurang dari 40 detik) Secondary arrest of dilatation atau arrest of descent) Secondary arrest of dilatation dan bagian terendah dengan kaput, terdapat moulase hebat, edema serviks, tanda ruptura uteri imminens, fetal dan maternal distress) Inersia uteri) Disproporsi sefalopelvik) Obstruksi

) Kelainan presentasi (selain vertex) Malpresentasi
Pembukaan serviks lengkap, ibu ingin mendedan, tetapi tak ada kemajuan penurunan.	Kala II Lama (Prolonged Second Stage).

3. Tanda dan gejala klinik

a. Pada ibu

Gelisah, letih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat, pernapasan cepat, dan meteorismus. Didaerah lokal sering di jumpai edema serviks, cairan ketuban berbau, terdapat mekonium.

b. Pada janin

1) Periksa denyut jantung janin selama atau segera sesudah his. Hitung frekuensinya sekurang-kurangnya sekali dalam 30 menit selama fase aktif dan tiap 5 menit selama kala dua.

a) Jika terdapat gawat janin, lakukan seksio sesarea; kecuali jika syarat-syaratnya dipenuhi, lakukan ekstraksi vakum atau forceps.

2) Jika ketuban sudah pecah, air ketuban kehijau-hijauan atau bercampur darah, pikirkan kemungkinan gawat janin.

- 3) Jika tidak ada ketuban yang mengalir setelah selaput ketuban pecah, pertimbangkan adanya indikasi penurunan jumlah air ketuban yang mungkin menyebabkan gawat janin.

Perbaiki keadaan umum dengan :

- Memberikan dukungan emosi. Bila keadaan masih memungkinkan anjurkan bebas bergerak, duduk dengan posisi yang berubah (sesuaikan dengan penanganan persalinan normal).
- Berikan cairan baik secara oral atau parenteral dan upayakan buang air kecil (hanya perlu katerisasi bila memang diperlukan). (Saifuddin, 2006 hal. 184-185).

4. Penanganan

Bagaimana bidan menghadapi persalinan lama atau persalinan macet. Bidan di daerah pedesaan dengan polindesnya diharapkan dapat mengambil bagian terbesar pada pertolongan persalinan normal dengan menggunakan partograf World Health Organisation (WHO). Kewaspadaan dalam pertolongan persalinan sudah dilakukan sejak semula, dengan melakukan observasi (kontraksi, his, penurunan bagian terendah, pembukaan) sehingga setiap saat keadaan ibu dan janin dapat diketahui dengan pasti. Jika kala II dibiarkan berlangsung lama maka janin akan mengalami peningkatan hipoksia dan gawat janin.

Puncak kewaspadaan ini dilaksanakan dengan melakukan rujukan penderita ke pusat pelayanan dengan fasilitas setelah melampaui garis waspada agar penderita diterima di pusat pelayanan dalam keadaan optimal. Bidan diharapkan bekerjasama dengan dukun melalui pendidikan dukun sehingga dapat mengenal penderita untuk dilakukan rujukan medis.

a. Penanganan Umum

- 1) Nilai cepat keadaan umum wanita hamil tersebut termasuk tanda-tanda vital tingkat hidrasinya.
- 2) Periksa denyut jantung janin selama atau segera sesudah his. Hitung frekuensinya sekurang-kurangnya sekali dalam 30 menit selama fase aktif dan tiap 5 menit selama kala II.
- 3) Memperbaiki keadaan umum
 - a. Dengan memberikan dukungan emosional, bila keadaan masih memungkinkan anjurkan bebas bergerak duduk dengan posisi yang berubah.
 - b. Berikan cairan searah oral atau parenteral dan upaya buang air kecil.
 - c. Berikan analgesia : tramadol atau petidin 25 mg IM (maksimum 1 mg/kg BB), jika pasien merasakan nyeri yang sangat.

b. Penanganan khusus

1) Persalinan palsu / belum inpartu (False labor)

Bila his belum teratur dan porsio masih tertutup, pasien boleh pulang. Periksa adanya infeksi saluran kencing. Ketuban pecah dan bila didapatkan adanya infeksi obati secara adekuat. Bila tidak pasien boleh rawat jalan.

2) Fase laten yang memanjang (Prolonged latent phase)

Diagnosis fase laten yang memanjang dibuat secara retrospektif. Bila his terhenti disebut persalinan palsu atau belum inpartu. Bila mana kontraksi makin teratur dan pembukaan bertambah sampai 3 cm, pasien tersebut dikatakan masuk fase laten.

Apabila ibu berada dalam fase laten lebih dari 8 jam dan tidak ada kemajuan, lakukan pemeriksaan dalam :

- a) Bila tidak ada perubahan penipisan dan pembukaan serviks tidak didapatkan tanda gawat janin, kaji ulang diagnosis nya kemungkinan ibu belum dalam keadaan inpartu.
- b) Bila didapatkan perubahan dalam penipisan dan pembukaan serviks, lakukan drips oksi dengan 5 unit dalam 500 cc dekstrose atau NaCl mulai dengan 8 tetes per menit, setiap 30 menit ditambah 4 tetes sampai his adekuat maksimum 40 tetes per menit atau berikan preparat prostaglandin lakukan penilaian 4 jam.

c) Bila didapatkan adanya tanda amnionitis, berikan induksi dengan oksitosin 5 unit dalam 500 cc dekstrose mulai dengan 8 tetes per menit, setiap 15 menit di tambah 4 tetes sampai his yang adekuat (maksimum 40 tetes per menit) atau di berikan preparat prostaglandin serta obati infeksi dengan ampisilin 2 gr Intra Vena (IV) sebagai dosis awal dan 1 gr Intra vena (IV) setiap 6 jam dan gentamisin 2 X 80 mg.

3) Fase aktif yang memanjang (prolonged active phase)

Bila tidak didapatkan adanya chevalo pelvik disproporsi (CPD) atau adanya obstruksi :

a) Berikan penanganan kontraksi dan mempercepat kemajuan persalinan.

b) Bila ketuban utuh, pecahkan ketuban

Bila kecepatan permukaan serviks pada waktu fase aktif kurang dari 1 cm per jam lakukan penilaian kontraksi uterus.

4) Disproporsi sefalopelvik (CPD)

CPD terjadi karena bayi terlalu besar atau pelvis kecil. Bila dalam persalinan terjadi CPD akan didapatkan persalinan yang macet. Cara penilaian pelvis yang baik adalah dengan melakukan partus percobaan (trial of labor). Kegunaan pelvimetri klinis terbatas :

a) Bila diagnosis CPD ditegakkan, lahirkan bayi dengan seksio sesarea

b) Bila bayi mati lakukan kraniotomi atau embriotomi (bila tidak mungkin lakukan seksio sesarea).

5) Obstruksi (partus macet)

Bila ditemukan tanda – tanda obstruksi :

a) Bayi hidup lakukan SC

b) Bayi meninggal lakukan kraniotomi/embriotomi (bila tidak mungkin, lakukan seksio sesarea).

6) Kontraksi uterus tidak adekuat (inersia uteri)

Bila kontraksi uterus tidak adekuat dan disproporsi atau obstruksi bisa disingkirkan, kemungkinan penyebab persalinan lama adalah inersia uteri.

a) Pecahkan ketuban dan lakukan induksi dengan oksitosin 5 unit dalam 500 cc dekstrosa (atau NaCl) atau prostaglandin.

b) Evaluasi kemajuan persalinan dengan pemeriksaan vaginal 2 jam setelah his adekuat :

- jika tidak ada kemajuan, lakukan seksio sesarea
- jika ada kemajuan, lanjutkan infuse oksitosin dan evaluasi setiap 2 jam

7) Kala II yang memanjang (prolonged expulsive phase)

Menghadapi persalinan lama dalam Kala II, dan tidak mungkin untuk merujuk penderita atau terjadi gawat janin diusahakan mengakhiri persalinan dengan episiotomi dan dorongan (eksresi) yang dilakukan dengan hati hati dan tarikan (Ekstraksi) vakum atau tarikan cunam.

Adapun syarat-syarat terpenuhi jika terdapat penyimpangan, dapat di usahakan mengakhiri persalinan.

- a) Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan, berikan infus oksitosin.
- b) Jika tidak ada kemajuan penurunan kepala
 1. Kepala tidak lebih dari $1/5$ diatas simfisis pubis, atau bagian tulang kepala di station (0), dilakukan ekstraksi vakum atau cunam.
 2. Kepala diantara $1/5-3/5$ diatas simfisis pubis, atau bagian tulang kepala diantara station (0)-(-2), dilakukan ekstraksi vakum.
 3. Kepala lebih dari $3/5$ diatas simfisis pubis, atau bagian tulang kepala diatas station (-2), lakukan secsio sesarea.(Saifuddin, 2006)

C. KONSEP DASAR MANAJEMEN KEBIDANAN

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan ,menguntungkan, menguraikan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan teori ilmiah, penemuan, keterampilan dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien. (Atik Purwandari, 2008 ; Salmah, 2006).

2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Mengingat bahwa manajemen asuhan kebidanan suatu yang kontinum perlu dilakukan secara sistematis, yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan

berakhir dengan evaluasi. Proses ini terdiri dari tujuh langkah yang membentuk suatu kerangka lengkap sebagai berikut :

a. Langkah I : Identifikasi dan analisa data dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

- 1) Anamnese meliputi : melakukan tanya jawab untuk memperoleh biodata meliputi : riwayat kesehatan, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan, nifas, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data social, ekonomi, dan psikologi, serta keadaan klien meliputi : HPHT, HTP, pergerakan janinnya, umur kehamilan, sakit perut tembus kebelakang sejak kapan, ada pelepasan lender dan darah.
- 2) Pemeriksaan fisik meliputi : pemeriksaan tanda-tanda vital, keadaan umum klien dan pemeriksaan fisik dilakukan secara : inspeksi, palpasi meliputi : Leopold I (mengetahui TFU dan umur kehamilan), Leopold II (mengetahui dimana letak punggung dan bagian terkecil dari janin apakah dikiri / dikanan perut ibu, Leopold III (mengetahui bagian terendah dari janin), Leopold IV (mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk PAP). Auskultasi DJJ dengan menggunakan lenek untuk mendengar bunyi jantung janin.

- 3) Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium (Hb, Albumin, Reduksi), Ultrasonografi (USG), dan catatan terbaru sebelumnya.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan, oleh karena itu proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien sebenarnya.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Mengidentifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosis dan masalah keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian.

Jika didapatkan persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida dan 18 jam multigravida, maka dapat didiagnosis sebagai partus lama.

c. Langkah III. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Pada langkah ini dilakukan identifikasi diagnose atau masalah potensial berdasarkan hasil pengkajian dari data subjektif dan data objektif. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Sehubungan dengan teori kasus partus lama penderita tampak kelelahan, pucat, mata cekung, dan berkeringat dingin, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun, dan suhu tubuh meningkat, his mulai melemah. Sehingga keadaan ibu dapat mempengaruhi janin.

d. Langkah IV : Tindakan Emergency dan Kolaborasi

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan petugas lain berdasarkan kebutuhan klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses terus-menerus ini menghasilkan baru yang segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak untuk menyelamatkan klien dengan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemasangan infuse dengan drips oksitosin.

e. Langkah V : Intervensi / Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, langkah ini

merupakan kelanjutan dari masalah yang telah diidentifikasi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan teori kasus partus lama harus ditolong di Rumah Sakit untuk perbaikan keadaan umum ibu, pemeriksaan lebih lanjut, pengkajian masalah partus lama, pemasangan infuse dengan drips oksigen, pemantauan lebih lanjut, serta intervensi hal-hal yang dapat mempercepat proses persalinan.

f. Langkah VI : Implementasi / Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman yang dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan dan sebagian oleh pasien. Meski telah berkolaborasi dengan dokter, bidan tetap bertanggung jawab dalam manajemen asuhan klien agar penanganan kasus pada partus lama dapat berhasil dan memuaskan.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ini dilakukan pengevaluasian keefektifan dari asuhan yang diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan teori yang ada.

Beberapa hal yang dapat dievaluasi, yaitu :

- 1) Apa ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan
- 2) Apa ibu sudah melakukan apa yang telah di anjurkan dan telah diajarkan.
- 3) Bagaimana keadaan umum ibu

- 4) Mengukur tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu
- 5) Apa kecemasan ibu teratasi
- 6) Apa partus lama dapat teratasi

h. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Dokumentasi merupakan catatan tentang interaksi antar tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan, asuhan itu harus dicatat dengan benar, jelas logis, sehingga dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan secara sistematis, dalam bentuk SOAP, yaitu :

Subjektif :

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I varney.

Objektif :

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan penunjang, untuk mendukung asuhan yang telah diberikan sebagai langkah I varney.

Assesment :

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi :

a. Diagnosis / masalah

b. Antisipasi diagnosa / masalah potensial

- c. Perlunya tindakan segera, konsultasi dan kolaborasi oleh bidan dan dokter rujukan 2,3 dan 4 varney.

Planning :

Menggambarkan pendokumentasian dari hasil perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian asuhan yang telah diberikan sebagai langkah 5,6 dan 7 varney (Salmah, 2006).

D. Tinjauan Islam Tentang Terjadinya Persalinan Dengan Partus Lama

Manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan dibanding dengan semua makhluk karena memiliki kepribadian, penciptaan yang sempurna dan banyak potensi yang dimilikinya, akal, keinginan, spiritual, perasaan dan emosi, semua ini terdapat dalam satu tubuh yang menakjubkan. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Faathir (35) ; 11 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah

ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Air mani yang terdapat dalam tempat yang kokoh (rahim), yaitu sel sperma yang telah menyatu dengan sel telur. Sel sperma laki-laki dan sel telur wanita sebelum terjadi pembuahan merupakan bukti kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Bermula dari satu sel mikro yang besarnya tidak lebih dari seperjuta gram kemudian berkembang hingga menjadi sekitar 200 milyar sel. (M. Quraish Shihab, 2009).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Insaan : 2 berbunyi :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur [1535] yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu kami jadikan dia mendengar dan Melihat.

[1535] Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan.

Ayat di atas menjelaskan proses awal penciptaan serta tujuannya, yakni dari sperma laki-laki dan indung telur wanita yang masing-masing memiliki 46 kromosom. Keduanya memiliki peranan yang sama dalam pembentukan benih yang masuk ke dalam rahim wanita. Yang tujuan Allah menciptakannya adalah hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan. (M. Quraish Shihab, 2009).

Dari proses ini persalinan lama terdiri dari dua cara yaitu pervaginam dan seccio sesarea. Maka dari itu lahirlah seorang bayi tanpa mengetahui sesuatupun.

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S. An-nahl (16) ; 78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Proses ini adalah salah satu tahapan penyempurnaan dan pembentukan mausia berasal dari tanah. Kemudian Allah SWT jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Allah jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Allah SWT jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, lalu Allah SWT jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Kemudian Allah memberikan cobaan kepada manusia salah satu di antaranya yaitu persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam (partus lama). (Hisham Thalbah, 2009).

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PATOLOGI
PADA NY “S” GRAVID 40 – 42 MINGGU DENGAN PARTUS LAMA
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITTI FATIMAH
TANGGAL 7 JULI 2010

No. Registrasi : 049 804
Tgl. MRS : 7 Juli 2010 jam 08.45 Wita.
Tgl. Pengkajian : 7 Juli 2010 jam 09.00 Wita.
Tgl. Partus : 7 Juli 2010 jam 23.30 Wita.
Nama Mahasiswa : Sri Yoelinda Sari S.

KALA I

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. “S” / Tn. “T”
Umur : 25 Tahun / 23 Tahun
Agama : Islam / Islam
Suku : Makassar / Makassar
Pendidikan : SMA / SI
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 17 Kompleks Batu Tambang.

B. Data Biologis

1. Keluhan utama : Ibu mengatakan sakit perut tembus ke belakang tanpa disertai Pelepasan lendir dan darah.
2. Riwayat keluhan utama
 - a. Sakit dirasakan sejak tanggal 7 – 7 – 2010 jam 01.30 Wita.
 - b. Lokasi mulai dari perut tembus ke belakang.
 - c. Sifat his hilang timbul.
 - d. Usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan.

C. Riwayat kesehatan yang lalu

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi dan diabetes milietus.
2. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular.
3. Ibu megatakan tidak pernah minum alkohol dan merokok.
4. Ibu mengatakan tidak pernah menjalani operasi.
5. Ibu mengatakan tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

D. Riwayat Reproduksi.

1. Menarche : Umur 15 tahun
2. Siklus : 28 - 30 hari
3. Lama : 6 - 7 hari
4. Dismenorrhoe : Tidak ada nyeri pada saat haid

E. Riwayat kehamilan sekarang

1. GI. P0. A0.
2. a. HPHT 25 – 9 – 2009
b. HTP 2 – 7 – 2010
3. Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya.
4. Ibu mengatakan bahwa kehamilannya sudah \pm 9 bulan.
5. Ibu mengatakan bahwa janinnya bergerak sejak januari sampai sekarang.
6. Ibu mengatakan pergerakan janinnya pada satu tempat yaitu sebelah kanan.
7. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil.
8. Imunisasi TT 2 kali, yaitu 3 – 12 – 2009 dan 10 – 1 – 2010 di RSIA Sitti Fatimah.

F. Riwayat Keluarga Berencana.

Klien tidak pernah memakai salah satu alat kontrasepsi Keluarga Berencana karena ingin punya anak.

G. Pemenuhan kebutuhan dasar.

1. Pola Nutrisi.
 - a. Saat hamil.
 - a) Frekuensi 3 kali dengan porsi 1 piring.
 - b) Pola makanan nasi, sayur, buah-buahan, dan kadang-kadang minum susu.
 - c) Nafsu makan baik.
 - d) Minum 6-8 gelas perhari

b. Selama inpartu

- a) Pola makan tidak teratur
- b) Nafsu makan kurang.
- c) Kebutuhan minum \pm 3 gelas

2. Pola Eliminasi

a. Saat hamil

- a) Buang Air Besar (BAB) 1 x sehari.

Warna kekuning-kuningan

Konsistensi lunak

- b) Buang air Kecil (BAK) 4-5 x sehari

Warna kuning muda berbau amoniak

b. Selama inpartu

Ibu belum pernah BAB, BAK 5 kali

3. Istirahat

a. Saat Hamil

- a) Pola tidur 2 x sehari

Tidur siang (14.00-15.00 wita)

Tidur malam (21.00-05.00 wita)

b. Selama inpartu

Ibu berbaring ditempat tidur karena rasa nyeri yang dialami

4. Personal Hygiene

a. Saat hamil.

- a) Kebersihan rambut ; keramas 2 x seminggu.
- b) Kebersihan mulut ; sikat gigi sehabis makan, mandi dan sebelum tidur.
- c) Kebersihan badan ; mandi 2 x sehari menggunakan sabun mandi.
- d) Kebersihan genetalia ; klien membersihkan alat genetalia nya setiap mandi dan sehabis BAK dan BAB

I. Pemeriksaan fisik

1. Keadaan Umum

- a. Wajah Ibu nampak meringis
- b. Ibu nampak lemah
- c. Kesadaran komposmentis.
- d. LILA : 25 cm
- e. TB : 157 cm
- f. Berat Badan :
 - 1) Berat Badan sebelum hamil : 48 kg
 - 2) Berat badan selama hamil : 54 kg
- g. Tanda Tanda Vital
 - TD : 110/70 mmHg
 - P : 20 x/menit
 - N : 79 x/menit
 - S : 36,4 °C

2. Kepala dan rambut

Inspeksi : Keadaan rambut ; Ikal, tidak rontok, bersih, berwarna hitam.

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan.

3. Muka

Inspeksi : Ekspresi wajah nampak meringis

Palpasi : Tidak ada oedema pada wajah.

4. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus.

5. Hidung

Inspeksi : Septum simetris kiri dan kanan, tidak ada polip.

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran massa dan benjolan.

6. Telinga

Inspeksi : Simetris kanan dan kiri, nampak bersih dan tidak ada pengeluaran

sekret

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan.

7. Gigi dan Mulut

Gigi dan mulut bersih, keadaan gigi lengkap dan tidak ada caries.

8. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid , kelenjar limfe dan vena

Jugularis.

9. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, hiperpigmentasi pada areola mamma.

Palpasi : Tidak ada benjolan pada mamma.

10. Abdomen

Inspeksi : Tampak adanya striae livide, tonus otot abdomen tegang, tidak ada luka bekas operasi.

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jbpx, 30 cm teraba bokong di fundus.

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP (bergerak dalam panggul)

- Pengukuran lingkar perut : 107 cm

- Pengukuran lingkar panggul : 89 cm

Distansia Spinarum : 25 cm (24-26 cm)

Distansia Cristarum : 27 cm (26-28 cm)

Distansia Posterior : 10 cm (8-10 cm)

Boudolouque : 20 cm (18-20 cm)

- Auskultasi

Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 128 x/menit.

Kontraksi uterus

Pukul 09.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 128 x/menit
Pukul 09.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 128 x/menit
Pukul 10.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 128 x/menit
Pukul 10.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 128 x/menit
Pukul 11.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 128 x/menit
Pukul 11.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 128 x/menit
Pukul 12.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit
Pukul 12.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit
Pukul 13.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit
Pukul 13.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit
Pukul 14.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit
Pukul 14.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 15.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 15.30 wita his 2x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 16.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 16.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 17.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 17.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 18.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 18.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit
Pukul 19.00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 19.30 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 20.00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 20.30 wita his 2 x 10 menit durasi 35-40 djj 130 x/menit

11. Genitalia

Inspeksi : Tidak adanya pengeluaran darah dan lendir, tidak tampak adanya varises, tidak ada odem.

Pemeriksaan dalam (VT)

Tanggal 7 – 7 – 2010.

Jam : 09.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio lunak dan tebal
3. Pembukaan 1 cm
4. Ketuban positif
5. Presentasi kepala dengan uuk sulit dinilai
6. Hodge I
7. Tidak ada molage
8. Tidak ada bagian terkemuka
9. Kesan panggul normal
10. Belum ada pelepasan darah dan lendir

Jam : 13.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio tebal dan lunak

3. Pembukaan 2–3 cm
4. Ketuban positif
5. Presentasi kepala dengan uuk sulit dinilai
6. Hodge I
7. Tidak ada molage
8. Tidak ada bagian terkemuka
9. Kesan panggul normal
10. Belum ada Pelepasan darah dan lendir

Jam : 17.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio tebal dan lunak
3. Pembukaan 5 cm
4. Ketuban positif
5. Presentasi kepala dengan uuk ki - dep
6. Hodge II - III
7. Tidak ada molage
8. Tidak ada bagian terkemuka
9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan darah dan lendir

12. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises.

Palpasi : Tidak ada oedema.

J. Data Psikologis.

1. Ibu berencana melahirkan di RSIA Sitti Fatimah.
2. Ibu senang dengan kehamilannya dan berharap anaknya segera lahir.
3. Ibu ditunggu oleh keluarganya selama proses persalinan.

K. Data Spiritual

Selama persalinan ibu berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan diri dan Bayinya.

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa / Masalah aktual : GI. P0. A0, Umur kehamilan 40-42 minggu. Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, Inpartu Kala I Fase aktif.

1. GI.P0.A0

DS : - ibu mengatakan hamil yang pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya.

DO : - Tampak striae livide

- Tonus otot abdomen tegang.

Leopold I : TFU 2 jbpx , 30 cm teraba bokong di fundus.

Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP (bergerak dalam panggul)

Auskultasi : Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah dengan frekuensi 128 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Pada primigravida tonus otot tegang karena belum pernah mengalami peregangan sebelumnya.
- Pada kehamilan uterus membesar mengikuti pertumbuhan janin disebabkan hipertropi otot polos dan serabut-serabut kolagen menjadi higroskopik akibat meningkatnya hormon estrogen.
- Pada kulit terdapat pigmen dan hiperpigmentasi alat-alat tertentu yang melanopore stimulating hormone yang meningkat pada masa kehamilan dimana hormone ini dikeluarkan oleh lobus anterior hipofise.
- Adanya teraba bagian-bagian besar janin, terdengar denyut jantung janin serta adanya gerakan janin pada saat palpasi menandakan ibu dalam keadaan hamil.

2. Gestasi 40-42 minggu

DS : - Ibu mengatakan HPHT 25-9-2009

- Ibu mengatakan umur kehamilan sudah 9 bulan lebih

DO : - Tanggal pengkajian 7-7-2010

- Leopold : TFU 2 jbpx, 30 cm

Analisa dan interpretasi data

- Berdasarkan rumus Naegele dari HPHT ibu tanggal 25-9-2009 sampai dengan tanggal pengkajian 7-7-2010 maka gestasi 293 hari atau 41 minggu 3 hari.

3. Letak memanjang.

DS : - ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya.

DO: - Leopold II : Punggung kiri

- Leopold III : Kepala

Analisa dan interpretasi data

- Pada palpasi Leopold II disatu sisi teraba struktur dan resisten adalah punggung dan disisi lain terdapat bagian-bagian kecil dan janin. Bunyi jantung janin terdengar lebih baik dipunggung janin dari pada persentase verteks dan bokong, biasanya bunyi jantung janin dihantarkan melalui lambung janin (punggung) yang terletak paling dekat dinding uterus.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

4. Intra Uteri

DS : - Ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut.

DO: - Pada saat palpasi ibu tidak merasa nyeri

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan

Analisa dan interpretasi data

- Bagian dari uterus yang merupakan tempat perkembangan janin adalah kavum uteri dimana pada bagian ini hasil konsepsi dapat tumbuh dan berkembang hingga aterm tanpa menyebabkan adanya rasa nyeri.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

5. Tunggal

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya

DO: - Leopold I : TFU 2 jbp_x, 30 cm teraba Bokong di fundus

- Leopold II : Punggung kiri

- Leopold III : Kepala

- Leopold IV : BDP (bergerak dalam panggul)

- Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 128 x/menit.

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan, teraba 1 kepala dan bokong dan terdengar djj pada satu tempat yaitu kuadran kiri bawah serta pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu pada sebelah kanan perutnya. Hal ini menandakan tunggal.

6. Hidup

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya

DO: - Auskultasi djj terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 128 x /menit.

Analisa dan interpretasi data

- Adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu pada saat pengkajian dan djj terdengar jelas menandakan jantung janin berfungsi dengan baik menandakan janin hidup.

7. Keadaan janin baik

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya.

DO: - Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 128 x /menit.

Analisa dan interpretasi data

Adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu serta terdengarnya Djj 128 x /menit yang dalam batas normal, teratur menandakan janin hidup dan baik.

8. Keadaan ibu baik

DS : - Ibu mengatakan tidak pernah mengalami penyulit yang serius

DO: - Konjungtiva merah muda dan sklera tampak bersih.

- Tidak ada odema pada wajah dan tungkai

Tanda Tanda Vital :

TD : 110/70 mmHg

P : 20 x/menit

N : 79 x/menit

S : 36,4°C

Analisa dan interpretasi data

- Tekanan darah 120/70 mmHg dalam batas normal menandakan ibu dalam keadaan (tidak pre eklampsia / eklampsia) dan odema pada wajah tidak ada.
- Konjungtiva merah muda normal menandakan ibu tidak anemis dan sklera putih bersih menandakan ibu tidak ikterus.

9. Inpartu kala I fase aktif

DS : - Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang

- Ibu mengatakan adanya pengeluaran darah dari jalan lahir

DO: - Genitalia luar nampak ada pelepasan lendir dan darah.

- Hasil pemeriksaan dalam jam 17.00 wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio tipis dan lunak
3. Pembukaan 5 cm
4. Ketuban positif
5. Presentasi kepala dengan uuk ki-dep
6. Hodge II–III
7. Tidak ada molage
8. Tidak ada bagian terkemuka
9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan darah dan lendir

Analisa dan interpretasi data

- Pada saat 1-2 minggu sebelum persalinan kadar hormon progesteron dan estrogen mulai menurun sehingga fungsinya akan berkurang yang akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga menimbulkan his atau kontraksi dari uterus. Pada waktu kontraksi uterus (His) otot - otot akan mengalami anoxia yang akan menyebabkan nyeri.
- Pada saat pace maker memulai kontraksi gelombang his akan bergerak ke dalam dan ke bawah yaitu fundus, korpus dan seluruh uterus dimana otot pada fundus semakin tebal dan otot-otot uterus mengadakan retraksi sehingga otot korpus uteri lebih pendek dan dengan sendirinya serviks yang kurang mengandung otot dan banyak mengandung kolagen akan mudah tertarik dan membuka.

Masalah Aktual : Nyeri perut karena kontraksi uterus

- DS : - Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang
- Ibu mengatakan adanya pengeluaran darah dari jalan lahir
- DO: - Kontraksi uterus

Pukul 17.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit

Pukul 17.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit

Pukul 18.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit

Pukul 18.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit

Pukul 19.00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 19.30 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 20.00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 132 x/menit

Pukul 20.30 wita his 2 x 10 menit durasi 35-40 djj 130 x/menit

Analisa dan interpretasi data

- Nyeri yang timbul berasal dari his persalinan dan mulainya persalinan
- Penurunan kadar hormone progesterone pada ibu mempengaruhi pengeluaran oxytosin dan hipofise anterior yang dapat menyebabkan kontraksi uterus.
- Pembukaan serviks disebabkan kontraksi SBR dan serviks diregang oleh isi uterus
- Sehingga menyebabkan dilatasi serviks.
- Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas dan terjadi pengeluaran darah dikarenakan kapiler pembuluh darah pecah

LANGKAH III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data menunjang

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY ATAU KOLABORASI

Tidak ada indikasi

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa aktual : GI. P0. A0, Umur kehamilan 40-42 minggu, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, Inpartu Kala I Fase aktif

Masalah aktual : Nyeri perut karena kontraksi uterus

Masalah Potensial : Tidak ada

Tujuan : - Kala I dalam batas normal

- Kondisi ibu dan janin baik
- Kriteria : - Kala I tidak melebihi 13 jam
- Kontraksi adekuat 3-4 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik
 - Djj teratur dan kuat dalam batas normal (120-160 x/menit)
 - Tanda Tanda Vital dalam batas normal.

TD : 100-130/60-90 mmHg

N : 60-80 x/menit

P : 16-20 x/menit

S : 36-37°C

Intervensi Tanggal 7 Juli 2010

1. Anjurkan ibu untuk BAK dan cuci kaki.

Rasional : Kandung kemih yang kosong dapat memberi rasa nyaman pada ibu dan mempercepat proses turunnya bagian terendah janin, cuci kaki untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Observasi his dan Djj tiap 30 menit

Rasional : Kontraksi uterus merupakan tanda inpartu dan adanya kemajuan persalinan serta untuk memantau keadaan janin.

3. Observasi Tanda Tanda Vital tiap 4 jam

Rasional : Memantau keadaan umum ibu

4. Monitor kemajuan persalinan tiap 4 jam bila indikasi dengan pemeriksaan dalam.

Rasional : Untuk memantau majunya persalinan.

5. Mengatasi nyeri yang sangat pada ibu

Rasional : nyeri yang berlebihan pada ibu dapat mengganggu proses persalinan

6. Anjurkan ibu untuk bernafas panjang saat ada his

Rasional : Suplai O₂ dalam jaringan dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan.

7. Dampingi ibu

Rasional : Ibu merasa aman dan diperhatikan

8. Beri support pada ibu dan keluarga

Rasional : Agar ibu dan keluarga tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi persalinan dan kelahiran

9. Pantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

Rasional : Dengan partograf dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa aktual : GI. P0. A0. Umur kehamilan 40-42 minggu, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, Inpartu Kala I Fase aktif

Masalah aktual : Nyeri perut karena kontraksi uterus.

Masalah Potensial : Tidak ada.

Implementasi Tanggal 7 Juli 2010 jam 21.00 wita-23.25 wita

1. Mengobservasi his dan Djj

Pukul 21.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 21.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 22.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 22.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit

Pukul 23.00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit

2. Mengobservasi Tanda Tanda Vital

TD : 120/70 mmHg

P : 20 x/menit

N : 79 x/menit

S : 36,4°C

3. Memonitor kemajuan persalinan tiap 4 jam

Jam : 21.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio melesap
3. Pembukaan 10 cm
4. Ketuban negatif
5. Presentasi kepala dengan caput
6. Hodge III-IV
7. Molage I
8. Tidak ada Penumbungan
9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan ketuban jernih

4. Mengatasi nyeri yang sangat pada ibu

Hasil : tramadol atau petidin 25 mg IM

5. Menganjurkan ibu untuk bernafas panjang pada saat ada his
6. Memberi minum pada ibu
7. Mendampingi ibu
8. Memberi support dan motivasi pada ibu
9. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

LANGKAH VII. EVALUASI

Diagnosa aktual : GI. P0. A0, Umur kehamilan 40-42 minggu, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, Inpartu Kala I Fase aktif

Masalah aktual : Nyeri perut karena kontraksi uterus

Masalah Potensial : Tidak ada

Tanggal 7 Juli 2010 jam 21.00 wita

1. Ibu mengatakan mempunyai dorongan untuk meneran
2. Ibu mengatakan terasa ingin BAB
3. His 2 x 10 menit durasi 30-35 detik
4. Djj 130 x/menit
5. Tanda Tanda Vital

TD : 120/70 mmHg

P : 20 x/menit

N : 79 x/menit

S : 36,4°C.

6. Pemeriksaan dalam
 1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan.
 2. Porsio melesap
 3. Pembukaan 10 cm
 4. Ketuban negative
 5. Presentasi kepala dengan caput
 6. Hodge III-IV
 7. Molage I
 8. Tidak ada Penumbungan
 9. Kesan panggul normal
 10. Pelepasan ketuban jernih
7. Keadaan ibu lelah

SOAP KALA I

Data Subjektif

- Ibu mengatakan sakit perut tembus ke belakang tanpa pelepasan darah dan lendir.
- Sakit dirasakan sejak tanggal 7 Juli 2010 Jam 01.30Wita
- Usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan
- Ibu tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, penyakit menular, tidak pernah menjalani operasi, tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

- Ibu mengatakan HPHT 25-9-2009
- Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
- Ibu mengatakan bahwa kehamilannya sudah 9 bulan lebih
- Ibu merasakan pergerakan janinnya pada satu tempat yaitu sebelah kanan
- Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil.
- Imunisasi TT 2 kali, yaitu 3-12-2009 dan 10-1-2010 di RSIA Sitti Fatimah

Data Objektif

- GI.P0.A0
- HTP 2-6-2010
- Wajah ibu nampak meringis
- Ibu nampak lemah
- Kesadaran komposmentis.
- Tanda Tanda Vital

TD	: 110/70 mmHg
P	: 20 x/menit
N	: 79 x/menit
S	: 36,4°C.
- Ekspresi wajah nampak meringis
- Tidak ada oedema pada wajah.
- Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus.
- Tampak adanya striae livide, tonus otot abdomen tegang, tidak ada luka bekas operasi

- Saat palpasi tidak terasa nyeri.

Leopold I : TFU 2 jbpx, 30 cm teraba bokong di fundus

Leopold II : Pu - ki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP (bergerak dalam panggul)

Auskultasi

Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah frekuensi

128 x/menit

- Kontraksi his 2 x 10 menit durasi 25-30 detik
- Belum tampak pelepasan darah dan lendir
- Tidak tampak adanya varises
- Pemeriksaan dalam (VT) tanggal 7-7-2010 Jam : 09.00 Wita
 1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
 2. Porsio tebal dan lunak
 3. Pembukaan 1-2 cm
 4. Ketuban positif
 5. Presentasi Kepala dengan uuk sulit dinilai
 6. Hodge I
 7. Tidak ada molage
 8. Tidak ada bagian terkemuka
 9. Kesan panggul normal
 10. Belum ada Pelepasan darah dan lendir

Assesment

Diagnosa aktual : GI. P0. A0, Umur kehamilan 40-42 minggu, Letak memanjang. Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, Inpartu Kala I Fase aktif

Masalah aktual : Nyeri perut karena kontraksi uterus

Masalah Potensial : Tidak ada

Planning

1. Mengobservasi his dan Djj

Pukul 21.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 21.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 22.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit

Pukul 22.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit

Pukul 23.00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit

2. Mengobservasi Tanda Tanda Vital

TD : 110/70 mmHg

P : 20 x/menit

N : 79 x/menit

S : 36,4°C.

3. Memonitor kemajuan persalinan tiap 4 jam

Jam : 21.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan

2. Porsio melesap

3. Pembukaan 10 cm
4. Ketuban negative
5. Presentasi kepala dengan kaput
6. Hodge III-IV
7. Molage I
8. Tidak ada Penumbungan
9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan ketuban jernih
4. Mengatasi nyeri yang sangat pada ibu
Hasil : tramadol atau petidin 25 mg IM
5. Menganjurkan ibu untuk bernafas panjang pada saat ada his
6. Memberi minum pada ibu
7. Mendampingi ibu
8. Memberi support dan motivasi pada ibu
9. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

KALA II

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran.
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pengeluaran darah dan lendir
4. Ibu merasa ingin BAB

5. Ibu merasa lelah

DO:

1. Kontraksi uterus 2 x 10 menit durasi 30-35 detik

2. Djj 130 x/menit

3. Nampak pelepasan darah dan lendir

4. Pemeriksaan dalam

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan

2. Porsio melesap

3. Pembukaan 10 cm

4. Ketuban negatif

5. Presentasi kepala dengan kaput

6. Hodge III-IV

7. Molage I

8. Tidak ada Penumbungan

9. Kesan panggul normal

10. Pelepasan ketuban jernih

5. Tanda Tanda Vital

TD : 120/80 mmHg

P : 22 x/menit

N : 88 x/menit

S : 36,5 °C.

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual : Kala II Memanjang

Masalah Aktual : Kelelahan

DS:

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk mencedan
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pengeluaran darah dan lendir
4. Ibu merasa ingin BAB
5. Ibu merasa lelah

DO:

1. Kontraksi uterus 2 x 10 menit durasi 30-35 detik
2. Djj 130 x/menit
3. Perineum menonjol
4. Nampak pelepasan darah dan lendir
5. Anus membuka
6. Pemeriksaan dalam

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio melesap
3. Pembukaan 10 cm
4. Ketuban negatif
5. Presentasi kepala dengan kaput
6. Hodge III-IV

7. Molage I
8. Tidak ada Penumbungan
9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan ketuban jernih

Analisa dan Interpretasi Data

- Keinginan mendedan ini merupakan refleks yang ditimbulkan oleh penekanan kepala bayi pada dinding vagina, rectum
- Persalinan yang lama dapat mengakibatkan ketidak seimbangan cairan elektrolit serta kekurangan cadangan glukosa mengakibatkan kelelahan dan persalinan lama.
- Kondisi kelelahan akan mengakibatkan kontraksi uterus kurang adekuat sehingga dapat mengakibatkan persalinan lama. Kala II pada primigravida berlangsung selama 1 1/2 jam
- Hormon oksitosin sintetik merangsang otot polos uterus, meningkatkan eksitabilitas sel-sel otot yang meningkatkan kekuatan kontraksi

LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadi gawat janin

DS :

- DO :
- Pemeriksaan dalam ketuban negative
 - Terdapat caput pada kepala

Analisa dan interpretasi data

- Persalinan yang berlangsung lama dapat menyebabkan keseimbangan O₂ pada janin dapat menurun disebabkan keadaan janin yang lebih lama pada jalan lahir.

- Serta pecahnya ketuban yang menjadi pelindung bayi dapat menyebabkan cairan ketuban berkurang sedikit demi sedikit sehingga dapat menyebabkan gawat janin.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

Jam 22.00 wita Pasang infus / drips oxytocin 5 unit 12 tetes/ menit dalam larutan RL 500 cc

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa Aktual : Kala II Memanjang
 Masalah Aktual : Kelelahan
 Masalah Potensial : Antisipasi terjadi Gawat janin
 Tujuan : 1. Kala II lama teratasi
 2. Potensial gawat janin tidak terjadi
 Kriteria : 1. Djj dalam batas normal (120-160 x/menit)
 2. Kontraksi uterus dalam batas normal (lebih dari 3 kali dalam 10 menit) dengan durasi lebih dari 40 detik.

1. Lakukan informed consent

Rasional : Untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dan sebagai perlindungan hukum.

2. Observasi tetesan infus

Rasional : Untuk menilai kontraksi uterus tindakan selanjutnya

3. Lihat tanda gejala kala II

Rasional : Dapat mengetahui mulainya persalinan

4. Siapkan peralatan

Rasional : Agar pertolongan persalinan dilakukan dengan sebaik-baiknya

5. Pakai celemek

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang dan menghindari percikan darah

6. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Rasional : Mencegah infeksi silang

7. Pakai sarung tangan Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)

Rasional : mencegah infeksi silang

8. Bersihkan vulva dan perineum

Rasional : Membersihkan jalan lahir dan mencegah infeksi silang

9. Lakukan VT (Vagina Toucher)

Rasional : Untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

10. Celupkan tangan ke dalam larutan Clorin 0,5 % dan buka sarung tangan secara terbalik.

Rasional : mencegah infeksi silang

11. Periksa Djjs

Rasional : Mengetahui keadaan janin

12. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik

Rasional : Agar ibu mengetahui kemajuan persalinannya serta keadaan bayinya dan siap untuk mendedan

13. Minta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi mendedan

Rasional : Dapat membantu proses persalinan

14. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan.

Rasional : Memperlancar berlangsungnya proses persalinan

15. Pasang handuk bersih di atas perut ibu

Rasional : Meringankan badan bayi dari lendir dan darah agar bayi tidak hipotermi

16. Pasang handuk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Rasional : Digunakan untuk menyokong bayi

17. Buka partus set

Rasional : Untuk memudahkan mengambil sarung tangan dan peralatan lainnya.

18. Pakai sarung tangan DTT pada ke dua tangan

Rasional: Mencegah terjadinya infeksi silang

19. Pimpin persalinan dan sokong perineum

Rasional : Membantu ibu dalam meneran dan mencegah agar perineum tidak ruptur.

20. Bersihkan mulut, hidung dan muka bayi dengan has steril

Rasional : Mengupayakan agar lendir dan air ketuban yang terhisap oleh bayi tidak tertelan

21. Periksa lilitan tali pusat

Rasional: Mencegah terjadinya asfiksia pada bayi

22. Tunggu putaran paksi luar kepala bayi

Rasional: Menghindari adanya distosia pada leher dan punggung bayi

23. Lahirkan bahu depan dan kemudian belakang

Rasional: Membantu kelahiran bahu bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

24. Lahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Rasional : Membantu kelahiran badan bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

25. Susur badan bayi, bahu hingga kaki

Rasional: Membantu menyangga badan bayi agar tidak terjatuh

26. Perhatikan kondisi bayi

Rasional: Untuk menilai Apgar score.

27. Keringkan dan bungkus badan bayi

Rasional: Agar bayi tidak kedinginan oleh suhu lingkungan

28. Jepit tali pusat dengan 2 klem

Rasional : Menghentikan darah yang berasal dari plasenta dan badan bayi

29. Gunting tali pusat

Rasional : Memisahkan bayi dengan plasenta dan membantu proses pernafasan serta sirkulasi bayi

30. Ganti pembungkus bayi dengan yang kering

Rasional : Memberikan kenyamanan dan kehangatan pada bayi.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadi Gawat janin

Implementasi Tanggal 7 Juli 2010, Jam 21.00-23.30 Wita

1. Melakukan informed consent

2. Mengobservasi tetesan infuse

Hasil : Tetesan infus 12 tetes /menit

3. Melihat tanda gejala kala II

- Adanya dorongan meneran

- Adanya tekanan pada anus

4. Menyiapkan peralatan

a. Partus Set Steril

- 2 buah klem

- 1 buah gunting tali pusat

- 1 buah 1/2 kocher

- 1 pasang handscoon

- Gaas steril , pengikat tali pusat dan duk steril

b. Bak hecting Steril

- Nalpuder

- Gunting

- Kom berisi bethadine

- c. Jarum dan Cat gut / Zaide
 - d. Ember yang berisi larutan klorin 0,5 %
 - e. Ember yang berisi larutan DTT
 - f. Ember untuk pakaian kotor
 - g. Kantong plastik tempat plasenta
 - h. 1 Buah Nierbekken
 - i. Pakaian bayi dan ibu
5. Memakai celemek
 6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 7. Memakai sarung tangan DTT
 8. Mengisi spuit dengan oxytosin 10 Unit dengan 1 tangan
 9. Membersihkan vulva dan perineum
 10. Melakukan Pemeriksaan dalam (VT)

Jam: 21.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
2. Porsio melelap
3. Pembukaan 10 cm
4. Ketuban Negatif
5. Presentase Kepala dengan kaput
6. Hodge III-IV
7. Molage I
8. Tidak ada bagian Penumbungan

9. Kesan panggul normal
10. Pelepasan ketuban jernih
11. Mencelupkan tangan ke dalam larutan Clorin 0,5 % dan buka sarung tangan secara terbalik
12. Memeriksa Dj
13. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik
14. Meminta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi meneran
15. Melakukan pimpinan mengedan saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengedan
16. Memasang handuk bersih di atas perut ibu
17. Memasang duk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu
18. Membuka partus set
19. Memakai sarung tangan pada kedua tangan pada kedua tangan
20. Memimpin persalinan dan sokong perineum
21. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur
22. Menunggu putaran paksi luar kepala bayi
23. Melahirkan bahu depan dan kemudian belakang
24. Memeriksa lilitan tali pusat
25. Membersihkan mulut, hidung, muka dengan gaas steril
26. Meletakkan bayi di atas perut ibu
27. Mengeringkan dan bungkus badan bayi
28. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

29. Memotong tali pusat

30. Mengganti pembungkus bayi dengan yang kering.

LANGKAH VII. EVALUASI

Diagnosa : Perlangsungan Kala II

Masalah aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya Gawat janin

Evaluasi Tanggal 7 Juli 2010, Jam 23.30 Wita

1. Kala II berlangsung \pm 2 Jam 30 menit
2. Bayi lahir spontan serotinus tanggal 7 Juli 2010 laki-laki A/S : 4/6
3. BBL / PBL : Bayi 3000 gram / 49 cm
4. Anus berlubang dan tidak ada cacat bawaan
5. Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
6. TFU setinggi pusat
7. Darah yang keluar \pm 150 cc
8. Plasenta belum lahir

SOAP KALA II

Data Subjektif

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk mencedan
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pelepasan darah dan lendir
4. Ibu merasa ingin BAB
5. Ibu merasa lelah

Data Objektif

1. Tanda Tanda Vital

TD : 120/80 mmHg

P : 22 x/menit

N : 88 x/menit

S : 36,5°C

2. Kontraksi uterus 2 x 10 menit durasi 30-35 detik

3. Djj 130 x/menit

4. Nampak kepala dengan caput pada vulva

5. Perineum menonjol

6. Anus membuka

7. Nampak pelepasan darah dan lendir

8. Pembukaan lengkap

Assesment

Diagnosa Aktual : Perlangsungan Kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Gawat janin

Planning

1. Melakukan informed consent

2. Mengobservasi tetesan infuse

Hasil : Tetesan infus 12 tetes /menit

3. Melihat tanda gejala kala II

- Adanya dorongan mencedan
- Adanya tekanan pada anus
- Perineum menonjol
- Vulva dan anus membuka

4. Menyiapkan peralatan

a. Partus Set Steril

- 2 buah klem
- 1 buah gunting tali pusat
- 1 buah 1/2 koher
- 1 pasang handscoon
- Gaas steril , pengikat tali pusat dan duk steril

b. Bak Hecting Steril

- Nalpuder
- Gunting
- Kom berisi bethadine
- Jarum dan Cat gut / Zaide

c. Ember yang berisi larutan klorin 0,5 %

d. Ember yang berisi larutan DTT

e. Ember untuk pakaian kotor

f. Kantong plastik tempat plasenta

g. 1 buah nierbekken

h. Pakaian bayi dan ibu

5. Memakai celemek
6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
7. Memakai sarung tangan DTT
8. Mengisi spuit dengan oxytosin 10 Unit dengan 1 tangan
9. Membersihkan vulva dan perineum
10. Melakukan VT

Jam : 21.00 Wita

1. Vulva dan vagina tidak ada kelainan
 2. Porsio melesap
 3. Pembukaan 10 cm
 4. Ketuban Negatif
 5. Molage I
 6. Hodge III–IV
 7. Tidak bagian Penumbungan
 8. Kesan panggul normal
 9. Pelepasan ketuban jernih
11. Mencelepkan tangan ke dalam larutan Clorin 0,5 % dan buka sarung tangan secara terbalik
 12. Memeriksa Djg
 13. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik
 14. Meminta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi meneran

15. Melakukan pimpinan mendedan saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan
16. Memasang handuk bersih di atas perut ibu
17. Memasang duk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu
18. Membuka partus set
19. Memakai sarung tangan pada ke dua tangan
20. Memimpin persalinan dan sokong perineum
21. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur
22. Menunggu putaran paksi luar kepala bayi
23. Melahirkan bahu depan dan kemudian belakang
24. Memeriksa lilitan tali pusat
25. Membersihkan mulut, hidung, muka dengan gaas steril
26. Meletakkan bayi di atas perut ibu
27. Mengeringkan dan bungkus badan bayi
28. Menjepit tali pusat dengan 2 klem
29. Memotong tali pusat
30. Mengganti pembungkus bayi dengan yang kering.

KALA III

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

- DS :
- Ibu mengatakan nyeri perut
 - Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

- DO: - Bayi lahir spontan serotinus tidak segera menangis Jam 23.30 Wita
- A/S : 4/6
 - BBL / PBL : Bayi 3000 gram / 49 cm
 - Anus berlubang dan tidak ada cacat bawaan
 - Kala II berlangsung \pm 2 jam 30 menit
 - Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
 - TFU setinggi pusat
 - Darah yang keluar \pm 150 cc
 - plasenta belum lahir

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : Perlangungan Kala III

DS : - Ibu mengatakan nyeri perut

- Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

DO : - Bayi lahir spontan serotinus tidak segera menangis Jam 23.30 Wita

- A/S : 4/6
- BBL / PBL : Bayi 3000 gram / 49 cm
- Anus berlubang dan tidak ada cacat bawaan
- Kala II berlangsung \pm 2 jam 30 menit
- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
- TFU setinggi pusat
- Darah yang keluar \pm 150 cc
- Plasenta belum lahir

Analisa dan Interpretasi Data

- i. Kala II dimulai sejak bayi lahir seluruhnya dan berakhir sampai plasenta lahir lengkap.
- ii. Pada waktu kala III volume uterus sudah berkurang dapat teraba TFU setinggi pusat pada saat itu uterus berkontraksi memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba bulat dan keras.

LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya rest plasenta

DS : -

DO : 1. TFU setinggi pusat
2. Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

Analisa dan Interpretasi Data

Plasenta yang sudah terlepas dari dinding uterus tapi belum keluar disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau karena salah penanganan kala III sehingga terjadi lingkaran konstriksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

Tidak Ada Indikasi

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perlangsungan kala III
Masalah Aktual : Tidak ada
Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya Rest Plasenta

- Tujuan :
1. Kala III berlangsung normal
 2. Perdarahan tidak terjadi
 3. Tidak terjadi Rest Plasenta

- Kriteria :
1. Lamanya kala III \pm 30 menit
 2. Perdarahan kala III \pm 250 cc
 3. Pelepasan plasenta lengkap

Intervensi Tanggal 7 Juli 2010

31. Periksa fundus uteri

Rasional : Untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

32. Beritahu ibu akan disuntik oxytocin

Rasional : Oxytocin dapat membantu terlepasnya plasenta dan dinding rahim

33. Suntikkan oxytocin 0,5 unit Intra Muscular (IM) dan lakukan PTT.

Rasional: Suntikan oxytocin dapat membantu kontraksi uterus dan Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT) akan memudahkan keluarnya pasenta.

34. Pindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dan vulva

Rasional : Memudahkan malakukan peregangan tali pusat.

35. Letakkan satu tangan di atas sympisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Rasional : Dengan PTT akan memudahkan plasenta terlepas dan tangan pada sympisis /untuk mencegah terjadinya Rest plasenta

36. Keluarkan plasenta dengan menarik ke bawah dan ke atas

Rasional: Untuk membantu pengeluaran plasenta

37. Jemput plasenta kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Rasional: Mencegah robekan plasenta dan selaput ketuban serta menghindari

tertinggalnya sisa - sisa plasenta

38. Lakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Rasional : Merangsang kontraksi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan

39. Periksa plasenta dan selaput ketuban lahir, jumlah kotiledon, insersi tali pusat

Rasional : Dengan adanya sisa plasenta dan ketuban yang tinggal akan menyebabkan perdarahan

40. Masukkan plasenta kedalam kantong plastik

Rasional: Mencegah infeksi silang

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa

: Perlangsungan kala III

Masalah Aktual

: -

Masalah Potensial

: Antisipasi terjadinya rest plasenta

Implementasi Tanggal 7 Juli 2010 jam 23.30-23.40 wita

31. Memeriksa fundus uteri

Hasil : tunggal

32. Memberitahu ibu akan disuntik oxytocin

Hasil : Ibu bersedia

33. Menyuntikkan oxytocin 0,5 unit IM dan lakukan PTT

34. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dan vulva
35. Meletakkan satu tangan di atas symphysis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi
36. Mengeluarkan plasenta dengan menarik ke atas dan ke bawah
37. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam.
38. Melakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta
39. Memeriksa plasenta dan selaput ketuban (lengkap)

Hasil : selaput ketuban utuh, jumlah kotiledon lengkap, insersio sentralis.
40. Memasukkan plasenta kedalam kantong plastik.

LANGKAH VII. EVALUASI

- Diagnosa : Perlangsungan Kala III
- Masalah Aktual : -
- Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya rest plasenta

Evaluasi Tanggal 7 Juli 2010 jam 23.40 wita

1. Kala III berlangsung 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon
3. Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
4. TFU setinggi pusat
5. Pendarahan \pm 150 cc
6. Hacting VII C

SOAP KALA III

Data Subjektif

- Ibu mengatakan nyeri perut
- Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

Data Objektif

- Bayi lahir spontan serotinus tidak segera menangis Jam 22.30 Wita
- A/S : 4/6
- BBL / PBL : Bayi 3000 gram / 49 cm
- Anus berlubang dan tidak ada cacat bawaan
- Kala II berlangsung \pm 2 jam 30 menit
- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
- TFU setinggi pusat
- Darah yang keluar \pm 150 cc
- Plasenta belum lahir

Assesment

Diagnosa : Perlangungan kala III

Masalah Aktual : Tidak ada

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya rest plasenta

Planning

31. Memeriksa fundus uteri

Hasil : Tunggal

32. Memberitahu ibu akan disuntik oxytocin

Hasil : ibu bersedia

33. Menyuntikkan oxytocin 0,5 unit IM dan lakukan PTT

34. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dan vulva

35. Meletakkan satu tangan di atas symphysis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

36. Mengeluarkan plasenta dengan menarik ke atas dan ke bawah

37. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam.

38. Melakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

39. Memeriksa plasenta dan selaput ketuban

Hasil : selaput ketuban utuh, jumlah kotiledon lengkap, insersio sentralis.

40. Memasukkan plasenta kedalam kantong plastik.

KALA IV

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : - Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 10 menit

- Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon

- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

- TFU setinggi pusat

- Pendarahan \pm 150 cc

- Plasenta lahir lengkap

-Apgar Score 8/10

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangsungan Kala IV

DS : - Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 10 menit

- Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon
- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
- TFU setinggi pusat
- Perdarahan \pm 150 cc
- Apgar score 8/10

Analisa dan interpretasi Data

Saat kala II diperlukan tenaga untuk meneran sehingga tekanan cardiac meningkat menyebabkan TTV sedikit meningkat Setelah plasenta lahir maka otot uterus berkontraksi sehingga dapat menutup pembuluh darah pada dinding uterus yang bermuara pada bekas implantasi plasenta

LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya perdarahan

DS : - Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 10 menit

- Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon
- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
- TFU setinggi pusat
- Perdarahan \pm 150 cc

- Apgar score 8/10

Analisa dan interpretasi data

- i. Kelelahan yang dialami setelah persalinan menyebabkan kontraksi uterus tidak baik.
- ii. karena itu kala IV merupakan kala pengawasan yang memungkinkan terjadi perdarahan atonia uteri atau rest plasenta.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

Tidak ada indikasi

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa	: Perlangsungan kala IV
Masalah aktual	: Kelelahan
Masalah Potensial	: Antisipasi terjadinya perdarahan
Tujuan	: Kala IV berlangsung normal
Kriteria	: 1. Kotraksi uterus baik (keras dan bundar) 2. Perdarahan tidak terjadi 3. Tanda Tanda Vital dalam batas normal
	TD : 100-130 / 60-90 mmHg
	P : 16-20 x/menit
	N : 60-80 x/menit
	S : 36-37°C.

Intervensi Tanggal 7 Juli 2010.

41. Periksa adanya robekan jalan lahir

Rasional : Mengantisipasi perdarahan jalan lahir

42. Lakukan evaluasi kontraksi uterus

Rasional : Mengantisipasi terjadinya perdarahan akibat kontraksi uterus yang jelek

43. Bersihkan sisa darah dan celupkan tangan ke dalam larutan clorin

0,5 % dan bilas ke wadah DTT

Rasional : Memberikan rasa nyaman kepada ibu dan membersihkan sarung tangan dan darah

44. Ikat tali pusat sekitar 1 cm dari umbilicus

Rasional : Mencegah perdarahan tali pusat

45. Ikat balik tali pusat 2 kali

Rasional : Mempererat pengikatan tali pusat

46. Lepaskan klem dan rendam dalam larutan clorin 0,5 %

Rasional : Mendekontaminasi dan membunuh kuman-kuman yang ada pada klem

47. Selimuti kembali bayi

Rasional : Menghindari pemindahan panas tubuh

48. Anjurkan ibu menyusui bayinya

Rasional : Merangsang hipofise posterior untuk memproduksi ASI

49. Lakukan pemantauan uterus

Rasional : Menghindari kontraksi uterus yang jelek

50. Ajarkan ibu/keluarga melakukan massase

Rasional : Agar kontraksi uterus baik

51. Evaluasi kehilangan darah tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua

Rasional : Mengantisipasi dan mengawasi perdarahan post partum

52. Periksa Tanda Tanda Vital dan kandung kemih

Rasional: Sebagai indikator mengantisipasi perdarahan post partum

53. Rendam semua peralatan ke dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

Rasional : Membunuh kuman-kuman pada peralatan dan mencegah infeksi silang pada pemakaian selanjutnya

54. bersihkan ibu

Rasional : Memberi rasa nyaman dan aman pada ibu

55. Buang sampah yang terkontaminasi

Rasional : mencegah infeksi silang

56. Pastikan ibu merasa nyaman

Rasional : Agar ibu dapat beristirahat

57. Dekontaminasi tempat tidur dengan larutan klorin 0,5 %

Rasional : Mencegah infeksi

58. Celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % dan buka secara terbalik

Rasional : Mencegah infeksi silang dan membunuh kuman-kuman dan kontaminasi darah

59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir

Rasional : Mencegah infeksi silang

60. Lengkapi partograf

Rasional : Sebagai lembar pertanggung jawaban hasil pertolongan persalinan dan sebagai alat pemantauan persalinan.

LANGKAH. VI. IMPLEMENTASI

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya perdarahan

Implementasi Tanggal 7 Juli 2010.

41. Membersihkan darah dan periksa adanya robekan jalan lahir.

Hasil : terdapat robekan tingkat II dan dilakukan penjahitan

42. Melakukan evaluasi kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

43. Membersihkan sisa darah dan celupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5 % dan bilas ke wadah DTT

44. Mengikat tali pusat sekitar 1 cm dari pusat

45. Mengikat satu lagi pada bagian bawah tali pusat

46. Melepaskan klem dan rendam dalam larutan clorin 0,5 %
47. Membungkus tali pusat dengan gaas steril
48. Membungkus badan bayi dan dimasukkan kedalam incubator
49. Melakukan evaluasi kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

50. Mengajarkan ibu melakukan masase
51. Mengevaluasi kehilangan darah tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua

Hasil : 23.55 wita perdarahan 20 cc

00.10 wita perdarahan 20 cc

00.25 wita perdarahan 15 cc

00.40 wita perdarahan 15 cc

01.10 wita perdarahan 15 cc

01.40 wita perdarahan 15 cc

52. Memeriksa Tanda Tanda Vital dan kandung kemih

Hasil 23.50 wita TD : 100/80 mmHg

N : 88 x/menit

P : 20 x/menit

S : 36,4°C

LANGKAH VII. EVALUASI

Diagnosa : Perlangsungan kala IV
 Masalah Aktual : Kelelahan
 Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya perdarahan

Evaluasi Tanggal 7 Juli 2010.

1. Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
2. Pendarahan \pm 100 cc
3. TFU setinggi pusat
4. Kala IV berlangsung normal
5. Asfiksia Sedang teratasi dengan apgar Score 8/10
6. Tanda Tanda Vital
 - TD : 100/80 mmHg
 - P : 20 x/menit
 - N : 88 x/menit
 - S : 36,4 °C

SOAP KALA IV

Data Subjektif

- Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

Data Objektif

- Kala III berlangsung 10 menit
- Plasenta lahir lengkap dengan selaput dan kotiledon
- Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

- TFU setinggi pusat
- Perdarahan \pm 100 cc
- Tanda Tanda Vital

TD : 100/80 mmHg

P : 20 x/menit

N : 88 x/menit

S : 36,4°C

Assessment

- Diagnosa : Perlangsungan kala IV
- Masalah Aktual : Kelelahan
- Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya perdarahan

Planning

41. Membersihkan darah dan periksa adanya robekan jalan lahir
Hasil : Terdapat robekan tingkat II dan dilakukan penjahitan
42. Melakukan evaluasi kontraksi uterus
Hasil : Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)
43. Membersihkan sisa darah dan celupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5 %
dan bilas ke wadah DTT
44. Mengikat tali pusat sekitar 1 cm dari pusat
45. Mengikat satu lagi pada bagian bawah tali pusat
46. Melepaskan klem dan rendam dalam larutan clorin 0,5 %
47. Membungkus tali pusat dengan gaas steril

48. Membungkus badan bayi dan dimasukkan kedalam incubator

49. Melakukan evaluasi kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik (keras dan bundar)

50. Mengajarkan ibu melakukan masase

51. Mengevaluasi kehilangan darah tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua

Hasil: 23.55 wita perdarahan 20 cc

00.10 wita perdarahan 20 cc

00.25 wita perdarahan 15 cc

00.40 wita perdarahan 15 cc

01.10 wita perdarahan 15 cc

01.40 wita perdarahan 15 cc

52. Memeriksa Tanda Tanda Vital dan kandung kemih

Hasil 23.55 wita TD : 100/80 mmHg

P : 20 x/menit

N : 88 x/menit

S : 36,4°C

00.10 wita TD : 100/70 mmHg

N : 88 x/menit

00.25 wita TD : 100/70 mmHg

N : 88 x/menit

00.40 wita TD : 100/70 mmHg

N : 88 x/menit

01.10 wita TD : 100/90 mmHg

N : 88 x/menit

S : 36,5°C

01.40 wita TD : 100/90 mmHg

N : 88 x/menit

53. Membersihkan ibu

54. Memastikan ibu merasa nyaman

55. Merendam semua peralatan ke dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

56. Membuang sampah yang terkontaminasi

57. Mendekontaminasi tempat tidur

58. Mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan clorin 0,5 % dan buka secara terbalik.

59. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir

60. Melengkapi partograf.



BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan antara teori hasil studi pada pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada klien Ny "S" dengan kasus partus lama di ruang Intra Natal Care RSIA SITTI FATIMAH tanggal 7 Juli 2010. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus. Untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis yang dimulai dari pengkajian data, interpretasi data, analisa data, perencanaan, implementasi dan evaluasi asuhan kebidanan untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

A. Pengkajian dan Analisa Data Dasar

Pada pengumpulan data dasar merupakan dasar proses manajemen kebidanan yang kegiatannya ditujukan untuk pengumpulan informasi. Berdasarkan pengkajian data yang ditemukan maka diperoleh gestasi 293 hari atau 41 minggu 3 hari. Hamil pertama kali dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang sejak \pm 5 jam yang lalu, bersifat hilang timbul dan ibu mengatakan janinnya bergerak kuat. Sedangkan data objektif hasil palpasi TFU 2 jbpx 30 cm teraba bokong di fundus, punggung kiri, presentase kepala dan kepala sudah BDP (bergerak dalam panggul). Hasil pemeriksaan dalam jam 09.00 wita didapatkan pembukaan 1 cm dan pembukaan lengkap pada jam \pm 21.00 wita sampai jam 23.30 wita bayi lahir.

Pada teori mengatakan perlangsungan kala I pada primigravida selama 13 jam dan majunya kepala terjadi setelah kepala masuk kedalam 1-4 rongga panggul yang dimulai pada kala II dimana perlangsungan kala II seluruhnya selama 1 1/2 jam sampai bayi lahir sedangkan pada kasus Ny "S" ditemukan perlangsungan kala I selama 12 jam, kala II berlangsung selama 2 1/2 jam sampai bayi lahir ini disebabkan karena kurang adekuatnya his dan didukung faktor kelelahan pada saat proses persalinan. Pada kasus diatas terjadi Partus Lama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan penerapan manajemen asuhan kebidanan.

B. Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan.

Adapun diagnosa / masalah aktual yang dapat diidentifikasi pada klien Ny "S" tidak memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek yaitu terjadinya partus lama dengan kala II memanjang.

C. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Dalam merumuskan diagnosa / masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan membahayakan klien.

Diagnosa / masalah potensial yang dapat diidentifikasi pada studi kasus Ny "S" ada kesamaan antara teori yaitu antisipasi terjadinya gawat janin.

D. Perlunya Tindakan Segera / Kolaborasi

Teori mengatakan jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan maka diberikan infus oksitosin 5 kesatuan dalam 500 cc dextrose 5 % (atau garam fisiologik) dimulai dari 8 tetes per menit dan dinaikkan setiap 15 menit.

Berdasarkan pada kasus Ny "S" ditemukan adanya data yang menunjang untuk melakukan tindakan emergency atau segera pada kala II yaitu kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih professional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien atau konsultasi dengan dokter untuk pemberian infus drips oksitosin 5 unit 12 tetes per menit.

E. Rencana Asuhan Kebidanan

Pada persalinan normal rencana tindakan yang diberikan adalah tirah baring, pemantauan dengan partograf, observasi, dan memberikan motivasi pada klien.

Pada kasus Ny "S" menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang menguntungkan dengan berbaring tidur dalam posisi miring ke kiri, memantau persalinan dengan partograf dan memberikan motivasi kepada ibu dalam menghadapi proses persalinan.

Pada teori mengatakan jika pada persalinan didapatkan kala II lama maka yang perlu diperhatikan:

Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan maka diberikan infus oksitosin 5 kesatuan dimulai dari 8 tetes per menit dan dinaikkan setiap 15 menit untuk meningkatkan kontraksi yang ada. Jika tidak ada kemajuan penurunan kepala tidak lebih dan 1/5 diatas simpipis pubis lakukan ekstraksi vakum atau cunam. Kepala diantara 1/5-3/5 diatas simpipis pubis lakukan ekstraksi vakum, kepala lebih dari 3/5 diatas simpipis pubis lakukan seksio sesarea.

Pada kasus Ny "S" tanda-tanda obstruksi dapat disingkirkan oleh karena itu tindakan yang diberikan adalah infus oksitosin 5 unit dalam larutan RL 500 cc 12 tetes /menit serta pemberian intake yang kuat. Kecepatan jumlah tetesan (12 tetes/menit) dikarenakan pembukaan lengkap. Kepala hodge III-IV dan menambah kontraksi uterus (2 x 10 menit durasi 30-35 detik) sampai bayi lahir secara spontan.

F. Implementasi Asuhan Kebidanan

Sesuai tinjauan manajemen kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada kasus Ny "S" dengan partus lama, semua tindakan telah direncanakan sudah dilakukan seluruhnya dengan baik, tanpa hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan yang ada di ruang bersalin RSIA SITTI Fatimah Makassar.

G. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Kala I persalinan dengan presentase kepala pada primigravida akan berlangsung 13 jam. Pada kasus Ny "S" kala I berlangsung \pm 12 jam.

Pada persalinan dengan kala II yang berlangsung lebih lama dan yang seharusnya menyebabkan dapat terjadi komplikasi pada bayi baru lahir.

Pada kasus Ny "S" bayi lahir dengan asfiksia sedang dengan Apgar Score 4/6 (tidak bernapas dengan spontan dimana warna, tubuh kemerahan, kaki biru pucat sedangkan denyut jantung kurang dari 100), Kala II berlangsung selama \pm 2 jam 30 menit dengan Jenis kelamin laki-laki, BBL : 3000 gram, PBL : 49 cm. Asfiksia sedang teratasi dengan apgar Score 8/10 selama \pm 15 menit setelah lahir dan dalam perawatan incubator selama \pm 6 jam dan penyuntikan vit. K 2 strip.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan studi kasus pada kasus Ny “S” dengan partus lama serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intra natal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pada inpartu II > 2 jam 30 menit dapat mengakibatkan gawat janin dan kematian. Sesuai teori dilakukan tindakan untuk mempercepat kala II dengan pemberian infuse drips 5 kesatuan dalam larutan RL 12 tetes per menit.
2. Bayi lahir dengan asfiksia sedang, sehingga dilakukan pembebasan jalan nafas, rangsangan taktil, dan perawatan incubator.
3. Pada kala III dan IV tidak ditemukan adanya masalah. Hasil evaluasi tercapai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Penerapan proses manajemen kebidanan pada Ny “S” dilaksanakan sesuai dengan pengkajian dan langkah-langkah sistematis yang dapat diidentifikasi secara menyeluruh. Dokumentasi proses manajemen kebidanan dilaksanakan pada setiap tahap dengan penuh tanggung jawab dalam menangani kasus Ny. “S”.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya partus lama yang dapat berdampak pada ibu maupun janinnya baik pada kala I dan kala II memanjang maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu adapun penulis sarankan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah kejadian partus lama perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan persalinan yang cepat dan tepat, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat timbul.
2. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan asuhan diperlukan kerja sama yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dokter serta bidan yang terlibat dalam penanganan kasus klien.
3. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada persalinan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Asrul. 2007. "*Asuhan Persalinan Normal*" Edisi Ketiga. Penerbit : JNPK-KR/POGI. Jakarta
- Ayurai. 2009. *Persalinan Fisiologis Kala I Fase Aktif*, Diakses tanggal 24 Maret 2010 dari <http://www.wordpress.com>
- BKKBN. 2010. *Capaian MDGS Terkendala Kasus Kematian*, Diakses tanggal 23 Maret 2010 dari <http://www.metrotvnews.com>
- Chapman, Vicky. 2006. "*Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*". Cetakan Pertama, Penerbit : Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Cilong. 2010. *Induksi Persalinan*. Diakses tanggal 16 April 2010 dari <http://www.childbirthconnection.com>
- Coad, Jane. 2007. "*Anatomi dan Fisiologi Untuk Bidan*". Cetakan Pertama, Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta
- Dinas kesehatan. 2008. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*, Makassar
- Harnawati. 2008. *Fisiologi Persalinan Normal*, Diakses tanggal 16 April 2010 dari <http://www.iulren.com>
- Henderson, Christine. 2006. "*Buku Ajar Konsep kebidanan*". Cetakan Pertama. Penerbit Buku kedokteran EGC. Jakarta
- HIMAPID. 2009. *Kematian Maternal*, Diakses tanggal 19 Maret 2010 dari <http://www.himapid@yahoo.co.id>
- Liu, David T.Y. 2008. "*Manual Persalinan*". Cetakan Pertama, Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta
- Maimunah. 2005. "*Kamus Istilah Kebidanan*". Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta

- Purwandari, Atik. 2008. "*Konsep kebidanan : Sejarah dan Profesionalisme*". Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
- Rizkaharni, 2009. *Prolonged Delivery (Persalinan Lama)*, diakses tanggal 24 Maret 2010 dari <http://www.wordpress.com>
- Saifuddin, AB. 2006. "*Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*". Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta
- _____ "*Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan maternal dan Neonatal*". Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas. Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta
- Salmah. 2006. "*Asuhan Kebidanan Antenatal*". Cetakan Pertama. Penerbit JNPK-KR/POGI, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2009. "*Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Cetakan Kedua. Penerbit Lentera Hati. Jakarta
- Thalbah, Hisham. 2009. "*Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadist*". Cetakan Ketiga. Penerbit PT. Sapta Sentosa. Jakarta
- Wayan. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persalinan*. Diakses tanggal 3 Mei 2010 dari <http://www.wordpress.com>
- Wiknjosastro, Hanifa. 2005. "*Ilmu Kebidanan*". Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh. Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Sri Yoelinda Sari S

Tempat, Tanggal Lahir : Nasara, 18 Maret 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Manuruki II lrg. 5 A.

No. telp : 085255969566

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri No. 15 Nasara, Kab. Jeneponto, tahun 2001
2. SLTP Negeri 3 Bangkala, Kab. Jeneponto, tahun 2004
3. SMA Negeri 1 Tamalatea, Kab. Jeneponto, tahun 2007
4. Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar jurusan Kebidanan sejak tahun 2007

Nama orang Tua

- a. Ayah : Safaruddin, S. Pd.
- b. Ibu : Nurhayati T, S. Pd.

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : PNS
- b. Ibu : PNS

Status dalam Keluarga : Anak pertama dari 3 Bersaudara