

**HUBUNGAN HYGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN  
INFEKSI KECACINGAN PADA PEMULUNG ANAK USIA  
SEKOLAH DASAR DI TPA ANTANG MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat (SKM) Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R**

**UMMUL WAQIAH  
NIM : 70200106092**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

**UMMUL WAQIAH**  
**NIM: 70200106092**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “hubungan hygiene perorangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang Makassar”, yang disusun oleh Ummul Waqiah, NIM 70200106092, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Skripsi* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Agustus 2010 M, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1431, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Agustus 2010 M  
21 Ramadhan 1431 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Fatmawaty Mallapiang, SKM., M. Kes (.....)

Sekretaris : Wahyuni Sahani, ST., M.Si. (.....)

Penguji I : Andi Susilawati, S. Si., M. Kes. (.....)

Penguji II : Dr. Hasaruddin, S. Ag., M. Ag. (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**dr. H.M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph.D**  
NIP. 19580404 198903 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswah dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi.

Ucapan terimakasih dan penghargaan teristimewa ananda haturkan kepada orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta (H. Muh. Yusuf Hamang, dan St. Suade, HS.) yang senantiasa memberikan dukungan moral yang tak terhingga, hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Selain itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan pembantu Dekan I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasehat kepada penyusun.
2. Ibu ketua prodi kesehatan masyarakat fakultas ilmu kesehatan Andi Susilawaty, S.Si., M. Kes. dan sekretaris prodi Hj. Syarfaeni, SKM., M. Kes. yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasehat selama penyusun menyelesaikan akademik di UIN Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, SKM. M. Kes. dan Hj. Wahyuni Sahani, ST., M. Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusun dalam mengikuti proses perkuliahan.
5. Kakak-kakakku yang tercinta Husnul Inayah, S. Pd. dan Faisal, S. Pi. beserta adik-adikku tersayang Nur Amalia, Nadilah, dan Ahmad Mustajab yang

selalu memberikan semangat, mendoakan dan mengingatkan untuk selalu tetap bersabar terhadap segala kendala yang dihadapi.

6. Terkhusus untuk kakanda Syamsur, S. Pd yang selalu hadir menemani dan memberikan dukungan yang tak ternilai harganya serta bantuan yang tak henti-hentinya saat pembuatan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di prodi kesehatan masyarakat angkatan 2006, khususnya *nine ladies* (inna, riri, muti, whina, neno, ela, indri, nurul) serta kak Syamsu Alam, SKM. yang selalu menasehati dan membantu saat penyusun menghadapi masalah dalam penyusunan.
8. Saudara-saudara di UKM LDK Al-Jami', khususnya akh Munawwar, akh Nur Taqwa dan akh Mustaqim atas doa dan bantuannya selama penyusunan.
9. Dan seluruh teman-teman yang namanya tak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Akhirul qalam, semoga bantuan bapak, ibu, dan saudara (i) diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. serta bernilai ibadah dan memperoleh balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah. *Amin ya Rabbal Alamin.*  
Billahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Makassar, Agustus 2010

Penyusun

**UMMUL WAQIAH**  
**NIM: 70200106092**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-6</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7-29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hygiene Perorangan.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Kecacingan.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pemulung .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Usia Anak Sekolah Dasar .....	29
<b>BAB III KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>30-37</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti .....	30
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti .....	32

C. Defenisi Operasional Kriteria Obyektif .....	33
D. Hipotesis Penelitian .....	35
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38-43</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel .....	40
D. Cara Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Penyajian Data.....	43
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44-64</b>
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	56
C. Keterbatasan Penelitian.....	63
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65-66</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 5.1</b>	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	44
<b>Tabel 5.2</b>	Distribusi Responden Menurut Umur .....	45
<b>Tabel 5.3</b>	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	45
<b>Tabel 5.4</b>	Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Memakai Alas Kaki .....	46
<b>Tabel 5.5</b>	Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Mencuci Tangan .....	46
<b>Tabel 5.6</b>	Distribusi Responden Menurut Kebersihan Kuku .....	47
<b>Tabel 5.7</b>	Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Memakai Sarung Tangan....	47
<b>Tabel 5.8</b>	Distribusi Responden Menurut Jenis Sarung Tangan.....	48
<b>Tabel 5.9</b>	Distribusi Responden Menurut Pencucian Sarung Tangan .....	48
<b>Tabel 5.10</b>	Distribusi Responden Menurut Kejadian Kecacingan.....	49
<b>Tabel 5.11</b>	Distribusi Responden Menurut Jenis Cacing .....	49
<b>Tabel 5.12</b>	Distribusi Responden Menurut Pemberian Obat Cacing .....	50
<b>Tabel 5.13</b>	Distribusi Responden Menurut Terakhir Kali Diberikan Obat Cacing .	50
<b>Tabel 5.14</b>	Distribusi Kejadian Kecacingan Berdasarkan Umur .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran A** Kuesioner

**Lampiran B** Master Tabel dan Output

**Lampiran C** Peta Tempat Pembuangan Akhir Sampah Antang

**Lampiran D** Persuratan



## ABSTRAK

Ummul Waqiah, 2010

### **HUBUNGAN HYGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI KECACINGAN PADA PEMULUNG ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI TPA ANTANG MAKASSAR**

(Pembimbing I: Fatmawaty Mallapiang, Pembimbing II: Wahyuni Sahani)

Penyakit-penyakit infeksi di Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi. Salah satu penyakit yang insidennya masih tinggi adalah infeksi kecacingan yakni cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*soil transmitted helminthiasis*). Hal ini terjadi mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat yang masih rendah serta beriklim tropis sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan penularan kecacingan. Infeksi kecacingan biasanya insidennya paling tinggi di pedesaan, daerah kumuh, dan daerah yang padat penduduknya.

Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hygiene perorangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan pendekatan *case control*, dimana variabel hygiene perorangan diteliti dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh pemulung usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria inklusi dan eksklusi kemudian besar sampel minimal diperoleh 30 anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji laboratorium, (2) kuesioner, (3) lembar observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rumus statistik uji *Chi-square* dengan derajat kemaknaan ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan analisis *Chi-square* yakni dengan uji *yate's corrected* antara variabel kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.006. Uji *yate's corrected* juga dilakukan antara variabel kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.011. Sedangkan anatar variabel kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan digunakan uji *fisher exact* diperoleh nilai p sebesar 0.000. Uji *fisher exact* antara variabel kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.004.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memotong kuku dan kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan.

Daftar Pustaka: 28 (1990-2010)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyakit-penyakit infeksi di Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi. Salah satu penyakit yang insidennya masih tinggi adalah infeksi kecacingan yakni cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*soil transmitted helminthiasis*). Hal ini terjadi mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat masih rendah serta beriklim tropis sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan penularan cacing.

Ada tiga jenis cacing yang hidup dan berkembang biak sebagai parasit di dalam tubuh manusia seperti *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang) hidup dengan mengisap sari makanan, *Trichuris trichiura* (cacing cambuk) selain mengisap sari makanan juga mengisap darah, *Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus* (cacing tambang) hidup dengan mengisap darah saja, sehingga penderita cacingan akan kurus, dan kurang gizi, pada gilirannya menjadi mudah lelah, malas belajar, daya tangkap menurun bahkan mengalami gangguan pencernaan (diare) yang berujung pada rendahnya mutu sumber daya manusia dan merosotnya produktivitas (Djamilah, M. 2003).

Infeksi cacing usus ditularkan melalui tanah yang tercemar, tempat tinggal yang tidak saniter, dan cara hidup yang tidak bersih. Infeksi cacing usus terdapat luas di seluruh Indonesia yang beriklim tropis, terutama di pedesaan, daerah kumuh, dan daerah yang padat penduduknya.

Infeksi cacing usus merupakan infeksi kronik. Semua umur dapat terinfeksi cacing ini namun prevalensi tertinggi terdapat pada anak usia sekolah dasar. Tingginya prevalensi kecacingan pada anak usia sekolah dasar dibandingkan dengan orang dewasa, disebabkan oleh karena aktivitas anak dominan berhubungan dengan tanah serta tidak menjaga kebersihan tangannya. Sedangkan pada usia dewasa yang rentan terhadap penyakit ini adalah para pekerja yang berhubungan langsung dengan tanah misalnya pekerja pertambangan dan pekerja perkebunan.

Di dunia pada tahun 2006, sekitar 2 milyar penduduk terinfeksi kecacingan, dimana 300 juta diantaranya meninggal dunia. *Ascaris lumbricoides* terdapat di seluruh dunia terutama di daerah tropis dengan suhu panas dan sanitasi lingkungan yang jelek. Di negara yang sudah maju angka kejadian penyakit ini sangat rendah, misalnya di Eropa Barat hanya 10%, Skandinavia 3% dan Italia 50%, di daerah pedesaan bagian selatan Amerika Serikat 20-67%. Prevalensi yang tinggi ditemukan terutama di negara-negara non-industri (negara yang sedang berkembang).

Di Indonesia pada tahun 2004, prevalensi penyakit kecacingan pada semua umur juga masih cukup tinggi yaitu 58,15% yang terdiri dari 30,4% *Ascaris lumbricoides*, 21,25% *Trichuris trichiura* serta 6,5% *Hookworm* ([http:// repository. usu.ac.id/bitstream/123456789/16381/5/Chapter%20I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16381/5/Chapter%20I.pdf)).

Penelitian epidemiologi telah dilakukan hampir di seluruh propinsi di Indonesia, terutama pada anak-anak sekolah dan umumnya didapatkan angka prevalensi tinggi yang bervariasi. Prevalensi askariasis, trichuriasis, dan infeksi

cacing tambang pada manusia di propinsi DKI Jakarta adalah 4-91%, 30-100%, dan 1-30%; Jawa Barat adalah 20-90%, 46-91%, dan 5-67%; Yogyakarta adalah 12-85%, 37-95%, dan 25-77%; Jawa Timur adalah 16-74%, 1-14%, dan 2-45%; Bali adalah 40-95%, 25-90%, dan 20-70%; NTT adalah 10-75%, 4-78%, dan 1-29%; Sumatera Utara adalah 46-75%, 65%, dan 20%; Sumatera Barat adalah 2-71%, 6-10%, dan 20-36%; Sumatera Selatan adalah 51-78%, 37%, dan 23%; Kalimantan Selatan adalah 79-80%, 78%, dan 82%; Sulawesi Utara adalah 30-72%, 12%, dan 13% (Tjitra, E. dalam [www.kalbe.co.id/files/cdk/files/07\\_Penelitian-Penelitian Soil di Indonesia. Pdf/ 07 Penelitian-Penelitian Soil di Indonesia.html](http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/07_Penelitian-Penelitian%20Soil%20di%20Indonesia.Pdf/07_Penelitian-Penelitian%20Soil%20di%20Indonesia.html)).

Daerah endemi dengan insiden yang tinggi pada *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris trichiura* salah satunya terdapat di daerah kumuh kota Jakarta. Pada umur satu tahun *Ascaris lumbricoides* dapat ditemukan pada anak tersebut yakni 80-100%, untuk *Trichuris trichiura* angkanya lebih rendah sedikit, yaitu 70%. Infeksi *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris trichiura* sudah ditemukan pada bayi yang berumur kurang dari satu tahun. Usia anak termuda yang mendapat infeksi *Ascaris lumbricoides* adalah 16 minggu, sedangkan untuk *Trichuris trichiura* adalah 41 minggu. Ini terjadi di lingkungan tempat kelompok anak berdefekasi di saluran air terbuka dan di halaman sekitar rumah (*door yard infection*). Karena kebiasaan seperti defekasi sekitar rumah, makan tanpa cuci tangan, bermain-main di tanah di sekitar rumah, maka khususnya anak-anak terus menerus mendapatkan reinfeksi (Gandahusada, S. 2006:24).

Berdasarkan hasil penelitian Budiyo pada tahun 1996 di TPA Jatibarang Semarang, menunjukkan jumlah pemulung yang positif kecacingan cacing usus sebanyak 58,23% dari 79 responden yang diperiksa. Dari penelitiannya juga menunjukkan adanya hubungan bermakna antara tingkat kebersihan tangan, tingkat pemakaian alas kaki, tingkat kebersihan kuku, tingkat pemakaian jamban serta tingkat kebersihan kaki dengan infeksi cacing usus pada pemulung (Fauziah. 2006).

Di Makassar penelitian tentang infeksi kecacingan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Veny Hadju pada tahun 1996 di daerah pemukiman kumuh, dengan hasil bahwa terdapat 92% anak terinfeksi oleh *Ascaris* dan *Trichuris* serta 98 % terinfeksi *Hookworm*.

Penelitian Budianto pada tahun 1999 menunjukkan lebih dari 70% pemulung terinfeksi cacing dan menemukan adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan pemakaian alas kaki, penggunaan sarung tangan, kebiasaan mencuci tangan dan potong kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Tamangapa, Makassar.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Tamangapa, kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala Kota Makassar, menunjukkan bahwa jumlah penderita cacingan pada tahun 2008 yakni mencapai 212 orang sedangkan pada tahun 2009 jumlah penderita infeksi kecacingan meningkat menjadi 332 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah penderita sebanyak 120 orang (63.85%) dalam satu tahun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas penulis bermaksud mengetahui apakah ada hubungan hygiene perorangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hygiene perorangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan antara pemakaian alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.
- d. Untuk mengetahui hubungan antara pemakaian sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah, terkhusus pada pengetahuan tentang teori dan konsep penyakit kecacingan yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat bagi institusi pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perencanaan, perbaikan dan pengembangan kualitas sanitasi lingkungan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pemulung sampah sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi kecacingan.

### **3. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang dapat membuahkan pokok-pokok pikiran yang kemudian dapat dikembangkan dan disumbangkan untuk menurunkan angka infeksi kecacingan serta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberdayaan pemulung sampah dalam membantu proses daur ulang demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

### **4. Manfaat bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam upaya menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejadian infeksi kecacingan disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat (SKM) pada Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hygiene Perorangan

##### 1. Pengertian Hygiene Perorangan

Hygiene perorangan disebut juga kebersihan diri, kesehatan perorangan atau personal hygiene. Hygiene berasal dari kata *Hygiea* yang dikenal dalam sejarah Yunani sebagai dewi kebersihan.

Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Hidayat, 2009 dalam <http://hidayat2.wordpress.com/2009/03/20/23/>).

Departemen Pendidikan Nasional (2001:400) hygiene adalah ilmu tentang kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kesehatan. Hygiene perorangan dapat tercapai bila seseorang mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena pada dasarnya hygiene adalah mengembangkan kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan (Evi Yulianto, 2006, dalam <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH11ea/3086d1cd.dir/doc.pdf>).

Pengertian hygiene berdasarkan UU No. 2 tahun 1966 adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa baik untuk umum maupun untuk perorangan dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup

yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan daya guna perikehidupan manusia.

Sedangkan menurut Azrul Azwar, hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan (Daud, A. 2001:39).

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hygiene merupakan usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya pencegahan timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat dihuni dengan nyaman.

Dalam Islam, kebersihan dijadikan sebagai akidah dengan sistem yang kokoh bagi seorang muslim, bukan semata-mata takut pada penyakit. Dengan demikian maka kebersihan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran ibadah dan puasa, bahkan Islam menjadikan sebagai bagian dari iman. Rasulullah saw. bersabda:

النظافة من الايمان

Artinya:

“Kebersihan merupakan sebagian dari iman.” (H.R. Muslim)

Dari hadist tersebut, dikemukakan bahwa nilai iman setingkat lebih tinggi dari pada nilai Islam semata. Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian. Baik kesucian yang bersifat lahiriah seperti wudhu dan mandi, ataupun kesucian yang sifatnya bathiniah, seperti kesucian

hati dan jiwa. Dengan demikian maka seorang muslim tidak diperbolehkan menghadap Allah dalam shalatnya melainkan setelah bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuhnya.

Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan bersuci (*thaharah*). Yang dimaksud dengan istilah “bersuci” (*thaharah*) adalah membersihkan atau membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri, sedang sesuatu yang kotor, atau mengandung jamur diidentikkan dengan “najis” (Al-Fanjari, 1996:13).

Adapun cara bersuci (*thaharah*) diterangkan oleh Allah dalam Alquran, yakni

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

فَأَطْهَرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”* (Q.S. al-Maa-idah {5}: 6).

Dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

*“... Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”* (Q.S. al-Baqarah {2}: 222).

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk selalu mensucikan diri. Ini berarti bahwa Islam ditegakkan atas prinsip kebersihan. Segala sesuatu harus dimulai dari kesucian, baik kesucian niat maupun kesucian fisik dan pakaian, seperti ketika hendak shalat dan membaca Alquran.

Selain hadist dan ayat tersebut di atas masih banyak ayat yang menggambarkan pentingnya kebersihan dalam Islam. Dalam beberapa ayat Alquran, dapat kita lihat bahwa surat pertama yang diturunkan adalah panggilan kepada ilmu yakni surat “al-Alaq”, dimana pada ayat pertama berbunyi “*iqra*” yang artinya “bacalah”, sedang surat kedua adalah panggilan kepada kebersihan.

Terjemahnya:

“ Dan pakaianmu bersihkanlah”. (Q.S. al-Mudatsir {74}: 4)

## 2. Tujuan Hygiene Perorangan

- a. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang
- b. Memelihara kebersihan diri seseorang
- c. Memperbaiki personal hygiene yang kurang
- d. Mencegah penyakit
- e. Menciptakan keindahan
- f. Meningkatkan rasa percaya diri

Pada dasarnya ruang lingkup usaha hygiene perorangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Hygiene badan, seperti usaha memelihara kebersihan tangan dan kuku, perawatan kebersihan kaki, rambut, gigi, mulut, mata dan lain-lain.
- b. Hygiene pakaian dan peralatan lain, seperti menghindari penggunaan secara lama dan atau yang kotor dari pakaian, maupun pakaian dalam, handuk dan sikat gigi.
- c. Hygiene makanan dan minuman yaitu sejak pemilahan bahan makanan hingga penyajiannya, kebiasaan tidak jajan, mencuci sayur lalapan secara bersih helai demi helai dengan menggunakan air yang mengalir dan lain-lain.

Menurut Departemen Kesehatan R.I (2001:100) usaha pencegahan penyakit cacangan antara lain: menjaga kebersihan badan, kebersihan

lingkungan dengan baik, makanan dan minuman yang baik dan bersih, memakai alas kaki, membuang air besar di jamban (kakus), memelihara kebersihan diri dengan baik seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan. Kebersihan perorangan penting untuk pencegahan.

### **1) Kebiasaan Memakai Alas Kaki**

Kesehatan anak sangat penting karena kesehatan semasa kecil menentukan kesehatan pada masa dewasa. Anak yang sehat akan menjadi manusia dewasa yang sehat. Membina kesehatan semasa anak berarti mempersiapkan terbentuknya generasi yang sehat yang akan memperkuat ketahanan bangsa.

Pembinaan kesehatan anak dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, ayah, ibu, saudara, anggota keluarga serta anak itu sendiri. Anak harus menjaga kesehatannya sendiri salah satunya dengan membiasakan memakai alas kaki (Departemen Kesehatan R.I, 1990:61).

Kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Tanah gembur (pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan larva cacing. Jika seseorang menginjakkan kakinya di tanah tanpa menggunakan alas kaki dan jika kebersihan serta pemeliharaan kaki tidak diperhatikan maka dapat menjadi sasaran pintu masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk larva cacing.

Oleh karena itu, pemakaian alas kaki saat keluar rumah ataupun ke WC (*water closet*), serta perawatan dan pemeliharaan kaki sangat penting. Menyela-nyela jari-jari kedua telapak kaki adalah termasuk sunah dalam

bersuci, kemudian hendaknya seseorang tidak menginjakkan kakinya selain pada tempat yang suci.

Hindari berjalan tanpa memakai alas kaki karena dapat mencegah infeksi pada luka dan masuknya telur cacing pada kaki yang tidak beralas. Dengan memakai alas kaki, maka dapat memutuskan hubungan bibit penyakit ke dalam tubuh, sehingga infeksi kecacingan dapat dihindari.

## **2) Kebiasaan Mencuci Tangan**

Kebanyakan penyakit kecacingan ditularkan melalui tangan yang kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tidak ada bagian tubuh lainnya yang paling sering kontak dengan mikroorganisme selain tangan.

Tangan hendaknya dibersihkan sebelum dan sesudah memasak atau menyiapkan makanan. Ini dapat mengurangi resiko terkena atau menyebarkan telur cacing yang menyebabkan makanan mengandung telur cacing. Sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar/ kecil. Juga setelah mengganti popok bayi dan sehabis memegang benda yang kotor.

Tangan dicuci di bawah air yang mengalir lebih baik lagi bila dengan air hangat dan menggunakan sabun. Disarankan sabun yang digunakan adalah sabun cair. Gosok tangan selama 1 menit. Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari dan kuku. Kemudian gunakan tissue atau handuk sebagai penghalang pada saat akan mematikan keran air karena bagian itu sudah kotor ketika kita akan menyalakan air. Cara ini dapat menghindari terjadinya kontaminasi makanan/minuman yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menghindari terjadinya infeksi kecacingan.

Saat bangun dari tidur pun, Rasulullah saw. menganjurkan ummatnya untuk mencuci tangan terlebih dahulu.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا  
ثَلَاثًا, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لِقَوْلِ مُسْلِمٍ)

Artinya:

“Apabila seseorang diantara kamu bangun dari tidur, dia tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam tempat air sampai dia telah mencuci tangannya sebanyak 3x, sesungguhnya kamu tidak tahu kemana kedua tanganmu merayap sewaktu tidur” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kebiasaan cuci tangan sebelum makan memakai air dan sabun mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pencegahan infeksi kecacingan, karena mencuci tangan dengan air dan sabun dapat lebih efektif menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan secara bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri dan parasit lainnya pada kedua tangan. Oleh karenanya, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dapat lebih efektif membersihkan kotoran dan telur cacing yang menempel pada permukaan kulit, kuku dan jari-jari pada kedua tangan.

### 3) Kebersihan Kuku

Kuku tangan yang panjang dan kotor menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit. Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran yang dimasukkan kategori dengan istilah *khabats*, atau *khataya*, atau *syaitan* (Al-Fanjari, 1996:11).



Telur cacing sering kali terselip pada kuku yang kotor. Kondisi ini sering terjadi pada anak yang sering bermain di tanah serta pada orang dewasa yang bekerja di kebun atau di sawah (Nadesul, Hendrawan. 2000).

Telur cacing yang berada di tanah dapat pindah ke sela-sela jemari tangan atau terselip pada kuku. Sehingga saat memakan makanan, telur cacing yang melekat di bawah kuku yang panjang dan kotor akan ikut tertelan bersama makanan yang dimakan. Oleh karena itu, kuku sebaiknya selalu dipotong pendek dan dijaga kebersihannya dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting tajam, jika ada jaringan yang kering di sekitar kuku maka dioleskan *lotion* atau minyak mineral, kuku direndam jika tebal dan kasar untuk menghindari penularan infeksi cacing dari tangan ke mulut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Kecacingan**

### **1. Pengertian Infeksi Kecacingan**

Menurut Entjang (2003) infeksi adalah masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit. Hadirnya agent penyakit di atas permukaan tubuh, pakaian, benda-benda kotor lainnya bukanlah merupakan suatu infeksi tetapi menggambarkan telah terjadi kontaminasi terhadap permukaan tubuh atau barang tersebut.

Hospes atau *host* adalah manusia atau hewan hidup, termasuk arthropoda, yang memberi penghidupan atau tempat tinggal sementara kepada agent infeksi dalam kondisi alami. Hospes yang digunakan sebagai tempat hidup oleh parasit untuk mencapai kedewasaannya atau untuk melalui tahap seksualnya disebut hospes definitif atau hospes primer, sedangkan hospes yang digunakan sebagai tempat

hidup stadium larva atau stadium aseksual disebut hospes perantara atau hospes intermedia. Manusia merupakan hospes defenitif beberapa nematoda usus (cacing perut), yang dapat mengakibatkan masalah bagi kesehatan masyarakat.

Kecacingan merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dari kelompok *helminth* (cacing), membesar dan hidup dalam usus halus manusia. Cacing adalah makhluk yang termasuk bersel banyak, yang umumnya badannya panjang ada yang jelas bagian kepalanya dan ekornya dan ada juga yang tidak jelas letak kepalanya, seolah-olah kepala dan ekor sama saja. Akan tetapi bila diteliti lebih jauh maka terlihat bahwa ekor dan kepala itu ada perbedaannya bahwa pada ujung kepala terdapat mulut dan alat-alat pengisap yang merupakan gigi dan sebagainya (Adam, S. 1992).

Cacingan merupakan masalah kesehatan yang perlu penanganan serius terutama di daerah tropis karena cukup banyak penduduk menderita kecacingan. Penyakit ini dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit dan terhambatnya tumbuh kembang anak, karena cacing mengambil sari makanan yang penting bagi tubuh, misalnya protein, karbohidrat dan zat besi yang dapat menyebabkan anemia (Ilmiah populer dalam [http:// www. pdpersi. co.id/ ?show= detailnews&kode=23&tbl=ilmiah](http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=23&tbl=ilmiah))..

## 2. Cacing Usus yang Ditularkan Melalui Tanah

Setiap parasit pada umumnya mempunyai sifat yang tidak baik yakni hidupnya menumpang (bergantung) pada makhluk hidup dengan maksud untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari host yang ditumpanginya.

Peranan cacing yang telah dewasa pada tubuh manusia dengan jalan:

- a. Menghisap darah tuan rumah (*host*)
- b. Menghisap darah dan mengeluarkan bisa (racun)
- c. Di dalam tubuh (usus), menghisap zat-zat makanan tuan rumah hingga kekurangan zat makanan
- d. Dapat menimbulkan sumbatan pada saluran pencernaan, disebabkan karena cacing di dalam usus dapat berkembang biak dalam jumlah banyak.
- e. Ada cacing yang berbentuk larva bersarang di dalam pembuluh limfe dan pembuluh darah sehingga peredaran darah dan limfe terganggu akibat anggota badan atau organ itu jadi bengkak-bengkak (Djamilah, M. 2003).

Cacing (nematoda usus) yang ditularkan melalui tanah dalam siklus hidupnya membutuhkan faktor lingkungan di luar tubuh hospesnya sehingga pengaruh terbesar penularan cacing adalah sanitasi lingkungan dan hygiene perorangan yang buruk.

Diantara cacing perut, terdapat sejumlah spesies yang ditularkan melalui tanah (*soil transmitted helminths*) yang terpenting adalah cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) dan cacing cambuk (*Trichuris trichiura*). Jenis-jenis cacing tersebut banyak ditemukan di daerah tropis seperti di Indonesia. Pada umumnya telur cacing bertahan pada tanah yang lembab, tumbuh menjadi telur yang infeksiif dan siap untuk masuk ke tubuh manusia yang merupakan hospes definitifnya (Gandahusada, S. 2006:8).

### **a. Cacing Gelang (*Ascaris lumbricoides*)**

Manusia merupakan satu-satunya hospes cacing ini. Penyakit yang disebabkan disebut askariasis. Berbentuk silinder dan warna cacing ini adalah putih kekuning-kuningan, sedikit merah atau coklat.

#### **1) Morfologi dan Daur Hidup**

Cacing jantan berukuran 10-30 cm, sedangkan betina 22-35 cm, pada stadium dewasa cacing ini hidup di rongga usus halus. Cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000-200.000 butir sehari, terdiri dari telur yang dibuahi dan telur yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi besarnya  $\pm 60 \times 45$  mikron dan yang tidak dibuahi berukuran 90x40 mikron. Dalam lingkungan yang sesuai, telur yang dibuahi tumbuh dan berkembang menjadi bentuk infeksius dalam waktu kurang lebih 3 minggu.

Bentuk infeksius ini bila tertelan manusia, akan menetas di usus halus. Larvanya menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe lalu dialirkan ke jantung, kemudian mengikuti aliran darah ke paru-paru. Larva di paru-paru menembus dinding pembuluh darah, lalu dinding alveolus, masuk rongga alveolus, kemudian naik ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Dari trakea, larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan pada faring. Penderita batuk karena rangsangan ini, dan larva kemudian tertelan masuk ke dalam esofagus lalu menuju ke usus halus. Di usus halus larva tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa. Sejak telur matang tertelan sampai cacing dewasa bertelur diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan (Gandahusada, S. 2006 : 8).

## 2) Patologi dan Gejala Klinis

Gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Gangguan karena larva biasanya terjadi pada saat berada di paru-paru. Pada orang yang rentan, terjadi perdarahan kecil pada dinding *alveolus* dan timbul gangguan pada paru yang disertai dengan batuk, demam dan eosinofilia. *Eosinofilia* artinya, bertambah banyaknya butir darah eosinofil. Keadaan ini disebut *Sindrom Loeffler*.

Pada anak-anak yang menderita askariasis perutnya nampak buncit (karena jumlah cacing dan perut kembung), biasanya matanya pucat dan kotor seperti sakit mata (rembes), dan seperti batuk pilek. Gangguan yang disebabkan oleh cacing dewasa biasanya ringan. Orang (anak) yang menderita cacingan biasanya lesu, tidak bergairah, dan konsentrasi belajar kurang. Kadang-kadang penderita mengalami gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, anemia, diare dan konstipasi. Pada infeksi berat, terutama pada anak-anak dapat terjadi gangguan penyerapan makanan (*mal absorbtion*). Pada keadaan tertentu cacing dewasa mengembara ke saluran empedu, apendiks, atau ke bronkus kemudian menggumpal dan menimbulkan keadaan gawat darurat sehingga kadang-kadang perlu tindakan operatif (Gandahusada, S. 2006 : 10).

## 3) Epidemiologi

Pada umumnya frekuensi tertinggi penyakit ini diderita oleh anak-anak yakni antara 60-90% sedangkan orang dewasa frekuensinya rendah. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran anak-anak akan kebersihan dan kesehatan

masih rendah ataupun mereka tidak berpikir sampai ke tahap itu. Sehingga anak-anak lebih mudah diinfeksi oleh larva cacing *Ascaris* misalnya melalui makanan, ataupun infeksi melalui kulit akibat kontak langsung dengan tanah yang mengandung telur *Ascaris lumbricoides*.

Perkembangan telur dan larva cacing sangat cocok pada iklim tropis dengan suhu optimal adalah 25-30° C. Jenis tanah liat merupakan tanah yang sangat cocok untuk perkembangan telur cacing, sementara dengan bantuan angin maka telur cacing yang infeksiif bersama dengan debu dapat menyebar ke lingkungan.

Telur cacing dapat dirusak dengan sinar matahari langsung selama 12 jam dan sangat cepat mati pada temperatur di atas 40°C, sebaliknya dingin tidak mempengaruhi. Oleh karena itu, telur *Ascaris* dapat bertahan selama musim dingin. Telur cacing juga resisten terhadap desinfektan kimiawi.

Penularan Ascariasis dapat terjadi melalui beberapa jalan yaitu;

Pertama, telur yang infeksiif masuk ke dalam mulut bersama makanan atau minuman yang tercemar atau tertelannya telur yang infeksiif melalui tangan yang kotor melalui mulut, lalu masuk ke usus besar, beberapa hari kemudian menetas jadi larva lalu menjadi dewasa dan berkembang biak.

Kedua, telur menetas di tanah lalu menjadi larva infeksiif kemudian masuk melalui kulit kaki atau tangan menerobos masuk ke pembuluh darah terus ke jantung berpindah ke paru-paru, lalu terjat di tenggorakan masuk ke kerongkongan lalu usus halus kemudian menjadi dewasa dan berkembang biak. Dan bisa juga dengan terhirupnya telur infeksiif bersama debu udara dimana

telur infektif tersebut akan menetas pada saluran pernapasan bagian atas, untuk kemudian menembus pembuluh darah dan memasuki aliran darah (Rasmaliah, dalam <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-rasmaliah.pdf>).

Kurangnya pemakaian jamban keluarga menimbulkan kebiasaan membuang hajat (defekasi) di tanah sehingga menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah, di bawah pohon, di tempat mencuci dan di tempat pembuangan sampah yang kemudian tanah akan terkontaminasi dengan telur cacing yang infektif dan larva cacing. Hal ini akan memudahkan terjadinya reinfeksi secara terus menerus pada daerah endemik. Di negara-negara tertentu terdapat kebiasaan memakai tinja sebagai pupuk. Oleh karena itu, anjuran mencuci tangan sebelum makan, menggunting kuku secara teratur, pemakaian jamban keluarga serta pemeliharaan kesehatan pribadi dan lingkungan dapat mencegah askariasis (Gandahusada, S. 2006 : 11).

#### **b. Cacing Tambang (*hookworm*)**

Ada beberapa spesies cacing tambang yang penting, diantaranya *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma ceylanicum*, *Ancylostoma caninum*. Namun yang terdapat di tubuh manusia yakni *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*. Cacing ini menyebabkan nekatoriasis dan ankilostomiasis. Berwarna merah darah. Kedua parasit ini diberi nama “cacing tambang” karena pada zaman dahulu cacing ini ditemukan di Eropa pada pekerja pertambangan, yang belum mempunyai fasilitas yang memadai.

## 1) Morfologi dan Daur Hidup

Hospes parasit ini adalah manusia, cacing ini menyebabkan nekatoriasis dan ankilostomiasis. Cacing betina *N. americanus* tiap hari mengeluarkan telur kira-kira 9000 butir, sedangkan *A. duodenale* kira-kira 10.000 butir. Cacing betina berukuran panjang kurang lebih 1 cm, cacing jantan kurang lebih 0,8 cm. Bentuk badan *N. americanus* biasanya menyerupai huruf S, sedangkan *A. duodenale* menyerupai huruf C. Cacing dewasa hidup di rongga usus halus, dengan mulut yang besar melekat pada mukosa dinding usus. Pada rongga mulut *N. americanus* mempunyai benda kitin, sedangkan *A. duodenale* ada dua pasang gigi. Cacing jantan mempunyai bursa kopulatriks.

Telur dikeluarkan dengan tinja dan setelah menetas dalam waktu 1-1,5 hari keluarlah larva rabditiform. Dalam waktu kira-kira 3 hari larva rabditiform tumbuh menjadi larva filariform, yang dapat menembus kulit dan dapat hidup selama 7-8 minggu di tanah. Telur cacing tambang yang besarnya kira-kira 60x40 mikron, berbentuk bujur dan mempunyai dinding tipis. Di dalamnya terdapat 4-8 sel. Larva rabditiform panjangnya kira-kira 250 mikron, sedangkan larva filariform panjangnya kira-kira 600 mikron.

Daur hidup adalah sebagai berikut:

Telur → larva rabditiform → larva filariform → menembus kulit → kapiler darah → jantung kanan → paru → bronkus → trakea → laring → usus halus

## 2) Patologi dan Gejala Klinis

Cacing tambang hidup dalam rongga usus halus tapi melekat dengan giginya pada dinding usus dan menghisap darah. Infeksi cacing tambang



menyebabkan kehilangan darah secara perlahan-lahan sehingga penderita mengalami kekurangan darah (*anemia*) akibatnya dapat menurunkan gairah kerja serta menurunkan produktifitas. Tetapi kekurangan darah (*anemia*) ini biasanya tidak dianggap sebagai cacingan karena kekurangan darah bisa terjadi oleh banyak sebab (Surat Keputusan Menteri Kesehatan No: 424/MENKES/SK/VI/, 2006:11).

Gejala klinik karena infeksi cacing tambang antara lain:

a) Stadium larva:

Bila banyak larva filariform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut *ground itch*. Perubahan pada paru biasanya ringan.

b) Stadium dewasa:

Gejala tergantung pada (a) spesies dan jumlah cacing dan (b) keadaan gizi penderita (Fe dan protein).

Tiap cacing *N. americanus* menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,005-0,1 cc sehari, sedangkan *A. duodenale* 0,008-0,34 cc. Biasanya terjadi anemia hipokrom mikrositer. Di samping itu juga terdapat eosinofilia. Biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi daya tahan berkurang dan prestasi kerja menurun (Gandahusada, S. 2006 : 14).

Pada infeksi yang berat nampak gejala berupa nyeri perut dan diare. Infeksi yang sangat berat menyebabkan perdarahan usus, anemia, penurunan berat badan dan peradangan usus buntu (*apendisitis*). Kadang rektum menonjol melewati anus (*prolapsus rektum*), terutama pada anak-anak atau wanita dalam

masa persalinan (Medicastore, dalam [http://medicastore.com/penyakit/94/Trikuriasis Infeksi cacing cambuk usus.html](http://medicastore.com/penyakit/94/Trikuriasis%20infeksi%20cacing%20cambuk%20usus.html)).

### 3) Epidemiologi

Kejadian penyakit (*incidens*) ini di Indonesia sering ditemukan pada penduduk yang bertempat tinggal di pegunungan, terutama di daerah pedesaan, khususnya di perkebunan atau pertambangan. Sering kali golongan pekerja perkebunan yang langsung berhubungan dengan tanah mendapat infeksi lebih dari 70%.

Cacing ini menghisap darah hanya sedikit namun luka-luka gigitan yang berdarah akan berlangsung lama, setelah gigitan dilepaskan dapat menyebabkan anemia yang lebih berat. Kebiasaan defekasi di tanah dan pemakaian tinja sebagai pupuk kebun sangat penting dalam penyebaran infeksi penyakit ini. Tanah yang baik untuk pertumbuhan *larva* adalah tanah gembur (pasir, humus) dengan suhu optimum untuk *N. americanus* 32°C-38°C, sedangkan untuk *A. duodenale* lebih rendah 23°C-25°C, pada umumnya *A. duodenale* lebih kuat. Untuk menghindari infeksi dapat dicegah dengan memakai sandal atau sepatu (alas kaki) bila keluar rumah (Gandahusada, S. 2006:15).

#### c. Cacing Cambuk (*Trichuris trichiura*)

Manusia merupakan hospes cacing ini. Penyakit yang disebabkan disebut trikuriasis. Cacing ini berwarna merah muda atau kelabu. Kosmopolit terutama di daerah panas dan lembab seperti di Indonesia.

## 1) Morfologi dan Daur Hidup

Cacing betina panjangnya sekitar 5 cm dan yang jantan sekitar 4 cm. Cacing dewasa hidup di kolon asendens dengan bagian anteriornya masuk ke dalam mukosa usus. Satu ekor cacing betina diperkirakan menghasilkan telur sehari sekitar 3.000-5.000 butir. Telur berukuran 50-54 mikron x 32 mikron, berbentuk seperti tempayan dengan semacam penonjolan yang jernih pada kedua kutub. Kulit telur bagian luar berwarna kekuning-kuningan dan bagian di dalamnya jernih. Telur yang dibuahi dikeluarkan dari hospes bersama tinja, telur menjadi matang (berisi larva dan infeksi) dalam waktu 3-6 minggu di dalam tanah yang lembab dan teduh. Telur matang ialah telur yang berisi larva dan merupakan bentuk infeksi. Cara infeksi langsung terjadi bila telur yang matang tertelan oleh manusia (hospes), kemudian larva akan keluar dari dinding telur dan masuk ke dalam usus halus sesudah menjadi dewasa cacing turun ke usus bagian *distal* dan masuk ke kolon asendens dan sekum. Cacing jantan dan betina dewasa berkembang di usus besar. Masa pertumbuhan mulai dari telur yang tertelan sampai menjadi cacing dewasa betina dan siap bertelur sekitar 30-90 hari. Cacing dewasa dapat hidup selama setahun dalam saluran usus (Gandahusada, S. 2006:17).

## 2) Patologi dan Gejala Klinis

Cacing cambuk pada manusia terutama hidup di sekum dapat juga ditemukan di dalam kolon asendens. Infeksi cacing cambuk yang ringan biasanya tidak memberikan gejala klinis yang jelas atau sama sekali tanpa gejala. Sedangkan infeksi yang berat dan menahun terutama pada anak

menimbulkan gejala-gejala seperti diare, disentri, anemia, berat badan menurun dan kadang-kadang terjadi prolapsus rektum akibat mengejanya penderita sewaktu defekasi. Infeksi cacing cambuk yang berat juga sering disertai dengan infeksi cacing lainnya atau protozoa (Gandahusada, S. 2006:19).

### 3) Epidemiologi

Yang penting untuk penyebaran penyakit adalah kontaminasi tanah dengan tinja. Telur tumbuh di tanah liat, tempat lembab, dan teduh dengan suhu optimum kira-kira 30°C. Di berbagai negara, pemakaian tinja sebagai pupuk kebun merupakan sumber infeksi.

Parasit ini paling sering ditemukan di daerah tropis dan juga di daerah subtropis seperti bagian selatan Amerika Serikat. Sedangkan di beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya masih sangat tinggi yakni berkisar antara 30-90 %. Distribusi cacing ini hampir paralel dengan *Ascaris*. Telur yang terdapat dalam tanah menjadi infeksi dalam waktu kira-kira 1 bulan dan tetap infeksi sampai beberapa bulan. Telur ini akan mati dengan temperatur yang lebih dari 40°C selama pemanasan 1 jam. Temperatur beku di bawah -8°C juga akan merusak telur cacing.

Di daerah yang sangat endemik infeksi dapat dicegah dengan pengobatan penderita trikuriasis, pembuatan jamban yang baik dan pendidikan tentang sanitasi dan kebersihan perorangan, terutama anak. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci dengan baik sayuran yang dimakan mentah adalah

penting apalagi di negara-negara yang memakai tinja sebagai pupuk (Gandahusada, S. 2006:20).

### 3. Pencegahan infeksi kecacingan

Cara yang terbaik untuk mengatasi infeksi kecacingan adalah dengan melakukan pencegahan, cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah:

#### a. Pencegahan tingkat pertama (*Primary Prevention*) yang meliputi:

##### 1) Promosi Kesehatan (*health promotion*)

- a) Membuang kotoran (tinja) di jamban
- b) Membuang sampah pada tempatnya
- c) Menjaga kebersihan rumah
- d) Cuci tangan dengan bersih sebelum makan/menjamah makanan sebelum memasak, sebelum menyuapi anak dan atau setelah buang air besar.
- e) Memotong kuku secara teratur seminggu sekali
- f) Biasakan makan lalap mentah yang sudah dicuci bersih helai demi helai dengan air yang mengalir serta memasak bahan makanan sampai matang
- g) Mencuci sprei, menjemur secara berkala kasur, bantal dan guling.
- h) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sanitasi lingkungan yang baik dan cara menghindari penyakit kecacingan.

##### 2) Pencegahan Khusus (*specific protection*) yang meliputi:

- a) Memberantas binatang yang dapat menyebarkan telur cacing misalnya lalat, kecoa, tikus dan lain-lain.
- b) Membiasakan diri memakai alas kaki bila berjalan ke mana-mana.
- c) Tidak membiasakan diri menggigit/ menghisap jari tangan

- d) Tidak membiasakan bagi anak-anak bermain-main di tanah
  - e) Tidak jajan penganan yang tak tertutup saji atau yang terpegang-pegang oleh banyak tangan
- b. Pencegahan Tingkat Kedua (*secondary prevention*) meliputi:
- 1) Diagnosa dini, misalnya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap faeces anak.
  - 2) Pengobatan segera
- c. Pencegahan Tingkat Ketiga (*Tertiary Prevention*) meliputi:
- 1) Pembatasan kecacatan (*disability limitation*)
  - 2) Rehabilitasi (*Rehabilitation*) misalnya perawatan rumah bagi orang/ anak yang terinfeksi kecacingan

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pemulung**

Pemulung adalah orang yang bekerja mengumpulkan barang-barang bekas dengan cara mengerumuni muatan truk sampah yang tengah di bongkar, dan sebagian lainnya berputar-putar mengais barang bekas dari tumpukan-tumpukan sampah.

Ada juga yang mengatakan pemulung adalah kelompok sosial yang kerjanya mengumpulkan atau memilah barang yang dianggap berguna dari sampah, baik yang ada di TPA maupun di luar TPA (Alicia, dalam [Http://Aliciakomputer.Blogspot.Com/2008/01/Etos-Kerja.Html](http://Aliciakomputer.Blogspot.Com/2008/01/Etos-Kerja.Html)).

Adapun jenis barang bekas yang diambil pemulung antara lain besi bekas, botol, plastik, karung plastik, kardus, kertas, botol kaca, kaleng, aluminium, karet, dan kayu.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Sekolah Dasar**

Sekolah dasar (disingkat SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di [Indonesia](#). Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak usia sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah dasar](http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar)).

Persyaratan untuk masuk di Sekolah Dasar (SD) menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), yaitu anak-anak yang sudah menginjak usia minimal 7 tahun, dan sampai berumur 12 tahun bisa mengikuti proses belajar di SD. ([http:// www. krjogja. com/ news/ detail/ 39127/ Mendiknas. Tegaskan.Masuk.SD.Berdasar.Umur.html](http://www.krjogja.com/news/detail/39127/Mendiknas.Tegaskan.Masuk.SD.Berdasar.Umur.html)).

## BAB III

### KERANGKA KONSEP

#### A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Infeksi kecacingan adalah terdapatnya telur cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*Soil Transmitted Helminths*) yakni cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*) dan cacing tambang (*Anchylostoma duodenale/ Necator americanus*) dalam tinja pemulung sampah usia anak sekolah dasar.

Tingginya prevalensi kecacingan di Indonesia karena daerah ini beriklim tropis dan berkelembaban tinggi, keadaan hygiene dan sanitasi lingkungan kurang terutama di daerah kumuh dan pedesaan, keadaan sosial ekonomi rendah, penyuluhan kesehatan yang kurang dan kepadatan penduduk yang berlebihan.

Meskipun penyakit cacing yang ditularkan melalui tanah pada umumnya tidak mengakibatkan mortalitas secara langsung pada penderitanya, namun morbiditas yang kompleks dan menahun dari dampak ekonominya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Infeksi cacing usus dapat terjadi dengan menelan telur cacing, karena mulut dengan berbagai alat, minuman atau makanan yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan tubuh pada saat pemulung melakukan aktifitasnya mengumpulkan sampah atau barang bekas di tempat pembuangan akhir. Pemulung dapat terinfeksi cacing ketika mengumpulkan sampah di tempat



pembuangan akhir tanpa menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, tidak memakai alas kaki, dan tidak mencuci tangan sebelum makan.

Dengan demikian, kejadian dan penularan infeksi kecacingan yang berhubungan dengan hygiene perorangan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota Makassar akan menjadi variabel yang akan diteliti. Hygiene perorangan sebagai variabel masing-masing diuraikan secara sistematis sebagai berikut;

#### 1. Pemakaian alas kaki

Memakai alas kaki (sepatu atau sandal) selama bekerja menghindari terjadinya transmisi dan infeksi cacing secara *perkutaneus*. Pada pemulung memakai alas kaki lebih menjamin terhindar dari infeksi kecacingan daripada tidak memakai alas kaki sama sekali.

#### 2. Mencuci tangan sebelum makan

Tindakan ini untuk mencegah terkontaminasinya makanan dan minuman oleh telur *A. lumbricoides* dan *T. trichiura* atau larva cacing tambang, terutama *A. duodenale* yang menempel pada tangan. Jadi tindakan ini memutuskan mata rantai penularan cacing.

#### 3. Kebersihan kuku

Kuku tangan yang panjang dan kotor akan memungkinkan tertimbunnya kotoran di bawah kuku, termasuk telur cacing yang dapat menginfeksi seseorang. Itulah sebabnya ummat Islam disunnahkan untuk memotong kuku minimal satu kali dalam seminggu supaya kebersihan kuku

tetap terjaga sehingga seseorang bebas dari berbagai penyakit termasuk infeksi kecacingan.

#### 4. Pemakaian sarung tangan


Pemulung yang menggunakan sarung tangan akan lebih terjamin untuk tidak terinfeksi kecacingan daripada tidak memakai sama sekali.

### B. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti



Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat (*dependent variable*) yakni Infeksi kecacingan
2. Variabel bebas (*independent variable*), yakni; hygiene perorangan yang terdiri dari sarung tangan, pemakaian alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, kebersihan kuku dan kebiasaan makan.

Berdasarkan konsep pemikiran seperti yang disebut di atas, maka disusunlah pola pikir variabel yang diteliti sebagai berikut:



Keterangan:

-  variabel terikat (*dependent variable*)
-  variabel bebas (*independent variable*)

### **C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif**

#### 1. Memakai alas kaki

Yaitu kebiasaan responden memakai alas kaki saat memulung dalam satu bulan terakhir.

#### **Kriteria Obyektif**

Kebiasaan memakai alas kaki dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Memakai, jika dalam wawancara responden menjawab selalu memakai alas kaki saat memulung dalam satu bulan terakhir dan pada saat observasi responden terlihat memakai alas kaki.
- b. Tidak memakai, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

#### 2. Mencuci tangan sebelum makan

yaitu kebiasaan responden membersihkan tangan dari kotoran baik yang nampak maupun yang tidak nampak dengan air yang mengalir dan memakai sabun yang dilakukan sebelum makan dalam satu bulan terakhir.

#### **Kriteria Obyektif**

Perilaku mencuci tangan sebelum makan dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Mencuci tangan, jika dalam wawancara responden menjawab selalu mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir dan pada saat obseravasi tangan tampak bersih.
- b. Tidak mencuci tangan, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

### 3. Kebersihan kuku

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh responden dalam satu bulan terakhir untuk membersihkan kuku tangan dan kuku kaki bila telah memanjang dan tampak kotor.

#### **Kriteria Obyektif**

Kebiasaan membersihkan kuku dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Bersih, jika dalam wawancara responden menjawab memotong kuku sekali seminggu dalam satu bulan terakhir serta pada saat observasi kuku tampak pendek dan tidak ada kotoran di bawah kuku.
- b. Kotor, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

### 4. Memakai sarung tangan

Yaitu kebiasaan responden memakai sarung tangan dalam satu bulan terakhir saat memulung.

#### **Kriteria Obyektif**

Kebiasaan memakai sarung tangan dalam penelitian ini dinyatakan:

- a. Memakai sarung tangan, jika dalam wawancara responden menjawab selalu memakai sarung tangan dalam satu bulan terakhir saat memulung dan pada saat observasi pemulung menggunakan sarung tangan.
- b. Tidak memakai sarung tangan, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

### 5. Infeksi kecacingan

Infeksi kecacingan adalah terdapatnya telur cacing usus yang ditularkan melalui tanah (*Soil Transmitted Helminths*) seperti cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*) dan atau cacing cambuk (*Trichuris trichiura*) dan atau cacing tambang

(*Anchylostoma duodenale/ Necator americanus*) dalam tinja pemulung sampah usia anak sekolah dasar.

### **Kriteria Obyektif**

Terinfeksi cacing : jika dalam pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja responden ditemukan adanya cacing atau telur cacing dari spesies *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Anchylostoma duodenale*, dan atau *Necator americanus*

Tidak terinfeksi cacing : jika dalam pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja responden tidak ditemukan adanya cacing atau telur cacing dari spesies *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Anchylostoma duodenale*, dan atau *Necator americanus*

### **7. Pemulung sampah anak usia sekolah dasar**

Anak usia sekolah dasar adalah kelompok anak yang umumnya berusia 7-12 tahun baik yang duduk di bangku sekolah dasar maupun yang tidak bersekolah yang bekerja mengumpulkan, mengangkut, dan memilah-milah sampah atau barang bekas di tempat pembuangan akhir Antang, Makassar.

## **D. Hipotesis Penelitian**

### **1. Pemakaian alas kaki**

Ho: Tidak ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

Ha: Ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

## 2. Kebiasaan mencuci tangan

Ho: Tidak ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

Ha: Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

## 3. Kebersihan kuku

Ho: Tidak ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

Ha: Ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

## 4. Pemakaian sarung tangan

Ho: Tidak ada hubungan antara pemakaian sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.

Ha: Ada hubungan antara pemakaian sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung anak usia sekolah dasar di TPA Antang, Makassar.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan *cross sectional* yakni suatu penelitian (*survey*) analitik dimana variabel-variabel yang termasuk faktor resiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama (Notoatmodjo, S. 2005).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota Makassar. Tempat pembuangan akhir memiliki luas 14,3 Ha dengan ketinggian sampah bervariasi antara 4 sampai 20 meter.

Secara geografis, tempat pembuangan akhir terletak pada;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Borong Jambu  
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bontoa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamangapa  
Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Borong Jambu

Di sekitar lokasi TPA terdapat beberapa perkampungan penduduk dan lahan sawah tadah hujan yang hanya bisa panen satu tahun sekali. Perkampungan tersebut adalah Kampung Bontoa (RT 04/ RW 05), Kajengjeng (RT 03/ RW 06) dan Kassi (RT 04/ RW 03). Sebagian besar pemulung tinggal di perkampungan ini. Jarak perkampungan yang paling dekat adalah kira-kira



0,2 km dan yang terjauh kira-kira 1 km. Juga terdapat beberapa pemulung yang tinggal di dalam lokasi TPA yakni di blok D dengan mendirikan gubuk-gubuk. Selain berasal dari perkampungan-perkampungan tersebut, pemulung juga banyak yang berasal dari kelurahan Antang, Manggala dan Bangkala.

Sebanyak 167 kepala keluarga yang berprofesi sebagai pemulung di TPA Tamangapa. Sebagian besar berasal dari suku Makassar (95 %), sisanya berasal dari suku Bugis (4 %) dan Jawa (1 %). Selain orang dewasa terdapat juga anak-anak yang setiap hari beraktivitas sebagai pemulung. Pemulung yang dewasa mulai bekerja (memulung) sejak pagi sampai malam hari. Sedangkan pada pemulung yang masih tergolong anak-anak mempunyai jadwal bekerja mulai pagi sampai sore hari.

Luas dan kapasitas lahan TPA antara lain;

- a. Blok A yakni lahan bahan baku ORGI yang luasnya adalah  $1779 \text{ m}^2$
- b. Blok B merupakan lahan gas gikoko (aktif) yang luasnya adalah  $2242 \text{ m}^2$
- c. Blok C terbagi menjadi 3 blok yakni blok C1 adalah landfill, blok C2 adalah lahan aktif, dan blok C3 adalah lahan persiapan yang luas seluruhnya adalah  $1614 \text{ m}^2$
- d. Blok D merupakan lahan gas gikoko dengan luas  $2665 \text{ m}^2$
- e. Blok E merupakan lahan gas gikoko yang aktif dengan luas  $4030 \text{ m}^2$
- f. Blok F merupakan lahan aktif dengan luas  $950 \text{ m}^2$
- g. Fasilitas pendukung (kantor, jalan dan bengkel) :  $1000 \text{ m}^2$

## 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian selama 11 hari yakni dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 18 Agustus 2010.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemulung anak usia sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang sebanyak 142 anak.

### 2. Sampel

Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti, yang berusaha untuk memperoleh sampel yang menurut pendapatnya nampak mewakili populasi (Stang, 2005:48).

Maka besarnya sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 anak. Sampel diambil secara kriteria *inklusi* dan *eksklusi* yaitu sebagai berikut:

#### a. Kriteria Inklusi

- 1) Bertempat tinggal di sekitar lokasi TPA Tamangapa
- 2) Berada di sekitar lokasi TPA saat wawancara dan observasi
- 3) Bersedia menjadi responden

#### b. Kriteria Eksklusi

- 1) Bertempat tinggal di wilayah yang jauh dari lokasi TPA Tamangapa
- 2) Tidak berada di sekitar lokasi TPA saat wawancara dan observasi
- 3) Tidak bersedia menjadi responden

## D. Cara Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden, melakukan observasi serta pengambilan *specimen* dan pemeriksaan sediaan tinja melalui pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui seseorang terinfeksi kecacingan.

#### Pemeriksaan Telur Cacing

Untuk memastikan apakah seseorang menderita cacingan atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan tinja di laboratorium. Pemeriksaan tinja ini gunanya untuk melihat banyaknya konsentrasi telur cacing yang ada dalam tinja. Pemeriksaan laboratorium yang digunakan yakni dengan teknik flokulasi. Metode ini digunakan untuk pemeriksaan secara cepat. Untuk pemeriksaan ini digunakan larutan NaCl jenuh dimaksudkan untuk mengangkat telur-telur cacing sampai ke permukaan sehingga mudah diidentifikasi.

#### a. Bahan dan Alat yang Digunakan:

- 1) Feses
- 2) Larutan NaCl jenuh
- 3) Pipet tetes
- 4) Objek Gelas
- 5) Deck Gelas
- 6) Pengaduk
- 7) Gelas kimia
- 8) Tabung reaksi
- 9) Mikroskop

b. Cara Kerja

- 1) Pada gelas kimia diberikan larutan NaCl jenuh
- 2) Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi hingga  $\frac{1}{2}$  bagian
- 3) Dengan pengaduk, diambil feses
- 4) Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCl jenuh, aduk hingga feses dan larutan NaCl menjadi homogen
- 5) Tambahkan larutan NaCl jenuh hingga tabung reaksi penuh
- 6) Tutup dengan deck gelas.
- 7) Setelah setengah jam kemudian ambil deck gelas letakkan di atas objek gelas
- 8) Lalu siap untuk diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran sepuluh kali.

2. Data Sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari instansi terkait dengan obyek penelitian.

**E. Instrumen Penelitian**

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan alat-alat untuk wawancara yakni kuesioner (daftar pertanyaan) dan formulir observasi.

**F. Pengolahan dan Analisis Data**

Pada proses pengolahan data digunakan sistem komputer dengan bantuan program SPSS versi 16.0 untuk memperoleh nilai statistik. Analisa data dilakukan dengan menguji hipotesis nol ( $H_0$ ) dengan menggunakan uji statistik “*Chi Square*”.

Untuk menguji hipotesis nol ( $H_0$ ) jika semua nilai E lima atau lebih maka digunakan *yates corrected* dengan rumus ( Stang, 2005: 32);

$$x^2 = \frac{n \left[ |ad-bc| - \frac{n}{2} \right]^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} \quad db = 1$$

Keterangan:

$x^2$  = Chi Square

n = Jumlah sampel

Untuk menguji hipotesis nol ( $H_0$ ) jika terdapat nilai E kurang dari lima maka digunakan *fisher exact* dengan rumus ( Stang, 2005: 34);

$$p = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n! a! b! c! d!}$$

Kriteria, keputusan pengujian hipotesis:

$H_0$  ditolak jika  $p < \alpha$ , berarti ada hubungan

Untuk mengetahui kuatnya hubungan pada hasil uji *Chi Square* ( $X^2$ ) untuk tabel kontigensi 2x2 digunakan koefisien  $\phi$  (phi) dengan rumus (Stang, 2005:36):

$$R \phi = \frac{|ad - bc|}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$

Dengan ketentuan:

0,01 – 0,25 : hubungan lemah

0,26 – 0,50 : hubungan sedang

0,51 – 0,75 : hubungan kuat

0,76 – 1,00 : hubungan sangat kuat (sempurna)

## G. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah Antang kota Makassar yang dimulai sejak tanggal 9-18 Agustus 2010. Responden adalah pemulung usia anak sekolah dasar yang beroperasi di TPA Antang. Jumlah pemulung yang dijadikan sampel yakni sebanyak 30 anak. Berikut ini hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan dalam bentuk narasi.

##### 1. Karakteristik Responden

###### a. Jenis kelamin

**Tabel 5.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	17	56.7
Perempuan	13	43.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 17 anak (56.7 %) dan selebihnya adalah perempuan sebanyak 13 anak (43.3 %).

b. Umur

**Tabel 5.2 Distribusi Responden Menurut Umur Di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Umur (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
7	5	16.7
8	8	26.7
9	7	23.3
10	7	23.3
11	2	6.7
12	1	3.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden yang terbanyak adalah yang berumur 8 tahun sebanyak 8 anak (26.7 %) dan yang paling sedikit sebanyak 1 anak (3.3 %) pada umur 12 tahun.

c. Tingkat pendidikan

**Tabel 5.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Sekolah	2	6.7
Sekolah Dasar	28	93.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini umumnya duduk di bangku sekolah dasar sebanyak 28 anak (93.3 %) dan yang tidak sekolah sebanyak 2 anak (6.7 %).

## 2. Variabel Penelitian

### a. Hygiene Perorangan

#### 1) Memakai alas kaki

**Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Memakai Alas Kaki Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Kebiasaan Memakai Alas Kaki</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	16	53.3
Tidak	14	46.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini umumnya memakai alas kaki saat memulung dalam satu bulan terakhir yaitu 16 anak (53.3 %) dan yang tidak memakai alas kaki saat memulung sebanyak 14 anak (46.7 %).

#### 2) Kebiasaan mencuci tangan

**Tabel 5.5 Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Mencuci Tangan Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Kebiasaan Cuci Tangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	14	46.7
Tidak	16	53.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini sebagian besar responden tidak mencuci tangan sebelum makan dengan air



yang mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir yaitu 16 anak (53.3 %) dan yang mencuci tangan sebelum makan sebanyak 14 anak (46.7 %).

### 3) Kebersihan kuku

**Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Kebersihan Kuku Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Kebersihan kuku	Frekuensi	Persentase (%)
Bersih	7	23.3
Kotor	23	76.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini umumnya memiliki kuku yang kotor dalam satu bulan terakhir sebanyak 23 anak (76.7 %) dan yang memiliki kuku bersih sebanyak 7 anak (23.3 %).

### 4) Pemakaian sarung tangan

**Tabel 5.7 Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Memakai Sarung Tangan Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Pemakaian Sarung Tangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	9	30
Tidak	21	70
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini yang tidak memakai sarung tangan saat memulung dalam satu

bulan terakhir sebanyak 21 anak (70 %) sedangkan yang memakai sarung tangan hanya 9 anak (30 %).

**Tabel 5.8 Distribusi Responden Menurut Jenis Sarung Tangan Yang Dipakai Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Jenis Sarung Tangan	Frekuensi	Persentase (%)
Kulit	0	0
Kaos	0	0
Kain Biasa	9	100
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa dari 9 responden dalam penelitian ini yang memakai sarung tangan saat memulung dalam satu bulan terakhir seluruhnya (100 %) menggunakan jenis sarung tangan yang terbuat dari kain biasa.

**Tabel 5.9 Distribusi Responden Menurut Pencucian Sarung Tangan Dalam Satu Bulan Terakhir di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Sarung Tangan Dicuci	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	5	55.6
Tidak	4	44.4
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa dari 9 responden yang memakai sarung tangan, sebanyak 5 anak (55.6 %) yang selalu mencuci sarung tangannya setelah dipakai dan sebanyak 4 anak (44.4 %) yang tidak mencuci sarung tangannya setelah dipakai.

b. Infeksi Kecacingan

1) Kejadian kecacingan

**Tabel 5.10 Distribusi Responden Menurut Kejadian Kecacingan di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Infeksi Kecacingan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Terinfeksi	19	63.3
Tidak Terinfeksi	11	36.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini didapatkan frekuensi anak yang terinfeksi kecacingan sebanyak 19 anak (63.3 %) dan yang tidak terinfeksi kecacingan yakni 11 anak (36.7 %).

2) Jenis cacing yang menginfeksi

**Tabel 5.11 Distribusi Responden Menurut Jenis Cacing di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Jenis Cacing</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>Ascaris lumbricoides</i>	3	15.8
<i>Trichuris trichiura</i>	12	63.2
<i>Ancylostoma duodenale</i>	2	10.5
<i>Ascaris lumbricoides</i> + <i>Trichuris trichiura</i>	2	10.5
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa dari 19 anak yang terinfeksi kecacingan dalam penelitian ini sebagian besar terinfeksi *Trichuris trichiura* sebanyak 12 anak (63.2 %), sedangkan yang terinfeksi *Ancylostoma*

*duodenale* serta yang terinfeksi gabungan antara *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris trichiura* masing-masing sebanyak 2 anak (10.5 %).

3) Pemberian obat cacing

**Tabel 5.12 Distribusi Responden Menurut Pemberian Obat Cacing di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Pemberian Obat Cacing</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	8	26.7
Tidak	22	73.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut 5.12 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang pernah minum obat cacing sebanyak 8 anak sedangkan yang tidak pernah minum obat cacing sebanyak 22 anak.

4) Lama pemberian obat cacing

**Tabel 5.13 Distribusi Responden Menurut Terakhir Kali Diberikan Obat Cacing di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

<b>Lama Pemberian Obat Cacing (bulan)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 6	3	37.5
> 6	5	62.5
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 8 anak yang pernah meminum obat cacing, terdapat 3 anak yang minum obat cacing

kurang dari 6 bulan yang lalu dan sebanyak 5 anak yang minum obat cacung lebih dari 6 bulan yang lalu.

5) Distribusi karakteristik responden yang menderita kecacangan

**Tabel 5.14 Distribusi Kejadian Kecacangan Berdasarkan Umur di TPA Antang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2010**

Umur (tahun)	Infeksi Kecacangan			
	Terinfeksi		Tidak Terinfeksi	
	n	%	n	%
7	5	26.3	0	0
8	6	31.6	2	18.2
9	2	10.5	5	45.5
10	4	21.1	3	27.3
11	2	10.5	0	0
12	0	0	1	9.1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa dari 30 responden dalam penelitian ini frekuensi anak menderita kecacangan menurut kelompok umur lebih banyak ditemukan pada anak yang berumur 8 tahun yakni 6 anak (31.6 %) sedangkan pada umur 12 tahun tidak ada anak (0 %) yang menderita kecacangan.

### 3. Analisis Hubungan

Untuk mengetahui variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian infeksi kecacangan pada pemulung sampah di tempat pembuangan akhir Antang, maka perlu dilakukan uji statistik dengan *yates corrected* jika semua nilai E lima atau lebih dan digunakan uji *fisher exact* jika terdapat nilai E yang

kurang dari lima serta kuatnya hubungan antara variabel-variabel dengan kejadian infeksi kecacingan digunakan uji koefisien *phi*. Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

- a. Hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan

Kebiasaan Memakai Alas Kaki	Infeksi Kecacingan			
	Terinfeksi		Tidak Terinfeksi	
	n	%	n	%
Ya	6	31.6	10	90.9
Tidak	13	68.4	1	9.1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang tidak memakai alas kaki saat memulung yaitu 13 anak (68.4 %). Sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang selalu memakai alas kaki saat memulung yakni 10 anak (90.9 %).

Hasil uji statistik dengan *yates corrected* antara variabel kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai *p* sebesar 0.006. Karena nilai *p* lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi*

sebesar 0.57 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

b. Hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan

Kebiasaan Mencuci Tangan	Infeksi Kecacingan			
	Terinfeksi		Tidak Terinfeksi	
	n	%	n	%
Ya	5	26.3	9	81.8
Tidak	14	73.7	2	18.2
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun sebanyak 14 anak (73.7 %). Sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang mempunyai kebiasaan mencuci tangan sebelum makan sebanyak 9 anak (81.8 %).

Hasil uji statistik dengan *yates corrected* antara variabel kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.011. Karena nilai p lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.011 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.54 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan

mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

c. Hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan

Kebersihan Kuku	Infeksi Kecacingan			
	Terinfeksi		Tidak Terinfeksi	
	n	%	n	%
Bersih	0	0	7	63.6
Kotor	19	100	4	36.4
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi kecacingan ditemukan pada responden yang mempunyai kuku kotor yaitu 19 anak (100 %), sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak pada anak yang memiliki kuku bersih yaitu 7 anak (63.6 %).

Hasil uji statistik dengan *fisher exact* antara variabel kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.000. Karena nilai p lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.73 yang berarti bahwa hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.



d. Hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan

Kebiasaan Memakai Sarung Tangan	Infeksi Kecacingan			
	Terinfeksi		Tidak Terinfeksi	
	n	%	n	%
Ya	2	10.5	7	63.6
Tidak	17	89.5	4	36.4
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada responden yang tidak menggunakan sarung tangan saat memulung yaitu 17 anak (89.5 %), sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang memiliki kebiasaan memakai sarung tangan saat memulung yaitu 7 anak (63.6 %).

Hasil uji statistik dengan *fisher exact* antara variabel kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.004. Karena nilai p lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.56 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemakaian Alas Kaki**

Perawatan serta pemeliharaan kaki sangat penting agar tidak menjadi sarang atau tempat masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh, termasuk telur cacing. Pemakaian alas kaki dapat mencegah terjadinya infeksi luka serta infeksi kecacingan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden, umumnya memakai alas kaki saat memulung dalam satu bulan terakhir yaitu 16 anak (53.3 %) dan yang tidak memakai alas kaki saat memulung sebanyak 14 anak (46.7 %). Responden yang terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang tidak memakai alas kaki saat memulung yaitu 13 anak (68.4 %). Sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang selalu memakai alas kaki saat memulung yakni 10 anak (90.9 %).

Sementara itu, sebanyak 6 (31,6 %) anak yang biasa memakai alas kaki namun masih terinfeksi kecacingan. Hal ini terjadi karena meskipun anak tersebut memakai alas kaki saat memulung (bekerja), tetapi saat akan makan mereka tidak biasa mencuci tangan sebelum makan, tidak menggunakan sarung tangan saat memulung serta kebersihan kuku tidak dijaga. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh sebanyak 1 anak (9,1 %) yang tidak memakai alas kaki namun tidak terinfeksi kecacingan. Hal ini bisa saja disebabkan karena anak tersebut mempunyai kebiasaan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun serta kebersihan kuku selalu dijaga.

Hasil uji statistik dengan *yates corrected* antara variabel kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.006. Karena nilai  $p$  lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.57 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djamilah, M. (2003) yang menemukan adanya hubungan bermakna antara pemakaian alas kaki dengan kejadian penyakit kecacingan di Kel. Mangga Dua, Kendari.

Hal ini disebabkan karena lingkungan tempat pemulung bekerja yaitu TPA merupakan tempat berjangkitnya berbagai bibit penyakit, sehingga bila tidak menggunakan alas kaki, maka bibit penyakit dapat menembus kulit. Telur dan larva cacing akan mudah menembus kulit yang tidak terlindungi oleh alas kaki.

## 2. Kebiasaan Mencuci Tangan

Kebiasaan mencuci tangan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian infeksi kecacingan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik dengan *yate's corrected* antara variabel kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.011. Karena nilai  $p$  lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.011 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi,

ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.54 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden didapatkan sebagian besar responden tidak mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir yaitu 16 anak (53.3 %) dan yang mencuci tangan sebelum makan sebanyak 14 anak (46.7 %). Responden yang terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun sebanyak 14 anak (73.7 %). Sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang mempunyai kebiasaan mencuci tangan sebelum makan sebanyak 9 anak (81.8 %). Sementara itu, terdapat 5 anak (26.3 %) yang biasa mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan memakai sabun namun masih juga terinfeksi kecacingan. Hal ini dapat terjadi karena infeksi kecacingan tak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tapi disebabkan oleh multi faktor. Salah satu penyebabnya adalah karena anak tersebut tidak biasa memakai alas kaki saat memulung. Selain itu, berdasarkan penelitian juga diperoleh terdapat 2 anak (18.2 %) yang tidak biasa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun tetapi malah tidak terinfeksi kecacingan. Hal ini

disebabkan karena anak tersebut selalu memakai alas kaki saat memulung dan kebersihan kukunya selalu terjaga.

Masih terinfeksi pemulung oleh kecacingan walaupun sudah mencuci tangan. karena mereka mencuci tangan hanya dengan air saja tanpa memakai sabun, sehingga kuman-kuman masih ada yang masih menempel di tangan. Ada juga responden yang menurut mereka nanti pada saat hendak makan makanan pokok baru mereka mencuci tangan sedangkan pada saat hendak makan selain makanan pokok yakni jajanan, mereka tidak mencuci tangan terlebih dahulu.

Selain itu, ada beberapa pemulung jika menemukan buah-buahan yang menurut mereka masih layak untuk dimakan, maka buah-buahan tersebut hanya dibersihkan di baju dan langsung dimakan tanpa mencuci tangan atau mencuci buah-buahan tersebut terlebih dahulu.

Hal lain yang juga mempengaruhi adalah kebersihan alat-alat perlengkapan minum dan makan seperti piring, sendok dan gelas yang mereka gunakan di warung atau di rumah yang mungkin telah tercemar/ terkontaminasi oleh telur atau larva cacing.

### 3. Kebersihan Kuku

Kebersihan kuku yang diabaikan menjadi penyebab terjadinya infeksi kecacingan sebab dibawah kuku yang panjang dan kotor terdapat banyak bakteri dan bibit penyakit yang menyebabkan penyebaran infeksi termasuk cacing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden, infeksi kecacingan ditemukan pada responden yang mempunyai kuku kotor yaitu 19 anak (100 %), sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak pada anak yang memiliki kuku bersih yaitu 7 anak (63.6 %).

Sementara itu, terdapat 4 anak (36,4 %) yang tidak biasa menjaga kebersihan kukunya tetapi malah tidak terinfeksi kecacingan. Hal ini disebabkan karena anak tersebut selalu memakai alas kaki dan sarung tangan saat memulung.

Hasil uji statistik dengan *fisher exact* antara variabel kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai p sebesar 0.000. Karena nilai p lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.73 yang berarti bahwa hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhadi, Abd. (2004) yang menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan tidak menjaga kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada anak SD Pumakang di Tanralili Maros.

Kuku harus dipotong pendek dan dijaga kebersihannya dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting tajam, jika ada jaringan yang

kering di sekitar kuku maka dioleskan *lotion* atau minyak mineral, serta kuku direndam jika tebal dan kasar.

Telur cacing sering kali terselip pada kuku yang kotor. Kondisi ini sering terjadi pada anak yang sering bermain di tanah serta pada orang dewasa yang bekerja di kebun atau di sawah (Nadesul, Hendrawan. 2000).

Meskipun para pemulung selalu mencuci tangan sebelum makan tetapi tidak terbiasa memotong kuku secara rutin yakni sekali dalam seminggu maka besar kemungkinannya untuk terinfeksi penyakit kecacingan karena telur cacing dapat masuk ke dalam tubuh melalui kotoran yang berada di bawah kuku pada saat makan.

#### 4. Pemakaian Sarung Tangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden yang tidak memakai sarung tangan saat memulung dalam satu bulan terakhir sebanyak 21 anak (70 %) sedangkan yang memakai sarung tangan hanya 9 anak (30 %). Infeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada responden yang tidak menggunakan sarung tangan saat memulung yaitu 17 anak (89.5 %), sedangkan responden yang tidak terinfeksi kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak yang memiliki kebiasaan memakai sarung tangan saat memulung yaitu 7 anak (63.6 %).

Sementara itu, terdapat 2 anak (10.5 %) yang biasa memakai sarung tangan namun masih juga terinfeksi kecacingan. Hal ini terjadi karena kedua anak tersebut tidak pernah mencuci sarung tangan yang telah mereka pakai setelah memulung. Sehingga menyebabkan telur cacing yang menempel pada

sarung tangan dapat masuk ke dalam tubuh anak tersebut akibat sarung tangan yang telah terkontaminasi dengan sampah yang mengandung telur cacing sebelumnya. Kemudian sebanyak 4 anak (36.4 %) yang tidak biasa memakai sarung tangan saat memulung namun tetap tidak terinfeksi kecacingan. Hal ini disebabkan karena anak tersebut biasa memakai alas kaki saat memulung, mencuci tangan sebelum makan dan kebersihan kukunya terjaga.

Hasil uji statistik dengan *fisher exact* antara variabel kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.004. Karena nilai  $p$  lebih kecil dari  $\alpha$ , 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. Dan berdasarkan uji koefisien *phi* diperoleh nilai *phi* sebesar 0.56 yang berarti bahwa hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan adalah kuat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2006) yang menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung di tempat pembuangan akhir di Antang, Makassar.

Sarung tangan merupakan alat pelindung diri dari sampah dan kotoran selama bekerja (memulung), juga menghindari adanya luka akibat goresan benda tajam ataupun pecahan kaca saat bekerja. Kebiasaan menggunakan sarung tangan saat bekerja akan meminimalkan tangan terkontak langsung dengan sumber penularan penyakit.



Pemakaian sarung tangan saat memulung dapat menjamin pemulung untuk tidak terinfeksi kecacingan namun juga tergantung pada jenis sarung tangan yang digunakan apakah terbuat dari jenis kulit (karet), kaos atau kain biasa.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 9 responden yang memakai sarung tangan saat memulung seluruhnya (100 %) menggunakan jenis sarung tangan yang terbuat dari kain biasa. Dan dari 9 responden yang memakai sarung tangan, sebanyak 5 anak (55.6 %) yang selalu mencuci sarung tangannya setelah dipakai dan sebanyak 4 anak (44.4 %) yang tidak mencuci sarung tangannya setelah dipakai.

Sarung tangan yang terbuat dari kain masih ada kemungkinan untuk terinfeksi kecacingan oleh karena cairan sampah yang mengandung telur cacing dapat meresap masuk ke dalam kulit tangan sehingga menembus kulit ataupun terselip di bawah kuku. Sedangkan bila menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kulit (karet) maka besar kemungkinan terhindar dari infeksi kecacingan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain;

1. Jenis penelitian yang digunakan yakni *cross sectional study* dimana variabel yang merupakan faktor resiko dan efek diteliti sekaligus pada saat yang bersamaan yakni saat observasi dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan sampel yang diambil telah terinfeksi kecacingan sebelum penelitian dilakukan.

2. Lokasi penelitian hanya terbatas pada tempat bekerja pemulung saja (TPA) tanpa melihat lingkungan tempat tinggal pemulung, sebab ada kemungkinan tempat tinggal mereka lebih memungkinkan untuk terinfeksi kecacingan karena mereka tinggal di daerah pemukiman kumuh.
3. Penelitian ini tidak memperhitungkan lama menjadi pemulung, apakah seseorang sudah lama menjadi pemulung atau sebaliknya karena jika seseorang sudah lama menjadi pemulung maka akan mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi kecacingan jika dibandingkan dengan mereka yang baru saja menjadi pemulung.
4. Hasil penelitian ini tidak memberikan gambaran spesifikasi jenis cacing tertentu. Tetapi hanya digambarkan apakah terinfeksi atau tidak terinfeksi berdasarkan tujuan penelitian. Olehnya itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang menyangkut kesehatan khususnya mengenai cacing pada pemulung dapat lebih dikembangkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang hubungan antara hygiene perorangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar dengan nilai  $p = 0.006$  dan kuat hubungannya adalah kuat dengan nilai koefisien *phi* sebesar 0.57.
2. Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar dengan nilai  $p = 0.011$  dan kuat hubungannya adalah kuat dengan nilai koefisien *phi* sebesar 0.54.
3. Ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar dengan nilai  $p = 0.000$  dan kuat hubungannya adalah kuat dengan nilai koefisien *phi* sebesar 0.73.
4. Ada hubungan antara kebiasaan memakai sarung tangan saat bekerja dengan kejadian infeksi kecacingan pada pemulung sampah usia anak sekolah dasar di tempat pembuangan akhir Antang, kota Makassar dengan nilai  $p = 0.004$  dan kuat hubungannya adalah kuat dengan nilai koefisien *phi* sebesar 0.56.

## **B. Saran**

1. Petugas kesehatan perlu memberikan penyuluhan yang intensif yakni sekali dalam sebulan kepada pemulung tentang pentingnya hygiene perorangan
2. Pemerintah setempat bekerja sama dengan petugas kesehatan bagian sanitasi dan bagian pemberantasan penyakit menular yang ada di puskesmas dan di dinas kesehatan kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang teratur dan terjadwal untuk mengetahui kondisi kesehatan pemulung.
3. Perlu pemberian obat cacicung secara berkala jika menderita kecacingan.
4. Pengelola TPA sebaiknya membuat sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan kran air di sekitar TPA.
5. Pemerintah sebaiknya membagikan kepada pemulung alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker dan pakaian yang tidak tembus air yang terbuat dari plastik sehingga para pemulung bisa bekerja dengan aman dan meminimalisir kejadian infeksi penyakit kecacingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Syamsunir. 1992. *Hygiene Perorangan*. Jakarta: Bhratara Niaga Media.
- Alicia, "Etos Kerja". [Http:// Aliciakomputer. Blogspot. Com/ 2008/ 01/ Etos-Kerja. Html](http://Aliciakomputer.Blogspot.Com/2008/01/Etos-Kerja.Html). (Diakses pada tanggal 4 Juni 2010)
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 2006. *Nilai Kesehatan Dalam Syarikat Islam, Cet II*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonim, [http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah\\_dasar](http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah_dasar). (Diakses pada tanggal 21 Juli 2010)
- \_\_\_\_\_, <http://www.krjogja.com/news/detail/39127/mendiknas.tegaskan.masuk.sd.berdasar.umur.html>. (Diakses pada tanggal 21 Juli 2010)
- \_\_\_\_\_, [http:// Repository. Usu. Ac. Id/ Bitstream/ 123456789/ 16381/ 4/ Chapter %20ii. Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/16381/4/Chapter%20ii.Pdf) (Diakses pada tanggal 12 Maret 2010)
- Budianto, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Penyakit Cacangan Pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Antang, Tamangapa, Makassar". Skripsi. Makassar FKM Unhas, 1999.
- Daud, Anwar. 2001. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Djamilah, Moerniyati, "Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Infeksi Kecacangan pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari". Skripsi. Makassar: FKM Unhas, 2003.
- Departemen Kesehatan R.I. 1990. *Materi Pelatihan Dokter Kecil*, Jakarta: Depkes R.I.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pedoman Modul dan Materi Pelatihan "Dokter kecil"*, Jakarta: Depkes R.I.
- Entjang, Indan. 2003. *Mikrobiologi dan Parasitologi Untuk Akademi Keperawatan, Cet. II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Environmental resources management. *Bank Dunia Addenda Proyek Gas Lahan TPA Makassar –Uji Tuntas Sosial Laporan Akhir 31 Oktober 2007*. [http://makassarkota.go.id/download/makassar\\_dd\\_report\\_%20social\\_%28bahasa%29.pdf](http://makassarkota.go.id/download/makassar_dd_report_%20social_%28bahasa%29.pdf) (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2010)

- Evi Yulianto, "*Hubungan Higiene Sanitasi Dengan Kejadian Penyakit Cacingan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Rowosari 01 Kecamatan Tembalang*". Skripsi. Semarang, 2006. [http:// digilib. unnes. ac. id/ gsd/ collect/ skripsi/ archives/ HASH1lea/ 3086d1cd.dir/ doc.pdf](http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH1lea/3086d1cd.dir/doc.pdf) (Diakses pada tanggal 12 Maret 2010)
- Fauziah, "*Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Ascariasis, Trichuriasis dan Ancylostomiasis Pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Antang*". Skripsi. Makassar FKM Unhas, 2006.
- Gandahusada, Srisasi.,dkk. 2006. *Parasitologi Kedokteran, Cet. VI*. Jakarta: FKUI
- Hadju, Veni, *Pengaruh infeksi cacingan terhadap kecerdasan anak sekolah dasar, kumpulan makalah seminar sehari infeksi parasit, status gizi dan kecerdasan pada anak sekolah dasar*. Ujung Pandang, 1996.
- Hajr, Ibn Imam. 1993. *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam, The Attainment of The Objective According to the Evidences of the Ordinances*. Beirut, Lebanon: Dar El Fikr.
- Hidayat, "*Konsep Personal Hygiene*" 20 Maret 2009. [http:// hidayat2. wordpress. com/ 2009/ 03/ 20/ 23/](http://hidayat2.wordpress.com/2009/03/20/23/) (Diakses pada tanggal 4 Juni 2010)
- Ilmiah populer, "*cacingan*" 20 Maret 2010, [http:// www. pdpersi. co. id/ ?show = detailnews&kode=23&tbl=ilmiah](http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=23&tbl=ilmiah) (Diakses pada tanggal 22 Maret 2010)
- Lampiran *Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.: 424/MENKES/SK/VI/2006. "Pedoman Pengendalian Cacingan"* 19 Juni 2006. [http:// 74.125.153.132/ search?q=cache : 6MTF8p6 - 3Y0J: www. depkes. go. id/ downloads/ Kepmenkes/ Kecacingan % 2520 dan % 2520 Filariasis/ Lamp % 2520 KMK % 2520 Cacingan. DOC + prevalensi + angka + penyakit + kecacingan + di + Indonesia&cd = 6&hl = id&ct = clnk&gl = id&client = firefox-a](http://74.125.153.132/search?q=cache:6MTF8p6-3Y0J:www.depkes.go.id/downloads/Kepmenkes/Kecacingan%2520dan%2520Filariasis/Lamp%2520KMK%2520Cacingan.DOC+prevalensi+angka+penyakit+kecacingan+di+Indonesia&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a) (diakses pada tanggal 12 Mei 2010)
- Marhadi, Abd. *Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan Dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak Usia SD di Desa Purnakang Kec. Tanralili Kab. Maros*". Skripsi. Makassar: FKM Unhas 2004.
- Medicastore, "*Trikuriasis (Infeksi cacing cambuk usus)*" [http:// medicastore. com/ penyakit/ 94/ Trikuriasis Infeksi cacing cambuk usus. html](http://medicastore.com/penyakit/94/Trikuriasis%20Infeksi%20cacing%20cambuk%20usus.html) (diakses pada tanggal 12 Mei 2010)
- Nadesul, Hendrawan. 2000. "*Bagaimana Kalau Cacingan?*"Cet. ke-3. Jakarta: Puspa Swara.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rasmaliah, "Ascariasis dan Upaya Penanggulangannya", [http:// library. usu. ac. id/ download/ fkm/ fkm – rasmaliah.pdf](http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-rasmaliah.pdf). (Diakses pada tanggal 12 Mei 2010).

Stang. 2005. "Biostatistik". Makassar : FKM Unhas.

Tjitra, Emiliana. *Penelitian-penelitian "Soil-Transmitted Helminth." di Indonesia*. [http:// www. kalbe. co. id/ files/ cdk/ files/ 07 Penelitian-Penelitian Soil di Indonesia. pdf/ 07 Penelitian-Penelitian Soil di Indonesia.html](http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/07_Penelitian-Penelitian%20Soil%20di%20Indonesia.pdf/07_Penelitian-Penelitian%20Soil%20di%20Indonesia.html). (Diakses pada tanggal 15 Juni 2010)



**DAFTAR KUESIONER**  
**HUBUNGAN HYGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI**  
**KECACINGAN PADA PEMULUNG ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI**  
**TPA ANTANG MAKASSAR**

**A. Identitas Responden**

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Nama Orang Tua :

**B. Panduan Wawancara**

Pemakaian Alas Kaki

1. Apakah adik selalu memakai alas kaki saat memulung selama 1 bulan terakhir?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Bila selalu atau kadang-kadang, apa jenis alas kaki yang digunakan?
  - a. Sepatu bot
  - b. Sepatu biasa
  - c. Sandal jepit
  - d. Lainnya \_\_\_\_\_

Kebiasaan Mencuci Tangan

1. Apakah adik selalu mencuci tangan sebelum makan, terutama setelah memulung selama 1 bulan terakhir?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah adik mencuci tangan dengan air yang mengalir ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Bila adik mencuci tangan, apakah menggunakan sabun ?
  - a. Ya
  - b. Tidak



### Kebersihan Kuku

1. Apakah adik selalu memotong kuku dalam 1 bulan terakhir?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Kalau ya, berapa kali adik memotong kuku?
  - a. Satu kali dalam seminggu
  - b. Satu kali dalam dua minggu
  - c. Satu kali dalam satu bulan

### Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir ini adik menggunakan sarung tangan saat memulung?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Bila ya, jenis sarung tangan apa yang adik pakai ?
  - a. Dari kulit
  - b. Dari kaos
  - c. Dari kain biasa
3. Apakah adik selalu mencuci sarung tangan setelah dipakai ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

### Pemberian Obat Cacing

1. Apakah adik pernah diberikan obat cacing?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Kapan terakhir adik diberikan obat cacing?
  - a. <6 bulan
  - b. >6 bulan

### CHECK LIST

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Memakai alas kaki			
2.	Kebersihan Tangan			
3.	Kebersihan Kuku			
4.	Memakai sarung tangan			



FREQUENCIES VARIABLES= jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, kebersihan kuku, pemakaian sarung tangan, jenis sarung tangan, pencucian sarung tangan, kejadian infeksi kecacingan, jenis cacing, pemberian obat cacing, terakhir diberikan obat cacing.

### Frequencies

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Statistics

Jenis Kelamin

N	Valid	30
	Missing	0

### Frequency Table

#### Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	17	56.7	56.7	56.7
perempuan	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### Frequencies

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Statistics

umur

N	Valid	30
	Missing	0

### Frequency Table

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 7	5	16.7	16.7	16.7
8	8	26.7	26.7	43.3
9	7	23.3	23.3	66.7
10	7	23.3	23.3	90.0
11	2	6.7	6.7	96.7
12	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### Frequencies

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Statistics

Tingkat Pendidikan

N	Valid	30
---	-------	----

**Statistics**

## Tingkat Pendidikan

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

## Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	6.7	6.7	6.7
SD	28	93.3	93.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

## Kebiasaan Memakai Alas Kaki

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

## Kebiasaan Memakai Alas Kaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	16	53.3	53.3	53.3
Tidak	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

## Kebiasaan Mencuci Tangan Sebelum Makan

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

## Kebiasaan Mencuci Tangan Sebelum Makan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	14	46.7	46.7	46.7
Tidak	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

## Kebersihan Kuku

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

## Kebersihan Kuku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bersih	7	23.3	23.3	23.3
Kotor	23	76.7	76.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

## Pemakaian Sarung Tangan

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

## Pemakaian Sarung Tangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	9	30.0	30.0	30.0
Tidak	21	70.0	70.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

## Jenis Sarung Tangan

N	Valid	9
	Missing	21

**Frequency Table**

## Jenis Sarung Tangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kain biasa	9	30.0	100.0	100.0
Missing -	21	70.0		
Total	30	100.0		

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

Pencucian Sarung Tangan

N	Valid	9
	Missing	21

**Frequency Table**

Pencucian Sarung Tangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	5	16.7	55.6	55.6
	Tidak	4	13.3	44.4	100.0
	Total	9	30.0	100.0	
Missing	System	21	70.0		
Total		30	100.0		

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

Kejadian Infeksi Kecacingan

N	Valid	30
	Missing	0

**Frequency Table**

Kejadian Infeksi Kecacingan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	positif	19	63.3	63.3	63.3
	negatif	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

**Frequencies**

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

**Statistics**

Jenis Cacing

N	Valid	19
	Missing	11

**Frequency Table**

Jenis Cacing

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ascaris	3	10.0	15.8	15.8
	Trichuris	12	40.0	63.2	78.9

	Ancylostoma	2	6.7	10.5	89.5
	Ascaris + Trichuris	2	6.7	10.5	100.0
	Total	19	63.3	100.0	
Missing	-	11	36.7		
Total		30	100.0		

### Frequencies

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Statistics

Pemberian Obat Cacing

N	Valid	30
	Missing	0

### Frequency Table

Pemberian Obat Cacing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	8	26.7	26.7	26.7
Tidak	22	73.3	73.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

### Frequencies

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Statistics

Terakhir Diberikan Obat Cacing

N	Valid	8
	Missing	22

### Frequency Table

Terakhir Diberikan Obat Cacing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 6 bln	3	10.0	37.5	37.5
> 6 bln	5	16.7	62.5	100.0
Total	8	26.7	100.0	
Missing System	22	73.3		
Total	30	100.0		

### CROSSTABS

/TABLES=umur BY cacingan  
 /FORMAT=AVALUE TABLES  
 /CELLS=COUNT  
 /COUNT ROUND CELL.

## Crosstabs

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
umur * cacingan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

### umur \* Infeksi Kecacingan Crosstabulation

		Infeksi Kecacingan		Total
		positif	negatif	
umur	7	5	0	5
	8	6	2	8
	9	2	5	7
	10	4	3	7
	11	2	0	2
	12	0	1	1
Total		19	11	30

#### CROSSTABS

/TABLES=alaskaki BY cacingan  
 /FORMAT=AVALUE TABLES  
 /STATISTICS=CHISQ PHI  
 /CELLS=COUNT EXPECTED COLUMN  
 /COUNT ROUND CELL.

## Crosstabs

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Alas kaki * cacingan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

### Kebiasaan Memakai Alas Kaki \* Kejadian Infeksi Kecacingan Crosstabulation

			Infeksi Kecacingan		Total
			positif	negatif	
Pemakaian Ya alas kaki	Count		6	10	16
	Expected Count		10.1	5.9	16.0
	% within cacingan		31.6%	90.9%	53.3%



Tidak	Count	13	1	14
	Expected Count	8.9	5.1	14.0
	% within cacingan	68.4%	9.1%	46.7%
Total	Count	19	11	30
	Expected Count	19.0	11.0	30.0
	% within cacingan	100.0%	100.0%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.853 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7.613	1	.006		
Likelihood Ratio	11.055	1	.001		
Fisher's Exact Test				.002	.002
N of Valid Cases <sup>b</sup>	30				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,13.

b. Computed only for a 2x2 table

#### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.573	.002
	Cramer's V	.573	.002
N of Valid Cases		30	

#### CROSSTABS

/TABLES=cucitangan BY cacingan  
 /FORMAT=AVALUE TABLES  
 /STATISTICS=CHISQ PHI  
 /CELLS=COUNT EXPECTED COLUMN  
 /COUNT ROUND CELL.

#### Crosstabs

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Cuci tangan * cacingan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

#### Kebiasaan Mencuci Tangan Sebelum Makan \* Kejadian Infeksi Kecacingan Crosstabulation

	Ya	Count	Infeksi Kecacingan		Total
			positif	negatif	
Kebiasaan	Ya		5	9	14

Mencuci Tangan Sebelum Makan	Expected Count	8.9	5.1	14.0
	% within cacingan	26.3%	81.8%	46.7%
Tidak	Count	14	2	16
	Expected Count	10.1	5.9	16.0
	% within cacingan	73.7%	18.2%	53.3%
Total	Count	19	11	30
	Expected Count	19.0	11.0	30.0
	% within cacingan	100.0%	100.0%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.623 <sup>a</sup>	1	.003		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.537	1	.011		
Likelihood Ratio	9.124	1	.003		
Fisher's Exact Test				.007	.005
N of Valid Cases <sup>b</sup>	30				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,13.

b. Computed only for a 2x2 table

#### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.536	.003
	Cramer's V	.536	.003
N of Valid Cases		30	

#### CROSSTABS

/TABLES=kbersihankuku BY cacingan  
 /FORMAT=AVALUE TABLES  
 /STATISTICS=CHISQ PHI  
 /CELLS=COUNT EXPECTED COLUMN  
 /COUNT ROUND CELL.

#### Crosstabs

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebersihan kuku * cacingan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

#### Kebersihan Kuku \* Kejadian Infeksi Kecacingan Crosstabulation

			Infeksi Kecacingan		Total
			positif	negatif	
Kebersihan kuku	Bersih	Count	0	7	7

	Expected Count	4.4	2.6	7.0
	% within cacingan	.0%	63.6%	23.3%
Kotor	Count	19	4	23
	Expected Count	14.6	8.4	23.0
	% within cacingan	100.0%	36.4%	76.7%
Total	Count	19	11	30
	Expected Count	19.0	11.0	30.0
	% within cacingan	100.0%	100.0%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.771 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	12.414	1	.000		
Likelihood Ratio	18.176	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases <sup>b</sup>	30				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,57.

b. Computed only for a 2x2 table

#### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.725	.000
	Cramer's V	.725	.000
N of Valid Cases		30	

#### CROSSTABS

/TABLES=sarung tangan BY cacingan  
 /FORMAT=AVALUE TABLES  
 /STATISTICS=CHISQ PHI  
 /CELLS=COUNT EXPECTED COLUMN  
 /COUNT ROUND CELL.

#### Crosstabs

[DataSet1] D:\Ummul\skripsi\skripsi\edit hasil.sav

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sarung tangan * cacingan	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

#### Pemakaian Sarung Tangan \* Kejadian Infeksi Kecacingan Crosstabulation

			Infeksi Kecacingan		Total
			positif	negatif	
sarung tangan	Ya	Count	2	7	9
		Expected Count	5.7	3.3	9.0

	% within cacingan	10.5%	63.6%	30.0%
Tidak	Count	17	4	21
	Expected Count	13.3	7.7	21.0
	% within cacingan	89.5%	36.4%	70.0%
Total	Count	19	11	30
	Expected Count	19.0	11.0	30.0
	% within cacingan	100.0%	100.0%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.357 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.999	1	.008		
Likelihood Ratio	9.444	1	.002		
Fisher's Exact Test				.004	.004
N of Valid Cases <sup>b</sup>	30				


a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,30.

b. Computed only for a 2x2 table

#### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.558	.002
	Cramer's V	.558	.002
N of Valid Cases		30	

**PETA LOKASI TAMANGAPA**



**Luas: 14,3 Ha**

**Keterangan:**

-  : Bengkel
-  : Masjid
-  : Pustu
-  : Orgi/mesin
-  : Posko
-  : Garasi Alat Berat
-  : Kantor
-  : Kolam Lindi
-  : Batas zona
-  : Batas Lahan TPA
-  : Jalan Lokasi
- G''** : Gikoko

**Pembagian Zona:**

- A : Lahan Bahan Baku ORGI
- B : Lahan Gas Gikoko (aktif)
- C<sub>1</sub> : Landfill
- C<sub>2</sub> : Lahan Aktif
- C<sub>3</sub> : Lahan Persiapan
- D : Lahan Gas Gikoko
- E : Lahan Gas Gikoko/Aktif
- F : Lahan Aktif





Lahir di Kabupaten Bulukumba tepatnya pada tanggal 29 Juli 1987, dan penulis diberi nama lengkap Ummul Waqiah. Penulis lahir dari pasangan pernikahan H. Muh. Yusuf Hamang dan St. Suade HS. yakni anak ketiga dari enam bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 221 Tanah Kongkong kecamatan Ujung Bulu dan saat duduk di kelas 3 penulis lulus seleksi untuk masuk ke kelas unggulan hingga tamat SD. Kemudian, penulis melanjutkan sekolah di SLTP Negeri 2 Bulukumba. Lalu penulis melanjutkan sekolah di SMU Negeri 1 Bulukumba yang merupakan sekolah unggulan se-kabupaten Bulukumba dan tamat tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan studi di sebuah perguruan tinggi Islam di Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Kesehatan Masyarakat. Semasa menyandang status sebagai mahasiswa, penulis belajar banyak hal untuk mengenal arti kehidupan dan bekal di kehidupan selanjutnya melalui mata kuliah, dan berbagai organisasi yakni di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Kesehatan selama dua periode (2007-2008 dan 2008-2009) dan merupakan aktivis di UKM LDK Al-Jami'.

Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2010, dengan penuh perjuangan selama 3 tahun lebih. Lepas dari perjuangan ini, keinginan terbesar penulis ingin membahagiakan kedua orang tua yang mendidik dan membesarkan sampai sekarang di jenjang perguruan tinggi dan mengaktualkan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.