

**PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK TERHADAP PERSENTASE
KARKAS DAN LEMAK KARKAS
PADA BROILER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

ANDI TENRI IKASARI

60700113041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Tenri Ikasari

Nim : 60700113041

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samata Gowa, 03 Agustus 2017



Andi Tenri Ikasari
60700113041

UNIVERSITAS ISLAM N
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Andi Tenri Ikasari, NIM: 60700113041, Mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Persentase Karkas dan Lemak Karkas pada Broiler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Samata Gowa, 03 Agustus 2017

Pembimbing I



Khaerani Kiramang, S.Pt.,M.P.
Nip. 197308282006042001


Pembimbing II



Muh Nur Hidayat, S.Pt.,M.P.
Nip. 197509092009121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
Nip. 195907121986031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Persentase Karkas dan Lemak Karkas pada Broiler" yang disusun oleh **ANDI TENRI IKASARI**, NIM: **60700113041**, mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017, dinyatakan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan.

Samata, 3 Agustus 2017
10 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Astaty, S.Pt., M. Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UTN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP: 19691205 199303 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya pada kita semua, shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad Saw yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang.

Limpahan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih tiada tara kepada **Ayahanda tercinta Abdullah** dan **Ibunda Andi Hikmah** yang telah melahirkan, mendoakan, mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis sampai saat ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada sodara tercinta **Andi Muh.Iqbal, Andi Tenri Putra dan Andi Tenri Ramahdani** yang senantiasa memberikan motivasi dan nasehat. Serta keluarga besarku yang selama ini memberikan dukungan baik secara moral maupun material.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** dan **Bapak Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan

pengalaman selama penulis melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Jurusan serta Bapak/Ibu Staf Dosen Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih atas waktu yang berharga dan ilmu yang berguna.
5. Kepada Tim Penguji, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Ir Muh Basir Paly, M.Si** selaku penguji I, dan kepada Bapak **Dr. Muh Sabri AR, M.Ag** selaku penguji II terima kasih telah memberikan kritik dan saran terutama tentang kajian islam sehingga skripsi ini lebih sempurna.
6. Terima kasih kepada Kakak **Andi Afriana SE** selaku pegawai di jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas. Terima kasih pula kepada Ibu **Drh. Aminah Hajah Thaha**, Kakak **Muh Arsan Jamili S.Pt., M,si** dan **Hikmawati S.Pt** selaku laboran jurusan ilmu peternakan yang ikut membimbing, memberi kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Tim penelitian Probiotik (**Amirullah S.Pt, Mudarsyah S.Pt, Felis Gunawan, Jusmi S.Pt, Sartika S.Pt, dan Siti Hardianti Basri S.Pt**) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung.
8. Seluruh teman-teman seangkatan saya **BANTENG (PETERNAKAN 2013)** terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini. Semangat kalian luar biasa dahsyatnya.
9. Sahabat-sahabat **Tawakkal Squad (Musfaidah S. Pt, Jusmi S.Pt, Sartika S.Pt, Warsyidawati Rasyid S.Pt, Muliani Syam S.Pt, Sahria S.Pt, Siti**

Hardianti Basri S.Pt) sahabat seperjuangan saya yang selalu ada saat saya butuh terima kasih telah menemani saya dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman **KKN Angkatan 53 Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto** khususnya **Desa Lebang Manai**. Terima kasih atas kebersamaan singkat yang tercipta selama tinggal di satu atap serta pengalaman luar biasanya dimana kehidupan serta sosialisasi dengan lingkungan baru mungkin tidak akan pernah saya dapatkan di ruang kelas didalam kampus.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samata Gowa, 03 Agustus 2017

Penulis

Andi Tenri Ikasari

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4
E. Defenisi Operasional	4
F. Ruang Lingkup	5
G. Hipotesis	5
H. Kajian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Broiler	7
B. Tinjauan Al- Qur'an	12
C. Bakteri Asam Laktat (BAL)	15
D. Probiotik	18
E. Persentase Karkas	36
F. Persentase Lemak Abdominal	38
G. Persentase Lemak Paha	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	42
B. Alat dan Bahan Penelitian	42
C. Jenis Penelitian	42
D. Metode Penelitian	43
E. Parameter yang Diukur	45
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	48
B. Pembahasan	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii



DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Kebutuhan Nutrien Pada Broiler	11
2. Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik	16
3. Bahan Penyusunan Ransum Penelitian	44
4. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian	44
5. Rataan Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Lemak Paha pada Broiler	48

ABSTRACT

Name : Andi Tenri Ikasari
Nim : 60700113041
Major : Animal Science
Title of Research : **The Effect of Probiotics on the Percentage of Carcass and Carcass in Broiler.**

This study aims to determine the effect of probiotics on the percentage of carcass and carcass in broiler. This research was conducted at poultry cage and Basic Laboratory of Department of Animal Science, Faculty of Science and Technology, UIN Alauddin Makassar.

This study was conducted for 35 days. The experiments were conducted in a completely randomized design with four treatments, namely P₀ (probiotics), P₁ (1 ml / liter of drinking water /day), P₂ (3 ml / liter of drinking water / day) and P₃ (5 ml /Drinking water/day) with three replications. This study uses a microbial probiotic *Enterococcus faecalis* containing $9,8 \times 10^7$ cfu/ml. The parameters measured were the percentage of carcass, the percentage of abdominal fat and the percentage of fat of the thighs.

Analysis of variance showed that the use of probiotic had no significant effect ($P > 0,05$) on carcass percentage and abdominal fat percentage, but significantly ($P < 0,05$) to fat thigh percentage. The average percentage of carcasses in the treatment of P₀ (60.59%), P₁ (58.03%), P₂ (61.85%), P₃ (61.03%). The average percentage of abdominal fat in the treatment of P₀ (0.77%), P₁ (2.63%), P₂ (1.76%), P₃ (1:22%). The average percentage of thigh fat in the treatment of P₀ (0.31%), P₁ (0.90%), P₂ (0.54%), P₃ (0.20%).

Keywords: *Probiotics, Broiler, Carcass percentage, Abdominal fat, Thighs fat.*

ABSTRAK

Nama : Andi Tenri Ikasari

Nim : 60700113041

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Persentase Karkas dan Lemak Karkas pada Broiler.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase karkas dan lemak karkas pada broiler. Penelitian ini dilakukan di kandang unggas dan Laboratorium Dasar Jurusan Ilmu Peternakan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari. Percobaan dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan, yaitu P₀ (tanpa probiotik), P₁ (1 ml/liter air minum/hari), P₂ (3 ml/liter air minum/hari) dan P₃ (5 ml/air minum/hari) dengan tiga ulangan. Penelitian ini menggunakan mikroba probiotik *Enterococcus faecalis* yang mengandung $9,8 \times 10^7$ cfu/ml. Parameter yang diukur adalah persentase karkas, persentase lemak abdominal dan persentase lemak paha.

Analisis sidik ragam menunjukkan penggunaan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas dan persentase lemak abdominal, tetapi berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap persentase lemak paha. Rata-rata persentase karkas pada perlakuan P₀ (60.59%), P₁ (58.03%), P₂ (61.85%), P₃ (61.03%). Rata-rata persentase lemak abdominal pada perlakuan P₀ (0.77%), P₁ (2.63%), P₂ (1.76%), P₃ (1.22%). Rata-rata persentase lemak paha pada perlakuan P₀ (0.31%), P₁ (0.90%), P₂ (0.54%), P₃ (0.20%).

Kata Kunci: *Probiotik, Broiler, Persentase Karkas, Lemak Abdominal, Lemak Paha.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perunggasan terutama ayam ras pedaging (Broiler) masih menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan protein hewani manusia. Mengingat sifat-sifat unggulnya yaitu tidak memerlukan tempat luas dalam pemeliharaan, bergizi tinggi, pertumbuhan cepat dan efisien mengkonversikan makanan menjadi daging sehingga cepat mencapai usia berat jual dengan bobot badan yang tinggi. Tetapi mempunyai kecenderungan sifat perlemakan yang tinggi pula, karena diikuti adanya gen pembentuk lemak. Broiler merupakan salah satu penyumbang terbesar protein hewani asal ternak dan merupakan komoditas unggulan. Industri broiler berkembang pesat karena daging ayam menjadi sumber utama menu konsumen. Daging broiler mudah didapatkan baik di pasar modern maupun tradisional. Produksi daging broiler lebih besar dilakukan oleh rumah potong ayam modern dan tradisional.

Usaha peternakan broiler bertujuan menghasilkan karkas yang memiliki bobot tinggi dengan kandungan lemak yang rendah. Karkas broiler merupakan daging bersama tulang ayam setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, dari kaki sampai lutut, yang telah dicabuti bulunya serta isi rongga perutnya telah dikeluarkan. Salah satu ciri karkas yang memiliki mutu yang baik yaitu sedikit mengandung lemak (Priyatno, 2003).

Mengingat tingginya kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan pangan, menuntut produsen bahan pangan termasuk pengusaha peternakan untuk meningkatkan kualitas produknya. Walaupun kualitas karkas tergantung pada preferensi konsumen namun ada standar khusus yang dijadikan acuan. Karkas yang layak konsumsi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai dari cara penanganan, cara pemotongan karkas, ukuran dan mutu, persyaratan yang meliputi bahan asal, penyiapan karkas, pengelolaan pascapanen, bahan pembantu, bahan tambahan, mutu produk akhir hingga pengemasan.

Kualitas karkas dapat dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas salah satunya adalah pakan yang termasuk bahan aditif (hormon, *antibiotic* atau mineral). Faktor tersebut akan memberikan hasil akhir yang kurang baik terhadap kualitas karkas. Sehingga perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat. Salah satu alternatif, yaitu dengan cara pemberian probiotik. Probiotik merupakan produk yang mengandung mikroorganisme hidup nonpatogen yang ditambahkan ke dalam pakan, yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan, meningkatkan produksi daging, efisiensi penggunaan ransum, pencernaan bahan pakan dan kesehatan ternak melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Soeparno, 1994).

Beberapa penelitian menunjukkan, penambahan probiotik mempunyai dampak positif. Salah satunya menyatakan, bahwa banyaknya kandungan mikroorganisme hidup dalam usus ternak dapat mempengaruhi metabolisme dalam usus, meningkatkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan,

sehingga produktivitas ternak lebih baik, kandungan lemaknya lebih rendah, sebab probiotik dapat meningkatkan metabolisme energi (ME) dan *Total Digestible Nutrien* (TDN) sehingga imbalan antara protein dan energi lebih bagus (Adnan, 2011).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakannya suatu penelitian terhadap penggunaan pakan aditif dalam penelitian ini berupa probiotik pada broiler untuk mengetahui pengaruhnya terhadap persentase karkas dan lemak karkas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase karkas broiler?
2. Bagaimanakah pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase lemak karkas broiler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase karkas broiler.
2. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap persentase lemak karkas broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat menerapkan tambahan pakan probiotik bagi broiler agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.
3. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan berkualitas.

E. Defenisi Operasional

1. Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain/inangnya beberapa contoh pada makanan suplemen diet yang mengandung bakteri berguna dengan asam laktat bakteri *Lactic Acid Bacteria* (LAB) sebagai mikroba yang paling umum dipakai.
2. Karkas broiler adalah daging bersama tulang ayam setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, dari kaki sampai lutut, yang telah dicabuti bulunya serta isi rongga perutnya telah dikeluarkan.
3. Lemak karkas adalah lemak yang berada dibagian karkas dalam hal ini dapat berupa lemak abdominal maupun lemak paha.

4. Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat disekitar usus membentang sampai *ischium*, disekitar *fabricus* dan rongga perut. Lemak abdominal merupakan bagian yang biasa diamati untuk menilai kandungan lemak yang berhubungan dengan selera konsumen. Sedangkan lemak paha sendiri adalah lemak yang terdapat disekitar paha (*femur*).

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh probiotik terhadap persentase karkas dan lemak karkas dalam hal ini lemak abdominal dan lemak paha pada broiler.

G. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini, yaitu diduga bahwa pemberian probiotik dapat mempengaruhi persentase karkas dan lemak karkas pada broiler.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Ronstarci dkk, (2007), tentang pengaruh penggunaan probiotik selulolitik (*Cellulomonas* sp.) didalam pakan terhadap rataan persentase karkas, persentase lemak abdominal (%), dan bobot organ dalam (g/100g BB) ayam pedaging menunjukkan bahwa penggunaan probiotik selulolitik dalam pakan berpengaruh tidak nyata ($P>0,05$). Kesimpulan Penambahan probiotik selulolitik (*Cellulomonas* sp.) dalam pakan ayam pedaging tidak meningkatkan kualitas karkas, lemak abdominal dan berat organ dalam ayam pedaging.

Penelitian Daud (2006), menunjukkan bahwa persentase karkas dan persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi oleh probiotik, prebiotik maupun kombinasi keduanya dalam ransum. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan

probiotik, prebiotik dan kombinasi keduanya dalam ransum tidak mempengaruhi terhadap pembentukan daging ayam, dengan demikian penambahan probiotik dan prebiotik dalam ransum belum mampu meningkatkan persentase karkas ayam pedaging secara signifikan. Kesimpulan Penambahan prebiotik (R4) dan kombinasi probiotik dengan prebiotik (R3) dalam ransum mampu menurunkan kadar lemak dada, lemak paha, lemak hati, kadar kolesterol dada, hati dan kolesterol serum darah ayam pedaging umur enam minggu.

Penelitian Daud dkk., (2007), hasil uji statistik menunjukkan bahwa persentase karkas dan persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi oleh probiotik, prebiotik dibandingkan dengan antibiotik, maupun kombinasi keduanya dalam ransum. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilaporkan Afriani (2002), bahwa penambahan probiotik dalam ransum ayam pedaging tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kadar lemak daging yang diperoleh. Sebelumnya juga Owings *et al.*, (1990), melaporkan bahwa beberapa penelitian tentang probiotik tidak selalu mendapatkan hasil yang positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Broiler

Perkembangan broiler di mulai dari *great grand parent stock*, *grand parent stock*, *parent stock*, dan *final stock*. *Great grand parent stock* adalah jenis ayam yang berasal dari persilangan dan seleksi dari berbagai kelas, bangsa, atau varietas yang dilakukan oleh pembibit dan merupakan bagian untuk membentuk *grand parent stock*, dihasilkan dari persilangan galur murni (*pure line*). *Grand parent stock* adalah jenis ayam yang khusus dipelihara untuk menghasilkan *parent stock* dan *parent stock* dipelihara untuk menghasilkan *final stock* yang saat ini dikenal dengan istilah broiler (Anggorodi, 1990).

Ayam ras pedaging disebut juga broiler yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Sebenarnya broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an. Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru, serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia (Nasin dan Tjetjep, 2008).

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia

yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 2003).

Ditinjau dari genetik, ayam broiler sengaja diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya. Oleh karena itu, istilah broiler adalah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya rekayasa genetika yang memiliki karakteristik ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur muda, serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, berserat lunak dengan kandungan protein yang tinggi. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai penambahan jumlah ataupun ukuran sel, bentuk dan berat jaringan-jaringan tubuh seperti tulang, urat daging, jantung, otak serta semua jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak dan pertumbuhan terjadi dengan cara yang teratur (Murtidjo, 2003).

Dengan berbagai macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan pilihannya. Sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki daya produktifitas relatif sama. Artinya, seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak begitu mencolok atau sangat kecil sekali. Dalam menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara, peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi bibit yang dijual di poultry shop. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah super 77, tegel hubbard, shaver starbro, pilch, yabro, goto, cobb 500, arbor arcres, tatum, indian river, CP 707, A.A 70 dan masih banyak lagi (Nasin dan Tjetjep, 2008).

Menurut Mulyantono (2003), keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh strain Cobb adalah keunggulannya daya hidup mencapai 98 %, bobot badan mencapai 1,7 kg dalam waktu 35 hari dan konversi pakan mencapai 1,8 kg. Kelemahannya antara lain, jumlah produksi masih terbatas, pertambahan bobot badan sampai umur empat minggu cenderung lambat.

Broiler memiliki beberapa kelebihan yakni dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat. Namun demikian, memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit, dan sulit beradaptasi (Rahmanto, 2012).

Faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai pertumbuhan broiler yang optimal adalah suhu lingkungan dan kelembaban udara yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya *heat stress* (cekaman panas). Hampir setengah dari terlambatnya pertumbuhan pada daerah dengan iklim panas, disebabkan oleh pengaruh langsung dari suhu dan kelembaban udara yang tinggi (May and Lott, 2001).

Pengembangan usaha peternakan broiler di Indonesia umumnya memiliki beberapa hambatan yang dapat berpengaruh terhadap *performance* diantaranya suhu lingkungan dan kelembaban yang cukup tinggi dan ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan harus sangat diperhatikan terutama dalam efisiensi penggunaan pakan yang akan berdampak terhadap nilai ekonomis dalam usaha peternakan tersebut, sedangkan suhu dan kelembaban yang relatif tinggi

menyebabkan broiler menjadi sangat rawan terhadap cekaman panas. Pada umumnya ayam akan berproduksi optimal pada zona nyamannya (*comfort zone*), apabila kondisi lingkungan berada di bawah atau di atas zona nyamannya, ayam akan mengalami *stress* (Kusnadi, 2008).

Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan faktor penyakit. Keunggulan ayam broiler akan terbentuk bila didukung oleh lingkungan, karena sifat genetik saja tidak menjamin keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam broiler akan nyaman hidup dan berproduksi pada suhu lingkungan 18-21 °C. Namun kita ketahui bahwa suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi konsumsi ransum dan lebih banyak minum. Dengan demikian, faktor ransum menyangkut kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Pertumbuhan yang cepat tidak akan timbul bila tidak didukung dengan ransum yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam. Bila faktor suhu dan ransum sudah teratasi maka faktor manajemen perlu diperhatikan pula. Ayam broiler perlu dipelihara dengan teknologi yang dianjurkan oleh pembibit untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (Abun, 2006).

Energi yang umum digunakan dalam pakan unggas adalah energi metabolisme. Tinggi rendahnya energi metabolisme dalam pakan ternak unggas akan mempengaruhi banyak sedikitnya ayam mengkonsumsi pakan. Pakan yang energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi

kebutuhannya (Murtidjo, 2003). Energi diperlukan sebagai sumber kekuatan untuk hidup dan memproduksi (Jull, 1979). Kebutuhan energi metabolis ayam pedaging fase *finisher* sekitar 3200 Kkal/kg pakan (Wahju, 2004).

Pakan *starter* diberikan pada ayam berumur 0-3 minggu, sedangkan ransum *finisher* diberikan pada waktu ayam berumur empat minggu sampai panen. Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan dalam jangka waktu tertentu. Pakan yang dikonsumsi ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat nutrisi lain (Suprijatna dkk., 2005). Kebutuhan nutrisi broiler selama pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien pada Broiler

Komponen	Fase Pemeliharaan			
	Starter		Finisher	
	1	2*	1	2**
Energi Metabolisme (kkal/kg)	3200	min. 2900	3200	min. 2900
Potein Kasar (%)	23	min. 19	20	min. 18
Serat Kasar (%)	-	maks. 6,0	-	maks. 6,0
Lemak Kasar (%)	-	maks. 7,4	-	mask. 8,0
Lisin (%)	1,10	min. 1,10	1,10	min. 0,90
Methionin (%)	0,50	min. 0,40	0,38	min. 0,30
Kalsium (Ca) (%)	0,95	0,90-1,20	0,90	0,90-1,20
Fosfor (P) (%)	0,45	min. 0,40	0,35	min. 0,40

Keterangan: 1. National Research Council (NRC)1994.

2*. Badan Standarisasi Nasional 2006.

2**. Badan Standarisasi Nasional 2006.

B. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Unggas

Unggas adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang merupakan hewan dari keluarga burung dengan ciri memiliki sayap, berbulu, berkaki dua, memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Unggas merupakan hewan yang bisa ditenakkan untuk diambil manfaatnya (Murtidjo, 2003). Sebagaimana di jelaskan pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-An'am/ 6:38 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Kementrian Agama RI, 2012).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk jenis burung adalah ciptaan Allah seperti halnya manusia. Hewan jenis burung atau unggas dapat dijadikan sebagai hewan yang di ternakkan dan dikembangkan untuk diambil manfaatnya. Misalnya, dagingnya, telurnya, bulunya, suaranya (kicaunya), dan sebagainya. Oleh karena itu berwiraswasta dalam bidang peternakan unggas merupakan usaha yang dibenarkan oleh islam (Shihab, 2002).

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am/ 6:142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Kementrian Agama RI, 2012).

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak yaitu pertama binatang ternak sebagai alat angkut atau alat transportasi (Hamulatan) seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan (Farsya). Kata (Farsya) yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu seperti kambing, domba, sapi dan sebagainya (Shihab, 2002).

Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka ayam termasuk dalam kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan.

2. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Diantara sekian banyak manfaatnya salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang peternakan yaitu dijadikan sebagai campuran pakan guna meningkatkan kualitas dari hasil peternakan. Salah satu produk yang berasal dari mikroorganisme

adalah probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai suplemen makanan yang terdiri atas mikrobia hidup yang mempunyai efek menguntungkan pada inang melalui peningkatan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan (Fuller, 1992). Hal ini di jelaskan pada firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:8 yang berbunyi:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya (Kementrian Agama RI, 2012).

Pada ayat ini disebutkan “dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui” menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang manusia sebelumnya tidak ketahui. Manusia masih mengungkap ayat Al-Qur’an tentang keberadaan adanya kehidupan itu, baru kemudian setelah alat mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil (Shihab, 2002).

Ayat diatas menjelaskan bahwa makhluk terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut mikroorganisme. Tersebar diseluruh bumi, penghuni bumi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan spesies yang masih dalam kategori binatang. Mikroorganisme ini terdiri atas bakteri, virus, jamur, alga, dan akarina (tungau dan pinjal). Keberadaan mereka pada jajaran penghuni bumi tidak serta merta kosong tanpa jasa. Mereka termasuk unsur penting dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Beberapa

manfaat mikroorganisme misalnya dapat diambil contoh dalam bidang sains: Pertama, siklus nitrogen salah satu komponen dasar pembentukan kehidupan di bumi, peran ini dimiliki oleh bakteri. Kedua, jamur akar merupakan unsur penting dalam penyerapan mineral tanah oleh tumbuhan. Ketiga, bakteri pada lidah kita mencegah keracunan makanan yang mengandung nitrat, bahan-bahan selada, dan daging. Keempat, bakteri dan alga merupakan unsur terpenting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Dari beberapa contoh yang telah disebutkan diatas menguatkan peran serta makhluk mikroorganisme dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Penemuan berkat hasil penelitian yang dilakukan manusia merupakan sebagian kecil ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia (Shihab, 2002).

C. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif *anaeorob*, tidak mempunyai *sitokrom*, tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrat dan memanfaatkan laktat, oksidasi negatif, katalase negatif, motilitas negatif dan kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella* (Carr *et al.*, 2002).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* (Saxelin, 1997).

Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Velez, 2007).

Genus bakteri yang tergolong kepada bakteri asam laktat adalah *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Propionibacterium* yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai probiotik (Nettles dan Barefoot, 1993).

Tabel 2. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik

<i>Lactobacillus</i>	<i>Bifidobacteria</i>	<i>Enterococcus</i>	<i>Streptococcus</i>
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>S. termhopilus</i>
<i>L. brevis</i>	<i>B. animalis</i>	<i>E. faecium</i>	
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>		
<i>L. curvatus</i>	<i>B. breve</i>		
<i>L. fermentum</i>	<i>B. infantis</i>		
<i>L. gasseri</i>	<i>B. longum</i>		
<i>L. johnsonii</i>	<i>B. thermophilum</i>		
<i>L. reuteri</i>			
<i>L. rhamnosus</i>			
<i>L. salivarius</i>			
<i>Propionibacterium</i>	<i>Yeast</i>	<i>Other</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Kluyveromyces</i>	<i>Leunococcus</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>lactis</i>	<i>mesenteroides</i>	
<i>subs. thermanii</i>	<i>Saccharomyces</i>	<i>Pediococcus</i>	

P. jensenii *boulardii* *acidilactici*
 Saccharomyces
 cerevisiae

Sumber: (Baffoni dan Biavati, 2008 dalam Malago, 2011).

Produk fermentasi BAL salah satunya adalah asam organik. Asam organik ini dihasilkan selama proses fermentasi terkait spesies organisme, gabungan kultur dan kondisi pertumbuhan (Lindgren dan Dobrogosz, 1990). Asam organik mampu menurunkan pH dan berfungsi untuk tidak memutus beberapa ikatan molekul sehingga memiliki kemampuan aktivitas mikroba. Lebih lanjut Lindgren dan Dobrogosz (1990), melaporkan bahwa penurunan pH mampu menghasilkan *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC), sehingga asam laktat dapat menghambat kerja *Clostridium tyrobutyricum*, *E. coli*, *Enterobacter* sp. dan *Propionibacterium freudenreichii* sp. Menurut *Food and Agriculture Organization/World Health Organization* (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk

makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Efisiensi penggunaan pakan dapat dilakukan dengan pemberian bahan imbuhan (*feed additive*) atau zat pemacu tumbuh (*growth promotant*). Pencampuran *feed additive* ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya simpan ransum dan memacu pertumbuhan ternak. Namun penggunaan *feed additif* secara terus menerus akan mengakibatkan terdapatnya produk metabolit berupa residu antibiotik. Oleh karena itu penggunaan *feed additive* alami merupakan alternatif untuk mengurangi akumulasi residu *feed additive* dalam daging. Salah satu *feed additive* alami yang mulai digunakan yakni bakteri probiotik (Tensiska, 2008).

D. Probiotik

Probiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya “untuk hidup”. Probiotik didefinisikan sebagai kultur spesifik dari mikroorganisme hidup seperti *Lactobacillus* yang memberikan pengaruh menguntungkan pada ternak serta dapat berfungsi untuk memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan ternak (Ritonga, 1992). Lebih lanjut Jin *et al.*, (1998), melaporkan bahwa manfaat probiotik pada unggas adalah menempatkan mikroorganisme yang menguntungkan dan menekan mikroorganisme yang merugikan, meningkatkan aktifitas enzim-enzim pencernaan dan menekan aktifitas enzim-enzim bakteri yang merugikan, memperbaiki sistem pencernaan, menekan produksi gas amonia, dan merangsang sistem pertahanan tubuh.

Probiotik didefinisikan sebagai suplemen makanan yang terdiri atas mikrobia hidup yang mempunyai efek menguntungkan pada inang melalui peningkatan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Probiotik pada prinsipnya adalah memasukkan mikrobia menguntungkan ke dalam saluran pencernaan, dan apabila probiotik diberikan sejak dini maka diharapkan dapat berkolonisasi pada saluran pencernaan sejak dini pula (Fuller, 1992).

Istilah probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Parker pada tahun 1974, yang menggambarkan tentang keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Pada saat ternak mengalami stres, keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan terganggu, mengakibatkan sistem pertahanan tubuh menurun dan bakteri-bakteri patogen berkembang dengan cepat. Pemberian probiotik akan memberikan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan yang mengalami perubahan karena masuknya bakteri patogen, sehingga bakteri patogen tidak dapat ditekan populasinya melalui pengaruh antibakteri probiotik dan pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari pakan dan menjaga kesehatan ternak (Samadi, 2002).

Sampai sekarang konsep tentang probiotik didasarkan pada terbentuknya kolonisasi mikroba yang menguntungkan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, mencegah perkembangan bakteri patogen, netralisasi racun pada saluran pencernaan, mengatur aktivitas enzim bakteri tertentu dan menguatkan pengaruh substansi yang merangsang sintesis antibodi pada sistem kekebalan (Cruywagen *et al.*, 1996).

Ritonga (1992), menyatakan bahwa syarat-syarat probiotik adalah: mikroba tersebut tidak patogen terhadap ternak maupun manusia, mikroba tersebut harus merupakan mikroorganisme yang normal di dalam saluran pencernaan dan sanggup melakukan kolonisasi di dalam usus, harus tahan terhadap asam-asam lambung, enzim-enzim pencernaan, asam dan garam empedu, maupun respon-respon kekebalan dalam tubuh ternak, sanggup memproduksi zat-zat anti bakteri yang berspektrum luas pada bakteri-bakteri spesifik termasuk bakteri patogen pada saluran pencernaan manusia. Umumnya yang dipenuhi syarat tersebut diatas sebagai probiotik adalah mikroba *Lactobacillus* dan *Pediococci* sp. Lebih lanjut Jin *et al.*, (1998), menyatakan bahwa mikroba yang digunakan sebagai probiotik yang efektif harus memiliki sifat-sifat dapat bertahan hidup selama persiapan sampai produksi dengan skala industri, stabil dan tetap hidup dalam jangka waktu lama pada periode penyimpanan dan kondisi lapangan, dapat bertahan hidup, mampu bersaing, tidak hanya sekedar tumbuh dalam saluran pencernaan, serta mampu menimbulkan efek yang menguntungkan bagi inang.

Pada ternak, penggunaan probiotik bertujuan untuk, memperbaiki kondisi saluran pencernaan dengan menekan reaksi pembentukan racun dan metabolit yang dapat menetralsisir senyawa beracun yang tertelan atau dihasilkan oleh saluran pencernaan, merangsang produksi enzim yang diperlukan untuk mencerna pakan dan memproduksi vitamin serta zat-zat yang tidak terpenuhi dalam pakan (Seifert dan Gessler, 1997).

Pemberian mikroba hidup dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan ekosistem mikroflora pencernaannya. Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan unggas mempengaruhi untuk kinerja dan kesehatan ternak. Ketidakseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan karena terjadinya kolonisasi bakteri patogen atau mikroflora yang dapat mengganggu kinerja ternak. Sebagai bahan alternatif untuk pemacu tumbuh, probiotik dalam penggunaannya pada ternak dapat meningkatkan kinerja ternak. Hal demikian terjadi karena adanya variasi respon yang tinggi dari individual ternak terhadap jenis pakan imbuhan. Probiotik bukan bertindak sebagai nutrisi esensial dimana tidak ada dosis respon, tetapi hanya ada level batas pemakaian. Cara kerja probiotik terutama melalui modifikasi populasi bakteri usus dan efektivitasnya tergantung atas status mikroba pada satu kelompok ternak dan pada individu ternak. Dengan demikian, dapat dimengerti jika efek yang terjadi mempunyai variasi yang tinggi. Perbedaan cara kerja dari *strain* probiotik sejauh ini belum dipahami, tetapi metabolit bakteri yang dihasilkan seperti asam organik khususnya pada bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH atau juga peroksida dan bakteriosin diperkirakan bertanggung jawab atas sifat antagonis terhadap bakteri patogen Gram positif seperti *Salmonella*. Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrisi. Terdapat beberapa mekanisme respon probiotik yaitu meliputi produksi bahan penghambat secara langsung, penurunan pH luminal melalui produksi asam lemak terbang

rantai pendek, kompetisi terhadap nutrisi dan tempat pelekatan pada dinding usus, interaksi bakterial, resistensi kolonisasi contohnya *Lactobacilli* dengan bakteri patogen, merubah respon imun, dan mengatur ekspresi gen *Colonocyte* (Fooks dan Gibson, 2002).

Menurut Lee dan Salminen (2009), yang menyatakan bahwa probiotik dapat diberikan dengan berbagai variasi berdasarkan:

1. Tipe probiotik (*Lactobacilli*, *Bifidobacteria*, *Yeast* atau *Enterococcus*)
2. Dosis harian (10^7 - 10^{10} cfu)
3. Frekuensi pemberian 1-4 x sehari
4. Waktu pemberian (sebelum, selama, atau setelah makan)
5. Durasi pemberian (1 hari atau beberapa bulan)
6. Bentuk sediaan (makanan fermentasi, minuman, kapsul, tablet atau serbuk)
7. Viabilitas

Probiotik memberikan efek fisiologis terhadap kesehatan di dalam pencegahan dan terapi penyakit seperti antikoolesterol, antihipertensi, intoleran laktosa, anti karsinogenik, gangguan saluran pencernaan serta alergi. Dengan memperhatikan kesehatan inangnya penambahan probiotik harus memperhatikan konsentrasi antara 10^7 - 10^{11} cfu/g per hari untuk manusia dan 10^7 - 10^9 cfu/g per hari untuk binatang, sehingga dapat berperan untuk menurunkan kadar kolesterol (Ooi dan Min-Tze, 2010).

Beberapa penelitian tentang probiotik tidak selalu mendapatkan hasil yang positif, tetapi ada yang mendapatkan hasil negatif. Perbedaan hasil penelitian

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jenis atau strain bakteri dalam probiotik tersebut, dosis pemberian pada ternak, tingkat ketahanan bakteri terhadap kondisi yang ekstrim baik dalam saluran pencernaan ternak maupun lingkungan penyimpanan (Owings *et al.*, 1990).

Didalam saluran pencernaan baik hewan, ternak atau manusia terdapat sekitar 100 sampai 400 jenis mikroba, yang secara sederhana dikelompokkan dalam mikroba menguntungkan dan mikroba yang merugikan dan dapat menyebabkan penyakit atau mikroba patogen. Semua mikroba hidup dalam keseimbangan. Jika keseimbangan terganggu, misalnya mikroba tidak menguntungkan lebih banyak dibandingkan dengan mikroba menguntungkan, maka timbullah penyakit. Pemberian probiotik telah dikemukakan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki keseimbangan populasi mikroba dalam saluran pencernaan hewan, dimana mikroba-mikroba yang menguntungkan populasinya lebih tinggi dari populasi mikroba yang merugikan. Pada manusia, perbandingan persentase jumlah mikroba yang baik yang diajurkan adalah sekitar 85:15. Perbandingan tersebut tentu saja dapat dicapai dengan pemberian atau penggunaan probiotik dan prebiotik (Budiansyah, 2004).

Satu dari alasan penggunaan probiotik yaitu untuk menstabilkan mikroflora pencernaan dan berkompetisi dengan bakteri patogen, dengan demikian strain probiotik harus mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup. Secara umum, ada beberapa karakteristik dan kriteria keamanan yang harus dimiliki oleh probiotik.

Karakteristik dan kriteria yang aman dari probiotik (Gaggia *et al.*, 2010):

1. Nontoksik dan nonpatogenik
2. Mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas
3. Dapat hidup dalam spesies target
4. Dapat bertahan, berkolonisasi dan bermetabolisme secara aktif dalam target yg ditunjukkan dengan:
 - a) Tahan terhadap cairan pencernaan dan empedu
 - b) Persisten dalam saluran pencernaan
 - c) Menempel pada ephitelium atau mucus
 - d) Berkompetisi dengan mikroflora inang
5. Memproduksi senyawa antimikrobia
6. Antagonis terhadap patogen
7. Dapat merubah respon imun
8. Tidak berubah dan stabil pada waktu proses penyimpanan dan lapangan
9. Bertahan hidup pada populasi yang tinggi
10. Mempunyai sifat organoleptik yang baik

Bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu *Lactobacillus* dan *Bifidobacteria*, kedua jenis bakteri ini dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan karena dapat menstimulasi respon imun dan menghambat patogen. Satu faktor kunci dalam seleksi *starter* probiotik yang baik yaitu kemampuannya untuk bertahan dalam lingkungan asam pada produk akhir fermentasi secara *in vitro* dan kondisi buruk dalam saluran pencernaan atau *in vivo*. Ketahanan probiotik pada

kondisi *in vitro* dapat dipengaruhi oleh pembentukan metabolit oleh *starter* seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida dan bakteriosin (Saarela *et al.*, 2000).

Berbagai jenis mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik diisolasi dari isi usus pencernaan, mulut, dan kotoran ternak atau manusia. Pada saat ini, mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai probiotik yaitu strain *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Bacillus* sp., *Streptococcus*, yeast dan *Saccharomyces cereviceae*. Mikroorganisme tersebut harus nonpatogen. Gram positif, strain yang spesifik, anti *E. coli*, tahan terhadap cairan empedu, hidup, melekat pada mukosa usus, dan minimal mengandung 30×10^9 cfu/g (Pal *et al.*, 2006).

Lebih dari 21 bahan probiotik diijinkan penggunaannya sebagai pakan imbuhan di Uni Eropa, 13 diantaranya disahkan digunakan untuk anak babi dan hanya beberapa diantaranya untuk induk dan penggemukan babi. Tujuh dari bahan probiotik tersebut diseleksi dari strain *E. faecium* (penghuni usus pencernaan), dua strain *S. cereviceae* (dari buah-buahan) dan hanya satu produk mengandung *L. farciminis* dan *Pediococcus acidilactici* yang masing-masing penghuni usus pencernaan dan produk susu. Konsentrasi yang direkomendasi untuk hampir semua probiotik yaitu kira-kira 10^8 cfu/kg pakan (Simon, 2005).

Beberapa laporan menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang berhubungan dengan manfaat probiotik dapat meningkatkan nafsu makan dan menghasilkan vitamin serta enzim-enzim pencernaan. Memungkinkan probiotik tersebut dapat berperan sebagai stimulasi

pertumbuhan, sehingga dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sekaligus bobot karkas broiler (Abrar dan Raudhati, 2006).

1. Jenis-jenis Mikroba Probiotik.

a. *Enterococcus* sp.

Probiotik strain *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri dengan karakteristik gram positif dan berbentuk kokus genus bakteri ini kurang dikenal karena hanya memiliki kurang dari 20 spesies. Bakteri gram positif dengan sel berbentuk seperti telur dalam bentuk tunggal, berpasangan atau rantai pendek dan tidak membentuk spora. Strain bakteri yang paling sering digunakan adalah *Enterococcus faecalis*. Pertumbuhan optimal pada suhu 35-37°C dan kebanyakan spesies dapat tumbuh pada suhu 42-45°C. bakteri ini bersifat homofermentatif yang mengubah glukosa seluruhnya menjadi asam laktat. Genus *Enterococcus* termasuk dalam kelompok mikroorganisme dikenal sebagai Bakteri Asam laktat (BAL) (De Vos, *et al.*, 2009).

Strain yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia telah terisolasi dari saluran pencernaan manusia dan biasanya termasuk spesies genera *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Namun, strain milik spesies BAL lainnya, di antaranya *Enterococci*, telah digunakan di masa lalu sebagai probiotik juga, seperti *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. thermophilus*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Propionibacterium freudenreichii*, *Pediococcus acidilactici*, *Sporolactobacillus inulinus*, *Bacillus cereus* dan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. Meskipun jenis *E. faecium* dan *E. faecalis* telah diaplikasikan pada manusia, suplemen probiotik,

strain *E. faecalis* juga ada dan telah banyak digunakan sebagai suplemen pakan hewan (Fuller, 1989).

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecium* diaplikasikan pada manusia dan hewan sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Batrinon, 2010).

Enterococci terdistribusikan secara luas pada lingkungan, terutama pada sistem saluran pencernaan manusia dan hewan. *E. faecalis* sering mendominasi spesies di usus manusia, meski pada beberapa individu dan di beberapa negara *E. faecium* melebihi *E. Faecalis*. Namun, kehadiran umum *E. faecalis* pada banyak produk makanan tidak selalu berhubungan dengan kontaminasi feses (tinja) secara langsung. Pada tahun 1992, Uni Eropa menetapkan tingkat maksimum untuk kehadiran *Coliform* dan *Escherichia coli*, keduanya dianggap sebagai indikator kebersihan, sementara tidak ada batas yang ditetapkan untuk *enterococci*. Selanjutnya, telah ditunjukkan bahwa *Enterococci* memiliki nilai yang kecil sebagai indikator kesehatan dalam industri pengolahan makanan. Meskipun *E. faecalis*, *E. faecium*, dan *E. Durans* sering terisolasi dari kotoran manusia, bakteri ini jauh lebih sedikit pada ternak, seperti babi, sapi, dan domba (Fuller, 1989).

b. *Bacillus* sp.

Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, beberapa spesies bersifat aerob obligat dan bersifat anaerobik fakultatif, dan memiliki endospora sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Backman *et al.*, 1994). Menurut Fardiaz (1992), bentuk spora (endospora) *Bacillus* bervariasi bergantung pada spesiesnya. Endospora ada yang lebih kecil dan ada juga yang lebih besar dari pada diameter sel induknya. Pada umumnya sporulasi terjadi bila keadaan medium memburuk, zat-zat yang timbul sebagai pertukaran zat yang terakumulasi dan faktor luar lainnya yang merugikan.

Menurut *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*, 8 th editions dalam Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi *Bacillus* sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Procaryotae

Divisi : Bacteria

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Bacillaceae

Marga : *Bacillus*

Jenis : *Bacillus* sp.

Bacillus mempunyai sifat yang lebih menguntungkan dari pada mikroorganisme lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994). Spesies dari jenis *Bacillus* juga berbeda dalam sifat pertumbuhannya.

Beberapa bersifat mesofilik misalnya *Bacillus subtilis* yang lainnya bersifat termofilik fakultatif misalnya *Bacillus coagulans* atau termofilik pada *Bacillus stearothermophilus* sering menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng. Sebanyak 22 spesies *Bacillus* telah diidentifikasi diantaranya banyak ditemukan pada makanan. Beberapa kelompok bakteri ini menghasilkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan patogen (Backman *et al.*, 1994).

Bakteri *Bacillus* merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam. Bakteri ini adalah organisme saprofitik, berbentuk batang, Gram positif pembentuk spora nonpatogen yang biasanya ditemukan dalam air, udara, debu, tanah dan sedimen. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat saprofit pada tanah, air, udara dan tumbuhan, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis*. Jenis-jenis *Bacillus* yang ditemukan pada saluran pencernaan ayam yaitu *Bacillus subtilis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus lincheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus firmus*, kelompok *Bacillus cereus* (Jawetz dan Adelberg, 2005).

Bacillus memiliki beberapa sifat yaitu, bersifat aerob fakultatif sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak, berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana, dan tetap viable pada saat proses pembuatan pakan, menghasilkan enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat anti mikroba (Kompang, 2009).

Genus *Bacillus* digunakan sebagai agen biokontrol secara luas, menghasilkan zat antimikroba berupa bakteriosin. Bakteriosin adalah zat

antimikroba polipeptida atau protein yang diproduksi oleh mikroorganisme yang bersifat bakterisida. Bakteriosin membunuh sel targetnya dengan menyisip pada membran target dan mengakibatkan fungsi membran sel menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan sel lisis. *Bacillus* sp. juga diketahui menghasilkan spora dan enzim kitinase yang mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen yaitu *Aspergillus* sp. *Bacillus* juga menghasilkan enzim yang banyak digunakan dalam industri (Kompiang, 2009). Widyasti (2003), melaporkan *Bacillus* sp. penghasil enzim α -amilase yang banyak digunakan dalam industri untuk menghidrolisis ikatan α -1,4 glikosidik pati, glikogen dan substrat sejenisnya. *Bacillus thermoglucosidasius* AF-01 memproduksi parsial protease alkali yang memiliki sifat proteolitik yang cukup tinggi banyak digunakan pada industri detergen dan makanan.

Berdasarkan penelitian Sofyan (2003), jumlah *Bacillus* dalam tembolok mencapai $3,2 \times 10^8$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dalam ampela menurun menjadi $2,8 \times 10^7$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, kemudian dalam usus halus meningkat menjadi $8,2 \times 10^9$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dalam *cloaca* menurun menjadi $5,7 \times 10^7$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dan dalam feses menurun lagi menjadi $2,4 \times 10^4$ *coloni forming unit* (cfu)/ml. Dari observasi ini dapat diketahui bahwa *Bacillus* mampu berkembang dalam saluran pencernaan ayam sehingga memenuhi salah satu kriteria sebagai probiotik.

c. *Lactobacillus* sp.

Lactobacillus adalah golongan bakteri penghasil asam laktat, termasuk bakteri gram positif, fakultatif anaerob dan mikroaerofil. Keberadaan bakteri *Lactobacillus* merupakan indikasi lingkungan yang sehat, karena bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam lingkungan dan saluran pencernaan makhluk hidup baik di darat maupun di air. Kemampuan metabolisme *Lactobacillus* untuk menghasilkan asam laktat dan peroksidase merupakan cara efektif bakteri ini dalam menghambat berbagai macam mikroba patogen penyebab penyakit. Sehingga bakteri *Lactobacillus* banyak dimanfaatkan sebagai probiotik yang dapat diaplikasikan langsung pada lingkungan maupun sebagai campuran pada pakan (Hadioetomo, 1985).

Menurut Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi dari *Lactobacillus* yaitu sebagai berikut:

Kerajaan : Bacteria

Divisi : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Lactobacillales

Famili : Lactobacillaceae

Genus : *Lactobacillus*

Kebanyakan dari bakteri ini umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari *Lactobacillus* memiliki kemampuan

membusukkan materi tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan beberapa bakteri merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genom sendiri. *Lactobacillus* termasuk golongan bakteri asam laktat yang sering dijumpai pada makanan fermentasi, produk olahan ikan, daging, susu, dan buah-buahan (Napitupulu dkk, 1997).

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistem pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi. Pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (*crop*, *gizzard*, dan usus halus) dengan menempatkan mikroflora dari strain *Lactobacillus* sp. untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella* (Barrow, 1992). Menurut Bidura dan Suastina (2002), mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah menetralkan racun, menekan populasi bakteri tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Suplementasi probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan berat karkas dan persentase daging karkas serta dapat menurunkan jumlah lemak subkutan termasuk kulit (Sterling *et al.*, 1998). Penggunaan probiotik dalam ransum meningkatkan kandungan *lysine analogue* dan *aminoethyl cysteine* dalam saluran pencernaan yang diubah menjadi asam amino lisin dan sistein dan dapat

meningkatkan retensi protein yang berperan dalam pembentukan daging (Candrasih dan Bidura, 2001). Soeharsono (2010), menyatakan bahwa penambahan probiotik dalam ransum yang diberikan pada ternak dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol.

2. Mekanisme Kerja Probiotik

Mekanisme kerja dari probiotik antara lain adalah menghasilkan asam, menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, berproliferasi di dalam saluran pencernaan dan bersaing dengan bakteri patogen, dalam hal ini bersaing untuk mendapatkan nutrisi seperti karbohidrat dan bersaing untuk memperoleh tempat pelekatan pada dinding usus, mempunyai aktivitas antimikrobal. Mikroba dalam probiotik juga dapat mengatur pergerakan isi perut, menghentikan diare dan mempertinggi sistem ketahanan tubuh (Lopez, 2000).

Menurut Budiansyah (2004), mekanisme kerja dari probiotik ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan

Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus merupakan tahap pertama untuk kolonisasi dan selanjutnya memodifikasi sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba probiotik berkembang dengan baik dan mikroba patogen tereduksi dari sel-sel usus inang sehingga pertumbuhan dari mikroba patogen dapat terhambat.

b. Kompetisi untuk memperoleh makanan dan memproduksi zat antimikroba

Mikroba probiotik menghambat organisme patogen dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotik dapat berkembang dengan baik. Substrat bahan makanan yang mendukung perkembangan mikroba probiotik dalam saluran pencernaan disebut prebiotik. Prebiotik ini adalah terdiri dari bahan-bahan makanan yang pada umumnya banyak mengandung serat.

Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas.

c. Stimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang

Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin-toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotika bagi mikroba-mikroba patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut berkurang

atau dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya. Hal ini dapat memberikan keuntungan terhadap kesehatan hewan inang sehingga tahan terhadap penyakit.

Meski jumlah bakteri probiotik melimpah dalam saluran pencernaan, probiotik tidak membahayakan, bahkan sebaliknya. Karena probiotik tidak memakan sel-sel dinding pencernaan, baik yang masih hidup maupun sel yang sudah mati. Probiotik hanya memakan zat makanan yang tidak bisa dicerna seperti inulin. Tidak hanya sekedar tidak mengganggu, keberadaan probiotik ternyata menghadirkan manfaat besar bagi manusia maupun hewan. Peralnya, probiotik mampu mencegah munculnya infeksi pada saluran pencernaan, terutama yang disebabkan bakteri jahat. Tidak seperti probiotik, bakteri jahat memang potensial merugikan manusia maupun hewan. Ini disebabkan bakteri jahat hidupnya dengan cara memakan sel dinding pencernaan yang mati maupun masih hidup. Akibatnya, dinding saluran pencernaan bisa terinfeksi dan bocor (Siswono, 2002).

Prinsip kerja probiotik yaitu memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia maupun hewan. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi dari hasil perombakan molekul kompleks (Medicinus, 2009).

E. Persentase Karkas

Karkas broiler adalah bagian tubuh ayam yang disembelih lalu dikeluarkan isi perut, kaki, leher, kepala, bulu, darah. Karkas ayam dibedakan menjadi: karkas kosong yaitu ayam yang telah disembelih dan dikurangi dengan darah, organ dalam, kepala dan kaki. Karkas isi yaitu ayam yang telah disembelih dan dikurangi bulu, darah, kepala, leher, kaki dan organ dalam kecuali jantung, hati dan ampela (*gizzard*). Persentase karkas sering digunakan untuk menilai produksi ternak daging (Bakar, 2003).

Menurut Murtidjo (2003), karkas broiler adalah daging bersama tulang ayam setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, dari kaki sampai lutut serta isi rongga perut. Pertumbuhan komponen karkas diawali dengan pertumbuhan tulang, lalu pertumbuhan otot yang akan menurun setelah mencapai pubertas selanjutnya diikuti pertumbuhan lemak yang meningkat. Faktor yang mempengaruhi bobot karkas ayam broiler adalah genetik, jenis kelamin, fisiologi, umur, berat tubuh dan nutrisi ransum.

Berdasarkan cara penanganannya, karkas broiler dibedakan menjadi: karkas segar, yaitu karkas yang baru selesai diproses selama tidak lebih dari 6 jam dan tidak mengalami perlakuan lebih lanjut, karkas dingin segar, yaitu karkas segar yang segera didinginkan setelah selesai diproses sehingga suhu di dalam daging menjadi antara 4-5°C, karkas beku, yaitu karkas yang telah mengalami proses pembekuan cepat atau lambat dengan suhu penyimpanan antara 12°C sampai dengan 18°C (Bakar, 2003).

Karkas maupun komposisi fisik karkas terdiri dari komponen tulang, otot, lemak, dan semua jaringan yang akan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan berat badan ternak. Proporsi tulang, otot dan lemak sebagai komponen utama karkas, dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, temperatur, kelembaban dan nutrisi (Soeparno, 2009). Kualitas dan kuantitas ransum mempengaruhi berat karkas, makin baik kualitas dan makin banyak konsumsi ransum maka berat karkasnya semakin tinggi. Untuk organ tubuh seperti kepala, kaki, bulu dan organ dalam dapat mempengaruhi berat karkas, semakin tinggi berat organ tersebut maka berat karkasnya semakin rendah (Cakra, 1986). Lebih lanjut Soeparno (2009), juga menyatakan bahwa bagian-bagian tubuh yang banyak tulang seperti sayap, kepala, punggung, leher dan kaki, persentasenya semakin menurun dengan meningkatnya umur ayam, karena bagian-bagian ini mempunyai pertumbuhan yang konstan pada ayam dewasa.

Haroen (2003), menjelaskan pencapaian bobot karkas sangat berkaitan dengan bobot hidup dan penambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan disebabkan secara langsung oleh ketersediaan asam amino pembentuk jaringan sehingga konsumsi protein pakan berhubungan langsung dengan proses pertumbuhan, oleh karena itu sangat memerlukan perhatian khusus mengenai manajemen penggunaan bahan pakan yang mengandung protein yang cukup sesuai dengan kebutuhan broiler untuk memenuhi asupan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh (Winedar dkk, 2006).

Bobot karkas individual ditentukan oleh bobot karkas itu sendiri, berdasarkan pembagiannya dibedakan menjadi ukuran kecil 0,8-1 kg, ukuran sedang 1-1,3 kg, ukuran besar 1,2-1,5 kg (SNI 01-3924-1995). Persentase karkas broiler yang normal berkisar antara 65-75% dari bobot hidup, semakin berat ayam yang dipotong, maka karkasnya semakin tinggi pula (North and Bell, 1990).

F. Persentase Lemak Abdominal

Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat disekitar usus membentang sampai *ischium*, disekitar *fabricus* dan rongga perut. Lemak abdominal merupakan bagian yang biasa diamati untuk menilai kandungan lemak yang berhubungan dengan selera konsumen. Begitu lemak dalam ransum bertambah, maka bobot badan dan persentase lemak abdominal juga meningkat. Kelebihan energi asal lemak segera akan disimpan dalam tubuh karena pencernaan lemak sekitar 90%. Lemak ini akan disimpan dibawah kulit dan rongga perut. Sekitar 60% dari seluruh lemak abdominal ada dalam bentuk padatan lemak. Berkurangnya nilai energi ransum, atau naiknya presentase protein, akan meningkatkan laju pertumbuhan dan karena itu meningkatkan jumlah lemak abdominal dan besarnya padatan lemak. Kelebihan lemak ada hubungannya dengan buruknya konversi pakan karena diperlukan lebih banyak makanan untuk menghasilkan lemak dalam bobot yang sama dibandingkan dengan menghasilkan daging (Amrullah, 2002).

Pengukuran lemak abdominal dapat digunakan sebagai indikator dari total lemak tubuh. Bobot lemak abdominal cenderung meningkat seiring dengan pertambahan umur. Pada periode ternak awal, lemak yang disimpan dalam tubuh

jumlahnya sedikit, namun pada pertumbuhan akhir proses pertumbuhan lemak akan berlangsung cepat dan lemak akan disimpan di bawah kulit, di sekitar organ dalam, antara lain empedal, usus, dan otot. Penimbunan lemak abdominal di dalam rongga perut akan berpengaruh terhadap bobot karkas (Salam dkk, 2013).

Persentase lemak abdominal karkas broiler berkisar antara 0,73% sampai 3,78%. Lemak abdominal mempunyai hubungan korelasi dengan total lemak karkas, semakin tinggi kandungan lemak abdominal maka semakin tinggi kandungan lemak karkas pada broiler (Salam dkk, 2013). Jika lemak abdominal broiler persentasinya semakin meningkat, dapat menurunkan kuantitas dan kualitas daging yang dikonsumsi dan dianggap terjadi penghamburan energi pakan broiler. Timbunan lemak abdomen pada tubuh ayam pedaging dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genetik, nutrisi, jenis kelamin, umur ayam dan faktor lingkungan (Tumuva & Teimouri 2010). Pertumbuhan dan penimbunan lemak dipengaruhi oleh komposisi ransum terutama tingkat energi dalam ransum (Maruyuni dan Wibowo, 2005).

Broiler cenderung menyimpan lemak bila penggunaan energi tidak efisien dan dalam waktu lama. Pemeliharaan broiler di daerah tropis akan menghasilkan lemak abdomen 2,85% dari bobot hidup pada umur 6 minggu. Kelebihan energi akan menghasilkan lemak, lemak disimpan dalam tubuh sehingga broiler akan terlihat gemuk, penimbunan lemak akan semakin meningkat setelah broiler memasuki fase akhir, karena setelah puncak pertambahan bobot badan di usia 4 minggu, pertambahan lemak semakin meningkat, penimbunan lemak ini akan semakin intensif kalau broiler kurang bergerak. Tinggi rendahnya kualitas karkas

broiler ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang terdapat dari broiler tersebut. Karkas yang baik harus mengandung daging yang banyak, mengandung kadar lemak yang rendah (Yuniastuti, 2002). Lu *et al.* (2007) melaporkan bahwa ayam broiler yang dipelihara pada lingkungan yang lebih panas menunjukkan bobot lemak abdomen yang lebih rendah.

G. Persentase Lemak Paha

Lipid meliputi lemak dan senyawa-senyawanya yang berkaitan. Lipid bersifat larut dalam berbagai pelarut lemak termasuk eter, kloroform dan zilene, tetapi tidak larut dalam air. Lemak paha merupakan lemak yang didapat dari lemak yang melekat didaerah sekitar paha (*femur*) (Salam dkk, 2013).

Penelitian Daud dkk, (2007), dengan $R_1 = 0,01\%$ antibiotik: $R_2 = 0,2\%$ probiotik: $R_3 = 0,2\%$ probiotik + $0,5\%$ prebiotik (daun katuk) dan $R_4 = 0,5\%$ prebiotik (daun katuk) diperoleh kadar lemak paha ayam pedaging, paling rendah ditemukan pada perlakuan R_3 (kombinasi probiotik dengan prebiotik) yaitu sebesar $2,62 \pm 0,62\%$. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kadar lemak paha pada perlakuan R_3 nyata ($P < 0,05$) lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali dengan perlakuan R_4 (prebiotik). Tidak terdapat perbedaan yang nyata, antara perlakuan R_2 dengan perlakuan R_1 . Rendahnya kadar lemak paha pada perlakuan R_3 , kemungkinan dipengaruhi oleh prebiotik itu sendiri (daun katuk). Hal ini dibuktikan dengan kadar lemak paha yang diperoleh pada ransum perlakuan yang mengandung prebiotik secara terpisah (R_4) cenderung lebih rendah ($2,91 \pm 0,24\%$) dibandingkan dengan ransum perlakuan kontrol (R_1)

sebesar $4,67 \pm 1,12$ % maupun ransum yang mengandung probiotik (R₂) $4,97 \pm 1,52$ %.

Santoso (2010), melaporkan bahwa kadar lemak paha masih tergolong normal, yaitu berkisar antara 2,62- 4,87%, sebagaimana yang dilaporkan yakni berkisar antara 1,3-7,3%. Nilai rata-rata dengan superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil yang berbeda nyata ($P < 0,05$) hal ini mengindikasikan bahwa penambahan kombinasi probiotik dengan prebiotik (R₃) baik digunakan untuk menurunkan kadar lemak hati dan kadar lemak paha ayam pedaging umur enam minggu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan Mei 2017. Bertempat di kandang unggas dan Laboratorium Ilmu Peternakan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti cutter, ember, gasolek, gelas ukur, kandang litter, lampu pijar 40 watt, tempat pakan gantung, tempat air minum manual 800 ml, talenan untuk pemeliharaan broiler, timbangan analitik, dan timbangan manual.

Bahan yang digunakan yaitu broiler umur satu hari atau *day old chick* (DOC) dengan strain cob 500 sebanyak 48 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), gula merah, tali rapia, kantong plastik dan probiotik cair (*Enterococcus faecalis* $9,8 \times 10^7$ cfu/ml).

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 4 ekor broiler sehingga terdapat 12 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P_0 = Ransum basal (Kontrol)

P_1 = Ransum basal + Probiotik cair 1 ml/liter air minum/hari ($9,8 \times 10^7$ cfu/ml)

P_2 = Ransum basal + Probiotik cair 3 ml/liter air minum/hari ($2,9 \times 10^8$ cfu/ml)

P_3 = Ransum basal + Probiotik cair 5 ml/liter air minum/hari ($4,9 \times 10^8$ cfu/ml)

2. Persiapan dan Pemeliharaan Ayam Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan ayam broiler yaitu:

a. Kandang

Sebelum DOC broiler dimasukkan ke dalam kandang, terlebih dahulu dilakukan sanitasi. Sanitasi kandang dilakukan setelah kandang dicuci dengan air dan detergen. Setelah kandang disanitasi kandang dibiarkan sampai kering kemudian ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, dan menyediakan tempat pakan dan minum. Luas unit kandang yang digunakan yakni 60 x 60 cm dengan tinggi 70 cm. Persiapan broiler dipelihara dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang menggunakan alas serbuk gergaji. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 48 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 4 ekor. Setiap sekat-sekat kandang

dilengkapi dengan lampu pijar 40 watt sebanyak 1 buah dan penambahan gasolek.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian ransum dan air minum dilakukan secara *adlibitum*. Ransum tersebut diberikan setiap hari pada ayam, dan air minumnya dicampur dengan probiotik dengan konsentrasi 1ml, 3ml, dan 5ml dari air minum yang diberikan setiap harinya mulai dari DOC sampai umur 35 hari.

Adapun bahan penyusun dan kandungan nutrisi ransum yang digunakan pada penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Bahan Penyusun Ransum Penelitian

Bahan Pakan	Komposisi (%)
Jagung	58
Polard	6
Tepung Ikan	10
Kacang Kedelai	9
Dedak	4
Bungkil kelapa	3
MBM	9
Premix	1

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian*

Kandungan Nutrisi	Jumlah
Protein (%)	20.2724
Energi Metabolisme (kkal/kg)	3026.46
Lemak Kasar (%)	6.8991
Serat Kasar (%)	3.4895
Kalsium (%)	1.6518
Posfor (%)	1.0532

Sumber: *Data Primer yang telah dihitung berdasarkan SNI (2006)*

* *Disusun berdasarkan SNI (2006)*

E. Parameter yang Diukur

Setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan penimbangan bobot karkas dan mengamati lemak abdominal serta lemak paha pada tiap objek penelitian (broiler), adapun yang diamati yaitu:

1. Persentase Berat Karkas

Persentase berat karkas diperoleh dengan cara melakukan penimbangan berat badan akhir pada akhir penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 1 ekor dari tiap unit. Ayam tersebut kemudian dipotong pada vena jugularis dan darah dikeluarkan pada posisi kaki diatas dan kepala dibawah. Setelah darah berhenti mengalir dan ayam tidak bergerak lagi, maka dilakukan perendaman dengan air panas selama 45 detik (metode *semiscalding*), sehingga bulu ayam dengan mudah dapat dicabut (Murtidjo, 2003).

Setelah bulu dicabut, bagian isi rongga perut dikeluarkan serta kepala dan kaki dipotong, karkas yang diperoleh kemudian ditimbang untuk mengetahui berat karkas.

Menurut Bundy dan Diggins (1960), persentase karkas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Berat Karkas \%} = \frac{\text{Berat Karkas (g)}}{\text{Berat Hidup (g)}} \times 100 \%$$

2. Persentase berat lemak abdominal

Persentase lemak abdominal dilakukan dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak yang berada pada sekeliling *gizzard* dan lapisan yang menempel antara otot abdomen serta usus dan selanjutnya ditimbang (Salam dkk, 2013).

Sembiring (2001), menyatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas karkas broiler ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang terdapat dari broiler tersebut, selain itu banyaknya kandungan lemak akan mempengaruhi penyusutan dari daging. Karkas yang baik harus mengandung daging yang banyak, sebagian yang dimakan harus baik, mengandung kadar lemak yang tidak tinggi.

Menurut Waskito (1981), persentase lemak abdominal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Lemak Abdominal (\%)} = \frac{\text{Berat Lemak Abdominal (g)}}{\text{Berat Karkas (g)}} \times 100 \%$$

3. Persentase berat lemak paha

Persentase lemak paha dilakukan dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak yang melekat didaerah sekitar paha (*femur*).

Menurut Waskito (1981), persentase lemak paha dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Lemak Paha (\%)} = \frac{\text{Berat Lemak Paha (g)}}{\text{Berat Karkas (g)}} \times 100 \%$$

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel dan Torrie (1991), model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian probiotik ulangan ke-j.

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P_1, P_2, P_3 (perlakuan)

j = 1,2,3,4,5 (ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup persentase karkas, persentase lemak abdominal dan persentase lemak paha pada broiler disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rataan Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Lemak Paha pada Broiler yang dipelihara selama 35 hari.

Parameter yang Diukur	Perlakuan			
	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃
Persentase karkas (%)	60.59 ^a	58.03 ^a	61.85 ^a	61.03 ^a
Persentase lemak abdominal (%)	0.77 ^a	2.63 ^a	1.76 ^a	1.22 ^a
Persentase lemak paha (%)	0.31 ^a	0.90 ^b	0.54 ^{ab}	0.20 ^a

Keterangan: Supeskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P < 0,05$).

B. Pembahasan

1. Persentase Karkas

Analisis sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 5, menunjukkan bahwa pemberian probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase karkas broiler. Rata-rata persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar 58.03 %-61.85 %. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat North and Bell (1990), yang menyatakan bahwa persentase karkas broiler yang normal berkisar antara 65-75 % dari bobot hidup, semakin berat ayam yang dipotong, maka karkasnya semakin tinggi pula.

Secara statistik probiotik tidak berpengaruh nyata pada persentase karkas namun dilihat dari setiap perlakuan (P), P₂ (61.85%) cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya, hal ini disebabkan karena level pemberian probiotik 3 ml/ liter air minum/hari ($2,9 \times 10^8$ cfu/ml) dapat meningkatkan persentase dari karkas tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronstarcki dkk.,(2007), bahwa penggunaan probiotik (*Cellulomonas* sp) dalam pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap persentase karkas, dimana dosis yang digunakan yaitu P₀ (0 ml/kg), P₁ (0,4 ml/kg), P₂ (0,8 ml/kg), P₃ (1,2 ml/kg) dan P₄ (1,6 ml/kg) pakan. Sejalannya hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemberian probiotik dalam bentuk cair maupun padat sama-sama tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase karkas.

Pengaruh yang tidak nyata pada pemberian probiotik terhadap persentase karkas ($P > 0,05$) disebabkan oleh strain tunggal (*Enterococcus faecalis*) yang digunakan. Mikroba tersebut kurang optimal dalam meningkatkan persentase karkas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daud (2006), menggunakan multi strain dengan kombinasi *Bacillus spp* dan *Lactobacillus spp* yang secara signifikan dapat meningkatkan persentase karkas broiler. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan multi strain lebih efektif dalam meningkatkan persentase karkas.

Persentase karkas yang rendah menunjukkan mekanisme kerja probiotik kurang baik, sehingga proses penyerapan makanan menjadi tidak optimal. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Candrasih dan Bidura (2001), yang menyatakan bahwa penggunaan probiotik dalam ransum meningkatkan kandungan *lysine*

analogue dan *aminoethyl cysteine* dalam saluran pencernaan yang diubah menjadi asam amino lisin dan sistein dan dapat meningkatkan retensi protein yang berperan dalam pembentukan daging.

2. Persentase Lemak Abdominal

Analisis sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 5, menunjukkan bahwa pemberian probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap persentase lemak abdominal broiler. Rata-rata persentase lemak abdominal yang diperoleh dalam penelitian (Tabel 5) masih termasuk dalam kisaran normal yaitu 0,77 %-2,63 %. Ini sejalan dengan hasil penelitian Daud (2006), bahwa persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi oleh probiotik, tetapi pada perlakuan R₂ (penambahan 0,2% probiotik) persentase lemak abdominal yang diperoleh masih dalam kisaran normal yaitu 2,36%. Hal ini sesuai dengan pendapat Salam dkk (2013), yang menyatakan bahwa persentase lemak abdominal broiler berkisar antara 0,73 %-3,78 %.

Penggunaan probiotik hingga level 5 ml/hari tidak berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal disebabkan oleh kandungan energi dan protein dalam ransum yang digunakan adalah sama, sehingga tidak terjadi kelebihan energi yang berdampak pada tidak terjadinya penimbunan lemak. Ini sesuai dengan pendapat Maruyuni dan Wibowo (2005) bahwa pertumbuhan dan penimbunan lemak dipengaruhi oleh komposisi ransum terutama tingkat energi dalam ransum.

Pengaruh yang tidak nyata pada pemberian probiotik terhadap persentase lemak abdominal ($P>0,05$) disebabkan oleh strain tunggal (*Enterococcus faecalis*) yang digunakan pada probiotik. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2015), disimpulkan bahwa pemberian probiotik Bakteri Asam Laktat (BAL) yang tersusun dari campuran strain *Lactobacillus murinus* (Ar3), *Streptococcus thermophilus* (Kd2) dan *Pediococcus acidilactici* (Kp6) dengan pemberian 10^9 Cfu/ml/ekor/hari pada ayam broiler memberi efek positif yang dapat menurunkan kandungan bobot lemak abdominal dan menurunkan persentase lemak abdominal. Didukung oleh penelitian Ebrisiantos dkk., (2012), yang menunjukkan hasil bahwa produk simbiotik yang terdiri dari campuran Bakteri Asam Laktat (BAL) *Lactobacillus salivarius* 172, *Pediococcus pentosaceus* (Db9) dan tepung *G. Lucidium* yang diberikan pada ternak ayam dapat memperbaiki kualitas dari kadar lemak. Ini menunjukkan bahwa adanya interaksi yang baik antara probiotik, sehingga lebih efektif dalam menurunkan persentase lemak abdominal tersebut.

Rendahnya persentase lemak abdominal yang dihasilkan menunjukkan bahwa kondisi perlemakan yang dihasilkan cenderung lebih baik. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lemak abdominal merupakan hasil ikutan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas. Oleh karena itu semakin rendah persentase lemak abdominal maka semakin baik karkas yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuniastuti (2002), bahwa tinggi rendahnya kualitas karkas broiler ditentukan dari jumlah lemak yang terdapat pada broiler.

3. Persentase Lemak Paha

Analisis sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 5, menunjukkan bahwa probiotik berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap persentase lemak paha broiler. Rata-rata persentase lemak paha pada penelitian ini masih tergolong normal yaitu berkisar antara 0.20 %-0.90 % sebagaimana yang dilaporkan Mounthey (1995), yakni berkisar antara 1,3-7,3 %. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daud dkk., (2007), bahwa kadar lemak paha pada perlakuan R_3 (probiotik) nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali dengan perlakuan R_4 (prebiotik).

Berdasarkan uji wilayah berganda Duncan pengaruh pemberian probiotik terhadap nilai persentase lemak paha menunjukkan bahwa perlakuan P_3 (0.20 %), P_0 (0.31 %) dan P_2 (0.54 %) tidak berbeda nyata tetapi perlakuan P_1 (0.57%) berbeda nyata dengan perlakuan P_3 (0.20 %) dan P_0 (0.31 %). Dilihat dari setiap perlakuan (P), P_3 (0.20 %) cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya, hal ini disebabkan karena zat aktif dalam probiotik dapat berpengaruh untuk menurunkan persentase lemak paha, dimana semakin tinggi level pemberian maka akan meningkatkan penyerapan nutrisi dengan baik sehingga akan mengurangi akumulasi lemak. Hal ini didukung dengan pendapat Adnan (2011), bahwa banyaknya kandungan mikroorganisme hidup dalam usus ternak dapat mempengaruhi metabolisme dalam usus, meningkatkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga produktivitas ternak lebih baik, kandungan lemaknya lebih rendah, sebab probiotik dapat meningkatkan metabolisme energi

(ME) dan *Total Digestible Nutrien* (TDN) sehingga imbangannya antara protein dan energi lebih bagus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian probiotik cair tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap persentase karkas dan persentase lemak abdominal tetapi berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap persentase lemak paha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level pemberian probiotik cair yang tepat agar diketahui konsentrasi yang optimal dalam meningkatkan persentase karkas dan menurunkan persentase lemak karkas pada broiler.

DAFTAR PUSTAKA

- Abun. 2006. *Nutrisi Ternak Unggas dan Monogastrik*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Abrar, A. dan Raudhati, E. 2006. Produktifitas Dan Aktifitas Mikroba Saluran Pencernaan Ayam Broiler Yang Diberi Probiotik. *Penelitian DIK-S*. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
- Adnan, K. 2011. *Manfaat Probiotik Bagi Peternakan Unggas dan Ruminansia (Sapi, Kambing, Domba)*. (Online). <http://dokterternak.com/2011/06/06/manfaat-probiotik-bagi-peternakan-unggas-dan-ruminansia/>. Diakses 04 November 2016.
- Afriani, H. 2002. Pengaruh Dosis Kultur Bacillus Sp dan Saccharomyces Cerevisiae Sebagai Probiotik Terhadap Performan, Kadar Lemak dan Kolesterol Karkas Ayam Broiler. *Tesis Program Pasca sarjana Universitas Pajajaran*, Bandung.
- Amrullah, I. K. 2002. *Nutrisi Ayam Broiler*. Lembaga Satu Gunung Budi KPP IPB. Baranangsiang, Bogor.
- Anggorodi, H. R. 1990. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Gramedia, Jakarta.
- Bakar, A. 2003. Mutu Karkas Ayam Hasil Pematangan Tradisional dan Penerapan Sistem Hazard Analisis Critical Control Point. *Jurnal litbang pertanian*, Bogor.
- Backman, P. A., Brannen, P. M. dan Mahaffe, W. F. 1994. Plant Respon and Disease Control Following Seed Inoculation With Bacillus Sp. Di dalam: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. *Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria. Pruc Third Int Work PGPR Souh*, Australia. .
- Barrow, P. A. 1992. *Probiotics for Chickens*. Chapman and Hall, London.
- Batrinon, A. 2010. The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria. *Thei of Athena*.
- Bidura, I.G.N.G. dan Suastina, I.G.P.B. 2002. Pengaruh Suplementasi Ragi Tape dalam Ransum Terhadap Efisiensi Penggunaan Ransum. *Majalah Ilmiah Peternakan*. Vol 5 (1): 06-11.

- Bundy, C. E. and Diggins, R. V. 1960. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs. *Poultry Production*. New Jersey, USA.
- Budiansyah, A. 2004. Pemanfaatan Probiotik Dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas. *Program Pascasarjana IPB*. Bogor.
- Cakra, I. G. L. O. 1986. Pengaruh Pemberian Hijauan Versus Top Mix Terhadap Karkas dan Bagian Tubuh Lainnya pada Ayam Pedaging. *Skripsi* Fakultas Peternakan, Denpasar.
- Candrasih, N. N. K. dan I.G.N.G. Bidura. 2001. Pengaruh Penggunaan Cangkang Kakao yang Disuplementasi Ragi Tape dalam Ransum Terhadap Penampilan Itik Bali. *Majalah Ilmiah Peternakan*. Vol 4 (3): 67-72.
- Carr E.G, Dunlap G, Horner R.H, Koegel R.L, Turnbull A.P, Sailor W. 2002. Positive Behavior Support: Evolution Of An Applied Science. *Journal of Positive Behavior Interventions*. 4:4-16.
- Cruywagen, C.W., Jordaan. and Venter. 1996. Effect of Lactobacillus acidophilus Suplementation of Milk Replacer on Preweaning Performance of Calves. *J. Dairy Science*. 79: 483-486.
- Daud, M. 2006. Persentase dan Kualitas Ayam Pedaging yang Diberi Probiotik dan Prebiotik dalam Ransum. *Jurnal Ilmu Ternak Unggas*. Vol 6 (2): 126-131.
- Daud, M., Piliang, W. G. dan Kompiang, P. 2007. Persentase dan Kualitas Karkas Ayam Pedaging yang Diberi Probiotik dan Prebiotik dalam Ransum. *JITV*. Vol 12 (3): 167-174.
- De Vos P., Garrity, Jones, Krieg, Ludwig, Rainey, Scleifer. dan Witman. 2009. *Bergey's Manual of Systematic Bacteria Second Edition*. Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York.
- Fardiaz, S. 1992. *Mikrobiologi Pangan 1*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fooks, L.J. and Ghibson, G.R. 2002. In-Vitroinvestigation of the Effect of Probiotics and Prebiotics on Selectedhuman Intestinal Pathogens. *Fems Microbiol. Ecol* 39:67-75.
- Fuller, R.1992. *Probiotics the Scientific Basis*. Chapman and Hall, London.
- Fuller, M. F. 1989. Probiotics in Man and Animal. *J. Appl. Bacteriol* 66 : 365-378
- Gaggia, F., Attarelli, M. and Iavati, B. 2010. Probiotic and Prebiotics in Animal Feeding for Safe Food Production. *Intl. J. Food Microbiol* .14: 515-528.

- Hadioetomo, R. S. 1985. *Mikrobiologi Dasar-Dasar Praktik*. Gramedia, Jakarta.
- Haroen, U. 2003. Respon Ayam Broiler yang Diberi Tepung Daun Sengon (*Albizzia Falcataria*) dalam Ransum Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Karkas. *J. Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*. Vol 6 (1): 34-41.
- Jawetz, M. dan Adelberg, S. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi 1. Salemba Medika, Jakarta. Hal 205-212.
- Jin, J. Z., Abdullah, N., Ali, M. A. dan Jalaludin S. 1998. Effect of Adherent *Lactobacillus* Cultures on Growth, Weight of Organs and Intestinal Microflora and Volatile Fatty Acids in Broiler. *Anim Feed Sci*. Vol 70 (3): 197-209.
- Jull, M.A.. 1979. *Poultry Husbandry*. Third edition. McGraw-Hill Book Company Inc. New York.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam, Jakarta.
- Kompiang, I P. 2009. Pemanfaatan Mikroorganisme Sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Produksi Ternak Unggas di Indonesia. *J. Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol 2 (3): 177-191.
- Kusnadi, R. 2008. *Jenis-jenis Tanah di Indonesia*. Available at: (Online). <http://zahiosofie.wordpress.com>. Diakses 14 Oktober 2016.
- Lee, Yuan Kun, Salminen S. 2009. Handbook of Probiotics and Prebiotics. Second Edition. *John Wiley and Sons Inc*. Hoboken New Jersey. Canada.
- Lindgren, S.E. dan W.J. Dobrogosz. 1990. Antagonistic Activities Of Lactic Acid Bacteria In Food And Fermentation FEMS Microbial. *Journal of Science*. Vol 87 : 149.
- Lopez, J. 2000. Probiotics in Animal Nutrition. Dept. De zootecnia, Universidia de Federal RGS. *Porto Alergre 9000 1-970*. Brazil.
- Lu L, Luo XG, Ji C, Liu B, Yu SX. 2007a. Effect of manganese supplementation and source on carcass traits, meat quality and lipid oxidation in broilers. *J Anim Sci*. 85:812-822.
- May, J.D. dan Lott, B. D. 2001. Relating Weight Gain and Feed: Gain of Male and Female Broilers to Rearing Temperature. *Poultry Sci*. Vol 80 (44): 581-584.

- Malago, J.J. 2011. Probiotic Bacteria and Enteric Infections-Cytoprotection by Probiotic Bacteria. *Springer*, New York.
- Medicinus. 2009. *Bakteri Probiotik Meningkatkan Imunitas Tubuh*. Bandung. Vol.22, No.3.
- Murtidjo, B.A. 2003. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyantono, 2003. Sulitnya Mencari Bibit Favorit. *Majalah Poultry Indonesia*. Hal: 25-27.
- Napitupulu, N. R. A., Kanti, T., Yuliner, Y. R., Hardiningsih. dan Julistiono, H. 1997. DNA Plasmid Lactobacillus Asal Makanan Fermentasi Tradisional yang Berpotensi dalam Pengembangan Sistem Inang Vektor untuk Bioteknologi Pangan. *Jurnal Mikrobiologi Tropis*. Hal 91-96.
- Nasin, L dan Tjetjep, S. 2008. *Yuk Beternak Ayam Pedaging dan Petelur*. PT. Puri Pustaka, Bandung.
- Nettles, C.G. and Barefoot. 1993. Biochemical and Genetic Characteristics of Bacteriocin of Food-Associated Lactic Acid Bakteria. *J. Food Prot.* Vol. 56: 338-356.
- NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th Ed. *National Academy of Science*, Washington DC.
- North, M. O. and Bell, D. D. 1990. Commercial Chicken Production Manual. 4th Edition. *Van Nostrand*. Reinhold, New York.
- Ooi, L.G. and Min-Tze. 2010. Cholesterol-Lowering Effects of Probiotics and Prebiotics: A Review of in Vivo and in Vitro Findings. *Int. J. Mol. Sci.* Vol. 11: 2499-2522.
- Osmanagaoglu, O., Kiran. and Nes. 2011. A Probiotic Bacterium, *Pediococcus pentosaceus* OZF Isolated from Human Breast Milk Produces Pediocin AcH/PA-1. *African Journal of Biotechnology*. Vol. 10 (11): 2070-2079.
- Owings, W. J., Reynolds, D.L., Hasiak, R. J. and Ferket, R. 1990. Influence of Dietary Supplementation With *Streptococcus Faecium* M-74 on Broiler Body Weight, Feed Conversion, Carcass Characteristics and Intestinal Microbial Colonization. *Poult. Sci.* Hal 1257-1264.
- Pal, A., Ray, L. and Chattopadhyay, P. 2006. Purification and Immobilization of an *Aspergillus Terreus* Xylanase: Use of continuous fluidized column reactor. *Ind. J. Biotechnol.* 5: 163–168.

- Priyatno, M. A. 2003. *Mendirikan Usaha Pemotongan Ayam*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rahmanto, 2012. Struktur Histologik Usus Halus dan Efisiensi Pakan Ayam Kampung dan Ayam Broiler. *S2 Thesis*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ritonga, H. 1992. Beberapa Cara Menghilangkan Mikroorganisme Patogen. *Majalah Ayam dan Telur*. Hal 24-26.
- Ronstarci, T., Osfar, S. dan Irfan, H. D. 2007. Pengaruh Penambahan Probiotik Selulolitik (*Cellulomonas Sp.*) dalam Pakan Terhadap Kualitas Karkas, Lemak Abdominal dan Berat Organ dalam Ayam Pedaging. *S2 Thesis*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Saarela, M., Mogensen, R., Fonde, J. Matto and Sandholm, T.M. 2000. Probiotic Bacteria: Safety, Functional and Technological Properties. *J Biotechnol*. 84(2000):197 –215.
- Salam, S., Fatahilah, A., Sunarti, D. dan Isroli. 2013. Bobot Karkas dan Lemak Abdominal Broiler yang Diberi Tepung Jintan Hitam (*Nigella Sativa*) dalam Ransum Selama Musim Panas. *Jurnal Sains Peternakan*. Vol 11 (2): 84-89.
- Samadi, 2002. *Penggunaan Probiotik Sebagai Pengganti Antibiotika dalam Pakan Ternak*. (Online). <http://www.google.co.id>. Diakses 14 Oktober 2016.
- Santoso, U. 2010. Reduction of fat Accumulation in Broiler Chicken by *Sauropus Androgynus* (katuk) leaf meal supplementation. *Asian- Aust. J. Anim. Sci.* 14: 346-350.
- Saxelin, M .1997. Lactobacillus GG – a Human Probiotic Strain with Thorough Clinical Documentation. *Food Rev Int*. Vol. 13: 293–313.
- Sembiring, H. 2001. *Komoditas Unggulan Pertanian Propinsi Sumatera Utara*. Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Sumatera Utara.
- Seifert, H.S.H. and F. Gessler. 1997. Continous oral application of probiotic *B.cereus* an alternative to prevention of enteroxamia. *Anim. Research and Develop.* 46: 30-38.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Siswono, 2002. *Kimia, Pangan dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Simon, O. 2005. *Micro-organism as feed additives probiotics*. Advances in Pork Production 16: 161–167.
- Soeharsono, 2010. *Probiotik Basis Ilmiah, Aplikasi, dan Aspek Praktis*. Widya Padjajaran, Bandung.
- Soeparno, 1994. *Ilmu Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soeparno. 2009. *Ilmu dan Teknologi Pengolahan Daging*. Edisi ke-5. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sofyan, O. 2003. Kajian Probiotik AB (*Aspergillus niger* dan *Bacillus* sp) Sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasi Efeknya Terhadap Mikroflora Usus Serta Penampilan Produksi Ayam Petelur. *Disertasi*. Program pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)*. SNI 01-3930-2006.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Finisher)*. SNI 01-3931-2006.
- Sterling, K. G., Harter, J. M., Estienne, M. J. and Mcelwain, K. V. 1998. Effect of Enzyme Addition In Pelleted Vs. Mash Barley Based Diets For Broilers. *Abstract American society of animal science northeast section*. Hal 76-81.
- Steel, R. G. D. dan Torrie, J. H. 1991. *Prinsip dan Prosedur Statistika*. PT.Gramedia, Jakarta.
- Suprijatna, E. U., Atmomarsono. dan Kartasudjana, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tensiska, 2008. *Serat Makanan*. (Online) www.pustaka.unpad.ac.id/14006/ (Diakses 03 Juli 2017).
- Tumuva E, Teimouri A. 2010. Fat deposition in the broilerchicken: A review. *Sci Agric Bohem*. 41:121-128.
- Velez, M.P. 2007. Identification and Characterization of starter Lactic Acid Bacteria and Probiotics from Columbian Dairy Products. *Journal of Applied Microbiology*, ISSN 1364-5072.
- Victoria, M.A., Carmen. and María. 2008. *Wine Chemistry and Biochemistry*. Springer.

- Waskito, W. M. 1983. Pengaruh Berbagai Faktor Lingkungan terhadap Gula Tumbuh Ayam Broiler. *Disertasi*. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Wahju, J. 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widyasti, E. 2003. Isolasi Bacillus spp. Penghasil α -Amilase Ekstraseluler dan Penentuan Suhu Serta pH Optimum Pertumbuhan. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Winedar, H., Listyawati., Sutarno, S. 2006. Daya Cerna Protein Pakan, Kandungan Protein Daging, dan Pertambahan Berat Badan Ayam Broiler Setelah Pemberian Pakan yang Difermentasi dengan Effective Microorganism-4 (EM-4). *Jurnal Bioteknologi*. Vol 3 (1): 14-19.
- Wong, P. T. W. 1994. *Bio-Control of Wheat Take-All In The Field Using Soil Bacteria and Fungi*. Di dalam: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. *Improving Plant Productivity With Rhizosphere Bacteria*. Pruc Third Int Work PGPR Souh, Australia.
- Yuniastuti, A. 2002. Efek Pakan Berserat pada Ransum Ayam Terhadap Kadar Lemak dan Kolesterol Daging Broiler. *JITV*. Vol 9 (3) : 175 - 183.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Persentase Karkas, Persentase Lemak Abdominal, dan Persentase Lemak Paha pada Broiler.

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
persentase_karkas 0	3	60.5900	2.79118	1.61149	53.6563	67.5237	58.86	63.81
1	3	58.0267	1.81814	1.04970	53.5102	62.5432	56.53	60.05
2	3	61.8500	3.81422	2.20214	52.3749	71.3251	58.46	65.98
3	3	61.0333	3.73404	2.15585	51.7575	70.3092	57.06	64.47
Total	12	60.3750	3.07017	.88628	58.4243	62.3257	56.53	65.98
persentase lemak abdominal 0	3	.7700	.27731	.16010	.0811	1.4589	.60	1.09
1	3	2.6233	2.21676	1.27985	-2.8834	8.1301	.55	4.96
2	3	1.7533	.29956	.17295	1.0092	2.4975	1.42	2.00
3	3	1.2233	.98185	.56687	-1.2157	3.6624	.40	2.31
Total	12	1.5925	1.27184	.36715	.7844	2.4006	.40	4.96
persentase lemak paha 0	3	.3133	.11846	.06839	.0191	.6076	.24	.45
1	3	.9000	.35679	.20599	.0137	1.7863	.49	1.14
2	3	.5400	.18520	.10693	.0799	1.0001	.33	.68
3	3	.2000	.08660	.05000	-.0151	.4151	.15	.30
Total	12	.4883	.33357	.09629	.2764	.7003	.15	1.14

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
persentase_karkas	Between Groups	24.510	3	8.170	.826	.516
	Within Groups	79.175	8	9.897		
	Total	103.685	11			
persentase lemak abdominal	Between Groups	5.704	3	1.901	1.258	.352
	Within Groups	12.089	8	1.511		
	Total	17.793	11			
persentase lemak paha	Between Groups	.858	3	.286	6.245	.017
	Within Groups	.366	8	.046		
	Total	1.224	11			

Persentase_karkas

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	
1	3	58.0267	
0	3	60.5900	
3	3	61.0333	
2	3	61.8500	
Sig.		.199	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Persentase lemak abdominal

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	
0	3	.7700	
3	3	1.2233	
2	3	1.7533	
1	3	2.6233	
Sig.		.121	



Means for groups in homogeneous subsets are displayed.


Persentase lemak paha

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
3	3	.2000	
0	3	.3133	
2	3	.5400	.5400
1	3		.9000
Sig.		.099	.073

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.



Ket: Proses Pembuatan Kandang



Ket. Probiotik yang digunakan.



Ket: Pencampuran Probiotik dengan Air Minum.



Ket: Proses Vaksinasi



Ket: Penimbangan Karkas.



Ket: Pemisahan Lemak Abdominal dan Lemak Paha.



Ket: Penimbangan Lemak.

RIWAYAT HIDUP



Andi Tenri Ikasari dilahirkan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Dusun Rea Timur, Desa Rea Kecamatan Binuang pada tanggal 07 Januari 1996. Penulis adalah anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Abdullah dan Andi Hikmah. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu di TK RA DDI Raudhatul Athfal, masuk pada tahun 2000 dan tamat di tahun 2001, kemudian masuk di Sekolah Dasar Min Polewali pada tahun 2001 dan tamat di tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Polewali masuk pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2010. Kemudian Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK-PP Negeri Rea Timur masuk pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) pada Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Peternakan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.