

**PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP KETIDAK KAMBUHAN  
REMATIK PADA LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA  
WERDHA GAU MABAJI KAB.GOWA  
DI SULAWESI SELATAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan**

**OLEH**

**MARDEWI RASYID**  
**NIM 70300107062**

**PRODI KEPERAWATAN**

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2011**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Olahraga Terhadap Ketidak Kambuhan Rematik Pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Sulawesi Selatan ” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Qadir Gassing. HT, MA, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M. Ag, selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
3. Nur Hidayah, S. Kep, Ns, M. Kes, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Hasniati S. Kep, M. Kep, selaku pembimbing utama yang ditengah kesibukan beliau telah memberikan pengarahan, saran, kritik dan bimbingan mulai dari persiapan proposal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
5. Hastuti, S.Kep, Ns, M. Kes, selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan bimbingan dan saran sampai skripsi ini diselesaikan.

6. Muh. Anwar Hafid, S. Kep, Ns, M. Kes, selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Dr. Nur Hidayat, M. Said, M. Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mulai dari semester I sampai semester VIII pada Program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
9. Pimpinan Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin penelitian di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Abdul Rasyid dan Ibu Hj. Dadima yang dengan penuh kasih sayang memberikan perhatian yang penuh, memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dengan sebuah harapan agar penulis dan keluarga lebih baik kehidupannya kelak dari mereka. Insya Allah penulis akan mengabulkannya.
11. Kepada saudaraku Abdullah Rasyid, S. kom dan saudariku Reskia Rasyid, S. Pd. atas segala doa, perhatian dan dorongan moril serta seruluh keluarga yang tercinta atas segala doa, perhatian dan dorongan baik moril maupun materil.
12. Kepada saudari risma, sophi, novi, kak fina, niar, deli dan teman-teman KKN dan rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi UIN Alauddin Makassar serta semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Meskipun terakhir penulis sebutkan kepada kakandaku Aswar yang telah dengan sabar membantuku dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan selama penyusunan Skripsi ini mendapat imbalan dan ridho dari Allah SWT, Amin.

Makassar, Agustus 2011

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Usia Lanjut .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Olahraga .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Rematik .....	27
<b>BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Dasar Pemikiran Variabel .....	48
B. Kerangka Konseptual .....	48
C. Hipotesis .....	49
D. Kerangka Kerja .....	50
<b>BAB IV : METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Populasi Dan Sampel .....	53
D. Pengumpulan Data .....	55

E. Etika penelitian	.....	56
F. Analisa Data	.....	56
G. Keterbatasan	.....	57

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	.....	58
B. Pembahasan	.....	64

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan	.....	72
B. Saran	.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 5.1 Distribusi Responden Penderita Rematik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2011
- Tabel 5.2 Distribusi Responden Penderita Rematik Berdasarkan yang Dilakukan di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2011
- Tabel 5.3 Distribusi Responden Penderita Rematik Pada Kelompok Perlakuan Berdasarkan Kekambuhan Setelah Melakukan Kegiatan olahraga di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2011
- Tabel 5.4 Distribusi Responden Penderita Rematik Berdasarkan Ketidak Kambuhan Setelah Melakukan Kegiatan Olahraga di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2011
- Tabel 5.5 Penagruh Olahraga Terhadap Ketidak Kambuhan Rematik Pada Lanjut Usia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2011

## ABSTRAK

**Nama** : MARDEWI RASYID  
**Nim** : 70300107062  
**Judul** : **PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP KETIDAK KAMBUAHN  
REMATIK PADA LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA  
WERDHA GAU MABAJI KABUPATEN GOWA SULAWESI  
SWLATAN**

---

Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami masalah kesehatan. Perubahan tubuh yang terjadi pada lanjut usia tampak pula pada semua sistem muskuloskeletal dan jaringan lain yang ada kaitannya dengan kemungkinan timbulnya berbagai penyakit yang terjadi pada usia lanjut salah satu contohnya adalah reumatik.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode desain *quasy- experiment desain*. dengan teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dengan cara *Purposive Sampling*. Pengumpulan data diperoleh melalui pengisian kuesioner dengan alat yaitu observasi dan cara ukurnya secara ordinal. Teknik analisa data yang digunakan secara univariat dan bivariat.

Dari penelitian yang dilaksanakan dengan jumlah responden 20 orang diperoleh hasil: Responden yang berolahraga, 2 orang (20%) yang mengalami kekambuhan rematik karena tidak berolahraga dengan baik dan 8 orang (80%) yang tidak mengalami kekambuhan rematik. Dan responden yang tidak berolahraga, 8 orang (80%) yang mengalami kekambuhan rematik dan 2 orang (20%) yang tidak mengalami kekambuhan rematik karena rajin berobat.

Hasil penelitian yang diperoleh  $P= 0,000$  dengan penilaian uji T- tes dengan tingkat kebermaknaan 0,05 dengan ketentuan hubungan dikatakan bermakna bila  $P \text{ value} < 0,05$  dan hubungan dikatakan tidak bermakna bila  $P \text{ value} > 0,05$  untuk melihat pengaruh olahraga terhadap ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia, dan hasil yang diperoleh  $P 0,000 < 0,05$ , maka hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh olahraga terhadap ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia. Dimana hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi, responden, profesi keperawatan dan peneliti sendiri.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup warga Negara Indonesia merupakan salah satu tujuan dari keberhasilan pembangunan nasional. Bukti dari keberhasilan pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan adalah meningkatnya usia harapan hidup ( UHH ) yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia dari tahun ketahun.( Abbas, 2009 )

Berdasarkan data dari direktorat pelayanan sosial lanjut usia Departemen Sosial RI, maka pada tahun 1990 menjadi 59,8 tahun, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 64,5 tahun. Pada tahun 2020 usia harapan hidup diperkirakan menjadi 71,1 tahun (Abbas, 2009)

Meningkatnya jumlah lansia juga diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan lansia dengan segala kondisi, karakteristik dan kebutuhannya baik dalam keluarga maupun masyarakat yang tentunya diperlukan upaya- upaya untuk mengatasinya.( Abbas, 2009)

Menurut Bustan (1997), Penyakit atau gangguan yang menonjol pada kelompok lansia adalah:

1. Gangguan pembuluh darah (dari hipertensi sampai stroke)
2. Gangguan metabolik (Diabetes Mellitus)
3. Gangguan persendian (arthritis dan terjatuh)
4. Gangguan psikososial (kurang penyesuaian diri dan merasa tidak berfungsi).

Mengingat pada lansia rentang akan berbagai penyakit, maka itu kita sebagai seorang anak yang memiliki orang tua yang bahkan sudah memasuki usia lanjut, untuk itu kita sebagai anak haruslah merawat orang tua kita sebagaimana mereka telah merawat kita sejak dari kecil sampai kita dewasa. Ada setumpuk bukti, bahwa berbakti kepada kedua orang tua –dalam wacana Islam- adalah persoalan utama, dalam jejeran hukum-hukum yang terkait dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Allah SWT sudah cukup menegaskan wacana ‘berbakti’ itu, dalam banyak firman-Nya, demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya, dengan memberikan ‘bingkai-bingkai’ khusus, agar dapat diperhatikan secara lebih saksama. Di antara tumpukan bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT menggandengkan’ antara perintah untuk beribadah kepada-Nya, dengan perintah berbuat baik kepada orang tua:
2. Allah SWT memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik kepada orang tuanya, meskipun mereka kafir
3. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad.
4. Taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk Surga.
5. Keridhaan Allah SWT berada di balik keridhaan orang tua.
6. Berbakti kepada kedua orang tua membantu meraih pengampunan dosa.

Dengan demikian merugilah para anak yang hidup bersama orang tuanya di saat tua renta namun ia tidak bisa meraih surga, karena tidak bisa berbakti kepada keduanya. Rasulullah SAW mengatakan tentang ihwal mereka

سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 رَغِمَ وَأَسْلَفَهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَقْبِقُهُ مَن يَأْرَسُولَ اللَّهِ قَالَ «  
 مَن أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَاهُمَا وَلِيَهُمَا مَتَى خَلَا لِدُجَنَّةِ».

“Dari Suhaili, dari ayahnya dan dari Abu Hurairah. Rosulullah SAW bersabda :”Merugilah ia (sampai 3 kali). Para Shahabat bertanya : ”siapa ya Rosulullah?Rosulullah SAW bersabda :“*Merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta, namun ia tidak masuk surga*” (HR. Muslim).

Terkait cara berbakti kepada orang tua, memulai dengan perkataan yang baik. Kemudian diiringi dengan meringankan apa-apa yang menjadi bebannya. Dan bakti yang tertinggi yang tak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu ialah Doa. Do'a adalah bentuk bakti anak kepada orang tua seumur hidup-nya. Do'alah satu-satunya cara yang diajarkan Rasulullah SAW bagi anak-anak yang pernah menyakiti orangtuanya namun mereka meninggal sebelum ia memohon maaf kepadanya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda :“*Bahwasanya akan ada seorang hamba pada hari kiamat nanti yang diangkat derajatnya, kemudian ia berkata “Wahai tuhanku dari mana aku mendapatkan (derajat yang tinggi) ini??. Maka dikatakanlah kepadanya “Ini adalah dari istighfar (doa ampunan) anakamu untukmu”*” (HR.Baihaqi)

Dari hasil studi tentang kondisi sosial ekonomi dan kesehatan lanjut usia (Lansia) yang dilaksanakan Komnas Lansia di 10 propinsi tahun 2006, diketahui bahwa penyakit terbanyak yang diderita Lansia adalah penyakit sendi (52,3%), hipertensi (38,8%), anemia (30,7%) dan katarak (23 %). Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab utama disabilitas pada lansia.(Hariani, 2007)

Maka melihat hasil studi tentang kondisi sosial ekonomi penyakit terbanyak adalah penyakit rematik. Rematik merupakan istilah penyakit yang sering

digunakan untuk mengungkapkan nyeri, ngilu, serta kekakuan otot. Penyakit yang sering dihubungkan dengan usia lanjut ini dapat menyerang siapapun tanpa mengenal status sosial, maupun jenis kelamin. Gejala umumnya diikuti dengan kekakuan pada sendi sehingga menjadi sulit digerakkan dan bahkan dapat pula terjadi perubahan bentuk sendi (deformitas), peradangan, sendi berwarna kemerahan, bengkak, bahkan hingga demam. Rematik bukan penyakit yang mematikan, tetapi perlu diwaspadai. Selain mengganggu aktivitas dan produktifitas, dapat cacat tubuh tertentu. selain itu, dalam kondisi yang lebih parah lagi, rematik dapat menyerang organ vital dan mengakibatkan komplikasi pada ginjal, jantung dan kelumpuhan.

Penyakit ini banyak sekali ragamnya, mencapai lebih dari 100 jenis.. Dengan adanya tingkat sensitivitas yang berbeda antara individu, tak jarang pula ada penderita rematik yang tidak merasakan gejala awal rematik, namun langsung merasakan sakit yang luar biasa saat harus menggerakkan sendi. ( H Panji Irawan, 2011)

Dari hasil studi sosial dan ekonomi terdapat 52,3% penderita rematik dan 28,4% dari penderita rematik tersebut takut untuk berolahraga. Padahal, olahraga sangat bermanfaat untuk melatih otot dan persendian. Berjalan kaki, berolahraga ringan, atau mengerjakan pekerjaan rumah ringan dapat membantu melatih otot dan sendi agar tidak semakin kaku. Namun, jangan melakukan olahraga yang terlalu berat karena justru dapat menyebabkan cedera. ( H Panji Irawan, 2011)

Dikatakan oleh ahli ortopedi dari Rumah Sakit Premier Omni Alam Sutera Tangerang, dr Albert Gandakusuma SpOT bahwa olahraga yang tepat untuk penderita rematik adalah berjalan kaki dan berenang. Tapi, olahraga untuk penderita rematik sebenarnya berbeda pada masing-masing keluhan yang dialami oleh tiap penderita.

Berolahraga ringan dan teratur kadang sulit dijalani oleh penderita rematik. Namun, jika kita melakukan olahraga dan berlatih secara rutin setiap hari selama 20 sampai 30 menit perhari dan menjaga berat badan ideal menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi nyeri di sendi lutut. ( H Panji Irawan, 2011).

Terdapat tiga jenis latihan yang dapat dilakukan dan terbukti aman untuk penderita rematik, yaitu pemanasan yang dilakukan pada pagi hari selama 10- 30 menit, penguatan, dan penyejukan berupa latihan pendinginan atau latihan aerobik, meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Latihan ini meliputi kegiatan seperti berjalan, berenang, bersepeda, atau menggunakan treadmill. Perlu diketahui bahwa olahraga ringan seperti jalan kaki bermanfaat untuk penderita rematik karena asam urat. Hal tersebut dikarenakan, jalan kaki dapat membakar kalori, memperkuat otot, dan membangun tulang yang kuat tanpa mengganggu persendian yang sakit. ( H Panji Irawan, 2011).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada kelompok lansia dipanti sosial trisna werdha Gau Mabaji Kab. Gowa memiliki kapasitas pelayanan sosial sebanyak 100 klien program regular dan 20 klien program subsidi silang. Jumlah penerima manfaat pelayanan sosial lanjut usia dari tahun 1968 sampai dengan tahun

2008 sebanyak 587 klien. Dan informasi yang didapat 10% lansia memeriksakan diri ke poliklinik dengan keluhan nyeri sendi dan ada pula lansia yang tidak memeriksakan diri walaupun memiliki keluhan yang sama karena mereka berfikir itu merupakan hal yang biasa terjadi pada lansia dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada dirinya. Dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lansia dipanti sosial tresna werdha, kegiatan olah raga yang paling menonjol dari kegiatan yang lainnya karena mengingat olah raga dapat mempertahankan kestabilan tubuh pada lansia, dan olah raga yang sering dilakukan adalah jalan kaki dipagi hari diatas batu kerikil yang telah disediakan, senam lansia yang dilakukan setiap hari jumat dan masih banyak lagi kegiatan olah raga yang dilakukan pada hari-hari tertentu. (Abbas, 2009).

Maka dari itu melihat fenomena yang terjadi pada lansia terutama penyakit yang mereka derita maka penulis mengangkat judul dan akan melakukan penelitian tentang :” Pengaruh Kegiatan Olah Raga Terhadap Ketidak kambuhan Rematik Pada Lansia Dipanti Sosial Trisna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan bahwa Bagaimana kegiatan olah raga berpengaruh terhadap ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia di panti sosial tresna werdha Gau Mabaji Kab. Gowa ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan umum**

Mengidentifikasi kegiatan olahraga pada lansia dan mengetahui pengaruh kegiatan olahraga terhadap ketidakambuhan rematik pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa

## 2. Tujuan khusus

- a) Di ketahuinya kekambuhan rematik pada lansia di panti sosial tresna werdha gau mabaji kab. Gowa setelah melakukan olahraga.
- b) Di ketahuinya ketidakambuhan rematik pada lansia di panti sosial tresna werdha gau mabaji kab. Gowa, setelah melakukan olahraga.

## D. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengembangkan penelitian tentang kejadian rematik pada lanjut usia.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lanjut usia untuk mengatasi penyakit rematik
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pra lansia untuk mempersiapkan diri sebelum masa lanjut usia tiba agar mereka bisa mengatasi masalah di usia lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. TINJAUAN UMUM TENTANG LANJUT USIA**

##### **A. PENGERTIAN MENUA**

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa, tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara psikologis maupun biologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut yang memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional.(Nugroho, 2008)

Menurut undang-undang kesehatan tahun 1992 pasal 10 ayat 1 “ Manusia usia lanjut( Growing old ) adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik , sikap, perubahan akan mengalami pengaruh pada keseluruhan aspek kehidupan termasuk kesehatan.

WHO dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur- angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan



proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.(Nugroho, 2008)

Dalam *buku ajar Geriatrik*, Prof. Dr. R. Boedhi Darmojo dan Dr. H. Hadi Martono ( 1994) mengatakan bahwa “ Menua “( menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/ mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas ( termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia secara perlahan mengalami kemunduran struktur dan fungsi organ. Kondisi ini dapat memengaruhi kemandirian dan kesehatan lanjut usia, termasuk kehidupan seksualnya.(Nugroho, 2008)

## **B. BATASAN – BATASAN LANJUT USIA**

Mengenai kapanakah orang disebut lanjut usia, sulit dijawab secara memuaskan. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai batasan-batasan umur ( Nugroho, 2000)

### **1. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia**

Lanjut usia meliputi : usia pertengahan ( middle age) kelompok usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia ( elderly old) antara 60 dan 74 tahun, lanjut usia tua ( old) antara 75 dan 90 tahun, uisa sangat tua ( very old) diatas 90 tahun.

### **2. Menurut Sumiati Ahmad Mohammad**

Membagi periodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut :  
usia – 0-1 tahun masa bayi, usia 1- 6 tahun masa prasekolah, usia 6- 10 tahun masa sekolah, usia 10- 20 tahun masa puberitas, usia 40- 65 tahun masa setengah umur ( prasenium), usia 65 tahun keatas masa lanjut usia ( senium).

### 3. Menurut Jos Masdani ( Psikolog UI )

Mengatakan lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa. Kedewasaan dapat dibagi menjadi empat bagian. Pertama fase iuventus antara 25- 40 tahun, kedua fase vertilisasi antara 40- 50 tahun, ketiga fase prasenium antara 55 dan 65 tahun, dan keempat fase senium antara 65 tahun hingga tutup usia.

### 4. Menurut Koesoemato Setyonegoro

Pengelompokkan lanjut usia sebagai berikut : usia dewasa muda ( elderly adulthood) 18 atau 20- 25, usia dewasa penuh ( middle years) atau maturisasi 25- 65 tahun, lanjut usia ( geriatric age) lebih dari 65 tahun atau 70 tahun,terbagi untuk umur 70- 75 tahun ( young old), 75- 80 tahun ( old), dan lebih dari 80 tahun ( very old)

### 5. Menurut Departemen Kesehatan

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program kesehatan lanjut usia yaitu : kelompok pertengahan umur, kelompok usia dalam masa vertilisasi yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa ( 45- 54 tahun). Kelompok usia lanjut dini, kelompok dalam masa prasenium yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut ( 55- 64 tahun). Kelompok usia lanjut, kelompok dalam masa senium ( 65 tahun keatas)

kelompok usia dengan resiko tinggi yaitu kelompok yang berusia 70 tahun / kelompok usia yang menderita penyakit berat / cacat ( Notoatmojo, s. 2007).

## **C. MASALAH DAN PENYAKIT PADA LANJUT USIA**

### **1. Masalah fisik umum**

#### **a. Mudah jatuh**

Jatuh pada lanjut usia merupakan masalah yang sering terjadi. Penyebabnya multi- faktor. Banyak yang berperan didalamnya, baik faktor intrinsik maupun dari luar lanjut usia. Misalnya gangguan gaya berjalan, kelemahan ekstremitas bawah, kekakuan sendi, dan sinkope atau pusing. Untuk factor ekstrinsik misalnya lantai yang licin dan tidak rata, tersandung benda, penglihatan yang kurang karena cahaya yang kurang terang. Memang tidak dapat dibantah, bila seseorang bertambah tua kemampuan fisik atau mentalnya pun perlahan, tetapi pasti menurun. Akibatnya, aktivitas hidupnya akan terpengaruh, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi ketegapan dan kesigapan seseorang.

Apakah sebenarnya jatuh itu ? menurut Reuben dalam buku Ajar Geriatri bahwa Jatuh adalah suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata yang melihat kejadian yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring/ terduduk dilantai atau ditempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka. (Nugroho, 2008)

#### **b. Mudah lelah**

Hal ini dapat disebabkan oleh:

- 1) Faktor psikologis ( perasaan bosan, keletihan, atau depresi )
- 2) Gangguan organis, misalnya :
  - a) Anemia
  - b) Kekurangan vitamin
  - c) Perubahan pada tulang ( osteomalasia)
  - d) Gangguan pencernaan.
  - e) Kelainan metabolisme ( diabetes melitus, hipertiroid)
  - f) Gangguan ginjal dengan uremia
  - g) Gangguan faal hati
  - h) Gangguan system peredaran darah dan jantung.
- 3) Pengaruh obat, misalnya obat penenang, obat jantung dan obat yang melelahkan daya kerja otot.(Nugroho, 2008)

### **c. Gangguan Kardiovaskular**

#### **1. Nyeri dada**

Nyeri dada dapat disebabkan oleh :

1. Penyakit jantung koroner yang dapat menyebabkan iskemia jantung ( berkurangnya darah ke jantung).
2. Aneurisme aorta
3. Radang selaput jantung ( perikarditis)
4. Gangguan pada system alat pernapasan, misalnya, emboli paru dan gangguan pada saluran pencernaan bagian atas.(Nugroho, 2008)

#### **2. Sesak napas pada kerja fisik**

Sesak napas pada kerja fisik dapat disebabkan oleh kelemahan jantung, gangguan system saluran napas, berat badan berlebihan, anemia.

### **3. Palpitasi**

Palpitasi dapat disebabkan oleh :

1. Gangguan irama jantung.
2. Keadaan umum badan yang lemah karena penyakit kronis
3. Faktor psikologis dan lain- lain.

### **d. Edema kaki**

Edema kaki dapat disebabkan oleh :

1. Kaki yang lama digantung
2. Gagal jantung
3. Bendungan pada vena bagian bawah
4. Kekurangan vitamin B<sub>1</sub>
5. Gangguan penyakit hati
6. Penyakit ginjal
7. Kelumpuhan pada kaki yang tidak aktif.

### **e. Nyeri atau ketidaknyamanan**

#### **1. Nyeri pinggang atau punggung**

Nyeri dibagian ini dapat disebabkan oleh :

1. Gangguan sendi atau susunan sendi pada susunan tulang belakang ( osteoporosis, osteomalasia, dan osteoartrosis).
2. Gangguan pancreas

3. Kelainan ginjal ( batu ginjal )
4. Gangguan pada rahim
5. Gangguan pada kelenjar prostat
6. Gangguan pada otot badan

## **2. Nyeri sendi pinggul**

1. Gangguan sendi pinggul, misalnya radang sendi ( artritis), sendi tulang yang keropos ( osteoporosis)
2. Kelainan tulang sendi, misalnya patah tulang( fraktur), dislokasi.
3. Akibat kelainan pada saraf punggung bagian bawah yang terjepit.

## **f. Keluhan pusing**

1. Gangguan lokal, misalnya vaskular, migraine, mata ( glaucoma atau tekanan dalam bola mata yang meninggi), kepala, sinusitis, furunkel, sakit gigi dan lain- lain.
2. Penyakit sistemik yang menyebabkan hipoglikemia
3. Psikologis ( perasaan cemas, depresi, kurang tidur, kekacauan pikiran, dan lain- lain).

## **g. Kesemutan pada anggota badan**

Keluhan ini dapat disebabkan oleh

1. Gangguan sirkulasi darah lokal
2. Gangguan persarafan umum
3. Gangguan persarafan lokal pada bagian anggota badan.

#### **h. Berat badan menurun**

1. Pada umumnya, nafsu makan menurun karena kurang adanya gairah hidup atau kelesuan.
2. Adanya penyakit kronis
3. Gangguan pada saluran pencernaan sehingga penyerapan makanan terganggu
4. Faktor sosio- ekonomis ( pensiun)(Nugroho, 2008)

Beruntung baik kepada kedua orang tua hukum wajib, baik waktu kita masih kecil, remaja atau sudah menikah dan sudah mempunyai anak bahkan saat kita sudah mempunyai cucu. Ketika kedua orang tua kita masih muda atau sudah lanjut usia bahkan pikun kita tetap wajib berbakti kepada keduanya. Bahkan lebih ditekankan lagi apabila kedua orang tua sudah tua dan lemah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 23 dan 24 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
KARANGMUNING

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: (23). dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[850].(24). dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan

*penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*

Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman bahwa Rabb (Allah) telah memerintahkan kepada manusia agar tidak beribadah melainkan kepada Allah saja. Kemudian hendaklah manusia beruntung sebaik-baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah seorang atau kedua-dua ada di sisi dalam usia lanjut maka jangan katakan kepada kedua perkataan 'uh' serta tidak boleh membentak keduanya, memukulkan tangan, menghentakkan kaki karena hal itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dan katakanlah kepada kedua dengan perkataan yang mulia.(mustahir. 2007)

- 1) Pada ayat ini Allah mengatakan 'kibara', kibar atau kibarussin arti berusia lanjut, sedangkan 'indaka' berarti pemeliharaan yaitu suatu kalimat yang menggambarkan makna tempat berlindung dan berteduh pada saat masa tua, lemah dan tidak berdaya. Imam Al-Qurthubi dalam tafsir menjelaskan tentang lebih ditekankan beruntung baik pada kedua orang tua pada usia lanjut karena : Keadaan usia lanjut ialah keadaan dimana kedua membutuhkan perlakuan yang lebih baik karena keadaan pada saat itu sangat lemah.
- 2) Semakin tua usia orang tua berarti semakin lama orang tua bersama anak. Hal ini dapat menyebabkan 'Si Anak' merasa berat sehingga dikhawatirkan akan berkurang beruntung baiknya, karena segala sesuatu diurus oleh anak dan keluarlah perkataan 'ah' atau membentak atau dengan ucapan, "Orang tua ini menyusahkan", atau yang lain. Apalagi apabila orang tua sudah pikun, akan memuntuk anak mudah marah atau benci kepadanya. Oleh karena itu Allah SWT berwasiat agar manusia selalu ingat untuk berbakti kepada kedua orang tua.



Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang rugi seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua pada waktu orang tua masih berada di sisi kita. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yaitu :“Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tua berusia lanjut, salah satu atau keduanya, tetapi (dengan itu) dia tidak masuk syurga” [Hadits Riwayat Muslim 2551, Ahmad 2:254, 346] Kemudian hadits berikut ini :“Artinya : Nabi SAW naik ke atas mimbar kemudian berkata, “Amin, amin, amin”. Para sahabat bertanya. “Kenapa engkau berkata ‘Amin, amin, amin, Ya Rasulullah?’” Nabi SAW, “Telah datang malaikat Jibril dan ia berkata : ‘Hai Muhammad celaka seseorang yang jika disebut nama engkau namun dia tidak bershalawat kepadamu dan katakanlah amin!’ maka kukatakan, ‘Amin’, kemudian Jibril berkata lagi, ‘Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadhan tetapi keluar dari bulan Ramadhan tidak diampuni dosa oleh Allah dan katakanlah amin!’, maka aku berkata : ‘Amin’. Kemudian Nabi SAW berkata lagi. ‘Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tua atau salah seorang dari kedua masih hidup tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga dan katakanlah amin!’ maka kukatakan, ‘Amin”. [Hadits Riwayat Bazzar dalam Majma’uz Zawaid 10/1675-166, Hakim 4/153 dishahihkan dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Ka’ab bin Ujrah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 644 [Shahih Al-Adabul Mufrad No. 500 dari Jabir bin Abdillah]

Pada umum seorang anak merasa berat dan malas memberi nafkah dan mengurus kedua orang tua yg masih berusia lanjut. Namun Rasulullah SAW

menjelaskan bahwa keberadaan kedua orang tua yang berusia lanjut itu ialah kesempatan paling baik untuk mendapatkan pahala dari Allah, dimudahkan rizki dan jembatan emas menuju surga. Karena itu sungguh rugi jika seorang anak menyalahgunakan kesempatan yang paling berharga ini dengan mengabaikan hak-hak orang tua dan dengan sebab itu dia tidak masuk surga.(mustahir, 2007)

## 2. TINJAUAN UMUM TENTANG OLAH RAGA

Salah satu ciri kehidupan adalah gerak. Dan gerak adalah kehidupan itu sendiri. Namun, rutinitas kerja acapkali membuat kita tidak bergerak lain selain gerak dipekerjaan yang kita geluti. Duduk terkurung dimeja kerja dalam ruangan ber AC selama 48 jam seminggu, minim gerakan tubuh yang berarti dan cenderung tegang seiring ketegangan otak yang dipacu berpikir. Dalam keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi tiba-tiba kita terserang kram otot, nyeri sendi, berkunang-kunang, dan mendadak sangat lunglai kehilangan tenaga ditengah-tengah aktivitas rutin. Suatu tanda bahwa tubuh kekurangan oksigen yang mengangkut darah ke otak dan untuk bersikulasi keseluruh jaringan tubuh.( Olivia, 2004)

Bugar berarti tubuh berada dalam kondisi puncak, dari setiap aspek. Sebaliknya, bila kita kurang bugar dan kekurangan energi, sekedar berdiri saja dapat merupakan kegiatan yang melelahkan. Dalam keadaan bugar, berarti kita bebas beraktualisasi, bebas bergerak, dan bisa menjadi yang kita kehendaki dari segi fisik, mental, dan spiritual.( Olivia, 2004)

Dalam kaitannya menjadi bugar, olahraga memegang peranan penting dan selalu banyak manfaatnya,. Bila kita merasa lebih baik setelah berolahraga, kita pun

akan terlihat lebih baik dan akan berfungsi lebih efisien sehingga akan menghasilkan kepercayaan diri lebih besar. ( Olivia, 2004)

Kebugaran juga berkaitan dengan hal- hal berikut :

- Tubuh kita kuat,
- Memungkinkan tumbuhnya jiwa yang sehat,
- Meningkatkan sistem pertahanan dan kekebalan kita. Dengan sendirinya berkemampuan menangkal berbagai penyakit,
- Mempertahankan kelenturan, daya tahan dan kekuatan yang selanjutnya akan mendorong kita tetap aktif dengan mobilitasi tinggi.
- Mengurangi dan menghindari stres.
- Terlihat lebih baik, merasa lebih baik, dan berpikir lebih baik.( Olivia, 2004).

Hal yang perlu diperhatikan tubuh kita terdiri atas 70 % kandungan air makanya tubuh kita harus tetap dijaga agar tidak kekurangan cairan tubuh karena pada saat kita kekurangan cairan tubuh maka tubuh kita akan terasa lemas, berkunang- kunang dan kehilangan tenaga.( Olivia, 2004)

Olah raga dapat menumbuhkan fisik dan mengembangkan kemampuan untuk mengemban sulitnya pekerjaan. Aktifitas ini juga telah menjadikan kita dapat mengisi kekosongan waktu dengan hal yang bermanfaat, juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam jiwa kita untuk berani dan maju. Nilai inilah yang akan selalu mendidik kita untuk fastabiqul khoiroot.

#### **A. Olahraga yang aman untuk penderita rematik.**

Berolahraga ringan dan teratur kadang sulit dijalani oleh penderita rematik. Padahal, olahraga menjadi salah satu cara terbaik yang dilakukan untuk menjaga sendi agar tetap dalam keadaan sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas. Berjalan kaki, berolahraga ringan, atau mengerjakan pekerjaan rumah ringan dapat membantu melatih otot dan sendi agar tidak semakin kaku. Namun, jangan melakukan olahraga yang terlalu berat karena justru dapat menyebabkan cedera. (H Panji irawan, 2011)

Memang tidak sedikit orang yang berpikir bahwa olahraga dapat memperburuk sendi bagi penderita rematik. Padahal, sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga membantu mengurangi rasa sakit, kelelahan, meningkatkan fleksibilitas gerak dan kekuatan, serta membuat rematik lebih baik. (H Panji irawan, 2011)

Dikatakan oleh ahli ortopedi dari Rumah Sakit Premier Omni Alam Sutera Tangerang, dr Albert Gandakusuma SpOT bahwa olahraga yang tepat untuk penderita rematik sebenarnya berbeda pada masing-masing keluhan yang dialaminya. (H Panji irawan)

Terdapat tiga jenis latihan yang dapat dilakukan dan terbukti aman untuk penderita rematik, yaitu:

1. pemanasan, penguatan, dan penyejukan. Pemanasan adalah hal yang paling sederhana dan mudah yang terdiri atas peregangan dengan memegang sendi dan otot yang berbeda masing-masing selama 10 hingga 30 detik.

2. Peregangan meningkatkan fleksibilitas dan peregangan harian adalah dasar bagi setiap program latihan. Untuk latihan penguatan melibatkan otot. Hal ini bisa dilakukan dengan mengangkat beban atau tidak sama sekali. Latihan ini memperkuat otot dan meningkatkan jumlah aktivitas yang dapat Anda lakukan tanpa rasa sakit.
3. Sementara pada latihan pendinginan atau latihan aerobik, meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Ada banyak manfaat latihan aerobik, antara lain adalah membuat hati dan pembuluh darah sehat dan memperbaiki suasana hati dan kesejahteraannya. Latihan ini meliputi kegiatan seperti berjalan, berenang, bersepeda, atau menggunakan treadmill. Perlu diketahui bahwa olahraga ringan seperti jalan kaki bermanfaat untuk penderita rematik karena asam urat. ( H Panji irawan, 2011)

Hal tersebut dikarenakan, jalan kaki dapat membakar kalori, memperkuat otot, dan membangun tulang yang kuat tanpa mengganggu persendian yang sakit. Namun, dari sekian banyak olahraga yang dapat dilakukan oleh penderita rematik, renang merupakan olahraga yang paling aman. ( H Panji irawan, 2011)

Lakukan olahraga dengan meminta pendapat dokter atau terapis terlebih dahulu untuk mengetahui gerakan-gerakan yang terbaik dan apa gerakan yang harus dihindari adalah olahraga yang terlalu membebani lutut, terutama ketika rematik jenis asam urat sedang kumat, seperti olahraga bulutangkis, voli, tenis, jogging, atau bela diri. Jangan memilih olahraga yang menggunakan cara berdiri terlalu lama karena akan menimbulkan sakit yang luar biasa. ( H Panji irawan, 2011)

Lakukan olahraga selama 20 sampai 30 menit dan rasakan manfaatnya setelah satu bulan berlatih, Selain itu, menjaga berat badan ideal menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi nyeri di sendi lutut. ( H Panji irawan, 2011)

Untuk mengatasi nyeri akibat rematik, pasien memang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapat pengobatan yang tepat. Tetapi kini, ada cara mudah untuk meringankan rasa nyeri serta mencegah terjadinya penyakit rematik dengan sebuah metode gerak tubuh yang dikenal dengan nama senam rematik. ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi di Jakarta, belum lama ini bertepatan dengan perayaan 8 tahun eksistensi Celecoxib, obat rematik produksi Pfizer Indonesia. Dalam acara tersebut, sebanyak 700 peserta berusia 30-70 tahun — yang sebagian besar menderita rematik — ikut ambil bagian. ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik merupakan hasil ciptaan Pfizer bersama dua pakar rehabilitasi medik dari RS Cipto Mangunkusumo/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM/FKUI) yaitu dr Angela BM Tulaar SpRM dan dr Siti Annisa Nuhonni SpRM. Dua spesialis itu mengumpulkan referensi dari berbagai sumber dan kemudian menerjemahkannya ke dalam gerakan tubuh dengan bantuan instruktur senam profesional. ( H Panji irawan, 2011)

Sementara itu, Dr Siti Annisa mengingatkan, senam rematik hanyalah satu upaya untuk mencegah dan meringankan gejala-gejala rematik. Selain juga

berfungsi sebagai terapi tambahan terhadap pasien rematik dalam fase tenang. Senam ini adalah salah satu modal untuk memandu mencegah dan memberikan terapi terhadap gejala rematik atau gejala osteoarthritis. ( H Panji irawan, 2011)

“Jadi ini bukan sebagai pengganti obat atau tindakan terapi oleh dokter. Pada penderita rematik, latihan senam harus di bawah pengawasan dokter, terapis, instruktur atau pasien itu sendiri. Perhatikan tiap sendi dan waspadai bila ada tanda-tanda radang. Waktu dan jenis latihan juga dibedakan tergantung stadium penyakit dan ada tidaknya radang,” terangya. ( H Panji irawan, 2011)

Secara umum, lanjut dr Siti, gerakan-gerakan senam rematik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan gerak, fungsi, kekuatan dan daya tahan otot, kapasitas aerobik, keseimbangan, biomekanik sendi dan rasa posisi sendi. “Senam ini konsentrasinya pada gerakan sendi, sambil meregangkan dan menguatkan ototnya, karena otot-otot itulah yang membantu sendi untuk menopang tubuh,” ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik berlangsung sekitar 20-30 menit dan terdiri dari empat tahapan yakni pemanasan, latihan inti aerobik I, latihan inti aerobik II dan pendinginan. Latihan inti aerobik I gerakannya bersifat low impact dan lebih ditujukan untuk menguatkan kerja jantung dan paru-paru. Latihan aerobik II adalah latihan dasar yang gerakannya lebih ditekankan guna mencegah dan sebagai terapi gejala atau dampak rematik. ( H Panji irawan, 2011)

“Untuk mencapai hasil maksimal, senam aerobik bisa dilakukan 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Namun bila ada tanda radang seperti nyeri, bengkak, merah atau gangguan gerak, hentikan latihan. Pasien juga harus bertanya pada dokter kapan boleh dan harus latihan,” ( H Panji irawan, 2011)

Surah Ar-ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”

Kita diharuskan berprasangka baik terhadap Allah dengan cara terus bersyukur, karena kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dibalik kegagalan itu tersimpan kebaikan untuk kita. Dan selanjutnya kita melakukan perubahan strategi dalam hidup, misalnya jika kita mengidap suatu penyakit janganlah kita selalu mengeluh dan berdiam diri tanpa berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

### **3. TINJAUAN UMUM TENTANG REMATIK**

#### **A. PENGERTIAN REMATIK**

Regangan musculoskeletal sangat sering dijumpai dan merupakan sebab tersering seorang pasien dirujuk pada praktik umum ( cedera olahraga dan nyeri punggung). Osteoarthritis mengenai sebagian usia separuh baya.( Rubenstein, david. 2008).



Istilah rematik berasal dari ilmu kedokteran kuno diyunani, yaitu *rheumaticos* atau *rheumatismos* dalam bahasa latin. Kata asalnya, yaitu “*rheuma*” yang berarti mengalir (kebawah) “.

Secara umum, orang selalu mengidentifikasi perasaan nyeri, sakit, serta kaku pada otot, persndian, tulang, dan ligament ( jaringan ikat ) dengan istilah rematik. Dalam ati medis, rematik merupakan istilah yang kurang jelas dan tidak spesifik sehingga jarang dpakai dalam praktek kedokteran. Karena keluhan utamanya nyeri dan pegal- pegal, otomatis penyakit rematik sangat mengganggu aktivitas penderita, terutama aktivitas yang memerlukan gerak tubuh.( Hembing, 2006).

Rematik termasuk dalam kelompok penyakit reumatologi, yang menunjukkan suatu kondisi dengan nyeri dan kaku yang menyerang anggota gerak atau system musculoskeleton, yaitu sendi, tulang, otot, maupun jaringan disekitar sendi.(Hembing, 2006).

## **B. KAITANNYA DENGAN ANGGOTA GERAK**

Anggota gerak adalah bagian- bagian tubuh yang digerakkan secara voluntary ( dikehendaki) dan mempunyai tujuan. Untuk bergerak secara normal, orang membutuhkan tiga komponen utama system muskuloskeleton yang terdiri atas tulang, otot, dan persendian.

Tulang- tulang sebagai keseluruhan rangka maupun bergerak karena adanya sendi- sendi yang menghubungkan antar tulang yang satu dengan yang lainnya yang diperkuat oleh jaringan ligament (jaringan ikat yang mengikat tulang- tulang persendian). Untuk membantu memperlancar gerakan, persendian

dilumasi oleh cairan yang khusus ( cairan sinovial) dan ujung- ujung tulang dilapisi oleh jaringan yang disebut kartilago ( tulang rawan).( Hembing, 2006).

Persendian sebagai anggota gerak dapat mengalami kerusakan sehingga menimbulkan rasa nyeri yang disebut rematik. Rematik juga dapat menyerang anggota gerak lainnya, seperti otot, tulang, dan jaringan ikat. Rasa nyeri pada anggota gerak dapat disebabkan karena proses patologis( penyakit) pada unsur- unsur yang ikut menyusun rangka tubuh.( Hembing, 2006 )

### **C. JENIS- JENIS REMATIK**

Ada lebih dari 100 jenis rematik. Namun, ditinjau dari lokasi patologik maka jenis rematik tersebut dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu rematik artikuler dan nonartikuler. Rematik artikuler atau arthritis ( radang sendi) merupakan gangguan rematik yang berlokasi pada persendian diantaranya arthritis rheumatoid, osteoarthritis, dan gout arthritis. Rematik nonartikuler atau ekstra artikuler, yaitu gangguan rematik yang disebabkan oleh proses diluar persendian, diantaranya meliputi bursitis, fibrositis, back pain, dan sciatica.( Hembing, 2006)

Jenis- jenis rematik yaitu :

#### **1. Rematik artikuler ( arthritis )**

##### **a. Arthritis rheumatoid**

Yang lebih sering dikenal dengan istilah encok merupakan radang sendi karena terjadi penimbunan asam urat kedalam sendi

##### **Etiologi dan pathogenesis**

RA merupakan manifestasi dari suatu respons system imun terhadap antigen asing pada individu- individu dengan predisposisi genetik. Proses ini memicu terjadinya inflamasi, aktivasi sel- sel endotel, dan penarikan sel- sel inflamasi spesifik kearah sendi, difasilitasi oleh adanya aktivitas molekul adhesi pada endotel pembuluh darah synovial dan pada sel- sel inflamasi yang beredar di sirkulasi. Bertambah kuatnya proses inflamasi ini muncul sebagai respon terhadap produksi lokal sitokin inflamasi didalam sendi oleh makrofag yang teraktivasi. (davey, 2005)

Jaringan synovial berproliferasi dan menjadi invasif secara lokal pada persendian. Pannus adalah lesi patologis yang khas pada RA, suatu jaringan granulasi inflamasi yang menebal. Sel- sel di dalam pannus menghasilkan protease dan kolagenase. (davey, 2005)

### **Manifestasi klinis**

Pada lansia AR dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok 1 adalah AR klasik. Sendi- sendi kecil pada kaki dan tangan sebagian besar terlibat. Terdapat faktor rheumatoid, dan nodul- nodul rheumatoid sering terjadi. Penyakit dalam kelompok ini dapat mendorong kearah kerusakan sendi yang progresif.
- 2) Kelompok 2 termasuk klien yang memenuhi kriteria dari *American Rheumatologic Association* untuk AR karena mereka mempunyai radang sinovitis yang terus- menerus dan simetris, sering melibatkan pergelangan tangan sendi- sendi jari.

- 3) Kelompok 3, sinovitis terutama memengaruhi bagian proksimal sendi, bahu, dan panggul. Awitannya mendadak, sering ditandai dengan kekakuan pada pagi hari. Pergelangan tangan pasien sering mengalami hal ini, dengan adanya bengkak, nyeri tekan, penurunan kekuatan menggenggam, sindrom *carpal tunnel*. Kelompok ini mewakili suatu penyakit yang dapat sembuh sendiri yang dapat dikendalikan secara baik dengan menggunakan prednison dosis rendah atau agens antiinflamasi dan memiliki prognosis yang baik.

Jika tidak diistirahatkan, AR akan berkembang menjadi 4 tahap yaitu :

- 1) Terdapat radang sendi dengan pembengkakan membran sinovial dan kelebihan produksi cairan sinovial. Tidak ada perubahan yang bersifat merusak terlihat pada radiografi.
- 2) Secara radiologis, kerusakan tulang pipih atau tulang rawan dapat dilihat. Klien mungkin mengalami keterbatasan gerak tetapi tidak ada deformitas sendi.
- 3) Jaringan ikat fibrosa yang keras menggantikan pannus, sehingga mengurangi ruang gerak sendi. Ankilosis fibrosa mengakibatkan penurunan gerakan sendi, perubahan kesejajaran tubuh, dan deformitas. Secara radiologis terlihat adanya kerusakan kartilago dan tulang.
- 4) Ketika jaringan fibrosa mengalami klasifikasi, ankilosis tulang dapat mengakibatkan terjadinya imobilisasi sendi secara total.

Atrofi otot yang meluas dan luka pada jaringan lunak seperti nodul- nodula mungkin terjadi.

#### **b. Arthritis gout**

Merupakan radang, terutama pada jari kaki, yang disebabkan oleh kelainan metabolisme asam urat yang ditandai dengan hiperurisemia dan serangan arthritis akut secara bergelombang.(Bambang, 2007)

Gejala arthritis akut disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan terhadap pembentukan Kristal monosodium urat monohidrat. Karena itu, dilihat dari penyebabnya, penyakit ini termasuk dalam golongan kelainan metabolik. Kelainan ini berhubungan dengan gangguan kinetik asam urat yaitu hiperurisemia, terjadi karena:

- 1) Pembentukan asam urat yang berlebihan.
- 2) Kurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal
- 3) Perombakan dalam usus yang berkurang. Namun, secara klinis hal ini tidak penting.(Mansjoer arif, dkk.2001)

#### **c. Osteoarthritis**

Merupakan penyakit sendi karena proses ketuaan yang disertai dengan kelainan pada tulang yang saling berdekatan.( Bambang, 2007).

Osteoarthritis dapat terjadi secara idiopatik atau dapat terjadi secara trauma, dengan stress berulang seperti yang dialami oleh pelari jarak jauh atau ballerina, atau berkaitan dengan deformitas kongenital. Individu yang mengalami hemophilia atau kondisi lain yang ditandai

oleh pembengkakan sendi kronis dan edema, dapat mengalami osteoarthritis. (Corwin Elizabeth, 2007)

#### GAMBARAN KLINIS

- Nyeri dan kekakuan pada satu atau lebih sendi, biasanya pada tangan, pergelangan tangan, kaki, lutut, spina bagian atas dan bawah, panggul, dan bahu. Nyeri dapat berkaitan dengan rasa kesemutan atau kebas, terutama pada malam hari.
- Pembengkakan sendi yang terkena, disertai penurunan rentang gerak. Sendi mungkin tampak mengalami deformitas.
- Nodus heberden, pertumbuhan tulang di sendi interfalangeal distal pada jari tangan, dapat terbentuk. (Corwin Elizabeth, 2007)

## 2. Rematik nonartikuler

### a. Bursitis

Merupakan peradangan bursa yang menimbulkan rasa sakit pada satu atau lebih kantong yang berisi cairan penutup dan pelindung ujung tulang. Bursa berfungsi sebagai bantalan antara tulang, otot, dan tali otot.

### b. Tendinitis

Merupakan rasa sakit yang disebabkan karena peradangan tendon dan penempelan otot ke tulang. Tendon merupakan penghubung otot dengan tulang. Urat dapat terkilir karena adanya

gerakan yang berlebihan. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh gangguan musculoskeletal lainnya.

#### **c. Sindrom carpal tunnel**

Merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya saraf pergelangan tangan yang terjepit sehingga dapat mempengaruhi fungsi tangan. Biasanya, penyakit ini menyerang pekerja yang jarang memakai alat kerja, pemakai computer, dan pekerja ditempat pengemasan. Gangguan ini ditandai dengan salah satu atau kedua tangan terasa lemah, sakit, panas, gatal atau mati rasa. Hal tersebut mempengaruhi beberapa jari tangan sehingga susah dikepalkan. Selain itu, kuku jari tangan terlihat pucat. Gejala tersebut akan memperburuk pada pagi hari dan malam hari ketika kecepatan sirkulasi darah berkurang.

#### **d. Siku tennis**

Umumnya, terjadi karena urat-urat yang melekat pada siku tulang hasta berkali-kali mengalami tarikan. Akibatnya, terjadi peradangan pada urat-urat otot ekstensor karpi radialis (otot penekuk tangan kebelakang) yang dikenal sebagai entesitis pada siku tulang hasta. Penekukan tangan ke belakang disendi pergelangan tangan dapat menimbulkan nyeri gerak. Gejala awalnya, adalah sakit siku yang menyebar ke lengan bawah serta punggung tangan setiap kali memegang objek atau memelintir siku. Gejala lainnya, pelunakan

sendi dan genggaman lemah, terkadang disertai dengan bengkak dan panas setempat serta terbatasnya gerakan.

**e. Frozen shoulder ( bahu baku)**

Mengakibatkan sendi menjadi tidak bebas digerakkan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh radang disekitar sendi bahu. Jika terjadi peradangan pada daerah tersebut, struktur- struktur yang berbeda tersebut akan terasa sakit jika digerakkan. Bahu yang sakit ini lama-kelamaan menjadi kaku sehingga tidak dapat digerakkan.

**f. Fibrositis**

Merupakan suatu keadaan yang disebabkan inflamasi atau peradangan pada jaringan ikat fibrous, terutama pada daerah leher, bahu, dan punggung bagian atas. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal. Umumnya, fibrositis disebabkan rasa sakit pada leher dan tulang belakang akibat salah urat atau cedera ringan, serta adanya daerah yang mengalami degenerasi pada tulang rawan. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh kelelahan, kecemasan, atau faktor kejiwaan maupun psikis. Gangguan ditandai dengan rasa sakit, sensitif, dan otot- otot yang kaku. Fibrositis sering dijumpai pada usia lanjut.

**g. Fibromialgia**

Merupakan jenis rematik yang disebabkan adanya proses peradangan di otot. Ditandai oleh nyeri otot dan tulang yang menyeluruh, serta kekakuan dan kelelahan kronis. Kondisi ini juga sering disertai gangguan tidur karena penderita akan mengeluh nyeri



otot yang hebat sehingga membuatnya tidak mungkin untuk berbaring dengan posisi yang sama dalam waktu yang lama. Kurang tidur terus-menerus mengakibatkan nyeri otot berkepanjangan, terkadang disertai rasa pening serta jantung berdebar-debar, kecemasan, dan gangguan lambung. Jenis penyakit ini dapat menyerang semua umur.

#### **h. Jari pelatuk**

Dapat terjadi karena akibat inflamasi pada pembungkus tendon otot jari tangan yang digunakan untuk menekuk. Akibat adanya proses peradangan rematik, akan tumbuh nodul atau benjolan kecil pada tendon yang bersangkutan. Karena adanya benjolan tersebut atau karena perlekatan antar tendon dan jaringan yang membungkusnya, terjadi hambatan saat menekuk jari tangan. Pada saat ini, penderita mengeluh sukarnya meluruskan kembali jari tangan yang telah ditekuk.

#### **i. Brakhialgia reumatoid**

Merupakan nyeri di lengan akibat reaksi peradangan rematik. Nyeri yang disebabkan oleh radang saraf lengan akan terasa pula pada pada daerah leher dan belikat. Gangguan rematik ini ditandai dengan nyeri yang tajam, yang menjalar dari pangkal leher ke tepi tulang belikat bagian dalam. Pada kondisi lain, nyeri menjalar kelengan melalui bahu bagian belakang. Rasa nyeri timbul secara spontan, terasa kesemutan didaerah yang nyeri tersebut, serta terasa ngilu jika ada penekanan disebelah dalam belikat dan lengan sebelah luar.

#### **j. Sakit pinggang**

Keluhan sakit pinggang merupakan keluhan yang sangat umum terjadi.

Sakit pinggang dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh banyak hal. Penyebab paling umum sakit pinggang bagian bawah adalah posisi tubuh yang salah pada waktu bekerja, kelelahan, tegangan pada punggung, kerja yang berlebihan, posisi duduk atau bentuk kursi yang kurang baik. Penyebab yang lain adalah kegemukan, kehamilan, telapak kaki yang datar, dan memakai sepatu hak tinggi.

#### **k. Sciatica**

Merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh rasa sakit yang menjalar kebawah dari punggung bagian bawah atau bokong hingga tungkai bawah sepanjang daerah saraf sciatic. Umumnya disebabkan oleh tekanan pada akar saraf oleh diskus intervertebralis, yang robek dan menonjol keluar dari sumsum tulang belakang atau ruas tulang punggung yang bergeser.

Gejalanya hampir selalu disertai dengan rasa kesemutan didaerah kaki yang dilindungi nyeri saraf tersebut, rasa sakit yang berdenyut dan tajam dari bokong dan paha kebawah bagian belakang kaki, serta rasa sakit yang konstan dan lebih hebat jika berdiri. (Hembing, 2006).

### **D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMATIK**

Faktor yang mempengaruhi munculnya rematik tergantung pada jenis rematiknya. Serangan pada jenis rematik yang satu dipengaruhi oleh faktor yang

berbeda dengan jenis rematik lainnya. Rematik tidak hanya menyerang lanjut usia, tetapi menyerang tanpa mengenal umur. Banyak jenis rematik yang belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi.(Hembing, 2006)

Berikut beberapa hal yang mempengaruhi timbulnya serangan rematik.

### **1. Infeksi**

Rematik pada persendian dapat disebabkan karena adanya infeksi virus atau bakteri. Hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit yang mendadak. Tanda- tandanya berupa demam, nyeri pada persendian tulang dan otot, disertai dengan peradangan ( seperti bengkak, panas, dan bercak- bercak merah pada kulit).( Hembing, 2006)

### **2. Pekerjaan**

sikap badan yang salah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari memudahkan timbulnya penyakit sendi. Mengangkat beban berat dari lantai dengan badan membungkuk, dapat mengakibatkan sakit pinggang. Pada pemain tenis, karena seringnya melakukan pukulan back hand yang keras atau cidera yang lain, dapat menimbulkan rasa nyeri dan peradangan pada jaringan otot siku lengan yang disebut dengan *tennis elbow*.( Hembing, 2006).

### **3. Makanan**

Tidak semua jenis rematik dipengaruhi oleh faktor makanan. Rematik gout atau asam urat merupakan satu- satunya jenis rematik yang yang serangannya sangat dipengaruhi oleh pola makan. Mengonsumsi

makanan yang banyak mengandung purin dapat meningkatkan kadar asam urat, yang menyebabkan terjadinya pengkristalisasi dalam sendi. Pada osteoporosis, salah satunya dipengaruhi oleh defisiensi kalsium akibat makanan rendah kalsium dan vitamin D dalam waktu yang lama.( Hembing, 2006)

#### **4. Gangguan imunitas**

Beberapa jenis rematik disebabkan oleh disfungsi imun, seperti pada rheumatoid arthritis yang menyebabkan utamanya diduga karena faktor autoimunitas (reaksi kekebalan karena proses dalam tubuh sendiri). Umumnya, disfungsi imun autoimunitas juga terjadi pada penyakit lupus, yaitu systematik lupus erythematosus (SLE). Jika menyerang sendi, penyakit ini akan mengakibatkan nyeri, pembengkakan, dan kaku. Pada autoimunitas, tubuh menghasilkan antibodi yang melawan sel-selnya sendiri. Kompleks antigen- antibodi yang terbentuk dapat menekan imunitas tubuh yang normal dan merusak jaringan sehingga dapat menghantam sendi- sendi.( Hembing, 2006).

#### **5. Kelenjar atau hormone**

Ketika wanita mengalami masa menopause, akan mengalami penurunan fungsi ovarium secara alamiah. Sebagian orang akan mengalami gangguan yang dapat memperburuk rematik ringan yang dideritanya sehingga gejala yang dirasakan bertambah buruk. Selain itu, kondisi rematik yang ringan akan menjadi lebih aktif. Osteoporosis atau penyakit keropos tulang merupakan jenis rematik yang lebih banyak

mengenai wanita yang telah menopause. Kurangnya hormone estrogen setelah menopause akan memperburuk masa tulang yang sudah berkurang karena usia. Wanita yang belum menopause, tidak terserang rematik gout karena masih memiliki cukup hormon estrogen yang membantu mengeluarkan asam urat dari darah ke urin.( Hembing, 2006).

## **6. Faktor usia**

Tidak semua jenis rematik dipengaruhi oleh proses ketuaan ( proses degeneratif). Ada juga rematik yang menyerang anak- anak dan usia muda, seperti *juvenile rheumatoid arthritis* yang menyerang usia 4-15 tahun dan *systematic lupus erythematosus* (SLE) pada wanita muda. Jenis rematik yang diduga dipengaruhi oleh proses degenerative atau ketuaan adalah osteoarthritis atau pengapuran karena lebih banyak menyerang usia diatas 50 tahun.( Hembing, 2006).

## **7. Faktor genetik**

Faktor genetik atau keturunan hanya berpengaruh pada beberapa jenis rematik tertentu, tidak pada semua jenis rematik, misalnya *ankylosing spondylitis*. Jenis rematik artikuler ini menyerang tulang belakang yang disebabkan oleh gen HLA- B27 yang terdapat dalam tubuh penderita. Faktor genetik juga berpengaruh pada nodus heberden, yaitu salah satu bentuk kelainan dari osteoarthritis.(Hembing, 2006)

## **8. Psikologis**

Defresi, stress, dan beban kecemasan yang disertai dengan kelelahan dan ketidak mampuan menangani tuntutan fisik dapat mempengaruhi

timbulnya penyakit rematik. Sikap mental yang salah tersebut merupakan sumber ketegangan otot yang dapat memicu timbulnya rematik. Rasa nyeri merupakan gejala kompleks rematik dapat bertambah buruk dalam keadaan stress, defresi, dan gelisah. Kasus rematik yang disertai dengan kecemasan merupakan hal yang nyata, seperti pada fibrositis, jenis rematik nonartikuler yang dipicu oleh tekanan psikis atau faktor kejiwaan.( Hembing, 2006).

### **9. Lingkungan**

Kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi rematik. Pencemaran lingkungan yang mengandung radikal bebas, seperti logam berat dan zat aditif/ bahan kimia dalam makanan dapat masuk kedalam tubuh sebagai racun dalam darah. Jika darah dibebani oleh sisa buangan atau racun maka kandungan oksigen dan unsur nutrisi menjadi kecil. Akibatnya, perbaikan jaringan tidak efisien. Racun dalam darah tersebut dapat memperburuk kerusakan jaringan tubuh dan memunculkan gejala arthritis.( Hembing, 2006).

### **E. GEJALA UMUM**

Gejala rematik bermacam- macam, tergantung pada jenisnya. Namun, secara umum rematik ditandai dengan rasa nyeri dan kaku pada persendian, otot, dan tulang. Selain itu, rematik juga disertai dengan gejala lain, seperti rasa lelah dan lemah, demam, sulit tidur, depresi, berat badan menurun, serta gerak tubuh terhambat/ lamban, dan tidak gesit.(Hembing, 2006).

Berikut gejala yang sering terjadi pada penyakit rematik.

### **1.) Nyeri pada anggota gerak**

Rasa nyeri pada anggota gerak merupakan keluhan utama pada penderita rematik. Biasanya, rasa nyeri timbul ketika melakukan gerakan tertentu atau setelah melakukan aktivitas. Nyeri juga dapat timbul ketika istirahat yang tidak ada hubungannya dengan masa gerakan sebelumnya, atau pada pagi hari ketika bangun tidur,. Rasa nyeri tersebut tidak hanya dipersendian, tetapi juga menyebar hingga keseluruhan tubuh. Nyeri yang menjalar secara tajam keseluruh tubuh menandakan nyeri saraf.( Hembing, 2006).

### **2.) Kelemahan otot**

Pada umumnya, gejala yang mengiringi nyeri adalah otot- otot terasa capek dan lemah. Dalam waktu yang lama, kelemahan otot tersebut dapat menimbulkan atrofi ( pengecilan) otot yang bersangkutan. Dalam hal ini disebabkan oleh proses rematismus yang berjalan cukup lama. Jaringan yang terkena proses patologik, yaitu saraf pergerakan ( saraf motorik ) atau otot.( Hembing, 2006)

### **3.) Peradangan dan bengkak pada sendi**

Jika sendi mengalami peradangan maka sendi akan membengkak, warna kulit terlihat memerah, nyeri dan terasa panas setempat, dan sakit jika diraba. Terkadang, pada kulit akan timbul bercak- bercak dan jika ditekan agak nyeri.( Hembing, 2006).

### **4.) Kekakuan sendi**

Persendian yang terkena rematik menjadi kaku dan susah digerakkan. Namun, kekakuan juga dapat disebabkan oleh otot yang tegang secara berkesinambungan.( Hembing, 2006)

#### **5.) Kejang atau kontraksi otot**

Saat kejang, otot-otot menggumpal dan terasa sebagai benjolan yang keras. Dengan mengurut dan mengerakkan anggota tubuh, dapat membantu meredakan kontraksi otot yang tegang dan keras ( Hembing, 2006).

#### **6.) Gangguan fungsi**

Lambat laun, rasa nyeri, kekakuan, dan kelemahan otot akan berpengaruh dalam melakukan aktivitas keseharian. Gangguan fungsi tersebut dapat mematahkan semangat kebanyakan penderita rematik. Gangguan fungsi tersebut sering menjadi keluhan utama penderita rematik, seperti tidak dapat berjalan karena lutut atau tumit sakit, atau tidak bisa berbalik karena pinggang terasa sakit.( Hembing, 2006)

#### **7.) Sendi berbunyi ( krepitasi)**

Sebagian orang usia muda dapat menghasilkan bunyi- bunyian jika menekukkan persendiannya pada jari- jari tangan, kaki, atau yang lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti mereka itu akan terkena rematik. Pada penyakit rematik, dapat dirasakan adanya bunyi berderak yang dapat diraba dan didengar.( Hembing, 2006)

#### **8.) Sendi goyah**



Sendi yang posisinya goyah dapat terjadi karena kerusakan rawan sendi atau ligamen yang sobek. Selain itu, dapat disebabkan juga karena adanya peradangan atau trauma pada ligamen dan kapsul sendi.( Hembing, 2006)..

#### **9.) Timbulnya perubahan bentuk**

Rematik yang parah dapat menyebabkan perubahan bentuk organ tubuh atau kecatatan. Kelainan ini hanya terjadi pada jenis rematik tertentu terutama pada rematik sendi ( artikuler), seperti rheumatoid arthritis, gout, dan osteoarthritis. Biasanya, perubahan bentuk terjadi pada sendi- sendi jari tangan dan sendi antar ruas jari yang terlihat bengkak dan bentuknya berubah. Osteoarthritis yang menyerang sendi lutut kadang dapat menyebabkan kaki berubah bentuk menjadi O. Sendi – sendi yang terserang rheumatoid arthritis dapat berubah menjadi bengkok. Sendi yang terserang gout menimbulkan tonjolan yang disebut dengan tofus.( Hembing, 2006)

#### **10.) Timbulnya benjolan/ nodul**

Umumnya, benjolan timbul pada rematik gout kronis, disebut tofus. Tofus merupakan endapan seperti kapur dibawah kulit atau didalam sendi yang menandakan adanya pengendapan asam urat. Pada rheumatoid arthritis, juga dapat timbul benjolan yang disebut nodul rheumatoid, yaitu massa berbentuk bulat atau oval yang tidak lunak dibawah kulit. Benjolan kecil yang timbul pada sendi antar ruas jari tangan paling ujung disebut nodus herberden. ( Hembing, 2006)

## **F. DIAGNOSA**

Banyak pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosa rematik, tetapi tidak semuanya diperlukan. Pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan perkiraan jenis rematiknya yang bisa dilihat dari gejalanya.

Berikut beberapa pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit rematik.

### **1. Pemeriksaan fisik**

Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan pada beberapa bagian tubuh yang menunjukkan gejala rematik, seperti nyeri, pembengkakan dan peradangan, serta kekakuan pada suatu sendi. Kadang- kadang, gangguan pada suatu sendi dapat menyebabkan ketegangan pada sendi- sendi didekatnya. Misalnya, sakit pada sendi bahu dapat menyebabkan gangguan pada leher. (Heming, 2006).

### **2. Tes darah**

Asam urat darah ( uric acid)

Pemeriksaan ini untuk mendeteksi kemungkinan terkena rematik gout yang ditandai dengan tingginya kadar asam urat dalam darah.

Faktor rheumatoid

Adalah autoantibodi yang terdapat dalam darah beberapa penderita arthritis rheumatoid. Selain itu, dapat juga ditemukan dalam kadar rendah pada orang normal, terutama orang tua dan beberapa orang masih keluarga dengan penderita arthritis rheumatoid. Faktor rheumatoid bukan sebagai penyebab penyakit, tetapi dapat digunakan sebagai penilai/ indikator.

Indeks pengendapan sel darah merah

Darah terdiri dari sel dan plasma. Sel darah yang paling banyak adalah sel darah merah, yang berfungsi mentransfer oksigen ke dalam dan keseluruhan tubuh.

Penghitungan jenis darah lengkap ( Hembing, 2006).

### **3. Analisis cairan sendi**

Analisa ini merupakan pemeriksaan cairan sendi dibawah mikroskop untuk melihat adanya peradangan, infeksi bakteri, dan Kristal asam urat.(Hembing, 2006)

### **4. Sinar X( radiologi)**

Sinar X atau foto rontgen tidak selalu diperlukan untuk mendiagnosis rematik. Sinar X digunakan untuk melihat kelainan pada sendi dan tulang secara jelas.( Hembing, 2006).

### **5. Pemeriksaan lain**

Pemeriksaan lain adalah MRI ( magnetik resonance imaging) CT scan ( computed tomography) yang dapat menggambarkan anatomi tubuh sehingga dapat mendeteksi kelainan dan ketidak normalan organ dan jaringan tubuh secara terperinci. Diagnostik lainnya adalah arthrograpi, biopsy, dan arthroskopi.( Hembing, 2006).

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**


#### **A. DASAR PEMIKIRAN VARIABLE**

Olah raga adalah suatu bentuk kegiatan gerak secara teratur atau tidak teratur yang dilakukan oleh seseorang, guna mencapai suatu kondisi puncak yang baik dan salah satu bentuk terapi yang diberikan dalam proses penekanan kekambuhan rematik. Olahraga merupakan bentuk terapi yang diberikan pada pasien lansia dipanti sosial tresna werdha sebagai upaya penekanan kekambuhan rematik pada lansia.

#### **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau terhadap konsep lain dari masalah yang ingin diteliti.

## Kerangka konsep pelaksanaan olah raga terhadap kekambuhan rematik



Keterangan :


----- : yang tidak diteliti

————— : yang diteliti

### C. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konsep diatas maka dapat ditegaskan bahwa dalam hipotesis penelitian ini yaitu dengan pemberian kegiatan olah raga pada pasien lansia yang memiliki penyakit rematik dipanti sosial maka akan dapat menekan kekambuhan rematik pada lansia.

#### D. KERANGKA KERJA



N	Variable	Defenisi operasional	Indikator	Alat	Ukur	Skor
1	Independent: Kegiatan olah raga	Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan gerak secara teratur atau tidak teratur yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai suatu kondisi puncak yang baik. Yang digunakan sebagai suatu terapi penghambat penyakit rematik, adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berjalan kaki diatas batu kerikil</li> <li>• Senam</li> </ul>	ya.apabila pasien melakukan kegiatan olah raga tidak, apabila pasien tidak melakukan kegiatan olah raga.	Observasi	Ordinal	
2	Dependen Ketidak kambuhan rematik pada lansia	Ketidak kambuhan rematik pada lansia adalah tidak terjadinya kekambuhan rematik setelah melakukan olahraga.	Tidak terjadi kekambuhan rematik pada lansia.  Terjadi kekambuhan rematik pada lansia	Observasi	Ordinal	Skor nilai > 10 tidak terjadi kekambuhan rematik pada lansia Skor nilai < 10 terjadi kekambuhan rematik pada lansia

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menjawab permasalahan, membuat suatu yang masuk akal, memahami peraturan, memprediksi keadaan dimasa yang akan datang. (Nursalam, 2003).

Pada bagian metode penelitian ini akan diuraika mengenai desain penelitian : desain penelitian, defenisi operasional populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data,teknik analisis data, etika penelitian dan keterbatasan.

#### 1. Desain penelitian

Desain penelitian adalah keseluruhan dari penomoran untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian ( Nursalam, 2003).

Desain penelitian yang digunakan adalah quasy- experiment desain. Dalam rancangan ini kelompok subjek dibagi 2 kelompok yaitu kelompok eksperiment dan kelompok control, kedua kelompok ini diawali dengan pretest, pada kelompok eksperiment diberi perlakuan dan kontrol tidak diberikan perlakuan. Untuk dapat mengetahui berapa jauh pengaruh kegiatan olah raga yang diberikan terhadap kekambuhan rematik maka kedua kelompok diberi post test.( Nursalam, 2003)

<b>Subjek</b>	<b>Pra</b>	<b>Perlakuan</b>	<b>Pasca test</b>
K- A	0	I	O1- A



K- B	0	-	O2- B
	<b>Time 1</b>	<b>Time 2</b>	<b>Time 3</b>

Ket : K- A, K- B : subjek perlakuan/ kontrol

I : perlakuan atau intervensi

O : observasi sebelum bimbingan

O1 ( A+B) : observasi sesudah perlakuan ( kelompok perlakuan dan kelompok kontrol).

## 2. Lokasi dan waktu penelitian

- a) Lokasi penelitian yang digunakan adalah dipanti sosial tresna werdha gau mabaji di kab. Gowa.
- b) Waktu penelitian mulai dari bulan juni sampai bulan juli di 2011

## 3. Populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, kriteria inklusi, dan kriteria eksklusi ( kriteria pemilihan)

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dipanti sosial tresna werdha gau mabaji di kab. Gowa Sulawesi selatan. Sebanyak 20 orang.

### b. Sampel

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasien yang diagnose keperawatannya adalah REMATIK yang memenuhi syarat penelitian selama kurung waktu yang ditentukan.

### **c. Teknik pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel yaitu non probability sampling, dengan teknik purposive sampling, yaitu cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti ( tujuan atau masalah dalam penelitian ), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

### **d. Kriteria inklusi**

Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk diteliti, dalam penelitian ini :

- a) Pasien dengan penyakit rematik
- b) Pasien yang pernah diberikan kegiatan olah raga
- c) Pasien yang bersedia sebagai sampel
- d) Jenis kelamin laki- laki dan perempuan
- e) lansia

### **e. Kriteria eksklusi**

Kriteria eksklusi adalah karakteristik sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak layak untuk diteliti, seperti :

- a) Pasien yang tidak bersedia melakukan kegiatan olah raga
- b) Pasien yang tidak pernah melakukan kegiatan olah raga
- c) Memiliki penyakit rematik yang kronis

## **4. Prosedur pengumpulan data**

Merupakan kegiatan penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Sebelum dilakukan pengumpulan data, maka terlebih dahulu menentukan alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibuat secara khusus oleh peneliti, kuesioner ini dapat menggunakan hubungan kegiatan yang diberikan dapat menekan kekambuhan rematik pada lansia dipanti sosial, kuesioner ini terdiri dari empat belas pertanyaan, tujuh pertanyaan untuk kelompok perlakuan dan tujuh pertanyaan untuk kelompok kontrol. disetiap pertanyaan diminta responden memberi tanda (benar), adapun untuk jawaban “ya” skornya 2 dan untuk tidak 1 dengan model guttman. Kemudian skor ini dijumlahkan dan hasil penjumlahan dapat menunjukkan tingkat kekambuhan rematik pada lansia.

Untuk memulai mengadakan penelitian dan mendapatkan data dari responden ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a) Harus mendapat permohonan ijin penelitian dari institusi kelokasi penelitian.
- b) Setelah mendapat izin penelitian, maka peneliti akan melapor kebagian KASBAG tata usaha dipanti tersebut.
- c) Menemukan calon responden, lalu menjelaskan tentang penelitian ini.
- d) Jika telah mendapat persetujuan dari responden, maka diberikan angket untuk diisi.

## **5. Etika penelitian**

Setelah mendapat persetujuan barulah dilakukan penelitian dengan menekankan pada masalah :

- a) Informed consent, respon menyatakan setuju setelah itu peneliti bisa melakukan kegiatan penelitian terhadap responden
- b) Anonymity ( tanpa nama) untuk menjaga kerahasiaan, maka peneliti tidak akan mencantumkan nama responden tersebut tetapi diberi kode
- c) Confidentiality, kerahasiaan informasi responden dijamin peneliti sebagai hasil penelitian.

## **6. Analisa data**

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan jasa komputer program SPSS 16 yang meliputi :

- a) Analisa univariat

Untuk mengetahui dan memperlihatkan tiap distribusi frekwensi serta persentase dari variabel yang diteliti.

- b) Analisa bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen dengan menggunakan uji statistik. Uji paired sampel statistik yakni uji T. Test dengan tingkat kebermaknaan 0,05 dengan ketentuan hubungan dikatakan bermakna bila  $P \text{ value} < 0,05$  dan hubungan dikatakan tidak bermakna bila  $P \text{ value} > 0,05$  untuk melihat

pengaruh olahraga terhadap ketidak kambuhan rematik pada kelompok perlakuan dan kontrol.

## 7. Keterbatasan

Keterbatasan merupakan kelemahan dan hambatan dalam penelitian dan keterbatasan dalam penelitian yang dihadapi peneliti adalah :

### 1. Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti karena tidak ada instrumen yang baku yang dapat dijadikan acuan sehingga kemungkinan terdapat kesalahan/kekeliruan.

### 2. Faktor Feasibility

a. Kemampuan peneliti : Penelitian ini merupakan penelitian awal dimana peneliti belum mempunyai pengalaman sebelumnya.

b. Waktu : Peneliti harus mengatur waktu dengan efektif karena kegiatan penelitian bersamaan pula dengan kegiatan akademik peneliti.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dikemukakan penyajian hasil analisis data dan pembahasan. Penyajian hasil analisis data meliputi analisis univariat dan bivariat. Kemudian dilakukan pembahasan hasil analisis dan kaitannya dengan teori yang mendasari penelitian ini untuk memberi interpretasi dari hasil analisis data.

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Analisa univariat**

###### **❖ Karakteristik Responden berdasarkan Jenis kelamin dan Agama**

Data yang diperoleh dari PSTW Gau Mabaji Gowa pada 20 responden menunjukkan bahwa jenis kelamin responden terbanyak berada pada perempuan yaitu 14 responden (70 %) dan jenis kelamin responden terkecil berada pada laki-laki yaitu 6 responden (30 %) dan dari jumlah 20 responden (100%) tersebut semua beragama islam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut

Tabel 5.1  
 Distribusi responden Penderita Rematik Berdasarkan  
 Jenis Kelamin dan Agama di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa  
 Tahun 2011

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki- laki	6	30
Perempuan	14	70
Agama	Jumlah	Persentase (%)
Islam	20	100
Kristen	-	-
Budha	-	-
Hindu	-	-
Jumlah (n)	20	100

*Sumber : Data Primer Juli 2011*

❖ Distribusi variabel Olahraga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat 10 responden(perlakuan) atau 50% dari 20 responden yang diteliti, dan melakukan kegiatan olahraga, dan sebanyak 10 responden(kontrol) atau 50% dari 20 responden yang diteliti dan tidak melakukan olahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2  
Distribusi Responden Berdasarkan Olahraga yang dilakukan  
di PSTW Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa Tahun 2011

Variable olahraga	Jumlah (n)	Persentase (%)
Perlakuan(berolahraga)	10	50
Control(tidak berolahraga)	10	50
Jumlah (n)	20	100

*Sumber : Data Primer Juli 2011*

- ❖ Distribusi Ketidak kambuhan rematik pada responden perlakuan setelah berolahraga

Berdasarkan hasil penelitian pada responden perlakuan (berolahraga) yang telah melakukan kegiatan olahraga bahwa terdapat 2 atau 20% dari 10 responden yang mengalami kekambuhan rematik setelah berolahraga. Dan 8 atau 80% dari 10 responden yang mengalami ketidak kambuhan rematik setelah berolahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 5.3  
Distribusi Responden Pada Kelompok Perlakuan Berdasarkan  
Kekambuhan Setelah Melakukan Kegiatan Olahraga di PSTW Gau  
Mabaji Kabupaten Gowa  
Tahun 2011

Variabel ketidak kambuhan(perlakuan )	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kambuh	2	20
Tidak kambuh	8	80
Jumlah (n)	10	100

*Sumber : Data Primer Juli 2011*

❖ Distribusi Ketidak kambuhan rematik setelah berolahraga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari hasil kuesioner yang dijawab oleh responden bahwa terdapat 10 responden (perlakuan) dengan persentase ketidak kambuhan rematik setelah berolahraga sebesar 54%. Dan 10 responden(kontrol) dengan persentase ketidak kambuhan rematik setelah berolahraga 46%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4  
 Distribusi responden Berdasarkan Ketidak Kambuhan Setelah  
 Melakukan Kegiatan Olahraga di PSTW Gau Mabaji Kabupaten  
 Gowa Tahun 2011

Variabel olahraga	ketidak kambuhan	
	jumlah (n)	persentase (%)
Perlakuan	10	54%
Control	10	46%
Jumlah (n)	20	100

*Sumber : Data Primer Juli 2011*

b. Analisis Bivariat

Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel dependen yaitu : ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia dengan variabel independen yaitu : Olahraga , maka dibuat ke dalam *cross tab* yang disertai dengan analisis data T test yang dapat dilihat pada hasil berikut :

- ❖ Pengaruh olahraga terhadap ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia di PSTW Gau mabaji kab. gowa

Hasil analisis pengaruh antara olahraga dengan ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia diperoleh bahwa terdapat 2 responden atau 20 % dari 10 responden pada kelompok perlakuan yang mengalami kekambuhan rematik dan 8 responden atau 80 % dari 10 responden pada kelompok control yang mengalami kekambuhan rematik. Sedangkan 8 responden atau 80 % dari 10 responden pada kelompok perlakuan yang tidak mengalami kekambuhan rematik serta sebanyak 2 responden atau 20% dari 10 responden pada kelompok control yang tidak mengalami kekambuhan rematik. Hal ini dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 5.5  
Pengaruh Olahraga Terhadap Ketidak Kambuhan Rematik Pada Lanjut  
Usia di PSTW Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa Tahun 2011

olahraga	Ketidak kambuhan Rematik				Jumlah	
	Kambuh		Tidak Kambuh		N	%
	f	%	F	%		
Perlakuan	2	20	8	80	10	54
Kontrol	8	80	2	20	10	46
Jumlah (n)	10	100	10	100	20	100

*Sumber : Data Primer Juli 2011*

Hasil uji statistik diperoleh nilai dengan P value < 0,05 maka hubungan dikatakan signifikan yaitu  $P 0,000 < 0,05$ , berarti terdapat pengaruh Olahraga Terhadap Ketidak kambuhan Rematik pada Lanjut Usia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Dan terdapat 2 orang pada kelompok perlakuan yang mengalami kekambuhan rematik karena tidak rutin berolahraga membuat signifikan bilangan akhir. Dan kurang olahraga menyebabkan sirkulasi darah pembuluh jaringan kurang.

## 2. Pembahasan

Hasil penelitian pengaruh antara olahraga dengan ketidakambuhan rematik pada lanjut usia diperoleh bahwa terdapat 2 responden atau 20 % dari 10 responden pada kelompok perlakuan yang mengalami kekambuhan rematik karena tidak rutin melakukan olahraga sehingga menyebabkan sirkulasi darah kepembuluh jaringan kurang, dan 8 responden atau 80 % dari 10 responden pada kelompok control yang mengalami kekambuhan rematik karena sama sekali tidak melakukan olahraga. Sedangkan 8 responden atau 80 % dari 10 responden pada kelompok perlakuan yang tidak mengalami kekambuhan rematik karena rutin berolahraga sehingga sirkulasi darah keseluruhan jaringan tubuh lancar, serta sebanyak 2 responden atau 20% dari 10 responden pada kelompok control yang tidak mengalami kekambuhan rematik karena rutin berobat kepoliklinik. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan olahraga memiliki pengaruh terhadap ketidakambuhan rematik pada lanjut usia dipanti sosial tresna werdha gau mabaji kab. Gowa.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori dan kerangka berpikir yang mendasarinya, maka penelitian ini mendukung dan memperkuat teori dan hasil- hasil penelitian terdahulu yang sudah ada. Sesuai dengan teori H. panji irawan(2011) olahraga menjadi salah satu cara terbaik yang dilakukan untuk menjaga sendi agar tetap dalam keadaan sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas. Berjalan kaki, berolahraga ringan, atau mengerjakan pekerjaan rumah ringan dapat membantu melatih otot dan sendi agar tidak semakin kaku, sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga membantu mengurangi

rasa sakit, kelelahan, meningkatkan fleksibilitas gerak dan kekuatan, serta membuat rematik lebih baik.

Berolahraga ringan dan teratur kadang sulit dijalani oleh penderita rematik. Padahal, olahraga menjadi salah satu cara terbaik yang dilakukan untuk menjaga sendi agar tetap dalam keadaan sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas. Berjalan kaki, berolahraga ringan, atau mengerjakan pekerjaan rumah ringan dapat membantu melatih otot dan sendi agar tidak semakin kaku. Namun, jangan melakukan olahraga yang terlalu berat karena justru dapat menyebabkan cedera. (H Panji irawan, 2011)

Terdapat tiga jenis latihan yang dapat dilakukan dan terbukti aman untuk penderita rematik, yaitu:

1. pemanasan, penguatan, dan penyejukan. Pemanasan adalah hal yang paling sederhana dan mudah yang terdiri atas peregangan dengan memegang sendi dan otot yang berbeda masing-masing selama 10 hingga 30 detik.
2. Peregangan meningkatkan fleksibilitas dan peregangan harian adalah dasar bagi setiap program latihan. Untuk latihan penguatan melibatkan otot. Hal ini bisa dilakukan dengan mengangkat beban atau tidak sama sekali. Latihan ini memperkuat otot dan meningkatkan jumlah aktivitas yang dapat Anda lakukan tanpa rasa sakit.
3. Sementara pada latihan pendinginan atau latihan aerobik, meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Ada banyak manfaat latihan aerobik, antara

lain adalah membuat hati dan pembuluh darah sehat dan memperbaiki suasana hati dan kesejahteraannya. Latihan ini meliputi kegiatan seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, atau menggunakan treadmill. Perlu diketahui bahwa olahraga ringan seperti jalan kaki bermanfaat untuk penderita rematik karena asam urat. ( H Panji irawan, 2011)

Hal tersebut dikarenakan, jalan kaki dapat membakar kalori, memperkuat otot, dan membangun tulang yang kuat tanpa mengganggu persendian yang sakit. Namun, dari sekian banyak olahraga yang dapat dilakukan oleh penderita rematik, renang merupakan olahraga yang paling aman. ( H Panji irawan, 2011)

Lakukan olahraga dengan meminta pendapat dokter atau terapis terlebih dahulu untuk mengetahui gerakan-gerakan yang terbaik dan apa gerakan yang harus dihindari adalah olahraga yang terlalu membebani lutut, terutama ketika rematik jenis asam urat sedang kumat, seperti olahraga bulutangkis, voli, tenis, jogging, atau bela diri. Jangan memilih olahraga yang menggunakan cara berdiri terlalu lama karena akan menimbulkan sakit yang luar biasa. ( H Panji irawan, 2011)

Lakukan olahraga selama 20 sampai 30 menit dan rasakan manfaatnya setelah satu bulan berlatih, Selain itu, menjaga berat badan ideal menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi nyeri di sendi lutut. ( H Panji irawan, 2011)

Untuk mengatasi nyeri akibat rematik, pasien memang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapat pengobatan yang tepat. Tetapi kini,

ada cara mudah untuk meringankan rasa nyeri serta mencegah terjadinya penyakit rematik dengan sebuah metode gerak tubuh yang dikenal dengan nama senam rematik. ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi di Jakarta, belum lama ini bertepatan dengan perayaan 8 tahun eksistensi Celecoxib, obat rematik produksi Pfizer Indonesia. Dalam acara tersebut, sebanyak 700 peserta berusia 30-70 tahun — yang sebagian besar menderita rematik — ikut ambil bagian. ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik merupakan hasil ciptaan Pfizer bersama dua pakar rehabilitasi medik dari RS Cipto Mangunkusumo/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM/FKUI) yaitu dr Angela BM Tulaar SpRM dan dr Siti Annisa Nuhonni SpRM. Dua spesialis itu mengumpulkan referensi dari berbagai sumber dan kemudian menerjemahkannya ke dalam gerakan tubuh dengan bantuan instruktur senam profesional. ( H Panji irawan, 2011)

Sementara itu, Dr Siti Annisa mengingatkan, senam rematik hanyalah satu upaya untuk mencegah dan meringankan gejala-gejala rematik. Selain juga berfungsi sebagai terapi tambahan terhadap pasien rematik dalam fase tenang. Senam ini adalah salah satu modal untuk memandu mencegah dan memberikan terapi terhadap gejala rematik atau gejala osteoarthritis. ( H Panji irawan, 2011)

Secara umum, lanjut dr Siti, gerakan-gerakan senam rematik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan gerak, fungsi, kekuatan dan daya tahan otot,

kapasitas aerobik, keseimbangan, biomekanik sendi dan rasa posisi sendi. “Senam ini konsentrasinya pada gerakan sendi, sambil meregangkan dan menguatkan ototnya, karena otot-otot itulah yang membantu sendi untuk menopang tubuh,” ( H Panji irawan, 2011)

Senam rematik berlangsung sekitar 20-30 menit dan terdiri dari empat tahapan yakni pemanasan, latihan inti aerobik I, latihan inti aerobik II dan pendinginan. Latihan inti aerobik I gerakannya bersifat low impact dan lebih ditujukan untuk menguatkan kerja jantung dan paru-paru. Latihan aerobik II adalah latihan dasar yang gerakannya lebih ditekankan guna mencegah dan sebagai terapi gejala atau dampak rematik. “Untuk mencapai hasil maksimal, senam aerobik bisa dilakukan 3 hingga 5 kali dalam seminggu. ( H Panji irawan, 2011)

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah berkata,” Bagian organ mana saja yang banyak digerakkan maka akan kuat. Khususnya berkaitan dengan jenis olah raga tersebut, bahkan seluruh kekuatan berawal dari sini, misalnya siapa yang banyak menghapal maka akan kuat hapalannya, siapa yang banyak berfikir maka akan kuat kecerdasan pikirannya. Setiap organ tubuh memiliki organ yang khusus. Adapun menunggang kuda memanah, bergulat dan lomba lari adalah olah raga fisik. semua itu dapat menghilangkan penyakit menahun seperti kusta, busung air, dan sakit perut. ( Zaadul Maad juz 3/ 145 ).

الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَدَبٌ إِلَى اللَّهِ . مَنْ أَمُؤْمِنٍ الضَّعِيفِ



artinya: *“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR. Muslim).*

Ibnu Umar pernah meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah berlomba lari dengan kuda yang kurus , jaraknya sekitar tsaniyatul wada'. Beliau (ibnu Umar ) juga pernah berlomba lari dengan kuda yang tidak kurus dari tsniyatul wada' sampai Masjid Bani Zuraiq dan Ibnu Umar yang menjadi pemenangnya. *Muttafaq alaih (Fathul Bari Juz 6/71 )*

Dalam riwayat lain dari salman bin al akhwaberkata:” Rasulullah Saw berjalan melewati sekelompok lelaki yang sedang berlomba memanah, lalu Rasulullah bersabda,” Memanahlah kalian wahai bani Ismail karena ayah kalian adalah para pemanah, memanahlah sedangkan saya berada pada pihak bani fulan.” Salman melanjutkan,” salah satu kelompok memegang panah ditangannya ( tidak mau berlomba ) Rasulullah lantas bertanya,” Mengapa kalian tidak mau memanah ?” Mereka menjawab,” Bagaimana kami akan memanah sedangkan engkau berada di pihak mereka?” Rasulullah menjawab,” Memanahlah karena aku ada dipihak kalian semua.” ( *Fathul Bari juz 9/91 dan Majma' zawa'id juz 5/ 268 )*

Kedua hadits di atas adalah anjuran Rasulullah agar berolah raga. Peralnya aktifitas ini akan menimbulkan semangat, energi serta fisik yang kuat dan juga memperbaiki metabolisme tubuh sehingga badan akan selalu prima dan terhindar dari berbagai penyakit. kita berolah raga dengan tujuan mengikuti anjuran Rasulullah, dengan begitu kita akan mendapatkan badan yang sehat serta pahala dari Allah.

Hasil uji statistik diperoleh nilai dengan P value  $< 0,05$  maka hubungan dikatakan signifikan yaitu  $P 0,000 < 0,05$ , berarti terdapat pengaruh Olahraga Terhadap Ketidak kambuhan Rematik pada Lanjut Usia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Dan terdapat 2 orang pada kelompok perlakuan yang mengalami kekambuhan rematik karena tidak rutin berolahraga membuat signifikan bilangan akhir. Dan kurang olahraga menyebabkan sirkulasi darah ke pembuluh jaringan kurang.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai tujuan akhir dari suatu penelitian, yang dikemukakan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya. Dari kesimpulan penelitian ini akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi bagi penerapan dan pengembangan hasil penelitian.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasannya maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji statistik diperoleh dengan P value  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti Olahraga memiliki pengaruh terhadap ketidak kambuhan rematik pada lanjut usia.
2. Lanjut usia dipanti sosial tresna werdha gau mabaji kab. Gowa yang rutin berolahraga memiliki tingkat ketidak kambuhan rematik lebih tinggi dibandingkan dengan lanjut usia yang tidak mengikuti olahraga.

#### B. Saran

1. Menghilangkan pikiran- pikiran pada masyarakat yang takut dan malas untuk berolahraga, karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan berolahraga tubuh menjadi sehat dan rentang akan penyakit.
2. Dengan olahraga kita dapat membentengi diri kita dari berbagai penyakit yang ada disamping pola hidup sehat yang kita lakukan, tetapi yang harus kita ingat bahwa olahraga bukan pengganti obat.

3. Pendidikan kesehatan sangat perlu ditingkatkan pada lanjut usia dan keluarganya, agar dapat mengerti dan mau bekerjasama untuk mengatasi masalah yang terjadi pada lanjut usia serta partisipasi aktif keluarga yang sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Rematik demi pengembangan profesi keperawatan.
5. Besar harapan peneliti bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi umat manusia serta sebagai awal dari peneliti dalam pengembangan pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Buniyamin. 2009. Menuju Senja Menjemput Harapan. Edisi 2. Departemen Sosial, Ditjen Yanreasos. Jakarta.
- Davey Patrick. 2005. At. A Glance. Erlangga. Jakarta.
- H Panji Irawan. 2010. Olahraga Yang Aman Untuk Penderita Rematik. (<http://m.okezone.com/read/2010/12/16/195/403941/olahraga-aman-untuk-penderita-rematik>)
- H Panji Irawan. 2010. Atasi Nyeri Sendi. (<http://www.suarakarya-online.com/news.htm/2010/12/16/201596/atasi-nyeri-sendi>)
- Mursito Bambang. 2007. Sehat Di Usia Lanjut Dengan Ramuan Tradisional. Cetakan 7. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Mustari Abdillah. 2007. Konsep Kesehatan Islam( Dalil- dalil Al- Qur'an dan Hadis). UIN Alauddin. Makassar.
- Notoatmojo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, W. 2000. Keperawatan Gerontik. Edisi 2. EGC. Jakarta
- Olivia, dkk. 2004. Seluk Beluk Food Supplement. Edisi 2. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rubenstein, David, dkk. 2008. Kedokteran Klinis. Edisi 6. Erlangga. Jakarta.
- Stanley Mickey. 2006. Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Edisi 2. EGC. Jakarta.
- Wijaya Kusuma Hembing. 2006. Atasi Asam Urat dan Rematik Ala Hembing. Edisi 1. Puspa Swara. Jakarta.

Lampiran 1

Lembaran wawancara

PENGARUH OLAH RAGA TERHADAP KEKAMBUHAN REMATIK

PADA LANSIA USIA DI PANTI SOSIAL TRISNA

WERDHA GAU MABAJI DIGOWA

NO. Responden :

Hari/ Tanggal observasi :

Nama (inisial) :

**Kelompok perlakuan**

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda rutin mengikuti kegiatan olahraga tiap hari dipanti ini?		
2	Apakah anda sering merasa malas mengikuti kegiatan olahraga yang diadakan dipanti ini?		
3	Apakah anda sering merasa takut untuk melakukan kegiatan olahraga ketika rematik anda kambuh?		
4	Apakah rematik anda tidak kambuh setelah berolahraga secara rutin?		
5	Apakah ada perubahan yang signifikan yang anda rasakan pada rematik anda setelah mengikuti olahraga secara rutin?		
6	Apakah anda senang melakukan kegiatan olahraga yang diberikan dipanti ini?		
7	Apakah anda ingin terus melakukan kegiatan olahraga ini?		

Lampiran 1

**Kelompok kontrol**

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda pernah mengikuti kegiatan olahraga tiap hari dipanti ini?		
2	Apakah anda ingin mengikuti kegiatan olahraga yang diadakan dipanti ini?		
3	Apakah anda merasa takut karena tidak pernah melakukan kegiatan olahraga?		
4	Apakah rematik anda masih sering kambuh?		
5	Apakah rematik anda tidak mengalami perubahan karena anda tidak melakukan olahraga secara rutin dipanti ini?		
6	Apakah ada perubahan yang signifikan yang anda rasakan pada rematik anda karena tidak berolahraga sama sekali?		
7	Apakah anda senang dengan tidak mengikuti kegiatan olahraga yang diberikan dipanti ini?		



## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang berjudul "PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP KETIDAK KAMBUHAN REMATIK PADA LANSIA DI PSTW GAU MABAJI KAB. GOWA SULAWESI SELATAN" yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa S1 Keperawatan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR.

Oleh peneliti, saya diharapkan untuk menjawab dan mengisi daftar pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Saya mengerti bahwa tidak ada resiko yang akan terjadi, karena itu jawaban yang saya berikan adalah yang sebenarnya.

Saya mengetahui bahwa, catatan data mengenai penelitian ini akan dirahasiakan, semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya dipergunakan untuk pengolahan data dan jika selesai semua identitas saya akan dimusnakan.

Demikianlah hal saya perbuat, dengan ini saya nyatakan kesediaan saya secara sukarela bersedia dalam penelitian ini tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Gowa, Agustus 2011

Tertanda Responden



Lampiran 3

Tabulasi data kelompok perlakuan dan kontrol

KELOMPOK PERLAKUAN

s/a	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH
1	2	1	1	2	2	2	2	12
2	2	1	1	2	2	2	2	12
3	2	1	1	2	2	2	2	12
4	2	1	1	2	2	2	2	12
5	2	1	1	2	2	2	2	12
6	2	1	1	2	2	2	2	12
7	2	1	1	2	2	2	2	12
8	2	1	2	2	2	2	2	13
9	2	1	1	2	2	2	2	12
10	2	2	1	2	2	2	2	13

KELOMPOK KONTROL

s/a	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH
1	1	2	1	2	2	1	1	10
2	1	2	1	2	2	1	1	10
3	1	2	1	2	2	1	1	10
4	1	1	2	2	2	1	1	10
5	1	1	2	2	2	1	1	10
6	1	2	1	2	2	1	2	11
7	1	1	2	2	2	1	1	10
8	1	2	2	2	2	1	1	11
9	1	2	1	2	1	1	1	9
10	1	2	2	2	2	1	1	11

## 1. Uji Normalitas Data Penelitian

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		VAR00001
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	11.20
	Std. Deviation	1.152
Most Extreme Differences	Absolute	.256
	Positive	.201
	Negative	-.256
Kolmogorov-Smirnov Z		1.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.144
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai alpha sebesar 0,144. Kaidah yang digunakan adalah  $p > 0,05$ , sehingga data penelitian terdistribusi normal.

## 2. Uji Homogenitas Data Penelitian

### Test of Homogeneity of Variances

Kekambuhan

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.231	1	18	.282

Berdasarkan hasil olah data penelitian diperoleh nilai F hitung sebesar 1,231 dengan penyebut ( $df1$ ) = 1 dan pembilang ( $df2$ ) = 18 pada signifikansi sebesar 0,282. Kaidah yang digunakan adalah  $p$  di atas 0,05 maka data homogen.

### 3. Uji Hipotesis Penelitian

**Group Statistics**

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ketidak	1	10	12.20	.422	.133
kambuhan	2	10	10.20	.632	.200

Tabel di atas merupakan tabel statistic deskriptif. Jumlah responden (N) untuk kelompok 1 (kelompok perlakuan) adalah 10 dan jumlah responden untuk kelompok 2 (kelompok kontrol) adalah 10. Mean variable ketidak kambuhan rematik pada kelompok perlakuan sebesar 12,20 sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 10,20.

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Ketidak kambuhan	Equal variances assumed	1.231	.282	8.321	18	.000	2.000	.240	1.495	2.505
	Equal variances not assumed			8.321	15.680	.000	2.000	.240	1.490	2.510

Table di atas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 8,321 dengan signifikansi sebesar 0,000. Kaidah yang digunakan adalah jika signifikansi dibawah atau sama dengan 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.  $0,000 < 0,05$  sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan ketidak kambuhan penyakit rematik pada kelompok perlakuan dan kelompok

control. Lansia yang rutin mengikuti olahraga memiliki tingkat ketidak kambuhan rematik yang lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang tidak mengikuti olahraga.



## BIODATA PENULIS



### Identitas:

Nama : Mardewi Rasyid  
Tempat Tanggal Lahir : Sabang Subik, 13 Januari 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Manuruki 14 no. 17 Makassar

### Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 032 INP Pambusuang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mamasa selesai Tahun 2001
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neg. 2 Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali mamasa selesai pada Tahun 2004
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Neg 1 Tinambung, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali mamasa selesai pada tahun 2007
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Jurusan Keperawatan pada tahun 2007-2011