

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANEMIA  
PADA IBU HAMIL DI RSIA SITI FATIMAH  
MAKASSAR



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar*

Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M / NIM: 70300107079 A R

**SOPIANA**

NIM: 70300107079

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat dan dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang dipeoleh karenanya, batal karena hukum.

Makassar, 28 juli 2011

Penyusun,

**SOPIANA**

NIM 70300107079



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar 2011, yang disusun oleh Sopiana, Nim: 70300107079, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 M, bertepatan dengan 2 Ramadhan 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 02 Agustus 2011 M

3 Ramadhan 1432 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasnah, S, SiT, M. Kes (.....)

Sekretaris : Hj. Asriany, SKM, M. Kes (.....)

Penguji I : Hj. Halwatiah, S. Kep.Ns, M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. A. Aderus. Lc. MA (.....)

Diketahui Oleh:

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, MA**

Nip: 19520811 198203 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي اجتنب عن الغافلين، وزين بعلم العاملين، صلاة وسلاما على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.dengan judul *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar"*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan, namun banyak pihak yang telah berpartisipasi secara aktif dalam membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun yang materil yang mampu membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak lupa rasa hormat yang teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Anhar dan Ibunda Melliana atas segala doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga selama masa pendidikanku baik moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk semua kesabaran dan ketegaran yang telah kalian ajarkan kepadaku dalam menapaki jalan hidup ini. Serta kepada semua

keluarga yang tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Prof. Dr.H.A.Qadir Gassing HT,MS sebagai Rektor dan para Pembantu Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad N. Sewang, MA sebagai Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya.
3. Nur Hidayah, S.Kep,Ns, M.Kes sebagai ketua Jurusan Keperawatan yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Hasnah, S, SiT, M. Kes selaku pembimbing I dan Hj. Asriany, SKM, M. Kes selaku pembimbing II dengan segala keikhlasan dan kesediannya memberikan bimbingan dan masukan yang berarti kepada penulis.
5. Hj. Halwatiah, S. Kep, Ns, M. Kes selaku penguji I dan Dr. H. A. Aderus. Lc. MA selaku penguji II yang memotivasi penulis dengan saran dan kritiknya.
6. Dosen jurusan Keperawatan UIN yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan segenap pegawai akademik.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap stafnya
8. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar beserta staf-stafnya yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada Ibu Hamil yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Kepada kakak Senior jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
11. Kepada Teman-teman, Keperawatan terkhusus Keperawatan B ,dan teman-teman angkatan '07 lainnya atas segala bantuan dan kerjasamanya,

kebersamaan di antara kita telah menggoreskan kenangan indah yang tidak akan pernah pudar oleh apapun.

12. Kepada Sahabat-sahabatku keperawatan B yang selama ini selalu memberiku semangat: Niar, Novy, Rizma, Dely, Dewi. Serta kepada sahabat-sahabatku anak Pangkep : Idong, Ita, Yayya, Chia, Melly, Mila, Hafzah. Terima kasih untuk semangat, doa dan kebersamaan serta dukungannya selama ini . Semoga Allah senantiasa menjaga dan mempererat tali ukhuwah di antara kita.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa dilanjutkan dan memberikan sumbangsih yang besar baik itu bagi penulis.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb*

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Makassar,

2011

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Abstrak .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
1. Tujuan Umum .....	6
2. Tujuan Khusus .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	8
1. Definisi Kehamilan.....	8
2. Pandangan Islam Tentang Kehamilan .....	9
3. Tanda-tanda Kehamilan.....	15
4. Perubahan Fisiologi Kehamilan .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anemia Dalam Kehamilan .....	19
1. Definisi Anemia.....	19
2. Klasifikasi Anemia Dalam Kehamilan .....	22
3. Etiologi Anemia Pada Ibu Hamil .....	24
4. Patofisiologi Anemia Dalam Kehamilan.....	34
5. Penilaian Gejala Klinik .....	35
6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Janin Secara Umum.....	37
7. Penanganan Anemia.....	38
<b>BAB III   KERANGKA KONSEPTUAL</b>	

A. Kerangka Konseptual Penelitian .....	41
B. Kerangka Kerja .....	42
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	42
1. Umur .....	43
2. Paritas.....	44
3. Jarak Kehamilan .....	44
4. Kunjungan ANC .....	44
D. Hipotesis Penelitian.....	45
 BAB IV   METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
C. Tehnik Sampling .....	47
D. Pengambilan Data .....	47
E. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
F. Pengolahan Data.....	48
G. Teknik Analisa Data.....	49
H. Etika Penelitian .....	50
 BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan.....	58
C. Keterbatasan Penelitian.....	71
 BAB VI   PENUTUP	
D. Kesimpulan .....	72
E. Saran .....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Jadwal Pemberian Imunisasi TT .....	29
Tabel 5.1 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Anemia Ibu Hamil Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	53
Tabel 5.2 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	53
Tabel 5.3 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Ibu Hamil Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	54
Tabel 5.4 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan Ibu Hamil Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	54
Tabel 5.5 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kunjungan ANC Ibu Hamil Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	55
Tabel 5.6 : Hubungan Umur Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia Pada Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	55
Tabel 5.7 : Hubungan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia Pada Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	56
Tabel 5.8 : Hubungan Jarak Kehamilan Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia Pada Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	57
Tabel 5.9 : Hubungan Kunjungan ANC Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia Pada Trimester II di RSIA St. Fatimah Makassar 2011 .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar .....	
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian .....	
Lampiran 3 Analisa Data Penelitian .....	
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Judul .....	
Lampiran 5 Surat Permohonan Tempat Penelitian dari UIN Alauddin Makassar.....	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Makassar .....	
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.....	
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.....	
Lampiran 9 Lembar Pengesahan Ujian Tutup .....	
Lampiran 10 Daftar Biodata Penulis.....	

**ABSTRAK**

**Nama** : SOPIANA  
**NIM** : 70300107079  
**Judul** : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011.  
**Pembimbing 1** : Hasnah, S, SiT, M. Kes  
**Pembimbing II**: Hj. Asriany, SKM, M. Kes

---

Anemia adalah kondisi dimana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dibawah nilai normal yang dapat disebabkan karena kekurangan zat besi sehingga berdampak pada ibu dan janinya. Anemia pada kehamilan memerlukan perhatian yang serius sehingga kehamilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti mengambil judul “faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh umur, paritas, kunjungan ANC dan jarak kehamilan terhadap anemia ibu hamil.

Desain penelitian adalah *Cross Sectional Study*. Jumlah populasi sebanyak 42 ibu hamil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. Sumber data diperoleh melalui data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu dengan analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan table distribusi frekuensi dengan uji *Chi-square*. Variabel penelitian ini mencakup variabel dependen yaitu anemia dan variabel independen yaitu umur, paritas, jarak kehamilan dan kunjungan ANC.

Dari penelitian yang dilaksanakan dengan jumlah responden 42 ibu hamil diperoleh hasil: umur resiko rendah terdapat 7 orang (31,8%) anemia dan 15 orang (68,2%) yang tidak anemia, sedangkan umur resiko tinggi terdapat 16 orang (80,0%) anemia dan 4 orang (20%) tidak anemia. Paritas resiko rendah terdapat 4 orang (21,1%) anemia dan 15 orang (78,9%) tidak anemia, sedangkan paritas resiko tinggi terdapat 19 orang (82,6%) anemia dan 4 orang (17,4%). Jarak kehamilan resiko rendah terdapat 10 orang (41,7%) anemia dan 14 orang (58,3%) tidak anemia, sedangkan jarak kehamilan resiko tinggi terdapat 13 orang (72,2%) anemia dan 5 orang (27,8%) tidak anemia. Kunjungan ANC resiko rendah terdapat 14 orang (46,7%) anemia dan 16 orang (53,3%) tidak anemia, sedangkan kunjungan ANC resiko tinggi terdapat 9 orang (75,0%) anemia dan 3 orang (25,0%) tidak anemia.

Kesimpulan dari hasil penelitian ialah menunjukkan terdapat pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil ( $\rho = 0,002$ ). Terdapat pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil ( $\rho = 0,000$ ). Terdapat pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil ( $\rho = 0,049$ ). Tidak terdapat pengaruh kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil ( $\rho = 0,096$ ).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehamilan merupakan anugrah terindah bagi setiap wanita. Bagi wanita mengetahui sedini mungkin bahwa dirinya positif hamil adalah sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa minggu pertama kehamilan, akan terjadi pembentukan organ-organ tubuh vital. Perubahan-perubahan fisik dan emosi pada diri ibu hamil biasanya terjadi pada setiap trimester selama kehamilan (Winkjosastro, 2002).

Kehamilan merupakan hasil konsepsi antara ovum (sel telur) dengan spermatozoa. Lama kehamilan mulai sampai partus adalah 280 hari (40 minggu) dan antara tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan merupakan saat yang menyenangkan dan dinanti-nanti, tetapi juga dapat menjadi kegelisahan dan keprihatinan ketika ibu mengalami anemia dalam kehamilan (Prawihardjo, 2005).

Anemia merupakan kondisi kurangnya sel darah merah (Hemoglobin) dalam darah dibawah nilai normal. Anemia yang paling sering terjadi dalam kehamilan adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Hal ini dapat disebabkan karena asupan makanan yang kurang, karena gangguan resorpsi, gangguan penggunaan atau terlalu banyaknya zat besi keluar dari badan, misalnya pada saat perdarahan (Sastro, 2002).

Anemia pada kehamilan banyak terjadi di daerah pedesaan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang makanan sehat

dan bergizi sehingga anemia menjadi semakin parah. Anemia pada kehamilan memerlukan perhatian yang serius sehingga kehamilan dapat berlangsung normal (Manuaba, 2004).

Kehamilan trimester pertama merupakan kejadian anemia yang dipengaruhi oleh kondisi ibu sebelum kehamilan. Banyak ibu hamil yang memasuki kehamilannya dalam keadaan anemia. Pada trimester kedua dan ketiga dimana terjadinya peningkatan volume darah dalam tubuh sekitar 50 persen karena telah memerlukan tambahan darah untuk mensuplai oksigen dan makanan bagi pertumbuhan janin. Namun peningkatan volume darah yang hanya 18 persen, sehingga terjadi hemodilusi yang dimulai pada umur kehamilan 32 sampai 36 minggu. Hal ini berpengaruh terhadap anemia fisiologis pada ibu, jika pada masa tersebut asupan gizi kurang dan ibu tidak mengkonsumsi tablet besi maka akan berpengaruh terjadinya anemia yang lebih berat (Manuaba, 2004).

Tingginya prevalensi anemia yang terjadi pada ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap ibu dan janin selama masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Dampak yang terjadi akibat anemia pada ibu hamil adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Prematuritas, Perdarahan Post Partum serta Partus Lama. Ibu dengan kehamilan yang lebih banyak dari biasanya atau lebih dari tiga kali akan makin banyak kehilangan zat besi dan menyebabkan terjadinya anemia (Maimunah, 2005).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2005, bahwa setiap tahunnya wanita yang bersalin meninggal dunia mencapai lebih

dari 500.000 orang (Winkjosastro, 2005), dan juga melaporkan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35 sampai 75 persen, serta semakin meningkat seiring dengan penambahan usia kehamilan.

Anemia defisiensi zat besi lebih cenderung berlangsung di negara yang sedang berkembang dari pada negara yang sudah maju. 36 persen (atau sekitar 1400 juta orang) dari perkiraan populasi 3800 juta orang di negara yang sedang berkembang menderita anemia jenis ini, sedangkan prevalensi di negara maju hanya sekitar 8 persen (atau kira-kira 100 juta orang) dari perkiraan populasi 1200 juta orang.

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2005, angka kematian ibu mencapai 262 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun faktor penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 40 sampai 60 persen preeklamsi dan eklamsi 20 sampai 30 persen, infeksi 20 sampai 30 persen. Perdarahan merupakan faktor terbesar penyebab tingginya AKI. Adapun penyebab tidak langsung kesakitan dan kematian ibu adalah kejadian anemia pada ibu hamil sekitar 51 persen dan pada ibu nifas 45 persen serta karena Kurang Energi Protein (Nina, 2008).

Data Sulawesi Selatan tahun 2005 sebanyak 3.467 ibu hamil yang menderita anemia, pada tahun 2006 sebanyak 2.340 ibu hamil, dan pada tahun 2007 sebanyak 2.272 ibu hamil (Data Dinkes Sul-Sel. 2008). Pada pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa kebanyakan anemia yang diderita masyarakat adalah karena kekurangan zat besi yang diatasi

melalui pemberian zat besi secara teratur dan peningkatan gizi (Nina, 2008).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada tahun 2009, terdapat 281 ibu hamil yang mengalami anemia. Pada tahun 2010 terdapat 390 ibu hamil yang mengalami anemia.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Vendaswari (2005) mengemukakan bahwa faktor utama yang menyebabkan anemia pada ibu hamil adalah umur, paritas, jarak kehamilan dan kunjungan ANC.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2004), faktor resiko umur ibu hamil di bawah 20 tahun atau di atas 30 tahun berisiko 9,70 kali mengalami anemia. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil. Hal ini dikarenakan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janin, berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia.

Wintrobe (2006) menyatakan bahwa usia ibu dapat mempengaruhi timbulnya anemia, yaitu semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya. Paritas di atas atau sama dengan 4 kali lebih berisiko 4,148 kali mengalami anemia dibandingkan dengan paritas 1 sampai 4. Frekuensi pemeriksaan ANC kurang dari 4 kali akan berisiko 5,921 kali mengalami anemia dibandingkan dengan pemeriksaan ANC lebih atau sama dengan 4 kali.

Kebutuhan ibu hamil selama kehamilan ialah 800 mg besi, diantaranya 300 mg untuk janin plasenta dan 500 mg untuk penambahan eritrosit ibu.

Dengan demikian ibu membutuhkan tambahan sekitar 2 sampai 3 mg besi perhari (Saifuddin, 2006).

Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”.

Permasalahan dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
2. Bagaimana pengaruh paritas kejadian anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
3. Bagaimana pengaruh jarak kehamilan kejadian anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
4. Bagaimana pengaruh kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil.
- b. Untuk mengetahui pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil ini akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan maternitas

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi ibu hamil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ibu hamil terutama pentingnya pemeriksaan kehamilan untuk menghindari terjadinya anemia dalam kehamilan

### b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan bahan bacaan bagi Mahasiswa Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan bagi peneliti selanjutnya.

### c. Bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah

Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan dan penanggulangan faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil dan diharapkan para dokter dan bidan memantau ibu hamil dengan memeriksa kadar hemoglobin pada setiap wanita hamil.

### d. Bagi peneliti sendiri

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan nyata yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil sehingga dapat menambah wawasan peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan**

##### **1. Definisi Kehamilan**

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir sampai terjadinya permulaan persalinan (Manuaba, 2004).

Kehamilan merupakan hasil konsepsi antara ovum atau sel telur dengan spermatozoa. Lama kehamilan terjadi mulai sejak konsepsi sampai partus adalah 280 hari atau 40 minggu dan antara tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 sampai 36 minggu disebut premature (Farrer, 2001).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua yaitu dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, dkk, 2006).

Kehamilan adalah masa seorang ibu membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Dalam kehamilan dapat terjadi banyak gestasi yakni misalnya dalam kasus kembar atau triplet. Kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran atau 38 minggu dari

pembuahan. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravid, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0 (Farrer, 2001).

## 2. Pandangan Islam Tentang Kehamilan

### a. Proses Kejadian Manusia

Allah s.w.t. sebagai pencipta makhluk, telah menjelaskan proses demi proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang perempuan. Proses perubahan janin dari setetes mani hingga menjadi manusia yang sempurna. Sebelum teknologi berkembang, hal itu merupakan perkara ghaib yang tidak diketahui oleh manusia, karena letaknya yang sangat dalam. Belum ada alat yang dapat menjangkau hingga ke dalam rahim tersebut (Thalbah, 2009).

Al-Qur'an menjelaskan proses kejadian manusia sebagai berikut :

- 1) Manusia diciptakan Allah s.w.t. Berasal dari saripati tanah, (QS. Al Hijr (15) : 28).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan peristiwa kejadian atau kehidupan manusia di persada bumi ini. Betapa mengagumkan Allah s.w.t. dalam ciptaan-Nya. Dia menciptakan dari unsur-unsur yang remeh dan menjijikkan yaitu dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam menjadi satu makhluk yakni Manusia (Quraisy Shihab, 2002).

- 2) Dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah (didalam rahim), segumapal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna (QS.Almukminun (23) : 12-14 ).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ﴿١٤﴾  
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12), kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14). (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan kuasa Allah s.w.t. menciptakan manusia melauai tujuh tahap proses kejadian manusia yang sangat mengagumkan sehingga ia lahir di bumi ini. Allah s.w.t. juga mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat-Nya. Proses penciptaan

manusia yang mengagumkan tersebut membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta (Quraisy Shihab, 2002).

- 3) Ditiupkan Ruh (QS. Al Hijr (15) : 29).

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud, (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika Allah s.w.t telah menyempurnakan bentuknya (manusia) dengan sebaik-baiknya, akan ditiupkan ke dalamnya roh ciptaan-Nya yang dapat mengantar manusia lebih mampu mengenal Allah s.w.t. Sehingga manusia akan lebih beriman, berbudi luhur, serta berperasaan halus (Quraisy Shihab, 2002).

- 4) Sebelum Ruh ditiupkan, ketika masih di alam ruh, manusia telah berjanji mentauhidkan Allah (QS. Al A'raf (7) : 172).

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ

هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami),

Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika manusia masih berada dalam rahim ibunya, manusia sudah berjanji akan mentauhidkan Allah s.w.t. sebelum ia lahir di muka bumi ini.

Ayat-ayat di atas menerangkan tahap-tahap penciptaan manusia dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya sehingga *Allah Jalla wa 'Alaa* saja yang berhak untuk disembah (Al Atsari, 2010). "*Allah Jalla wa Alaa*" adalah Allah Maha Agung dan di Atas segala-galanya. Kata "jalla" merupakan kata kerja intransitif yang kata sifatnya adalah "jalil" yang artinya "agung". Kata "Wa" artinya adalah "dan". Kata "Alaa" artinya adalah "Di Atas". Sehingga jika digabungkan kata-kata "Jalla wa Alaa" berarti Allah Yang Maha Agung dan di Atas Segala-galanya.

Selama 160 hari yaitu selama 16 minggu (4 bulan) telah terjadi perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut antara lain bentuk kepala masih dominan, wajah menyerupai manusia, pada pemeriksaan kasar mata dan telinga serta hidung mulai menyerupai bentuk sebenarnya, perbandingan lengan sampai kaki sesuai serta muncul rambut pada bagian kepala.

Usia kehamilan 20 minggu terjadi perkembangan antara lain tungkai sangat bertambah panjang, mulai terlihat kelenjar sebacea, hidung dan telinga membentuk tulang, secara kasar otak terbentuk dan gerakan janin

cukup kuat untuk dapat dirasakan ibu. Kehamilan 24 minggu terjadi perkembangan yakni tubuh janin menjadi langsing tetapi dengan perbandingan sesuai, kulit menjadi merah dan berkeriput, pembentukan kelenjar keringat, pembentukan darah meningkat dalam sum-sum tulang dan janin dapat mendengar.

Usia kehamilan 28 minggu terjadi perkembangan yakni badan langsing, keriput berkurang dan berwarna merah, terbentuk kuku, kelopak mata terbuka kembali, lapisan retina selesai dibentuk, dapat menerima cahaya dan pupil dapat bereaksi terhadap cahaya.

Usia kehamilan 30 sampai 31 minggu terjadi perkembangan yakni lemak subkutan mulai terkumpul, tampak lebih bulat, kulit merah muda dan licin, mengambil posisi persalinan, dapat menengok ke samping, sadar akan suara dari luar tubuh ibu dan testis turun ke dalam skrotum.

Usia kehamilan 36 minggu terjadi perkembangan yakni kulit janin berwarna merah muda, tubuh bulat, tubuh biasanya gemuk, dapat membalik dan mengangkat kepala. Usia kehamilan 40 minggu terjadi perkembangan yakni kulit halus dan berwarna merah muda, rambut sedang atau banyak, tampak tulang rawan hidung dan cuping hidung, gerakan aktif dan perlahan, tonus baik, dapat mengangkat kepala, percabangan paru-paru, siklus tidur sampai bangun teratur, testis di dalam skrotum dan labia mayora berkembang baik (Lamadhah, 2009).



Diungkapkan dalam Hadis Rasulullah saw mengenai proses penciptaan manusia yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَضِيٍّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ (أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلُ ذَلِكَ) (رَأَوْهُ الْبُحَارِ وَمُسْلِمٌ).

Artinya :

“Dari Abu Abdirahman, Abdullah Bin Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah SAW, orang yang benar (Ash Shadiq) lagi dibenarkan (Al Mashduq), bercerita kepada kami, “Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut (rahim) ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi ‘Alaqah selama empat puluh hari juga. Kemudian menjadi mudhghah selama empat puluh hari juga. Setelah itu, ada seorang malaikat yang diutus padanya, kemudian ia meniupkan ruh kepadanya”, (Riwayat Bukhari Muslim).

#### b. Hubungan Antara Menyusui dan Kehamilan

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pokok dan paling baik bagi anak terutama ketika hari-hari pertama kelahirannya. Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberikan ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia 2 tahun (Al Atsari, 2010). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, (Alquran dan terjemahan, 2010).

Al-Qur`an dengan tegas menyebutkan bahwa waktu yang ideal adalah dua tahun. Hal ini dikarenakan di balik perintah al-Qur`an mengandung pesan yang ideal. Selama kurun waktu dua tahun, bayi mudah terserang penyakit dan kandungan ASI bisa melawan serangan penyakit yang hendak menyerang tubuh sang bayi. ASI juga memiliki manfaat besar membentuk perkembangan intelensia, rohani serta perkembangan emosional sang bayi. Dekapan ibu ketika menyusui bayinya bisa bersentuhan langsung dengan ibu dan mendapat kehangatan kasih sayang dan rasa aman (Quraisy Shihab, 2002).

### 3. Tanda-tanda Kehamilan

Seorang wanita dikatakan hamil perlu dilakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap data subyektif dan obyektif pada wanita

tersebut. Data subyektif artinya segala sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh wanita yang sedang hamil atau sering disebut dengan gejala kehamilan. Data obyektif adalah segala hal yang dapat diamati oleh orang lain pada diri seorang wanita yang sedang hamil atau diistilahkan dengan tanda kehamilan. Firman Allah s.w.t. dalam QS. Al-Imran (3) : 41 yaitu:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَاتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۖ وَادْكُرْ رَبَّكَ  
كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari", (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah s.w.t. memberikan Zakariya tanda atas kehamilan istrinya. Tanda istri Zakariya mengandung ialah bahwa Zakariya sendiri tidak dapat berbicara dengan orang lain selama tiga hari. Selama tiga hari itu dia hanya dapat mempergunakan isyarat dengan tangan dan kepala, Zakariya tidak lalai dari berzikir dan bertasbih kepada Allah. Allah s.w.t. menjadikan Zakaria tidak bisa berbicara selama tiga hari agar seluruh waktunya dipergunakan untuk zikir dan bertasbih kepada-Nya sebagai pernyataan syukur yang hakiki (Quraisy Shihab, 2002).

a. Tanda dugaan kehamilan

1) Amenore (terlambat datang bulan)

- 2) Mual dan muntah. Hal ini terjadi karena pengaruh esterogen dan progesteron yakni terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan
  - 3) Ngidam
  - 4) Sinkope atau pingsan. Hal ini terjadi karena gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf dan menimbulkan sinkop.
  - 5) Payudara tegang. Hal ini terjadi karena pengaruh esterogen, progesteron dan somatomotropin menimbulkan deposit lemak dan air serta garam pada payudara.
  - 6) Sering miksi. Hal ini terjadi karena desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi.
  - 7) Konstipasi atau Obstipasi. Hal ini terjadi karena pengaruh progesteron yakni menghambat peristaltik usus menyebabkan kesulitan untuk buang air besar.
  - 8) Pigmentasi kulit pada daerah pipi, dinding perut dan sekitar payudara
  - 9) Varices atau penampakan pembuluh darah vena (Manuaba, 2004).
- b. Tanda-tanda Kemungkinan Kehamilan
- 1) Perut membesar
  - 2) Uterus membesar
  - 3) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif
- c. Tanda Pasti Kehamilan
- 1) Gerakan janin dalam rahim : Terlihat atau teraba gerakan janin dan teraba bagian – bagian janin.

- 2) Denyut jantung janin, didengar dengan stetoskop laenec, alat kardiografi, alat doppler (Manuaba, 2004).

#### 4. Perubahan Fisiologi Kehamilan

Secara fisiologi ibu mengalami perubahan nyata untuk menunjang perkembangan janin dan sebagai persiapan ibu dalam persalinan dan laktasi. Perubahan fisiologi pada ibu selama kehamilan tersebut antara lain :

##### a. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perubahan payudara tersebut disebabkan karena adanya pengaruh hormon Estrogen dan Progesteron serta Somatomammotropin.

Hormon Estrogen berfungsi menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam sehingga payudara tampak makin membesar, tekanan sistem saraf akibat penimbunan lemak, air dan garam menyebabkan rasa sakit pada payudara.

Hormon Progesteron berfungsi mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi dan menambah jumlah sel asinus.

Hormon Somatomammotropin berfungsi melakukan penimbunan lemak sekitar alveolus payudara dan merangsang pengeluaran kolostrum pada kehamilan.

##### b. Rahim atau Uterus

Pertumbuhan uterus yang fenomenal pada trimester pertama berlanjut sebagai respon terhadap stimulus kadar hormon estrogen dan progesteron. Rahim yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 gram akan mengalami hipertropi dan hyperplasia sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Pada minggu ke tujuh ukuran uterus sebesar ayam negeri, pada minggu ke 10 uterus mencapai ukuran buah jeruk, pada minggu ke 12 uterus mencapai ukuran buah grafepruit (jeruk asam yang berwarna kuning yang besarnya sekitar dua kali jeruk biasa), dan pada minggu ke 40 gestasi. Uterus juga mengalami perubahan berat dan posisi. Dinding-dinding otot menguat dan menjadi lebih elastis. Selama trimester kedua bentuk uterus bulat. Hal ini dikarenakan janin yang memanjang, uterus menjadi lebih besar, lebih lonjong dan membesar keluar rongga panggul menuju rongga abdomen.

#### c. Vagina

Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Peningkatan vaskularisasi menimbulkan warna kebiru-biruan yang disebut tanda chadwicks suatu tanda kehamilan dan dapat muncul pada minggu keenam, tetapi dengan mudah terlihat pada minggu ke 8 kehamilan (Janes & Melvyn, 2007).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anemia Dalam Kehamilan**

### **1. Definisi Anemia**

Anemia (dalam bahasa Yunani: Tanpa darah) adalah keadaan dimana jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pembawa oksigen) berada dibawah normal ( wikipedia) (herlina, 2008).

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar Hb rendah dibawah normal. Dikatakan sebagai anemia bila Hb kurang dari 14 g% pada pria dan Hb kurang dari 12 g% pada wanita (Arif, dkk, 2001).

Anemia merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan jumlah sel darah merah. Menurut WHO, anemia didefinisikan sebagai Hb kurang dari 13 g% untuk laki-laki dan Hb kurang dari 12 g% untuk wanita (Sudoyono, 2007).

Menurut WHO kejadian anemia ibu hamil berkisar 20 persen sampai 89 persen dengan menetapkan Hb 11 gr/dl sebagai dasar. Menurut depkes RI, wanita hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gr/dl dan tidak anemia jika hemoglobin lebih atau sama dengan 11 gr/dl.

Anemia adalah menurunnya kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah sel darah merah dan berkurangnya konsentrasi hemoglobin (Manuaba, 2004).

Pengertian anemia dari beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa anemia adalah kondisi dengan kadar Hb berada di bawah normal. Anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gr/dl dan tidak anemia jika hemoglobin lebih atau sama dengan 11 gr/dl.

Anemia pada masa kehamilan merupakan anemia tipe defisiensi besi yakni sekitar 80 persen (Arias, 1993).

Wanita memerlukan zat besi lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini dikarenakan pada wanita terjadi menstruasi dengan perdarahan sebanyak 50 sampai 80 cc setiap bulan dan akan kehilangan zat besi sebesar 30 sampai 40 mg. Pada wanita juga terjadi kehamilan dan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Seorang wanita yang mengalami kehamilan dan melahirkan lebih banyak dari biasanya akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis. Gambaran akan kebutuhan pada setiap kehamilan antara lain :

Meningkatkan sel darah ibu	500 mgr Fe
Terdapat dalam plasenta	300 mgr Fe
Untuk darah janin	100 mgr Fe

---

Jumlah	900 mgr Fe
--------	------------

Kebutuhan ibu terhadap zat besi akan meningkat selama kehamilan. Kebutuhan tersebut untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Zat besi yang perlu disimpan selama hamil sebesar 200 sampai 300 persen atau sama dengan 1040 mg zat besi. Suplementasi zat besi perlu untuk diberikan pada ibu hamil bahkan kepada ibu yang bergizi baik. Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menelan zat besi sebanyak 30 mg tiap hari. Takaran ini tidak akan terpenuhi hanya melalui makanan. Oleh sebab itu suplemen sebesar 30 sampai 60 mg dimulai pada minggu ke 12 kehamilan yang



diteruskan sampai 3 bulan pasca partum perlu untuk diberikan setiap hari (Arisman, 2004).

## 2. Klasifikasi Anemia dalam Kehamilan

Anemia dalam kehamilan dapat dibagi sebagai berikut: (Winkjaosastro, 2002).

### a. Anemia defisiensi zat besi

Anemia dalam kehamilan yang paling sering ialah anemia akibat kekurangan besi. Kekurangan ini disebabkan karena kurang masuknya unsur dengan makanan, karena gangguan reabsorpsi, gangguan penggunaan atau terlalu banyaknya zat besi keluar dari badan, misalnya pada saat perdarahan. Keperluan akan zat besi jika tidak ditambah dalam kehamilan, maka dengan mudah akan terjadi anemia defisiensi besi, terlebih pada kehamilan kembar.

Zat besi dibutuhkan lebih banyak saat kehamilan dari pada saat tidak hamil. Pada kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Kebutuhan akan zat besi pada setiap trimester kehamilan berbeda-beda. Pada awal kehamilan atau trimester pertama, zat besi dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang janin. Zat besi pada trimester kedua dibutuhkan karena terjadi peningkatan volume plasma darah sebanyak 35 persen, kebutuhan ini sama dengan 450 mg zat besi

untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sel darah merah harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk kebutuhan janin karena darah dibutuhkan untuk mensuplai oksigen dan makanan bagi pertumbuhan janin dan akan berlanjut pada trimester ketiga.

b. Anemia megaloblastik

Anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh karena kekurangan asam folik, jarang sekali karena kekurangan Vitamin B12. Anemia megaloblastik dalam kehamilan disebabkan karena defisiensi asam folik (Pteroylglutamic Acid), jarang terjadi karena defisiensi makanan. Pada umumnya asam folik tidak diberikan secara rutin, kecuali di daerah-daerah dengan frekuensi anemia megaloblastik yang tinggi. Gejalanya diare, lidah licin dan agak ikterus (Mansjoer, 2001).

c. Anemia hipoplastik

Anemia hipoplastik ialah anemia yang disebabkan karena sum-sum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Dampak yang ditimbulkan ialah gejala demam dan perdarahan (Mansjoer, 2001).

d. Anemia hemolitik

Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Gejala utama adalah kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatannya tergantung pada jenis anemia hemolitik serta penyebabnya. Bila disebabkan oleh infeksi maka infeksinya diberantas dan diberikan obat-obat penambah darah.

Namun pada beberapa jenis obat-obatan, hal ini tidak memberi hasil, sehingga transfusi darah berulang dapat membantu penderita ini, gejalanya hemolisis antara lain ikterus (Mansjoer, 2001).

### 3. Etiologi Anemia Pada Ibu Hamil

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia dalam kehamilan diantaranya ialah :

#### a. Umur

Umur ibu saat hamil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan kehamilan. Hal ini dikarenakan umur berkaitan erat dengan perlindungan alat-alat reproduksi.

Umur ibu mempunyai pengaruh yang erat dengan alat reproduksi wanita. Umur reproduksi yang ideal bagi wanita untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 35 tahun. Keadaan ini disebabkan karena pada umur kurang dari 20 tahun rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik, belum cukup dewasa untuk menjadi ibu. Umur 35 tahun keatas, elastisitas otot-otot panggul dan sekitarnya serta alat-alat reproduksi pada umumnya telah mengalami kemunduran sehingga dapat mempersulit persalinan dan dapat menyebabkan kematian bayi dan ibu (Winkjosastro, 2002).

Umur reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 20 sampai 35 tahun. Kehamilan diusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dapat menyebabkan anemia. Hal tersebut dikarenakan pada kehamilan diusia

dibawah 20 tahun secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami keguncangan dan akan mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilan, pengalaman dan pengetahuan tentang persiapan dan pemeliharaan kehamilan masih rendah.

Kehamilan diusia ibu jika diatas 35 tahun ,dalam tubuh telah terjadi perubahan-perubahan akibat penuaan organ. Keadaan seperti itu kemungkinan akan menimbulkan penyakit dalam masa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit hipertensi, keracunan kehamilan, preeklamsi atau eklamsi, diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah (Ridwanamiruddin, 2004).

Ibu dengan umur dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil. Hal tersebut dikarenakan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu dan janin. Dampaknya antara lain akan berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia.

Wintrobe (2000), menyatakan bahwa usia ibu dapat mempengaruhi timbulnya anemia, yakni semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya. Muhilal et al (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat kecendrungan semakin tua umur ibu hamil maka presentasi anemia semakin besar.

b. Paritas

Paritas secara luas mencakup gravida atau jumlah kehamilan, prematur atau jumlah kelahiran, dan abortus atau jumlah keguguran. Paritas dalam arti khusus yaitu banyaknya anak yang dilahirkan (Winkjosastro, 2002).

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh ibu (BKKBN, 2006). Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup diluar rahim yakni 28 minggu (manuaba, 2008).

Paritas adalah jumlah kehamilan ibu. Kehamilan tersebut dapat berupa janin hidup maupun janinyang telah mati setelah viabilitas dicapai. Viabilitas adalah kapasitas untuk hidup di luar uterus, sekitar 22 minggu periode menstruasi atau 20 minggu kehamilan atau berat janin lebih dari 500 gr (Bobak, 2004).

Paritas tinggi merupakan salah satu faktor risiko pada ibu hamil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kehamilan yang berulang-ulang dapat menyebabkan rahim ibu tidak sehat lagi untuk kehamilan berikutnya sehingga menyebabkan ibu akan kehilangan banyak zat besi. Pada waktu melahirkan akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah dinding rahim yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin (Winkjosastro, 2002).

Anemia dapat terjadi pada ibu dengan paritas tinggi. Hal tersebut dikarenakan keadaan biologis ibu dan asupan zat besi yang kurang selama kehamilan. Anemia dalam hal ini terkait dengan kehamilan sebelumnya dimana apabila cadangan zat besi di dalam tubuh berkurang,

maka kehamilan akan menguras persediaan besi tubuh dan akan menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. Paritas di atas 4 kali merupakan paritas yang beresiko dalam kehamilan (Ridwanamiruddin, 2004).

Paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetric dan pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dengan paritas tinggi adalah perdarahan antara partum, hipertensi, diabetes mellitus. Paritas 2 sampai 3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Paritas tinggi (lebih dari 3 kali) dengan jarak melahirkan singkat atau dibawah 2 tahun dapat menimbulkan kejadian perdarahan pasca persalinan yang lebih tinggi (Fauziah A, 2009).

Paritas merupakan jumlah persalinan yang dialami oleh ibu. Paritas terdiri atas tiga kelompok yaitu:

- 1) Golongan primipara adalah golongan ibu dengan 0 sampai 1 paritas
- 2) Golongan multipara adalah golongan ibu dengan paritas 2 sampai 6
- 3) Golongan grande multipara adalah golongan ibu dengan paritas lebih dari 6 (Bobak, 2004).

c. Kunjungan Antenatal Care

Antenatal Care (ANC) adalah perawatan sebelum persalinan. Perawatan tersebut terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim (Bobak, 2004).

Abdul Saifuddin mengemukakan bahwa Antenatal Care adalah pelayanan kesehatan bagi ibu dan janin. Pelayanan tersebut dilakukan oleh tenaga profesional. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar pelayanan yaitu minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Pemeriksaan terdiri dari minimal 1 kali pada trimester pertama dan kedua, serta minimal 2 kali pada trimester ketiga.

Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) diharapkan bahwa kejadian anemia pada ibu dapat dideteksi sedini mungkin sehingga ibu dapat merawat diri dan janin selama hamil dan mempersiapkan persalinannya serta tanda-tanda dini perdarahan yang berlebihan dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat (Bobak, 2004).

Kunjungan Antenatal Care pada ibu hamil harus diperhatikan hal-hal seperti berikut :

1) Penatalaksanaan ANC

Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *Ante Natal Care* (ANC). Pemeriksaan selengkapnya mencakup banyak hal yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium. Penerapan operasionalnya dikenal standar minimal 7 T untuk pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) yang terdiri atas:

- a) (Timbang) berat badan

Ukuran berat badan dalam kg tanpa sepatu dan memakai pakaian yang seringannya. Berat badan kurang dari 45 kg pada trimester III dinyatakan ibu kurus dan kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.

b) Ukur (Tekanan darah)

Mengetahui setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

c) Ukur (Tinggi fundus uteri)

Pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, memeriksa posisi bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul.

d) Pemberian imunisasi (*Tetanus Toksoid*) TT lengkap untuk mencegah *tetanus neonatorum*.

Tabel 2.1 Jadwal Pemberian Imunisasi TT

Antigen	Interval (selang waktu minimal)	Lama perlindungan	Persen perlindung
TT 1	Kunjungan antenatal care pertama	–	–
TT 2	4 minggu setelah TT 1	3 tahun	80
TT 3	1-6 bulan setelah TT 2	5 tahun	95
TT 4	1 tahun setelah TT 3	10 tahun	95
TT 5	1 tahun setelah TT 4	25 tahun	99



- e) Pemberian (Tablet besi) minimal 90 tablet selama kehamilan
- f) (Tes) terhadap penyakit menular seksual
- g) (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan

Memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya tentang tanda-tanda resiko kehamilan. (Anwar, 2010).

## 2) Tujuan ANC

Tujuan *Ante Natal Care* (ANC) adalah : (Anwar, 2010),

- a) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.
- b) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu dan janin.
- c) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil.
- d) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, ibu dan bayi selamat dengan trauma seminimal mungkin.
- e) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif.
- f) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.

## 3) Kunjungan ANC

Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) sesuai standar yang ditetapkan. Istilah kunjungan disini tidak hanya berarti bahwa ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas pelayanan, tetapi setiap kontak yang dilakukan ibu dengan tenaga kesehatan baik diposyandu, pondok bersalin desa maupun kunjungan rumah. (Anwar, 2010).

a) **Kunjungan ibu hamil K1**

Kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan.

b) **Kunjungan ulang**

Kunjungan ulang adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar selama satu periode kehamilan berlangsung.

c) **K4**

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang empat atau lebih. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat:

- ✓ Minimal Satu kali dalam trimester pertama (sebelum 14 minggu).
- ✓ Minimal Satu kali dalam trimester kedua (antara minggu 14 sampai 28)

- ✓ Minimal Dua kali dalam trimester ketiga (antara minggu 28 sampai 36 dan setelah minggu ke 36).
- ✓ Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu.

#### d. Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan merupakan tenggang waktu antara kehamilan terakhir dengan persalinan sebelumnya.

Anjuran yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih. Hal ini dikarenakan jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab kelemahan dan kematian ibu serta bayi yang dilahirkan.

Perhitungan jarak kehamilan tak kurang dari 2 tahun didasarkan atas pertimbangan kembalinya organ-organ reproduksi ke keadaan semula. Oleh karena itu terdapat istilah masa nifas. Masa nifas adalah masa organ-organ reproduksi kembali ke masa sebelum hamil yang berlangsung selama 40 hari atau minimal 2 bulan. Organ-organ reproduksi akan kembali ke keadaan semula minimal 3 bulan. Rahim atau uterus membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk kembali utuh. Rahim atau uterus sewaktu tak hamil beratnya hanya 30 gr setelah hamil

beratnya hampir 1 kg atau 1000 gr dan setelah persalinan beratnya berkurang mencapai 60 gr.

Jarak kehamilan dibagi ke dalam dua kategori yaitu :

1) Jarak kehamilan terlalu pendek

Jarak kehamilan kurang dari 24 bulan merupakan jarak kehamilan yang berbahaya. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksi belum kembali ke kondisi semula, kondisi energi ibu juga belum memungkinkan untuk menerima kehamilan berikutnya. Keadaan gizi ibu yang belum prima membuat gizi janin juga sedikit, sehingga pertumbuhan janin tidak memadai yang dikenal dengan PJT atau Pertumbuhan Janin Terhambat.

WHO menganjurkan bahwa selama kehamilan sekurang-kurangnya memeriksakan diri sebanyak 4 kali. Pemeriksaan tersebut minimal sekali pada trimester pertama yaitu untuk memastikan kehamilannya, sekali pada trimester kedua untuk memantau kehamilannya, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga untuk memantau dan meramalkan persalinan, apakah persalinan akan normal atau sesar.

Syarat kehamilan yang sehat ialah cukup gizi dan penambahan Berat badan. Penambahan berat badan ibu yakni minimal 10 sampai 12 kg sehingga Berat badan bayi yang dilahirkan dapat mencapai lebih dari 2,5 kg (Notobroto, 2003).

2) Jarak kehamilan terlalu jauh

dr. Agus Supriyadi, SpOG dari RSIA Hermina Jatinegara mengemukakan bahwa kehamilan dengan jarak lebih dari 24 bulan atau lebih dari 2 tahun sangat baik buat ibu. Hal ini dikarenakan kondisi ibu sudah normal kembali. Jadi, organ-organ reproduksi ibu sudah siap menerima kehamilan kembali. Tapi bukan berarti ibu dapat hamil kapan saja asalkan jaraknya lebih dari 24 bulan. Kehamilan berikutnya diharapkan tidak lebih dari 59 bulan (diatas 5 tahun).

Usia ibu saat kehamilan berikutnya harus diperhatikan. Bila lebih dari 35 tahun saat kehamilan berikutnya, berarti ibu masuk dalam kategori risiko tinggi. Sementara usia reproduksi yang bagus adalah 20 sampai 30 tahun. Dikhawatirkan jika usia ibu di atas 35 tahun akan menimbulkan komplikasi. Dampak yang dapat ditimbulkan ialah kualitas sel telur yang dihasilkan juga tak baik, saat persalinan akan berisiko terjadi perdarahan post partum atau pasca persalinan. Hal ini disebabkan otot-otot rahim tak selentur dulu, sehingga saat harus mengkerut kembali bisa terjadi gangguan yang berisiko terjadi Hemorrhagic Post Partum (HPP) atau perdarahan pasca persalinan, resiko terjadi preeklampsia dan eklampsia juga sangat besar (Anwar, 2010).

#### **4. Patofisiologi Anemia dalam Kehamilan**

Hipervolemia atau indremia adalah kondisi dimana darah bertambah banyak dalam kehamilan. Hal tersebut fisiologis terjadi pada ibu hamil, tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan

bertambahnya plasma. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding sebagai berikut plasma 30 persen, sel darah 18 persen dan hemoglobin 19 persen. Pembentukan sel darah merah yang terlalu lambat akan menyebabkan ibu menjadi kekurangan sel darah merah atau anemia (Mansjoer, 2001).

Hemodilusi atau pengenceran darah dapat terjadi pada ibu hamil. Hal tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan plasma darah selama kehamilan. Peningkatan plasma darah sebanyak 30 sampai 40 persen. Peningkatan tersebut dapat menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) menjadi menurun secara fisiologis. Akibat hemodilusi menyebabkan hemoglobin (Hb) tersebut mudah mengalami kehancuran atau lisis. Anemia fisiologis tersebut mulai terjadi pada trimester kedua dan ketiga (Wiknjosastro, 2002).

## **5. Penilaian Klinik Anemia**

### **a. Tanda dan gejala**

Konsentrasi hemoglobin yang berkurang selama masa kehamilan mengakibatkan suplay oksigen ke seluruh jaringan tubuh berkurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya anemia. Secara umum tanda dan gejala anemia adalah sebagai berikut :

- 1) Lemah, mengantuk karena berkurangnya Hb dan oksigen sehingga kurang transport untuk metabolisme tubuh.
- 2) Merasa pusing, lelah oleh karena berkurangnya oksigen dan energi
- 3) Nafsu makan turun atau anoreksia
- 4) Mual dan muntah

- 5) Konsentrasi hilang
- 6) Tidak enak badan dan nafas pendek oleh karena penurunan suplay darah
- 7) Mengeluh lidah mudah luka
- 8) Terjadi saluran gangguan pencernaan seperti anoreksia, konstipasi dan diare
- 9) Sakit kepala
- 10) Mata berkunang-kunang
- 11) curah jantung bertambah (berdebar-debar)
- 12) pucat pada membran mukosa karena kurangnya sel darah merah dalam pembuluh darah kapiler.

b. Diagnosis

1) Anamneses

Pada anamneses akan didapatkan keluhan cepat lelah, mata berkunang kunang, sering pusing, mual dan muntah yang berlebihan pada kehamilan muda.

2) Pemeriksaan darah

Pemeriksaan diharapkan dilakukan minimal dua kali selama kehamilan yakni pada trimester pertama dan trimester ketiga (Heien, 2002).

Anemia pada kehamila dapat dibagi menjadi anemia pada trimester I jika kadar Hb < 11 gr% ,anemia pada trimester II jika kadar Hb < 10,5

gr% dan anemia pada trimester III jika kadar Hb < 10 gr% (Bobak, 2005).

3) Pemeriksaan fisik

Tensi masih dalam batas normal, pucat pada membran mukosa dan konjungtiva. Hal ini dikarenakan kurangnya sel darah merah pada pembuluh darah kapiler dan pucat pada kuku dan jari tangan (Notobroto.2003).

**6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Janin Secara Umum.**

a. Selama kehamilan

- 1) Dapat terjadi abortus
- 2) Persalinan prematuritas
- 3) Hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim
- 4) Mudah terjadi infeksi
- 5) Ancaman dekompensasi kordis (Hb kurang dari 6 gr/dl)

b. Bahaya pada persalinan

- 1) Gangguan His
- 2) Kala I dapat berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan
- 3) Kala III dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan post partum karena atoni uterin
- 4) Kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uterin.



c. Bahaya pada masa nifas

- 1) Terjadi sub involusi uterin menimbulkan perdarahan post partum
- 2) Memudahkan infeksi puerperium
- 3) Pengeluaran asi berkurang
- 4) Terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan
- 5) Mudah terjadi infeksi mammae

d. Bahaya terhadap janin

Anemia dapat mengurangi metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Akibat anemia dapat terjadi gangguan dalam bentuk :

- 1) Abortus
- 2) Terjadi kematian intra uterin
- 3) Persalinan prematuris tinggi
- 4) Berat badal lahir rendah
- 5) Dapat terjadi cacat bawaan
- 6) Bayi mudah mendapatkan infeksi sampai kematian perinatal
- 7) Intelegensial rendah (Prawihardjo, Sarwono. 2005).

## 7. Penanganan Anemia

a. Pemberian tablet besi

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam program suplementasi. Dosis yang dianjurkan dalam satu hari adalah dua tablet (satu tablet mengandung 60 mg Fe dan 400 mg asam

folat) yang dimakan selama paruh kedua kehamilan karena pada saat tersebut kebutuhan akan zat besi sangat tinggi (Ida bagus, 2004).

b. Pendidikan

Konsumsi tablet zat besi dapat menimbulkan efek samping yang mengganggu sehingga orang cenderung menolak tablet yang diberikan. Penolakan tersebut sebenarnya berpangkal dari ketidaktahuan mereka bahwa selama kehamilan mereka memerlukan tambahan zat besi. Agar mengerti para wanita hamil harus diberikan pendidikan yang tepat. Pendidikan yang diberikan dapat berupa pengetahuan akibat bahaya yang dapat terjadi akibat anemia dan harus diyakini bahwa salah satu penyebab anemia adalah defisiensi zat besi (Arisman, 2004).

c. Modifikasi makanan

Asupan zat besi dari makanan dapat ditingkatkan melalui dua cara. Adapun caranya ialah pertama pemastian konsumsi makanan yang cukup makanan yang cukup kalori sebesar yang dikonsumsi. Kedua meningkatkan ketersediaan zat besi yang dimakan yaitu dengan jalan mempromosikan makanan yang dapat memacu dan menghindarkan pangan yang bisa mereduksi penyerapan zat besi (Arisman, 2004).

d. Pengawasan penyakit infeksi

Pengobatan yang efektif dan tepat waktu dapat mengurangi dampak gizi yang tidak diinginkan. Tindakan yang penting sekali dilakukan selama penyakit berlangsung adalah mendidik keluarga penderita tentang cara makan yang sehat selama dan sesudah sakit. Pengawasan penyakit

infeksi ini memerlukan upaya kesehatan masyarakat, pencegahan seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi dan kebersihan perorangan ( Arisman, 2004).

e. Fortifikasi makanan

Merupakan salah satu cara terampuh dalam pencegahan defisiensi zat besi. Kelompok masyarakat yang dijadikan target harus (dilatih) dibiasakan mengkonsumsi makanan fortifikasi ini serta harus memiliki kemampuan untuk mendapatkannya (Arisman, 2004). Hasil olahan makanan fortifikasi yang paling lazim adalah tepung gandum roti, makanan yang terbuat dari jagung serta jagung giling dan hasil olahan susu meliputi formula bayi dan makanan sapihan (tepung bayi).

### BAB III


#### KERANGKA KONSEPTUAL

##### A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Kerangka konsep dibuat berdasarkan kerangka teori yang peneliti rumuskan sebagai berikut :


Variabel independen

Variabel dependen




Keterangan :

: Variabel Independent



## B. Kerangka Kerja



## C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional dapat menghindari kesalahpahaman dan membatasi ruang lingkup permasalahan serta menghindari pengambilan data yang tidak terkait dengan penelitian. Penelitian ini diberikan batasan operasional variabel-variabel yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Skala Ukur
1.	Dependen Anemia	Kondisi jumlah sel darah merah ibu atau jumlah hemoglobin berada dibawah nilai normal.	Anemia = pada trimester I jika Hb < 11 gr%, pada trimester II jika Hb < 10,5 gr% dan pada trimester III jika Hb < 10 gr%. Tidak anemia = pada trimester I jika Hb > 11gr%, pada trimester II jika Hb > 10,5 gr% dan pada trimester III jika Hb > 10 gr%.	Nominal
2. a.	Independen Umur Ibu	umur dalam penelitian ini adalah usia ibu terhitung mulai saat	Resiko tinggi = bila umur ibu dalam kehamilan	Nominal

		dilahirkan hingga saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam satuan tahun.	dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun. Resiko rendah = bila umur ibu dalam kehamilan 20 sampai 35 tahun.	
b.	Paritas	Jumlah anak yang dilahirkan ibu baik yang berakhir dengan kelahiran hidup ataupun dengan kelahiran mati.	Resiko tinggi = bila paritas 1 kali dan di atas 3 kali. Resiko rendah = bila paritas 2 sampai 3 kali.	Nominal
c.	Kunjungan ANC	Jumlah kunjungan Antenatal Care (ANC) yang dilaksanakan oleh ibu selama kehamilan.	Resiko tinggi = jika pemeriksaan ANC ibu hamil pada trimester I dan II <2 kali dan pada trimester III <3 kali. Resiko rendah = jika pemeriksaan ANC ibu hamil pada trimester I dan II >2 kali, pada trimester III >3 kali.	Nominal
d.	Jarak	Tenggang waktu	Resiko tinggi =	Nominal

	kehamilan	antara kehamilan terakhir ibu dengan kehamilan yang sebelumnya.	bila jarak kehamilan ibu < 2 tahun. Resiko rendah = jika jarak kehamilan ibu $\geq$ 2 tahun.	
--	-----------	---	---	--

#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil
2. Ada pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil
3. Ada pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil
4. Ada pengaruh kunjungan Antenatal Care (ANC) dengan anemia pada ibu hamil.





**BAB IV**  
**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan *Cross Sectional Study*. *Cross sectional study* adalah suatu rancangan penelitian untuk mengkaji dinamika hubungan, yakni untuk mengetahui hubungan atau pengaruh faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil (Nursalam, 2008).

**B. Populasi dan sampel**

1. Populasi

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berkunjung di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar selama penelitian dilaksanakan yaitu sebanyak 42 ibu hamil.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian sebanyak 42 ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang memenuhi kriteria, yaitu:

### a. Kriteria inklusi :

Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian dapat memenuhi syarat sebagai sampel. Dalam penelitian ini kriteria inklusi dari responden adalah :

- 1) Ibu hamil yang memeriksakan kadar Hemoglobinnnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar selama penelitian dilaksanakan.
- 2) Bersedia menjadi responden.

### b. Kriteria eksklusi :

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana mengeluarkan subjek yang tidak dapat mewakili sampel atau tidak sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu

- 1) Tidak bersedia menjadi responden.
- 2) Tidak berada di RSIA St. Fatmah pada saat dilakukan penelitian

(Alimul, 2008).

## C. Teknik Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi responden dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Total Sampling.

## D. Pengambilan Data

### 1. Sumber data

#### a. Data primer

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data yang peneliti peroleh langsung dari responden dengan membagikan kuesioner. Kuesioner diberikan pada ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kadar Hemoglobin di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

#### b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data yang peneliti peroleh dari RSIA Siti Fatimah Makassar yaitu di bagian laboratorium dan ruangan rekam medik.

### 2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa kuesioner. Metode kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden yang terdiri dari identitas responden, umur, paritas, jarak kehamilan dan kunjungan ANC.

Data tersebut diukur dengan menggunakan Skala Guttman. Skala Guttman adalah skala pengukuran dengan memilih dua jawaban yaitu:

a. Ya = 1

b. Tidak = 0

## E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah yang bertempat di Jl. Gunung Merapi No. 75 Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2011.

## **F. Pengolahan Data**

Data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan penyajian datanya dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentasi dengan pengolahan tabel. Data yang diolah secara sistematis terlebih dahulu dinyatakan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Seleksi*

Seleksi bertujuan mengklasifikasi data yang masuk menurut kategori.

2. *Editing*

Editing merupakan langkah pengecekan kembali terhadap data yang telah masuk dalam usaha melengkapi data yang masih kurang. Memeriksa data, memeriksa jawaban, memperjelas dan melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan kemudian memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

3. *Koding*

Koding adalah pemberian nilai pada opsi-opsi yang telah lengkap. Setelah proses koding selesai data kemudian ditabulasi atau diolah dalam tabel, selanjutnya diuraikan dari presentasi dan hasil perhitungan tersebut.

4. *Tabulasi*

Tabulasi adalah penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga mudah dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

## G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Analisa Univariat

Analisa Univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti.

### 2. Analisa Bivariat

Analisa Bivariat dilakukan pada tiap variabel yang diteliti dan dihubungkan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Analisis ini digunakan untuk melihat besarnya resiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian anemia pada ibu hamil di RSIA Siti Fatimah Makassar (Arikunto, 2006).

Hubungan antar variabel dapat diketahui dengan uji statistik *Chi Square* ( $X^2$ ) dengan batas kemaknaan ( $\alpha$ ) 0,05 dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 17,0. *Chi Square* adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan dependen.

Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat signifikan (nilai  $p$ ), yaitu :

- 1) Jika nilai  $p > 0,05$  berarti hipotesis penelitian ditolak
- 2) Jika nilai  $p \leq 0,05$  berarti hipotesis penelitian diterima.

## H. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan izin kepada direktur tempat diadakannya penelitian untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakannya penelitian. Adapun etika dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. *Informed Consent*

Informed consent diberikan sebelum melakukan penelitian. Informed consent berupa lembar persetujuan untuk menjadi responden. Pemberian informed consent ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampaknya. Jika responden telah bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan sedangkan jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati keputusan tersebut.

### 2. *Anonimity* (tanpa nama)

Anonimity berarti nama responden tidak dicantumkan pada angket atau kuesioner. Peneliti hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner tersebut.

### 3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari responden, hanya kelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan dalam hasil penelitian (Hidayat AAA, 2009).



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar merupakan salah satu rumah sakit Obstetri dan Ginekologi serta dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Profil Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar ialah :

- a. Tahun 1931 bernama RB. Melania
- b. Tahun 1966 berubah nama RSB. Fatimah Pendidikan Bidan Ujun Pandang
- c. Tahun 1983 berubah nama menjadi RSB. Siti Fatimah

Pada tanggal 9 februari 2002 RSB. Siti Fatimah berubah nama menjadi RSIA. Siti Fatimah sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12, tanggal 4 februari 2002.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah terletak di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar dengan spesifikasi geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sungai Saddang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gunung Lokon
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sungai Paramen
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gunung Merapi.

## 2. Hasil Analisis Univariat

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Waktu penelitian pada tanggal 21 Juni sampai 13 Juli 2011. Jumlah sampel sebanyak 42 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel yaitu Total Sampling.

- a. Karakteristik Anemia Ibu Hamil

Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Anemia Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

No.	Karakteristik Anemia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Anemia	23	54,8
2.	Tidak Anemia	19	45,2
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2011

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 42 responden lebih banyak ibu hamil anemia dibandingkan ibu hamil tidak anemia.

- b. Karakteristik Umur Ibu Hamil

Tabel 5.2



Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

No.	Umur ibu hamil	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Resiko rendah	22	52,4
2.	Resiko tinggi	20	47,6
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2011

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 42 responden lebih banyak ibu hamil dengan umur resiko rendah (20 sampai 35 tahun) dibandingkan ibu hamil dengan umur resiko tinggi (dibawah 20 dan lebih dari 35 tahun) .

c. Karakteristik Paritas Ibu Hamil

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

No.	Paritas ibu hamil	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Resiko rendah	19	45,2
2.	Resiko tinggi	23	54,8
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2011

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 42 responden lebih banyak ibu hamil dengan paritas resiko tinggi (kurang atau sama dengan 1 dan lebih dari 3 kali) dibandingkan ibu hamil dengan paritas resiko rendah (2 sampai 3).

d. Karaktistik Jarak Kehamilan Ibu Hamil

Tabel 5.4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

No.	Jarak Kehamilan ibu hamil	Frekuensi	Persentase (%)
-----	---------------------------	-----------	----------------

1.	Resiko rendah	24	57,1
2.	Resiko tinggi	18	42,9
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2011

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 42 reponden lebih banyak ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah (di atas atau sama dengan 2 tahun) dibandingkan ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko tinggi (di bawah 2 tahun).

#### e. Karakteristik Kunjungan ANC Ibu Hamil

Tabel 5.5

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kunjungan ANC Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2011

No.	Kunjungan ANC ibu hamil	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Resiko rendah	30	71,4
2.	Resiko tinggi	12	28,6
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2011

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 42 responden lebih banyak ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah dibandingkan ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko tinggi.

### 3. Analisa Bivariat

Analisa Bivariat bertujuan untuk mengukur hubungan dari setiap variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti antara lain:

#### a. Pengaruh Umur Ibu Hamil Terhadap Anemia

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh umur ibu hamil dengan anemia dapat diketahui berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.6  
Pengaruh Umur Ibu Hamil Terhadap Anemia di Rumah Sakit Ibu dan  
Anak Siti Fatimah Makassar 2011

No	Umur Ibu Saat Hamil	Anemia				Jumlah	%	p
		Anemia		Tidak Anemia				
		N	%	N	%			
1	Resiko Rendah	7	31,8	15	68,2	22	100	0,02
2	Resiko Tinggi	16	80,0	4	20,0	20	100	
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>54,8</b>	<b>19</b>	<b>45,2</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2011

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil dengan umur resiko rendah sebanyak 22 orang yakni lebih banyak yang ibu hamil tidak anemia dibandingkan ibu hamil yang anemia. Ibu hamil dengan umur resiko tinggi sebanyak 20 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang anemia dibandingkan ibu hamil tidak anemia.

b. Pengaruh Paritas Ibu Hamil Terhadap Anemia

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh paritas ibu hamil dengan anemia dapat diketahui berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.7  
Pengaruh Paritas Ibu Hamil Terhadap Anemia di Rumah Sakit Ibu dan  
Anak Siti Fatimah Makassar 2011

No	Paritas Ibu Hamil	Anemia				Jumlah	%	P
		Anemia		Tidak Anemia				
		N	%	N	%			
1	Resiko Rendah	4	21,1	15	78,9	19	100	0,000
2	Resiko Tinggi	19	82,6	4	17,4	23	100	
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>54,8</b>	<b>19</b>	<b>45,2</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2011

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil dengan paritas resiko rendah sebanyak 19 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang

tidak anemia dibandingkan ibu hamil yang anemia. Ibu hamil paritas resiko tinggi sebanyak 23 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang anemia dibandingkan ibu hamil tidak anemia.

c. Pengaruh Jarak Kehamilan Ibu Hamil Terhadap Anemia.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh jarak kehamilan ibu hamil dengan anemia dapat diketahui berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.8

Pengaruh Jarak Kehamilan Ibu Hamil Terhadap Anemia di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011

No	Jarak Kehamilan Ibu Hamil	Anemia				Jumlah	%	P
		Anemia		Tidak Anemia				
		N	%	n	%			
1	Resiko Rendah	10	41,7	14	58,3	24	100	0,049
2	Resiko Tinggi	13	72,2	5	27,8	18	100	
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>54,8</b>	<b>19</b>	<b>45,2</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2011

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah sebanyak 24 orang yakni lebih banyak ibu hamil tidak anemia dibandingkan ibu hamil yang anemia. Ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko tinggi sebanyak 18 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang anemia dibandingkan ibu hamil tidak anemia.

d. Pengaruh Kunjungan ANC Ibu Hamil Terhadap Anemia.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kunjungan ANC ibu hamil dengan anemia dapat diketahui berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.9

Pengaruh Kunjungan ANC Ibu Hamil Terhadap Anemia di Rumah  
Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011

No	Kunjungan ANC Ibu Hamil	Anemia				Jumlah	%	P
		Anemia		Tidak Anemia				
		n	%	n	%			
1	Resiko Rendah	14	46,7	16	53,3	30	100	
2	Resiko Tinggi	9	75,0	3	25,0	12	100	0,096
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>54,8</b>	<b>19</b>	<b>45,2</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Data Primer 2011*

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah sebanyak 30 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang tidak anemia dibandingkan ibu hamil yang anemia. Ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko tinggi terdapat 12 orang yakni lebih banyak ibu hamil yang anemia dibandingkan ibu hamil tidak anemia.

## B. Pembahasan

Anemia pada kehamilan merupakan salah satu fenomena yang memerlukan perhatian serius sehingga kehamilan dapat berlangsung dengan baik (Manuaba, 2004).

Tingginya prevalensi anemia yang terjadi pada ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap ibu dan janin selama masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Dampak yang terjadi akibat anemia pada ibu hamil adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Prematuritas, Perdarahan Post Partum serta Partus Lama. Ibu dengan kehamilan yang lebih banyak dari biasanya atau lebih dari tiga kali akan makin banyak kehilangan zat besi dan menyebabkan terjadinya anemia (Maimunah, 2005).

Ibu hamil cenderung mengalami anemia mulai dari trimester pertama dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia kehamilan. Masa tersebut janin menimbun cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai persediaan bulan pertama setelah lahir. Pada awal kehamilan atau trimester pertama, zat besi dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang janin. Zat besi pada trimester kedua dibutuhkan karena terjadi peningkatan volume plasma darah sebanyak 35 persen, kebutuhan ini sama dengan 450 mg zat besi untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sel darah merah harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk kebutuhan janin karena darah dibutuhkan untuk mensuplai oksigen dan makanan bagi pertumbuhan janin (Manuaba, 2004).

Hemodilusi dapat terjadi pada ibu hamil. Hal tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan plasma darah selama kehamilan. Peningkatan plasma darah sebanyak 30 sampai 40 persen. Peningkatan tersebut dapat menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) menjadi menurun secara fisiologis. Akibat hemodilusi menyebabkan hemoglobin (Hb) tersebut mudah mengalami kehancuran atau lisis. Anemia fisiologis tersebut mulai terjadi pada trimester kedua dan ketiga (Wiknjosastro, 2002).

Pembahasan yang komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil sangat dibutuhkan. Pembahasan tersebut minimal sebagai gambaran umum tentang faktor apa saja yang mempengaruhi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Secara lebih besar pembahasan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi terjadinya anemia pada ibu hamil khususnya di Negara tercinta kita ini.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil diperoleh jumlah sampel sebanyak 42 ibu hamil. Jumlah sampel tersebut diperoleh data bahwa ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 23 orang atau 54,8 persen dan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 19 orang atau 45,2 persen. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 42 ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar ialah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Umur dengan Anemia pada Ibu Hamil

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh responden yaitu 42 ibu hamil. Ibu hamil dengan umur resiko rendah sebanyak 22 orang atau 52,4 persen, dan ibu hamil dengan umur resiko tinggi sebanyak 20 orang atau 47,6 persen.

Hasil analisis statistik diketahui jumlah ibu hamil dengan umur resiko rendah sebanyak 7 orang atau 31,8 persen anemia dan 15 orang atau 68,2 persen tidak anemia. Jumlah ibu hamil dengan umur resiko tinggi sebanyak 16 orang atau 80,0 persen anemia dan 4 orang atau 20,0 persen tidak anemia. Hasil penelitian tersebut dilakukan uji statistik *Chi Square* sehingga diperoleh nilai  $p = 0,002 < \alpha = 0,05$ , berarti terdapat pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ibu hamil dengan umur resiko rendah dapat mengalami anemia dan ibu hamil dengan umur resiko tinggi juga dapat tidak anemia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa

ibu hamil dengan umur resiko rendah (20 sampai 35 tahun) maupun resiko tinggi (kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun) akan tetap berpotensi untuk anemia. Hal tersebut dikarenakan jika pola makan dan asupan nutrisi ibu hamil kurang baik selama kehamilan, ibu hamil yang kurang istirahat, beban psikologi yang dialami ibu serta kondisi fisik ibu yang lemah.

Peneliti mengasumsikan bahwa umur ibu hamil dengan resiko tinggi atau kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun adalah faktor yang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Hal tersebut dikarenakan pada umur ibu dibawah 20 tahun perkembangan reproduksi masih belum optimal, jiwa masih labil, pengetahuan terhadap kesehatan ibu dan janin masih rendah dan ibu cenderung tidak memperhatikan kehamilannya. Umur ibu lebih dari 35 tahun, tubuh telah mengalami perubahan-perubahan akibat penuaan organ. Umur ibu dengan resiko rendah yakni 20 sampai 35 tahun adalah umur yang baik untuk mempunyai anak dan akan meminimalkan segala hal yang dapat membahayakan kehamilan misalnya anemia, sehingga memberikan dampak positif bagi ibu dan janin.

Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Fatmawati (2008), mengemukakan bahwa hal yang dapat memperberat terjadinya anemia adalah seringkali wanita memasuki masa kehamilan dengan kondisi cadangan zat besi yang kurang dalam tubuh. Hal ini dapat diperberat dengan hamil pada usia kurang dari 20 tahun karena pada usia muda tersebut membutuhkan zat besi yang lebih banyak untuk pertumbuhan ibu dan janin.



Wintrobe 2000, menyatakan bahwa usia ibu dapat mempengaruhi terjadinya anemia. hal tersebut dikarenakan semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Indriati, M. T (2006), dalam bukunya Panduan Lengkap Kehamilan dan Perawatan Bayi yang menyatakan bahwa kehamilan usia 20 sampai 35 tahun adalah usia yang paling tepat bagi wanita untuk mempunyai anak. Hal tersebut dikarenakan ibu lebih siap untuk bersalin secara alami serta resiko mengalami keguguran sangat kecil.

Departemen Kesehatan RI, 2001 mengemukakan bahwa kelompok umur yang beresiko adalah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Kelompok umur tersebut terbukti merupakan penyebab tinggi morbiditas dan mortalitas ibu dan anak selama kehamilan dan persalinan.

## 2. Pengaruh Paritas dengan Anemia pada Ibu Hamil

Paritas dalam arti khusus adalah banyaknya anak yang dilahirkan (Winkjosastro, 2002).

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh responden yaitu 42 ibu hamil. Ibu hamil dengan paritas resiko rendah sebanyak 19 orang atau 45,2 persen, dan ibu hamil dengan paritas resiko tinggi sebanyak 23 orang atau 54,8 persen.

Hasil analisis statistik diketahui jumlah ibu hamil dengan paritas resiko rendah terdapat 4 orang atau 21,1 persen anemia dan 15 orang atau 78,9 persen tidak anemia. jumlah ibu hamil dengan paritas resiko tinggi sebanyak 19 orang atau 82,6 persen anemia dan 4 orang atau 17,4 persen tidak anemia. Hasil penelitian tersebut dilakukan uji statistik *Chi Square* sehingga diperoleh nilai  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ , berarti terdapat pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ibu hamil dengan paritas resiko rendah dapat mengalami anemia dan ibu hamil dengan umur resiko tinggi juga dapat tidak anemia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa ibu hamil dengan paritas resiko rendah (2 sampai 3 kali) maupun resiko tinggi (kurang atau sama dengan 1 dan lebih dari 3 kali) akan tetap berpotensi untuk anemia. Hal tersebut dikarenakan jika pola makan dan asupan nutrisi ibu hamil kurang baik selama kehamilan, ibu hamil yang kurang istirahat, beban psikologi yang dialami oleh ibu serta kondisi fisik ibu yang lemah.

Peneliti mengasumsikan bahwa paritas dengan resiko tinggi yang tidak sejalan dengan jarak kehamilan yang baik serta cakupan nutrisi terutama zat besi yang cukup merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada ibu hamil. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kehamilan yang berulang-ulang dapat menyebabkan rahim ibu tidak sehat lagi untuk kehamilan berikutnya sehingga menyebabkan ibu akan kehilangan banyak zat besi. Pada waktu melahirkan akan terjadi

kerusakan pada pembuluh darah dinding rahim yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rahmayanti (2008), mengemukakan bahwa paritas adalah faktor penting dalam menentukan nasib ibu dan janin selama kehamilan maupun melahirkan. Paritas merupakan salah satu faktor yang diasumsikan mempunyai hubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Makin sering seorang ibu dalam kehamilan dan melahirkan akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis.

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Paritas dalam jumlah yang banyak memberikan gambaran tingkat kehamilan yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan berbagai resiko kehamilan seperti anemia. Semakin banyak jumlah kelahiran yang dialami seorang ibu, semakin tinggi resikonya untuk mengalami komplikasi. Hal ini dapat disebabkan karena secara fisik jumlah paritas yang tinggi mengurangi kemampuan uterus sebagai media pertumbuhan janin. Kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin sehingga jumlah nutrisi akan berkurang. Anemia dalam hal ini akan terkait dengan kehamilan sebelumnya dimana apabila cadangan zat besi di dalam

tubuh berkurang, maka kehamilan berikutnya akan menimbulkan anemia (Ridwanamiruddin, 2004).

Anak merupakan harta yang paling berharga dalam sebuah perkawinan. Maka sewajarnya orang tua harus menjaga dan merawat anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Kahfi (18) : 46 yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia dan amal- amal yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya disisi tuhanNya, dan lebih baik di cita-citanya, (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak merupakan titipan Allah yang diberikan kepada manusia selaku orang tua. Anak bagaikan sebuah perhiasan maka kewajiban orang tua untuk menjaga hingga menjadi dewasa (Quraisy Shihab, 2002).

### 3. Pengaruh Jarak Kehamilan dengan Anemia Pada Ibu Hamil

Jarak kehamilan adalah waktu sejak ibu hamil sampai terjadinya kelahiran berikutnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh responden yaitu 42 ibu hamil. Ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah sebanyak 24 orang atau 57,1 persen, dan ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko tinggi sebanyak 18 orang atau 42,9 persen.

Hasil analisis statistik diketahui jumlah ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah terdapat 10 orang atau 41,7 persen anemia dan 14

orang atau 58,3 persen tidak anemia. Jumlah ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko tinggi sebanyak 13 orang atau 72,2 persen anemia dan 5 orang atau 27,8 persen tidak anemia. Hasil penelitian tersebut dilakukan uji statistik *Chi Square* sehingga diperoleh nilai  $\rho = 0,049 < \alpha = 0,05$ , berarti terdapat pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah dapat mengalami anemia dan ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko tinggi juga dapat tidak anemia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu hamil dengan jarak kehamilan resiko rendah (lebih atau sama dengan 2 tahun) maupun resiko tinggi (dibawah 2 tahun) akan tetap berpotensi untuk anemia. Hal tersebut dikarenakan jika pola makan dan asupan nutrisi ibu hamil kurang baik selama rentang waktu setelah melahirkan, ibu hamil yang kurang istirahat, beban psikologi yang dialami oleh ibu serta kondisi fisik ibu yang lemah.

Peneliti mengasumsikan bahwa jarak kehamilan dengan resiko tinggi yaitu kurang dari 2 tahun merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada ibu hamil. Hal tersebut dikarenakan pada saat kehamilan yang berulang dalam waktu singkat akan menguras cadangan zat besi ibu serta secara psikologi jarak kehamilan yang berdekatan dapat menimbulkan rasa cemburu bagi anak akibat ketidaksiapan orang tua dalam berbagi kasih sayang. Pengetahuan akan jarak kehamilan yang baik minimal 2 tahun penting untuk diperhatikan agar badan ibu siap untuk menerima janin kembali.

Penelitian serupa dilakukan oleh Fatmawati (2008), mengemukakan bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat merupakan salah satu penyebab tinggi terjadinya anemia dalam kehamilan. Hal tersebut dikarenakan kehamilan yang berulang dalam jangka waktu singkat menyebabkan cadangan zat besi ibu belum pulih dan terkuras untuk keperluan janin berikutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang menyatakan bahwa jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih. Hal tersebut dikarenakan bahwa jarak kelahiran singkat akan menyebabkan seorang ibu belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya (Ridwanamiruddin, 2004).

Jarak kehamilan singkat dapat menyebabkan terjadinya anemia. Hal ini dikarenakan kondisi ibu masih belum pulih dan pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi belum optimal. Jarak kehamilan yang lebih dari 2 tahun diharapkan akan membuat organ reproduksi ibu akan kembali seperti sebelum hamil. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahqaaf (46) : 15, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا طَوَضَعَتْهُ كُرْهًا طَوَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ رِثْلُثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya :

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri", (Alquran dan terjemahan, 2010).

Ayat di atas bagaikan menyatakan : Sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya siapapun dan apapun agama kepercayaannya atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Penggalan ayat di atas menyatakan “kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan” mengisyaratkan bahwa masa kandungan adalah minimal enam bulan (Shihab, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dalam kesempurnaan penyusuan. Perintah akan penyusuan selama dua tahun bukan kewajiban. Hal ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Kalau seorang wanita memberikan ASI secara sempurna hingga 2 tahun, artinya dia tidak hamil selama dalam proses tersebut. Setelah dua tahun barulah seorang ibu boleh hamil kembali. Proses

kehamilan membutuhkan waktu hingga 9 bulan, berarti jarak yang ideal bagi seorang ibu untuk mempunyai anak atau melahirkan adalah 2 tahun 9 bulan (Al Atsari, 2010).

#### 4. Pengaruh Kunjungan ANC dengan Anemia Pada Ibu Hamil

Antenatal Care (ANC) adalah perawatan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim (Bobak, 2004).

Menurut Abdul Saifuddin (2006), Antenatal Care adalah pelayanan kesehatan bagi ibu dan janin oleh tenaga profesional. Pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar pelayanan yakni minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Pemeriksaan tersebut antara lain minimal 1 kali pada trimester pertama dan kedua, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (Bobak, 2004).

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh responden yaitu 42 ibu hamil. Ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah sebanyak 30 orang atau 71,4 persen dan ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko tinggi sebanyak 12 orang atau 28,6 persen.

Hasil analisis statistik diketahui jumlah ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah terdapat 14 orang atau 46,7 persen anemia dan 16 orang atau 53,3 tidak anemia. Jumlah ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko tinggi terdapat 9 orang atau 75,0 persen anemia dan 3 orang atau 25,0 persen tidak anemia. Hasil penelitian tersebut dilakukan uji statistik *Chi*



*Square* sehingga diperoleh nilai  $\rho = 0,096 > \alpha = 0,05$ , sehingga diketahui tidak terdapat pengaruh kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah dapat mengalami anemia dan ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko tinggi juga dapat tidak anemia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu hamil dengan kunjungan ANC resiko rendah maupun resiko tinggi akan tetap berpotensi untuk anemia. Hal tersebut dikarenakan bila saat ibu melakukan kunjungan ANC tidak mendapatkan pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai kondisi kehamilannya atau kurangnya komunikasi yang terjalin antara ibu dengan bidan, perawat dan dokter.

Peneliti mengasumsikan bahwa kunjungan ANC bukan merupakan salah satu faktor mutlak yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada ibu hamil. Hal tersebut dikarenakan bila ibu hamil merasakan tanda-tanda anemia misalnya sering merasa pusing, lemah, muka pucat, nafsu makan menuru serta merasa tidak enak badan maka ibu akan melakukan tindakan individu yang dapat meminimalkan keluhan tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya dengan memperbanyak istirahat dan minum multivitamin. Selanjutnya ibu akan melakukan kunjungan ANC untuk pemeriksaan selanjutnya. Artinya ada tindakan individual oleh ibu terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan ANC.

Penelitian serupa dilakukan oleh Pratiwi (2000), mengemukakan bahwa dengan pemeriksaan ANC kejadian anemia pada ibu dapat dideteksi

sedini mungkin sehingga diharapkan ibu dapat merawat dirinya selama hamil dan mempersiapkan persalinannya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh WHO yang menyarankan selama kehamilan sekurang-kurangnya memeriksakan diri minimal sebanyak 4 kali. Pemeriksaan tersebut antar lain minimal sekali pada trimester I yaitu untuk memastikan kehamilan, minimal sekali di trimester II untuk memantau kehamilan, dan minimal 2 kali di trimester III untuk memantau dan meramalkan persalinan apakah persalinan normal atau persalinan sesar.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dimana kemampuan peneliti sangat kurang karena peneliti masih termasuk taraf pemula sehingga hasil dari penelitian masih banyak kekurangan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh umur dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai  $\rho = 0,002$  di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011.
2. Terdapat pengaruh paritas dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai  $\rho = 0,000$  di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011.
3. Terdapat pengaruh jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai  $\rho = 0,049$  di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011.
4. Tidak terdapat pengaruh kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai  $\rho = 0,096$  di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2011.

#### B. Saran

1. Perencanaan kehamilan dan persalinan sangat penting dilaksanakan pada umur 20 sampai 35 tahun, untuk menekan kejadian anemia pada ibu hamil
2. Program KB sangat diperlukan untuk mengatur jarak kelahiran sehingga kelahiran berikutnya dapat lebih dari dua tahun.
3. Paritas atau jumlah anak hendaknya di batasi demi kesehatan ibu dan anak

4. Kunjungan ANC yang teratur sangat diperlukan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, sebagai upaya deteksi dini kelainan kehamilan.
5. Perlunya peran anggota keluarga ibu hamil yang tinggal serumah untuk mengingatkan ibu hamil yang lupa minum tablet besi dan memberi dorongan kepada ibu hamil yang malas minum tablet besi dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi terutama yang banyak mengandung zat besi.
6. Dengan keterbatasan penelitian, maka kepada peneliti selanjutnya yang berminat pada tema yang sama diharapkan menggunakan sampel yang lebih banyak dan mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010
- Al Atsari, Abdul Muslim. 2010. *Mengetahui Bagaimana Proses Penciptaan Manusia Qur'an dan Sunnah*. (<http://qurandansunnah.wordpress.com.html>). diakses pada tanggal 10 juni 2011.
- Anwar. 2010. *Antenatal Care*. ([http://antenatal Care.com.html](http://antenatalCare.com.html)). diakses pada tanggal 5 Februari 2011.
- Arikunto, suharsini, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Alimul, Azziz. 2007. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Ed. 1. Jakarta: Salemba.
- Bobak, L. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Ed. 4. Jakarta: EGC.
- Farrer, Helen. 2001. *Perawatan Maternitas*. Ed. 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Nina & Djamilus, Fausia. 2008. *Faktor Resiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil*. (<http://alijeco.com/2008/05/faktor-resiko-kejadian-anemia-pada-ibu.html>). Diakses pada tanggal 18 Desember 2010.
- Hamilton, Persis Mary. 1995. *Dasar-dasar Keperawatan Maternitas*. Ed 6. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Ida, Bagus. 2004. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Ed. 4. Jakarta: Buku Kedokteran EGC Editor Arcan.
- Arisman. 2004. *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Nutrisi Dengan Kejadian Anemia Selama Kehamilan Dipuskesmas*

*Selat Ii Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Skripsi keperawatan.*  
Fakultas kedokteran universitas airlangga Surabaya.

- Lamadhah, Athif. 2009. *Buku Pintar Kehamilan dan Melahirkan*. Jogjakarta: Diva Press.
- Fauziah. 2009. *Status Gizi Ibu Hamil Serta Pengaruhnya Terhadap Bayi Yang Dilahirkan*. (<http://118.98.213.22/aridataweb/how/k/kesehatan/12> status gizi ibu hamil. Pdf). Diakses 18 Desember 2010.
- Manuaba I,B,G. 2004. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri Dan Ginekologi*, Ed. 2. Jakarta: EGC.
- Mansjoer, Arif. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Aesculapeus FK UI.
- Maimunah. 2005. *Kamus Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Notobroto. 2003. *Insiden Anemia*. Jakarta: EGC.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Ed. 1. Jakarta: Salemba Medika.
- Prawihardjo, Sarwono. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo.
- Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an* Vol 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ridwanamiruddin. 2004. *Studi Kasus Kontrol Faktor Biomedis Terhadap Kejadian Anemia Ibu Hamil Di Puskesmas Bantimurung* (online). (<http://ridwanamiruddin.wordpress.com>). Diakses pada tanggal 18 Desember 2010.
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal 281*. Ed. 1. Cetakan 4. Jakarta: Yayasan bina pustaka Sarjono Prawihardjo.
- Sudoyono, A. W. 2007. *Naskah Lengkap Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalbah Hisham. 2009. *Kemukjizatan Penciptaan Manusia, Ensiklopedia 2 Mukjizat Alqur'an dan Hadis*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, PT Sapta Sentosa.

Winkjo, Sastro. H. 2002. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: YBP-SP.

Varneys, Heien. 2002. *Buku Saku Bidan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1****SURAT PERMOHONAN KE RESPONDEN**

Kepada Yth :

Saudara Calon Responden

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar “.

Sehubungan dengan judul tersebut di atas, saya datang dihadapan saudara guna mengajukan berbagai pertanyaan. Sekiranya saya mohon ketersediaannya untuk meluangkan waktu mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan sejujurnya.

Saya menjamin kerahasiaan jawaban saudara dan tidak akan saya gunakan di luar kepentingan penelitian ini dan hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas ketersediaan saudara saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2011



Responden

Responden Penulis

( )

(Sopiana)

### INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Alamat :

Bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar” dan saya akan memberikan jawaban sejujur-jujurnya demi kepentingan penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak siapapun.

Makassar, Juni 2011

Responden

( )

**KUESIONER****FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANEMIA PADA IBU  
HAMIL DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR TAHUN 2011**

Tanggal pengisian:

No. Responden:

Petunjuk pengisian:

1. Isilah identitas dengan lengkap dan benar
2. Bacalah dengan seksama pertanyaan sebelum anda menjawab
3. Pilihlah jawaban yang benar sesuai dengan pendapat anda
4. Berikan tanda (√) pada kolom yang tersedia.
  - a. No. Responden :
  - b. Umur : M A K A S S A R
  - c. Paritas :
  - d. Jarak Kehamilan :
    - 1) < 1-2 tahun
    - 2) > 2-3 tahun
    - 3) > 3-4 tahun
    - 4) > 4 tahun
  - e. Kadar Hemoglobin:

**A. Aspek Anemia**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Setiap hari saya minum tablet besi selama hamil		
2.	Dalam sehari saya minum tablet besi sebanyak 1 kali		
3.	Saya sering merasa pusing selama kehamilan		
4.	Saya sering merasa lemah selama kehamilan		
5.	Muka saya kelihatan pucat		
6.	Saya sering bernafas pendek dan merasa tidak enak badan.		
7.	Nafsu makan saya menurun selama kehamilan		
8.	Saya merasa cepat lelah jika terlalu banyak beraktivitas selama kehamilan		
9.	Saya seringkali tidak memperhatikan asupan nutrisi terhadap makanan yang saya konsumsi sehari-harinya selama dalam kehamilan		
10	Saya biasanya enggan atau jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani seperti daging, ikan selama dalam kehamilan		
11.	Saya enggan atau jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna hijau selama dalam kehamilan		

**B. Aspek kelengkapan pemeriksaan ANC**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
-----	------------	----	-------

1.	Saya selalu memeriksa diri ketenaga kesehatan selama hamil		
2	Jumlah kunjungan ANC saya saat pemeriksaan kehamilan pada trimester I dan II adalah 1 kali.		
3.	Jumlah kunjungan ANC saya saat pemeriksaan kehamilan pada trimester III adalah 2 sampai 3 kali		
4.	Saat pemeriksaan kehamilan saya pernah di suntik Tetanus Toksoid (TT)		
5.	Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, saya selalu diperiksa Tekanan Darah		
6.	Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, saya diberikan tablet penambah darah		
7.	Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, saya selalu menimbang Berat Badan		
8.	Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, saya diperiksa Tinggi Fundus Uteri (perut)		
9.	Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, saya melakukan tes penyakit menular seksual.		



---

---

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Sopiana**

**Nim : 70300107079**

**Prodi : Keperawatan UIN Alauddin Makassar**

Mengajukan judul skripsi sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

**“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DI  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH  
MAKASSAR”.**

Demikian pengajuan judul ini.  
Wassalam,

Makassar, Januari 2011

**Nama Pembimbing**

**TDT**

**PEMBIMBING I**

**Hasnah, Sit, M.Kes  
Nip. 140 320 416**

( )

**PEMBIMBING II**

**Hj. Asriany, SKM, M.Kes  
Nip. 194809221972062001**

( )

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TUTUP**

Hasil penelitian ini telah kami setuju untuk diajukan pada Ujian Tutup di hadapan tim penguji Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka Penyempurnaan penulisan

Makassar, Juli 2011

Pembimbing I

Tim Pembimbing

Pembimbing II

Hasnah, S, SiT, M. Kes  
NIP. 140 320 416

Hj. Asriany, SKM, M. Kes  
NIP194809221972062001

Diketahui :  
Ketua Program Studi Keperawatan  
FIK UIN Alauddin Makassar

Nur Hidayah,S.Kep,Ns,M.Kes  
NIP. 19810405 200604 2 003

**BIODATA PENULIS**

**Identitas:**

Nama : Sopiana  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 27 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Manuruki 2 Lr. 3 no. 7 Makassar

**Riwayat Pendidikan:**

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tala, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep selesai Tahun 2001
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ma'rang, Kabupaten Pangkep selesai pada Tahun 2004
3. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep selesai pada tahun 2007
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Jurusan Keperawatan pada tahun 2007-2011





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## Lampiran II

## MASTER TABEL

No	Nama	Variabel Independen				Variabel Dependen
		Umur	Paritas	Jarak Kehamilan	Kunjungan ANC	Anemia dan tidak anemia
1	Ny. Aq	1	1	1	1	2
2	Ny. G	2	2	2	1	1
3	Ny. H	2	2	2	2	1
4	Ny. Jn	1	2	1	1	2
5	Ny. B	2	2	1	2	1
6	Ny. D	2	2	2	1	1
7	Ny. A	1	1	1	1	2
8	Ny. C	2	1	1	1	2
9	Ny. E	1	1	1	1	2
10	Ny. M	2	2	2	1	1
11	Ny. N	1	1	2	1	1
12	Ny. S	2	2	2	1	1
13	Ny. Mu	1	2	2	1	2
14	Ny. Je	1	2	2	2	1
15	Ny. Gi	2	2	2	2	1
16	Ny. Hu	2	1	1	1	1
17	Ny. V	1	1	1	1	2
18	Ny. F	2	2	1	1	2
19	Ny. W	1	1	1	1	1
20	Ny. K	2	2	2	1	1
21	Ny. O	2	2	2	1	1
22	Ny. I	1	1	1	2	2
23	Ny. Y	1	1	1	1	2
24	Ny. He	1	1	1	1	2
25	Ny. R	1	2	1	1	1
26	Ny. T	2	2	1	1	1
27	Ny. Sa	2	2	2	2	1
28	Ny. U	2	2	1	2	1
29	Ny. L	1	1	1	1	2
30	Ny. W	1	1	1	1	2
31	Ny. So	1	2	1	2	1
32	Ny. V	1	2	2	1	1
33	Ny. G	2	2	2	1	1
34	Ny. Z	1	1	2	1	2
35	Ny. L	2	1	1	1	2
36	Ny. D	2	1	1	2	1
37	Ny. K	2	1	2	2	2
38	Ny. Ju	2	2	1	1	1
39	Ny. H	1	2	1	2	2
40	Ny. C	1	1	2	1	2

41	Ny. Z	1	2	1	2	1
42	Ny. N	1	1	2	1	2

Keterangan

A. Umur

1. Resiko Rendah : 20 - 35 Tahun
2. Resiko Tinggi : < 20 Tahun dan > 35 Tahun

B. Paritas

1. Resiko Rendah : 2 - 3 Orang
2. Resiko Tinggi :  $\leq 1$  dan  $> 3$  orang

C. Jarak Kehamilan

1. Resiko Rendah :  $\geq 2$  Tahun
2. Resiko Tinggi : < 2 Tahun

D. Kunjungan ANC pada Trimester II

1. Resiko Rendah :  $\geq 2$  Kali

2. Resiko Tinggi : < 2 Kali

E. Anemia

1. Anemia
2. Tidak Anemia



FREQUENCIES VARIABLES=anemia umur paritas jarak.kehamilan kunjungan.anc  
/ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

### Statistics

		anemia	umur	paritas	jarak.kehamilan	kunjungan.anc
N	Valid	42	42	42	42	42
	Missing	0	0	0	0	0

## Frequency Table

### anemia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anemia	23	54.8	54.8	54.8
	tidak anemia	19	45.2	45.2	100.0
Total		42	100.0	100.0	

### umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko rendah	22	52.4	52.4	52.4
	resiko tinggi	20	47.6	47.6	100.0
Total		42	100.0	100.0	

### paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko rendah	19	45.2	45.2	45.2
	resiko tinggi	23	54.8	54.8	100.0
Total		42	100.0	100.0	

### jarak.kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko rendah	24	57.1	57.1	57.1
	resiko tinggi	18	42.9	42.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

### kunjungan.anc

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	resiko rendah	30	71.4	71.4	71.4
	resiko tinggi	12	28.6	28.6	100.0
Total		42	100.0	100.0	

CROSSTABS /TABLES=umur BY anemia /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ  
 /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.

**Crosstab**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
umur * anemia	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

**umur \* anemia Crosstabulation**

			anemia		Total
			anemia	tidak anemia	
umur	resiko rendah	Count	7	15	22
		% within umur	31.8%	68.2%	100.0%
	resiko tinggi	Count	16	4	20
		% within umur	80.0%	20.0%	100.0%
Total		Count	23	19	42
		% within umur	54.8%	45.2%	100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.817 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7.969	1	.005		
Likelihood Ratio	10.305	1	.001		
Fisher's Exact Test				.002	.002
Linear-by-Linear Association	9.583	1	.002		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,05.

b. Computed only for a 2x2 table

CROSSTABS /TABLES=paritas BY anemia /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ  
 /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
paritas * anemia	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

### paritas \* anemia Crosstabulation

			anemia		Total
			anemia	tidak anemia	
paritas	resiko rendah	Count	4	15	19
		% within paritas	21.1%	78.9%	100.0%
	resiko tinggi	Count	19	4	23
		% within paritas	82.6%	17.4%	100.0%
Total		Count	23	19	42
		% within paritas	54.8%	45.2%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.914 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	13.527	1	.000		
Likelihood Ratio	17.032	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	15.536	1	.000		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,60.

b. Computed only for a 2x2 table

```
CROSSTABS /TABLES=jarak.kehamilan BY anemia /FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
```

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jarak.kehamilan * anemia	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

### jarak.kehamilan \* anemia Crosstabulation

			Anemia		Total
			anemia	tidak anemia	
jarak.kehamilan	resiko rendah	Count	10	14	24
		% within jarak.kehamilan	41.7%	58.3%	100.0%
	resiko tinggi	Count	13	5	18
		% within jarak.kehamilan	72.2%	27.8%	100.0%
Total		Count	23	19	42
		% within jarak.kehamilan	54.8%	45.2%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.876 <sup>a</sup>	1	.049		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.741	1	.098		
Likelihood Ratio	3.971	1	.046		
Fisher's Exact Test				.065	.048
Linear-by-Linear Association	3.784	1	.052		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,14.

b. Computed only for a 2x2 table

CROSSTABS /TABLES=kunjungan.anc BY anemia /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.



## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kunjungan.anc * anemia	42	100.0%	0	.0%	42	100.0%

### kunjungan.anc \* anemia Crosstabulation

			anemia		Total
			anemia	tidak anemia	
kunjungan.anc	resiko rendah	Count	14	16	30
		% within kunjungan.anc	46.7%	53.3%	100.0%
	resiko tinggi	Count	9	3	12
		% within kunjungan.anc	75.0%	25.0%	100.0%
Total		Count	23	19	42
		% within kunjungan.anc	54.8%	45.2%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.778 <sup>a</sup>	1	.096		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.752	1	.186		
Likelihood Ratio	2.891	1	.089		
Fisher's Exact Test				.169	.092
Linear-by-Linear Association	2.711	1	.100		
N of Valid Cases	42				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,43.

b. Computed only for a 2x2 table