

***HOSPITAL INFECTION* DI RUANG PERAWATAN BEDAH**

RSUD TENRIAWARU KELAS B KABUPATEN BONE



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Program Studi Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

OLEH :

RINI AYU LESTARI

70300107017

PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 30 Juli 2011

Penyusun,


Rini Ayu Lestari

NIM.70300107017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lebih baik kejujuran yang menyakitkan

Daripada kebohongan yang manis.....



Sahabat selalu ada setiap saat

Baik suka maupun duka,

Tak peduli orang mau berkata apa,

Kalian tetap sahabatku.....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta serta adik-adikku tersayang yang selalu ada baik suka maupun duka. Kalian adalah motivasi dalam hidupku. Tanpa kalian daku tak dapat menyelesaikan karya ini.

Love you my family.....

ABSTRAK

Rini Ayu Lestari “Hospital Infection di Ruang Perawatan Bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kab. Bone” dibimbing oleh Nur Hidayah dan Muchtar Sa’na, terdiri dari 61 halaman, 4 tabel, 3 gambar, 9 lampiran.

Hospital infection atau yang biasa dikenal dengan infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada klien ketika sedang dirawat di rumah sakit atau pernah dirawat di rumah sakit yang terjadi setelah 72 jam perawatan pada pasien rawat inap dan harus ditangani dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang *hospital infection* di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pasien rawat inap di ruang perawatan bedah yang terinfeksi *hospital infection* selama peneliti melakukan penelitian yang berjumlah 21 responden. Dengan menggunakan instrument penelitian berupa lembar observasi dimana meliputi umur, jenis kelamin, lama hari perawatan dan manifestasi penyakit *hospital infection* kemudian didapatkan data dan dianalisa serta diolah kemudian disajikan dalam bentuk table frekuensi serta persentase.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kelompok umur dewasa penuh, jenis kelamin laki-laki dan lama hari rawat 7 - 20 hari lebih cenderung terkena *hospital infection*. Adapun manifestasi penyakit yang sering terjadi yaitu berupa flebitis (infeksi luka infuse). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan demi pengembangan kualitas rumah sakit perlu adanya peningkatan kesadaran akan prosedur kewaspadaan universal dan meningkatkan kinerja perawat dalam melaksanakan prosedur kewaspadaan universal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan berkah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **”Hospital Infection Di Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone “**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S. Kep) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya skripsi ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan hati yang tulus terkhusus kepada Ayahanda Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes dan Ibunda Nuraeni yang telah memberikan dukungan serta doa dengan penuh kasih sayang kepada penulis. Serta tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT.,MS, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Prof. DR. H. Ahmad Sewang, MA selaku plt Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua program studi keperawatan sekaligus pembimbing, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muchtar Sa'na, S.Kep, Ns, M. Kes selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Prof. DR. H. Abd. Rahim Yunus, MA selaku penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji serta memberikan masukan dan sarannya kepada penulis.
6. Bapak Alfi Syahar Yakub, S.Kp, Ns, M.Kes. selaku penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji serta memberikan masukan dan sarannya kepada penulis.
7. Ibu Direktur RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone beserta seluruh stafnya yang telah memberi izin dan bantuannya kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Adik-adikku tersayang Rina dan Resky, mama iya, K'Irfan Nur, S.Kep, K'Arham, SE serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabatku tercinta exister (Maul, Nur, Sri, Ina, Mirna, Ima) yang selalu ada baik suka maupun duka. Terima kasih untuk kisah persahabatan terindah yang kalian berikan.
10. Bunda Yaya, Bunda Aby dan K'Gabet, terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaannya selama ini baik dalam hal pendidikan maupun liburan.

11. Teman-temanku (Sadar, Ardy, Tiar, Wandu, Wawan, Tasyrik, Opick, Agus, Talib, Ide') yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Angkatan 46 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap terkhusus Desa Wanio Timoreng, terima kasih atas kenangan terindah yang telah kalian berikan kepada penulis.
13. Rekan-rekan keperawatan A angkatan 2007 serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu segala kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga karya ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat memberikan sumbangan dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keperawatan dan kesehatan.

Amin....Wassalam.

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Hospital Infection</i>	7
1. Definisi <i>Hospital Infection</i>	7
2. Faktor-faktor penyebab <i>hospital infection</i>	8


3. Proses terjadinya <i>hospital infection</i>	12
B. Diagnosis <i>Hospital Infection</i>	23
C. Faktor-faktor predisposisi <i>hospital infection</i>	24
D. Tinjauan Tentang Pencegahan <i>hospital infection</i>	28
E. Unit di Rumah Sakit yang Rentan terhadap <i>Hospital Infection</i>	36
 BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar pemikiran dan variable yang diteliti	39
B. Definisi operasional	40
 BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	43
B. Populasi dan sampel	43
C. Waktu dan tempat penelitian.....	45
D. Instrument penelitian	45
E. Prosedur pengumpulan data	45
F. Teknik pengolahan data dan analisa data.....	46
G. Etika penulisan	47
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	48
B. Pembahasan	53
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	63
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 : Karakteristik <i>hospital infection</i> berdasarkan umur di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone	49
Tabel 5.2 : Karakteristik <i>hospital infection</i> berdasarkan jenis kelamin di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone	50
Tabel 5.3 : Karakteristik <i>hospital infection</i> berdasarkan lama hari perawatan di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone	51
Tabel 5.4 : Tabel angka kejadian <i>hospital infection</i> menurut manifestasi penyakit di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Rantai penularan infeksi	17
Gambar II : Proses terjadinya <i>hospital infection</i>	21
Gambar III : Diagram kerangka konsep	40



DAFTAR SINGKATAN

ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
C D C	: <i>Center for Disease Control</i>
A I D S	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
H I V	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
E K G	: Elektrokardiogram
U S G	: Ultrasonografi
I S P A	: Infeksi Saluran Nafas Akut
I S K	: Infeksi Saluran Kemih
I L O	: Infeksi Luka Operasi
I L I	: Infeksi Luka infus

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi
- Lampiran 2 : Tabulasi Data Hasil Penelitian
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone
- Lampiran 5 : Surat keterangan selesai penelitian dari BPRSUD Tenriawaru Kelas B kabupaten Bone
- Lampiran 6 : Profil RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone
- Lampiran 7 : Profil penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan adalah tempat dimana orang sakit mencari pertolongan untuk mengatasi penyakitnya. Penderita yang datang ke tempat pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia, sebagian besar adalah penderita penyakit infeksi, sehingga tidak mengherankan bila tempat pelayanan kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya adalah lingkungan yang sangat berpotensi bahaya dalam hal penularan penyakit infeksi. Sebagian besar terutama pengidap penyakit akut berhasil memperoleh perbaikan/penyembuhan tadi. Namun ada kalanya, terutama pengidap penyakit kronis atau yang keadaan umumnya buruk justru acapkali terkena infeksi yang baru. Infeksi yang didapatkan di rumah sakit tersebut dikenal dengan infeksi nosokomial atau biasa juga sebut dengan *hospital infection* (Zulkarnain Iskandar, 2007).

Infeksi yang didapatkan di rumah sakit ini merupakan masalah yang pelik yang makin sering terjadi serta tidak mudah mengatasinya. Tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat tetapi juga di negara-negara berkembang. Di Amerika Serikat tiap tahun hampir 40 juta orang masuk rumah sakit. Lima sampai sepuluh persen diantaranya atau 2-4 juta orang berpeluang menderita *hospital infection*. Pengawasan penyakit dan survei *hospital infection* Amerika Serikat melaporkan bahwa tahun 1995, *hospital infection* berperan dalam kematian 88.000 jiwa sebelum setahun atau

1 orang tiap menit dan menyebabkan penghabisan dana sebesar 4,5 miliar dolar AS (Zulkarnain Iskandar, 2007).

The National Prevalence survey yang dilaksanakan di 157 sentra di Inggris dan Republik Irlandia oleh *The Hospital Infection Society* dan *The Infection Control Nurses Association*. Hasilnya memperlihatkan angka keseluruhan sebesar 9%, dimana infeksi tergolong dalam empat kelompok utama : infeksi saluran kemih (23,2%), infeksi saluran nafas (22,9%), infeksi luka operasi (10,7%), dan infeksi kulit (9,6%). Infeksi saluran kemih merupakan penyakit tersering pada pasien bedah urologi dan ginekologi, terutama mereka yang berusia lebih dari 75 tahun (Michael J. Pelczar, 1988).

Di Indonesia yaitu di sepuluh RSU pendidikan, *hospital infection* cukup tinggi yaitu enam sampai dengan 16% dengan rata-rata 9,8% dan hasil penelitian di RSU Sleman kejadian *hospital infection* luka operasi sebesar 13,04% dan *hospital infection* di ruang interna sebesar 15,74% (Depkes RI, 2003).

Menurut Rahmah yang merupakan salah satu kepala bagian di RSUD Tenriawaru, angka kejadian *hospital infection* yang terjadi di RSUD Tenriawaru Watampone cukup tinggi dimana pada tahun 2008 angka kejadian *hospital infection* yang paling sering terjadi yaitu infeksi luka infus (15,3%), infeksi luka operasi (4,7%), infeksi saluran kemih (3,5%) dan infeksi kulit (9,5%). Sedangkan pada tahun 2009 angka kejadian infeksi yang paling sering terjadi yaitu infeksi luka infus (14,9 %), infeksi luka operasi

(3,6%), infeksi saluran kemih (3,2), dan infeksi kulit (9%). Infeksi luka infus merupakan infeksi yang tersering terjadi hampir setiap ruangan.

Infeksi sering terjadi pada pasien beresiko tinggi yaitu pasien dengan karakteristik usia tua, berbaring lama, penggunaan obat immunosupresan dan steroid, daya tahan tubuh turun pada luka bakar, pada pasien yang dilakukan prosedur infasive, infus lama atau pemasangan kateter urine yang lama dan *hospital infection* pada luka operasi. Sebagai sumber dan cara penularan terutama melalui tangan, jarum suntik, kateter IV, kateter urine, kain kasa atau perban, cara keliru menangani luka dan lain-lain (Iskandar Zulkarnain, 2007).

Selain itu, ada hal yang sedikit terlupakan tentang bahaya *hospital infection*. Resiko *hospital infection* selain terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit, dapat juga terjadi pada petugas rumah sakit tersebut. Berbagai prosedur penanganan pasien memungkinkan petugas terpajan atau exposure dengan kuman yang berasal dari pasien. Infeksi petugas juga berpengaruh pada mutu pelayanan karena petugas menjadi sakit sehingga tidak dapat melayani pasien (Syaputra Artama, 2009).

Infeksi di rumah sakit sering terjadi karena kelalaian tenaga kesehatan menjaga kebersihan dalam melakukan tindakan medis. Padahal, dalam ajaran Islam telah menjadikan kebersihan sebagai akidah dengan sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai akidah bagi seorang muslim sehingga dapat terhindar dari penyakit.. Dengan demikian maka kebersihan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari ajaran ibadah bahkan Islam menjadikan sebagai bagian atau setengah dari iman.

Rasulullah SAW bersabda:

النَّظَافَةُ مِنْ الْإِيمَانِ

Artinya : “Kebersihan merupakan sebagian dari iman”

Dari hadist tersebut, dikemukakan bahwa nilai iman adalah setingkat lebih tinggi daripada nilai islam semata. Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian, baik kesucian yang bersifat lahiriah seperti wudhu dan mandi ataupun kesucian yang sifatnya bathiniah seperti kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian maka seorang muslim tidak diperbolehkan menghadap Allah SWT dengan shalatnya melainkan setelah bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuh dan badannya.

Hospital infection di rumah sakit yang terjadi pada penderita memberikan dampak kerugian yang besar. Infeksi rumah sakit yang terjadi pada penderita umumnya akan menyebabkan penyakit yang parah dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh dan status gizi penderita yang jelek, disamping kenyataan bahwa sebagian besar penyebab adalah bakteri komensal yang sudah kebal terhadap bakteri antibiotik. Ini akan menyebabkan waktu perawatan yang lama atau kematian penderita, sehingga angka morbiditas dan mortalitas di rumah sakit meningkat dan ini akan menurunkan mutu rumah sakit yang bersangkutan. Rumah sakit juga akan merugi karena masa inap penderita

menjadi lebih panjang sehingga hunian rumah sakit rendah. Perusahaan atau orang yang menanggung biaya perawatan penderita merugi karena harus membayar lebih tinggi dari seharusnya. Penderita pribadi merugi karena kehilangan waktunya yang produktif selama dirawat di rumah sakit (*Nasrum Massi, 2008*).

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “*Hospital Infection di Ruang Perawatan Bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas telah diketahui bahwa angka kejadian *hospital infection* masih tergolong banyak. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian “*Bagaimana hospital infection di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone?*”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya *hospital infection* di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru kelas B Kabupaten Bone.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya *hospital infection* menurut umur
- b. Diketuinya *hospital infection* menurut jenis kelamin
- c. Diketuinya *hospital infection* menurut lama perawatan
- d. Diketuinya *hospital infection* menurut manifestasi penyakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi mutu pelayanan keperawatan khususnya dalam penerapan upaya pencegahan *hospital infection* pada ruang perawatan.

2. Bagi Profesi Keperawatan

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien khususnya dalam upaya pencegahan *hospital infection* pada ruang perawatan

3. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai bahan masukan pada program penelitian dan pengembangan khususnya tentang penerapan pencegahan *hospital infection* pada ruang perawatan

4. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dalam tindakan pencegahan dan pengendalian *hospital infection*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Hospital Infection*

1. Definisi *Hospital Infection*

Infeksi adalah keadaan dimana terjadi multiplikasi mikroba dalam jaringan tubuh. Multiplikasi bakteri anggota flora normal saluran cerna, kulit dan lain-lain flora normal, biasanya tidak disebut infeksi, tapi sebaliknya multiplikasi bakteri patogen walaupun pada orang yang asimtomatik tetap disebut infeksi (*Nasrum Massi, 2008*).

Infeksi terjadi saat patogen memperoleh akses ke jaringan pejamu dan memicu suatu respons. Infeksi pada luka ditunjukkan oleh munculnya peradangan dan pus (nanah). Pasien mungkin mengalami demam (pireksia), dan usap/apusan luka akan memperlihatkan adanya sejumlah besar organisme penyebab.

Hospital infection atau biasa lebih dikenal dengan infeksi nosokomial berasal dari bahasa Yunani, dari kata *nosos* yang artinya penyakit dan *komeo* yang berarti merawat. Nosokomion berarti tempat untuk merawat/rumah sakit. Jadi *hospital infection* dapat diartikan sebagai infeksi yang diperoleh atau terjadi di rumah sakit (*Darmadi, 2008*)

Menurut Iskandar Zulkarnain (2007), definisi *hospital infection* yaitu :

- a. Infeksi yang didapat di rumah sakit

- b. Infeksi yang timbul/terjadi sesudah 72 jam perawatan pada pasien rawat inap
- c. Infeksi yang terjadi pada pasien yang dirawat lebih lama dari masa inkubasi suatu penyakit.

Rumah sakit yang mempunyai ICU, angka *hospital infection*nya lebih tinggi dibanding yang tidak mempunyai ICU. Kejadian *hospital infection* juga lebih tinggi di rumah sakit pendidikan oleh karena disini banyak dilakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan bersifat invasif (*Iskandar Zulkarnain, 2007*).

Hospital infection dikenal pertama kali pada tahun 1847 oleh Semmelweis dan hingga saat ini tetap menjadi masalah yang cukup menyita perhatian. Sejak 1950 *hospital infection* mulai diteliti dengan sungguh-sungguh di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Insiden *hospital infection* berlainan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya (*Darmadi, 2008*).

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya *hospital infection*

Agar dapat terjadi infeksi, pejamu yang rentan harus bertemu dengan suatu mikroorganisme virulen. Patogen yang bersangkutan harus menyelesaikan tahap-tahap berikut :

- a. Memperoleh akses ke jaringan pejamu
- b. Bergerak ketempat yang menguntungkan
- c. Berhasil bermultiplikasi walaupun pejamu melakukan perlawanan melalui mekanisme pertahanan

Resiko untuk mendapatkan *hospital infection* bergantung pada :

- a) Kemudahan untuk terkena infeksi (susceptibility) yang dimiliki penderita, misalnya usia (bayi, usia lanjut), status gizi (kurang gizi), penyakit yang sedang diderita (diabetes, AIDS)(*Indan Entjang, 2001*).

Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro dalam skripsi Sutriani Halim, pengelompokan usia dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Anak : 1 – 11 tahun
 2. Remaja : 12 - 17 tahun
 3. Dewasa muda : 18 – 25 tahun
 4. Dewasa tua : 26 – 60 tahun
 5. Usia lanjut : > 61 tahun
- b) Jenis tindakan pengobatan yang diterima penderita di rumah sakit, misalnya pembedahan, penggunaan alat bantu pernapasan, pengobatan dengan corticosteroid.
 - c) Tingkat paparan (exposure) penderita oleh mikroba yang potensial patogen yang dimilikinya (flora normal) maupun dari mikroba patogen yang berasal dari penderita lain di rumah sakit (*Indan Entjang, 2001*).

Dinegara yang telah maju kejadian infeksi ini diperkirakan 5-10% dan angka ini makin tinggi dinegara-negara berkembang. Menurut Ibrahim Abdul Samad angka *hospital infection* di tiap rumah sakit atau negara bisa berbeda, tapi ia menyebutkan bahwa *hospital infection* di bagian bedah merupakan yang tertinggi dan dibagian anak merupakan yang terendah (*Sunoto dalam Syarifuddin, 2006*).

Hospital infection yang paling sering melibatkan saluran kencing dan pada umumnya menyertai manipulasi urologis, termasuk penggunaan kateter tetap saluran kencing. Beberapa *hospital infection* saluran kencing mengakibatkan bakterimia kecuali pada adanya obstruksi. Walaupun wanita lebih sering terinfeksi, tetapi pada lelaki tua lebih sering terjadi bakterimia (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

Pneumonia menggambarkan terutama suatu bentuk *hospital infection* yang menyulitkan dan orang tua atau penderita amat mudah beresiko tinggi. Determin lain dari kecenderungan infeksi termasuk status mental yang tertekan menyebabkan aspirasi flora faring dan intubasi endotrakea. Selama masa pasca bedah penderita sangat mudah terkena infeksi paru. Penderita sering tidak bergerak (yang memudahkan aspirasi); tidak terventilasi penuh dan mendapat pengobatan untuk nyeri yang mengganggu batuk, refleks batuk dan penelanan. Insisi thoraks atau abdomen atas, mendahului infeksi pernafasan dan obesitas juga menambah resiko. Akhirnya pengurangan asiditas gaster terapeutik menambah resiko pneumonia nosokomial (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

Infeksi kulit dan jaringan lemak terjadi di rumah sakit sebagai akibat dari imobilisasi dan terjadinya luka tekanan (ulkus dekubitus) atau tindakan invasif yang mengganggu keutuhan kulit (infeksi luka). Beberapa ulkus dekubitus atau luka infeksi berhubungan dengan bakterimia. Resiko tertinggi untuk kemungkinan komplikasi yang mematikan ini adalah penderita tua

yang tidak bergerak dan penderita yang baru saja mengalami pembedahan usus besar, rektum dan urologi (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

Infeksi luka merupakan *hospital infection* nomor 2 yang paling sering terjadi. Menurut Center For Disease Control (CDC), luka mengalami infeksi jika terdapat drainase purulen pada luka, walaupun tidak dilakukan kultur atau hasil kultur negative. Sampel drainase yang berasal dari luka yang terinfeksi mungkin tidak mengandung bakteri akibat teknik kultur yang buruk atau karena pemberian antibiotik. Hasil kultur yang positif tidak selalu mengindikasikan adanya infeksi, karena banyak jenis luka yang mengandung koloni bakteri tetapi tidak menyebabkan infeksi (*Potter & Perry, 2006*).

Infeksi luka operasi merupakan komplikasi paling serius yang terjadi pada penderita pascabedah. Morbiditas dan mobilitas penderita infeksi pascabedah dan penderita akibat kecelakaan sangat ditentukan oleh ada tidaknya sepsis. Infeksi juga dapat mempengaruhi penyembuhan luka, dan dapat menyebabkan terjadinya parut luka yang secara kosmetik sangat mengganggu. Pemberian antibiotik untuk profilaktik sebenarnya tidak menurunkan kejadian infeksi luka operasi, malah dapat menambah jumlah bakteri yang resisten terhadap antibiotik di rumah sakit (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

Infeksi luka operasi biasanya tidak terjadi sampai hari keempat atau kelima setelah operasi. Klien mengalami demam, nyeri tekan dan nyeri pada daerah luka serta jumlah sel darah putih klien meningkat. Tepi luka terlihat mengalami inflamasi. Jika terdapat drainase berbau dan purulen, sehingga

menimbulkan warna kuning, hijau atau coklat bergantung pada jenis organisme penyebab (*Potter & Perry, 2006*).

Bila dibandingkan dengan *hospital infection* yang lain, maka *hospital infection* pada luka bakarlah yang paling sering terjadi. Biasanya infeksi luka bakar disebabkan oleh lebih dari satu mikroba dan tidak jarang terjadi septikimia atau infeksi invasif yang lain. Sedangkan *hospital infection* saluran pencernaan yang sering terjadi di rumah sakit yang tersering dijumpai ialah dalam bentuk diare dan gastroenteritis. Cara penularan utama *hospital infection* saluran pencernaan ini pada umumnya melalui makanan (keracunan/kontaminasi makanan) (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

Kontaminasi bisa terjadi pada setiap titik dari sistem intravenous. Misalnya, resiko terjadinya kontaminasi bisa bertambah pada penambahan obat kedalam botol intravenous, suntikan kedalam selang, pemasangan manometer dan lain-lain alat saat penggantian botol dan pengambilan spesimen dari sistem intravenous. Cairan intravenous juga bisa terkontaminasi dengan masuknya udara yang tidak difilter kedalam botol infus. Hal ini bila vacuum dari botol pecah waktu set dipasang dan udara masuk dalam ke dalam botol selama infus berjalan (*Phair JP dalam Syarifuddin, 2006*).

3. Proses terjadinya *hospital infection*

Suatu bagian didalam tubuh, dimana bakteri harus menempel atau melekat pada sel inang biasanya adalah sel epitel. Setelah bakteri memiliki kedudukan yang tetap untuk menginfeksi, mereka mulai memperbanyak diri

dan menyebar secara langsung melalui jaringan atau limfatik ke aliran darah. Infeksi ini dapat sementara atau menetap. Bakterimia memberi kesempatan untuk menyebar ke dalam tubuh serta mencapai jaringan yang cocok untuk memperbanyak diri (*Geo F Brooks dkk, 2005*).

Proses infeksi pada dasarnya terdiri dari :

a. Melekatnya bakteri pada sel epitel

Sekali bakteri masuk ke dalam tubuh inang, maka bakteri ini akan melekat pada sel jaringan permukaan (epitel). Bila mereka tidak bisa melekat, maka bakteri tersebut akan disapu keluar bulu getar yang ada pada lapisan mukosa.

Bakteri dan sel inang masing-masing mempunyai molekul permukaan yang bisa berinteraksi secara spesifik satu dengan yang lainnya. Misalnya sebagian besar bakteri mempunyai pili, yaitu satu jonjot mirip rambut yang menonjol dari permukaan sel bakteri yang membantu bakteri melekat pada permukaan sel inang.

b. Multiplikasi bakteri

Untuk sampai pada tahap ini dan lanjut ketahapan selanjutnya dari proses infeksi maka bakteri harus bisa mempertahankan diri dari semua hal-hal yang dapat menghancurkannya, misalnya lisosim yang terdapat pada permukaan epitel, antibiotik, atau sel-sel atau bahan-bahan lain yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik atau antibodi. Untuk hal ini bakteri dilengkapi dengan kapsul, dan juga

bakteri bisa menghasilkan enzim yang dapat menyebabkan zat-zat yang bakterisid sehingga kehilangan fungsinya.

c. Penyebaran bakteri

Setelah bakteri menetap pada lokasi pertama dari infeksi, mereka segera berkembang biak dan mulai menyebar langsung melalui jaringan atau lewat sistim limfatik ke aliran darah. Bisa terjadi infeksi darah (bakterimia) yang bisa bersifat sementara (transient) atau menetap. Dengan terjadinya bakterimia ini, bakteri bisa menyebar luas dalam tubuh dan memungkinkan mereka masuk ke jaringan utamanya yang cocok untuk bermultiplikasi.

d. Dihasilkannya hasil-hasil metabolisme yang mengganggu kesehatan tuan rumah yaitu toksin dan enzim.

Sebagian besar bakteri menghasilkan dan mengeluarkan enzim, yang berperan sangat penting dalam berbagai macam mekanisme patogenesis penyakit infeksi. Toksin yang dihasilkan bakteri menyebabkan bermacam-macam kelainan dan pengaruh bagi tubuh manusia (*Nasrum Massi, 2008*).

Menurut Agus Syahrurachman (1993), selain disebabkan oleh bakteri, infeksi juga dapat disebabkan oleh virus. Adapun penyebaran virus dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penyebaran dekat sehingga infeksi terlokalisir dan penyebaran jauh.

Pada penyebaran dekat, virus menginfeksi sel tetangga melalui ruang antar sel atau kontak langsung antar sel. Pola demikian terjadi pada

infeksi kulit atau papilloma. Pola lain terjadi melalui aliran secret/ekskret dalam rongga-rongga badan. Pola ini misalnya terjadinya pada infeksi saluran pernapasan dan pencernaan (Agus Syahrurachman, 1993).

Pada penyebaran jauh, proses infeksi biasanya melalui beberapa tahap. Setelah melewati *central focus* virus menyebar mencapai organ sasaran, penyebaran terjadi melalui aliran darah, getah bening, ataupun susunan saraf (Agus Syahrurachman, 1993).

Sama dengan infeksi pada umumnya, maka rantai *hospital infection* juga dipengaruhi oleh 3 faktor penting yaitu mikroba penyebab (agent), penularan (transmission), dan inang (host).

a. Mikroba (agent)

Mikroba penyebab yang terbanyak adalah bakteri dan virus, sedang fungi dan parasit jarang menyebabkan *hospital infection* (Nasrum Massi, 2008).

Perubahan type mikroba penyebab infeksi disebabkan perubahan resistensi hospes dan modifikasi mikrobiota hospes. Bila ketahanan pasien rendah akibat luka berat, penyakit akibat operasi patogen berkembang biak dan menyebabkan penyakit (Lud Waluyo, 2005).

Sumber infeksi dapat dibagi menjadi : benda mati dan makhluk hidup terutama manusia.

1. Benda mati

- a. Ditularkan melalui kontak dengan alat-alat kedokteran seperti spoit, jarum suntik, jarum biopsi, jarum punksi, termometer, alat-alat kebersihan (handuk, kain lap, pakaian, seprei terutama yang basah), alat-alat intubasi (lambung, duodenum), kapsul biopsi, sendok lidah, endoskop, colonoskop, rektosigmoidoskop, alat-alat anastesi, kateter dsb.
- b. Ditularkan melalui makanan, minuman, dan air yang sudah terkontaminasi dengan kuman. Makanan di dapur rumah sakit dapat terkontaminasi oleh kuman-kuman, baik sebelum, selama maupun setelah diolah. Sebelum diolah misalnya daging dan ikan yang mengandung kuman *salmonella spp*, *clostridium spp*, dan *vibrio spp*. Selama diolah, misalnya pemotongan daging dan ikan yang tidak sempurna (terlalu besar hingga tidak matang semua), pencucian bahan-bahan makanan sebelum dimasak yang tidak higienis dan tukang masak yang merupakan carrier dari suatu penyakit menular (thypus, salmonellosis, amubiasis, hepatitis, kolera, dan sebagainya). Sesudah diolah, misalnya penyimpanan makanan yang tidak baik, mudah terkontaminasi oleh kuman, tercampur dengan bahan-bahan makanan mentah, mudah dimasuki binatang (kecoa, lalat, semut, cecak dan sebagainya), tempat makanan yang kotor, makanan yang sudah basi dan pegawai


dapur yang mengedarkan makanan yang mengandung carrier atau kurang higienis.

2. Makhluk hidup terutama manusia

- a. Manusia sehat, seperti pengunjung rumah sakit yang sehat, tenaga kesehatan seperti dokter, mahasiswa kedokteran, paramedik, analisis, teknisi, fisioterapis, dan pegawai dapur
- b. Merupakan sumber infeksi yang sudah tidak asing lagi.
- c. Manusia sakit, seperti pengunjung rumah sakit dan tenaga kesehatan yang sedang sakit dan terutama penderita sendiri merupakan sumber infeksi yang sangat potensial.
- d. Binatang hidup dapat merupakan sumber infeksi terutama dapat berperan sebagai vektor yang terkenal antaranya golongan serangga (Samad IA, 1998).

Sumber mikroorganisme yang dapat menyebabkan *hospital infection* pada hakikatnya sama dengan yang ada di masyarakat, yaitu orang, benda, substansi, aliran udara, hewan dan serangga. Yang paling sering merupakan sumber mikroorganisme yang pathogenik bagi orang ialah manusia. Salah satu ancaman paling serius bagi terjadinya infeksi datang dari mikrobiota normal kita sendiri (Michael J Pelczar, 1988).

b. Penularan



Gambar I. Rantai penularan infeksi

Penularan dapat terjadi melalui cara silang (*cross-infection*) dari satu pasien kepada pasien lainnya atau infeksi dari diri sendiri dimana kuman sudah ada pada pasien, kemudian melalui suatu migrasi (gesekan) pindah tempat dan ditempat yang baru menyebabkan infeksi (*self infection* atau *auto infection*) (Iskandar Zulkarnain, 2007).

Penularan mikroba pada *hospital infection* juga bisa terjadi secara endogen atau eksogen yang *port the outlet*, cara penularannya, dan *port the entry*-nya hampir sama dengan infeksi pada umumnya.

- Reservoir infeksi

Reservoir infeksi adalah organ tubuh petugas atau penderita sendiri, sputum, nanah, duh tubuh saluran reproduksi, darah dan cairan tubuh lainnya. Reservoir infeksi lain adalah cairan infus, air atau makanan.

a. Sumber infeksi

Yang bisa jadi sumber infeksi adalah udara, air, darah, cairan infus, makanan, obat, alat-alat medis.

b. Rute infeksi

Penularan *hospital infection* sama dengan penularan infeksi pada umumnya, yaitu terjadi melalui satu atau lebih rute penularan, yaitu lewat kontak langsung, *common vehicle*, dan udara (*airborne*) dan melalui vektor (Nasrum Massi, 2008)

1. Penularan lewat kontak

Penularan terjadi karena adanya kontak antara korban dengan sumber infeksi kontak langsung tau tidak langsung (lewat droplet).

Sebagian besar *hospital infection* terjadi lewat kontak dari orang ke orang (*cross infeksi*).

a. Kontak langsung

Disebut kontak langsung bila terjadi kontak fisik secara langsung diantara korban dengan sumber infeksi.

b. Kontak tidak langsung

Disebut kontak tidak langsung bila terjadi perpindahan cepat dari mikroba pathogen melalui udara pada saat korban dengan sumber penularan satu sama lain berada pada jarak dekat.

c. Penyebaran lewat *common vehicle*

Vehicle yang terkontaminasi bisa merupakan sumber penularan terhadap banyak orang. Korban terkena infeksi setelah kontak dengan *common vehicle* ini bias terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Macam-macam *common vehicle* yaitu :

1. Makanan dan minuman (*water borne and food borne*)
2. Darah dan produk darah (hepatitis dan HIV)
3. Cairan intra venous (gram negatif septicernia)
4. Obat-obat, susu (salmonellosis) (Syaputra Artama, 2009).

d. Penularan lewat udara

Udara sangat mutlak diperlukan oleh setiap orang, namun adanya udara yang terkontaminasi oleh mikroba patogen sangat sulit dideteksi. Mikroba patogen dalam udara masuk kesaluran nafas

pejamu dalam bentuk *droplet nuclei* yang dikeluarkan oleh penderita (reservoir) saat batuk atau bersin, bicara atau bernafas melalui mulut atau hidung. Sedangkan dust merupakan partikel yang dapat terbang bersama debu lantai/tanah. Penularan melalui udara ini umumnya mudah terjadi di dalam ruangan yang tertutup seperti di dalam gedung, ruangan/bangsal/kamar perawatan, atau pada laboratorium klinik.

e. Penularan lewat vektor

Sebagai media perantara penularan adalah vektor (serangga), yang memindahkan mikroba pathogen ke pejamu dengan cara sebagai berikut.

1. Cara mekanis


Pada kaki serangga melekat kotoran/sputum (mikroba pathogen), lalu hinggap pada makanan/minuman, dimana selanjutnya akan masuk ke saluran cerna pejamu.

2. Cara biologis

Sebelum masuk ke tubuh pejamu, mikroba mengalami siklus perkembangbiakan dalam tubuh vektor/serangga, selanjutnya mikroba dipindahkan ke tubuh pejamu melalui gigitan (*Darmadi, 2008*).

Dokter atau perawat dan lingkungan rumah sakit dapat menjadi media perantara faktor eksogen kepada klien yang tidak menderita

hospital infection. Sehingga terjadi kolonisasi mikroorganisme pada tubuh penderita yang mengakibatkan terjadinya *hospital infection*



Gambar II: Proses terjadinya *hospital infection*
(sumber :Yayasan Spiritia, 2006)

3. Tuan rumah

Pertahanan tubuh (kekebalan) tuan rumah, baik yang spesifik maupun yang non spesifik pada penderita yang sedang dirawat di rumah sakit pada umumnya lebih rendah daripada orang yang normal, terutama pada ibu hamil yang akan melahirkan (Nasrum Massi, 2008).

Hal ini merupakan persoalan serius yang dapat menjadi penyebab langsung atau tidak langsung terhadap kematian pasien. Mungkin saja di beberapa kejadian, *hospital infection* tidak

menyebabkan kematian pasien. Akan tetapi ia menjadi penyebab penting pasien dirawat lebih lama di rumah sakit. Disisi lain, kita juga dapat menyampingkan akibat dari suatu penyakit sehingga pasien dapat dirawat lebih lama tanpa berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Maka dari itu, untuk mencegah *hospital infection* sebagai tuan rumah harus tetap menjaga sistem imun dengan cara menjaga pola makan dengan baik dengan menu makanan yang bergizi dan tinggi protein. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 88 :

﴿ ۸۸ ﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya :

" Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada - Nya."

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor kesehatan seseorang tergantung dari bagaimana cara seseorang menjaga sistem imunnya. Misalnya dengan menjaga pola makan dengan makan makanan bergizi dan berprotein. Karena dengan makan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi maka akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang.

Hospital infection atau infeksi yang didapat di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya adalah infeksi yang yang tampak secara klinis yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari rumah sakit

atau tempat pelayanan rumah sakit dan bukan berasal dari diagnosis penyakit dasar penderita. Infeksi umumnya yang tampak secara klinis setelah 48 jam dirawat di rumah sakit dianggap sebagai *hospital infection*. Infeksi yang terjadi setelah penderita keluar dari rumah sakit pun dianggap sebagai *hospital infection* apabila organisme penyebabnya didapat selama dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, dalam ajaran islam, manusia diwajibkan memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi seseorang karena penyakit yang dapat ditimbulkannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ
يُحِبُّ
النَّظَافَةَ
كَرِيمٌ
يُحِبُّ
الْكَرَمَ
نَظَّفُوا
أَفْنَيْتَكُمْ
وَدَّ وُرَكُمْ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah SWT itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu bersih menyukai sesuatu yang bersih, Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, maka bersihkanlah halaman rumahmu dan lingkunganmu” (HR. Muslim)

Dari sabda Rasulullah SAW. sangat jelas bahwa Allah SWT sangat menyukai yang baik dan bersih yang merupakan sumber utama kesehatan.

B. Diagnosis *Hospital Infection*

Menegakkan diagnosis *hospital infection* tidaklah mudah. Diagnostik pada umumnya hanya berdasar pada gejala klinik, sedangkan diagnosis etiologi lebih sukar ditetapkan karena terbatasnya sarana dalam dana untuk menegakkan diagnosis *hospital infection* tersebut.

Diagnosa klinik pada umumnya diduga ditegakkan bila :

- a. Sebelumnya penderita tidak sedang dalam masa inkubasi penyakit tersebut
- b. Sebelumnya tidak pernah kontak dengan penyakit tersebut

Masa inkubasi penyakit tersebut lebih pendek dari masa rawat penderita di rumah sakit (*Iskandar Zulkarnain, 2007*).

Kriteria diagnosis *hospital infection*:

- a. Infeksi saluran nafas : manifestasinya berupa batuk, nyeri dada, dan sputum menjadi purulen, foto thoraks berubah.
- b. Infeksi saluran kemih : manifestasinya disuri, nyeri suprapubik, dan bila pemeriksaan laboratorium jumlah kuman >10 juta/ml
- c. Infeksi saluran cerna : manifestasinya berupa diare lebih dari 2 hari, dan kultur kuman positif
- d. Infeksi luka bakar : manifestasinya bila jumlah kuman > 10 juta/gram jaringan
- e. Infeksi bekas luka operasi : manifestasinya berupa pus pada luka insisi

- f. Infeksi kulit : manifestasi berupa dekubitus
- g. Infeksi luka infus : terdapat flebitis
- h. Infeksi hepar : terdapat ikterus dan tes urologi positif

C. Faktor-faktor predisposisi *hospital infection*

a. Faktor endogen

Tubuh manusia dalam keadaan normal dihuni oleh mikroba komensal yang tidak berbahaya bagi yang bersangkutan, malah membantu misalnya dalam mencegah infeksi dari bakteri pathogen karena dihasilkannya zat-zat tertentu oleh bakteri komensal yang berbahaya bagi mikroba lain (*Nasrum Massi, 2008*).

Namun bila dilakukan tindakan invasif, misalnya pada pemasangan pipa endotrakheal, infus, kateter, dan lain-lain, maka bisa terjadi kerusakan pertahanan tubuh setempat pada mukosa sehingga memungkinkan invasi mikroorganisme ke dalam jaringan. Dengan menggunakan alat yang tidak steril, maka mikroba komensal bisa dipindahkan ke lokasi yang bukan habitat normal mikroba tersebut (translokasi), sehingga mikroba yang bersangkutan bisa berubah menjadi pathogen. Mikroba yang demikian dikenal sebagai mikroba yang *opportunistic pathogen* (*Nasrum Massi, 2008*).

b. Faktor rumah sakit

Rumah sakit adalah tempat yang banyak dihuni oleh banyak mikroba pathogen, yang dapat dipindahkan dari seorang penderita ke penderita lain oleh tindakan petugas di rumah sakit. Dirumah sakit banyak dilakukan

tindakan medis yang menggunakan alat yang dapat merupakan *vehicle* bagi mikroba untuk memasuki tubuh manusia (*Nasrum Massi, 2008*).

Manajemen rumah sakit merupakan factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kejadian *hospital infection*. Persediaan peralatan medis, keterampilan dokter dan perawat, dan asuhan keperawatan adalah sebagian factor pencetus terjadinya *hospital infection*. Karena itu, angka kejadian *hospital infection* disatu rumah sakit dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk melihat mutu pelayanan di rumah sakit tersebut (*Nasrum Massi, 2008*).

c. Faktor penderita

Penderita yang masuk ke rumah sakit adalah orang-orang yang umumnya sudah lama sakit sehingga mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, gizi yang jelek dan dengan usia tua yang semuanya merupakan faktor yang dapat lebih mempermudah terjadinya infeksi. Pengobatan steroid atau terapi imunologis, juga merupakan faktor yang dapat mempermudah infeksi (*Nasrum Massi, 2008*).

d. Faktor antibiotika

Pemakaian antibiotika yang tak terkendali dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri komensal yang berlebihan, dan terjadinya kekebalan dari bakter-bakteri komensal tubuh (*Nasrum Massi, 2008*).

Bakteri komensal yang normal tidak berbahaya bagi tuan rumahnya, bila tumbuh menjadi banyak tentu akan menyebabkan penyakit. Ini sangat

berbahaya mengingat bakteri tersebut adalah bakteri yang sudah kebal terhadap sebagian besar antibiotika (*Nasrum Massi, 2008*).

Menurut Weinstein dalam tesis Setiawati (2009), bahwa berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang sering disebut sebagai faktor yang berhubungan dengan terjadinya *hospital infection* secara umum sebagai berikut :

1. Usia

Penelitian Syahrul (1997) dan Kamal (1998) menemukan adanya hubungan yang bermakna antara umur dengan kejadian *hospital infection*. Pada periode neonatal, bayi dengan berat badan lahir rendah dan jenis kelamin laki-laki beresiko untuk mendapatkan *hospital infection* 1,7 kali dibandingkan dengan wanita.

2. Jenis kelamin

Nguyen (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *hospital infection* tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pada infeksi saluran kemih ada perbedaan kejadian antara laki-laki dan perempuan karena perempuan secara anatomis memiliki uretra yang lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki.

3. Lama hari rawat

Pasien yang dirawat lebih lama di rumah sakit beresiko mendapatkan infeksi lebih tinggi dibandingkan dengan lama rawat yang singkat (Mireya, 2007).

Semakin lama hari rawat maka akan semakin terpapar terhadap agen pathogen dari rumah sakit sehingga *hospital infection* akan semakin tinggi.

Lama hari rawat inap yang merupakan faktor yang cukup dominan yang

mempengaruhi *hospital infection* di rumah sakit Cipto Mangunkusumo (Yelda, 2003).

4. Kelas ruang rawat

Kelas ruang rawat yang semakin rendah makin rentan terhadap kemungkinan *hospital infection*. Hal ini mungkin disebabkan oleh latar belakang kemampuan ekonomi pasien. Lingkungan rumah sakit yang jelek, seperti ventilasi kurang memadai, jarak satu pasien dengan pasien yang tidak sesuai, cahaya dengan intensitas yang kurang dapat menjadi sumber infeksi (Ahmad, 2002).

5. Komplikasi dan penyakit penyerta

Pasien di rumah sakit dengan komplikasi dan penyakit penyerta pada umumnya mempunyai kondisi umum yang lemah, sehingga lebih terpapar terhadap infeksi (Setiawati, 2009).

D. Tinjauan tentang pencegahan *hospital infection*

Saat ini perhatian terhadap *hospital infection* di sejumlah rumah sakit di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka kejadian *hospital infection* dapat menunjukkan turunnya kualitas mutu pelayanan medis, sehingga perlu adanya upaya pencegahannya (Darmadi, 2008).

Kemungkinan terjadinya *hospital infection* antara lain dipengaruhi oleh tindakan medis yang diterima oleh klien karena itu upaya pencegahan terjadinya infeksi juga dibedakan sesuai dengan tindakan medis yang diberikan :

a. Tindakan invasif

Tindakan invasif adalah suatu tindakan memasukkan alat kesehatan kedalam tubuh klien sehingga memungkinkan mikroorganisme masuk bersama alat kedalam tubuh dan menyebarkan ke jaringan misalnya kateter intravena.

Salah satu prosedur terapeutik yang sering menyebabkan timbulnya infeksi adalah prosedur pemasangan infus yang biasanya disebut flebitis. Mendapat terapi intravena. Ketika kulit ditembus oleh kateter intravena dapat menjadi hospes yang rentan terhadap organisme endogen dan eksogen yang resisten dan masuk kedalam tubuh menyebabkan infeksi (*Nasrum Massi, 2008*).

Penggunaan alat intravaskular melalui vena maupun arteri, baik untuk memasukkan cairan steril, obat atau makanan, maupun untuk memantau tekanan darah sentral dan fungsi hemodinamik, telah meningkat tajam. Alat yang dimasukkan ke aliran darah vena atau arteri melewati mekanisme pertahanan kulit yang normal, dapat membuka jalan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam aliran darah, memungkinkan masuknya mikroorganisme yang berada dikulit tempat pemasangan. Pencemaran dimulai pada saat pemasangan alat dan selama alat masih terpasang. Contohnya pada saat memasang alat penghubung atau pada saat penggantian cairan (*Rohani dkk, 2010*).

b. Tindakan non invasif

Tindakan non invasif adalah tindakan medis dengan menggunakan alat kesehatan tanpa memasukkan alat tersebut

kedalam tubuh klien yang memungkinkan mikroorganisme masuk kedalam jaringan misalnya EKG, USG, pengukuran suhu tubuh, pengukuran tekanan darah.

Kemampuan untuk mencegah transmisi *hospital infection* adalah tingkatan pertama dalam pemberian pelayanan yang bermutu. Untuk seorang petugas kesehatan, kemampuan mencegah infeksi memiliki keterkaitan yang tinggi dengan pekerjaan karena mencakup setiap aspek penanganan penderita (Nasrum Massi, 2008).

Usaha untuk mencegah terjadinya *hospital infection* ini dikenal sebagai universal precaution : kewaspadaan universal, yang sangat penting dilakukan oleh petugas kesehatan waktu bekerja melayani orang sakit. Kewaspadaan universal ini dimaksudkan bukan saja untuk melindungi penderita dari kejadian *hospital infection*, tapi juga akan melindungi petugas itu sendiri (Nasrum Massi, 2008).

Konsep tehnik aseptik merupakan salah satu usaha perawat dalam melaksanakan kewaspadaan universal. Aseptik berarti tidak adanya pathogen penyebab sakit. Tehnik aseptik adalah usaha mempertahankan klien sedapat mungkin bebas dari mikroorganisme. Asepsis dan tehnik adalah suatu septic adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme kedalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi (Tietjen, 2004).

Dalam konsep teknik aseptik diperlukan ketelitian dalam melakukan tindakan. Sebagaimana diajarkan dalam ajaran islam agar teliti dalam melakukan setiap tindakan karena dalam tindakan yang dilakukan akan membuahkan hasil sesuai yang dilakukan pula.

Oleh karena dalam firman-Nya dalam surah an-Najm (53) ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Terjemahan :

“.....dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Dari ayat tersebut, dikemukakan bahwa ketelitian sangat diperlukan dalam melakukan tindakan agar dapat terhindar dari musibah seperti *hospital infection* yang terjadi karena kurangnya ketelitian tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan medis kepada pasien karena tindakan yang diberikan akan sesuai dengan apa yang diusahakan.

Ada dua jenis teknik aseptik yang diterapkan dalam praktek keperawatan, yaitu aseptik medis dan aseptik bedah.

a. Aseptik medis

Aseptik medis yaitu teknik atau prosedur yang dilaksanakan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme disuatu objek serta mencegah kemungkinan penyebarannya dari mikroorganisme tersebut ke pasien.

Karena selama proses perawatan, perawat melakukan kontak dengan banyak pasien di rumah sakit, maka perawat harus menyadari

dan mengetahui akan prinsip-prinsip medical asepsis sebagai upaya untuk menghindari transfer kuman dari pasien ke perawat, dari perawat ke klien, dari perawat ke perawat lain atau petugas kesehatan lain, atau dari satu klien ke klien lainnya.

Mata rantai infeksi yang paling mudah untuk diputus adalah cara penularan. Dalam lingkungan perawatan kesehatan, mencuci tangan adalah merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan penularan *hospital infection* (Schaffer, 2000).

b. Aseptik bedah

Aseptik bedah adalah teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu untuk meyakinkan bahwa prosedur pembedahan steril.

Teknik steril yang sering dibutuhkan dalam berbagai tindakan keperawatan diruang perawatan, seperti pada saat persiapan dan pemberian injeksi, pemasangan kateter, terapi intravena, pemasangan infus trakheobronkhial, dan perawatan luka operasi (mengganti luka balutan) (Schaffer, 2000).

Hal-hal yang dilakukan pada kewaspadaan universal ini adalah:

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja

Cuci tangan ada tiga macam yaitu :

a. Cuci tangan rutin

Dilakukan dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Cuci tangan rutin misalnya dilakukan sebelum bekerja dimaksudkan untuk melindungi

penderita, sedangkan cuci tangan setelah bekerja disamping untuk melindungi penderita lain, juga untuk melindungi diri petugas sendiri dari infeksi.

b. Cuci tangan aseptis

Dilakukan dengan air mengalir dan sabun antiseptik, kemudian larutan savlon, dan alkohol 70%, atau antiseptik yang lain. Cuci tangan aseptis dilakukan misalnya setelah tangan kontak dengan darah atau duh tubuh penderita.

c. Cuci tangan untuk pembedahan

Disamping tangan dicuci dengan sabun, antiseptik dan air, maka harus dilakukan penyikatan kulit tangan minimal 15 menit untuk menghilangkan sebanyak mungkin bakteri penghuni pori-pori kulit.

2. Menghindari kontak langsung dengan darah dan duh tubuh lain

Pada waktu bekerja harus selalu dijaga agar bagian tubuh petugas tidak kontak dengan darah atau duh tubuh penderita. Hal ini bisa dilakukan dengan memakai alat pelindung tubuh pada waktu melakukan pelayanan atau tindakan medis yang memungkinkan terjadinya kontak antara tubuh petugas dengan darah atau duh tubuh lain. Alat pelindung tersebut adalah :

a. Baju kerja, gaun operasi, jas praktikum atau celemek, yang dipakai sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada keadaan dimana ada kemungkinan darah atau duh tubuh bisa mencemari kaki, maka harus digunakan sepatu yang tertutup

- b. Sarung tangan dipakai untuk melindungi tangan dari pencemaran darah atau duh tubuh. Jenis sarung tangan yang dipakai pun harus sesuai dengan pekerjaan, misalnya sarung tangan operasi yang steril dipakai untuk pekerjaan medis, misalnya pada saat perawat memandikan penderita atau pada saat melakukan pekerjaan pembersihan lingkungan.
- c. Masker, penutup kepala, dan kaca mata, dipakai sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Masker dan kaca mata dipakai bila ada kemungkinan adanya percikan darah atau duh tubuh, misalnya pada operasi atau waktu menolong persalinan. Penutup kepala dipakai bersama masker untuk menghindari penderita dari pencemaran bakteri yang berasal dari tubuh petugas. Disamping itu masker juga dipakai untuk melindungi petugas dari penularan bakteri lewat udara, misalnya bila bekerja pada bangsal atau poliklinik penyakit paru-paru, atau bekerja dilaboratorium mikrobiologi.
- d. Wadah tempat bahan pemeriksaan, terutam darah dan duh tubuh dari saluran reproduksi, harus tertutup rapat. Membawa bahan pemeriksaan ke laboratorium tidak boleh dipegang dengan tangan telanjang, dan harus ditempatkan pada tempat khusus dimana terjamin wadah tempat bahan pemeriksaan tersebut tidak bisa tumpah (*Nasrum Massi, 2008*).

3. Melakukan dekontaminasi alat medis dan non-medis yang sudah tercemar darah atau duh tubuh lain

Semua alat dan barang yang terkontaminasi dengan darah atau duh tubuh penderita, sebelum dicuci harus didekontaminasi dulu dengan merendamnya dalam cairan sunclyn (chloryn) 0,5% selama 5-10 menit. Dengan merendam dalam cairan sunclyn 0,5% maka semua virus sudah dimatikan dalam 5 menit. Dekontaminasi ini terutama bertujuan untuk melindungi petugas dari kemungkinan tertular infeksi.

4. Menggunakan alat yang steril

Semua alat medis harus disterilkan sebelum dipakai untuk melindungi penularan infeksi pada penderita. Mengingat bahwa spuit dan jarum suntik dapat merupakan alat transportasi mikroorganisme utamanya virus, maka dalam penggunaan spuit dan jarum suntik, jarum infus, sangat dianjurkan untuk memakai jarum yang disposable. Untuk mengambil contoh darah yang paling aman untuk penderita dan petugas dianjurkan penggunaan alat pengambil darah yang disebut vakuitainer.

Alat non-medis, misalnya alat makan pada tempat perawatan penyakit yang menular melalui saluran pencernaan, harus disterilkan dengan cara dekontaminasi tingkat tinggi yaitu dimasak sampai mendidih minimal 30 menit.

5. Dekontaminasi sampah dan limbah medis

Yang dimaksud dengan sampah/limbah medis adalah semua benda yang tidak diperlukan lagi, yang berasal dari tubuh penderita

atau pernah menyentuh darah atau duh tubuh penderita. Sampah medis bisa berbentuk cair atau padat.

Sampah medis harus disimpan dalam wadah yang terpisah dari sampah domestik. Sampah medis bisa dibedakan atas sampah medis cair, sampah medis padat dan sampah tajam, yang ketiganya juga harus dipisahkan satu dari yang lain.

6. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan

- a. Meja tempat bekerja terutama pada pekerjaan yang ada hubungannya dengan darah dan duh tubuh manusia, harus dibersihkan dengan larutan desinfektan (lisol) setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Percikan darah atau cairan tubuh diatas meja, harus dituangi larutan desinfektan dan dibiarkan minimal 1 jam sebelum dibersihkan.
- b. Lantai harus disapu dan dislaper dengan larutan desinfektan minimal 1 kali dalam satu hari. Bila ada tumpahan darah atau cairan tubuh penderita pada lantai, maka harus dituangi larutan desinfektan dan dibiarkan minimal 1 jam sebelum dibersihkan.
- c. Mobilier yang ada dalam ruang kerja atau ruang perawatan, misalnya meja instrumen di kamar operasi, tempat tidur dan lemari di kamar perawatan harus juga dilap dengan desinfektan minimal sekali dalam seminggu, dan pada saat penderita meninggalkan rumah sakit.

- d. Pembersihan umum harus dilakukan minimal sekali dalam seminggu disemua unit pelayanan.
- e. Mesin pendingin ruangan harus dibersihkan minimal setiap 3 bulan untuk menjamin kebersihan udara yang beredar dalam ruangan (Nasrum Massi, 2008).

E. Unit di rumah sakit yang rentan terhadap *hospital infection*

Pada dasarnya semua unit pelayanan, dan instalasi pelayanan yang berhubungan dengan penderita atau dengan darah dan duh tubuh penderita merupakan daerah yang rentan terhadap *hospital infection*. Juga pada pelayanan dimana dirawat penderita dengan pertahanan tubuh yang tidak normal atau kurang, misalnya pada unit pelayanan rawat intensif, ruang perawatan bayi, ruang perawatan geriatrik atau ruang perawatan penderita yang mendapat pengobatan kemoterapi dan lain-lain obat yang menekan sistem pertahanan tubuh (Nasrum Massi, 2008).

Bagi penderita resiko terkena hospital infeksi tentu lebih besar pada unit-unit pelayanan dimana banyak dilakukan tindakan medis, misalnya di Unit Pelayanan intensif, Unit pelayanan Hemodialisa, Unit Pelayanan Bedah, dan Unit Pelayanan Gigi dan Mulut. Tingginya resiko *hospital infection* pada penderita-penderita yang dirawat pada unit rawat intensif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebanyakan penderita yang dirawat pada unit ini menderita penyakit berat yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh

2. Pada penderita yang serius biasanya terjadi perubahan flora normal dari usus. Penggunaan antibiotik menyebabkan perubahan flora normal, sehingga usus lebih banyak dihuni oleh mikroba-mikroba yang resisten terhadap lebih dari satu antibiotik
3. Pada unit ini biasanya penderita menjalani bermacam-macam prosedur invasif, baik untuk terapi maupun untuk monitoring, yang semuanya dapat menjadi vehicle yang potensial untuk penyebaran infeksi atau memindahkan mikroba dari habitat normalnya ketempat malam
4. Biasanya prosedur untuk penyelamatan hidup penderita lebih diperhatikan, bila dibanding prosedur untuk untuk pencegahan infeksi.
5. Penempatan penderita dalam jarak yang dekat memudahkan penularan penyakit infeksi (*Nasrum Massi, 2008*).

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL


A. Dasar pemikiran dan variabel yang diteliti

Hospital infection disebut juga infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada seseorang penderita yang sedang dirawat atau berobat jalan di rumah sakit dan waktu dirawat tidak sedang dalam masa tunas suatu penyakit menular.

Pada penelitian ini akan diteliti umur penderita, jenis kelamin, lama perawatan dan manifestasi penyakit dari *hospital infection*.

1. Umur penderita : pada penelitian ini akan diketahui pada umur berapa saja penderita rawat inap di ruang perawatan RSUD Tenriawaru Watampone yang terkena *hospital infection*
2. Jenis kelamin : Dalam hal ini akan diketahui pada jenis kelamin apa *hospital infection* di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Watampone sering terkena
3. Lama perawatan : Pada penelitian ini akan diketahui lama perawatan yang mempunyai kasus *hospital infection* terbanyak
4. Manifestasi penyakit : Pada penelitian ini akan diketahui jenis *hospital infection* yang terdapat diruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kab. Bone.

Diagram kerangka konsep



Gambar III : Diagram Kerangka Konsep

B. Definisi operasional

1. *Hospital infection*

Infeksi yang didapatkan di rumah sakit dan terjadi setelah 72 jam perawatan dengan adanya infeksi yang jelas pada penderita selama dirawat di rumah sakit, atas dasar gejala klinis maupun laboratorium dan pada penderita tidak ditemukan tanda-tanda infeksi atau masa inkubasi dari penyakit yang bersangkutan sejak penderita mulai dirawat

2. Umur

Lamanya penderita hidup, sejak dilahirkan sesuai dengan yang tercantum dalam status penderita. Dalam penelitian ini, dikelompokkan berdasarkan:

- a. Anak : 1 - 11 tahun
- b. Remaja : 12 -17 tahun
- c. Dewasa muda : 18 - 25 tahun
- d. Dewasa tua : 26 - 60 tahun
- e. Usia lanjut : > 61 tahun

3. Jenis kelamin

Jenis kelamin penderita sesuai dengan yang dicantumkan dalam status penderita. Dibedakan atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

4. Lamanya perawatan

Lama perawatan selama di rumah sakit adalah jangka waktu penderita dirawat hingga penderita pulang, dihitung dalam hari :

- a. 3 – 6 hari (< 1 minggu)
- b. 7 – 20 hari (1 – 2 minggu)
- c. 21 – 34 hari (3 – 4 minggu)

5. Manifestasi penyakit

Manifestasi penyakit *hospital infection* berdasarkan gejala klinik dan penunjang (laboratorium dan foto thorax). Gejala yang sering dijumpai adalah demam, sedangkan sebelumnya tidak menderita demam. Gejala lain sesuai dengan bagian tubuh yang terinfeksi :

- a. Infeksi saluran nafas (ISPA): salah satu manifestasinya dapat berupa batuk, nyeri dada, dan sputum menjadi purulen, foto thoraks berubah.
- b. Infeksi saluran kemih (ISK): salah satu manifestasinya dapat berupa disuri, nyeri suprapubik, dan bila pemeriksaan laboratorium jumlah kuman >10 juta/ml
- c. Infeksi bekas luka operasi (ILO): manifestasinya berupa pus pada luka insisi
- d. Infeksi kulit : manifestasi berupa dekubitus
- e. Infeksi luka infus (ILI): terdapat flebitis
- f. Infeksi hepar : terdapat ikterus dan tes urologi positif

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang *hospital infection* menurut umur, jenis kelamin, lama perawatan, dan manifestasi penyakit.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah setiap subjek (dapat berupa manusia, binatang percobaan, dan lain-lain) yang memenuhi karakteristik yang ditentukan (*Sastroasmoro, 1995*). Ada dua jenis populasi yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Dengan perkataan lain populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Dari populasi terjangkau ini akan dipilih sampel, yang terdiri dari subjek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone selama peneliti melakukan penelitian.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi.

Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Proporsive sampling* adalah memilih sampel diantara populasi dengan sengaja atau memilih kasus atau responden sesuai dengan yang dikendaki dan memenuhi kriteria (Soekidjo Notoatmodjo, 2005).

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu semua populasi yang terinfeksi *hospital infection* ketika penelitian berlangsung dan memenuhi kriteria pemilihan sampel. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat atau tidaknya sampel itu digunakan.

a. Kriteria inklusi dan eksklusi

1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2002).

- a. Terdapat tindakan pembedahan dan perlukaan
- b. Lama perawatan > 3 hari
- c. Diagnosis masuk jelas

2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang tidak memiliki kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2002).

- a. Diagnosis masuk tidak jelas
- b. Lama perawatan < 3 hari
- c. Sudah terjadi perlukaan (infus)

- d. Riwayat demam dari rumah
- e. Perjalanan penyakit tidak tertulis

C. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone 16 Juni 2011 sampai 26 Juni 2011.

D. Instrumen penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu proyek penelitian adalah menyusun instrumen penelitian atau alat pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman observasi. Pedoman observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera. Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung proses upaya pencegahan *hospital infection* terhadap pasien di ruang perawatan bedah dengan menggunakan lembar observasi sebagai pedoman.

E. Prosedur pengumpulan data

Data penelitian yang diambil berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari survey yang dilakukan. Dalam pengambilan data, dilakukan seleksi terhadap pasien yang akan diteliti. Dimana pasien yang tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel tidak dimasukkan.

F. Teknik pengolahan data dan analisa data

1. Pengolahan data

Setelah data-data yang diharapkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan data yang meliputi :

a. Editing

Dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data menurut karakteristiknya masing-masing, kesinambungan data dan keragaman data.

b. Koding

Untuk memudahkan pengolahan data maka semua jawaban atau diberi kode menurut jawaban responden. Pengkodean ini dilakukan dengan pemberian halaman, daftar pertanyaan, nomor pertanyaan, nomor variabel dan nama variabel.

c. Tabulasi data

Data yang telah dikelompokkan, selanjutnya diolah dengan menggunakan program computer SPSS/PC versi 16.0 kemudian hasil analisis yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, dan penjelasan.

2. Analisa data

Setelah data terkumpul dilakukan uji analisis statistik yaitu analisis univariat yaitu untuk mengetahui dan memperlihatkan frekuensi serta presentase dari tiap variabel yang diteliti (*Aziz Alimul Hidayat, 2007*).

G. Etika penulisan

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak institusi atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian. Setelah mendapat persetujuan barulah dilakukan penelitian dengan menekankan masalah etika penelitian yang meliputi :

1. Informed consent

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian dan manfaat penelitian. Bila subjek menolak maka peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan tetap menghormati hak-hak subjek.

2. Anonimity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang *hospital infection* ini dilakukan pada pasien rawat inap di ruang perawatan bedah RSUD Tenriwaru Kelas B Kabupaten Bone pada tanggal 16 Juni 2011-26 Juni 2011. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 52 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu secara *purposive sampling*. Banyaknya sampel yang sekaligus dijadikan responden berjumlah 21 orang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu lembar observasi yang berbentuk lembar *check list* yang diisi oleh peneliti dari hasil observasi langsung pada responden.

A. Hasil Penelitian

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Karakteristik *hospital infection* berdasarkan umur

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik *hospital infection* berdasarkan umur yang terbagi dalam kelompok umur anak (1 – 11 tahun), remaja (12 – 17 tahun), dewasa muda (18 – 25 tahun), dewasa tua (26 – 60 tahun) dan usia lanjut (>61 tahun). Maka diperoleh data yang digambarkan dalam bentuk tabel dan sebagai berikut :

Tabel 5.1

**Karakteristik *hospital infection* berdasarkan umur
Di ruang perawatan bedah RSUD Tenriwaru kelas B**

Kabupaten Bone Tahun 2011

Umur	<i>Hospital Infection</i>								Total	
	Infeksi Luka infus		Infeksi saluran nafas akut		Infeksi luka operasi		Infeksi saluran kemih			
	n	f	n	f	n	f	N	f	n	f
Anak (1 -11 tahun)	1	4.8%	0	0%	0	0%	0	0%	1	4.8%
Remaja (12 – 17 tahun)	1	4.8%	0	0%	0	0%	0	0%	1	4.8%
Dewasa muda (18 – 25 tahun)	4	19.0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	19.0%
Dewasa tua (26 – 60 tahun)	8	38.1%	1	4.8%	1	4.8%	1	4.8%	11	52.4%
Usia lanjut (>61 tahun)	2	9.5%	1	4.8%	0	0%	1	4.8%	4	19.0%
Total	16	76.2%	2	9.5%	1	4.8%	2	9.5%	21	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa karakteristik *hospital infection* terbanyak pada kelompok umur dewasa tua (26 – 60 tahun) sebanyak 11 orang (52,4%), kemudian diikuti berturut-turut dewasa muda (18 – 25 tahun) sebanyak 4 orang (19,0%), usia lanjut (>61 tahun) sebanyak 4 orang (19,0%) dan paling sedikit anak (0 – 11 tahun) dan remaja (12 – 17 tahun) sebanyak 1 orang (4,8%).

2. Karakteristik *hospital infection* berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian angka kejadian *hospital infection* menurut jenis kelamin diperoleh data yang digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.2
karakteristik *hospital infection* berdasarkan jenis kelamin
Di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru kelas B
Kabupaten Bone Tahun 2011

Jenis kelamin	<i>Hospital Infection</i>								Total	
	Infeksi Luka infus		Infeksi saluran nafas akut		Infeksi luka operasi		Infeksi saluran kemih			
	n	f	n	f	n	F	n	f	n	f
Laki-laki	8	38.1%	1	4.8%	1	4.8%	2	9.5%	12	57.1%
Perempuan	8	38.1%	1	4.8%	0	0%	0	0%	9	42.9%
Total	16	76.2%	2	9.5%	1	4.8%	2	9.5%	21	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa karakteristik *hospital infection* terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebesar 12 orang (57.1%) dengan manifestasi penyakit terbanyak infeksi luka infuse kemudian infeksi saluran kemih dan terkecil infeksi saluran nafas akut dan infeksi luka operasi sedangkan perempuan sebesar 9 orang (42,9%) dengan manifestasi penyakit terbanyak yaitu infeksi luka infuse kemudian infeksi saluran nafas akut.

3. Karakteristik *hospital infection* berdasarkan lama perawatan

Berdasarkan hasil penelitian angka kejadian *hospital infection* menurut lama perawatan yang dihitung berdasarkan hari yang terbagi dalam 3 - 6 hari, 7 – 20 hari, dan 21 – 34 hari, diperoleh data yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3

Karakteristik *hospital infection* berdasarkan lama perawatan

Di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru kelas B

Kabupaten Bone Tahun 2011

Lama perawatan	<i>Hospital infection</i>								Total	
	Infeksi luka infus		Infeksi saluran nafas akut		Infeksi luka operasi		Infeksi saluran kemih			
	n	f	n	f	n	f	n	f	n	f
3 – 6 hari	6	28.6%	1	4.8%	0	0%	1	4.8%	8	38.1%
7 – 20 hari	10	47.6%	1	4.8%	1	4.8%	1	4.8%	13	61.9%
Total	16	76.2%	2	9.5%	1	4.8%	2	9.5%	21	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penderita yang dirawat antara 7 – 20 hari memiliki persentase angka kejadian *hospital infection* terbanyak yaitu 13 orang (61,91%) dengan manifestasi penyakit infeksi luka infuse sebanyak 6 orang dan kemudian diikuti 3 – 6 hari sebanyak 8 orang dengan manifestasi penyakit infeksi luka infus.

4. Karakteristik *hospital infection* berdasarkan manifestasi penyakit

Berdasarkan hasil penelitian angka kejadian *hospital infection* menurut manifestasi penyakit diperoleh data *hospital infection* dalam bentuk infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, infeksi luka operasi, infeksi luka infuse, infeksi kulit dan infeksi hepar yang digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 5.4
Karakteristik *hospital infection* berdasarkan manifestasi penyakit
Di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru kelas B
Kabupaten Bone Tahun 2011

Manifestasi penyakit	Jumlah penderita <i>hospital infection</i> (orang)	Persentase (%)
Infeksi saluran nafas	2	9.52
Infeksi saluran kemih	2	9.52
Infeksi luka operasi	1	4.76
Infeksi luka infuse	16	76.20
Jumlah	21	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa angka kejadian *hospital infection* terbanyak pada infeksi luka infuse sebanyak 16 orang (76,20%). Sementara infeksi saluran nafas dan infeksi saluran kemih memiliki angka kejadian *hospital infection* yang sama yaitu 2 orang (9,52%) dan infeksi luka operasi memiliki angka kejadian *hospital infection* sebanyak 1 orang (4,76%). Sedangkan kasus infeksi kulit dan infeksi hepar tidak ditemukan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan terhadap pasien rawat inap di ruang perawatan bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone pada tanggal 16 – 26 Juni 2011 diperoleh angka kejadian *hospital infection* sebanyak 21 orang. Pada penelitian yang dilakukan di dua kota besar di Indonesia pada masa-masa sekitar tahun 80-an yang dilaporkan oleh H. Iskandar Zulkarnain didapat angka *hospital infection* sekitar 20 – 60%.

Menurut Brachman dkk, seperti yang dilaporkan Janas dkk, data angka kejadian *hospital infection* berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Perbedaan ini menurut Benet karena berbagai faktor dasar seperti perbedaan umur dan status penyakit penderita, frekuensi dan jenis prosedur, terapi yang dilakukan, kelengkapan mengidentifikasi kasus, efektifitas pengawasan, lama rawat di rumah sakit, dan faktor lain yang tidak dapat diidentifikasi. Demikian juga dengan apa yang dijelaskan oleh Nasrum Massi bahwa penderita yang datang ke tempat pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia, sebagian besar adalah penderita penyakit infeksi, sehingga tidak mengherankan bila tempat pelayanan kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya adalah lingkungan yang berpotensi bahaya dalam hal penularan penyakit infeksi.

a. Angka kejadian *hospital infection* menurut umur

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, dapat diketahui bahwa kejadian *hospital infection* terbanyak pada kelompok umur dewasa tua (26 – 60 tahun) sebanyak 11 orang (52,4%) dengan *hospital infection* terbanyak infeksi luka

infus sebanyak 8 orang (38.1%) kemudian diikuti infeksi saluran nafas akut, infeksi luka operasi dan infeksi saluran kemih sebanyak 1 orang (4.8%). Kemudian diikuti dewasa muda (18 – 25 tahun) sebanyak 4 orang (19,0%) dengan infeksi luka infus sebanyak 4 orang (19.0%) dan tidak terdapat infeksi saluran nafas akut, infeksi luka operasi dan infeksi saluran kemih. Usia lanjut (>61 tahun) sebanyak 4 orang (19,0%) dengan jenis *hospital infection* terbanyak yaitu infeksi luka infus sebanyak 2 orang, infeksi saluran nafas akut dan infeksi saluran kemih sebanyak 1 orang (4.8%) dan tidak ditemukan infeksi luka operasi pada kelompok usia lanjut. Dan paling sedikit anak (1-11 tahun) dan remaja (12 – 17 tahun) sebanyak 1 orang (4,8%) dengan jenis *hospital infection* infeksi luka infus. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh H. Iskandar Zulkarnain bahwa pada usia yang lebih muda atau remaja dan usia lanjut memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah sehingga resiko mendapatkan *hospital infection* lebih besar.

Demikian pula dengan apa yang dijelaskan oleh Indan Entjang bahwa kemudahan untuk terkena infeksi (*susceptibility*) yang dimiliki penderita, misalnya usia (bayi, usia lanjut), status gizi (kurang gizi), penyakit yang sedang diderita (diabetes, AIDS).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syarifuddin yang menjelaskan bahwa kejadian *hospital infection* terbanyak pada kelompok umur dewasa meskipun pada penelitian tersebut tidak terdapat pembagian kelompok umur dewasa muda dan dewasa tua.

Dari hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kelompok umur dewasa tua (26 – 60 tahun) lebih cenderung terkena *hospital infection* khususnya infeksi luka infus. Hal ini disebabkan karena sistem imunitas remaja dan dewasa muda terhadap penyakit masih baik dibandingkan umur dewasa tua, anak dan usia lanjut. Namun, dalam penelitian ini kelompok usia lanjut memiliki angka kejadian *hospital infection* yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dewasa tua.

Selain itu, menurut peneliti angka kejadian *hospital infection* terbanyak pada kelompok usia dewasa tua disebabkan karena pada saat penelitian, pasien rawat inap di ruang perawatan bedah dominan kelompok usia dewasa tua dan sangat jarang ditemukan kelompok usia lanjut dan anak.

b. Angka kejadian *hospital infection* menurut jenis kelamin

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, dapat diketahui bahwa kejadian *hospital infection* terbanyak pada kelompok jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 orang (57,1%) dengan manifestasi terbanyak infeksi luka infuse sebanyak 8 orang (38.1%), infeksi saluran kemih sebanyak 2 orang (9.5%), kemudian infeksi saluran nafas akut dan infeksi luka operasi sebanyak 1 orang (4.8%) dibandingkan dengan perempuan 9 orang (42,86%) dengan manifestasi terbanyak infeksi luka infus sebanyak 8 orang (38.1%), infeksi saluran nafas akut sebanyak 1 orang (4.8%) dan tidak ditemukan infeksi luka operasi maupun infeksi saluran kemih. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nguyen dalam tesis Setiawati bahwa jenis kelamin laki-laki berisiko untuk mendapatkan *hospital infection* 1,7 kali dibandingkan dengan perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Syarifuddin yang menemukan bahwa kejadian *hospital infection* terbanyak pada kelompok jenis kelamin laki-laki (52,17%) dibandingkan dengan perempuan (47,83%).

Namun menurut Nguyen dalam tesis Setiawati menyimpulkan bahwa *hospital infection* tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pada infeksi saluran kemih ada perbedaan kejadian antara laki-laki dan perempuan karena perempuan secara anatomis memiliki uretra yang lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki.

Dari hasil penelitian diatas, jumlah pasien pada kelompok jenis kelamin laki-laki lebih cenderung terkena *hospital infection* dibanding pasien pada kelompok berjenis kelamin perempuan. Infeksi saluran kemih dan infeksi luka operasi hanya terdapat pada kelompok jenis kelamin laki-laki. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa perempuan lebih cenderung terkena *hospital infection* karena uretra perempuan lebih pendek dibanding uretra laki-laki.

Selain itu, jumlah pasien rawat inap pada saat dilakukan penelitian jumlah pasien laki-laki lebih banyak dibanding dengan pasien perempuan.

c. Angka kejadian *hospital infection* menurut lama perawatan

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diatas, dapat diketahui bahwa kejadian *hospital infection* tertinggi pada pasien rawat inap yang dirawat antara 7 – 20 hari yaitu sebanyak 13 orang (61,9%) dengan manifestasi terbanyak yaitu infeksi luka infus sebanyak 10 orang (47.6%) kemudian infeksi saluran nafas akut, infeksi luka operasi dan infeksi saluran kemih sebanyak 1 orang (4.8%) dan terendah pada lama perawatan 3-6 hari sebanyak 8 orang (38,09%) dengan

manifestasi terbanyak yaitu infeksi luka infuse sebanyak 6 orang (28.6%), infeksi saluran nafas akut dan infeksi saluran kemih sebanyak 1 orang (4.8%) dan tidak ditemukan infeksi luka operasi. Sedangkan pada lama perawatan 21 – 34 hari tidak ditemukan pada saat penelitian.

Hal ini berbeda dengan pendapat Mireya dalam tesis Setiawati bahwa pasien yang dirawat lebih lama di rumah sakit beresiko mendapatkan infeksi lebih tinggi dibandingkan dengan lama rawat yang singkat. Semakin lama hari rawat maka akan semakin terpapar terhadap agen pathogen dari rumah sakit sehingga *hospital infection* pun akan semakin tinggi.

Namun pada penelitian ini, *hospital infection* tertinggi pada kelompok lama perawatan antara 7 – 20 hari karena rata-rata pasien yang dirawat di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kab. Bone berkisar antara 7 – 20 hari dan jarang sekali terdapat pasien yang dirawat lebih dari 20 hari bahkan tidak ada.

Semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, maka semakin rentan pula untuk terkena *hospital infection*. Hal ini disebabkan karena selain daya tahan tubuh pasien yang masih belum stabil, di rumah sakit juga banyak terdapat jenis-jenis penyakit yang mudah menular sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyebar ke pasien yang awalnya tidak terkena penyakit tersebut.

d. Angka kejadian *hospital infection* menurut manifestasi penyakit

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diatas , dapat diketahui bahwa kejadian *hospital infection* tertinggi pada manifestasi penyakit infeksi luka infus yaitu sebanyak 16 orang (76, 20%) dalam bentuk demam dan phlebitis. Infeksi

saluran nafas dan saluran kemih sebanyak 2 orang (9,52%), dan terendah infeksi luka operasi sebanyak 1 orang (4,76%). Sedangkan infeksi kulit dan infeksi hepar tidak ditemukan.

Penelitian ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh H. Iskandar Zulkarnain bahwa pada ruang perawatan diperkirakan 20 – 25% pasien memerlukan terapi infuse dengan pemakaian/pemasangan infuse yang tidak diganti-ganti sesuai prosedur standar pencegahan infeksi rumah sakit. Komplikasi kanula intravena ini dapat berupa gangguan faktor mekanis, fisis, dan kimiawi atau gangguan yang berhubungan dengan flora mikrobiologis. Komplikasi tersebut dapat berupa ekstrasvasasi, penyumbatan, phlebitis, septicemia dll.

Demikian juga dengan apa yang dijelaskan oleh Nasrum Massi bahwa bila dilakukan tindakan invasive, misalnya pada pemasangan pipa endotrakheal, infuse, kateter dan lain-lain. Maka bisa terjadi kerusakan pertahanan tubuh setempat pada mukosa, sehingga memungkinkan invasi mikroorganisme ke dalam jaringan.

Dari hasil penelitian diatas, diketahui bahwa jumlah penderita *hospital infection* dengan manifestasi penyakit infeksi luka infus (phlebitis) lebih banyak daripada manifestasi penyakit lainnya. Hal ini disebabkan karena hampir semua pasien rawat inap dilakukan tindakan invasif berupa pemasangan infus. Ketika kulit ditembus oleh kateter intravena dapat menjadi hospes yang rentan terhadap organisme endogen dan eksogen yang resisten dan masuk kedalam tubuh sehingga menyebabkan infeksi.

Adapun salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko infeksi yaitu sewaktu pemakaian kateter intravena dengan pemberian suntikan berkali-kali, pencemaran silang melalui tangan petugas sewaktu tindakan dan perawatan waktu pemasangan serta pemasangan atau penggantian balutan yang tidak benar.

Phlebitis adalah peradangan pada dinding pembuluh darah balik/vena. Phlebitis dapat timbul secara spontan ataupun merupakan akibat dari prosedur medis. Secara mekanis, phlebitis dapat timbul karena :

1. Diameter jarum kateter terlalu besar sehingga vena teregang,
2. Cara insersi kateter yang tidak baik, dan
3. Fiksasi tidak baik sehingga kateter bergerak-gerak.

Secara bakterial, phlebitis timbul karena pencemaran. Kebanyakan infeksi disebabkan oleh pencemaran kateter dengan mikroorganisme dari kulit pasien atau tangan petugas sewaktu memasang/perawatan karena kateter yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Mikroorganisme dapat disalurkan kedalam pembuluh darah melalui empat jalan sebagai berikut:

1. Melalui ruangan diantara kateter dan jaringan
2. Melalui pencemaran dengan bagian tengah (lumen kateter). Pemakaian sebuah jarum untuk beberapa orang dapat meningkatkan resiko penularan penyakit.
3. Melalui cairan infus yang tercemar.
 - a. Kadang-kadang obat dimasukkan ke dalam botol infus. Suntikkan obat melalui karet karena lebih elastik dan setelah ditusuk karet akan menutup kembali, sementara menusuk badan badan plastic akan menyebabkan lubang yang menyebabkan resiko masuknya bakteri ke dalam cairan.

- b. Saat penggantian botol, setelah segel dibuka tidak perlu didisinfektan karena sudah steril.
 - c. Bila set infus terlepas dari sambungan, sebaiknya ganti dengan yang baru.
Set infus diganti maksimal setelah infus terpasang 72 jam.
4. Melalui pembuluh darah dari tempat infeksi lain.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran *hospital infection* di ruang perawatan bedah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penderita *hospital infection* terdapat pada kelompok umur dewasa tua yakni sebesar 52,38%.
2. Kasus *hospital infection* paling banyak terdapat pada penderita yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 57,14% disbanding perempuan sebesar 42,86%.
3. Pasien dengan lama perawatan 7 – 20 hari menduduki peringkat pertama terjadinya *hospital infection* yaitu sebesar 61,91%.
4. Manifestasi *hospital infection* paling banyak ditemukan pada infeksi luka infuse yaitu sebesar 76,20%.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh *hospital infection* serta hal-hal yang menjadi kesimpulan dari peneliti, maka disarankan :

1. Prosedur kewaspadaan universal harus diterapkan oleh pihak rumah sakit dan dilaksanakan baik oleh tenaga medis maupun oleh paramedik

2. Pengunjung rumah sakit harus dibatasi dari segi jumlah, waktu maupun lama kunjungan.
3. Diagnosis masuk dan keluar harus jelas serta perjalanan penyakit harus tertulis jelas dalam status pasien agar memudahkan penelitian dan pengendalian penyakit ini selanjutnya.
4. Tenaga medis maupun paramedic sebaiknya memperhatikan keadaan serta keluhan-keluhan pasien demi meningkatkan kesejahteraan pasien.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Alimul, Azis. 2007. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Salemba Medika : Jakarta.

Artama, Syaputra. 2009. *Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja Perawat dalam Upaya Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Perawatan Anak RSUD Labuang Baji Makassar*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar : Makassar.

Az-Zabidi, Imam. 1997. *Ringkasan Shahih Al-Qur'an*. Mizan : Bandung

Brooks, Geo F dkk. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran Edisi Pertama*. Salemba Medika : Jakarta.

Darmadi. 2008. *Infeksi Nosokomial Problematika dan Pengendaliannya*. Salemba Medika : Jakarta

Departemen Kesehatan RI. 2003. *Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan*. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan : Jakarta.

Halim, Sutriani. 2010. *Studi Perbandingan Tingkat Kemandirian antara Lansia yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha gau Mabaji Kab. Gowa dengan yang tinggal di Rumah Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-kassi*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar : Makassar.

Iskandar, Zulkarnain. 2007. *Infeksi Nosokomial dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam jilid III*. FKUI : Jakarta

Massi, Nasrum dkk. 2008. *Mikrobiologi Kedokteran untuk Paramedik*. Bagian Mikrobiologi kedokteran UNHAS : Makassar

Notoatmodjo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta : Jakarta.

Nursalam. 2002. *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional Edisi II*. Salemba Medika : Jakarta.

Nursalam & Siti Priani. 2000. *Metodologi Riset Keperawatan*. CV.Agung Seto : Jakarta

Pelczar, Michael J dkk. 1988. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. UI Press : Jakarta

- Phair JP. 1994. *Infeksi Nosokomial dalam Dasar Biologis dan Klinis Penyakit Infeksi Edisi Keempat*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Potter & Perry. 2006. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Volume 2 Edisi 4*. EGC : Jakarta.
- Rohani dkk. 2010. *Panduan Praktik Keperawatan Nosokomial*. Citra Aji Parama:Yogyakarta.
- Samad I.A. 1998. *Infeksi Nosokomial dalam Ilmu Patologi Klinik Edisi Pertama*. Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unhas : Makassar.
- Sastroasmoro, S & Ismail, S. 1995. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Binarupa Aksara : Jakarta
- Schaffer. 2000. *Pencegahan Infeksi dan Praktek yang Aman*. EGC : Jakarta.
- Suyuti, Machmud. 2009. *Hadis Wa'ulumuhu Syarh al-hadis tentang IPTEK*. UIN Alauddin Makassar : Makassar.
- Syahrurachman, Agus dkk. 1993. *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*. Binarupa Aksara : Jakarta.
- Syarifuddin & Hasanuddin. 2006. *Studi Tentang Gambaran Infeksi Nosokomial di Bangsal Penyakit Dalam Lontara I Bawah Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Agustus 2005 – Juli 2006*. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin : Makassar
- Tietjen, Linda dkk. 2004. *Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : Jakarta
- Waluyo, Lud. 2005. *Mikrobiologi Umum*. UMM Press : Malang.
- Yayasan Spiritia. 2007. *Infeksi Nosokomial dan Kewaspadaan Universal*. <http://www.spiritia.or.id.htm> Diakses pada Sabtu, 23 Oktober 2010.

RIWAYAT HIDUP



Rini Ayu Lestari, lahir di Desa Patangkai, 13 Maret 1989 Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone merupakan buah hati dari Muh. Syamsuri, SKM.,M.Kes dan Nuraeni. Penulis merupakan anak sulung dari 3 bersaudara.

Tahun 1996 bersekolah di SD Inp 10/73 Patangkai dan tamat pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP N 1 Lappariaja dan tamat pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Lappariaja tamat pada tahun 2007. Dan sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R