

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN BBL
(BERAT BADAN LAHIR) DI PUSKESMAS ASKA
KEC. SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar

Oleh :

MUTHAHHARAH

70300107066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
JURUSAN KEPERAWATAN
MAKASSAR**

2011

ABSTRAK

NAMA : MUTHAHHARAH
NIM : 70300107066
JUDUL : ANALISA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
BBL (BERAT BADAN LAHIR) DI PUSKESMAS ASKA
KEC. SINJAI SELATAN KAB. SINJAI

Bayi merupakan generasi pelanjut untuk masa depan yang lebih baik sehingga memerlukan perhatian yang sangat besar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus adalah BBL (Berat Badan Lahir) dan banyak faktor yang diduga mempengaruhi kejadian tersebut yang dapat mempengaruhi angka kelahiran hidup pada bayi.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitiannya adalah *Survey analitic* yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejadian BBL di Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan pendekatan *Cross Sectional*. Data yang dikumpulkan berdasarkan data sekunder yang tercatat pada rekam medik tahun 2010 dengan teknik populasi dan sampel (total sampling) sebanyak 124 orang. Data kemudian diolah dengan analisa univariat dan bivariat, kemudian dilanjutkan dengan uji *chi-square* dan disajikan dalam bentuk tabel.

Dari hasil penelitian di peroleh bahwa dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya BBL yang diteliti hanya kasus Anemi yang memiliki hubungan yang besar dengan kejadian BBL di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai dengan persentase kejadian 42,35% hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan nilai $X^2 > 3,841$ atau $P < 0,05$. Sedangkan peluang kejadian umur mempengaruhi BBL sebesar 13,03% dan parietas mempengaruhi BBL sebesar 5,06%.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa persentase terbesar yang mempengaruhi BBL di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai adalah faktor status anemia ibu hamil. Akibat analisa data yang hanya menggunakan data sekunder oleh peneliti inilah yang menjadi penyebab keterbatasan penelitian ini, sehingga diharapkan untuk diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai hal ini.

Kata Kunci : Umur, Status Anemia, Parietas, BBL

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

I. IDENTITAS KLIEN

NAMA :

II. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BBLR

a. Umur / Usia Ibu

1. Resiko Tinggi
2. Resiko rendah

b. Anemia

1. Anemia
2. Tidak anemia

c. Paritas

1. Resiko tinggi
2. Resiko rendah

d. Berat Badan Lahir Bayi

1. BBLR
2. BBLN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “Analisis Faktor yang Berhubungan Dengan BBL (Berat Badan Lahir) Di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MA, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M. Ag, selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program S1 Ilmu Keperawatan.
3. Nur Hidayah, S. Kep, Ns, M. Kes, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Hasnah, S. Sit, M. Kes, selaku pembimbing utama yang ditengah kesibukan beliau telah memberikan pengarahan, saran, kritik dan motivasi mulai dari persiapan proposal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
5. Hj. Andi Asriany, SKM, M.Kes, selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan bimbingan dan saran serta motivasi sampai skripsi ini diselesaikan.
6. Hj. Halwatiah, S. Kep, Ns, M. Kes, selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi menyempurnakan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Samiang Katu, M. Ag selaku penguji II yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mulai dari semester I sampai semester VIII pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Dr. Andi Eliya Supardi selaku kepala Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di puskesmas tersebut.
10. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Abd. Kadir. M, S. Ag dan Ibunda Hariyatni Achmad, A. Ma. Pd yang penuh kasih sayang, dukungan, doa serta kesempatan kepada penulis untuk kuliah dengan sebuah harapan agar penulis dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kelak nanti, yang insya Allah akan penulis kabulkan.
11. Kepada kakak dan adikku tercinta atas segala doa, perhatian dan dorongan moril maupun materil penulis ucapkan banyak terima kasih

12. Kepada rekan – rekan UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar serta teman-teman KKN di ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Immank, Maya, K'Cia serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dan Ridho dari Allah SWT, Amin.

Makassar, 21 Juli 2011

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Muthahharah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1 - 7
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8 - 28
A. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir Rendah	9
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor - Faktor yang Mempengaruhi BBLR	23
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	29 – 35
A. Dasar Pemikiran Variabel yang di Teliti.....	29
B. Kerangka Kerja.....	32
C. Kerangka Konsep Penelitian.....	33
D. Hipotesa Penelitian	33
E. Definisi Operasional.....	34


BAB IV	METODE PENELITIAN.....	36 – 38
	A. Desain Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian.....	36
	C. Populasi dan Sampel.....	36
	D. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
	E. Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39 – 52
	A. Hasil Penelitian.....	39
	B. Pembahasan.....	44
BAB VI	PENUTUP.....	53 – 54
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	xv
	LAMPIRAN.....	xvi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Umur Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	40
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Status Anemia Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	40
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Parietas Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	41
Tabel 5.4 Hubungan Antara Umur Ibu Dengan Kejadian BBL Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	42
Tabel 5.5 Hubungan Antara Status Anemia Dengan Kejadian BBL Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	43
Tabel 5.6 Hubungan Antara Parietas Dengan Kejadian BBL Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai Tahun 2010.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman pengumpulan data
- Lampiran 2 : Data penelitian
- Lampiran 3 : Data hasil SPSS
- Lampiran 4 : Rekomendasi penelitian dari Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai.
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas Aska
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Juli 2011

Penyusun,

MUTHAHHARAH
NIM : 70300107066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Strategi Nasional *Making Pregnancy Safer* di Indonesia 2010 disebutkan bahwa dalam konteks Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 adalah “Kehamilan dan persalinan berlangsung aman, serta bayi yang dilahirkan hidup dan sehat (Depkes, 2002).

Menurut SKRT dalam profil kesehatan kota Bogor (2002) angka anemia ibu hamil yaitu 51,8 persen pada trimester I, 58,2 persen pada trimester II, dan 49,4 persen pada trimester III. Adapun penyebab tidak langsung kesakitan dan kematian ibu adalah kejadian anemia pada ibu hamil sekitar 51 persen dan pada ibu nifas 45 persen serta karena kurang energi protein (Depkes, 2006).

Disamping itu, angka kesakitan dan kematian neonatal di Indonesia juga masih sangat tinggi. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kematian neonatal 21,8 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah karena kelahiran bayi berat lahir rendah. Keadaan tersebut tentunya akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia (Saifuddin AB, 2002).

Biaya yang digunakan untuk merawat Bayi Berat Lahir Rendah merupakan salah satu ukuran beban nasional pada kelahiran preterm. Secara individual, tidak jarang bayi-bayi amat kecil yang bertahan hidup

membutuhkan biaya perawatan yang mencapai beberapa ribu dolar, Penyebab kematian terbanyak adalah karena kelahiran bayi berat lahir rendah. Keadaan tersebut tentunya akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Status gizi ibu sebelum dan sesudah hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) mempunyai kebutuhan gizi yang khusus hal tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan yang sangat cepat dan juga karena perkembangan yang masih jauh tertinggal (Husaini M.A, 2005).

Dalam pemberian makan BBLR, Gizi ibu pada waktu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya. Angka kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) lebih tinggi dinegara-negara yang sedang berkembang dari pada dinegara-negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan karena adanya keadaan sosial ekonomi yang masih rendah dan mempengaruhi diet ibu.

Berat badan lahir bayi pada dasarnya berhubungan dengan kurangnya pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan ibu dan hal ini berhubungan dengan banyak faktor dan lebih utama pada masalah perekonomian keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan pun kurang. Namun kejadian BBLR juga dapat terjadi tidak hanya karena aspek perekonomian, tetapi kejadian BBLR dapat saja terjadi pada status perekonomian yang cukup (Rano, 2006).

Ibu hamil pada usia muda biasanya pengetahuan akan gizi masih kurang, sehingga berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya angka kelahiran yang mengakibatkan prematurius, kecerdasan anak kurang, serta berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

Bayi lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor resiko yang mempunyai kontribusi terhadap kematian bayi khususnya pada masa perinatal. Bayi dengan berat badan lahir rendah dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia tumbuh kembang sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Israr Akhyar Y, 2008).

Terjadinya berat badan lahir rendah (BBLR) karena terdapat dua penyebab kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram yaitu karena umur hamil kurang dari 37 minggu, berat badan lebih rendah dari semestinya, sekalipun umur cukup, atau karena kombinasi keduanya (Israr Akhyar Y, 2008).

Prevalensi bayi berat badan lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15 persen dari seluruh kelahiran di dunia dengan batasan 3,3 persen sampai 38 persen dan lebih sering terjadi di Negara-negara berkembang atau sosio-ekonomi rendah. Secara statistik menunjukkan 90 persen kejadian BBLR di dapatkan di Negara berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi di banding pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 gram. BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan mortalitas, morbiditas, dan disabilitas neonatus, bayi

dan anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya di masa depan.

Data dari Depkes, masalah gizi di Indonesia ternyata jauh lebih serius. Gizi buruk atau anemia besi tidak hanya pada bayi atau balita tetapi semua kelompok umur perempuan dan paling rentan adalah wanita hamil. Diperkirakan dari 4 juta wanita hamil separuhnya wanita hamil dan 1 juta lainnya kekurangan energi kronik. Dari kondisi ini rata-rata setiap tahun terlahir 350.000 bayi dengan kondisi BBLR (Sri Hartina, 2006).

Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain yaitu berkisar 30 persen sampai 90 persen, hasil studi di tujuh daerah multisenter diperoleh angka BBLR dengan rentang 2,1 persen sampai 17,2 persen. Secara Nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5 persen. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat 2010 yakni maksimal tujuh persen (Yayang Akhyar, 2008).

Di Indonesia dari berbagai penelitian kesehatan (tahun 2007) dan beberapa pengamatan intensif telah didapatkan perkiraan angka BBLR yang ada di masyarakat Indonesia tahun 2007 proporsi BBLR sebesar tujuh persen sampai 14 persen. Berdasarkan hasil pengumpulan data indikator kesehatan provinsi diperoleh proporsi BBLR pada tahun 2007 sebesar 0,91 persen untuk Gorontalo, 1,8 persen untuk Jawa Tengah, 0,54 persen untuk Sumatra Utara, sedangkan untuk Sulawesi Selatan diperoleh data sebesar 1,16 persen dari 134.434 bayi lahir hidup (Profil Kesehatan Sul-Sel, 2008).

Data yang diperoleh dari Dinas kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2007 bahwa prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah adalah sebanyak 43 persen dari kasus persalinan, tahun 2008 tercatat 43 persen dari kasus persalinan dan tahun 2009 tercatat sebanyak 45 persen dari kasus persalinan (Data Laporan tahunan Dinkes Kab. Sinjai, 2009).

Berdasarkan data awal dari Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai, bayi dengan berat badan lahir rendah tahun 2007 adalah sebanyak 11 persen dari kasus persalinan, tahun 2008 tercatat sebanyak 15 persen dari kasus persalinan, dan tahun 2009 tercatat sebanyak 15 persen dari kasus persalinan (Data Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, 2009).

Dengan melihat masih tingginya kejadian bayi berat badan lahir rendah khususnya di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, maka peneliti tertarik ingin meneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBL pada bayi di Puskesmas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apakah yang mempengaruhi Berat Badan Lahir (BBL) di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya faktor yang berhubungan dengan Berat Badan Lahir (BBL) di Puskesmas tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya hubungan antara umur dengan kejadian BBL
- b. Diketuainya hubungan anemia dengan kejadian BBL
- c. Diketuainya hubungan parietas dengan kejadian BBL

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis. diantaranya;

1. Manfaat secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritik dari dunia pendidikan dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan BBL pada setiap persalinan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi institusi

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai gambaran persepsi ibu hamil tentang faktor yang berhubungan dengan BBL.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi kesehatan bagi pengambil kebijakan dalam peningkatan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak.

b. Bagi pelayanan kesehatan

1. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan di desa dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan ANC bagi ibu hamil agar tidak melahirkan bayi dengan BBLR.
2. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perawatan khususnya dalam perawatan bayi.

c. Bagi peneliti

1. Merupakan pengalaman nyata yang dapat menambah wawasan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta kemampuan dalam hal penelitian kesehatan khususnya pada kasus BBL.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan berfikir bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir (BBL)

Hanifa, W (1997) mengemukakan bahwa, salah satu indikator keberhasilan tumbuh kembang janin selama dalam kandungan adalah berat badan lahir. Berat badan lahir adalah berat badan neonatus yang ditimbang dalam waktu satu jam sesudah lahir.

Bayi berat badan lahir normal adalah bayi yang baru lahir dengan berat badan lahirnya lebih atau sama dengan 2500 gram. Pembagian berat badan lahir sangat mudah tetapi tidak memuaskan. Ternyata bahwa morbiditas dan mortalitas neonatus tidak hanya tergantung dari berat badannya tetapi juga pada maturitas bayi tersebut. Selain itu dinegara yang masih berkembang batas 2500 gram sebagai bayi prematur mungkin masih tinggi karena berat badan rata-rata lebih rendah. (Nurjuwita, 2003)

Berat badan lahir merupakan interaksi berbagai faktor melalui suatu proses yang berlangsung selama dalam kandungan. Berat badan lahir berhubungan erat dengan kelangsungan hidup dan kesehatan bayi, akan tetapi sulit dipisahkan dari tingkat pendapatan perkapita, ketersediaan dan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan serta konsumsi makanan sehari-hari.

Pertumbuhan janin untuk masa gestasi dikatakan baik bila berat badannya sesuai dengan berat badan seharusnya untuk masa gestasi tersebut.

Sebagai suatu hasil interaksi antara pertumbuhan dan usia kehamilan, kemampuan janin mencapai berat badan bayi yang optimal saat lahir ditentukan oleh adanya persediaan zat gizi yang cukup dalam mutu dan jumlah, kemampuan memanfaatkan zat gizi untuk melanjutkan proses tumbuh kembang serta kesediaan ibu memeriksakan kehamilannya hingga cukup bulan. Mekanisme kerja ketiga faktor tersebut masih dikendalikan oleh interaksi antara faktor genetik, biologi dan lingkungan. Banyak faktor penentu pertumbuhan janin yang berhubungan dengan ketersediaan dan pemanfaatan zat gizi. Hal ini mengarah pada pentingnya status gizi ibu dalam kaitannya dengan berat badan lahir. Akan tetapi status gizi ibu tidak berarti hanya dengan konsumsi makannya selama hamil saja.

B. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir Rendah

1. Pengertian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

a. Israr Akhyar Y

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 (sampai dengan 2499 gram). Berkaitan dengan penanganan dan harapan hidupnya, bayi berat lahir rendah dibedakan dalam; 1) Bayi berat badan lahir rendah (BBLR), berat lahir 1500- 2500, 2) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR), berat lahir <1500 gram, 3) Bayi berat lahir ekstrem rendah (BBLER), berat lahir <1000 gram (Israr Akhyar Y, 2008).

b. Rano Z

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir (neonatus) yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram saat kelahiran tanpa memperhatikan umur kehamilan. Lebih dari dua per tiga kematian adalah BBLR yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Lebih dari dua per tiga kematian adalah BBLR yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram. BBLR juga merupakan salah satu dari ibu hamil yang menderita energi kronis dan akan mempunyai status gizi buruk (Rano Z, 2006).

c. Azis Alimul Hidayat

Berat Badan Lahir Rendah merupakan bayi (neonatus) yang lahir dengan memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram atau 2499 gram. Dalam penentuan bayi dengan berat badan lahir rendah terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui seperti prematuritas murni dan dismatur (Hidayat A, 2005).

d. Depkes RI

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah salah satu hasil dari ibu hamil yang menderita energi kronis dan akan mempunyai status gizi buruk. BBLR berkaitan dengan tingginya angka kematian bayi dan balita, juga dapat berdampak serius pada kualitas generasi mendatang, yaitu akan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpengaruh pada penurunan kecerdasan (Depkes RI, 2006).

e. Wiknjosastro

Sejak tahun 1960 WHO telah mengganti istilah *premature baby* dengan *low birth weigh baby* (Bayi dengan berat badan lahir rendah). Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi dengan berat kurang dari 2500 gram waktu lahir adalah *premature*. Keadaan ini dapat disebabkan oleh; 1) masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan yang sesuai dengan masa kehamilan dihitung mulai dari pertama haid terakhir dari haid yang teratur, 2) bayi small for gestational age (SGA), bayi yang beratnya kurang dari semestinya menurut masa kehamilannya disebut kecil untuk masa kehamilan atau disingkat KMK (Wiknjosastro, 2005).

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Bayi dengan berat badan lahir rendah disebut juga sebagai bayi prematur dimana bayi yang lahir tersebut memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram atau 2499 gram yang diakibatkan oleh berbagai faktor.

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT Q.S At-Tiin ayat empat mengatakan bahwa:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾

Terjemahannya :

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kandungannya :

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang lebih sempurna dibandingkan ciptaannya yang lain. Kejadian BBLR merupakan kejadian dimana bayi memiliki berat badan yang kurang dari normal, namun walaupun berat badan bayi kurang dari normal kita sebagai manusia harus bersyukur apa yang telah diciptakan Allah SWT, Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

Untuk keseragaman, maka pada tahun 1979, WHO mengklasifikasikan pembagian kehamilan sebagai berikut :

- a. Preterm (bayi kurang bulan) ialah umur masa kehamilan kurang dari 37 minggu atau 259 hari.
- b. Aterm (bayi cukup bulan) ialah umur kehamilan mulai dari 37 sampai 42 minggu atau 259 sampai 293 hari.
- c. Post-term (bayi lebih bulan) ialah umur kehamilan diatas 42 minggu atau 294 hari (Wiknjosastro, 2005).

2. ***Pembagian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)***

Mochtar (1998) membagi BBLR menjadi 2 golongan :

- a. Prematuritas Murni

Bayi yang lahir dengan masa gestasi yang kurang dari 37 minggu dan berat badan untuk masa gestasinya disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan.

b. Dismaturitas

artinya bayi mengalami retardasi pertumbuhan intra uterine dan merupakan bayi yang kecil untuk masa kehamilan.

3. ***Klasifikasi Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)***

Saifuddin (2002) mengklasifikasikan BBLR dalam kategori :

- a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi yang memiliki berat badan lahir antara 1500 – 2500 gram.
- b. Bayi Berat Badan Lahir Rendah Sangat Rendah (BBLSR) yaitu bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 1500 gram.
- c. Bayi Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah (BBER) yaitu bayi memiliki berat badan lahir kurang dari 1000 gram.

4. ***Gambaran Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)***

Secara umum bayi dengan berat badan lahir rendah sangat tergantung dari umur kehamilan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin kecil bayi yang lahir maka akan semakin mudah pula umur kehamilan. Sebagai gambaran umum dapat dilihat dengan berat badan lahir rendah mempunyai karakteristik:

- a. Warna, biasanya merah jambu atau merah terang tetapi bisa juga akrosianotik, pantau adanya sianosis, ikterk dan plethora.
- b. Kulit berwarna kemerahan, translusen (tembus cahaya), pembuluh darah tampak jelas, kurang lemak subcutan.
- c. Jumlah lanugo sangat banyak dan tersebar luas.
- d. Ukuran kepala tampak lebih besar dibandingkan tubuh.

- e. Tulang tengkorak lentur, fontanel lembut dan datar
- f. Telinga, kartilago berjumlah minimal, lentur, dapat terlipat seluruhnya.
- g. Kuku lembut, pendek
- h. Genetalia kecil, testis mungkin belum turun
- i. Posisi istirahat kaki seperti posisi katak.
- j. Tangisan lemah, kurang kekuatan fisiknya.
- k. Refleks mengisap, menelan dan bersendawa lemah.
- l. Aktifitas tersentak-sentak, pergerakan menyeluruh (aktifitas kejang adalah abnormal) (Ladewing, Patricia. 2005).

Hal tersebut di atas juga di jelaskan dalam Al-Qur;an Surah Al-Infithaar ayat tujuh dan delapan yang berbunyi :

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu (Q.S. Al- Infithaar : 7 dan 8)

Kandungannya :

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menyempurnakan kejadian manusia dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, namun karena beberapa faktor sehingga terjadi BBLR dimana BBLR ini mempunyai susunan tubuh dan organ-organ yang belum sempurna.

5. *Patofisiologi Terjadinya Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah*

Menurut Rano Z (2006), Semakin kecil dan semakin premature bayi itu maka semakin tinggi resiko gizinya. Beberapa faktor yang memberikan efek pada masalah gizi adalah :

1. Menurunnya simpanan zat gizi. Hampir semua lemak, glikogen, dan mineral, seperti zat besi, kalsium, fosfor dan seng dideposit selama 8 minggu terakhir kehamilan.
2. Meningkatnya kilokalori untuk bertumbuh. BBLR memerlukan sekitar 120 kkal/kg/hari, dibandingkan neonatus aterm sekitar 108 kkal/kg/hari.
3. Belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan. Koordinasi antara isap dan menelan, dengan penutupan epiglotis untuk mencegah aspirasi pneumonia, belum berkembang dengan baik sampai kehamilan 32 sampai 34 minggu.
4. Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan. Bayi preterm mempunyai lebih sedikit simpanan garam empedu, yang diperlukan untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak, dibandingkan bayi aterm.
5. Paru-paru yang belum matang dengan peningkatan kerja bernafas dan kebutuhan kalori yang meningkat. Masalah pernafasan juga akan mengganggu makanan secara oral.
6. Potensial untuk kehilangan panas akibat luasnya permukaan tubuh dibandingkan dengan berat badan, dan sedikitnya lemak pada jaringan di bawah kulit yang memberikan insulasi (Moore, 1997).

Lebih lanjut Rano Z (2006), mengatakan bahwa penyulit bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut :

1. Umur ibu hamil saat persalinan

Makin muda kehamilan makin sulit beradaptasi dengan keadaan luar rahim sehingga terjadi komplikasi yang makin besar.

2. Asfiksia/iskemia otak dapat terjadi nekrosis dan perdarahan.

3. Gangguan metabolisme menimbulkan asidosis, hipoglisemia dan hiperbilirubinemia.

4. Mudah terjadi infeksi menjadi sepsis dan meningitis.

5. Bila bayi dengan berat badan lahir rendah masih perlu dipertimbangkan kelanjutan penyulit, yaitu gangguan panca indera, gangguan system motorik saraf pusat, dapat terjadi hidrosefalus, cerebral palsy (Manuaba, 2002).

Anjuran pada ibu hamil untuk mencegah kelahiran BBLR pada masa kehamilan adalah sebagai berikut ;

1. Menganjurkan para ibu-ibu untuk pergi memeriksakan kehamilannya ke BKIA/Puskesmas terdekat secara teratur.

2. Ibu hamil makan lebih banyak makanan yang bergizi atau 1 kali lebih sering dari pada sebelum masa hamil.

3. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara teratur minimal 4 kali selama kehamilan.

4. Ibu hamil minum tablet zat besi secara teratur setiap hari 1 tablet sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan dan 40 tablet setelah persalinan.
5. Ibu hamil harus mengurangi kerja yang dapat melelahkan dan mendapat istirahat yang cukup dan tidur lebih awal.
6. ***Pengkajian Perawatan pada Bayi berat Badan Lahir Rendah***

Pengkajian yang dapat dilakukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah antara lain; dengan pengukuran berat badan didapatkan hasil kurang dari 2500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, dan lingkar dada kurang dari 33 cm, masa gestasi kurang dari 37 minggu, adanya kulit tipis dan transparan, adanya kepala lebih besar dari pada badan, adanya lanugo banyak terutama pada dahi, pelipis, telinga dan lengan, jumlah lemak subkutan kurang, ubun-ubun dan sutura lebar, labio minora belum tertutup oleh labio mayora (pada wanita) dan pada laki-laki testis belum turun, tulang rawan dan daun telinga imatur, pergerakan kurang dan lemah, tangisan lemah, pernafasan belum teratur dan sering mengalami serangan apnea, refleks tonus leher lemah, refleks menghisap dan menelan serta refleks batuk belum sempurna, kulit terselubung verniks kaseosa tipis atau tidak ada, kulit pucat atau bernoda mekonium, kering keriput tipis, jaringan lemak di bawah kulit tipis, bayi tampak gesit, aktif dan kuat, tali pusat berwarna kuning kehijauan (Hidayat, 2005).

7. *Diagnosis dan Gejala Klinis*

1. Sebelum bayi lahir

- a. Pada anamnesa sering dijumpai adanya riwayat abortus, partus prematurus dan lahir mati.
- b. Pembesaran uterus tidak sesuai tuanya kehamilan.
- c. Pergerakan janin yang pertama (*quickening*) terjadi lebih lambat, gerakan janin lebih lambat walaupun kehamilannya sudah agak lanjut.
- d. Pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai menurut yang seharusnya.
- e. Sering dijumpai kehamilan dengan oligihidramnion atau bisa pula dengan hidramnion, hipermesis gravidarum dan pada hamil lanjut dengan toksemia gravidarum atau perdarahan antepartum.

2. Setelah bayi lahir

- a. Bayi dengan retardasi pertumbuhan intrauterine

Secara klasik tampak seperti bayi yang kelaparan. Tanda-tanda bayi ini adalah tengkorak kepala keras, gerakan bayi terbatas, verniks kaseosa sedikit atau tidak ada, kulit tipis, kering, berlipat-lipat, mudah diangkat. Abdomen cekung atau rata, jaringan lemak bawah kulit sedikit, tali pusat tipis, lembek dan berwarna kehijauan.

b. Bayi premature yang lahir sebelum kehamilan 37 minggu

Verniks kaseosa ada, jaringan lemak bawah kulit sedikit, tulang tengkorak lunak mudah bergerak, muka seperti boneka (*doll-like*), abdomen buncit, tali pusat tebal dan segar, menangis lemah, tonus otot hipotoni, dan kulit tipis, merah dan transparan.

c. Bayi *small date* sama dengan bayi dengan retardasi pertumbuhan intrauterin.

Bayi premature kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya, karena itu sangat peka terhadap gangguan pernafasan, infeksi, trauma kelahiran, hipotermi, dan sebagainya. Pada bayi kecil untuk masa kehamilan (*small for date*) alat-alat dalam tubuh lebih berkembang dibandingkan dengan bayi premature (Saimin J, 2006).

8. Penanganan Pada Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Dengan memperhatikan gambaran klinik dan berbagai kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari pada BBLR (Premature dan dismature), maka perawat dan pengawasannya dapat ditujukan pada :

1. Pengaturan suhu tubuh

Bayi BBLR sangat mudah mengalami hipotermia, sehingga suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan ketat.

2. Mencegah terjadinya infeksi

Bayi BBLR sangat rentan terjadinya infeksi, sehingga sangat perlu diperhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk mencuci tangan sebelum memegang bayi

3. Pengawasan nutrisi/ASI

Karena bayi BBLR refleks menelannya belum sempurna, sehingga pemberian nutrisi/ASI harus dilakukan dengan cermat.

4. Penimbangan ketat

Perubahan berat badan pada bayi BBLR mencerminkan kondisi nutrisi/gizi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan pada bayi harus dilakukan dengan ketat (Winkjosastro H, 2005).

9. Tinjauan Umum Tentang Penatalaksanaan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

1. Di ruang persalinan, untuk ibu yang diperkirakan bayi dalam rahimnya kecil ;

- a. Hanya diberikan obat-obatan yang sangat diperlukan saja selama persalinan
- b. Ikatlah tali pusat dengan hati-hati.
- c. Hisap lendir bayi
- d. Berikan oksigen $\frac{1}{2}$ liter/menit jika bayi mengalami kesulitan bernafas

e. Ingatlah memberikan bayi vitamin K (fitomenadion) 1 mg dalam 1 ml.

2. Jagalah bayi agar tetap hangat

Di daerah beriklim panas, inkubator atau tempat tidur bayi dengan pemanas tidak diperlukan. Selimut dan kantong air pemanas sudah mencukupi. Di dataran tinggi, di mana temperatur turun sangat rendah pada malam hari, dan kelembaban sangat rendah, diperlukan perawatan khusus untuk menjaga bayi tetap hangat. Jika menggunakan kantong air pemanas, kantong tersebut jangan dekat dengan kulit bayi dan jangan terlalu panas (Husaini M.A, 2005).

3. Hematlah energi bayi

Sesedikit mungkin memanipulasi bayi, jangan pernah dimandikan. Kotoran dapat dihilangkan dengan minyak atau cairan paraffin. Susuilah bayi di tempat tidurnya pada posisi terlentang (kepala jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah). Timbang dan catat berat badannya setiap hari.

4. Pemberian makanan

Berikan makanan segera mungkin sebelum bayi berumur 2 jam. Banyak bayi berat lahir rendah dapat menghisap dengan kuat dari payudara ibu. Jika bayi dapat menghisap dengan kuat doronglah ibu untuk terus menyusui bayinya. Anda dapat memberikan bayi susu tambahan selama 2 hari pertama, sampai ibu menghasilkan cukup

banyak air susu. Gunakan air susu ibu dari ibu lain atau susu setengah full cream (susu-gula).

5. Pemberian vitamin tambahan

Bayi dengan berat lahir rendah memerlukan vitamin tambahan. Berikan 10 tetes vitamin-cairan multi vitamin (Pentavite atau Abdec) setiap hari.

6. Pencegahan terhadap infeksi

- a. Jauhkan dari bayi-bayi lain
- b. Jauhkan dari sanak saudara (kecuali ibu)
- c. Janganlah mengizinkan orang dengan infeksi kulit, pilek atau diare menyentuh ibu
- d. Cucilah tangan anda sebelum memegang bayi
- e. Anjurkan ibu untuk sedapat mungkin merawat sendiri bayinya. Lebih sedikit infeksi silang yang terjadi jika ibu merawat sendiri bayinya.

7. Memulangkan bayi

Bayi dengan berat lahir rendah siap dipulangkan jika;

- a. Sudah sepenuhnya mendapat air susu ibu
- b. Mencapai kenaikan berat badan
- c. Sudah mampu menjaga suhu tubuhnya tetap normal
- d. Tidak ada tanda-tanda infeksi
- e. Ibu sudah mampu merawat bayi di rumah.

Sebelum memulangkan bayi, beberapa yang harus diperiksa;

- a. Bayi sudah mendapat vasin BCG

- b. Ibu sudah diberikan Buku Catatan Kesehatan bayi yang diisi dengan benar
- c. Ibu mengetahui waktu periksa dan alamat klinik kesehatan ibu dan anak
- d. Ibu mengetahui pelayanan keluarga berencana yang tersedia.

C. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berat Badan Lahir Bayi (BBL)

1. Faktor Usia Ibu

Umur seorang ibu sangat berkaitan dengan alat-alat reproduksi wanita. Umur reproduksi yang sehat dan aman adalah antara 20 sampai dengan 35 tahun. Kehamilan diusia < 20 tahun dan diatas 35 tahun secara biologis belum optimal, dan sudah harus memenuhi kebutuhan nutrisi janin yang dikandung (Wahidah, 2007).

Angka kejadian bayi BBLR tertinggi adalah pada umur atau usia ibu dibawah 20 tahun dan usia diatas 35 tahun dimana pada multigravida yang jarak antara kelahirannya terlalu dekat. Kajadian terendah pada umur atau usia ibu antara 21 sampai dengan 34 tahun (Wahidah, 2007).

Berbagai kesulitan yang terdapat dalam kehamilan maupun persalinan yang lebih rentang terjadi pada usia lebih dini atau remaja (<20 tahun) oleh karena pematangan fisik termasuk organ reproduksi yang berkaitan erat dengan usia dalam artian pertumbuhan tubuh belum optimal tercapai. Wanita hamil untuk usia produktif sehat antara usia 20 sampai dengan 35 tahun untuk reproduksi. Begitu pula sebaliknya, kehamilan yang

terjadi setelah usia 35 tahun dimana fungsi uterus menurun oleh karena adanya vaskularisasi ke uterus yang kurang adekuat (Winkjosastro, 2005).

Wanita hamil pada usia muda dapat meningkatkan resiko komplikasi obstetri karena tingkat pertumbuhan sistem reproduksi relatif kurang sempurna. Meningkatnya usia atau umur ibu maka meningkat pula kejadian BBLR dua kali lipat dibanding pada usia reproduktif (Goldman, 2005).

2. *Faktor Anemia Ibu Hamil*

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) darah kurang dari nilai normal (11 gr %). Dalam kehamilan terjadi peningkatan jumlah darah (hiperemia/hipervolumia) dan terjadi pengenceran darah karena sel-sel darah tidak seimbang, dimana peningkatan tersebut adalah plasma darah sekitar 30 persen, sel-sel darah sekitar 18 persen, sedangkan hemoglobin hanya 19 persen. Sehingga secara fisiologis, pengenceran darah ini adalah untuk membantu meringankan kerja jantung (Goldman, 2005).

Anemia dapat pula didefinisikan sebagai berkurangnya jumlah eritrosit (sel darah merah) dan kadar hemoglobin (Hb) dalam setiap millimeter kubik darah. Hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia yang ditandai warna keputihan pada tubuh, terutama ekstermitas (Nursalam, 2005).

Menurut *United Nation* yang dikutip oleh, Goldman, 2005, tingginya prevalensi anemia pada kehamilan melatarbelakangi kematian

ibu sewaktu hamil, bersalin atau nifas sebagai akibat komplikasi penanganannya. Sekitar 50 persen dari kematian ibu di negara-negara berkembang dilatarbelakangi oleh adanya anemia defisiensi zat besi. Disamping itu dapat mengakibatkan kematian, demikian pula anemia defisiensi zat besi pada kehamilan dapat menyebabkan pertumbuhan janin dalam kandungan terganggu, dan munculnya BBLR (Saimin J, 2006).

Menurut Saimin J penyebab anemia antara lain : 1) Kurang gizi atau disebut malnutrisi, 2) kurangnya zat besi yang terkandung dalam diet, 3) Malabsorpsi, 4) kehilangan darah yang banyak akibat persalinan, haid dll, 5) Penyakit – penyakit kronik seperti TBC, malaria, cacing dll (Saimin J, 2006).

Menurut Amiruddin R.(2007), hasil konsepsi (janin, plasenta, darah) membutuhkan zat besi dengan jumlah yang besar untuk pembuatan butir-butir darah merah dalam pertumbuhannya. Jumlah ini merupakan 1/10 dari seluruh zat besi dalam tubuh. Terjadinya anemia dalam kehamilan tergantung dari jumlah persediaan zat besi dalam hati, limpa dan sum-sum tulang. Selama masih mempunyai cukup persediaan zat besi, Hb tidak akan turun. Ini terjadi pada bulan ke 5-6 kehamilan, pada waktu janin membutuhkan banyak zat besi. Bila terjadi anemia, pengaruhnya terhadap hasil konsepsi adalah :

- 1) Kematian mudigah (keguguran)
- 2) Kematian janin dalam kandungan
- 3) Kematian perinatal tinggi

- 4) Kematian janin waktu lahir (*tillbirth*)
- 5) Prematuritas atau dismature (BBLR)
- 6) Dapat terjadi cacat bawaan
- 7) Cadangan besi kurang

3. *Faktor Sosial Ekonomi*

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini dapat terlihat pada keluarga dengan sosial ekonomi tinggi, tentunya pemenuhan kebutuhan gizi pada anak-anaknya atau keluarganya cukup baik dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh orang tua dengan sosial ekonominya rendah. Demikian juga dengan status pendidikan keluarga, misalnya tingkat pendidikan rendah akan sulit untuk menerima arahan dalam pemenuhan gizi serta tidak mau dan menerima pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan pentingnya pelayanan kesehatan (Hidayat, 2005).

Kurangnya pengetahuan tentang arti kesehatan sangat mempengaruhi status sosial ekonomi. Untuk mengurangi terjadinya BBLR, perlu peningkatan terhadap keadaan status sosial ekonomi keluarga dan kesehatan lingkungan (Rano Z, 2006).

4. *Faktor Penyakit Ibu*

Penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan, seperti; malnutrisi, hipertensi, penyakit paru-paru, diabetes melitus, pre-eklamsia, eklamsia, perdarahan antepartum sehingga dapat menyebabkan kejadian BBLR (Iskandar, 2002).

Selain itu, beberapa faktor lain terjadinya BBLR ditinjau dari faktor ibu adalah; kurangnya gizi saat hamil, jarak hamil dan bersalin terlalu dekat, penyakit menahun ibu, dan faktor pekerja yang terlalu berat (Husaini M.A, 2005).

5. Faktor Paritas Ibu

Paritas adalah jumlah/banyaknya anak yang telah dilahirkan oleh ibu tanpa memandang apakah anak lahir hidup atau lahir mati. Sehingga, mempengaruhi banyak jumlah anak yang ibu lahirkan, maka semakin tinggi resiko untuk melahirkan bayi BBLR (Saimin J, 2006).

Seorang ibu yang sering melahirkan mempunyai resiko mengalami anemia pada kehamilan berikutnya apabila tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi. Karena selama hamil zat-zat gizi akan terbagi untuk ibu dan untuk janin yang dikandungnya (Amiruddin R, 2007).

Dengan mengetahui berbagai faktor penyebab persalinan preterm dapat dipertimbangkan beberapa langkah untuk menghindari persalinan preterm dengan jalan :

- a. Melakukan pengawasan hamil dengan seksama dan teratur
- b. Melakukan konsultasi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan preterm
- c. Memberikan nasehat tentang gizi kehamilan, meningkatkan pengertian Keluarga Berencana (KB)

Hal tersebut di atas juga di jelaskan dalam Al-Qur;am Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S Al-Maidah : 88)

Kandungannya :

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa kita di tuntut untuk mengkonsumsi makanan yang halal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat hamil dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas reski yang diberikan kepada kita untuk menjauhkan kemurkaan Allah SWT.

- d. Meningkatkan keadaan sosial-ekonomi keluarga dan kesehatan lingkungan.

BAB III

KERAGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel

Berat Badan Lahir Bayi (BBL) tak dapat dilepaskan dari keadaan kondisi ibu terhadap masa kehamilan. BBLR sendiri dapat memberikan resiko kematian perinatal dan posnatal. Penyakit pada ibu dapat mempengaruhi uterine blood sehingga aliran darah yang membawa zat gizi kejadian tidak maksimal. Usia ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan janin kerana mempengaruhi kapasitas trofiknya, sehingga pada usia tua bayi yang dilahirkan berat badannya lebih rendah. Pada penelitian ini, variabel yang berpengaruh langsung dianggap sebagai variabel independen. Variabel independen yang akan diteliti adalah masalah, usia/umur ibu, status anemia, dan paritas.

1. Umur

Wanita yang berumur kurang dari (< 20 tahun) dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksi belum optimal atau lebih dari 35 tahun, mempunyai resiko yang tinggi untuk hamil. Karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya, berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia. Wintrobe menyatakan bahwa usia ibu dapat mempengaruhi timbulnya anemia, yaitu semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya. (Muhilal Etal, 1991)

Kehamilan pada usia yang masih remaja sering dihubungkan dengan terjadinya komplikasi seperti BBLR, kurang gizi, angka kematian perinata yang tinggi dan keracunan kehamilan. Hal ini disebabkan oleh karena sang ibu sendiri masih membutuhkan kalori dalam jumlah yang banyak untuk pertumbuhan dirinya sendiri. Sedangkan pada ibu hamil di usia lanjut dimana terjadi penurunan proses faal dalam tubuh. Ini akan mempengaruhi keadaan rahim dan vaskularisasi di daerah tersebut.

2. Status Anemia

Anemi merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya sirkulasi uteroplasenta sehingga teranspor oksigen dan nutrisi ke bayi terganggu yang dapat menyebabkan gangguan pada berat badan lahir bayi atau bisa disebut BBLR. Anemia didefinisikan sebagai salah satu gangguan yang paling sering terjadi selama kehamilan. Ibu hamil pada umumnya sering mengalami deplesi besi sehingga hanya memberi sedikit zat besi pada janin yang dibutuhkan untuk metabolisme bayi yang normal. Selanjutnya mereka akan menjadi anemia pada saat kadar hemoglobin ibu turun sampai 11 g% selama trimester.


3. Paritas

Paritas adalah kehamilan yang pernah dialami oleh seorang ibu baik yang berakhir dengan kelahiran hidup atau mati. Paritas yang tinggi merupakan salah satu faktor resiko tinggi pada ibu hamil. Ibu dengan paritas tinggi cenderung mengalami komplikasi dalam kehamilan. Setiap persalinan


yang disusul kehamilan yang berulang menimbulkan kerusakan pembuluh darah uterus yang akan mempengaruhi sirkulasi darah ke janin dimana jumlah nutrisi akan berkurang dibanding kehamilan sebelumnya.

Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang pernah melahirkan lebih dari tiga kali cenderung mengalami kematian dibawah usia lima tahun. Mendapatkan kasus lahir mati serta memperoleh anak dengan kasus cacat bawaan yang usia harapan pendek. Paritas yang tinggi memberikan gambaran tingkat kehamilan yang banyak, dapat menyebabkan berbagai resiko kehamilan, semakin banyak jumlah kelahiran yang dialami oleh ibu semakin tinggi resikonya untuk mengalami komplikasi disebabkan karena secara fisik jumlah paritas yang tinggi mengurangi kemampuan uterus sebagai media pertumbuhan janin.

B. Kerangka Kerja



C. Kerangka Konsep Penelitian



D. Hipotesa Penelitian

Untuk membuktikan hipotesa itu diterima atau tidak, maka penyelesaiannya harus melalui penelitian, maka penulis menuliskan hipotesa sebagai berikut :

a. Hipotesa Alternatif (H1)

- 1) Ada hubungan antara usia / umur ibu melahirkan dengan kejadian BBL.
- 2) Ada hubungan antara status anemia ibu melahirkan dengan kejadian BBL
- 3) Ada hubungan antara status Paritas dengan kejadian BBL.

b. Hipotesa Null (Ho)

- 1) Tidak ada hubungan antara usia/umur ibu melahirkan dengan kejadian BBL.
- 2) Tidak ada hubungan antara status anemia ibu melahirkan dengan kejadian BBL.
- 3) Tidak ada hubungan antara Paritas dengan kejadian BBL.

E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Berat Badan Lahir

Berat badan lahir bayi adalah berat badan ketika dilahirkan baik yang cukup bulan maupun yang kurang bulan yang diukur dengan timbangan yang tercatat didalam rekam medik yang dinyatakan dalam satuan gram.

Kriteria objektif :

- a. BBLR jika berat badan saat lahir < 2500 gram
- b. BBLN jika berat badan saat lahir ≥ 2500 gram

2. Usia / umur ibu

Usia / Umur ibu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur ibu sejak lahir sampai mengandung anak pertama yang dinyatakan dalam tahun.

Kriteria Objektif :

- a. Resiko tinggi bila usia ibu < 20 tahun dan > 35 tahun
- b. Resiko rendah bila usia ibu 20 – 35 tahun.

3. Status Anemia

Status anemi yang dimaksud adalah keadaan dimana kadar haemoglobin ibu pada saat masuk kamar bersalin kurang dari normal.

Kriteria objektif :

- a. Tidak anemia bila kadar Hb \geq 11 gram%
- b. Anemia bila kadar Hb $<$ 11 gram%.

4. Paritas

Paritas yang dimaksud adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik yang lahir hidup maupun lahir mati.

Kriteria objektif ;

- a. Resiko tinggi bila paritas $>$ 3 kali
- b. Resiko rendah bila paritas 1 – 3 kali.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*, yaitu dengan faktor yang mempengaruhi berat badan lahir (BBL).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Aska yang terletak di jalan poros Aska Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di Puskesmas Aska kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selama satu tahun pada periode 2010 yang tercatat dalam rekam medik dengan jumlah populasi 124 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan Bayi dengan Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan ibu yang melahirkan bayi normal (BBLN) di Puskesmas tersebut pada periode 2010 dan tercatat dalam rekam medik.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari catatan rekam medik di Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan kriteria pengambilan sampel adalah :

1. Merupakan data ibu hamil yang memiliki rekam medik di Puskesmas tersebut pada periode 2010.
2. Terdapat data yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti.
3. Peneliti mendapat izin mengambil data yang diinginkan.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

Adapun proses pengolahan data dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Koding

Untuk memudahkan pengolahan data, semua data diberi kode. Pengkodean ini dilakukan untuk mempermudah pada analisis data dan juga mempercepat pada saat entry data.

2. Tabulasi data

Setelah dilakukan kegiatan koding, dilanjutkan dengan mengelompokkan data kedalam suatu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Analisa data

Setelah memperoleh memperoleh hasil dari observasi yang dilakukan dari tiap-tiap variabel, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan computer program SPSS 17,0, penyajian data dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan.

Ada dua macam analisa data yang akan digunakan, yaitu :

- a. Analisa Univariat, yaitu dilakukan terhadap tiap variable dari hasil penelitian.
- b. Analisa Bivariat, yaitu Analisis yang digunakan untuk melihat huubungan variabel-variabel dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang akan digunakan adalah uji Chi-square.

Adapun rumus Chi-square yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$X^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Keterangan :

X^2 = Nilai Chi-square yang dicari/kai kuadrat

O = Frekuensi atau nilai observasi dan jumlah sampel yang memilih setiap alternatif

E = Frekuensi harapan atau (nilai sampel)

Hipotesis diterima apabila nilai $p < 0,05$ atau $X^2_{hitung} > X^2_{tabel} (3,841)$
atau dengan $\alpha = 0,05$

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai berdiri pada tahun 1985. Pada awalnya Puskesmas itu tidak bernama Puskesmas Aska dan kondisinya tidak layak dikatakan sebagai Puskesmas. Hal ini karena tempat itu didirikan atas inisiatif warga dan mengangkat seorang warga kampung yang mampu mengobati sebagai pengelolanya.

Pada tahun 1990 mulailah di bangun Puskesmas yang layak di tanah wakaf dengan luas enam Hekto are dan diberi nama Puskesmas Aska dan pada saat sekarang ini akan dibangun beberapa ruang perawatan sehingga pemanfaatan untuk puskesmas rawat inap dapat dijalankan. Adapun nama kepala puskesmas saat ini adalah dr. Andi Eliya Supardi yang telah menjabat sebagai kepala Puskesmas Aska selama enam bulan yang sebelumnya Puskesmas tersebut dipimpin oleh dr. Nurwahidah Kamaruddin.

Puskesmas Aska terdiri dari kurang lebih 25 tenaga kerja baik yang telah menjadi pegawai negeri sipil maupun tenaga kerja honorer.

2. Analisa Univarat

Analisa univariat dalam penelitian ini akan menggambarkan distribusi frekuensi umur/usia, status anemia dan parietas.

a. Umur / Usia Ibu

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Umur
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Kelompok Umur	Jumlah (n)	Persen (%)
Resiko Tinggi	75	60,4
Resiko Rendah	49	39,5
Total	124	100,0

Sumber : Data Sekunder 2010

Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa distribusi berdasarkan tingkat umur/usia ibu adalah pada kelompok usia kurang dari 20 tahun dan diatas 35 tahun (Resiko tinggi) sebanyak 75 orang (60,4 %) dan terendah adalah pada kelompok umur 20 sampai 35 tahun (Resiko rendah) sebanyak 49 orang (39,5 %). Keadaan ini menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan di Puskesmas Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada periode 2010 adalah ibu dengan umur 20 sampai 35 tahun memiliki resiko rendah melahirkan dalam keadaan tidak normal.

b. Status Anemia

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Status Anemia
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Status Anemia	Jumlah (n)	Persen (%)
Tidak Anemia	72	58,06
Anemia	52	41,94
Total	124	100,0

Sumber : Data Sekunder 2010

Tabel 5.2 menunjukkan distribusi berdasarkan status anemia dimana frekuensi ibu yang mengalami anemia dan tidak anemia hampir sama dimana sampel terbanyak adalah ibu yang tidak anemia yaitu sebanyak 72 orang (58,06 %) dan terendah adalah yang berstatus anemia yaitu 52 orang (41,94 %).

c. Parietas

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Ibu Melahirkan Berdasarkan Parietas
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Parietas	Jumlah (n)	Persen (%)
Resiko Tinggi	29	23,38
Resiko Rendah	95	76,62
Total	124	100,0

Sumber : Data Sekunder 2010

Tabel 5.3 diatas menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan parietas dimana frekuensi terbanyak adalah parietas yang beresiko rendah yaitu 95 orang (76,62 %) dan terendah adalah parietas yang beresiko tinggi yaitu 29 orang (23,38 %).

3. Analisis Bivariat

Tabel 5.4
Hubungan Antara Umur Ibu Dengan Kejadian BBL
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Umur Ibu	BBLN		BBLR		Jumlah	X ²	P	OR
	N	%	N	%				
Resiko Tinggi	58	77,3	17	22,7	75 (100 %)	0,565	0,655	1.303 (13,03%)
Resiko Rendah	40	81,6	9	18,4	49 (100 %)			
Total	98	79,0	26	38,2	124 (100 %)			

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari jumlah kelahiran dimana usia ibu yang memiliki resiko tinggi dapat melahirkan bayi dengan berat badan normal (BBLN) sebanyak 58 orang (77,3%) dan bayi yang dilahirkan dengan kondisi BBLR sebanyak 17 orang (22,7%) sehingga jumlah kelahiran dengan usia ibu yang beresiko tinggi sebesar 75 orang.

Sedangkan untuk usia ibu yang memiliki resiko rendah yang dapat melahirkan bayi dengan BBLN sebanyak 40 orang (81,6%) dan kejadian BBLR sebanyak 9 orang (18,4%) sehingga jumlah kelahiran dengan usia ibu yang beresiko rendah sebanyak 49 orang.

Hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square diperoleh nilai X^2_{hitung} (0,565) atau P (0,655). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBL bayi. Adapun peluang kejadian BBL bayi berhubungan dengan umur ibu sebesar 13.03 %.

Tabel 5.5
Hubungan Antara Status Anemia Dengan Kejadian BBL
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Status anemia	BBLN		BBLR		Jumlah	X ²	P	OR
	N	%	N	%				
Tidak Anemia	64	88,9	8	11,1	72 (100 %)	10,066	0,003	4.235 (42,35%)
Anemia	34	65,4	18	34,6	52 (100 %)			
Total	98	79,0	26	38,2	124 (100 %)			

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran bayi dengan BBLN pada ibu yang tidak memiliki kasus anemia sebanyak 64 orang (88,9) dan kasus BBLR sebanyak 8 orang (11,1%), jumlah kelahiran tanpa anemia sebanyak 72 orang.

Untuk kasus ibu dengan riwayat anemia jumlah kelahiran bayi dengan BBLN sebanyak 34 orang (65,4%) dan kejadian BBLR sebanyak 18 orang (34,6%) sehingga jumlah kelahiran seluruhnya dengan ibu dengan status anemia sebesar 52 orang.

Kehamilan dengan kejadian BBLR dimana ibu hamil menderita anemia mempunyai resiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak menderita anemia.

Hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square test seperti pada tabel 5.5 diperoleh nilai X²_{hitung} (10.066) atau P (0,003). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBL pada bayi. Peluang kejadian BBL dengan status anemia sebesar 42,35%.

Tabel 5.6
Hubungan Antara Paritas Dengan Kejadian BBL
Di Puskesmas Aska Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Tahun 2010

Paritas	BBLN		BBLR		Jumlah	X ²	P	OR
	N	%	N	%				
Resiko Tinggi	58	84,1	11	15,9	29 (100 %)	2,371	0,182	506 (5,06%)
Resiko Rendah	40	72,7	15	27,3	95 (100 %)			
Total	98	79,0	26	38,2	124 (100 %)			

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran BBLN dengan paritas yang beresiko tinggi sebanyak 58 orang (84,1%) dan bayi dengan BBLR sebanyak 11 orang (15,9%). Jumlah kelahiran dengan BBL yang beresiko tinggi sebanyak 29 orang.

Kelahiran bayi dengan BBLN dengan resiko rendah terhadap paritas sebanyak 40 orang (72,7%) dan bayi dengan BBLR sebanyak 15 orang (27,3%). Jumlah kelahiran dengan BBL bayi yang memiliki resiko rendah terhadap paritas sebanyak 95 orang.

Hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square diperoleh nilai X^2_{hitung} (2,371 %) atau P (0,182). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBL pada bayi.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Umur / usia ibu dengan kejadian BBL

Umur ibu berhubungan dengan perkembangan alat-alat reproduksi wanita. Umur muda kurang dari 20 tahun dimana perkembangan alat-alat

reproduksi belum optimal, sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun berhubungan dengan perubahan alat reproduksi yang diakibatkan oleh faktor ketuaan, seperti makin berkurangnya elastisitas otot-otot panggul yang mana dapat mempengaruhi proses persalinan. Oleh karena itu dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 sampai 35 tahun. Bila kehamilan terjadi bukan pada rentang waktu umur tersebut, maka dapat berakibat pada meningkatnya angka kematian maternal dan neonatal.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan, distribusi umur tidak berisiko sebesar 75 orang (60,4 %) dan umur berisiko sebesar 49 orang (39,5 %). Sedangkan pada hasil uji statistik X^2 didapat hasil $X^2_{hitung} 0,565 < X^2_{table} 3,841$ dengan hasil $P_{hitung} 0,655 > P_{value} 0,05$, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu waktu hamil dengan kejadian BBL pada bayi.

Hal ini juga dikemukakan oleh M. Ichsan (1996), yang mana pada penelitiannya ditemukan adanya hubungan antara umur ibu dengan kejadian anemia pada kehamilan. Dimana disebabkan oleh perubahan faal dalam tubuh yang akan mempengaruhi keadaan vaskularisasi dalam hal ini pembuluh darah sudah banyak mengalami perkapuran atau terjadi perubahan dalam sistem hemodinamik berupa pengenceran darah, karena penambahan volume plasma yang lebih besar dari pada penambahan sel darah merah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kadar Hb ibu selama kehamilan.

Dalam Al-qur'an surah Al-Nisa' ayat enam mengatakan bahwa :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahannya :

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (Pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)."

Kandungannya :

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menikah disaat umur kita dianggap mampu atau telah produktif serta matang secara fisik maupun psikisnya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu peringatan kepada hambanya yang bertakwa bahwa banyak hal yang dapat terjadi jika sesuatu itu dilakukan secara

tergesa-gesa, misalnya yang marak terjadi di zaman sekarang ini yaitu pernikahan dini yang merupakan salah satu pemicu BBLR.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa usia resiko tinggi terhadap kejadian BBL adalah usia kurang dari 20 tahun dan usia diatas 35 tahun sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata usia ibu yang beresiko tinggi tidak mempengaruhi BBL. Hal ini disebabkan karena selain faktor ibu banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi BBL seperti faktor Nutrisi ibu saat hamil.

Oleh sebab itu pengarahan dari pihak kesehatan di puskesmas tersebut khususnya bidan sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peningkatan angka harapan hidup pada bayi.

2. Hubungan antara Anemia Pada Kehamilan dengan Kejadian BBL

Dari hasil penelitian, ditemukan prevelensi anemia pada ibu hamil masih tinggi. Hal itu dapat dilihat dari hasil crosstabulasi, didapat anemia ibu hamil sebanyak 52 orang (41,94 %). Masih tingginya angka kejadian pada lokasi penelitian, disebabkan oleh raktor Hb ibu yang rendah pada waktu hamil. Selain itu ada beberapa factor yang dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil antara lain umur ibu waktu hamil, pendidikan, pola makan, paritas, kandungan zat gizi dalam makanan, serta kepatuhan ibu untuk mengkonsumsi suplemen zat besi (Fe). Secara fisiologis, pada waktu hamil kebutuhan akan zat-zat gizi meningkat. Disamping itu terjadi perubahan dalam darah dan sumsum tulang akibat terjadinya volume pertambahan darah yang mengakibatkan terjadinya hemodilusi dan akan

menyebabkan kadar Hb darah ibu dapat menurunkan sampai 10 gr/dl. Jika keadaan ini terus berlanjut maka dapat menyebabkan menurunnya cadangan zat besi (Fe).

Hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square test seperti pada tabel 5.5 diperoleh nilai X^2_{hitung} (10.066) atau P (0,003). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBL pada bayi. Peluang kejadian BBL dengan status anemia sebesar 42,35%.

Defisiensi zat besi bila diakibatkan oleh kurangnya asupan Fe yang tinggi yaitu kuning telur, kacang-kacangan, ikan, sayuran berwarna hijau atau adanya zat pelancar dan zat penghambat yang dapat menurunkan absorpsi Fe seperti zat tannin yang banyak terdapat dalam teh dan kopi.

Pemberian suplemen zat besi pada ibu hamil dianjurkan sebanyak 120 tablet sesuai dengan kebutuhan dan zat besi ibu hamil. Oleh karena itu diharapkan ibu hamil pada usia kehamilan trimester III tidak terjadi anemia. Keberhasilan proses pemberian zat besi sangat tergantung pada kepatuhan dan pengetahuan ibu hamil tentang manfaat dari pemberian tablet besi dan tidak terlepas pula, peran serta dari berbagai pihak utamanya tenaga kesehatan dan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahannya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dalam pepatah Arab juga mengatakan bahwa :

اطلب العلم من اهدى الى الله

Artinya :

“Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai keliang lahad.”

Kandungannya :

Dari firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa kita patutnya untuk saling berbagi informasi tentang apa yang kita ketahui dan yang tidak diketahui oleh orang lain agar mampu memnambah wawasan atau pengetahuan kita. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab bahwa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu tanpa memperhatikan status dan umur kita agar kita mampu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita kedepannya.

Anemia dalam kehamilan merupakan keadaan yang berbahaya bagi ibu maupun anak yang dikandungnya, dimana komplikasi terhadap janin dapat menyebabkan terjadinya BBLR. Hal ini terjadi oleh karena pada ibu hamil menderita anemia dimana kadar Hb berkurang sehingga pada kandungan. Hasil penelitian Jumirah, dkk (2001) menunjukkan

bahwa ada hubungan kadar Hb ibu hamil dengan berat badan lahir, dimana semakin tinggi kadar Hb ibu maka semakin tinggi berat badan bayi yang dilahirkan. Sedangkan penelitian Edwi Saraswati, dkk (1999) menemukan bahwa kadar Hb pada batas 11 gr/dl bukan merupakan risiko untuk melahirkan BBLR.

Berdasarkan hasil penelitian ini sangat diharapkan agar adanya perhatian khusus bagi para ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas tersebut agar dapat menekan kejadian BBLR di Puskesmas tersebut, sebab status anemia sangat mempengaruhi BBL.

3. Hubungan Antara Paritas Ibu dengan Kejadian BBL

Paritas adalah jumlah kelahiran bayi dengan umur kehamilan 32 minggu atau lebih (bayi tunggal maupun kembar yang dianggap telah mampu bertahan diluar kandungan) yang pernah dialami oleh ibu inpartu dengan kata lain jumlah paritas bayi adalah bayi yang telah dilahirkan oleh seorang ibu, baik dalam keadaan hidup lahir mati. Paritas 0 adalah bila ibu belum pernah melahirkan bayi dengan umur kehamilan 32 minggu atau lebih, paritas 1 bila pernah melahirkan 1 kali, 2 bila pernah melahirkan 2 kali, dan seterusnya (Jurnal Medikal Nusantara, 2001).

Disini hasil penelitian, dimana didapatkan hasil uji Chi-Square bahwa nilai X^2 didapat hasil $X^2_{hitung} 2,371 < X^2_{table} 3,841$ dengan hasil $P_{hitung} 0,182 > P_{value} 0,05$, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara parietas ibu dengan kejadian BBLR. Peluang kejadian ini sebesar

5.06% dan merupakan persentase faktor yang mempengaruhi BBL paling rendah.

Hal ini dapat diterangkan bahwa setiap kehamilan disusul dengan persalinan akan menyebabkan kelainan uterus. Dalam hal ini kehamilan yang berulang-ulang menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi kejanin dimana jumlah nutrisi akan berkurang di banding persalinan sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang kelak melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Wirnojosostro, H, 1997).

Anak-anak dilahirkan dari ibu yang pernah melahirkan tiga kali atau lebih sebelumnya lebih cenderung meninggal di bawah usia lima tahun. Mendapat kasus lahir mati serta memperoleh anak dengan cacat bawaan yang usia harapan hidupnya pendek merupakan resiko lainnya dari ibu dengan paritas > 3 ([Http/www.Infokes.com](http://www.infokes.com)).

Paritas yang tinggi merupakan salah satu faktor resiko tinggi pada ibu hamil. Kejadian kematian ibu dan bayi pada persalinan pertama cukup tinggi yang kedua paling rendah yang ketiga sedikit rendah dari yang pertama resiko persalinan selanjutnya akan lebih tinggi memberikan gambaran tingkat kehamilan yang tinggi. Dapat menyebabkan berbagai resiko kehamilan. Semakin banyak jumlah kelahiran yang dialami seorang ibu, semakin tinggi resikonya untuk mengalami komplikasi hal

ini disebabkan karena secara fisik jumlah paritas yang tinggi mengurangi kemampuan terus sebagai media pertumbuhan janin.

Hal ini dapat menimbulkan komplikasi kehamilan termasuk berat badan lahir rendah. Umumnya kejadian BBLR meningkat dengan meningkatnya paritas ibu. Kelahiran yang kedua dan ketiga umumnya paling aman bagi wanita, tetapi kelahiran keempat insiden kematian ibu, kematian anak, dan komplikasi kelahiran lainnya meningkat dengan makin tingginya paritas. (Ridwan E, 1997).

Berdasarkan teori diatas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian tidak sesuai, hal ini disebabkan karena selain faktor paritas banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi BBL seperti sosial ekonomi, nutrisi serta pengetahuan. Oleh sebab itu pihak puskesmas khususnya bidan yang bertugas diharapkan untuk mengadakan program penyuluhan kepada ibu hamil dan bekerja sama dengan BKKBN untuk mencegah prevalensi angka kematian bayi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, tentang Faktor-faktor yang memepengaruhi terjadinya BBL di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dilihat dari segi umur, status anemia serta parietas ibu dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat hubungan antara Umur ibu dengan kejadian Berat Badan Lahir Di puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa usia itu mempengaruhi BBL dan dapat mengakibatkan terjadinya BBLR.
2. Ada hubungan antara status anemia ibu hamil dengan kejadian Berat Badan lahir di Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang dapat dilihat dari frekuensi peluang BBL dan sangat berpengaruh pada kejadian BBLR.
3. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadial Berat Badan Lahir di Puskesmas Aska Kec. Sinjai selatan, Kabupaten Sinjai, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa paritas itu dapat mempengaruhi BBL.

B. Saran

1. Bagi ilmu pengetahuan semoga bisa menjadi bahan dan sumber data bagi penelitian berikutnya dan mendorong pihak institusi pendidikan maupun pemerintah untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi institusi terkait dalam hal ini Puskesmas Aska kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mencegah dan faktor-faktor penyebab terjadinya bayi lahir dengan BBLR.
3. Memberikan penyuluhan atau menganjurkan para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke BKIA / Puskesmas terdekat secara teratur.
4. Menganjurkan para ibu hamil untuk minum tablet besi secara teratur setiap hari sebanyak satu tablet.
5. Perlu dilakukan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat nutrisi seimbang dengan penerapan pada pola makan yang teratur dan seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Ketut Ngurah. *Resiko Kelahiran BBLR dari Ibu Kekurangan Energi Kronik*. Program Pasca UNHAS, 2001.
- Argadiredja DS. *Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2003*. Available at: <http://www.Bapemnas.go.id/info/indonesia/Rakobangnas/2002/depkes>
Diakses 18 september 2011
- Depkes RI,2006. *Membangun Bangsa Melalui Program Kesehatan Indonesia*, Jakarta.
- Dinkes Prov. Sulsel, 2008. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*.Makassar
- Data Medical Record. 2009 Puskesmas Aska kec. Sinjai Selatan Kab.Sinjai. Sinjai
- BKPM, 2007. Upah Minimum Regional Provinsi. <http://www.bkpm.go.id>, diakses 26 Desember 2006
- Dr. Ahmad Watik Praktiknya. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*, 2001.
- Guslihan DT. *Penataksanaan Bayi Berat Lahir Rendah*. Dalam: Majalah Kedokteran Nusantara, No. 4, Vol. 36, USU, Medan, 2003; 181.
- Goldman, J. C. Malone. F. D, Vidaver. J. Ball. R, H. (2005). <http://www/intl/greenjournal.org/cgi/content/impactofmaternal> Age On Obstetric Outcome Abstract, Diakses 16 September 2010.
- Hidayat, A. 2005. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Salemba Medika. Jakarta
- Husaini, M.A. *Prevalensi Anemia Gizi, Gizi Prima*. Jakarta: 1993, 12.
- Israr Akhyar Yayang. S.Ked.2008. *Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)*. Fakultas Universitas Riau.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2003.
- Muhilal, dkk. *Review of Surveys and Suplementation Studies of Anemia in Indonesia*. Available: <http://www.UNU.EDA/Edupress/food/8fi7le.2001.htm>
- Mukhtar, R. *Sinopsis Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi*. Ed. 2 Jakarta: EGC, 1998, 145-146, 448-449.

- Saifuddin AB, dkk. *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: JNPKKR-YBPSP, 2000.
- Sidarta Y, Budiarmo LR, dkk. *Anemia Pada Wanita Hamil*. Dalam: Medika, 1998.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
- Notoatmojo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Wiknjosastro H. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: YBPSP, 1991; 22-53; 771-775.
- Zainal A. *Pengaruh Suplementasi Besi, Iodium dan Asam Askorbat Terhadap Peningkatan Kadar HB Pada Ibu Hamil Penderita Anemia*. Dalam Jurnal Kedokteran Yarsi, No. 3, Vol. II, UGM. Yogyakarta. 2003.
- Amiruddin, R. 2007. *Studi Kasus Kontrol Biomedis Terhadap Kejadian Anemia Ibu Hamil*. <http://www.com/> . diakses 9 September 2010
- Rano, Z. 2006. *Beberapa Faktor Resiko Kejadian BBLR Di Rumah Sakit Al Fattah Ambon*. <http://www.com> Diakses 25 September 2010.





MASTER TABEL

NO	NAMA	UMUR	ANEMIA	PARITAS	BBL
1	Ny. H	2	2	2	2
2	Ny. S	1	1	2	2
3	Ny. H	2	1	1	1
4	Ny. S	1	2	2	2
5	Ny. Y	1	2	1	2
6	Ny. M	2	2	2	2
7	Ny. S	1	2	2	2
8	Ny. S	1	1	2	2
9	Ny. A	1	2	2	2
10	Ny. S	2	2	1	2
11	Ny. M	2	2	2	2
12	Ny. A	1	2	1	2
13	Ny. D	1	1	2	1
14	Ny. S	1	2	1	2
15	Ny. A	1	2	2	2
16	Ny. P	1	1	1	1
17	Ny. J	1	2	2	2
18	Ny. S	2	1	2	1
19	Ny. I	2	2	2	2
20	Ny. A	2	2	1	2
21	Ny. R	1	1	1	2
22	Ny. S	2	2	2	1
23	Ny. D	1	1	1	2
24	Ny. R	1	1	2	1
25	Ny. W	1	1	1	1
26	Ny. Z	2	2	2	2
27	Ny. M	2	2	2	2
28	Ny. R	2	1	2	2
29	Ny. M	1	1	2	2
30	Ny. E	2	2	1	2
31	Ny. H	1	1	1	1
32	Ny. H	2	2	2	2
33	Ny. R	1	2	1	2
34	Ny. M	1	1	2	1
35	Ny. A	2	2	1	2
36	Ny. R	2	1	2	2
37	Ny. T	1	2	2	2
38	Ny. M	1	1	2	2
39	Ny. M	2	1	2	2
40	Ny. R	2	2	1	2
41	Ny. L	2	2	1	2
42	Ny. C	1	1	2	1
43	Ny. H	1	2	2	2
44	Ny. T	1	2	2	2

45	Ny. N	1	1	1	2
46	Ny. I	2	2	1	2
47	Ny. M	2	2	2	2
48	Ny. R	1	1	2	1
49	Ny. H	2	2	1	2
50	Ny. M	1	1	2	2
51	Ny. N	2	2	1	1
52	Ny. S	1	1	2	2
53	Ny. M	1	1	1	2
54	Ny. F	1	1	2	1
55	Ny. I	2	2	1	2
56	Ny. S	1	1	2	2
57	Ny. A	2	2	2	2
58	Ny. M	1	1	2	1
59	Ny. H	2	2	1	2
60	Ny. F	2	2	1	2
61	Ny. W	2	2	2	2
62	Ny. F	1	1	1	2
63	Ny. A	1	2	2	2
64	Ny. N	1	2	1	2
65	Ny. S	1	1	2	1
66	Ny. S	2	2	1	2
67	Ny. H	2	2	1	2
68	Ny. M	2	1	1	1
69	Ny. S	1	2	2	2
70	Ny. T	2	2	2	2
71	Ny. H	2	2	1	2
72	Ny. S	1	1	1	1
73	Ny. H	1	2	1	2
74	Ny. S	2	2	2	2
75	Ny. Y	2	2	1	2
76	Ny. M	1	1	1	2
77	Ny. S	1	1	1	2
78	Ny. S	1	2	1	2
79	Ny. S	2	2	1	2
80	Ny. A	2	2	1	2
81	Ny. S	1	1	2	1
82	Ny. M	1	1	1	2
83	Ny. A	2	2	2	2
84	Ny. D	2	2	1	2
85	Ny. S	1	1	1	1
86	Ny. A	1	1	1	2
87	Ny. P	2	2	1	2
88	Ny. J	1	1	2	1
89	Ny. S	1	1	1	2
90	Ny. I	2	2	1	2
91	Ny. A	1	1	1	2
92	Ny. R	1	2	2	2

93	Ny. S	2	2	2	2
94	Ny. D	1	1	1	2
95	Ny. R	2	2	2	1
96	Ny. W	1	1	1	2
97	Ny. Z	1	2	2	2
98	Ny. H	2	2	1	1
99	Ny. S	1	1	1	2
100	Ny. H	1	1	1	2
101	Ny. S	1	2	1	2
102	Ny. Y	1	2	2	2
103	Ny. M	2	2	2	1
104	Ny. S	1	1	1	2
105	Ny. S	2	2	1	1
106	Ny. A	1	1	2	2
107	Ny. S	2	2	1	2
108	Ny. M	2	2	1	2
109	Ny. A	1	1	1	2
110	Ny. D	1	2	2	1
111	Ny. S	1	1	1	2
112	Ny. A	1	2	2	2
113	Ny. P	1	2	1	1
114	Ny. J	1	1	1	2
115	Ny. S	1	2	1	2
116	Ny. I	2	2	1	2
117	Ny. A	1	1	2	2
118	Ny. R	1	2	1	2
119	Ny. S	1	2	1	2
120	Ny. D	1	1	1	2
121	Ny. R	1	1	1	2
122	Ny. W	1	2	1	2
123	Ny. Z	1	1	1	2
124	Ny. M	1	2	1	2