

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KAPANG ENDOFIT ASAL
KAYU SECANG (*Caesalpinia sappan* L.)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
SITI LATIFA WULANDARI
60300113014
M A K A S S A R

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Siti Latifa Wulandari
NIM : 60300113014
Tempat / Tgl. Lahir : Pinrang / 08 Desember 1995
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : JL. Mustafa deng bunga, Perumahan graha surandar permai
dua
Judul : Uji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu
secang (*Caesalpinia sappan. L*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2017
Penyusun

Siti Latifa Wulandari

NIM: 60300113014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*. L)”, yang disusun oleh Siti Latifa Wulandari, NIM: 60300113014, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.


Makassar, 21 Agustus 2017 M
28 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si. M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm Apt	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Burhanuddin, Lc., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Siti Latifa Wulandari**, NIM: 603001130134, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “**Uji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*. L)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes
NIP. 1918216 200912 1 003



Eka Sukmawaty S.Si., M.Si
NIP. 19860716 201503 2006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada segala makhluk ciptaan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini dengan judul “Uji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*. L)” serta dapat menyelesaikan Skripsi tepat waktu.

Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang telah kami lakukan pada saat penelitian yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penyusunan skripsi tidak terlepas dari hambatan dan tantangan, namun berkat kerja keras, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sulaeman dan Ibunda Mulyati atas doa dan dukungan morilnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih secara mendalam kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejawarannya.

2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Hasyimuddin.S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mashuri Masri, S.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Eka Sukmawaty S.Si. M.Si, sebagai Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc., Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm.Apt., Dr. Burhanuddin, Lc., M.Th.I selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Kepala Laboratorium dan seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu, arahan, dan membantu selama penelitian ini.
9. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan sejarannya.
10. Spesial Keluarga dan Saudaraku Miftahul Khair, Tenri Faqwa dan Siti mutia, terima kasih memberikan semangat, doa dan dukungannya.
11. Spesial untuk sahabat seperjuanganku (Inna Shitia, Sri Wahyuni, Dewi Fitriana Yul Fitriani, Retno Budiati dan Lindawanti) suka dan duka hidup sebagai mahasiswa kita rasakan bersama dan selalu setia menemani terima kasih atas do'a dan dukungannya.
12. Sahabat dan Teman – teman “BRACHIALIS A 2013” yang selalu memberi dukungan dan semangat, terkhusus seperjuangan penelitianku Inna Shintia dan

Muhammad Maslan yang selalu ada dan membantu saat penelitian di dalam laboratorium. sukses untuk kita semua .

13. Sahabat-sahabat dan Teman-teman Spesial seperjuangan angkatan 2013 “BRACHIALIS 2013” yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta banyak kenangan yang tak terlupakan selama ini.
14. Teman – Teman KMP013 Terima kasih banyak waktu, kebersamaan dan semangatnya kawanku.
15. Teman- teman GSP 02 yang tak pernah lelah memberi dukungan, doa dan semangat
16. Teman-teman KKN Geng Tasse terima kasih atas bantuan, doa dan selalu ada
17. Kakanda senior-senior Biologi terima kasih atas bantuan dan doa serta dukungannya
18. Bapak Eris Septiana pembimbing PKL LIPI terima kasih atas bimbingan arahan dan dukungannya.
19. Adik-adik angkatan 2014, 2015, dan 2016 terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
20. Serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan kepada ALLAH swt jualah saya menyerahkan segalanya., maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan semoga kita semua mendapat curahan & Rihdo dari-Nya, Aamin yaarabbal alamin...

Makassar, Agustus 2017
Penulis

Siti Latifa Wulandari
NIM: 60300113014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ILUSTRASI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1-5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-28
A. Ayat dan Hadits yang Relevan.....	9-11
B. Tinjauan Umum Tentang Radikal Bebas	11-14
C. Tinjauan Umum Tentang Antioksidan.....	15-17
D. Tinjauan Umum Tentang Kapang Endofit.....	17-21
E. Tinjauan Umum Tentang Fermentaasi.....	21
F. Tinjauan Umum Tentang Ekstraksi	22
G. Tinjauan Umum Pengujian Aktivitas Antioksidan	22-25
H. Tinjauan Tentang Kayu Secang (Caesalpinia Sappan L).....	25-27
I. Kerangka Fikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29-35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29

B. Pendekatan Penelitian	29
C. Variabel Penelitian.....	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	29-30
E. Metode Pengumpulan data.....	30
F. Alat dan Bahan.....	30-31
G. Prosedur Kerja	31-35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36-70
A. Hasil Penelitian	36-47
B. Pembahasan	47-69
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
KEPUSTAKAAN.....	71-76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77-100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Pengamatan Makroskopis	40
Tabel 4.2	Pengamatan Mikroskopis.....	40
Tabel 4.3	Pengamatan Makroskopis Dan Mikroskopis	42
Tabel. 4.4	Hasil Timbangan Ekstrak	43
Tabel 4.5	Hasil Nilai % Hambatan penentu aktivitas antioksidan.....	44-45
Tabel L. 1.1	Hasil Timbangan Ekstrak.....	77
Tabel L. 1.2	Nilai Absorbansi	77-78
Tabel L. 1.3	Nilai Absorbansi <i>Curvularia lunata</i>	79
Tabel L. 1.4	Nilai Absorbansi <i>Penicillium</i> sp.	80
Tabel L. 1.5	Nilai Absorbansi <i>Chrysosporium</i>	81
Tabel L. 1.6	Nilai Absorbansi <i>Tricoderma</i> sp.	82
Tabel L. 1.7	Nilai Absorbansi <i>Geotrichum candidum</i>	83
Tabel L. 1.8	Nilai Absorbansi <i>Vitamin C</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Rumus Kimia DPPH.....	23
Gambar 2.2.	Reaksi Kimia DPPH.....	24
Gambar 2.3.	Morfologi Kayu Secang (<i>Caesalpinia sappan</i> L.).....	25
Gambar 4.1	Bentuk Hifa.....	43
Gambar 4.2	Bentuk konidia.....	43
Gambar L.3.1	Pengambilan sampel.....	97
Gambar L.3.2	Sterilisasi Permukaan.....	97
Gambar L.3.3	Pembuatan Media.....	97
Gambar L.3.4	Isolasi dan penanaman sampel.....	97
Gambar L.3.5	Inkubasi dan pemurniaan.....	98
Gambar L.3.6	Identifikasi Kapang Endofit.....	98
Gambar L.3.7	Fermentasi.....	98
Gambar L.3.4	Pemisahan filtrate dan biomassa.....	99
Gambar L.3.5	Ekstraksi dan Eksrak.....	99
Gambar L.3.6	Uji Aktivitas Antioksidan.....	100
Gambar L.3.7	Alat yang digunakan.....	101

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 4.3	Diaagram Hasil uji Antioksidan (IC_{50})	46
Gambar L.1.3	Kurva Nilai Absorbansi <i>Curvularia lunata</i>	80
Gambar L.1.4	Kurva Nilai Absorbansi <i>Penicillium</i> sp.	81
Gambar L.1.5	Kurva Nilai Absorbansi <i>Chrysosporium</i>	82
Gambar L.1.6	Kurva Nilai Absorbansi <i>Tricoderma</i> sp.	83
Gambar L.1.7	Kurva Nilai Absorbansi <i>Geotrichum candidum</i>	84
Gambar L.1.8	Kurva Nilai Absorbansi Vitamin C	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1	Perhitungan % Hambatan Uji Anttioksidan	85-89
Lampiran 2.2	Perhitungn Kurva Hambatan IC ₅₀	89-90
Lampiran 2.3	Konversi pembuatan bahan Media.....	90-94
Lampiran 2.3	Skema Penelitian.....	95-96



ABSTRAK

Nama : Siti Latifa Wulandari
NIM : 60300113014
Judul Skripsi : “Uji Aktivitas Antioksidan Kapang Endofit Asal Tanaman Kayu Secang (*Caesalpinia Sappan* L.)”

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi dari radikal bebas. Salah satu tumbuhan hutan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat yaitu kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) dengan kandungan senyawa brazilinnya telah diketahui berpotensi dijadikan sumber antioksidan alami. Namun, perkembangan eksplorasi sumber senyawa biokatif dewasa ini banyak mengarah ke pemanfaatan mikroba endofit. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis kapang endofit dari batang dan daun asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) dan uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Hasil identifikasi ditemukan 5 isolat kapang endofit yaitu *Curvularia lunata*, *Penicillium* sp, *Chrysosporium* , *Trichoderma* sp, Dan *Geotrichum candidum*. hasil uji aktivitas antioksidan ditemukan kapang endofit *Trichoderma* sp. merupakan antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} 46,354, *Curvularia* sp. dengan nilai IC_{50} sebesar 91,926 antioksidan kuat, Sedangkan *chrysosporiu*, *Penicillium* sp dan *Geotrichum candidum* merupakan antioksidan yang lemah dengan nilai IC_{50} lebih dari 100-150..

Kata kunci: antioksidan, DPPH, kapang endofit, kayu secang (*Caesalpinia sappan* L)

ABSTRACT

Name : Siti Laatifaa Wulandari
NIM : 60300113014
Skripsi Title : “ Antioxidant Activity Test of Endophytic mold Ship from Wood Plants Secang Antioxidant Activity Test of Endofit mold Origin of Timber Secang wood (*Caesalpinia sappan* L.) ”

Antioxidant is the compound that able to slowing oxidation proseses of free radical. One the plant which is used widely as medicine compound is secang wood (*Caesalpinia sappan* L.) it's brazilin component has known can be used as bioactive source. Moreover current advance of, the natural bioactive compound exploration lead to endophytic microbe apptication, the aim of this research was to identify endophtic fungi species from steam and leaves secang wood (*Caesalpinia sappan* L.) and to examine the activity of antioxidant used DPPH method. The identification result found 5 isolates of endophytic fungi, they are *curvularia lunata* , *Penicillium* sp, *Chrysosporium*, *Trichoderma* sp dan *Geotrichhum candidum*. test of antioxidant activity showed that *Trichoderma* sp as very strong antioxidant with IC₅₀ was 46,354, *curvularia lunata* with IC₅₀ was 91,916 as strong antioxidant, white *Chrysosporium*, *Penicillium* sp and *Geotrichhum candidum* as weak antioxidant with IC₅₀ was more than 100-150

Keywords: Antioxidant, DPPH, Endophytic mold, secang wood (*Caesalpinia sappan* L.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. berisikan sejumlah petunjuk dan informasi yang tak terhingga jumlahnya. Bahkan, al-qur'an memuat berbagai informasi ilmiah yang bisa didapatkan dari ayat-ayat al kauniyah di dalamnya. Pada era modern ini, saat teknologi semakin berkembang telah banyak peneliti yang membuktikan kebenaran informasi yang telah tercantum di dalamnya sejak berabad-abad silam. Ini merupakan bukti keajaiban al-qur'an sebagai kitab yang berasal dari sang Khaliq. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, namun masih banyak informasi yang belum dituntaskan sehingga memerlukan pengkajian dan penelitian lebih banyak lagi untuk mendapatkan informasi tersebut yang akan digunakan untuk kemashalatan manusia.

Salah satu informasi yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu vitamin, antioksidan minyak dan masih banyak lainnya. Allah berfirman dalam QS Asy syu'ara/26: 7 memuat informasi tentang bermacam-macam tumbuhan yang baik, yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementrian Agama, 2012).

Menurut Tafsir Jalalayn maksud ayat di atas yaitu (Dan apakah mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang (bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) jenisnya? Kemudian penjelasan lain dari Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah tentang makna ayat tersebut bahwa sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha esa dan Mahakuasa (M. Quraish shihab, 2009).

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang memiliki banyak manfaat. Tumbuh-tumbuhan dapat memunculkan beberapa zat untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, kegunaan untuk kehidupan manusia misalnya mulai dari beberapa vitamin-vitamin, antioksidan minyak dan masih banyak lainnya. Sebagai negara tropis, hutan tropika Indonesia yang mengandung lebih dari 30.000 jenis tumbuhan yang sangat potensial untuk diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti Indonesia. Berbagai tumbuhan yang lebih kurang 1.000 spesies telah menjadi tanaman obat atau bahan baku obat. Tanaman tersebut

dapat mengobati berbagai macam penyakit degeneratif, seperti kardiovaskuler, kanker, diabetes dan anemia (Betsy, 2002).

Salah satu tumbuhan hutan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat yaitu kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.). Sudah banyak penelitian tentang khasiat tanaman secang, baik sebagai antimikroba, antioksidan, maupun zat pewarna alami. Komponen senyawa bioaktif yang terkandung dalam kayu secang yaitu brazilin, brazilein, sappanone, chalcone, sappancalcone dan komponen umum lainnya, seperti asam amino, karbohidrat dan asam palmitat yang jumlahnya relative sangat kecil. Komponen brazilin merupakan spesifik dari kayu secang yang dapat memberikan warna merah kecoklatan jika teroksidasi atau dalam suasana basa. Selain itu, brazilin ini diduga juga dapat melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal bebas (Rina, 2012).

Radikal bebas sendiri merupakan atom molekul yang memiliki kereaktifan tinggi, hal ini dikarenakan adanya elektron yang tidak berpasangan. Sumber radikal bebas dapat berasal dari sisa hasil metabolisme tubuh dan dari luar tubuh seperti makanan, sinar UV, polutan dan asap rokok. Jumlah radikal bebas yang terus meningkat dalam tubuh dapat mengakibatkan terjadinya stress oksidatif sel. (Wiwit, 2015).

Bila produksi radikal bebas dalam tubuh terus meningkat karena pengaruh eksternal, sistem pertahanan antioksidan tubuh tidak akan efektif lagi bekerja sebagai pelindung serangan radikal bebas sehingga terjadi stres oksidatif, untuk mencegah terjadinya stress oksidatif diperlukan suplemen antioksidan (Molyneux, 2004).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi dari radikal bebas. Mekanisme kerja senyawa antioksidan salah satunya yaitu dengan cara mendonorkan atom hidrogen atau proton kepada senyawa radikal. Hal ini menjadikan senyawa radikal lebih stabil (Wiwik, 2015).

Sumber-sumber antioksidan dapat berupa antioksidan sintetis maupun antioksidan alami. Tetapi saat ini penggunaan antioksidan sintetis mulai dibatasi karena ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa antioksidan sintetis seperti BHT (*Butylated Hydroxy Toluena*) dapat meracuni binatang percobaan dan bersifat karsinogenik (Zuhra, 2008). Oleh karena perlu dicari sumber antioksidan alami yang aman, salah satunya dengan menggunakan senyawa bioaktif dari tumbuhan (Aqil, 2006).

Kayu secang dengan kandungan senyawa brazilinnya telah diketahui berpotensi dijadikan sumber antioksidan alami. Namun, perkembangan eksplorasi sumber senyawa bioaktif dewasa ini banyak mengarah ke pemanfaatan mikroba endofit. Mikroba endofit dipandang lebih efisien sebagai penghasil senyawa tertentu dibandingkan dengan tumbuhan, karena tidak memerlukan waktu yang lama dan ruang yang banyak untuk menumbuhkannya. Mikroba endofit dapat diisolasi dari akar, batang dan daun suatu tumbuhan. Bakteri dan fungi adalah jenis mikroba yang umum ditemukan sebagai mikroba endofit, akan tetapi yang banyak diisolasi adalah golongan fungi (Strobel, 2003)

Berdasarkan penjelasan mengenai zat antioksidan pada tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*. L) dan penggunaan kapang endofit yang bersimbiosis dengan

inangnya maka dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*. L) sebagai antioksidan alami yang akan dimanfaatkan sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit degeneratif seperti kanker.

B. Rumusan Masalah

1. Kapang endofit jenis-jenis apa saja yang terdapat pada kayu secang ?
2. Bagaimana aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. kapang endofit pada penelitian ini diisolasi dari batang dan daun dari tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L).
2. Batang dan daun tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) diperoleh dari Kab. Bone.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016-Maret 2017 dilakukan di laboratorium Biologi Dasar, Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi dan laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Wahyu (2011), Uji fitokimia dan potensi antioksidan ekstrak etanol kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekstrak kayu secang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (>70%) pada semua konsentrasi kecuali konsentrasi terendah 3,125 µg/ml kategori aktivitas sedang sebesar 53,86%. Ekstrak kayu secang memiliki aktivitas antioksidan kuat pada konsentrasi 6,25-100 µg/ml sebesar 80,46-89,13% hal ini diduga karena kadar fenol yang sangat tinggi (++++) dan kadar flavonoid yang tinggi (++++)
2. Delvi (2013), Aktivitas Antioksidan dan Sifat Organoleptik Teh Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn.) Berdasarkan Variasi Lama Pengeringan . hasil penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh lama pengeringan terhadap aktivitas antioksidan teh daun sirsak. Kondisi operasional pengeringan daun sirsak pada suhu 50 °C dengan lama pengeringan 150 menit menghasilkan teh daun sirsak dengan aktivitas antioksidan tertinggi dan nilai IC₅₀ terendah.
3. Edward (2015), Aktivitas antidiabetes dan antioksidan kapang endofit dari tanaman mahoni (*Swietenia macrophylla* King). Isolasi kapang endofit dari ranting tumbuhan mahoni pada media CMMA dan PDA, diperoleh 7 isolat. Kapang endofit B.Sm.1F aktif sebagai antioksidan dengan IC₅₀ sebesar 84,41 dan

memiliki aktivitas antidiabetes dengan ekstrak filtrat dan biomassa masing masing sebesar 63,40% dan 96,09% sehingga berpotensi sebagai agen antidiabetes dan antioksidan.

4. Dini (2014), Isolasi fungi endofit penghasil senyawa antioksidan dari tanaman (*kleinhovia hospita* Linn). Diperoleh 5 isolat fungi endofit yang memiliki aktivitas antioksidan yaitu 2 isolat dari daun (KhD1 dan KhD2) dan 3 isolat dari ranting (KhR1, KhR2, dan KhR3) tanaman Paliasa (*Kleinhovia hospita* Linn). Diperoleh nilai IC₅₀ untuk ekstrak etil asetat metabolit sekunder dari isolat KhD1 sebesar 1087,0 µg/ml.
5. Widya (2013), Kandungan Flavonoid dan kapasitas antioksidan total ekstrak etanol daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis.) Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun Binahong mengandung flavonoid total sebesar 11,263 mg/kg (segar) dan 7,81 mg/kg (kering). Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kering dan segar termasuk golongan flavonol. Ekstrak etanol daun Binahong memiliki antioksidan total sebesar 4,25 mmol/100g (segar) dan 3,68 mmol/100g (kering).

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jenis-jenis kapang endofit dari tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan L*).
2. Mengetahui kemampuan kapang endofit kayu secang (*Caesalpinia sappan L*) dalam menghasilkan senyawa antioksidan.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah kegunaan dari pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang potensi Kapang endofit kayu secang (*Caesalpinia sappan L*) menghasilkan senyawa antioksidan.
2. Menemukan sumber antioksidan yang baru untuk menggantikan obat-obatan kimia.
3. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Keberadaan kapang yang menginfeksi tumbuhan sehat pada jaringan tertentu mampu menghasilkan mikotoksin, enzim serta antibiotika yang bermanfaat bagi inang. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara jamur endofit dengan tanaman inangnya dapat berupa mutualistik. Keberadaan kapang endofit sebenarnya sudah dijelaskan dalam QS ar-Ruum/30: 19 yang berbunyi:

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْجُرُجُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur) (Kementerian Agama, 2012).

Firman Allah Ta'ala "*Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup,*" Yakni situasi yang kami alami saat ini adalah dalam kekuasaan-Nya yang menciptakan segala sesuatu silih berganti. Ayat-ayat yang berurutan dan mulia dalam jajaran ini mengandung penyebutan tentang ciptaan-Nya yang berupa sesuatu dengan lawannya (yang hidup dan yang mati) untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Diantaranya ialah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji dan mengeluarkan biji dari tumbuh-tumbuhan mengeluarkan telur dari ayam dan mengeluarkan air mani dari manusia, mengeluarkan

orang mukmin dari kafir dan mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin (M. Quraish shihab, 2009).

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan pada manusia atau termasuk obat tradisional. Beberapa macam tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan alami (herbal) telah disebutkan dalam al-Qur'an ataupun Hadis dimana kajian sains modern telah berhasil menemukan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki khasiat untuk mengobati penyakit sesuai Firman Allah dalam QS an-Nahl/16: ayat : 68-69 yang berbunyi:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
 ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Kementrian Agama, 2012).

Firman Allah Ta'ala “*Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia,*” ada yang berwarna putih, kuning, merah, dan warna-warna lainnya yang indah sesuai dengan lingkungan dan makanannya. Firman-Nya “*Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia*”. Maksudnya, didalam madu itu terdapat obat penyembuh bagi manusia. Sebagian orang yang berbicara tentang *thibbun nabawi* (Ilmu kedokteran Nabi) mengatakan, jika Allah mengatakan, “*Fiihis-syifa’ linnas*”, berarti madu itu menjadi obat bagi segala macam penyakit, tetapi dia mengatakan “*Fiihi syifa’ linnas,*” yang berarti bahwa madu itu bisa dipergunakan untuk obat penyakit kedinginan, karena madu itu panas. Penyakit itu selalu diobati dengan lawannya. Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala “*Didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia*” (Ibnu Khatsir, 2004).

B. Tinjauan Umum Tentang Radikal bebas

Radikal bebas adalah *Reactive Oxygen Species* (ROS) dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, ketika kelebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sel, asam nukleat, protein dan lemak. Radikal bebas menyerang molekul biologi yang menyebabkan kerusakan jaringan dan sistem imun. Radikal bebas menyebabkan lipid peroksidase, yang memudahkan gejala penuaan (Fardiaz, 1988 dalam Dini, 2014).

Radikal bebas sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada lapisan luarnya. Merupakan juga suatu kelompok bahan kimia dengan reaksi jangka pendek yang memiliki satu atau lebih. Radikal bebas dapat mengganggu produksi DNA, lapisan lipid pada dinding sel, mempengaruhi pembuluh darah, dan produksi prostaglandin. (Strobel, 2003 dalam Dini 2014).

Radikal bebas dapat dibentuk dari dalam sel oleh absorpsi tenaga radiasi (misalnya sinar ultra violet, sinar X) atau dalam reaksi reduksi oksidasi yang selama proses fisiologi normal atau mungkin berasal dari metabolisme enzimatik bahan-bahan kimia eksogen. Tenaga radiasi dapat melisiskan air dan melepaskan radikal seperti ion hidroksil dan H^+ . Radikal bebas lain ialah superoksida yang berasal dari reduksi molekul oksigen. Oksigen secara normal direduksi menjadi air, tetapi pada beberapa reaksi terutama yang menyangkut xantin oksidase, O_2^- dapat terbentuk (Siti, 2009).

Mekanisme terbentuknya radikal bebas dapat dimulai oleh banyak hal, baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Reaksi selanjutnya adalah peroksidasi lipid membran dan sitosol yang mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi kerusakan membran dan organel sel (Siti, 2009).

Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri (endogen), bisa pula berasal dari luar tubuh (eksogen). Bersifat endogen di dalam tubuh, radikal bebas sering diproduksi selama proses aerob seperti metabolisme, reaksi biokimia di sel, detoksifikasi di liver dan penghasil energi oleh mitokondria selama metabolisme

aerob ketika oksigen digunakan untuk mengoksidasi makanan yang kita makan untuk memproduksi energi. Superoksida dan hidrogen peroksida juga dihasilkan oleh tubuh sebagai bagian dari sistem imun untuk melawan dan membunuh bakteri, sehingga tubuh membutuhkan dan menggunakan beberapa radikal bebas (Dini, 2012).

Sumber eksogen, Produksi radikal bebas dipertinggi oleh diet lemak tinggi, minyak jenuh, daging panggang, makanan siap saji dan makanan basi. Gaya hidup stress, rokok, dan radiasi juga mempertinggi produksi radikal bebas. Radikal bebas juga masuk ke dalam tubuh dari bahan kimia pada pewarna makanan, bahan pengawet, dan perasa yang tinggi, polusi lingkungan dan pestisida (Dini, 2012)

Radikal bebas bersifat destruktif, sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan makromolekul sel, seperti: protein, lipid, karbohidrat, atau DNA. Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu berujung pada timbulnya suatu penyakit, yaitu antara lain:

1. Peroksidasi lemak, membran sel kaya akan sumber Poly Unsaturated Fatty Acid (PUFA), yang mudah dirusak oleh bahan-bahan pengoksidasi. Proses tersebut dinamakan peroksidasi lemak. Hal ini sangat merusak karena merupakan proses berkelanjutan.
2. Kerusakan protein, protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas dari pada PUFA, sehingga kecil kemungkinan terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang, kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi (jarang pada sel normal), atau bila kerusakannya

terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Salah satu penyebab kerusakan terfokus adalah jika protein berikatan dengan ion logam transisi.

3. Kerusakan DNA, senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain seperti virus. Bila kerusakan tidak terlalu parah, masih dapat diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Namun, bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat, kerusakan ini tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel akan terganggu. Bahkan terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Kemungkinan terjadinya kerusakan DNA menjadi suatu reaksi berantai, disebabkan oleh suatu lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi, dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi.
4. Membran Sel, komponen penyusun membran utamanya berupa asam lemak tak jenuh yang merupakan bagian dari fosfolipid dan mungkin juga protein. Serangan radikal hidroksil pada asam lemak tak jenuh dimulai dengan interaksi oksigen pada rangkaian, sehingga terbentuk lipid hidroperoksida, yang selanjutnya merusak bagian sel hidroperoksida ini berada.
5. Proses penuaan, secara teori radikal bebas dapat dihambat oleh berbagai antioksidan, tetapi tidak pernah mencapai 100%. Karena itu, secara perlahan dan pasti terjadi kerusakan jaringan oleh radikal bebas yang tidak termusnahkan. Kerusakan jaringan secara perlahan ini menyebabkan terjadinya penuaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat oksigen reaktif dan radikal bebas. Dengan kata lain Antioksidan adalah senyawa yang dapat melawan dan menetralsir radikal bebas dan memperbaiki kerusakan oksidatif pada molekul biologis. Antioksidan pada umumnya diisolasi dari sumber alami yang tersebar di beberapa bagian tanaman. Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional (Prihatiningtias, 2007).

Sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan terhadap serangan radikal bebas, secara alami telah ada dalam tubuh kita. Antioksidan tubuh bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Antioksidan primer

Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru. Antioksidan ini mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas sempat bereaksi. Contoh antioksidan ini adalah enzim SOD yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel di dalam tubuh serta mencegah proses peradangan karena radikal bebas (Virmala, 2003).

2. Antioksidan sekunder

Antioksidan ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder: vitamin E, vitamin C, beta karoten,

bilirubin, senyawa fenolik dan albumin. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi antioksidan fenolik alami yang terdapat dalam buah, sayur mayur, dan tanaman serta produk-produknya mempunyai manfaat besar terhadap kesehatan yakni dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Senyawa-senyawa fenolik menghambat reaksi oksidasi melalui mekanisme penangkapan radikal (radical scavenging) dengan cara menyumbangkan satu elektron pada elektron yang tidak berpasangan dalam radikal bebas sehingga banyaknya radikal bebas menjadi berkurang (Virmala, 2003).

3. Antioksidan tersier

Antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. Contoh enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksidan reduktase. Adanya enzim-enzim perbaikan DNA ini berguna untuk mencegah penyakit kanker. Hasil berbagai penelitian mendukung teori bahwa mengkonsumsi antioksidan yang memadai dapat mengurangi terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, kardiovaskular, katarak serta penyakit degeneratif lain (Virmala, 2003).

Sumber-sumber Antioksidan yaitu:

1. Antioksidan Alami

Antioksidan Alami berasal dari tumbuhan yang sering dikonsumsi dan telah diisolasi. Antioksidan yang terdapat pada tanaman tingkat tinggi dan terdapat dalam setiap bagian tanaman seperti pada kayu, batang, daun, buah, akar, bunga dan serbuk sari. Senyawa kimia yang tergolong kelompok antioksidan dapat ditemukan pada

tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, bioflavonoid, vitamin c, vitamin E, beta-karoten, katekin dan resveratrol (Sashikumar, 2009).

2. Antioksidan Sintetik

Antioksidan Sintetik diizinkan penggunaannya dalam makanan untuk menjaga mutu dan dari perubahan sifat kimia makanan akibat proses oksidasi yang terjadi terutama pada waktu penyimpanan. Contohnya Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), Propil galat (Sashikumar, 2009).

Sumber potensial antioksidan alami adalah buah-buahan, biji-bijian, sayuran, daun, akar, kulit kayu, rempah-rempah, dan bumbu (Velioglu, 1998 dalam Souren, 2017). Metabolisme sekunder aromatik utama pada tanaman seperti fenolat, dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas nutrisi, warna dan menjamin mutu pada makanan (Tomas dan Martinez, 2001 dalam Souren, 2017). Makanan herbal kaya akan antioksidan karena kaya akan kandungan fenolik dan bertanggung jawab atas berbagai macam kegiatan pengobatan seperti antiviral, anti alergi, anti inflamasi, anti mikrobial, antikarsinogenik (souren, 2017).

D. Tinjauan Umum Kapang Endofit

Jamur endofit adalah kelompok yang tinggal di dalam jaringan hidup tanaman inang tanpa menimbulkan gejala penyakit atau penyakit. Istilah endofit diperkenalkan oleh de Bary dan pada awalnya diterapkan pada organisme yang ditemukan didalam tanaman (de Bary 1866 dalam Amit, 2016).

Metabolit sekunder termasuk antibiotik/antimikrobia dapat diproduksi oleh mikroorganisme endofit yang dalam habitat aslinya dapat membentuk koloni dalam jaringan tanaman. Dari sekitar 300.000 jenis tanaman yang tersebar di muka bumi, masing-masing tanaman mengandung satu atau lebih mikroorganisme endofit yang terdiri dari bakteri atau fungi. Mikroorganisme endofit dapat ditemukan pada berbagai jaringan tanaman diantaranya biji, ovula, buah, batang, akar, umbi akar dan daun tetapi tidak menyebabkan penyakit pada tanaman tersebut (Halliwell, 1992).

Menurut Azevedo (2000), mikoriza dapat juga dianggap sebagai mikroorganisme endofit. Kapang endofit menarik perhatian besar bagi peneliti karena ada dua alasan, yaitu pertama dapat ditemukan di semua tumbuhan, biasanya jumlah dan jenisnya sangat beragam (Stone and Petrini, 1997; Arnold et al., 2000). Alasan kedua, yaitu mampu menghasilkan mikotoksin yang menguntungkan bagi tumbuhan inang untuk melawan mikroorganisme pathogen (Carrol, 1988 in Faeth, 2002).

Mikrobia endofit meningkatkan adaptasi ekologi inangnya dengan menaikkan toleransi mereka pada “stress” lingkungan (lingkungan yang kurang menguntungkan) dan juga menaikkan resistensi inangnya terhadap fitopatogen atau herbivora termasuk serangga yang memakan tanaman inang. (Halliwell, 1992).

Mikroba endofit dapat berupa bakteri atau kapang, tetapi saat ini yang lebih banyak dieksplorasi adalah kapang endofit. Asosiasi kapang endofit dengan tumbuhan inangnya digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu mutualisme konstitutif dan induktif. Mutualisme konstitutif merupakan asosiasi yang relatif erat

hubungannya antara kapang endofit dengan tanaman inang terutama rumput-rumputan. Mutualisme induktif merupakan asosiasi antara mikroorganisme endofit dengan tumbuhan inang yang penyebarannya terjadi secara bebas melalui udara dan air. Jenis ini hanya berasosiasi dalam bagian vegetatif inang dan sering berada dalam keadaan tidak aktif dalam periode cukup lama dan membentuk biomassa yang kecil (Ediningsari, 2006).

Kapang atau jamur adalah organisme yang berbentuk benang, multiseluler, tidak berklorofil, dan pertumbuhannya pada substrat mudah dilihat karena penampaknya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula berwarna putih tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang. Berbeda halnya dengan sel khamir (ragi), kapang tampak jelas kelihatan walau dengan pembesaran kuat, maka kapang tampak menyerupai struktur hutan kecil (Wulandari, 2009).

Hubungan antara kapang endofit dan tumbuhan inang adalah mulai dari phytopathogen laten sampai simbiosis mutualisme (Tan and Zou, 2001). Phytopathogen laten artinya kapang endofit merupakan patogen lemah bagi tumbuhan inang tetapi suatu saat dapat menimbulkan gejala penyakit apabila jaringan sudah tua dan rusak (Azevedo, 2000).

Hubungan mutualisme antara kapang endofit dengan tumbuhan inang adalah kapang akan memperoleh nutrisi dari tumbuhan inang dan tumbuhan inang akan memperoleh zat metabolit dari metabolisme sekunder kapang endofit. Dalam simbiosis ini, kapang endofit dapat membantu proses penyerapan unsur-unsur hara

yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis serta melindungi tumbuhan inang dari serangan penyakit, dan hasil dari fotosintesis dapat digunakan oleh kapang endofit untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keuntungan penting kapang endofit bagi tumbuhan inang adalah untuk meningkatkan resistensi tumbuhan terhadap hewan herbivora dengan memproduksi senyawa alkaloid, meningkatkan daya tahan terhadap serangan kelompok nematoda dan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen lain dengan menghasilkan mikotoksin, antiviral dan antibiotik (Siegel et al., 1987) Selain itu kapang endofit ini juga meningkatkan pertumbuhan tumbuhan inang dengan memproduksi hormon IAA (auksin) (Debattista et al., 1990 in Wilson et al., 1995).

Metabolit sekunder kapang endofit, mikroba endofit memiliki potensi dalam dunia farmasi dan agrokimia, yaitu dengan menghasilkan produk antibiotik, komponen antivirus, volatile antibiotik antikanker, antioksidan, insektisida, agen antidiabetik, dan komponen immunosupresif (Strobel and Daisy, 2003).

Produk antibiotik, Banyak kelompok kapang endofit yang mampu memproduksi senyawa antibiotik yang aktif melawan bakteri, fungi patogen terhadap manusia, hewan dan tumbuhan, terutama genus *Coniothirum* dan *Microsphaeropsis* (Petrini et al., 1992). Penelitian Dryfuss et al., (1986) menunjukkan adanya aktivitas yang tinggi dari penisilin, sporiofungin yang dihasilkan oleh isolate isolat endofit *Pleurophomopsis* sp dan *Cryptosporiopsis* sp yang diisolasi dari tumbuhan *Cardamin heptaphylla* Schultz.

Penyebaran kapang atau jamur di alam sangat luas, jamur terdapat di dalam tanah, pada buah-buahan, dalam air, air laut, bahan organik, bahan makanan, sebagai saprofit dan ada yang bersifat parasit pada tanaman dan manusia. Spora jamur beterbangan di udara. Spora tersebut akan berkecambah menjadi sel vegetatif, jika jatuh pada tempat yang memungkinkan untuk hidup. Sedangkan jamur yang hidup di air mempunyai satu alat pekembangbiakan yang dapat aktif bergerak (Wulandari, 2009)

E. Tinjauan Umum Tentang Fermentasi

Fermentasi dalam mikrobiologi industri digambarkan sebagai proses untuk mengubah bahan dasar menjadi produk yang dikehendaki dalam kultur mikroba tertentu atau proses yang dilakukan oleh mikroorganisme baik melalui proses aerobik ataupun anaerobik yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia spesifik dari suatu substrat organik dan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. pemilihan medium sangat penting terhadap keberhasilan proses fermentasi karena medium menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan, energi, zat zat pembangun sel, dan substrat biosintesis selama fermentasi (Fardiaz, 1988).

Medium yang digunakan untuk menumbuhkan fungi mengandung sumber karbon (umumnya glukosa), sumber nitrogen (umumnya ammonia atau nitrat terkadang asam amino), fosfat, sulfat, magnesium pottasium, dan unsur mikro seperti besi, mangan, zink, tembaga dan sebagai tambahan, terkadang juga ditambahkan bahan alam pada medium seperti air rendaman jagung, ekstrak khamir, jus buah-buahan dan protein terhidrolisa (Virmala, 2013).

F. Tinjauan Umum Tentang Ekstraksi


Ekstraksi adalah isolasi senyawa yang terdapat dalam campuran larutan atau campuran padatan dengan menggunakan pelarut yang cocok. Adapun prinsip dari ekstraksi adalah melarutkan komponen senyawa yang berada dalam campuran secara selektif dengan pelarut yang sesuai. Hasil dari proses ekstraksi disebut ekstrak (Kumalaningsih,2006).

Ekstraksi dapat dilakukan dengan pelarut organik terhadap bahan segar atau bahan yang telah dikeringkan berdasarkan energi yang digunakan, ekstraksi dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Hal yang harus diperhatikan pada proses ekstraksi adalah kestabilan dari senyawa yang diisolasi. Untuk senyawa yang tidak tahan panas diekstraksi dengan cara dingin agar senyawa tersebut tidak rusak. Sedangkan senyawa yang tahan panas dengan diekstraksi dengan cara panas (Kumalaningsih,2006).

G. Tinjauan Umum Pengujian Aktivitas Antioksidan

Beberapa metode pengukuran aktivitas antioksidan yang dapat digunakan yaitu metode DPPH. Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai model dalam penelitian antioksidan atau peredam radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH). Metode ini sering digunakan untuk mendeteksi kemampuan antiradikal suatu senyawa sebab hasilnya terbukti akurat, reliabel dan praktis. Selain itu, sederhana, cepat dan memerlukan sedikit sampel (Shinta, 2014).

DPPH dikenal dengan nama kimia 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil ($C_{18}H_{12}N_5O_6$) yang mempunyai bobot molekul 394,33 dengan rumus struktur sebagai berikut:




Gambar 2.1 Rumus
(Sumber Dini, 2010)

Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas transfer H^{\cdot} , sekaligus juga untuk penghambatan radikal bebas. Senyawa DPPH adalah radikal bebas yang stabil yang berwarna ungu. Radikal DPPH merupakan senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ_{max} yang bervariasi berkisar 515 nm, 516 nm, 518 nm, dan 520 nm. Namun pada praktiknya, λ_{max} dapat diperoleh dengan mengatur alat yang digunakan, sehingga diperoleh serapan yang maksimum (Sudahnta, 2007).

Waktu pengoperasian yang disarankan adalah 30 menit dan telah digunakan pada beberapa penelitian. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning (difenil pikrilhidrazin). Hasil perubahan warna dari ungu menjadi kuning stoikiometrik dengan jumlah elektron yang ditangkap. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan terhadap konsentrasi. Penurunan intensitas warna

yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi (Dini, 2010).



Gambar 2.2 Reaksi
(Sumber Dini, 2010)

Akibatnya, penambahan senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal akan menurunkan konsentrasi DPPH dan menyebabkan penurunan absorbansinya dibandingkan dengan absorbansi kontrol yang tidak diberi senyawa uji yang diduga mempunyai aktivitas antiradikal. Besarnya persentase penangkapan radikal bebas dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{\text{serapan blangko} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan blangko}} \times 100 \%$$

Parameter yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil dari metode DPPH adalah nilai EC_{50} (*Efficient Concentration*) atau sering juga disebut nilai IC_{50} (*Inhibitory Concentration*) yang didefinisikan sebagai konsentrasi dari substansi

yang dapat meredam 50% aktivitas DPPH (dari perubahan warna). Parameter IC_{50} menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin rendah nilai IC_{50} (Dini, 2010).

H. Tinjauan Umum Kayu Secang (*Caesalpinna sappan*)

Sejak zaman kuno, tanaman obat banyak digunakan sebagai Alat alternatif untuk pencegahan atau pengobatan banyak penyakit karena ampuhnya Aktivitas antioksidan (srujana, 2016). salah satunya yaitu kayu secang berikut dekskripsi kayu secang:

1. Gambar 2.3. Morfologi kayu secang

(a). pohon secang

(b). polong secang

(c). Bunga secang

(d). batang secang

(e). daun secang



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

(Sumber : Bramardianto, 2011)

a) Klasifikasi kayu secang (*Caesalpinia sappan* L)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatopyta
Classis	: Dicotyledoneae
Ordo	: Fabales
Familia	: Fabaceae
Genus	: <i>Caesalpinia</i>
Spesies	: <i>Caesalpinia sappan</i> L. (Heyne, 1987).

b) Nama Indonesia dan nama daerah

Caesalpinia sappan L. Todaro (1876) yang termasuk family caesalpinaceae atau leguminosae, di Indonesia lazimnya dikenal dengan nama seupeuang (Aceh), sepang (sunda, bugis, goya, sasak), soga jawa (jawa), cang (bali), supa, supang (bima), sepal (timor), kayu sema (manado), sapang (Makassar), pasa, nagel (minahasa), (Anonim 1, 1995, anonim 2, 1997, heyne, 1987, sangat, 2000).


c) Penyebaran

Menurut Cronquist (1981) family Caesalpiniaceae terdiri dari 150 genus dan 2200 spesies serta tersebar luas di daerah tropika dan subtropika. Genus yang utama family Caesalpiniaceae ialah *Bauhinia*, *Chamaecrista*, dan *Senna*, yang masing-masing terdiri dari 250 spesies, diikuti oleh *Caesalpinia* dan *Swartzia*, yang masing-masing terdiri dari 125 spesies, dan *Caesalpinia sappan* adalah salah satu spesies yang utama. Di Asia Tenggara terdapat sekitar 18 spesies *Caesalpinia* dan tersebar luas di wilayah Indonesia. (Van Valkenburg, 2001).

d) Kandungan Kimia

Zat yang terkandung dalam secang antara lain brazilin, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, fenil propana dan terpenoid. Selain itu juga mengandung asam galat, brasilein, delta-a phellandrene, oscimene, resin dan resorin. Sementara daunnya mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,20% yang beraroma enak dan tidak berwarna. Bagian yang digunakan untuk dijadikan minuman adalah kayunya atau batang pohonnya. Panen kayu secang dapat dilakukan mulai umur 1-2 tahun. Kandungan yang terdapat dalam batang pohon secang berguna untuk tubuh kita terutama dalam bidang kesehatan antara lain penghenti pendarahan, pembersih darah, penawar racun, dan obat antiseptik. Karena tanaman ini mengandung senyawa anti bakteri dan bersifat anti koagulasi atau anti penggumpalan, maka tak heran kalau secang dapat digunakan sebagai obat diare, batuk dan dapat menyembuhkan luka. (Valkenburg, 2001).

I. Kerangka pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi, Laboratorium Mikrobiologi dan Farmasi biologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar Samata-Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru yang belum diketahui, belum dipahami dan belum dikenal.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu kapang endofit kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) yang menghasilkan senyawa antioksidan.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. kapang endofit kayu secang merupakan kapang yang hidup dalam jaringan kayu secang (*Caesalpinia sappan* L) yang diisolasi dari batang dan daun yang dapat menghasilkan senyawa antioksidan.

2. kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) adalah famil Caesalpiniaceae yang banyak ditemui di Indonesia. Dan diketahui memiliki banyak khasiat penyembuhan dan sering dikonsumsi oleh masyarakat sebagai minuman kesehatan.
3. Senyawa antioksidan merupakan senyawa yang berfungsi untuk mencegah proses terjadinya oksidasi yang dideteksi dengan menggunakan reagen DPPH.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melihat persentasi radikal bebas menggunakan rumus % hambatan.

F. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain oven, autoklaf, lemari es, sendok, botol pengenceran, cawan petri, inkubator, labu erlenmeyer, gelas piala, laminar air flow, gelas ukur, pipet tetes, jarum ose, bunsen, gelas objek, deck glass, korek api, mikropipet dan tip, water bath, vortex mixer, buscner dan spektrofotometer UV-vis.

Bahan yang digunakan adalah sampel kapang endofit berasal dari tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.), bahan yang digunakan untuk sterilisasi permukaan yaitu: hipoklorit alkohol 70%, alkohol 70%, akuadest steril. Medium yang digunakan yaitu medium PDA (*Potato Dextrose Agar*) dengan komposisi 150 dengan takaran 150 ml aquades dengan kentang 30 g, dextrose 2,25 g dan agar-agar

2,25 g. Medium *Potato Dextrose Broth* (PDB) dengan komposisi: 12 g Dextrosa, 2,5 g CaCO_3 , 100 g kentang dan 500 ml akuadest. Pengujian antioksidan menggunakan Vitamin C sebagai kontrol dan DPPH sebagai blangko.

G. Prosedur Kerja

1. Isolasi kapang endofit

Sampel kayu secang sebagai sumber isolat berupa batang dan daun. Bagian tanaman yang akan diisolasi dicuci bersih kemudian disterilisasi permukaan dengan cara merendam dalam larutan hipoklorit alkohol 70% selama 1 menit, alkohol 70% 1 menit dan terakhir dibilas dengan akuades steril. (Coombs and ranco, 2003). Kemudian daun digerus menggunakan mortal dan pastel sampai halus kemudian dilakukan pengenceran sampai 10^{-6} , setelah itu sampel disebar di media PDA. Sedangkan sampel batang dipotong kecil dan ditabur langsung di media PDA. Kemudian inkubasi dilakukan selama satu minggu pada suhu ruang. Koloni kapang yang tumbuh dari jaringan tanaman diisolasi dan dimurnikan lebih lanjut. Koleksi isolat disimpan di dalam lemari pendingin sebelum diuji lebih lanjut.

2. Identifikasi kapang endofit

Identifikasi kapang dilakukan menurut (Susiana, 2009) Gelas benda dibersihkan dengan alkohol kemudian dipanaskan sampai bebas lemak dan debu. Kaca preparat ditetesi aquadestt pada bagian tengah. Biakan jamur diambil secara aseptis menggunakan jarum ose kemudian diletakkan di atas gelas benda yang telah ditetesi aquadest, kemudian dikeringkan dengan tissue, lalu dilihat dibawah mikroskop untuk

mendapatkan ciri mikroskopiknya. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan karakteristik cendawan yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan buku identifikasi Barnett and hunter (1998).

3. Persiapan medium

Pembuatan media PDA 150 dengan takaran 150 ml aquades dengan kentang 30 g, dextrose 2,25 g dan agar-agar 2,25 g. kemudian dituangkan kedalam labu Erlenmeyer dan dipanaskan dengan menggunakan alat hot plate selama 30 menit untuk melarutkan dekstrosa dan agar, kemudian media ditutup rapat dan disterilkan menggunakan autoklaf suhu 121 °C selama 15 menit. Erlenmeyer yang berisi PDA dikeluarkan dari autoklaf setelah itu menuang PDA kedalam cawan petri, dikerjakan secara aseptik didalam *Laminar Air Flow* (LAF) yang akan digunakan sebagai media peremajaan.

4. Media fermentasi

Medium *Potato Dextrose Broth* (PDB) dibuat dengan cara sejumlah kentang dikupas dan dipotong menjadi dadu, cuci potongan kentang, ditimbang 200 gram lalu dididihkan dengan 500 ml akuades. Saring lalu dimasukkan dalam Erlenmeyer 1000 ml kemudian tambahkan 12 g Dextrosa, 2,5 g CaCO₃. Kemudian tutup media dan sterilkan di autoklaf (Suciati, 2010).

5. Inokulasi Isolat kapang Endofit

a). Pada Media PDA

Isolat kapang endofit yang telah dimurnikan dinokulasi pada media PDA didalam cawann petri kemudian diinkubasi selama 7-10 hari.

b). Pada media PDB

Isolat kapang endofit yang telah tumbuh di canwan petri yang sudah dimurnikan, diambil serabut hifanya dengan ose yang sudah steril lalu difermentasi pada 100 ml media PDB, didalam Erlenmeyer 250. Selanjutnya diinkubasi pada *rotary shaker* selama 10 hari (LIPI, 2016).

c). Ekstraksi hasil fermentasi

labu Erlenmeyer yang mengandung 100 ml hasil fermentasi dari isolat dipisahkan antara biomassa dengan filtrate. Biomassa dikeringkan terlebih dahulu dengan oven. Filtrate diekstraksi sebanyak 2 kali dengan 50 ml etil asetat menggunakan corong pisah, lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara fase etil asetat dan air. Fase etil asetat dikumpulkan kemudian dikeringkan. Hasil ekstraksi filtrat yang sudah kering kemudian diuji aktivitas antioksidannya (LIPI, 2016).

6. Uji aktivitas antioksidan ekstrak filtrat

Aktivitas antioksidan ditentukan dengan metode peredaman radikal bebas menggunakan DPPH. (LIPI, 2016).

a). Pembuatan larutan DPPH

Menimbang 0,0079 g DPPH dan dilautkan dengan metanol pro analisis sekitar 50 ml kemudian tempatkan dalam botol gelap

b). Pembuatan larutan blanko

Larutan DPPH dipipet 1 mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ditara 5 mL, dilarutkan dalam metanol pro analisis hingga tanda, dihomogenkan.

c). Pembuatan larutan uji

Secara seksama ditimbang 10 mg ekstrak kental dari tiap fraksi menggunakan timbangan analitik, dilarutkan dengan metanol pro analisis sampai 10 ml (1000 bpj). Larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian dipipet 25 μL , 50 μL , 125 μL , 250 μL , dan 500 μL . larutan induk tersebut kedalam tabung reaksi yang telah ditara 5 ml untuk mendapatkan konsentrasi sampel 5 bpj, 10 bpj, 25 bpj, 50 bpj, dan 100 bpj.

d). Pembuatan larutan vitamin C (kontrol positif)

Menimbang 10 mg vitamin C, lalu dilarutkan metanol pro analisis samapai 10 ml (1000 bpj) larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian dipipet 15 μL , 30 μL , 45 μL , 60 μL dan 75 μL . larutan induk ke dalam labu terukur 5 ml untuk mendapatkan konsentrasi sampai 3 bpj, 6 bpj, 9 bpj, 12 bpj, dan 15 bpj.

7. Uji aktivitas antioksidan

Larutan uji dan kontrol positif dimasukkan ke dalam masing – masing tabung reaksi lalu ditambahkan 1 ml larutan DPPH kemudian ditambahkan metanol pro analisis hingga 5 mL, lalu dihomogenkan larutan blanko, larutan uji dan control positif segera di inkubasi selama 30 menit . sarapan dibaca pada gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer UV-vis.

a). Serapan blanko, kontrol positif dan sarapan larutan uji yang telah diukur pada spektrofotometer UV-vis dicatat dengan cara memasukkan hasil sarapan masing-masing konsentrasi pada rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{\text{serapan blanko} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan blanko}} \times 100 \%$$

- b). Dibuat persamaan regresi linear dengan memasukkan nilai konsentrasi larutan uji sebagai sumbu x dan % hambatan sebagai sumbu y
- c). Dihitung IC_{50} dengan cara memasukkan % hambatan sebesar 50 % pada persamaan regresi linear,
- d). Ditentukan isolat mana yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Allah swt. menciptakan segala sesuatu dengan manfaat ataupun kegunaannya masing-masing, yang menjadi tanda kebesaran-Nya. Salah satunya adalah tanaman yang merupakan sumber kekayaan alam yang potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat dari bagian daun, batang, biji, akar dan buahnya. Namun seiring berkembangnya keberadaan kapang endofit yang mampu menginfeksi tumbuhan sehat pada jaringan tertentu dan mampu menghasilkan mikotoksin, enzim serta antibiotika yang bermanfaat bagi tumbuhan inang sehingga dapat dikatakan antara kapang endofit dengan tanaman inangnya dapat berupa mutualistik. Ini jelas membuktikan bahwa batang dan daun tanaman kayu secang merupakan salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang telah Allah ciptakan. Hal ini sesuai dengan bukti Allah pada firman-Nya QS ‘Abasa/80 ayat 24-27:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (Kementrian Agama, 2012).

Firman-Nya:

Dan Firman Allah Ta'ala "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya" Dalam firman-Nya ini terkandung upaya meningkatkan akan pemberian karunia. Selain itu, terkadang juga dalil penumbuhan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati untuk menunjukkan penghidupan kembali jasad-jasad setelah sebelumnya berupa tulang-belulang yang berserakah dan tanah yang bertebaran "Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit)." Maksudnya, kami telah menurunkan air dari langit ke bumi. "kemudian kami bela bumi dengan sebaik-baiknya". Yakni kami tempatkan air itu di sana, lalu ia masuk ke dalam lapisan-lapisan tanah, selanjutnya masuk ke dalam biji-bijian yang terdapat di dalam bumi, sehingga tumbuh, tinggi dan tampak di permukaan bumi. "lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu." Yang dimaksud al-habb disini adalah semua biji –bijian (Quraish shihab, 2003).

Melihat dan merenung tentang bahan makanan, bagaimana proses kejadiannya, lalu memilih yang terbaik dan sesuai untuk dimakan, merupakan salah satu perintah Allah yang perlu diperhatikan. Setiap orang harus dapat menarik pelajaran dari fenomena alam, semakin dalam renungan, semakin banyak rahasia dan manfaatnya yang dapat terungkap. Manusia hendaknya selalu mengingat nikmat-nikmat Allah dan alangkah banyaknya nikmat tersebut, antara lain ketersediaan yang lebih dari cukup di persada bumi ini bahan pangan untuk seluruh makhluk hidup.

Ayat-ayat yang lalu menguraikan tentang aneka makanan yang disiapkan Allah bagi manusia. Di sana, terlihat betapa Allah kuasa mencipta. Pepohonan dipetik buahnya bahkan berguguran dedaunannya, khususnya pada musim gugur, kemudian berkembang lagi pada musim bunga. Apa yang berjatuhan dari pepohonan, lalu bercampur dengan tanah dapat tumbuh lagi, antara lain menunjuk kuasa-Nya membangkitkan yang mati.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kekayaan alam yang ada di bumi ini diciptakan Allah hanya untuk manusia dapat mengambil maanfaat untuk kemaslatan dan kesejahteraan hidupnya, karena semua kekayaan alam yang ada ini baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang kecil maupun yang besar sudah pasti memiliki manfaat masing-masing. Seperti halnya kapang yang dapat dihidup di jaringan tumbuhan yang saling menguntungkan dan menghasilkan manfaat sehingga kapang endofit yang memiliki kandungan dapat dijadikan sebagai antioksidan yang memiliki banyak kegunaan untuk kesehatan dan hal-hal lainnya.

Pada hasil penelitian tanaman yang sudah diisolasi dan diinkubasi dalam Media tumbuh menunjukkan terjadinya pertumbuhan kapang endofit yang ada pada batang tanaman kayu secang (*Caeselpinia sappan L.*) Membuktikan bahwan kapang endofit dapat tumbuh pada jaringan tanaman.

Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh (Carrol dan Clay, 1988) bahwa jamur endofit terdapat didalam sistem jaringan tumbuhan seperti daun, ranting, batang, bahkan akar tumbuhan.

Adapun hasil isolasi kapang endofit dari batang secang (*Caesalpinia sappann* L.) diperoleh 5 isolat dari batang kayu secang terdiri dari *Curvularia lunata*, *Penicillium* sp, *Chrysosporium*, *Trichoderma* sp, Dan *Geotrichum candidum*. Identifikasi dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis, untuk pengamatan makroskopis yaitu mengamati warna permukaan, warna reverse, tekstur, topografi, tetesan eksudat, garis radial, dan lingkaran konsentris dan pengamatan mikroskopis yaitu mengamati bentuk konidia dan bentuk hifa, pengamatan makroskopis dan mikroskopis seperti yang terlihat pada tabel 4.1

Selanjutnya uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH, Pengukuran antioksidan dengan metode DPPH pada prinsipnya adalah mengukur terjadinya pemudaran warna dari radikal DPPH akibat adanya antioksidan yang dapat menetralkan molekul radikal bebas. Jadi, radikal DPPH yang sebelumnya berwarna akan kehilangan warnanya jika ada antioksidan, karena antioksidan akan menyumbangkan elektronnya kepada radikal DPPH. (Rahim, 2012).

Adapun hasil uji aktivitas antioksidan pada penelitian ini yaitu ditemukan kapang endofit *Trichoderma* sp. merupakan antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} 46,354, *Curvularia* sp. dengan nilai IC_{50} sebesar 91,926 antioksidan kuat, Sedangkan *chrysosporium*, *Penicillium* sp. dan *Geotrichum candidum* merupakan antioksidan yang lemah dengan nilai IC_{50} lebih dari 100-150. Dapat dilihat pada tabel 4.5 % hambatan masing-masing isolat

1. Tabel 4.1 pengamatan Makroskopis

Kode isolat	Pengamatan						
	Makroskopis						
	Warna permukaan	Warna balik koloni	Tekstur	Topografi	Tetesan eksudat	Garis radial	Lingkaran konsentri
KS 1	Hitam dengan pinggian putih	Hitam	Velvety	Verrugose	-	-	✓
KS 2	Hijau tua dengan pinggir putih	Putih kehijauan	Cattony	Rogosse	-	-	-
KS 3	Hijau tua	Hijau tua dengan pinggian putih	Velvety	Verrugose	-	-	-
KS 4	Putih abu-abu ditengah	Kuning hijau dan ungu ditngah	Velvety	Umbonate	✓	✓	-
KS 5	Kuning pinggian putih	Kuning	Cattony	Umbonate	-	-	-

2. Tabel 4.2 pengamatan Mikroskopis

Mikroskopis		
Bentuk konidia	Bentuk hifa	Genus
Kapsul	Tidak bersekat	<i>Curvularia lunata</i>
Bulat	-	<i>Penicillium sp.</i>
Bulat	Tidak bersekat	<i>Chrysosporium</i>
Bulat	Bersekat	<i>Trichoderma sp</i>
Bulat	Bersekat	<i>Geotrichum candidum</i>

Keterangan :

Tekstur:

Absent : koloni dengan miselium tenggelam, permukaan agak halus

Cattony : koloni dengan hifa arieal yang panjang dan paadat, menyerupai

Woolly : koloni dengan tenunan hifa atau kumpulan hifa hamper panjan, tenunannya mirip kaain wool

velvety : koloni dengan hifa aerial yang pendek menyerupai kain beludru

Downy : Koloni dengan hifa halus, pendek dan tegak, secara keseluruhan sering transparan

Glabrous : Koloni dengan permukaan halus, kaarenaa tidak ada hifa aerial

Granular : Koloni rata dan terlihat banyak konidia yang terbentuk











Topografi:

Rugose : Koloni yang memiliki alur-alur yang ketinggiannya tidak beraturan dan tampak meupakan garis radial dari *reverse side*.

Umbonate : Koloni yang memiliki penonjolan sepertti sebuah kancing pada bagian tengah koloni. Seringkali koloni ini juga memiliki alur-alur garis radial


Verrugose : Koloni yang memiliki penampakan kusut dan keriput. Biasanya koloni tidak memiliki aerial hifa.

3. Tabel 4.3 pengamatan Makroskopis dan Mikroskopis

Kode isolat	Gambar			
	makroskopis	Mikroskopis	Ket	Genus
KS 1			<ul style="list-style-type: none"> → Konidia → Hifa 	<i>Curvularia lunata</i>
KS 2			<ul style="list-style-type: none"> → Hifa → Konidia 	<i>penicillium sp.</i>
KS 3			<ul style="list-style-type: none"> → Konidia → Hifa 	<i>Chrysosporium</i>
KS 4			<ul style="list-style-type: none"> → konidia → Hifa 	<i>Trichoderma sp</i>
KS 5			<ul style="list-style-type: none"> → konidia → Hifa 	<i>Geotrichum candidum</i>

Keterangan :

Hifa : struktur fungi berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia



Gambara 4.1 hifa

Konidia : spora aseksual yang di hasilkan di ujung hifa yang berbentuk bulat atau kapsul



Gambar 4.2 Konidia

4. Tabel 4.4 hasil timbangan Ekstrak

Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat aktif yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Hasil dari ekstraksi adalah ekstrak yang merupakan berwujud seperti pasta kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif. Dapat dilihat pada tabel 4.4 hasil bobot ekstak yang akan dilarutkan dengan metanol pro analisis sesuai untuk pengujian antioksidan.

Sampel	Bobot ekstrak (g)
<i>Curvularia lunata</i>	0,0112
<i>Pinicilium sp.</i>	0,0022
<i>Chrysosporium</i>	0,0066
<i>Trichoderma sp.</i>	0,0158
<i>Geotrichum candidum</i>	0,0075

5. Tabel 4.5 hasil nilai % hambatan penentu aktivitas antioksidan

Metode DPPH adalah nilai IC₅₀ (*Efficient Concentration*) atau sering disebut nilai IC₅₀ (*Inhibitory Concentration*) yang didefinisikan sebagai konsentrasi dari substansi yang dapat meredam 50% aktivitas DPPH (dari perubahan warna). Parameter IC₅₀ menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin rendah nilai IC₅₀ sebelum menghitung nilai IC₅₀ maka terlebih dahulu % inhibisi dihitung.

% hambatan adalah perbandingan antara selisih dari absorbansi blanko dan absorbansi sampel dengan absorbansi blanko. Persen inhibisi digunakan untuk menentukan persentase hambatan dari suatu bahan yang dilakukan terhadap senyawa radikal bebas. Persen hambatan dihitung dengan rumus berikut: $P_i = [(A_b - A_s) / A_b] \times 100\%$, P_i : Persen inhibisi, A_b : Absorbansi blanko A_s : Absorbansi sampe. Hasil perhitungn dapat dilihat pada tabel 4.5

Sampel (Konsentrasi Sampel (bpj))	% hambatan	IC ₅₀ (bpj)	Keterangan
<i>Curvularia lunata</i> (5)	31,0 %	91,926	Kuat
<i>Curvularia lunata</i> (10)	38,0 %		
<i>Curvularia lunata</i> (25)	41,6 %		
<i>Curvularia lunata</i> (50)	45,7 %		
<i>Curvularia lunata</i> (100)	49,5 %		

<i>Pinicilium</i> sp. (5)	47,0 %	161,60	Lemah
<i>Pinicilium</i> sp. (10)	51,1 %		
<i>Pinicilium</i> sp. (25)	48,8 %		
<i>Pinicilium</i> sp. (50)	43,9 %		
<i>Pinicilium</i> sp. (100)	51,1 %		
<i>Chrysosporium</i> (5)	1,8 %	219,25	Lemah
<i>Chrysosporium</i> (10)	4,2 %		
<i>Chrysosporium</i> (25)	13,0 %		
<i>Chrysosporium</i> (50)	18,2 %		
<i>Chrysosporium</i> (100)	22,2 %		
<i>Trichoderma</i> sp. (5)	10,8 %	46,354	Sangat Kuat
<i>Trichoderma</i> sp. (10)	33,7 %		
<i>Trichoderma</i> sp. (25)	52,7 %		
<i>Trichoderma</i> sp. (50)	56,9 %		
<i>Trichoderma</i> sp. (100)	73,4 %		
<i>Geotrichum candidum</i> (5)	27,2 %	219,81	Lemah
<i>Geotrichum candidum</i> (10)	31,9 %		
<i>Geotrichum candidum</i> (25)	34,2 %		
<i>Geotrichum candidum</i> (50)	35,8 %		
<i>Geotrichum candidum</i> (100)	38,0 %		
Vitamin C (3)	12,3%		

Vitamin C (6)	25,2%	3, 03	Sangat Kuat
Vitamin C (9)	40,3%		
Vitamin C (12)	84,4%		
Vitamin C (15)	95,4%		
Serapan Blangko = 0,444			

Vitamin C Sebagai kontrol positif adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraselular. Sehingga Vitamin C digunakan sebagai kontrol positif karena merupakan senyawa yang sudah murni. Hasil perhitungan % hambatannya dapat dilihat pada tabel 4.5




Diagram 4.3 Hasil Uji Antioksidan (IC₅₀)

Keterangan :

Nilai IC ₅₀	Keterangan
< 50	Sangat kuat
50-100	Kuat
100-150	Sedang
150-200	Lemah

Dari didiagram diatas dapat dilihat bahwa nilai IC₅₀ yang terendah menghasilkan antioksidan yang sangat kuat sedangkan nilai tertinggi menghasilkan antioksidan yang rendah. Dan vitamin C merupakan control positif yang memiliki IC₅₀ sangat kuat karena merupakan antioksidan alami. Dan diantara 5 isolat *Trichoderma* sp. yang memiliki antioksidan yang kuat.

B. Pembahasan

1. Hasil identifikasi

Hasil identifikasi kapang endofit asal kayu secang Kapang endofitik didasarkan pada beberapa fakta terutama karena merupakan reservoir utama keanekaragaman hayati di alam dan juga memiliki Signifikansi farmakologis, karena Sumber metabolit sekunder yang aktif. Metabolisme jamur endofitik tanaman merupakan sumber potensial yang bagus untuk program skrining bahkan Produk alami bioaktif. Saat ini, bioprospeksi Endofit dianggap penting, dan dapat diisolasi dari berbagai macam tanaman (Amit, 2016)

Pada penelitian ini dilakukan isolasi kapang endofit penghasil senyawa antioksidan dari tanaman kayu secang (*Caesalpinia Sappan L.*) dan kemudian dilakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Tujuan Isolasi yaitu untuk menumbuhkan mikroba diluar dari lingkungan alamianya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa daun dan batang tanaman. kayu secang (*Caesalpinia Sappan L.*) Isolasi dilakukan dengan cara menempelkan sampel diatas permukaan medium PDA yang sebelumnya telah diberi Kloramfenikol. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertumbuhan bakteri sehingga menjamin bahwa yang tumbuh merupakan kapang endofit. Sebelum ditempelkan diatas medium, sampel disterilisasi permukaan terlebih dahulu yaitu dengan perendaman sampel dengan menggunakan etanol 70% selama 1 menit, larutan Natrium hipoklorit 1% selama 1 menit, etanol 70% selama 30 detik, kemudian dibilas dengan air suling sebanyak 3 kali lalu ditiriskan di dalam wadah steril. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan mikroba pada permukaan sampel sehingga menjamin bahwa kapang yang akan diisolasi merupakan kapang endofit yang berasal dari jaringan sampel (Sudantha, 2007). Selanjutnya diinkubasi selama 3-7 hari pada suhu ruang.

Pengamatan dilakukan selama masa inkubasi untuk menentukan adanya pertumbuhan fungi endofit berdasarkan adanya koloni yang tumbuh disekitar jaringan tanaman yang ditanam secara acak begitu juga dengan kontrol air bilasan, kontrol ruangan dan kontrol medium. Berdasarkan pengamatan, pertumbuhan kapang mulai terlihat pada hari ke-3 berupa hifa-hifa halus yang tumbuh dari dalam jaringan sampel batang. Koloni yang merupakan kapang endofit dipindahkan ke medium

PDA baru untuk mendapatkan koloni murni berupa pertumbuhan tunggal dengan karakteristik persamaan warna dan bentuk koloni. Hasil isolasi diperoleh 5 isolat murni dari batang dan dari daun tidak ditemukan isolat.

Isolat murni yang diperoleh kemudian ditumbuhkan pada medium PDA lalu diamati secara langsung bentuk dan warna koloni mulai pada hari ke-3 hingga hari ke-7. Hasil pengamatan makroskopik dan mikroskopis ke lima jenis isolate kapang endofit tanaman kayu secang (*Caesselpinia Sappan L.*) pada hari ke-7. Dapat dilihat pada tabel 4.1. dapat dilihat bahwa setiap jenis isolat kapang endofit tanaman kayu secang (*Caesselpinia Sappan L.*) memiliki ciri khas morfologi yang berbeda-beda. Kapang endofit yang dihasilkan dari tumbuhan inang dapat menghasilkan jenis isolat yang berbeda-beda dan jumlah bervariasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyudi bahwa isolasi kapang endofit dari bagian tanaman yang berbeda dari satu tanaman inang ternyata mengandung jenis isolat yang berbeda pula. Berikut kapang yang berhasil diidentifikasi.

a. *Curvularia lunata*

Pada hasil penelitian dengan ciri makroskopis warna permukaan Hitam dengan pinggiran putih warna balik koloni hitam tekstur *dawny* dan topografi *verrugose* memiliki garis radial dan tidak memiliki tetesan eksudat, dan lingkaran konsentri. Pada pengamatan mikroskopis bentuk konidia kapsul, dengan hifa yang tidak bersekat. Hal ini sesuai dengan teori (Barnett dan Hanter, 1972) ciri mikroskopis kapang *Curvularia lunata*.

Curvularia lunata adalah hyphomycete (cetakan) jamur yang merupakan patogen fakultatif, banyak jenis tumbuhan dan tanah. Kebanyakan *Curvularia* ditemukan di daerah tropis, meskipun sedikit yang ditemukan di zona beriklim sedang. *Curvularia* didefinisikan oleh jenis spesies *C. lunata* (Wakker) Boedijn. *C. lunata* relatif sulit dikendalikan karena dalam penyebarannya dapat melalui berbagai cara, diantaranya terbawa angin maupun karena percikan air hujan dan air siraman, atau dapat juga oleh serangga.

Namun sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Curvularia lunata* dapat menghasilkan metabolit sekunder yaitu Oksilipin dihasilkan oleh tanaman sebagai metabolit sekunder yang merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri (Graner et al, 2003; Prost et al., 2005). Kelompok senyawa tersebut didalam tanaman dilaporkan berfungsi sebagai signal komunikasi antara mikroba yang tumbuh didalam jaringan, terutama yang bersifat pathogen. Pathogen tanaman menghasilkan senyawa tersebut sebagai mekanisme untuk mengelabui sistem pertahanan tanaman dengan menghasilkan struktur senyawa yang menyerupai mekanisme pertahanannya (Brodhun dan Feussner, 2010; Tsitgiannis dan Keller, 2007). Sehingga disimpulkan bahwa *C. lunata* adalah kapang endofit.

1. Karakteristik

Konidiofor terbentuk tunggal atau berkelompok, tampak sederhana atau bercabang, lurus atau merunduk, berwarna coklat dan mendekati ujung menjadi coklat muda. Konidiofor dekat basis memiliki ukuran panjang 650 μm dan lebar 5 – 9 μm . Konidia bersepta 3, membengkok pada sel ke tiga yang lebih lebar dan

berwarna lebih coklat dari pada sel yang lain, berdinding tipis dan berukuran (20-30) x (9-15) μm . Bersifat heterotalik, askomata terbentuk sesudah perkawinan dari hifa, pada stromata terbentuk kolumnar, pematangan setelah 20 hari. Askomata berwarna hitam, dan memiliki tinggi 410-700 μm . Askus berbentuk silindris atau gada dan bertunika tunggal. Askospora terletak meliuk dalam askus, berbentuk filiform dan agak meruncing pada ujungnya, bening, berseptata 6-15, dan berukuran (130-270) x (3,8-6,5) μm (Barnett dan Hanter, 1972).

2. Habitat.

Banyak ditemukan di daerah tropis terutama pada tumbuh-tumbuhan, telah diisolasi dari sawah, tanah hutan, lumpur hutan bakau, serasah dan bahan organik yang mengandung keratin, selulosa dan lain-lain. Suhu pertumbuhan yang optimal antara 24°-30°C. Dapat hidup selama 2 tahun pada tanah dalam bentuk sklerotia (Gandjar, 1999).

3. Manfaat *Curvularia lunata*

Biokontrol terhadap berbagai patogen tanaman dalam tanah Dapat mengoksidasi Mangan. (Mukerji, 2000). Namun menurut (Humaidi, 1999) *C. lunata* merupakan fungi saprofit tanah yang fungsinya masih belum banyak diketahui dengan jelas.

Adapun klasifikasi *Curvularia lunata* yaitu :

Kingdom	: Fungi
Devisi	: Ascomycota
Classis	: Euascomycetes
Ordo	: Pleosporales
Familia	: Pleosporaceae
Genus	: <i>Curvularia</i>
Spesies	: <i>Curvularia lunata</i> (Barnett dan Hanter, 1972).

b. Penicillium sp.

Pada hasil penelitian dengan ciri makroskopis: warna permukaan Hijau tua dengan pinggiran putih, warna balik koloni Putih kehijauan, tekstur *contony* dan topografi *rogosse* tidak memiliki teteesan eksudat, lingkaran konsentri dan garis radial. Pada pengamatan mikroskopis bentuk konidia bulat, dengan hifa yang bersekat. Hal ini sesuai dengan teori (Barnett dan Hanter, 1972) ciri mikroskopis kapang *penicillium sp.*

1. Karakteristik

Penicillium sp. adalah genus fungi dari ordo Hypomycetes, filum Askomycota. *Penicillium sp.* memiliki ciri hifa bersepta dan membentuk badan spora yang disebut konidium. Konidium berbeda dengan sporangium, karena tidak memiliki selubung pelindung seperti sporangium. Tangkai konidium disebut konidiofor, dan spora yang dihasilkannya disebut konidia. Konidium ini memiliki cabang-cabang yang disebut phialides sehingga tampak membentuk gerumbul. Lapisan dari

phialides yang merupakan tempat pembentukan dan pematangan spora disebut sterigma. Beberapa jenis *Penicillium* sp. yang terkenal antara lain *P. notatum* yang digunakan sebagai produsen antibiotik dan *P. camembertii* yang digunakan untuk membuat keju biru (Purves dan Sadava, 2003).

2. Kemampuan *Penicillium* sp.

(Panda et al, 2005) menyatakan bahwa *Penicillium* sp. mampu menghasilkan senyawa antimikroba *griseofulvin* yang bersifat menghambat pertumbuhan fungi dengan cara mengganggu fungsi benang spindel dan mikrotubulus sitoplasma sehingga menghambat mitosis sel fungi (Nugroho et al, 2013).

Menurut (Bruehl, 1987), *Penicillium* sp. merupakan organisme yang umum diketahui sebagai penghasil antibiotik. Antibiotik merupakan produk limbah suatu organisme yang aktif pada konsentrasi rendah, berubah dalam substrat pH dan dapat menghambat pertumbuhan organisme lain yang tidak sesuai dengan antibiotik tertentu. Sehingga *Penicillium* sp termasuk kapang endofit .

Adapun klasifikasi *Penicillium* sp. yaitu:

Kingdom : Fungi

Divisi : Ascomycota

Classis : Euecomycetes

Ordo : Hypomycetes

Familia : Trichocomaceae

Genus : *Penicillium*

Spesies : *Penicillium* sp. (Barnett dan Hanter, 1972).

c. *Chrysosporium* sp.

Pada hasil penelitian dengan ciri makroskopis warna permukaan Hijau tua, warna balik koloni hijau tua dengan pinggian putih tekstur *velvety* dan topografi *verrugose* tidak memiliki teteesan eksudat, lingkaran konsentri dan garis radial. Pada pengamatan mikroskopis bentuk konidia bulat, dengan hifa yang bersekat. Jamur *chrysosporium* sp. termasuk dalam kelompok jamur pelapuk putih dan merupakan jamur kelas Basidiomycetes yang juga menyerang holoselulosa, namun pilihan utamanya adalah lignin. Hal ini sesuai dengan teori (Barnett dan Hanter, 1972) ciri mikroskopis kapang *Chrysosporium* sp.

Chrysosporium sp. dapat mendegradasi lignin dan senyawa turunannya secara efektif dengan cara menghasilkan enzim peroksidasi ekstraseluler yang berupa Lignin Peroksidase (LiP) dan Mangan Peroksidase (MnP) *Chrysosporium* sp. adalah jamur pelapuk putih yang dikenal kemampuannya mendegradasi lignin (Sembiring, 2006).

(Laconi, 1998), menyebutkan bahwa fermentasi kulit buah kaka dengan *chrysosporium* sp. mampu menurunkan kandungan lignin sebesar 18,36%. Melihat kemampuan *Chrysosporium* sp. dalam menghasilkan enzim lignolitik dan selulolitik, kapang ini mampu menurunkan kandungan lignin dengan meningkatkan pertumbuhan kapang dan aktivitas enzim lignolitik.

1. Karakteristik *chryso sporium* sp.

chryso sporium sp. merupakan mikroorganisme bersel banyak, hidup secara aerobik, nonfotosintetik kemoheterotrof dan termasuk eukariotik. Mikroba ini menggunakan senyawa organik sebagai substrat dan bereproduksi secara aseksual dengan spora. Kebutuhan metabolisme mereka sama seperti bakteri, namun membutuhkan lebih sedikit nitrogen serta dapat tumbuh dan berkembang biak pada pH rendah (Dyah dan Adi, 2010).

Jamur *chryso sporium* sp. memiliki keadaan fisik yang berserabut seperti kapas dan berwarna putih serta memiliki spora dan talus bercabang yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa disebut miselium (Fardiaz, 1989). Miselium *chryso sporium* sp. mempunyai tiga fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif, seksual dan aseksual. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan dominan. Selama fase ini jamur paling banyak menghasilkan enzim ekstraselular. Tubuh buah jamur secara alami mulai terbentuk pada hari ke 18-20. Tubuh buah basah dan lembut, berwarna putih kekuningan (Cookson, 1995 dalam Satitiningrum, 1998). Filamen dari *chryso sporium* sp. lebih sering digunakan untuk penerapan dalam bidang bioteknologi daripada tahap sporanya (Wainwright, 1992 dalam Iriani 2003).

2. Kegunaan *chryso sporium* sp.

Penggunaan jamur *chryso sporium* sp. sebagai inokulum fermentasi sudah banyak dilakukan karena pertumbuhannya relatif mudah dan cepat, dan kadar asam nukleatnya rendah, sehingga *chryso sporium* sp dikatakan kapang endofit. (Scherllart, 1975 dalam Iriani, 2003).

Metode ligninolitik dari *chrysosporium* sp. dilakukan sebagai kultur jamur yang memasuki metabolisme sekunder dan mengakibatkan pertumbuhannya terhenti karena pengurangan beberapa hara seperti keterbatasan nitrogen, karbon atau sulfur, sehingga menyebabkan terjadinya proses degradasi lignin untuk mengatasi keterbatasan nitrogen.

adapun klasifikasi *Chrysosporium* sp. yaitu:

Kingdom	: Fungi
Divisi	: Ascomycota
Classis	: Basidiomycetes
ordo	: Aphylophorales
Familia	: Certiciaceae
Genus	: Chrysosporium
Spesies	: <i>Chrysosporium</i> sp. (Barnett dan Hanter, 1972).

1. *Trichoderma* sp.

Pada hasil penelitian dengan ciri makroskopis warna permukaan Putih abu-abu ditengah, warna balik koloni Kuning hijau dan ungu ditengah dengan pinggian putih tekstur *velvety* dan topografi *umbonat* memiliki teteesan eksudat, garis radial dan tidak memiliki lingkaran konsentri. Pada pengamatan mikroskopis bentuk konidia bulat, dengan hifa yang bersekat. Hal ini sesuai dengan teori (Barnett dan Hanter, 1972) ciri mikroskopis kapang. Koloni dari kapang *Trichoderma* sp. berwarna putih, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Dijelaskan lebih lanjut bahwa

kultur kapang *Trichoderma* sp. pada skala laboratorium berwarna hijau, hal ini disebabkan oleh adanya kumpulan konidia pada ujung hifa kapang tersebut.

a. Karakteristik *Trichoderma* sp.

Koloni dari kapang *Trichoderma* sp. berwarna putih, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kultur kapang *Trichoderma* sp. pada skala laboratorium berwarna hijau, hal ini disebabkan oleh adanya kumpulan konidia pada ujung hifa kapang tersebut. Susunan sel kapang *Trichoderma* sp. bersel banyak berderet membentuk benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa pada jamur ini berbentuk pipih, bersekat, dan bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut miselium. Miseliumnya dapat tumbuh dengan cepat dan dapat memproduksi berjuta-juta spora, karena sifatnya inilah *Trichoderma* sp. dikatakan memiliki daya kompetitif yang tinggi. Dalam pertumbuhannya, bagian permukaan akan terlihat putih bersih, dan bermiselium kusam. Setelah dewasa, miselium memiliki warna hijau kekuningan (Barnett dan hanter,1972).

Kapang ini memiliki bagian yang khas antara lain miselium bersepat, bercabang banyak, konidia spora bersepat dan cabang yang paling ujung berfungsi sebagai sterigma. Konidiofornya bercabang berbentuk verticillate. Pada bagian ujung konidiofornya tumbuh sel yang bentuknya menyerupai botol (*fialida*), sel ini dapat berbentuk tunggal maupun berkelompok. Konidiana berwarna hijau cerah bergerombol membentuk menjadi seperti bola dan berkas-berkas hifa terlihat menonjol jelas diantara konidia spora. *Trichoderma* berkembangbiak secara aseksual dengan membentuk spora di ujung fialida atau cabang dari hifa (Purwantisari, 2009).

b. Fisiologi *Trichoderma* sp.

Trichoderma sp. adalah salah satu jamur tanah yang tersebar luas (kosmopolitan), yang hampir dapat ditemui di lahan-lahan pertanian dan perkebunan. *Trichoderma* bersifat saprofit pada tanah, kayu, dan beberapa jenis bersifat parasit pada jamur lain. *Trichoderma* sp. merupakan jenis yang paling banyak dijumpai diantara genusnya dan mempunyai kelimpahan yang tinggi pada tanah dan bahan yang mengalami dekomposisi. Pada spesies saprofit, kapang tumbuh pada kisaran suhu optimal 22-30°C (Harjono, 2000).

Ditinjau dari sisi taksonomi dan ekologi, fungi ini merupakan organisme yang sangat heterogen. menggolongkan fungi endofit dalam kelompok Ascomycotina dan Deuteromycotina. Jamur yang tergolong dalam kelompok jamur endofit salah satunya *Trichoderma* sp merupakan jamur yang bersifat saproba obligat, yaitu organisme yang memanfaatkan sisa bahan organik dan tidak bersifat parasit bagi tanaman (Petrini et al.1992 dalam Worang, 2003). Jamur ini biasanya hidup dalam tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan sering dimanfaatkan sebagai agens pengendali patogen tular tanah (Abadi, 2003).

Menurut (Bentez, 2004), ada 10 potensi *Trichoderma* sp. sebagai agens hayati, yaitu fungistatis merupakan kemampuan suatu jamur untuk bertahan dari senyawa-senyawa racun yang disebabkan oleh senyawa kimia (fungisida), maupu yang dikeluarkan oleh tanaman maupun patogen, sehingga jamur antagonis ini tetap dapat berkembang di tanah. Kompetisi terhadap nutrisi. *Trichoderma* sp. memiliki kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi di tanah, dan memiliki kemampuan dalam

memanfaatkan unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan organisme lainnya. Kolonisasi di akar tanaman. *Trichoderma* sp. dapat mengkolonisasi akar sehingga dapat merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan daya tahan terhadap infeksi patogen. Sebagai pupuk hayati. Kolonisasi *Trichoderma* sp. di perakaran tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan akar, produksi panen, tahan terhadap stress lingkungan dan meningkatkan serapan unsur hara (Mukarlina, 2010).

c. Kemampuan *Trichoderma* sp.

Merangsang ketahanan tanaman dan mekanisme pertahanan terhadap serangan patogen. Penambahan *Trichoderma* sp. di rhizosfer, dapat melindungi tanaman dari serangan sejumlah kelas patogen, dengan menginduksi ketahanan mekanis yang mirip seperti reaksi hypersensitif, ketahanan sistemik, dan induksi ketahanan sistemik pada tanaman. Jamur *Trichoderma* sp. dapat menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat perkembangan pathogen (Prayudi, 1996).

Hampir seluruh jenis *Trichoderma* sp. dapat menghasilkan senyawa volatil yang dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme lain. Selain itu, *Trichoderma* sp. juga menghasilkan antibiotik lain, seperti, asam *harzianik*, *alamethicin*, *tricholin*, *peptaibols*, *viridin*, *glicoviridin*, *glicosoprenin*, dan asam *heptelitic*. Mikoparasitisme merupakan kemampuan suatu jamur untuk menyerang langsung pada jamur lainnya (Suharna, 1996).

Trichoderma sp. memiliki kemampuan untuk menyerang patogen secara langsung dengan cara memarasiti patogen tersebut. Produksi enzim yang dapat mendegradasi sel. *Trichoderma* sp. dapat menghasilkan beberapa jenis enzim, yaitu

Khitinase. Enzim berperan dalam mendegradasi khitin. Protease merupakan enzim yang dapat mendegradase protein pada dinding sel jamur lain. Enzim-enzim ini dapat berperan secara sinergis dalam menghambat pertumbuhan patogen tumbuhan.

Adapun Klasifikasi kapang *Trichoderma* sp. adalah sebagai berikut ini

Kingdom	: Fungi
Divisio	: Ascomycetes
Classis	: Deuteromycetes
Ordo	: Moniliales
Famila	: Moniliaceae
Genus	: <i>Trichoderma</i>
Species	: <i>Trichoderma</i> sp. (Barnett dan Hanter, 1972).

2. *Geotrichum candidum*

Pada hasil penelitian dengan ciri makroskopis warna permukaan Kuning pingiran putih, warna balik koloni kuning, tekstur *cattony* dan topografi *umbonat* memiliki teteesan eksudat, garis radial dan tidak memiliki lingkaran konsentri. Pada pengamatan mikroskopis dengan hifa tidak bersekat. Hal ini sesuai dengan teori (Barnett dan Hanter, 1972) ciri mikroskopis kapang *Geotrichum candidum*.

Pada penelitian isolasi jamur endofit asal tanaman mimba mununjukka bahwa *geotrichum* memiliki daya membunuh jamur lain, sehingga *geotrichum* yang ditemukan dari tanaman mimba tersebut dapat dikatakan jamur endofitt yang memiliki senyawa daya hambat tinggi.

Geotrichum candidum biasanya ditemukan di dalam tanah, air, udara, kotoran dan dapat ditemukan di tanaman, tekstil kertas, sereal, dan produk susu. Adapun klasifikasi *Geotrichum candidum* yaitu :

Kingdom	: Fungi
Divisi	: Amastigomycota
Classis	: Deuteromycetes
Ordo	: Moniliales
Familia	: Moniliaceae
Genus	: <i>Geotrichum</i>
Species	: <i>Geotrichum candidum</i> (Barnett dan Hanter, 1972).

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap jenis isolat kapang endofit tanaman kayu secang memiliki ciri khas morfologi yang berbeda-beda. Fungi endofit yang dihasilkan dari tumbuhan inang dapat menghasilkan jenis isolat yang berbeda-beda dan jumlah bervariasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyudi bahwa isolasi fungi endofit dari bagian tanaman yang berbeda dari satu tanaman inang ternyata mengandung jenis isolat yang berbeda pula.

Berdasarkan hasil penelitian isolasi kapang endofit pada tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) menunjukkan bahwa kapang endofit yang berhasil diisolasi dari eksplant batang ada 5 isolat sedangkan pada daun tidak ditemukan kapang endofit Menurut (Dompeipen, 2014), perbedaan jumlah hasil isolasi kapang endofit antara batang dan daun tanaman disebabkan karena adanya perbedaan kondisi pada saat isolasi dan asal sampel tumbuhan. Kondisi pada saat isolasi meliputi usia sample

tanaman yang akan dijadikan eksplant. Setiap bagian tanaman memiliki masa maksimal dalam menghasilkan senyawa metabolit sekunder, sehingga ketika bagian tanaman tersebut sedang menghasilkan metabolit sekunder secara maksimal maka semakin banyak jenis kapang yang dihasilkan.

Jaringan tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder secara maksimal ketika tanaman masuk pada fase generatif atau berbunga. Selain itu, tidak semua kapang dapat hidup disemua bagian tumbuhan. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian tanaman yang berbeda dari suatu tanaman inang dan habitat yang berbeda dapat menunjukkan jenis-jenis mikroba endofit dan senyawa kimia yang berbeda. (Dompeipen 2014).

2. Fermentasi dan ekstraksi

Setelah isolat murni diidentifikasi maka dilakukan fermentasi dimana tujuan Fermentasi dalam mikrobiologi industri digambarkan sebagai proses untuk mengubah bahan dasar menjadi produk yang dikehendaki dalam kultur mikroba tertentu atau proses yang dilakukan oleh mikroorganisme baik melalui proses aerobik ataupun anaerobik yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia spesifik dari suatu substrat organik dan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis.

Pemilihan medium sangat penting terhadap keberhasilan proses fermentasi karena medium menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan, energi, zat zat pembangun sel, dan substrat biosintesis selama fermentasi. Medium yang digunakan untuk menumbuhkan fungi mengandung sumber karbon (umumnya glukosa), sumber nitrogen (umumnya ammonia atau nitrat terkadang asam amino), fosfat, sulfat,

magnesium pottasium, dan unsur mikro seperti besi, mangan, zink, tembaga dan sebagai tambahan, terkadang juga ditambahkan bahan alam pada medium seperti air rendaman jagung, ekstrak khamir, jus buah-buahan dan protein terhidrolisa. Media yang digunakan pada penelitian ini yaitu media cair PDB (*Potato Dextrosa Broth*) dimana media terbuat dari bahan kentang, dextrose, ekstrak khamir dan CaCO_3 .

Medium PDB (*Potato Dextrosa Broth*) berdasarkan susunannya merupakan medium organik semi alamiah atau semi sintetis sebab terdiri dari bahan alamiah yang ditambah dengan senyawa kimia; berdasarkan konsistensinya merupakan medium cair karena tidak mengandung agar yang memadatkan medium; berdasarkan kegunaannya merupakan medium umum yang dapat digunakan untuk pertumbuhan jamur.

Medium PDB terdiri dari kentang yang berfungsi sebagai sumber energi, nitrogen organik, karbon dan vitamin, dekstrosa sebagai sumber karbon dan aquadest sebagai pelarut untuk menghomogenkan medium dan sumber O_2 . CaCO_3 juga dibutuhkan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi dan mineral untuk pertumbuhannya dalam memperoleh energi, pembentukan sel, dan biosintesis produk-produk metabolisme dan ekstrak khamir merupakan sumber yang amat kaya akan vitamin B, mengandung senyawa organik dan senyawa karbon, yang berfungsi untuk nutrisi kapang pada tahap fermentasi.

Fermentasi menggunakan shaker dengan rotasi 120 rpm selama 7-10 hari untuk mendapatkan hasil metabolisme kapang yang akan diekstrak. Setelah mendapatkan hasil fermentasi selanjutnya pemisahan bio massa dengan filtrate, dengan

menggunakan alat corong buchner bertujuan memisahkan endapan dari suatu campuran larutan yang tidak larut. Prinsip kerja dari corong Buchner adalah menyedot udara di ruang corong agar air dapat menetes dan menurun sedangkan serbuk zat yang tidak larut tetap didalam corongnya.

kemudian pemisaahan metabolisme sekunder yaitu dengan menggunakan corong pisah tujuannya yaitu untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Pemisahan dengan corong pisah hanya bisa digunakan untuk pemisahan cair dengan cair.

Ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan etil asetat sebagai pelartu. Etil asetat merupakan pelarut polar menengah yang volatil (mudah menguap). Pelarut etil asetat digunakan karena yang diinginkan adalah senyawa kimia yang larut dalam pelarut tersebut. Ekstraksi ini dimaksudkan agar senyawa dalam kapang endofit dari batang kayu secang diharapkan dapat terlarut dengan baik sesuai polaritasnya.

Filtrat yang dilarutkan menggunakan etil asetat dengan perbandingan 1 : 1 hingga terbentuk 2 lapisan, setelah itu dikocok dalam corong pisah sampai homogen. Dibiarkan hingga terbentuk 2 lapisan Masing-masing lapisan ditampung dalam wadah yang berbeda. selanjutnya lapisan atas yang merupakan filtrate supernatant yang akan menjadi metabolit kemudian dikeringkan. Hasil ekstraksi yaitu ekstrak yang akan diuji antioksidannya ditimbang menggunakan timbangan analitik. hasil

uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH dengan alat spektrofotometri sinar UV-vis

Uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan DPPH yaitu metode yang dilakukan berdasarkan reduksi pada 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) adalah radikal bebas yang stabil pada suhu ruangan dimana menghasilkan larutan berwarna ungu atau violet bila dilarutkan dalam metanol. Saat radikal bebas bereaksi dengan antioksidan, terjadi peredaman reaksi rantai dari radikal bebas dengan membentuk senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil yang berwarna kuning pucat. Serapan pada panjang gelombang 517 nm ditentukan setelah 30 menit inkubasi kemudian mengitung panjang gelombang dengan menggunakan spektrofotometri. Dan hasil perhitungan tersebut bisa dilihat pada table 4.4.

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis berdasarkan pengukuran absorbansi senyawa kimia terhadap radikal bebas energi tertentu dengan menggunakan sinyal monokromat. Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan serapan pada pengukuran didaerah ultraviolet dan cahaya tampak dari suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan cahaya monokromatik. Pelarut yang sering digunakan pada spektrofotometri UV-Vis adalah methanol, aquadest, ethanol dan kloroform.

3. Uji Aktivitas Antioksidan dengan menggunakan metode DPPH

uji antioksidan dilakukan dengan membuat larutan blangko yaitu DPPH dengan pelarut metanol digunakan sebagai pelarut dalam penelitian ini ini karena metanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan hampir semua senyawa organik,

baik polar maupun non polar dan metanol mempunyai titik didih rendah ($67,5^{\circ}\text{C}$) sehingga mudah diuapkan. Kemudian prinsip dari DPPH mudah bereaksi dengan cahaya dan oksigen, sehingga dapat mengalami degradasi. Untuk menghindari atau meminimalisir hal tersebut, maka larutan harus ditutup dengan aluminium foil dan disimpan ditempat yang gelap. Kemudian larutan yang ingin diuji terlebih dahulu di inkubasi pada suhu 30°C selama 30 menit tujuan inkubasi yaitu untuk mempercepat reaksi antara sampel yang bertindak sebagai antioksidan dan radikal DPPH.

Pengukuran nilai IC_{50} Vitamin C sebagai control positif dilakukan untuk membandingkan data aktivitas antioksidan dari ekstrak gabungan karena vitamin C sudah terbukti memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang sangat tinggi. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa Vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat aktif dengan nilai IC_{50} 3,509.

Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan yang sangat kuat apabila nilai IC_{50} kurang dari 50 ppm. Kuat apabila nilai IC_{50} 50-100 ppm, sedang apabila nilai IC_{50} 100-150 ppm, dan lemah bila IC_{50} antara 150-200 ppm., isolat 4 yaitu *Trichoderma* sp. merupakan antioksidan yang sangat kuat karena nilai IC_{50} 46,354 dan *Trichoderma* sp. dengan nilai IC_{50} 91,926 kuat, Sedangkan *chrysosporium*, *Penicillium* sp. dan *geotrichum candidum* antioksidan yang lemah karena melebihi dari IC_{50} 100-150.

Trichoderma sp. merupakan cendawan antagonis yang banyak terdapat di tanah dan digunakan untuk mengendalikan patogen tanah. *Trichoderma* sp.

mempunyai sifat mikroparasitik yaitu kemampuan untuk menjadi parasit cendawan lain. Sifat inilah yang dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis cendawan fitopatogen. *Trichoderma* sp. merupakan sejenis cendawan yang termasuk kelas *ascomycetes*, dan memiliki aktivitas antifugal yang tinggi. *Trichoderma* sp. dapat memproduksi enzim litik dan antibiotik antifugal. Selain itu *Trichoderma* sp. juga dapat berkompetisi dengan patogen dan dapat membantu pertumbuhan tanaman, serta memiliki kisaran penghambatan yang luas karena dapat menghambat berbagai jenis fungi (Gusnawaty, 2014).

Trichoderma sp. memproduksi metabolit seperti asam sitrat, etanol dan berbagai enzim seperti urease, selulase, glukonase dan kitinase. Hasil metabolit ini dipengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat dalam media. *Trichoderma viride* dapat memproduksi beberapa pigmen yang bervariasi pada media tertentu seperti pigmen ungu yang dihasilkan pada media yang mengandung amonium oksalat, dan pigmen jingga yang dihasilkan pada media yang mengandung gelatin atau glukosa, serta pigmen merah pada medium cair yang mengandung glisin dan urea. Saat berada pada kondisi yang kaya akan kitin, *Trichoderma viride* memproduksi protein kitinolitik dan enzim kitinase. Enzim ini berguna untuk meningkatkan efisiensi aktivitas biokontrol terhadap patogen yang mengandung kitin. (Gusnawaty, 2014).

Curvularia lunata dengan nilai IC_{50} 91,926 dinyatakan sebagai antioksidan yang kuat. Meskipun kapang endofit *Curvularia lunata* dilaporkan dapat bersifat saprofit hingga pathogen pada beberapa tanaman seperti padi jagung

dan bahkan ketela pohon Kapang *C. lunata* dapat merusak baik daun, akar maupun batang. (Erwahyuni,2011)

Patogenitas suatu fungi terhadap suatu tanaman dilaporkan memerlukan interaksi yang spesifik antara fungi dan tanaman inangnya. Beberapa senyawa seperti lemak, fenolik, protein, pati dan gula telah diteliti untuk mengetahui peran masing-masing dalam biosintesis mikotoksin. Diantara kelompok lemak oksilipin adalah senyawa yang banyak menarik perhatian dalam mempelajari mekanisme pathogenitas fungi pada tanaman. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa metabolisme lemak dan signal lemak memegang peranan yang penting dalam interaksi antara mikroba dan tanaman inangnya (Blée, 2002; Wang, 2004). Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jenis kapang *Curvularia lunata* memiliki senyawa aktif yang dihasilkan oleh kapang endofit *C. lunata* BioMCC FE-283 teridentifikasi sebagai 8-hydroxy 9-12-octadecadienoic acid (8-HODE) sehingga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Senyawa tersebut merupakan salah satu kelompok oksilipin yang dihasilkan oleh mikroba. Oksilipin di dalam fungi dilaporkan merupakan molekul pemberi tanda antar sel di dalam organisme (Erwahyuni,2011).

Ekstrak kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) hasil penapisan mengandung lima senyawa aktif yang terkait dengan flavonoid baik sebagai antioksidan primer maupun antioksidan sekunder (Safitri, 2002). Telah diketahui ternyata flavonoid yang terdapat dalam ekstrak kayu secang memiliki sejumlah kemampuan yaitu dapat

meredam atau menghambat pembentukan radikal bebas hidroksil, anion superoksida, radikal peroksil, radikal alkoksil, singlet oksigen, hidrogen peroksida (Miller, 2002).

Menurut Hariana (2006) kandungan kimia kayu secang salah satunya Brazilin. Brazilin adalah golongan senyawa yang memberi warna merah pada secang dengan struktur $C_6H_{14}O_5$ dalam bentuk kristal. Brazilin diduga mempunyai efek anti-inflamasi dan anti bakteri. Tanaman obat yang kaya akan kandungan kimianya sangat diminati Karena senyawa ini berfungsi dalam pertahanan tanaman mekanisme untuk melawan spesies oksigen reaktif (ROS) untuk mencegah kerusakan oleh mikroorganisme, Serangga, dan herbivora. Bahan tanaman yang memiliki Jumlah senyawa misalkan fenolat dan Brazilin yang signifikan semakin meningkat. Digunakan di industri makanan karena mereka memamerkan aktivitas antioksidan dengan menonaktifkan radikal bebas lipid Sehingga meningkatkan kualitas dan nilai gizi (Srujana, 2017).

*Inhibitor Concentration*₅₀ (IC₅₀) adalah konsentrasi efektif zat dalam sampel yang dapat menghambat 50 % absorbansi DPPH. Dimana semakin tinggi nilai IC₅₀ maka daya aktivitas antioksidan semakin kecil. Kecilnya daya aktivitas antioksidan pada kapang endofit asal kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) dibandingkan dengan vitamin C dikarenakan ekstrak etil asetat kapang endofit kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) masih merupakan campuran dari beberapa macam senyawa seperti alkaloid, saponin dan tanin sedangkan vitamin C merupakan senyawa sintetis murni yang poten sebagai antioksidan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil isolasi kapang endofit yang berhasil diidentifikasi diantaranya *curvularia lunata*, *Penicillium sp.* *Chrysosporium*, *Trichoderma sp.* *Geotrichum candidum*
2. Hasil uji antioksidan menunjukkan *Trichoderma sp.* antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} 46,354 dan *curvularia lunata* merupakan antioksidan yang kuat dengan nilai IC_{50} 91,926 Sedangkan *Chrysosporium* antioksidan yang lemah dengan IC_{50} 219,25, *Geotrichum candidum* 219,81. Dan *Pinicilium sp.* dengan IC_{50} 161, 60.

B. Saran

Diperluakan penelitian lebih lanjut tentang uji antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (*Casalpinia sappan* L.) untuk menguji senyawa yang terkandung didalam kapang endofit yang telah diidentifikasi

KEPUSTAKAAN

- Amit, Sharma. *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaaspur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- Anonim 1. *Medicinal Herb Index In Indonesia*. Indonesia: P.T Eisai Indonesia, 1995.
- Arnold, A.E., Z. Maynard, G. S. Gilbert. “Are Tropical Fungal Endophytes Hyperdiverse?”. *Ecology*. 3:267-274. 2000.
- Azevedo, J. L., Jr. Walter, M. Pereira, J.D. Araujo, W.L. De. “Endophytic Microorganism: a Review on Insect Control and Recent Advances on Tropical Plants”. *EJB. Electronic Journal Plant Biotechnology*. Vol. 3. 2000.
- Barnet, H.L. dan Hunter, B.B. *Illustrated genera of imperfect fungi (Third Edition)*. Minneapolis, Minnesota : Burgess Publisshing Company. 1972
- Bacon, C. W., W. Charles, J.F. White. *Microbial Endophytes*. Marcd Dekker Inc. New York. 2000.
- Baley, R. R., D. P. Caylor. *Microbiology Laboratory Manual*. Burgess Publishing Company. Minessota. 1977.
- Bills, G. F. “Isolation and Analysis of Endophytic Fungal Communities from Woody. Plants”. *World Mycologia Journal*. New York. Pp.31-65, 1996.
- Brock, J. D. *Biology Microorganism*. Prentisce Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1970.
- Brooks, G. F., J. S. Butel and S. F. Morse. *Medical Microbiology*. 2th edition. Mc. Graw Hill. New York, 2001.
- Brodhun F, Feussner I. *Oxylipins in fungi*. *FEBS J.* , 278, 1047-1063, 2011.
- Bills, G. F. “*Isolation and Analysis of Endophytic Fungal Communities from Woody Plants*”. New York: *World Mycologia Journal*Pp.31-65, 1996.

- Brodhun F, Feussner I. *Oxylipins in fungi*. *FEBS J.* , 278, 1047-1063. 201
- Bruehl, GW. *Soilborne Plant Pathogens*. Canada: Macmillan Publishing Company, 1987.
- Bentez, T. *Biocontrol mechanisms of Trichoderma Strains*. Publishing Company, 2004.
- Cronquist, A. *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, Columbia: University Press New York, 1981.
- Carroll, G. C. “*Fungal Endophytes in Stems and Leaves: From Latent Pathogen to Mutualistic Symbiont*”. *Ecology*. 62:2-9, 1988.
- Chu M, 1994 dalam amit *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaasapur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- De bary A. 1866 dalam Ami, *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaasapur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- Dompeipen, J. E., *Isolasi Kapang Endofit dari Tanaman Mengkudu (Morinda Citrifolia L) dan Potensinya sebagai Antidiabetes dan Antioksidan*. Ambon: Balai Riset dan Standardisasi Industri, 2014.
- Dini, *Isolasi Fungi Endofit Penghasil Senyawa Antioksidan Dari Tanaman Kleinhovia hospital Linn* , Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010.
- Gandjar, I., Samson, R.A., Vermulen, T.D.V.K., Oetari, A. & Santoso, I. *Pengenalan Kapang Tropik Umum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Graner G, Hamberg M, Meijer J. *Screening of oxylipins for control of oilseed rape (Brassica napus) fungal pathogens*. *Phytochem*. 63 : 89-95, 2003.
- Ediningsari, A. R. *Identifikasi Khamir*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2006.
- Fardiaz, S. *Fisiologi Fermentasi*. Lembaga sumber daya informasi – IPB. Bogor. 1988.
- Harman. *Trichoderma Species Opportunistic, a Virulent Plant Symbionts*. Nature Reviews Microbiology Vol 2, 2004.

- Hermani, Rahardjo, dan Mono. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*. Penebar swadaya. Jakarta. 2006.
- Halliwell, B, Gutteridge, J.M.C. *Free Radicals, Antioxidants and Human Disease*. Journal of Laboratory Clinical Medicine.. hal. 598-620. 1992.
- Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan, 1987.
- Hertiani, T., Palupi, S. I., Sanliferianti dan Nurwindasari, D. H. 2003. “*Uji In Vitro Potensi Antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigell dysenteriae, dan Candida albicans dari Beberapa tanaman Obat Tradisional untuk Penyakit infeksi*”. *Pharmacon*. 4(2): 89-95.
- Kementrian Agama, 2012
- Irawati, A. F. C. *Spesies Mikoriza Rhizoctonia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Kumalaningsih, S. *Antioksidan Alami Penangkal Radikal Bebas*. 1st Ed. Trubus Agrisana. Surabaya. hal. 11-12, 16. 3. 2006.
- Kristini dan Irawan. *Potensi Jamur Trichoderma sp. Sebagai Agen Pengendali Hayati Penyakit Tanaman*. Pasuruan: *Bulletin P3GI*, 2001.
- Lingham RB, 1993 dalam amit, *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaasapur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- LIPI, *Uji Aktivitas Isolat Bo.Ci.Cl.A3 Asal Tanaman Kunyit (Curcuma Longa Linn) dengan variasi karbon media fermentasi*, Bogor: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016
- Mukarlina, S. Khotimah dan R. Rianti. *Uji Antagonis Trichoderma harzianum Terhadap Fusarium spp. Penyebab Penyakit Layu pada Tanaman Cabai (Capsicum annum) Secara In Vitro*. *Jurnal Fitomedika*, 2010.
- Miller, M.J., Diplock, A.T. and Rice-Evan, C.A. *Evaluation of the total antioxidant activity as a marker of the deterioration of apple juice on storage*. *J. Agric. Food. Chem.* 43: 1794-1801, 1995.
- Nugroho, S.P. *Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca*. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 2000.

- Panda, H., *Herbal cosmetics hand book, Asia paasific business preaa*. new ddelhi, pp.525-526. 2002.
- Petrini, D., T. N. Sieber, T. Toti, and D. Viret.. “*Ecology Metabolite Production and Substrate Utilization in Endophytic Fungi*”. *Natural Toxin*. 1: 185-196. 1992.
- Pujianto. *Pemanfaatan Jasad Mikro Jamur Mikoriza dan Bakteri dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia*. Bogor: Tinjauan dari perspektif falsafah sainsProgram Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Purwanto, R. *Peranan Mikroorganisme Endofit Sebagai Penghasil Antibiotik*. 2008.
- Prihatiningtias, W., dan Wahyuningsih, M.S.H. Prospek Mikroba Endofit Sebagai Sumber Senyawa Bioaktif. *Majalah Ilmu Kefarmasian*, Vol. IV, No.2. 2007.
- Purwantisari S. *Isolasi dan identifikasi cendawan indigenous rhizosfer tanaman kentang dari lahan pertanian kentang organik di Desa Pakis*. Magelang. *Jurnal BIOMA*, 2009
 Purwantisari S. *Isolasi dan identifikasi cendawan indigenous rhizosfer tanaman kentang dari lahan pertanian kentang organik di Desa Pakis*. Magelang. *Jurnal BIOMA*, 2009
- Pratimasari, D. *Uji Aktivitas Penangkap Radikal Bebas Buah Carica papaya dengan Metode DPPH dan Penetapan Kadar Fenolik serta*.
- Proctor, P.H, Reynolds, E.S. Free Radicals and Disease in Man. *Physiol Chem Phys Med* 16. 1984.
- Prayudi, Bambang. *Keefektifan Trichoderma sp. Menekan Perkembangan Penyakit Hawar Pelepah Daun Padi dan Rebah Semai Kedelai di Lahan Pasang Surut*. *Jurnal Penelitian Pertanian*, 1996.
- Raflizar, Cornelis A, Sulistyowati T. *Dekok Daun Paliasa (Kleinhovia hospita Linn.) Sebagai Obat Radang Hati Akut*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran , 2006.
- Rajagopal, 2015 dalam amit *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaaspur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- Raflizar, Cornelis A, Sulistyowati T. *Dekok Daun Paliasa (Kleinhovia hospita Linn.) Sebagai Obat Radang Hati Akut*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran , 2006.
- Sangat, H.M. Zuhud, E.A.M. Damayanti, E.K. *Kamus Penyakit dan Tumbuhan obat Indonesia (Etnofitomedikal 1)*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2000.

- Strobel, GA dan B. Bioprospecting for Microbial Endophytes and Their Natural Product. *Microbiol. Molec. Biol. Rev.* 2003.
- Shinta, S., Toripah, Jemy, A., & Frenly, W. *Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Total Fenolik Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera Lam).* *Pharmacon J.* 3(4). 2009.
- Sashikumar, J.M., Maheshu, V., & Jayadev, R. *In Vitro Antioxidant Activity of Methanolic Extract of Berberia Tinctona Lesch Root and Root Bark.* *India Journal of Herbal Medicine and Toxicology*, 3(2), 53-58. 2009.
- Strobel, G.A. Natural Products from Endophytic Microorganism. *J.Nat.Prod.* 2004.
- Strobel GA, 2003 dalam amit *Diversity Of Endophytic Fungi In Triphala Trees Of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Chhattisgarh*, Universitas kota, Bilaaspur, India: ISSN 0975-6299, int J pharm Bio Sci 2017.
- Siegel, M. R., G. C. M. Latech, and M. C. Johnson. “*Fungal Endophytes of Grasses*”. *Ann. Rev. Phytopathology.* 25: 293-315. 1987.
- Simanjutak, P., R. Melliawati, A. Soeksmanto., T. Parwati dan Bustanussalam. “*Pengembangan Bahan Baku Zat Bioaktif Antimalaria dari Mikroba Endofit Tumbuhan Obat Indonesia*”. Laporan Teknik Penelitian Puslit Bioteknologi-LIPI. Cibinong-Bogor. 2002.
- Stierle, A., G. A. Strobel and D. Stierle. “*An Endophytic Gliocladium sp of Eurhythpha cordifolia Producing Selective Volatile Antimicrobial Compounds*”. *Plants Science.* 165: 913-922. 2003.
- Sudantha,M., Abadi, AL. *Identifikasi Jamur Endofit dan Mekanisme Antagonisnya Terhadap Jamur Fusarium axysporum f.sp vanillae pada Tanaman Vanilli.* *Agroteknos.* Vol.17 No.1. April 2007.
- Suciatmih. *Pengaruh Konsentrasi Antimikroorganisme, Media Fermentasi, Dan Waktu Inkubasi Terhadap Pertumbuhan Absidia Corymbifera (Cohn) Sacc. & Trotter Dari Jamur Endofit Fusarium nivale (Fr.) Ces.* Cibinong: Puslit Biologi-Lipi, 2010.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lantera Hati, 2009.
- Suharna dan Widyastutik. *Sifat Antagonistik Trichoderma sp. Terhadap Geotrichum candidum.* *Journal Mikrobiologi Tropika.* 1996.

- Susilowati, D. N., R. Saraswati, Elsanti dan E. Yuniarti. *Isolasi dan Seleksi Mikroba Diazotrof Endofitik dan Penghasil Zat Pemacu Tumbuh pada Tanaman Padi dan Jagung*. Bogor: Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian. 2009.
- Virmala, S., Adenan, M.I., Ahmad, A.R., dan Shahdan R. *Nature's Choice To Wellness. Antioxidan Vegetable/Ulam*. Forest Research Institut. Malaysia, Kuala Lumpur. 2003
- Van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N. (Eds.). *Plant Resources of south-East Asia No. 12(2), Medicinal And Poisonous plants 2*, backhyus publishers, Leiden, 1992.
- Widowati, Wahyu. *Uji Fitokimia dan Potensi Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.)* Vol.11 No.1 Juli 2011.
- Wilson, A. D., S. L. Clement, W. J. Kaiser, and D. E. Lester. "First Report of Clavicipitaceous Anamorphic Endophytes in *Hordeum* Species". *Plant Diseases*. 75:215. 1991.
- Wulandari, R.R. *Uji Aktivitas Penangkap Radikal DPPH Analog Kurkumin Siklik & N- Heterosiklik Monoketon*. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2009.
- Worang, R. L. *Fungi Endofit Sebagai Penghasil Antibiotika*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003.
- Yang, X., G. Strobel, A. Stierle, W. H. Hess, J. Lee, and J. Clardy. "A Fungal Endophyte Tree Relationship: *Phoma* sp in *Taxus wallanchiana*". *Plant Science*. 102: 1-9. 1994.
- Rahim, Abdul, *Uji Aktivitas Antioksidan dengan metode DPPH dan uji Terpenoid Terhadap Ekstrak ACHATHASTER*, Universitas Indonesia: Depok, 2012.
- Endang, Erwahyuni, *Isolasi Karakterisasi dan Optimasi Medium Produksi Senyawa Aktif Kapang Endofit untuk Menghambat Proliferasi Sel Kanker Payudara MCF-7 Secara In Vitro*, Insitut Pertania Bogor: Bogor, 2011
- Gusnawaty, Dkk, *karakterisasi morfologis trichoderma spp. indigenus sulawesi tenggara*. Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo: Kendari, 2014.

LAMPIRAN 1

Sampel	Berat kosong Vial (g)	Berat vial + ekstrak (g)	Bobot ekstrak(g)
<i>Curvularia lunata</i>	16,7917	16,8029	0,0112
<i>Pinicilium sp</i>	16,4971	16,4993	0,0022
<i>Chrysosporium</i>	16,7983	16,8049	0,0066
<i>Trichoderma sp.</i>	16,9209	16,9367	0,0158
<i>Geotrichum candidum</i>	16,8682	16,8757	0,0075

Lampiran Tabel 1. 1 hasil timbangan Ekstrak


Sampel (Konsentrasi Sampel (bpj))	Absorbansi
<i>Curvularia lunata</i> (5)	0,306
<i>Curvularia lunata</i> (10)	0,275
<i>Curvularia lunata</i> (25)	0,259
<i>Curvularia lunata</i> (50)	0,241
<i>Curvularia lunata</i> (100)	0,224
<i>Pinicilium sp.</i> (5)	0,235
<i>Pinicilium sp.</i> (10)	0,217
<i>Pinicilium sp.</i> (25)	0,227
<i>Pinicilium sp.</i> (50)	0,249
<i>Pinicilium sp.</i> (100)	0,215

<i>Chrysosporium</i> (5)	0,436
<i>Chrysosporium</i> (10)	0,425
<i>Chrysosporium</i> (25)	0,385
<i>Chrysosporium</i> (50)	0,363
<i>Chrysosporium</i> (100)	0,345
<i>Trichoderma</i> sp. (5)	0,396
<i>Trichoderma</i> sp. (10)	0,294
<i>Trichoderma</i> sp. (25)	0,210
<i>Trichoderma</i> sp. (50)	0,191
<i>Trichoderma</i> sp. (100)	0,118
<i>Geotrichum</i> (5)	0,323
<i>Geotrichum</i> (10)	0,302
<i>Geotrichum</i> (25)	0,292
<i>Geotrichum</i> (50)	0,285
<i>Geotrichum</i> (100)	0,275
Vitamin C (3)	0,389
Vitamin C (6)	0,332
Vitamin C (9)	0,265
Vitamin C (12)	0,069
Vitamin C (15)	0,065
Serapan Blangko = 0,444	

Lampiran Tabel 1.2 Nilai Absorbansi

Sampel	Absorbansi	% hambatan
<i>Curvularia lunata</i> (5)	0,306	31,0
<i>Curvularia lunata</i> (10)	0,275	38,0
<i>Curvularia lunata</i> (25)	0,259	41,6
<i>Curvularia lunata</i> (50)	0,241	45,7
<i>Curvularia lunata</i> (100)	0,224	49,5
Serapan Blangko = 0,444		


Lampiran Tabel 1.3 Nilai Absorbansi *Curvularia lunata*



Lampiran 1.1 kurva hambatan *Curvularia lunata*

Sampel	Absorbansi	% hambatan
<i>Penicillium</i> sp (5)	0,235	47,0 %
<i>Penicillium</i> sp (10)	0,217	51,1 %
<i>Penicillium</i> sp (25)	0,227	48,8%
<i>Penicillium</i> sp (50)	0,249	43,9%
<i>Penicillium</i> (100)	0, 215	51,5%
Serapan Blangko = 0,444		


Lampiran Tabel 1.4 Nilai Absorbansi *Penicillium* sp.



Lampiran 1.4 kurva hambatan *Penicillium* sp

Sampel	Absorbansi	% hambatan
<i>Chrysosporium</i> sp. (5)	0,436	1,8%
<i>Chrysosporium</i> sp. (10)	0,425	4,2 %
<i>Chrysosporium</i> sp. (25)	0,385	13,0%
<i>Chrysosporium</i> sp. (50)	0,363	18,2%
<i>Chrysosporium</i> sp. (100)	0,345	22,2%
Serapan Blangko = 0,444		


Lampiran Tabel 1.5 Nilai Absorbansi *Chrysosporium* sp.



Lampiran 1.5 kurva hambatan *Chrysosporium* sp.

Sampel	Absorbansi	% hambatan
<i>Trichoderma</i> sp (5)	0,396	10,8%%
<i>Trichoderma</i> sp (10)	0,294	33,7%
<i>Trichoderma</i> sp (25)	0,210	52,7%
<i>Trichoderma</i> sp (50)	0,191	56,9%
<i>Trichoderma</i> sp (100)	0,118	73,4%
Serapan Blangko = 0,444		


Lampiran Tabel 1.6 Nilai Absorbansi *Trichoderma* sp.



Lampiran 1. 6 kurva hambatan *Trichoderma viride*

Sampel	Absorbansi	% hambatan
<i>Geotrichum caandidum</i> (5)	0,323	27,2%
<i>Geotrichum caandidum</i> (10)	0,302	31,9%
<i>Geotrichum caandidum</i> (25)	0,292	34,2%
<i>Geotrichum caandidum</i> (50)	0,285	35,8%
<i>Geotrichum caandidum</i> (100)	0,275	38,0%
Serapan Blangko = 0,444		


Lampiran Tabel 1.7 Nilai Absorbansi *Geotrichum candidum*



Lampiran 1. 7 kurva hambatan *Geotrichum caandidum*

Konsentrasi Sampel (bpj)	Absorbansi (ppm)	% Hambatan
3	0,389	12,3%
6	0,332	25,2%
9	0,265	40,3%
12	0,069	84,4%
15	0,065	95,4%

Lampiran Tabel 1.8 Nilai Absorbansi Vitamin C



Lampiran 1.8 kurva hambatan Vitamin C

LAMPIRAN 2

1. Lampiran 2.1 perhitungan % hambatan untuk uji antioksidan menggunakan DPPH 0,4 mM

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{\text{serapan blangko} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan blangko}} \times 100 \%$$

$$\text{Serapan blangko} = 0,444$$

a) *Curvularia lunata*

1. *Curvularia lunata* (5)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,306}{0,444} \times 100 \% = 31,0 \%$$

2. *Curvularia lunata* (10)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,274}{0,444} \times 100 \% = 38,0 \%$$

3. *Curvularia lunata* (25)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,259}{0,444} \times 100 \% = 41,6 \%$$

4. *Curvularia lunata* (50)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,241}{0,444} \times 100 \% = 45,7 \%$$

5. *Curvularia lunata* (100)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,224}{0,444} \times 100 \% = 49,5 \%$$

b). *Penicilium* sp1. *Penicilium* sp (5)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,235}{0,444} \times 100 \% = 47,0 \%$$

2. *Penicilium* sp (10)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,217}{0,444} \times 100 \% = 51,1 \%$$

3. *Penicilium* sp (25)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,227}{0,444} \times 100 \% = 48,8 \%$$

4. *Penicilium* sp (50)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,249}{0,444} \times 100 \% = 43,9 \%$$

5. *Penicilium* sp (100)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,215}{0,444} \times 100 \% = 51,5 \%$$

c). *Chrysosporium* sp.1. *Chrysosporium* sp. (5)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,436}{0,444} \times 100 \% = 1,8 \%$$

2. *Chrysosporium* sp. (10)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,425}{0,444} \times 100 \% = 3,3\%$$

3. *Chrysosporium* sp. (25)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,386}{0,444} \times 100 \% = 13,0\%$$

4. *Chrysosporium* sp. (50)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,363}{0,444} \times 100 \% = 18,2\%$$

5. *Chrysosporium* sp. (100)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,345}{0,444} \times 100 \% = 22,2 \%$$

d). *Trichoderma* sp.

1. *Trichoderma* sp. (5)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,396}{0,444} \times 100 \% = 10,8 \%$$

2. *Trichoderma* sp. (10)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,294}{0,444} \times 100 \% = 33,7\%$$

3. *Trichoderma* sp. (25)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,210}{0,444} \times 100 \% = 52,7\%$$

4. *Trichoderma* sp. (50)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,191}{0,444} \times 100 \% = 56,9\%$$

5. *Trichoderma* sp. (100)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444-0,118}{0,444} \times 100 \% = 73,4 \%$$

e). *Geotrichum caandidum*1. *Geotrichum caandidum* (5)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,323}{0,444} \times 100 \% = 27,2 \%$$

2. *Geotrichum caandidum* (10)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,302}{0,444} \times 100 \% = 31,9 \%$$

3. *Geotrichum caandidum* (25)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,292}{0,444} \times 100 \% = 34,2 \%$$

4. *Geotrichum caandidum* (50)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,285}{0,444} \times 100 \% = 35,8 \%$$

5. *Geotrichum caandidum* (100)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,275}{0,444} \times 100 \% = 38,0 \%$$

a). Vitamin C (3)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,245}{0,444} \times 100 \% = 44,8 \%$$

b). Vitamin C (6)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,170}{0,444} \times 100 \% = 61,7 \%$$

c). Vitamin C (9)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,059}{0,444} \times 100 \% = 86,7 \%$$

d). Vitamin C (12)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,028}{0,444} \times 100 \% = 93,6 \%$$

e). Vitamin C (15)

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,021}{0,444} \times 100 \% = 95,2 \%$$

2. Lampiran 2.2 perhitungan kurva hambatan (IC₅₀)

Dengan konsentrasi (bpj) sebagai sumbu x dan % hambatan sebagai y

Maka diperoleh persamaan garis :

$$y = ax + b$$

$$X = \frac{(50-b)}{a}$$

1. *Curvularia lunata*

$$R^2 = 0,7978$$

$$50 = 0,1641x + 34,924$$

$$X = \frac{50-34,924}{0,1641} = 91,9$$

2. *Penicilium sp*

$$R^2 = 0,0279$$

$$50 = 0,0131X + 47,883$$

$$X = \frac{50-47,883}{0,0131} = 161,60$$

3. *Chrysosporium* sp

$$R^2 = 0,834$$

$$50 = 0,2113X + 3,6715$$

$$X = \frac{50-3,6715}{0,2113} = 219,2$$

4. *Trichoderma viride*

$$R^2 = 0,7597$$

$$50 = 0,5387X + 25,029$$

$$X = \frac{50-25,029}{0,5387} = 46,3$$

5. *Geotrichum caandidum*

$$R^2 = 0,7356$$

$$50 = 0,0912X + 29,953$$

$$X = \frac{50-29,953}{0,0912} = 219,8$$

6. Vitamin C

$$R^2 = 0,8939$$

$$y = 4,4233x + 36,59$$

$$50 = 4,4233x + 36,59$$

$$x = \frac{50 - 36,59}{4,4233} = 3,03 \text{ bpj}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

3. Lampiran 2.3 konversi bahan pembuatan media

- a. Pembuatan Media PDA (*Potato Dextrosa Agara*) 150 ml

Komposisi :

Diketahui takaran pembuatan untuk 1000 ml PDA

Kentang 1 Liter : 200 g Agar 1 Liter : 15 g

Dextrose 1 Liter : 15 g aquadest 1 Liter : 1000 ml

Ditanyakan pembuatan larutan PDA 150 ml ?

$$\text{Kentang} : \frac{200}{1000} \times 150 = 30 \text{ g}$$

$$\text{Dextrose} : \frac{15}{1000} \times 150 = 2,25 \text{ g}$$

$$\text{Agar} : \frac{15}{1000} \times 150 = 2,25 \text{ g}$$

- b. Pembuatan media PDB

Diketahui : PDB (*Potato Dextrose Borth*) 1 Liter

Dextrose : 24 g Kentang 1 Liter : 200 g

CaCo₃ : 5 g Aquadest : 1000 ml

Ditanyakan pembuatan larutan PDB 500 ml ?

$$\text{Dextrose} : \frac{24}{1000} \times 500 = 12 \text{ g}$$

$$\text{CaCo}_3 : \frac{5}{1000} \times 500 = 2,5 \text{ g}$$

$$\text{Kentang} : \frac{200}{1000} \times 500 = 100 \text{ g}$$

c. Perhitungan larutan DPPH 0,4 mM

Diketahui:

$$\text{Larutan DPPH} = 0,4 \text{ mM} = 0,0004 \text{ mol/L}$$

$$\text{Mr} = 394,33 \text{ g/mol}$$

$$\text{Volume} = 50 \text{ ml}$$

$$\text{Massa} = \text{gram ?}$$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} 0,4 \text{ mM} &= \frac{\text{Massa}}{\text{Mr} \times V} \\ 0,0004 \text{ mol/L} &= \frac{\text{Massa}}{394,33 \frac{\text{g}}{\text{Mol}} \times 0,05 \text{ L}} \\ &= 0,0079 \text{ g} \end{aligned}$$

d. Perhitungan larutan uji

Diketahui : 10 ml Metanol

$$10 \text{ mg} (10 \times 1000) = 10000 \text{ } \mu\text{l}$$

$$\text{bpj} = \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{10000 \mu\text{l}}{10 \text{ ml}} = 1000 \text{ bpj}$$

ket : V_1 = Volume larutan stok yang yang dibutuhkan V_2 = Volume air yang diinginkan N_1 = konsentrasi larutan stok N_2 = konsentrasi yang diinginkan

$$\begin{aligned} \text{Untuk 5 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 5 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{25 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,025 \text{ mL} = 25 \mu\text{L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 10 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 10 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{50 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,005 \text{ mL} = 50 \mu\text{L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 25 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 25 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{125 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,125 \text{ mL} = 125 \mu\text{L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 50 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 50 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{250 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,25 \text{ mL} = 250 \mu\text{L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 100 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 100 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{500 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,5 \text{ mL} = 500 \mu\text{L} \end{aligned}$$

e. Perhitungan larutan Vitamin C

Diketahui:

$$10 \text{ mg} (10 \times 1000) = 10000 \mu\text{L}$$

10 ml metanol

$$\text{Bpj} \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{10000}{10} = 1000 \text{ bpj.}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 3 bpj} &\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ bpj} &= 5 \text{ ml} \times 3 \text{ bpj} \\ V_1 &= \frac{15 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ ml}} = 0,015 \text{ mL} = 15 \mu\text{L} \end{aligned}$$


Untuk 6 bpj $\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 6 \text{ bpj}$
 $V_1 = \frac{30 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ ml}} = 0,03 \text{ mL} = 30 \mu\text{L}$


Untuk 9 bpj $\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 9 \text{ bpj}$
 $V_1 = \frac{45 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ ml}} = 0,045 \text{ mL} = 45 \mu\text{L}$

Untuk 12 bpj $\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 12 \text{ bpj}$
 $V_1 = \frac{60 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ ml}} = 0,06 \text{ mL} = 60 \mu\text{L}$

Untuk 15 bpj $\longrightarrow V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$
 $V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 15 \text{ bpj}$
 $V_1 = \frac{75 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ ml}} = 0,075 \text{ mL} = 75 \mu\text{L}$

4. Lampiran 2.44 Skema penelitian






Diuji aktivitas antioksidan dengan Metode DPPH 0,4 mM

Menggunakan spektrofotometri untuk menghitung absorbansi sampel

LAMPIRAN 3



L. Gambar 3.4 Isolasi dan penanaman sampel



L. Gambar 3.5 Inkubasi dan pemurnian



L. Gambar 3.6 Identifikasi kapang endofit







Hot Plate




Oven



Autoklaf



Neraca Analitik



Water Bath



Mikropipet



Laminar Air Flow



Mikroskop



Corong pisah



Buchner



Shaker



Spektropotometer UV-vis

L. Gambar 4.11 Alat yang digunakan

Riwayat Hidup



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Nama Siti Latifa Wulandari tapi teman-teman biasa memanggilku wulan. Saya lahir di pinrang pada tanggal 08-12-1995. Saya adalah anak pertama dari empat bersaudara. Saya mempunyai tiga adik, satu adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Saya mempunyai bapak bernama Suleman dan ibu bernama Mulyati. Saya masuk SD berumur 6 tahun, di SD 164 Mattiro Sompe. Dan saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 3 MATTIRO SOMPE selama 3 tahun dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 1 MATTIRO BULU. Saya sangat bahagia setelah melihat pengumuman di internet di situs UIN, bahwa saya lulus di jalur SBMPT-Prestasi dengan jurusan biologi, dan sekarang saya tinggal di kabupaten GOWA sementara waktu untuk melaksanakan studi, pernah tercatat sebagai Asisten Mikrobiologi Umum dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi. Motto hidup, (Hidup adalah belajar yang tak ada habisnya.)

Wassalamu Alaikum Wr.Wb