


**ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA
HATI, DAGING DAN KULIT IKAN BARONANG DI PULAU
LAE-LAE**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sains
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HARDINAWATI
NIM.60300113005

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardinawati
NIM : 60300113005
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 30 Juni 1994
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. H. Muh. Yasin Limpo
Judul : Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Hati, Daging dan Kulit Ikan Baronang Tompel (*Siganus guttatus*) Di Pulau Lae-lae.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sepenuhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan menduplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2017

Penyusun,

Hardinawati
NIM: 60300113005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudari **Hardinawati**, NIM: 60300113005, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama Skripsi berjudul, “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Hati, Daging dan Kulit Ikan Baronang Tompel (*Siganus guttatus*) di Pulau Lae-lae”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Makassar, 18 Agustus 2017



Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd

Pembimbing II



Fatmawati Nur, S.Si., M.Si

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Hati, Daging dan Kulit Ikan Baronang Tompel (*Siganus guttatus*) Di Pulau Lae-lae” yang disusun oleh Hardinawati, NIM: 60300113005, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 18 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2017 M
25 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy I : St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes. (.....)

Munaqisy II : Hasyimuddin, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy III : Dr. Sohra, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Kandungan Logam Berat (Pb) Pada Hati, Daging dan Kulit Ikan Baronang Tompel (*Siganus guttatus*)”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar . Salam serta shalawat tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Baco Dg. Maling dan Ibunda tercinta Isa Dg. Sakking, serta saudaraku selalu memberi Do'a, semangat, dukungan dan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang lulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi .

3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si.,M.Kes, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan ibu Baiq Fahratul Wahidah, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Fatmawati Nur, S.Si., M.Si, dan ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd, selaku pembimbing I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbimngannya selama penyusunan Skripsi.
5. Ibu St. Aisyah S, S.Pd.,M.Kes. bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si dan ibu Dr. Sohra, M.Ag, selaku penguji I, II dan III. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf jurusan, staf akademik, terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Laboratorium Riset dan Laboratorium An Organik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membimbing dan membantu penulis selama penelitian.
8. Teman-teman seperjuanganku, Hajjah, Idha, Yul dan Mila. Terima kasih atas bantuan do'a dan semangat yang kalian berikan.
9. Terkhusus buat kakak Rusdy Effendi Thamrin yang selama ini telah membantuku selama masa perkuliahan terima kasih banyak atas do'a nya serta bantuan dan dukungannya.

10. Buat seluruh keluarga besar Biologi, terkhusus Angkatan 2013 “BRACHIALIS” yang telah bersama-sama menjalani metamorfosis. Terimakasih untuk semangat dan do’a serta setiap moment terbaik yang telah kalian berikan.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati, segala bentuk koreksi, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat menjadi bahan acuan mahasiswa Biologi, serta bagi pemerintah dan masyarakat.

Makassar,

Penulis

Hardinawati
NIM. 60300113005


DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ILUSTRASI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ASBSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-10
A.....	Latar
Belakang.....	1
B.....	Rumusa
n Masalah.....	6
C.....	Ruang
Lingkup Penelitian.....	6
D.....	Kajian
Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	6

E.....	Tujuan	
Penelitian.....		10
F.....	Kegunaan	
n Penelitian.....		10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....		12-40
A.....	Ayat	
Yang Relevan.....		12
B.....	Tinjauan	
Umum Logam Berat		14
C.....	Tinjauan	
Umum Timbal.....		16
D.....	Karakter	
istik Timbal.....		20
E.....	Tingkat	
Pencemaran Timbal (Pb).....		21
F.....	Toksisitas	
s Timbal (Pb).....		23
G.....	Tinjauan	
Umum Spektrofometri Serapan Atom (SSA).....		27
H.....	Tinjauan	
Umum Ikan BaronangTompel (<i>Siganus gutattus</i>).....		29

I.....	Tinjauan	
Umum Pulau Lae-lae.....		37
J.....	Kerangk	
a Pikir.....		40
BAB III METEODOLOGI PENELITIAN.....		41-45
A.....	Jenis dan	
Lokasi Penelitian.....		41
B.....	Pendekat	
an Penelitian.....		41
C.....	Populasi	
dan Sampel.....		41
D.....	Variabel	
Penelitian		42
E.....	Defenisi	
Operasional Variabel.....		42
F.....	Metode	
Pengumpulan Data.....		42
G.....	Instrume	
n Penelitian (Alat dan Bahan).....		43
H.....	Prosedur	
Kerja.....		43

I.....	Teknik	
Pengolahan dan Analisis Data.....		45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47-50
A.....	Hasil	
Penelitian.....		47
B.....	Pembaha	
san.....		50
BAB V PENUTUP		57-58
A.....	Kesimpu	
lan		57
B.....	Saran	
.....		57
KEPUSTAKAAN.....		59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batasan kadar logam berat Pb pada ikan dan hasil olahannya.....	20
Tabel 4.1 Kadar logam berat timbal (Pb) pada stasiun I (Sebelah Timur) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae	46
Tabel 4.2 Kadar logam berat timbal (Pb) pada stasiun II (Sebelah Barat) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae	47
Tabel 4.3 Rata-rata kadar logam berat timbal (Pb) pada stasiun I dan stasiun II pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae.....	49




DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1 Logam berat timbal.....	17
Gambar 2.3 Morfologi ikan Baronang (<i>Siganus guttatus</i>).....	31
Gambar 2.2 Anatomi ikan Baronang (<i>Siganus guttatus</i>).....	33
Gambar 2.4 Pulau Lae-lae.....	38
Gambar 2.5 Peta Pulau Lae-lae.....	39
Gambar 4.1 Diagram batang kadar logam berat timbal (Pb) pada stasiun I pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae.....	47
Gambar 4.2 Diagram batang kadar logam berat timbal (Pb) pada stasiun II hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae.....	48
Gambar 4.3 Diagram batang rata-rata kadar logam berat timbal (Pb) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (<i>Siganus guttatus</i>) di pulau Lae-lae.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi pengambilan sampel.....	64
Lampiran 2 Diagram alir metode penelitian.....	65
Lampiran 3 Perhitungan.....	66
Lampiran 4 Observasi pulau Lae-lae sebagai tempat pengambilan sampel.....	68
Lampiran 5 Pengambilan sampel.....	69
Lampiran 6 Tahap dekstruksi.....	71
Lampiran 7 Tahap pengujian SSA.....	74



ABSTRAK

Nama : Hardinawati

Nim : 60300113005

Judul Skripsi : “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Hati, Daging dan Kulit Ikan Baronang (*Siganus gutattus*) Di Pulau Lae-lae”.

Pulau Lae-lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kota Makassar. Secara Geografis pulau Lae-lae terletak di Perairan Selat Makassar. Timbal (Pb) merupakan logam berat yang berpotensi menjadi bahan toksik jika terakumulasi ke dalam tubuh organisme yang berada diperairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam timbal pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) di pulau Lae-lae. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling purposif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kandungan logam berat timbal (Pb) paling tinggi yang terletak pada stasiun I (Sebelah Timur) dan stasiun II (Sebelah Barat) yaitu pada organ kulit yaitu 3,511mg/kg dan 3,630 mg/kg. Kandungan logam berat timbal (Pb) terendah terletak pada organ daging yaitu 2,486 mg/kg dan 3,012 mg/kg. Berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB) pada ikan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 2,0 mg/kg, maka ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) di pulau Lae-lae sudah termasuk ke dalam kategori tercemar logam berat timbal (Pb) dan tidak layak konsumsi.

Kata kunci: Timbal (Pb), Pulau Lae-lae, SSA

ABSTRACT

Name : Hardinawati
Student ID Number : 60300113005
Title : Analysis Of Lead Weight Metal (Pb) Content In Liver, Meat And Skin Of Baronang Tompel Fish (*Siganus gutattus*)

. Lae-lae Island is one of the islands in the cluster of islands or Spermonde Islands, South Sulawesi. Administratively included into the area of Makassar City. Geographically Lae-lae island is located in Makassar Strait Waters. Lead (Pb) is a heavy metal that has the potential to become toxic material if it accumulates into the body of the organism in the water. This study aims to determine the level of lead metal in liver, meat and skin of Baronang tompel fish (*Siganus gutattus*) on Lae-lae island. The method used in this research is purposive sampling. The results showed that the highest concentration of lead metal (Pb) located at station I (East) and station II (West side) were 3,511 mg/kg and 3,630 mg/kg in the skin organ and the lowest heavy metal (Pb) content was in meat organ 2,486 mg/kg and 3,012 mg/kg. Based on the Boundary Threshold (NAB) value of fish defined by the Indonesian National Standard (SNI) of 2.0 mg / kg, the Baronang tompel (*Siganus gutattus*) on Lae-lae Island is included in the polluted category of heavy metal lead (Pb) And not worth consuming.

Keywords: Lead (Pb), Lae-lae Island, SSA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Salah satu nikmat ciptaan Allah swt. adalah logam berat timbal meskipun memiliki respon negatif namun disisi lain logam ini sa ngatlah bermanfaat dibidang industri pabrik. Allah swt. berfirman dalam QS Ali Imran/3:191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN



MAKASSAR

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka." (Kementerian Agama R.I., 2012).

Makna dari QS Ali Imran/3:191 yaitu menjelaskan sebagian dari ciri-ciri orang yang dinamai Ulul Albab. Mereka adalah orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah dengan ucapan atau dengan hati, dan

dalam seluruh situasi dan kondisi, saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring atau bagaimanapun, dan mereka memikirkan tentang penciptaan yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi, dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan, maha suci engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Shihab, 2010).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya termasuk biotik dan abiotik yang berada dalam laut dan darat dan tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia seperti halnya logam berat dimana, seperti diketahui logam berat timbal ini sangat berbahaya terhadap kesehatan meskipun memiliki sisi negatif namun disisi lain logam ini sangat bermanfaat dalam bidang industri seperti kabel, cat dan anti letup pada bensin. Akan tetapi akan berdampak buruk jika tidak sesuai dengan peruntukannya, apabila sisi negatifnya ini terdapat pada tubuh ikan maka secara tidak langsung akan berdampak pada kesehatan. Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) merupakan lauk pauk yang sering dikonsumsi maka penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kadar logam yang terdapat pada ikan apakah masih aman dikonsumsi atau tidak.

Sekitar 97,2% dari air yang ada di bumi ini adalah air laut. Seperti air tawar, air laut juga mempunyai kemampuan yang besar untuk melarutkan berbagai zat, baik yang berupa gas, cairan maupun padatan. Salah satu zat terlarut yang terdapat dalam

air laut adalah logam berat. Unsur atau senyawa logam berat ini dapat masuk ke tubuh organisme yang hidup di perairan laut (Hutagalung, 1984).

Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui berbagai perantara, seperti udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasi. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia (Sofyan, 1979).

Menurut Palar (1994) logam berat merupakan bahan kimia golongan logam yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh, di mana jika masuk ke dalam tubuh organisme hidup dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan efek negatif terhadap fungsi fisiologis tubuh. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah kecil akan berakumulasi di dalam tubuh, sehingga pada suatu saat juga dapat menimbulkan efek negatif dan gangguan kesehatan.

Logam-logam berat yang berbahaya yang sering mencemari lingkungan antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), khromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam berat tersebut diketahui dapat terakumulasi di dalam tubuh suatu mikroorganisme dan tetap tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun (Darmono, 1995).

Logam berat secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan manusia seperti timbal (Pb) dapat mengakibatkan penghambatan sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia, terganggunya sistem

syaraf pusat dan tepi, sistem ginjal, sistem reproduksi, idiot pada anak-anak, sawan (*epilepsi*), cacat rangka dan merusak sel-sel somatik. Walaupun jumlah timbal (Pb) yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-senyawa timbal (Pb) dapat memberikan efek racun terhadap banyak organ yang terdapat dalam tubuh (Palar, 1994).

Timbal (Pb) mempunyai arti penting dalam dunia kesehatan bukan karena penggunaan terapinya, melainkan lebih disebabkan karena sifat toksisitasnya. Absorpsi timbal di dalam tubuh sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi dan menjadi dasar keracunan yang progresif. Keracunan timbal ini menyebabkan kadar timbal yang tinggi dalam *aorta*, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, tulang, limpa, testis, jantung dan otak. Hal ini diperoleh dari kasus yang terjadi di Amerika pada 9 kota besar yang pernah diteliti (Ruman, 2010).

Darmono (1995) mengungkapkan, toksisitas logam pada manusia yang dapat menyebabkan terutama timbulnya kerusakan jaringan, terutama jaringan detoksifikasi dan ekskresi (hati dan ginjal). Beberapa logam mempunyai sifat karsinogenik (pembentuk kanker), maupun teratogenik (salah bentuk organ). Telah diketahui bahwa pada anak-anak, timbal ini bisa merusak sistem syaraf sentral, sedangkan pada orang dewasa dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Timbal (Pb) terbukti bisa menyebabkan turunnya tingkat kecerdasan anak, anemia, kerusakan pada ginjal dan bayi lahir cacat.

Pulau Lae-lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Secara administratif termasuk ke dalam

wilayah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-lae, dengan luas aratan pulau 8,9 hektar. Dalam penelitian Hamazah dkk (2015) berdasarkan peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, tentang baku mutu akumulasi logam Pb pada perairan ditetapkan yaitu 0,008 ppm. Dengan berdasarkan pada standar baku mutu timbal di perairan tersebut, maka perairan pulau Lae-lae tergolong telah tercemar berat logam timbal (0,556 – 0,609 ppm).

Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) dapat dikenal dengan mudah karena bentuknya yang khas, yaitu kepalanya berbentuk seperti kelinci, sehingga ikan ini disebut juga *rabbitfish* dan termasuk kedalam ikan herbivora. Ikan sebagai salah satu biota laut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat sebagai indikator terjadinya suatu pencemaran dalam lingkungan. Kandungan logam berat dalam ikan erat kaitannya dengan pembuangan limbah industri di sekitar tempat hidup ikan tersebut, seperti sungai, danau dan laut. Banyaknya logam berat yang terserap dan terdistribusi pada ikan bergantung pada bentuk senyawa dan konsentrasi polutan, aktivitas mikroorganisme, tekstur sedimen, serta jenis dan unsur ikan yang hidup di lingkungan tersebut (Adnan, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian untuk analisis kadar logam berat timbal (Pb) pada ikan yang telah diambil dipulau Lae-lae.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keberadaan kadar logam berat timbal (Pb) yang terkandung pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) didapatkan dari pulau Lae-lae pada dua stasiun yaitu stasiun I sebelah timur pulau Lae-lae dan pada stasiun II sebelah barat pulau Lae-lae.
2. Uji kadar logam berat timbal (Pb) yang digunakan adalah hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).
3. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret – 19 April 2017 di laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

1. Hamazah (2015), melakukan penelitian Analisis kandungan logam timbal (Pb) pada *Caulerpa racemosa* (Forsskal) J. Agardh dari perairan pulau Lae-lae Makassar dan Laikang Kabupaten Takalar dengan metode Spektrofotometri serapan Atom (SSA). Hasilnya menunjukkan konsentrasi logam timbal (Pb) pada

algae jenis *Caulerpa racemosa* di perairan pulau Lae-lae dan Laikang masih sangat rendah. Sedangkan konsentrasi logam timbal (Pb) pada perairan Lae-lae dan Laikang telah melewati standar baku mutu perairan peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, tentang baku mutu akumulasi logam Pb pada perairan ditetapkan yaitu 0,008 ppm. Konsentrasi timbal (Pb) pada perairan Lae-lae ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi Pb di perairan Laikang pada periode sampling bulan Desember 2014.

2. Zulfikar (2003), melakukan penelitian tentang kandungan timbal (Pb) pada air laut dan ikan Baronang (*Siganus spinus*) diperairan pesisir dikota makassar dengan metode Spektrofotometri serapan Atom (SSA). Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan standar kualitas air menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 dan untuk ikan yaitu berdasarkan BPOM RI nomor HK.00.06.1.52.4011. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi timbal pada air laut di Kelurahan Barombong, yaitu 0,516mg/L dan di Kelurahan Tallo sebesar 0,395 mg/L. Konsentrasi timbal pada ikan Baronang di perairan pesisir laut di Kelurahan Barombong berkisar 1,023–1,761 mg/Kg dan Kelurahan Tallo berkisar 0,967–1,754 mg/Kg. Penelitian menyimpulkan kandungan timbal pada sebagian air laut di Barombong dan Tallo tidak memenuhi syarat karena telah melebihi standar dengan nilai 0,05 mg/L. Kadar timbal pada ikan Baronang semuanya tidak memenuhi syarat karena telah melebihi standar yaitu, 0,3 ppm.
3. Isnania (2010), melakukan penelitian tentang Analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan Bandeng (*Channos channos*) dipertambahan Kecamatan

Pangkajene dengan metode SSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan bandeng yang diperoleh pada daerah pertambakan terdeteksi mengandung logam berat timbal (Pb). Masing-masing pada ginjal 0.540 ppm, pada hati 0.399 ppm, pada usus 0.303 ppm sedangkan pada otot 0.540 ppm. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan timbal (Pb) pada ikan bandeng di pertambakan kecamatan Pangkajene masih dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh Dirjen POM No. 03725/B/SK/VI/89 senilai 2 ppm.

4. Supriadi (2005), melakukan penelitian tentang Analisis Pb dalam beberapa jenis ikan perairan Suppa Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan logam Pb pada ikan Kerapu Sunu (*Plectroponus maculatus*) 0,0398 mg/kg, Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*) 4,0772 mg/kg, ikan Buntal (*diodin holocanthus*) 2,6717 mg/kg, Baronang (*Siganus sp*) 3,7714 mg/kg, Ekor Kuning (*Caesio curing*) 2,6476 mg/kg, Bandeng (*Chanos chanos*) 45,1152 mg/kg.
5. Yulaipi dan Aunurohim (2013), melakukan penelitian tentang Bioakumulasi logam berat timbal (Pb) dan hubungannya dengan laju pertumbuhan ikan Mujair (*Oreochromis mossambicus*). Penelitian ini meliputi uji pendahuluan penentuan konsentrasi PbCl₂, persiapan ikan uji, uji AAS (*Atomic Absorbtion Spectrophotometry*). Hasil uji pendahuluan penentuan konsentrasi PbCl₂ diperoleh nilai LC₅₀ 96 jam sebesar 313,232 mg/L. Variasi konsentrasi yang digunakan adalah 0%, 2,5%, 5% dan 10% dari LC₅₀ 96 jam. Konsentrasi timbal (Pb) dan hari paparan mempengaruhi konsentrasi timbal (Pb) pada daging ikan

dengan nilai p pada uji ANOVA two – way adalah 0,000 dan konsentrasi yang paling berpengaruh adalah konsentrasi 10% LC₅₀ 96 jam pada hari paparan ke 30. Terkait laju pertumbuhan ikan semakin besar konsentrasi yang digunakan dan semakin lama paparan timbal, maka laju pertumbuhan (laju pertumbuhan spesifik dan laju pertumbuhan panjang harian) menurun, sedangkan setelah dilakukan uji ANOVA one-way menurunnya laju pertumbuhan spesifik dan laju pertumbuhan panjang harian ternyata tidak dipengaruhi oleh kandungan logam berat timbal (Pb) yang ada di dalam daging ikan. Hal ini dapat diketahui dari nilai p uji ANOVA one – way pada laju pertumbuhan spesifik (SGR) adalah 0,453 dan nilai pada laju pertumbuhan panjang harian sebesar 0,223.

6. Faikha dan Khaerunnisa (2015), melakukan penelitian tentang Analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan Baronang (*Siganus* sp) dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (Spektrofotometer Shimadzu AA-6200). Hasil analisis diperoleh kadar timbal (Pb) pada sampel ikan Baronang (sampel A) dan ikan Baronang (sampel B) adalah konsentrasi timbal tertinggi terdapat pada sampel B1 (daging), yaitu sebesar 0,33 ppm atau 1,65 mg/kg, diikuti konsentrasi timbal pada sampel A2 (perut) yaitu 0,32 ppm atau 1,60 mg/kg, dan konsentrasi timbal pada sampel B2 (perut) yaitu 0,31 ppm atau 1,55 mg/kg sedangkan konsentrasi timbal yang terendah terdapat pada sampel A1 (daging) dengan konsentrasi 0,30 ppm atau 1,50 mg/kg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam timbal (Pb) yang terdapat pada ikan Baronang yang berasal dari Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar tidak melebihi

ambang batas menurut Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan yaitu sebesar 2,0 mg/kg.

7. Karneli (2010), melakukan penelitian tentang Kandungan logam berat timbal (Pb) pada kerang kimia sisik di sekitar pelabuhan feri Bira Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Hasil yang diperoleh menunjukkan pada stasiun 1 rata-rata 0,0014 mg/kg, stasiun 2 rata-rata sebesar 0,0012 mg/kg, pada stasiun 3 rata-rata sebesar 0,00105 mg/kg, stasiun 4 rata-rata 0,00075 mg/kg dan pada stasiun 5 rata-rata sebesar 0,0006 mg/kg. Hasil penititan menunjukkan kerang kimia (*Tridacna squamosa*) masih ibu layak untuk dikonsumsi karena kadar logam timbalnya masih dibawah standar kelayakan menurut WHO yaitu 0.715 mg/kg.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) yang terkandung pada hati daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah data ilmiah tentang kadar logam timbal pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*).

2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
3. Menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat dalam mengonsumsi ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) yang di peroleh dari pulau Lae-lae.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat Yang Relevan

Allah swt. berfirman dalam QS Al Qashash: 28/77.



Terjemahan:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Kementerian Agama R.I., 2012).

Makna dari QS Al Qashas: 28/77. yaitu menjelaskan beberapa orang dari kaum Nabi Musa as. itu melanjutkan nasibnya kepada Qarun bahwa nasihat ini bukan berarti engkau hanya boleh beribadah murni dan melarangmu memperhatikan dunia. Tidak! Berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah dengan cara bersungguh-

sebenarnya yakni melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak, sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmat-Nya dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian mana pun di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan (Shihab, 2002).

Allah swt. telah menciptakan laut dan seisinya seperti ikan segar untuk manusia, akibat tidak adanya kesadaran manusia bahwa laut mestinya dijaga agar tercemari. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kepadamu, seperti halnya meneliti, meneliti juga termasuk kedalam berbuat baik kepada orang lain karena apa yang di dapatkan dari hasil meneliti akan memberikan sebuah informasi bagi orang lain akan dampak logam berat timbal (Pb) bagi kesehatan. Apabiala logam berat timbal (pb) terakumulasi kedalam tubuh makan akan berdampak buruk terhadap kesehatan baik itu secara akut maupun kronis. Dan Allah memerintahkan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, seperti halnya fenomena yang dapat dilihat sekarang ini manusia tidak sadar akibat dari membuang sampah keperairan langsung tanpa memikirkan dampak akibat dari perbuatannya itu, yang akan berakibat buruk pada perairan dan

biota didalamnya yang secara tidak langsung akan berdampak buruk juga terhadap kesehatan.

B. Tinjauan Umum Logam Berat

Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi yang tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan dan merupakan zat yang berbahaya karena dapat terjadi bioakumulasi. Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh makhluk hidup dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di alam (Arsentina, 2008).

Logam berat merupakan komponen alami. Elemen ini tidak dapat didegradasi maupun dihancurkan. Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, air minum, atau udara. Logam berat seperti tembaga, selenium, atau seng dibutuhkan tubuh manusia untuk membantu kinerja metabolisme tubuh. Akan tetapi, dapat berpotensi menjadi racun jika konsentrasi dalam tubuh berlebih. Logam berat menjadi berbahaya disebabkan sistem bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi unsur kimia didalam tubuh makhluk hidup (Darmono, 1995).

Logam berat masih termasuk golongan logam-logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk kedalam tubuh organisme hidup. Sebagai contoh, bila unsur logam besi (Fe) masuk dalam tubuh, meski dalam jumlah agak berlebihan biasanya tidaklah menimbulkan pengaruh yang buruk

terhadap tubuh karena unsur besi (Fe) dibutuhkan dalam darah untuk mengikat oksigen. Sedangkan unsur logam berat baik itu logam berat beracun yang dipentingkan seperti tembaga (Cu), bila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap fungsi fisiologis tubuh (Darmono, 1995).

Logam berat terdiri dari logam essential dan logam non essential. Logam essential adalah logam yang sangat membantu dalam proses fisiologis makhluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk yang bersangkutan. Sedangkan logam non essential adalah logam yang peranannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui, kandungannya dalam jaringan hewan sangat kecil dan apabila kandungannya tinggi akan dapat merusak organ-organ tubuh makhluk yang bersangkutan. Salah satu logam non essential yang terdapat dalam perairan adalah timbal (Pb) (Darmono, 1995).

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak pada pengaruh yang diakibatkan bila logam ini diberikan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Meskipun semua logam berat dapat mengakibatkan keracunan pada makhluk hidup, namun sebagian dari logam berat tersebut tetap dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Bila kebutuhan yang sangat sedikit itu tidak dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup organisme (Rusman, 2010).

Faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar yaitu logam berat tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar

organik, logam berat dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama sedimen sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik, melalui proses adsorpsi dan pembentukan senyawa kompleks (Tarigan, 2003).

Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Dalam kadar rendah logam berat pada umumnya sudah beracun bagi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Termasuk logam berat yang sering mencemari habitat ialah Hg, Cr, Cd, As, dan Pb (Rusman, 2010).

Adanya logam berat di perairan berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yaitu sulit terurai, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (Rusman, 2010). Kandungan logam berat yang menumpuk pada air laut dan sedimen akan masuk ke dalam sistem rantai makanan dan berpengaruh pada kehidupan organisme (Said dkk, 2009).

C. Tinjauan Umum Timbal (Pb)

Timbal merupakan logam yang berwarna abu-abu, mempunyai titik didih 1620 °C dan titik leleh 3275 °C, lunak dan dapat ditempa serta sukar menghantar arus listrik. Biasanya timbal digunakan sebagai logam campuran dalam pematrian tutup makanan kemasan kaleng. Dalam jumlah kecil timbal dalam makanan kaleng tidak berbahaya terhadap manusia akan tetapi apabila jumlah timbal dalam keadaan yang melampaui batas maka akan terjadi keracunan baik secara akut maupun kronis. Di

Indonesia badan yang menentukan kadar dari masing-masing mikroba dan cemaran adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan makanan) dan SNI (Standar Nasional Indonesia). Adapun batas timbal (Pb) dalam makanan kaleng yang diperbolehkan menurut badan BPOM Nomor HK.00.06.1.52.4011 dan SNI Nomor 7387:2009 adalah 2,0 mg/kg untuk daging olahan seperti sosis, kornet dan bakso (Susilawati, 2009). Timbal (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan, karena dampaknya pada sejumlah besar orang akibat keracunan makanan atau udara yang terkontaminasi Pb memiliki sifat toksik berbahaya (Yusuf dkk, 2005).



Gambar 2.1 Logam berat timbal (Pb) (Haas, 1984).

Timbal (Pb) merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat awam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pb yang digunakan di industri non pangan dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Pb adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari pertambangan (Agustina, 2010).

Asap timbal akan mudah terbentuk ketika dipanaskan. Dapat dicatat bahwa sebagian besar asupan Pb oleh penghuni kota adalah dari makanan (sekitar 200

sampai 300 µg per hari), udara dan air menambahkan masing-masing lebih dari 10-15 µg per hari (Palar, 2004).

Menurut Palar (2004), timbal (Pb) banyak digunakan untuk berbagai keperluan karena sifatnya sebagai berikut :

1. Timbal mempunyai titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam bentuk cair hanya dibutuhkan teknik yang cukup sederhana dan tidak mahal.
2. Timbal merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah menjadi berbagai macam bentuk.
3. Sifat kimia timbal (Pb) menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung jika kontak dengan udara lembab.
4. Timbal dapat membentuk alloy dengan logam lainnya dan alloy yang terbentuk mempunyai sifat berbeda dengan timbal (Pb) murni.
5. Densitas timbal lebih tinggi dibandingkan dengan logam lainnya kecuali emas dan merkuri.

Sedangkan menurut Palar (2004), logam timbal (Pb) mempunyai sifat-sifat yang khusus sebagai berikut :

1. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.
2. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal sering digunakan sebagai bahan coating.
3. Mempunyai titik lebur yang rendah, hanya 3275 °C

4. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam lain seperti emas dan merkuri.
5. Merupakan penghantar listrik yang baik.

Logam berat secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan manusia seperti timbal (Pb) dapat mengakibatkan penghambatan sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia, terganggunya sistem syaraf pusat dan tepi, sistem ginjal, sistem reproduksi, idiot pada anak-anak, sawan (*epilepsi*), cacat rangka dan merusak sel - sel somatik. Walaupun jumlah Timbal (Pb) yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-senyawa timbal (Pb) dapat memberikan efek racun terhadap banyak organ yang terdapat dalam tubuh (Palar, 1994).

Logam berat timbal sangat beracun, mempunyai sifat bioakumulatif dalam tubuh organisme air dan akan terus diakumulasi hingga organisme tersebut tidak mampu lagi mentolerir kandungan logam berat timbal dalam tubuhnya. Karena sifat bioakumulatif logam berat timbal, maka bisa terjadi konsentrasi logam tersebut dalam bentuk terlarut dalam air adalah rendah, dalam sedimen semakin meningkat akibat proses-proses fisika, kimia dan biologi perairan dan dalam tubuh hewan air meningkat sampai beberapa kali lipat (Sitorus, 2004).

Menurut SNI no. 7387/2009 tentang batasan kadar logam berat timbal (Pb) pada daging ikan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Batasan kadar logam berat Pb pada ikan dan hasil olahannya (SNI, 2009).

Bahan	Batasan kadar logam berat Pb (mg/kg)
Ikan dan hasil olahannya	Indonesia (SK Dirjen POM 1989) = 2.0 mg/kg Malaysia (1999) = 2.0 mg/kg Eropa (2006) = 0.3 mg/kg Singapura (2005) = 2 mg/kg

D. Karakteristik Timbal (Pb)

Timbal atau timah hitam (*Plumbum*=Pb) termasuk jenis logam yang sudah sejak lama dikenal dan sangat populer. Hal tersebut disebabkan banyaknya timbal yang digunakan pada pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Timbal yang mempunyai nomor atom 82, berat atom 207,19 dan berat jenis 11,34 merupakan logam lunak yang berwarna coklat kehitaman. Pada tekanan udara 1 atm, titik cairnya pada suhu 3275°C dan titik didihnya adalah pada suhu 1620°C (Achmad, 2004).

Timbal adalah jenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan dalam bahasa ilmiahnya dinamakan *Plumbum* dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk kedalam logam golongan IV-A tabel periodik unsur kimia (Darmono, 1995).

Menurut Darmono (1995), Pb mempunyai sifat bertitik lebur rendah, mudah dibentuk, mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan. Bila dicampur dengan logam lain,

membentuk logam campuran yang lebih bagus dari pada logam murninya, mempunyai kepadatan melebihi logam lain.

E. Tingkat Pencemaran Timbal (Pb)

Keberadaan logam berat dalam perairan laut dapat berasal dari berbagai sumber-sumber ilmiah dan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, secara alamiah logam berat timbal (Pb) dapat masuk keperairan melalui pengkristalan Pb pada udara dengan bantuan hujan, disamping itu juga berasal dari pengikisan batuan mineral yang banyak disekitar perairan adapun aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan kadang menghasilkan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif akibat aktivitas manusia adalah turunnya kualitas lingkungan hidup (Palar, 1994).

Logam berat yang termasuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan disperse, kemudian diserap oleh organisme yang hidup didaerah tersebut pengendapan logam berat disuatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap didasar perairan dan berikatan dengan partikel-partikel sendimen, sehingga konsentrasi logam berat dalam sendimen lebih tinggi dibandingkan dalam air (Hutagalung, 1994). Logam berat yang terlarut dalam air akan berpindah kedalam sendimen jika berikatan dengan materi organik bebas atau materi organik yang melapisi sendimen (Wilson, 1988).

Adanya logam berat di perairan, berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan

manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yaitu sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (dihilangkan), dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, sehingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut (Lukman, 2012).

Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan (non degradable) oleh organisme hidup yang ada di lingkungan. Akibatnya, logam-logam tersebut terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi (Lukman, 2012).

Logam Pb banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat (sebagai zat pewarna), penyepuhan, pestisida dan yang paling banyak digunakan sebagai zat antiletup pada bensin. Pb juga digunakan sebagai zat penyusun patri atau solder dan sebagai formulasi penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan kontak dengan Pb. Logam Pb dapat masuk kedalam tubuh melalui pernapasan, makanan dan minuman. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkannya sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak dan rambut (Agustina, 2010).

Sumber kontaminan timbal (Pb) terbesar dari buatan manusia adalah bensin beraditif timbal untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Diperkirakan 65 persen dari semua pencemaran udara disebabkan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan

bermotor. Pencemaran udara dari asap kendaraan bermotor acapkali dituduh sebagai sumber kontaminasi timbal dalam makanan, selain kemasan, zat warna tekstil dan limbah industri. Tuduhan ini bukan tak ada alasannya. Data yang dikeluarkan Bapedal DKI tahun 1998, kadar timbal yang melayang-layang di udara Jakarta yaitu rata-rata telah mencapai 0,5 mikrogram per meter kubik udara. Untuk kawasan tertentu, seperti terminal bus dan daerah padat lalu lintas, kadar timbal bisa mencapai 2-8 mikrogram per meter kubik. Pencemaran ini telah menyebabkan sayuran yang ditanam dekat jalan padat lalu lintas, mengandung timbal di atas ambang batas yang ditentukan oleh WHO. Yakni antara 15,5 ppm hingga 29,9 ppm. Padahal WHO memberi ambang batas hanya sampai 2 ppm. Demikian pula makanan jajanan disekitar terminal bus tak terhindarkan lagi dari kontaminasi timbal (Alamsyah, 2010).

F. Toksisitas Timbal (Pb)

Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah logam berat esensial di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun, contoh logam berat ini adalah Fe. Keberadaan besi dalam air laut juga dapat bersumber dari perkaratan kapal-kapal laut dan tiang-tiang pancang pelabuhan yang mudah berkarat. Sedangkan jenis kedua adalah logam berat non esensial atau beracun, dimana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun seperti Pb.

Secara alamiah timbal dapat masuk ke dalam badan perairan melalui pengkristalan timbal di udara dengan bantuan air hujan (Khasanah, 2009).

Pada manusia, timbal dapat mengakibatkan bermacam-macam dampak biologi, bergantung pada tingkatan dan durasi terpaannya. Dampak yang bervariasi terjadi pada rentang dosis yang luas, dimana janin dan bayi lebih rentan terkena dampak dibandingkan dengan orang dewasa. Terpaan pada tingkat yang tinggi dapat mengakibatkan dampak keracunan biokimia pada manusia, yang selanjutnya dapat mengarah pada berbagai problem seperti mengganggu proses sintesa hemoglobin, menyerang ginjal, saluran pencernaan, persendian, dan sistem reproduksi, serta menimbulkan kerusakan akut maupun kronis pada sistem saraf.

Keracunan berat karena timbal sudah sangat jarang ditemukan (Alamsyah, 2010).

Timbal (Pb) juga salah satu logam berat yang mempunyai daya toksitas yang tinggi terhadap manusia karena dapat merusak perkembangan otak pada anak-anak, menyebabkan penyumbatan sel-sel darah merah, anemia dan mempengaruhi anggota tubuh lainnya. Timbal dapat diakumulasi langsung dari air dan dari sedimen oleh organisme laut (Rochyatun dkk, 2006).

Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme tubuh terputus. Lebih jauh lagi, logam berat ini akan bertindak sebagai alergen, mutagen atau karsinogen bagi manusia. Jalur masuknya adalah melalui kulit, pernafasan dan pencernaan. Masing-masing logam berat tersebut memiliki dampak negatif terhadap

manusia jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (Alamsyah, 2010).

Selain dalam bentuk logam murni, timbal dapat ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik dan organik. Semua bentuk Pb tersebut berpengaruh sama terhadap toksisitas pada manusia (Darmono, 1995). Menurut Palar (2004), senyawa tetraetil-Pb, dapat menyebabkan keracunan akut pada sistem saraf pusat. Meskipun jumlah Pb yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal itu disebabkan senyawa-senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ yang terdapat dalam tubuh.

Logam berat timbal sangat beracun, mempunyai sifat bioakumulatif dalam tubuh organisme air dan akan terus diakumulasi hingga organisme tersebut tidak mampu lagi mentolerir kandungan logam berat timbal dalam tubuhnya. Karena sifat bioakumulatif logam berat timbal, maka bisa terjadi konsentrasi logam tersebut dalam bentuk terlarut dalam air adalah rendah, dalam sedimen semakin meningkat akibat proses-proses fisika, kimia dan biologi perairan, dan dalam tubuh hewan air meningkat sampai beberapa kali lipat (Sitorus, 2004).

Logam Pb sebagai gas buang kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Logam Pb yang terhirup oleh manusia setiap hari akan diserap, disimpan dan kemudian ditampung dalam darah. Bentuk kimia Pb merupakan faktor penting yang mempengaruhi sifat-sifat Pb di dalam tubuh. Komponen Pb organik misalnya tetraethyl Pb segera dapat terabsorpsi oleh tubuh melalui kulit dan membran mukosa. Logam Pb organik diabsorpsi terutama melalui

saluran pencernaan dan pernafasan dan merupakan sumber Pb utama di dalam tubuh. Tidak semua Pb yang terhisap atau tertelan ke dalam tubuh akan tertinggal di dalam tubuh. Kira-kira 5-10% dari jumlah yang tertelan akan diabsorpsi melalui saluran pencernaan, dan kira-kira 30% dari jumlah yang terisap melalui hidung akan diabsorpsi melalui saluran pernafasan akan tinggal di dalam tubuh karena dipengaruhi oleh ukuran partikel-partikelnya (BPLHD, 2009).

Sebagian besar toksifikasi yang masuk ke dalam tubuh setelah diserap sel epitel usus halus akan dibawa ke hati oleh *vena aorta* hati. Organ hati sangat rentan terhadap pengaruh berbagai zat kimia dan merupakan organ tubuh yang sering mengalami kerusakan (Lu, 1995). Pengamatan kerusakan pada hati dapat dilakukan dengan pengamatan secara histologi. Menurut penelitian Alifia dan Djawad (2000), ikan bandeng yang tercemar logam timbal (Pb) memperlihatkan bahwa hati mengalami perubahan pada konsentrasi tertentu.

Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak, berwarna merah kecoklatan (Affandi dan Tang, 2002). Hati merupakan organ yang sangat rentan terhadap pengaruh zat kimia dan menjadi organ sasaran utama dari efek racun zat kimia (Toksifikasi).

Menurut Lu (1995) menyatakan bahwa hati sangat rentan terhadap pengaruh zat kimia dan menjadi organ sasaran utama dari zat beracun. Hal ini terjadi karena sebagian besar racun atau zat toksik yang masuk ke dalam tubuh setelah diserap oleh sel akan dibawa ke hati oleh *vena aorta* hati, sehingga hati berpotensi mengalami

kerusakan. Kerusakan hati akibat logam berat (Pb) disebabkan aktifitas logam tersebut dalam mempengaruhi kerja enzim.

Akumulasi logam timbal dalam tubuh manusia akan mengakibatkan keracunan akibat dari timbal yang dapat menyebabkan gangguan anatomi tubuh. Secara visual akan muncul gejala dampak akibat terpapar oleh timbal secara akut maupun kronis. Dalam jangka pendek akan menyebabkan keracunan akut yang ditandai dengan rasa terbakar pada mulut adanya ransangan pada sistem *gastrointestinal* yang disertai dengan diare. Pada beberapa kasus akut akibat terpapar timbal terjadi *oliguria* (Urin sedikit) dan gagal ginjal yang akut dapat berkembang secara cepat. Dampak keracunan kronis yang ditandai dengan mual, sakit disekitar mulut, anemia dan bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. (Naria, 2005).

G. Tinjauan Umum Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometri serapan atom (SSA) merupakan suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Prinsip kerja SSA adalah didasarkan pada prinsip absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom yang mana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik. Dengan menyerap suatu energi maka atom akan memperoleh energi sehingga suatu atom pada keadaan dasar dapat ditingkatkan energinya ketingkat eksitasi. Prinsip spektrofotometri serapan atom sama saja dengan spektrofotometri

sinar tampak dan ultra violet. Perbedaannya terletak pada bentuk spektrum, cara pengerjaan sampel dan peralatannya (Napitupulu, 2008).

Setiap alat Spektrofotometri Serapan Atom SSA terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Unit atomisasi (Atomisasi dengan nyala dan tapa nyala)
2. Sumber radiasi
3. Sistem pengukur fotometri

Prinsip kerja SSA adalah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom bebas yang dibebaskan oleh nyala dengan panjang gelombang tertentu. Secara lebih rinci yaitu sampel dianalisis berupa liquid dihembuskan kedalam nyala api burner dengan bantuan gas bakar yang digabungkan bersama oksidan (bertujuan untuk menaikkan temperatur) sehingga dihasilkan kabut halus. Atom-atom keadaan dasar yang berbentuk dalam kabut dilewatkan pada sinar dan panjang gelombang yang khas. Sinar sebagian diserap, yang disebut absorbansi dan sinar yang diteruskan emisi. Penyerapan yang terjadi berbanding dengan banyaknya atom keadaan dasar yang berada dalam nyala. Pada kurva absorpsi, terukur besarnya sinar yang diserap, sedangkan kurva emisi, terukur intensitas sinar yang dipancarkan (Napitupulu, 2008).

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) yaitu:

1. Menganalisis konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat.

2. Menganalisis sampel sampai kadar rendah, sedangkan pada metode lain seperti volumetrik hanya dapat menganalisis pada kadar yang tinggi.
3. Analisis sampel dapat berlangsung lebih cepat.

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) yaitu:

1. Hanya dapat menganalisis logam berat dalam bentuk atom-atom. SSA menganalisis logam berat dari atom-atom karena tidak berwarna.
2. Sampel yang dianalisis harus dalam keadaan suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2 sampai 3.
3. Biaya operasional lebih tinggi dan harga peralatannya yang mahal.

H. Tinjauan Umum Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

1. Defenisi Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)


Ikan Baronang tompel dapat dikenal dengan mudah karena bentuknya yang khas, yaitu kepalanya berbentuk seperti kelinci, sehingga ikan ini disebut juga *rabbitfish* (Ghufran dan Kordi, 2005).

Proses bioakumulasi logam dalam jaringan ikan cukup bervariasi, bergantung pada jenis logam berat dan spesies ikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Palar (1994) bahwa kemampuan fisiologis ikan yang berbeda-beda terhadap pengaruh paparan logam berat akan mempengaruhi kadar logam tersebut di dalam tubuh ikan. Secara umum *uptake* logam berat oleh ikan adalah melalui air, pakan dan sedimen.

2. Morfologi Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Jari-jari sirip pada ikan Baronang (*Siganus guttatus*) yang terletak pada bagian sirip punggung (*Pinna dorsalis*), anal (*Pinna analis*) dan perut (*Abdomen*) mempunyai kelenjar-kelenjar racun. Ikan Baronang tompel termasuk famili Siganidae dengan tanda-tanda khusus diantaranya, bentuk tubuh oval sampai lonjong, pipih, tinggi sampai ramping. Dilindungi oleh sisik-sisik lingkaran yang berukuran kecil dan memanjang, mulut kecil posisinya terminal. Rahang dilengkapi dengan deret gigi-gigi yang ramping, gigi seperti mata gunting pemotong. Punggungnya dilengkapi sebuah duri tajam mengarah kedepan antara neural pertama dan biasanya tertanam dibawah kulit. Tipe ekor *Homocercal* yaitu bentuk *Pinna caudalis* yang berlekuk atau tidak dan ditunjang oleh jari-jari sirip ekor. Tipe sisik *Cycloid* yang mempunyai bentuk bulat, tipis dan transparan mempunyai lingkaran pada bagian belakang dan bergerigi. Dan memiliki duri-duri dilengkapi kelenjar atau racun pada ujungnya. Kelenjar beracun pada ikan merupakan derivate dari kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir (Ghufran dan Kordi, 200

Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) ini memiliki bentuk tubuh yang pipih dan agak lebar, bertotol-totol dengan satu tompel yang agak besar berwarna kuning di punggung belakang. Umpan kegemarannya lumut, pisang, nasi atau pelet sudah dilumatkan. Panjang maksimumnya 35 cm (Ghufran dan Kordi, 2005).



Gambar 2.2 Morfologi ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Mata (<i>Visus</i>) | g. Kulit (<i>Integumen</i>) |
| b. Katup insang (<i>Operculum</i>) | h. Sirip anal (<i>Pinna analis</i>) |
| c. Sirip punggung (<i>Pinna dorsalis</i>) | i. Sirip perut (<i>Pina abdomen</i>) |
| d. Sirip jari-jari keras (<i>Pinna acanthopterygii</i>) | j. Sirip dada (<i>Pinna pectoralis</i>) |
| e. Sirip jari-jari lemah (<i>Pinna malacopterygii</i>) | k. Mulut (<i>Oris</i>) |
| f. Sirip ekor (<i>Pinna caudalis</i>) | |


Jenis *Siganus guttatus* mempunyai tubuh berwarna abu-abu kebiruan dengan bagian berwarna keperakan dengan beberapa bintik sebesar bola mata berwarna orange. Bercak besar berwarna kuning terdapat di bawah sirip punggung (*Pinna dorsalis*), sirip ekor (*Pinna caudalis*), bagian punggung yang lunak dan sirip dubur (*Pinna analis*) memiliki deretan berwarna gelap. Lebar badan Baronang jenis *S. guttatus* sekitar 1,8 – 2,3 lebih pendek dari panjang standar. Warna pada ikan sangat dipengaruhi oleh *schemachrome* (Konfigurasi fisik) dan *biochrome* (pigmen

pembawa warna). *Schemachrome* warna putih ditemukan pada rangka, gelembung renang, sisik dan testis. Warna biru dan ungu pada iris mata, warna pelangi pada sisik dan membran anu. Sedangkan yang tergolong kedalam *biochrome* adalah *carotenoid* (Kuning dan merah), *chromolipoid* (Kuning sampai coklat), *indigoid* (Merah, biru dan hijau), *melanin* (Hitam dan coklat) *Flavin* (fluoresensi kehijau-hiajuan), *purin* (Putih atau keperak-perakan) dan *pterin* (Putih, kuning, merah dan jingga) (Ghufran dan Kordi, 2005).

Baronang tompel juga mampu berubah warna dengan cepat untuk menghindar dari bahaya. Warna Baronang tompel juga dapat berubah karena pengaruh kondisi lingkungan. Ikan Baronang tompel yang hidup di laut mempunyai warna tubuh yang lebih cerah dibanding Baronang yang hidup di tambak (Ghufran dan Kordi, 2005).

3. Anatomi Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Di dalam rongga mulut ikan terdapat gigi-gigi dan lidah yang berfungsi untuk menelan makanan. Pada proses pencernaan, makanan dari rongga mulut masuk ke kerongkongan (*esofagus*). *Esofagus* adalah permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, *esofagus* berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan *rectum* (proses osmoregulasi) (Ghufran dan Kordi, 2005).



Keterangan:

- a. Hati (*Hepar*)
- b. Daging
- c. Gonad jantan
- d. Usus (*Intestinium*)
- e. Kantung empedu (*Vesica felea*)

Gambar 2.3 Anatomi ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Lambung berfungsi sebagai penampung makanan. Pada ikan yang tidak berlambung fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantong yang membesar. Pada ikan tak bergigi (biasanya herbivora) terdapat *gizzard* yang berfungsi untuk menggerus makanan. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel *mucus* yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Di bagian luar sel *epitellium* terdapat lapisan lendir sebagai hasil sekresi sel *mucus* tersebut. Sel-sel penghasil cairan *gastric* terletak di bagian bawah dari lapisan *epitellium* mensekresikan pepsin dan asam klorida (Ghufran dan Kordi, 2005).

Dari lambung, makanan masuk ke usus. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus terdapat dua saluran yang masuk ke dalam yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu dan yang berasal dari pankreas. Pankreas merupakan organ yang menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Organ yang menghasilkan empedu dalam kantung empedu adalah

hati. Di usus bermuara cairan empedu yang membantu proses pencernaan terutama pencernaan lemak. Di usus halus, sari-sari makanan diserap dan selanjutnya diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap dikeluarkan melalui anus (Ghufran dan Kordi, 2005).

4. Klasifikasi Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Adapun klasifikasi ikan Baronang tompel sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Pisces

Ordo : Percoformes

Famili : Siganidae

Genus : *Siganus*

Spesies : *Siganus guttatus* (Ghufran dan Kordi, 2005).

5. Lingkungan Hidup Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Menurut Kordi (2011) salah satu ikan ekonomis penting yang diketahui berasosiasi dengan padang lamun adalah ikan Baronang tompel yang memanfaatkan ekosistem padang lamun sebagai daerah asuhan, pembesaran dan tempat mencari

makanan. Penelitian sebelumnya tentang keberadaan spesies *Siganus guttatus* pada ekosistem padang lamun di perairan Teluk Ambon dalam dilakukan oleh Sumadiharga (1983) yang menemukan kelimpahan juvenil ikan Baronang tompel di perairan Tanjung Tiram pada bulan Januari, (Marasebessy dan Hukom, 1989) menemukannya melimpah pada bulan Desember.

Siganidae merupakan ikan herbivora, sesuai dengan morfologis dari gigi dan saluran pencernaannya yaitu mulut yang berukuran kecil, dinding lambung agak tebal, usus halus panjang dan mempunyai permukaan yang luas, sehingga ikan ini termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan. Apabila dibudidayakan, ikan Baronang tompel mampu memakan makanan apa saja yang diberikan seperti pakan buatan (Marasabessy dan Hukom, 1989). Pada umumnya ikan mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap makanan dan dalam memanfaatkan makanan yang tersedia (Zulfikar, 2003).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diluar negeri maupun di Indonesia, makanan ikan Baronang tompel antara lain lamun (*seagrass*) dari jenis *Enhalus* dan *Halophilla*. Ditemukan dalam isi perut semua jenis ikan *Siganus* spp. terdapat fragmen lamun. Dalam lambung ikan Baronang ditemukan 22 spesies alga dengan tingkat preferensi yang tinggi adalah *Enteromorpha compressa*, *Murayella perichlados*, *Chondria repens*, *Cladophoropsis membranacea*, *Acanthopora spicifera* dan *Centroceras clavulatum* (Kordi, 2011).

6. Siklus Hidup Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Ikan baronag akan melakukan reproduksi bila ikan Baronang tompel jantan mencapai ukuran 11-14 cm dan betina 13-21 cm. Dalam pemijahan ikan Baronang

tompel ini sebaiknya dilakukan pada bulan Januari hingga April dan sampai pada puncaknya pada bulan Februari sampai Maret serta pada musim kedua pada bulan Juli hingga Oktober (Ghufran dan Kordi, 2005).

Padang lamun memiliki produktivitas primer dan sekunder yang sangat tinggi dan mendukung kelimpahan dan keragaman ikan yang memanfaatkan lamun pada beberapa tahap siklus hidup bahkan sepanjang hidupnya. Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) merupakan kelompok ikan yang cukup banyak dijumpai hidup di daerah padang lamun. Hal ini terkait dengan kebiasaan makanan ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) yang cenderung herbivora, memakan tumbuhan lamun dan epifit yang berasosiasi dengan lamun (Ghufran dan Kordi, 2005).

Daya toleransi *S. guttatus* terhadap perubahan salinitas 5% dengan kisaran temperatur 25-34 °C. Ikan Baronang tompel sangat sensitif terhadap kandungan oksigen terlarut di bawah 2 ppm dan pH diatas 9 (Ghufran dan Kordi, 2005).

7. Manfaat Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Ikan mengandung 18% protein terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Kandungan lemaknya 1-20 % lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah (Ghufran dan Kordi, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan, ikan mengandung protein yang berkualitas tinggi. Protein dalam ikan tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu protein ikan sangat mudah dicerna dan diabsorpsi.

Selain ikan memang daging unggas, telur, susu, merupakan bahan makanan sumber protein yang berkualitas tinggi. Asam-asam amino yang dikandungnya cukup banyak dan bervariasi sesuai yang dibutuhkan tubuh. Para ahli telah menemukan, komposisi asam-asam amino dalam bahan makanan hewani sesuai dengan komposisi jaringan di dalam tubuh manusia. Oleh karena ada kesamaan ini maka protein dari ikan, daging, susu, unggas dan telur mempunyai nilai gizi yang tinggi. Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Ikan sebagai makanan sumber protein yang tinggi. Absorpsi protein ikan lebih tinggi dibandingkan daging sapi dan ayam (Zulfikar, 2003).

Daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Oleh karena itu ikan dan hasil produknya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan pencernaan sebab mudah dicerna. Vitamin yang ada dalam ikan juga bermacam-macam, yaitu vitamin A, D, Thiamin, Riboflavin dan Niacin. Ikan juga mengandung mineral yang kurang lebih sama banyaknya dengan mineral yang ada dalam susu seperti kalsium, phosphor, akan lebih tinggi dibandingkan dengan susu. Ada dua kelompok vitamin dalam ikan yaitu larut dalam air dan larut minyak. Yang larut dalam minyak yaitu vitamin A dan D, yaitu dalam minyak ikan (Zulfikar, 2003).

I. Tinjauan Umum Pulau Lae-lae

Pulau Lae-lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Secara administratif termasuk ke dalam

wilayah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-lae, dengan luas aratan pulau 8,9 hektar. Secara Geografis pulau terletak pada posisi 119° 23'33,1" BT dan 05°08' 16,0" LS atau di Perairan Selat Makassar. Batas-batas administrasi meliputi sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Samalona, sebelah Timur dengan Kota Makassar, Sebelah Selatan dengan Tanjung Bunga, dan Sebelah Utara dengan Lae-lae kecil. Pulau Lae-lae merupakan pulau kecil di barat Makassar merupakan salah satu tempat kunjungan wisata di Makassar yang berjarak 1.5 Km dari Maksasar dan dapat terlihat jelas langsung dari Pantai Losari. Untuk melakukan perjalanan kepulau kecil ini dapat di tempuh selama 10 menit dengan perahu motor nelayan dengan biaya Rp. 15.000 per orang dari dermaga kayu Bangkoa atau dermaga depan Benteng Fort Rotterdam. Di pulau Lae-lae terdapat pula situs sejarah peninggalan perang yaitu sebuah terowongan bawah tanah, yang konon katanya terhubung dengan benteng kota Makassar atau Fordrotherdam. Namun sangat disayangkan karena tidak adanya perhatian oleh dinas terkait dan penduduk setempat maka jalan masuk terowongan tersebut telah tertimbun oleh sampah rumah tangga (Budiman, 2006).



Gambar 2.4 Pulau Lae-lae (Dokumentasi pribadi, 2016).


Pulau yang terletak di sisi barat kota Makassar ini menjadi salah satu tempat menyelam bagi para penggemar penyelam. Dengan lautnya yang biru dan tidak dalam serta jarangya bulu babi di sekitar pantai, Lae-lae sangat cocok untuk yang hobi berenang di laut atau sekedar mandi mandi. Di Sisi selatan Lae-lae kita dapat menikmati dan berjalan di batu-batu pemecah ombak berbentuk pyramid segitiga. Konon asal muasal dari nama Lae-lae sendiri menurut cerita ada sebuah kapal bermuatan orang-orang China terdampar di karang berpasir. Ketika ita orang orang China memanggil manggil dan berteriak dengan bahasa mereka Lae-lae yang artinya kemari-kemari, semenjak itulah Tanjung itu disebut Tanjung Lae-lae dan sekarang menjadi Pulau Lae-lae (Budiman, 2006).



Gambar 2.5 Peta Pulau Lae-lae (Google Maps, 2016).

UNIVERSITAS ALAUDDIN
MAKASSAR

J. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menunjukkan keberadaan logam berat timbal (Pb) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang di pulau Lae-lae.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Maret – 19 April 2017 di Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan pengambilan sampel di pulau Lae-lae.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif yaitu metode pendekatan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang berlangsung pada saat ini atau pada tempat dan lokasi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) yang hidup di pulau Lae-lae.

Sampel dari penelitian ini adalah salah satu dari jenis ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) yang hidup di pulau Lae-lae.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah logam berat timbal (Pb).

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Timbal merupakan logam yang berwarna abu-abu, yang didapatkan pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*). Dalam jumlah kecil timbal yang terakumulasi dalam tubuh tidak berbahaya akan tetapi apabila jumlah timbal dalam keadaan yang melampaui batas maka akan terjadi keracunan baik secara akut maupun kronis.
2. Ikan Baronang tompel merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam familia siganidae. Bagian tubuh yang akan diteliti adalah hati dan daging. Sampel ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) diambil dari pulau Lae-lae.

F. Metode Pengumpulan Data

Observasi (pengamatan) yaitu observasi langsung terhadap kegiatan nelayan dan pencatatan hasil penangkapan. Dilanjutkan sesi dokumentasi yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dengan menggunakan kamera. Selanjutnya pengujian yang dilakukan di Laboratorium yaitu dengan menganalisis atau mengukur logam berat dengan menggunakan SSA (Spektrofotometer Serapan Atom).

G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah labu alas, erlenmeyer, labu ukur, pipet tetes, pipet volume, lemari asam, *hot plate*, kertas saring, pisau bedah, pinset, *cool box*, *bulp* pipet, timbangan analitik, wadah tempat sampel, tombak, lampu, kacamata renang, perahu dan spektrofotometer serapan atom (SSA).

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*), aquabides (*Water One*), HClO_4 dan HNO_3 pekat.

H. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini persiapan alat dan bahan serta observasi di pulau Lae-lae.

Hal ini dilakukan untuk memastikan sampel tersedia untuk dianalisis.

2. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 yang diperoleh dari pulau Lae-lae. Stasiun pengambilan sampel yaitu dari arah Barat dan Timur masing-masing 10 ekor. Ikan yang diperoleh dari hasil tembak atau ditombak kemudian dimasukkan ke dalam *cool box* untuk selanjutnya dibawa kemudian didekstruksi di Laboratorium An Organik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Pembersihan sampel

Pembersihan sampel dilakukan dengan cara mencuci sampel sampai bersih kemudian memotong mulai dari bawah sampai perut bagian atas setelah itu mengambil bagian organ yang akan dianalisa seperti hati, daging dan kulit dengan menggunakan pisau bedah dan pinset. Selanjutnya mencuci organ hati, daging dan kulit.

4. Persiapan Dekstruksi Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

Menimbang sampel organ hati, sisik dan daging menggunakan timbangan analitik (*adventure ohauss*) masing-masing dari sampel tersebut ditimbang sebanyak 10 gr kemudian sampel organ yang telah ditimbang selanjutnya ditambahkan aquabides sebanyak 100 mL setelah itu ditambahkan HNO₃ pekat sebanyak 5 mL dan dipanaskan dari 150 mL hingga berkurang menjadi 100 mL. Kemudian didinginkan lalu tambahkan HClO₄ sebanyak 1 mL, setelah itu dipanaskan kembali hingga airnya berkurang dari 100 mL menjadi 50 mL. Sampel tersebut disaring dengan penambahan aquabides 50 mL kedalam labu alas bulat selanjutnya dihomogenkan dan disimpan dalam botol untuk tahap persiapan pengujian SSA.

5. Tahap Persiapan Pengujian Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Dalam tahapan ini sebelum pengujian Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) yaitu hal pertama yang dilakukan pembuatan larutan baku yang digunakan larutan induk Pb (Timbal) 1000 ppm diencerkan menjadi larutan baku 10 ppm dengan memipet 0,5 mL larutan induk Pb (Timbal) dalam labu ukur dan

diencerkan menggunakan aquabides sampai batas minisqus. Setelah itu menyiapkan 5 labu ukur untuk larutan deret standar 0,1, 0,2, 0,5, 1 dan 2 untuk larutan standar 0,1 dipipet 0,5 mL larutan baku lalu diencerkan dengan aquabides sampai batas minisqus, untuk larutan standar 0,2 dipipet 1 mL larutan baku dan diencerkan dengan aquabides sampai batas minisqus, untuk larutan standar 0,5 dipipet 2,5 larutan baku dan diencerkan dengan aquabides sampai batas minisqus. Untuk larutan standar 1 dipipet 5 mL larutan baku dan diencerkan menggunakan aquabides sampai batas minisqus, untuk larutan standar 2 diencerkan larutan baku sebanyak 10 mL dan diencerkan dengan aquabides sampai batas minisqus. Selanjutnya ketahap pengujian SSA untuk mengetahui kadar logam.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengukuran konsentrasi timbal (Pb) dengan menggunakan metode *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Kadar logam timbal (Pb) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$C = \frac{c \times V}{A}$$

Keterangan :

C : Kadar logam dalam sampel ($\mu\text{g}/\text{gr}$)

c : Konsentrasi larutan sampel (true value)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)

a : Berat sampel basah (gram)

Sumber: Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel, Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kota Makassar, 2017.

Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar dengan parameter yaitu kandungan logam berat Timbal (Pb) pada ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) tompel disekitar pulau Lae-lae.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis kandungan logam berat timbal (Pb) stasiun I kandungan logam timbal (Pb) terletak pada kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Kadar logam berat timbal pada stasiun I (Sebelah Timur) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

No	Kode sampel	Kadar logam berat timbal (Pb) mg/kg	Rata-rata
1.	IK ₁ H1	3,654	3,124
2.	IK ₁ H2	2,596	
3.	IK ₁ D1	2,462	2,486
4.	IK ₁ D2	2,501	
5.	IK ₁ K1	3,407	3,511
6.	IK ₁ K2	3,616	

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (2017).

Keterangan:

IK₁ H1 = Stasiun I hati ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji pertama)


IK₁ H2 = Stasiun I hati ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji kedua)

IK₁ D1 = Stasiun I daging ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji pertama)

IK₁ D2 = Stasiun I daging ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji kedua)

IK₁ K1 = Stasiun I kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji pertama)

IK₁ K2 = Stasiun I kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) (Uji kedua)



Gambar 4.1 Kadar logam berat timbal pada stasiun I (Sebelah Timur) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis kandungan logam berat timbal (Pb) stasiun II (Sebelah Barat) kandungan logam timbal (Pb) terletak pada kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kadar logam berat timbal pada stasiun II (Sebelah Barat) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

No	Kode sampel	Kadar logam berat timbal (Pb) mg/kg	Rata-rata
1.	IK ₂ H1	4,030	3,429
2.	IK ₂ H2	2,828	
3.	IK ₂ D1	2,297	3,012
4.	IK ₂ D2	3,378	
5.	IK ₂ K1	3,702	3,630
6.	IK ₂ K2	3,558	

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (2017).

Keterangan:

IK₂ H1 = Stasiun II hati ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji pertama)


IK₂ H2 = Stasiun II hati ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji kedua)

IK₂ D1 = Stasiun II daging ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji pertama)

IK₂ D2 = Stasiun II daging ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji kedua)

IK₂ K1 = Stasiun II kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji pertama)

IK₂ K2 = Stasiun II kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) (Uji kedua)




Gambar 4.2 Kadar logam berat timbal pada stasiun II (Sebelah Barat) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) di pulau Lae-lae.

Hasil kandungan logam berat (Pb) Stasiun I dan II pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus gutattus*) di pulau Lae-lae, setelah dirata-ratakan

paling tinggi terletak pada kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) adalah 3,511 mg/kg dan 3,630 mg/kg yang di tunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rata-rata logam berat timbal (Pb) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

No	Organ	Stasiun	Kadar rata-rata logam berat timbal (Pb)
1.	Hati	Stasiun I	3,124
		Stasiun II	3,429
2.	Daging	Stasiun I	2,481
		Stasiun II	3,012
3.	Kulit	Stasiun I	3,511
		Stasiun II	3,630



Gambar 4.3 Diagram batang rata-rata logam berat timbal (Pb) stasiun I dan II pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

B. Pembahasan

Karakteristik perairan di pulau Lae-lae pada stasiun I ditinjau dari keadaan perairannya yang tidak jauh dari lokasi pantai losari yang telah diduga sudah tercemar logam berat terlihat keruh serta sampah yang beserahkan mengapung diatas permukaan air, dimana hal ini dapat menjadi pemicu utama perairan terkontaminasi oleh logam berat timbal (Pb), adanya logam berat timbal (Pb) yang masuk kedalam ekosistem dapat menjadi sumber pencemar dan dapat mempengaruhi biota perairan. Pada stasiun II ditinjau dari keadaan perairannya banyaknya sampah yang mengapung diatas permukaan laut serta banyaknya transportasi laut seperti perahu yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, seperti yang diketahui bahwa anti letup pada bensin mengandung timbal (Pb) dapat menjadi salah satu pemicu sumber utama pencemaran timbal (Pb) tidak hanya itu solar dan kaleng-kaleng cat juga yang dibuang begitu saja keperairan, sehingga tidak hanya mencemari perairan akan tetapi merusak biota perairan pulau Lae-lae. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari limbah yang dibuang setiap saat akan menyebabkan pencemaran pada perairan serta biota laut yang terdapat pada perairan tersebut.

Dalam penelitian Hamazah dkk (2015) berdasarkan peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, tentang baku mutu akumulasi logam Pb pada perairan ditetapkan yaitu 0,008 ppm. Dengan berdasarkan pada standar baku mutu timbal di perairan tersebut, maka perairan pulau Lae-lae tergolong telah tercemar logam berat timbal (0,556 – 0,609 ppm).

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 4.1 stasiun I (Sebelah timur) menunjukkan bahwa kadar logam berat timbal tertinggi terdapat pada organ kulit yaitu 3,511mg/kg dan hasil pengamatan pada tabel 4.2 stasiun II (sebelah barat) yaitu 3,630 mg/kg. Kulit mengandung banyak logam berat timbal (Pb) dibandingkan organ lainnya dikarenakan logam berat timbal lebih mudah terakumulasi pada kulit ikan serta ukuran dari logam berat timbal ini besar (Mikro) dibandingkan dengan logam berat lainnya yang ukurannya sebesar nano yang proses penyerapannya dari dalam (*Absorpsi*), hal inilah yang menyebabkan mengapa timbal banyak terdapat pada kulit.

Hasil rata-rata logam berat timbal (Pb) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae dari stasiun I dan stasiun II logam timbal paling banyak terletak pada kulit yaitu 3,511mg/kg dan 3,630 mg/kg. Hal ini dikarenakan timbal (Pb) proses penyerapannya *Adsorpsi* serta berukuran mikro dibandingkan dengan logam yang lainnya yang ukurannya kecil (Nanomikro), inilah yang menjadi alasan mengapa timbal banyak terdapat pada kulit. Sedangkan pada organ daging sangat rendah yaitu 2,486 mg/kg dan 3,012 mg/kg karena logam timbal (Pb) pada ikan terakumulasi secara difusi sehingga kadar logam timbal lebih banyak pada kulit.

Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) ambang batas berdasarkan keputusan Standar Nasional Indonesia no. 7387/2009 ambang batas logam berat timbal (Pb) pada ikan dan olahannya adalah 2.0 mg/kg. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan hasil yang didapatkan pada organ hati, daging dan kulit melewati ambang batas karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 3,0 mg/kg.

Akumulasi logam berat pada ikan dapat terjadi karena adanya kontak antara medium yang mengandung toksik dengan ikan. Kontak berlangsung dengan adanya pemindahan zat kimia dari lingkungan air kedalam atau permukaan tubuh ikan, misalnya logam berat melalui insang. Masuknya logam berat kedalam tubuh organisme perairan dengan tiga cara yaitu melalui makanan, insang dan difusi melalui permukaan kulit (Sahetapy, 2011).

Ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) yang telah terakumulasi oleh logam timbal kemudian dikonsumsi oleh manusia maka logam yang semula terakumulasi oleh ikan akan ikut juga terakumulasi kedalam tubuh manusia dan jika dibiarkan dalam jangka waktu maupun panjang akan mengakibatkan penyakit akut maupun kronis. Akumulasi logam timbal dalam tubuh manusia akan mengakibatkan keracunan akibat dari timbal yang dapat menyebabkan gangguan anatomi tubuh. Secara visual akan muncul gejala dampak akibat terpapar oleh timbal secara akut maupun kronis. Dalam jangka pendek akan menyebabkan keracunan akut yang ditandai dengan rasa terbakar pada mulut adanya ransangan pada sistem *gastrointestinal* yang disertai dengan diare. Pada beberapa kasus akut akibat terpapar timbal terjadi *oliguria* (Urin sedikit) dan gagal ginjal yang akut dapat berkembang secara cepat. Dampak keracunan kronis yang ditandai dengan mual, sakit disekitar mulut, anemia dan bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. (Naria, 2005).

Keberadaan logam berat dalam perairan laut dapat berasal dari berbagai sumber-sumber ilmiah dan dari aktifitas yang dilakukan oleh manusia, secara alamiah logam berat timbal (Pb) dapat masuk keperairan melalui pengkristalan Pb pada udara

dengan bantuan hujan, disamping itu juga berasal dari pengikisan batuan mineral yang banyak disekitar perairan adapun aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan kadang menghasilkan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif akibat aktivitas manusia adalah turunnya kualitas lingkungan hidup. Logam berat yang termasuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan disperse, kemudian diserap oleh organisme yang hidup didaerah tersebut pengendapan logam berat disuatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil (Palar, 1994).

Logam berat timbal sangat beracun, mempunyai sifat bioakumulatif dalam tubuh organisme air dan akan terus diakumulasi hingga organisme tersebut tidak mampu lagi mentolerir kandungan logam berat timbal dalam tubuhnya. Karena sifat bioakumulatif logam berat timbal, maka bisa terjadi konsentrasi logam tersebut dalam bentuk terlarut dalam air adalah rendah, dalam sedimen semakin meningkat akibat proses-proses fisika, kimia dan biologi perairan dan dalam tubuh hewan air meningkat sampai beberapa kali lipat (Sitorus, 2004).

Adanya logam berat di perairan berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yaitu sulit terurai, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai. Kandungan logam berat yang menumpuk pada air laut dan sedimen akan masuk ke dalam sistem rantai makanan dan berpengaruh pada kehidupan organisme (Said dkk, 2009).

Allah swt. berfirman QS Al Baqarah: 2/30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dari surah Al Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa kedudukan manusia dimuka bumi ini adalah sebagai khalifah dibumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Maka dari itu membuang limbah rumah tangga keperairan tidak lagi dilakukan dan mengingatkan kembali pada pengunjung yang hendak

mengunjungi pulau tersebut agar tidak membuang sampah sembarangan tempat demi menjaga ekosistem yang ada pada perairan pulau Lae-lae serta menimalisir kadar logam timbal.

Adapun saran agar ikan tidak tercemar yaitu dengan cara lebih memperhatikan kebersihan disekitar lingkungan terkhusus pada perairan pulau Lae-lae agar tidak lagi membuang limbah rumah tangga langsung keperairan dan memperhatikan wisatawan atau pengunjung yang hendak berkunjung di pulau Lae-lae untuk mengingatkan agar sampahnya tidak dibuang sembarangan tempat maupun keperairan langsung sehingga ekosistem dalam perairan tidak tercemar oleh logam timbal (Pb) yang sangat berbahaya sehingga dapat menimalisir kadar logam dalam perairan, apabila logam berat timbal (Pb) telah terakumulasi kedalam tubuh manusia ditambah lagi dalam jangka yang sudah cukup lama akan mengakibatkan penyakit akut maupun kronis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada stasiun I nilai kadar logam berat timbal (Pb) pada ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) bagian organ hati yaitu 3,124 mg/kg, daging yaitu 2,481mg/kg dan kulit yaitu 3,511 mg/kg. Sedangkan pada stasiun II kadar logam berat timbal (Pb) pada ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) bagian organ hati yaitu 3,429 mg/kg, daging yaitu 3,012 mg/kg dan kulit yaitu 3,630 mg/kg. Kandungan logam berat timbal (Pb) paling tinggi yang terletak pada stasiun I (Sebelah Timur) dan stasiun II (Sebelah Barat) yaitu pada organ kulit yaitu 3,511mg/kg dan 3,630 mg/kg. Kandungan logam berat timbal (Pb) terendah terletak pada organ daging yaitu 2,486 mg/kg dan 3,012 mg/kg. Stasiun I dan stasiun II kadar logam timbal (Pb) pada ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) bagian organ hati, daging dan kulit telah melewati ambang batas berdasarkan keputusan Standar Nasional Indonesia no. 7387/2009 ambang batas logam berat timbal (Pb) pada ikan dan olahannya adalah 2.0 mg/kg dan sudah tidak layak dikonsumsi.

B. Saran

1. Adapun saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan logam berat timbal (Pb) pada biota lainnya pulau Lae-lae.

2. Agar lebih memperhatikan kebersihan disekitar lingkungan terkhusus pada perairan pulau Lae-lae agar tidak lagi membuang limbah rumah tangga langsung keperairan sehingga ekosistem dalam perairan tidak tercemar oleh logam timbal (Pb).



KEPUSTAKAAN

- Achmad. R. Kimia Lingkungan. Jakarta: Universitas Yogyakarta, 2004.
- Adnan, S.J.S. "Determination Of Mercury, Arsenic, And Cadmium In Fish By Neutron Activation", *Journal of Radioanalytical Chemistry*. (1978). p. 44 -101.
- Affandi, R. dan U.M. Tang. Fisiologi Hewan Air. Pekanbaru Riau: UNRI Press, 2002.
- Agustina Titin. "Kontaminasi Logam Berat Pada makanan dan Dampaknya Pada Kesehatan". *Teknubuga* 2 no. 2 (April 2010). h. 53-65.
- Alamsyah. Distribusi Logam Berat Timbal (Pb) dan Kromium (Cr) Dalam Air muara Sungai Poboya. *Sripsi*. Palu: UNTAD Press, 2010.
- Alifia, F dan Djawad, M.I. 2000. Kondisi Histologi Insang dan Organ dalam Juvenil Ikan Bandeng (*Chanos Chanos Forskall*) yang Tercemar Logam Timbal (Pb). http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/sc_i_1_2/frida.pdf. (Diakses Tanggal 07 oktober 2016).
- Arsentina Panggabean. Logam Berat Pb (t Timbal) Pada Jeroan Sapi. Prosiding PPI Standardisasi, 2008.
- Ashshiddiqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementrian Agama RI, 2009.
- Budiman. *Dampak Eutrofikasi Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan*. PROSIDING KONFERENSI NASIONAL V: 365 – 377 (2006).
- Darmono. *Logam Dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Dokumentasi pribadi Morfologi ikan Baronang (*Siganus gutattus*), 2017.
- Dokumentasi pribadi Anatomi ikan Baronang (*Siganus gutattus*), 2017.
- Dokumentasi pribadi (Pulau Lae-lae), 2016.
- Faikha dan Khaerunnisa. Analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan barongang (*Siganus sp*). *Skripsi*. Makassar, 2015.
- H, Ghufuran, M dan K. Kordi . Budidaya Ikan Baronang. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- H, Ghufuran, M dan K. Kordi. Budidaya Ikan Laut Di Keramba Jaring Apung. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Haas, E.M. Cadmium Staying Healthy with Nutrition: *The Complete Guide Diet and Nutritional Nutrition Center*. San Rafael (1984) <http://www.healthy.net>. (13 Maret 2006).
- Hutagalung. P. Horas. Logam Berat Dalam Lingkungan Laut. Jakarta: Pusat Penelitian Ekologi, Lembaga Oseanologi Nasional - LIPI, 1984.
- Hamazah, Rispah. Muh Ruslan Umar dan Muhtadin Asnady Salam. Analisis kandungan logam timbal (Pb) pada *Caulerpa racemosa* (Forsskal) J. Agardh dari perairan pulau Lae-lae Makassar dan Laikang Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Makassar, 2015.
- Isnania. Analisis kandungan logam berat (Pb) pada ikan bandeng (*Channos channos*) dipertambang kecamatan Pangke Jene. *Skripsi*. Makassar, 2010.
- Karneli. Kandungan logam berat timbal (Pb) pada kerang kimia sisik disekitar pelabuhan feri Bira kabupateng Bulukumba. *Skripsi*. Makassar, 2010.
- Kepmen LH. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Deputi Menteri Lingkungan Hidup: Bidang Kebijakan dan Kelembagaan L.H, Jakarta, 2004.
- Khasanah, N. E. Adsorpsi logam berat. *Jurnal Oseana* 34 no. 4 (2009). h. 1-7.
- Kordi, M.G.H. Ekosistem Lamun (Seagrass); Fungsi, potensi dan Pengelolaan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Laporan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bandung, BPLH Kota Bandung, 2008.
- Lu, C.F. Toksikologi Dasar. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Lukman. "Distribusi Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Sendimen dan Organisme Pemakan Deposit (Deposit Feeder) diperairan Pantai Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Manik, N dan A. Syahailatua. Struktur Komunitas Ikan Padang Lamun Teluk Ambon Dalam. *Prosiding Seminar Kelautan LIPI UNHAS Ambon* (1997). h. 133-139.
- Marasabessy, M.D dan F.D.Hukom. Studi Pendahuluan Komunitas Ikan Padang Lamun di Teluk Ambon. Teluk Ambon II: Biologi, Perikanan, Oseanografi dan Biologi. Dalam Soemodihardjo et al (eds). BSL P3O-LIPI, Ambon (1989). h. 82 – 94.

- Napitupulu, Monang. *Analisis Logam Berat Seng, Kadmium, dan Tembaga Pada Berbagai Tingkat Kemiringan Tanah Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestasi dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*. Medan. 2008.
- Naria, Evi. Mewaspadai dampak bahan pencemar timbal (Pb) di lingkungan terhadap kesehatan. *Jurna Komunikasi Penelitian* vol. 17 (2005).
- Palar, Heryanto. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Rochyatun, E., Kaisupy, T.M., & Rozak, A. Distribusi logam berat dalam air dan sedimen di perairan muara sungai Cisadane. *Jurnal Makara, Sains* 10 no. 1 (2006). p. 35-40.
- Rusman. Analisis kandungan logam kromium (Cr) dan timbal (Pb) dalam Susiati, H., Arman, A., & Yarianto. (2009). Kandungan logam berat (Co,Cr, Cs, As, Sc, dan Fe) dalam sedimen di kawasan pesisir I semenanjung Muria. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir* 11 no, 1 (2010).
- Said, I., Jalaluddin, M. N., Upe, A., & Wahab, A.W. Penetapan konsentrasi logam berat krom dan timbal dalam sedimen estuaria sungai matangpondo Palu. *Jurnal Chemica* 10 no 2 (2009). h. 40–47.
- Sahetapy. Toksisitas logam berat timbal (Pb) dan pengaruhnya pada komsumsi oksigen dan respon dan respon hematologi juvenil ikan kerapu macan. *Thesis*. Pasca sarjana IPB Bogor, 2011.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Sitorus, H. Analisis beberapa karakteristik lingkungan perairan yang mempengaruhi akumulasi logam berat timbal dalam tubuh kerang darah di perairan pesisir timur Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia* 11 no. 1 (2004). h. 53-60.
- Sofyan Yatim, dkk. "Distribusi Logam Berat Dalam Air Laut Teluk Jakarta", *Majalah Batan XII* 3, 1979.
- Sumadiharga, O.K. Prospek budidaya ikan lalosi (*Caesio spp*) dan samandar (*Siganus spp*) di perairan pulau Ambon dan sekitarnya. *Lonawarta* 1. Thn VI. SPA-LON LIPI (1983). h. 11-22.

- Supriadi. "Analisis Pb dalam beberapa jenis ikan perairan suppa kabupaten Pinrang". *Skripsi*, 2005.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) no. 7387 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan, 2009.
- Susilawati. Penentuan kadar logam besi (Fe) dalam tepung gandum dengan cara destruksi basah dan destruksi kering dengan spektroskopi serapan atom (SSA). *Skripsi*. Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Tarigan, Z. Edward dan Rozak Abdul. Kandungan logam berat Pb Cd Cu Zn dan Ni dalam air laut dan sedimen muara sungai membramo Papua dalam kaitannya dengan kepentingan budidaya perikanan. *Jurnal Makara Sains* no. 3. Vol. 7(2003)
- Wilson. J. G. *The Biology of Estuarine Manajemen Croom Helm*. London, 1988.
- Yulaipi. Bioakumulasi logam berat timbal (Pb) dan hubungannya dengan laju pertumbuhan ikan mujair (*Oreochromis mossambicus*). *Skripsi*. Makassar, 2013.
- Yusuf, Y., & Murtini, T. J. Kandungan logam berat air laut, sedimen dan daging kerang darah (*Anadara granosa*) di perairan Mentok dan Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia* 12 no. 1 (2005). h. 27-32.
- Zulfikar. "Kandungan Timbal (Pb) pada air laut dan ikan Baronang tompel (*Siginus spinus*) diperairan pesisir kota Makassar. *Skripsi*. Makassar, 2003.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a stylized green emblem. It features a central archway with a smaller arch inside it. In the center of the inner arch is a gold-colored star containing the year '1965'. The entire emblem is set against a white background.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 Lokasi Pengambilan Sampel



Gambar Lokasi pengambilan sampel


Keterangan:

Stasiun I = Pengambilan sampel disebelah timur pulau Lae-lae.

Stasiun II = Pengambilan sampel disebelah barat pulau Lae-lae.

Lampiran 2

Diagram Alur Metode Penelitian



Lampiran 3 Perhitungan

A. Analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*)

1. Analisis kadar logam berat pada timbal (Pb) pada stasiun I (Sebelah Timur) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

$$IK_1 D1 = \frac{0,2474747 \times 100 \text{ ml}}{10,0480} = 2,462$$

$$IK_1 D2 = \frac{0,2575758 \times 100 \text{ ml}}{10,2984} = 2,501$$

$$IK_1 K1 = \frac{0,270202 \times 100 \text{ ml}}{7,9307} = 3,407$$

$$IK_1 K2 = \frac{0,3030303 \times 100 \text{ ml}}{8,3780} = 3,616$$

$$IK_1 H1 = \frac{0,30303 \times 100 \text{ ml}}{8,2921} = 3,654$$

$$IK_1 H2 = \frac{0,255051 \times 100 \text{ ml}}{9,8284} = 2,595$$

2. Analisis kadar logam berat pada timbal (Pb) pada stasiun II (Sebelah Barat) pada hati, daging dan kulit ikan Baronang tompel (*Siganus guttatus*) di pulau Lae-lae.

$$IK_2 D1 = \frac{0,2348485 \times 100 \text{ ml}}{10,2228} = 2,297$$

$$IK_2 D2 = \frac{0,25 \times 100 \text{ ml}}{10,2959} = 3,728$$

$$IK_2 K1 = \frac{0,3838384 \times 100 \text{ ml}}{10,3673} = 3,702$$

$$IK_2 K2 = \frac{0,3712121 \times 100 \text{ ml}}{10,3673} = 3,558$$

$$IK_2 H1 = \frac{10,4328}{6,2021} \times 100 \text{ ml} = 4,030$$

$$IK_2 H2 = \frac{0,224747 \times 100 \text{ ml}}{7,9458} = 2,828$$

B. Rata-rata logam berat timbal (Pb) pada hati, daging dan kulit pada ikan

Baronang tompel (*Siganus gutattus*) di pulau Lae-lae.

1. Titik I

$$2,462 + 2,501 + 3,407 + 3,616 + 3,654 + 2,595 = 2,436$$

2. Titik II

$$2,297 + 3,728 + 3,702 + 3,558 + 4,030 + 2,828 = 3,352$$



Lampiran 4 Observasi pulau Lae-lae sebagai tempat pengambilan sampel

1. Keadaan Pulau Lae-lae



2. Hasil wawancara dengan nelayan



3. Hasil tangkapan nelayan



Lampiran 5 Pengambilan sampel dilokasi

1. Alat yang digunakan




2. Stasiun I (Sebelah Timur) pengambilan sampel





3. Stasiun II (Sebelah Barat) pengambilan sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Lampiran 6 Tahap Dekstruksi

1. Proses pembersihan sampel



2. Proses pembedahan



2. Proses penimbangan sampel




5. Penambahan Aquabides 100 ml




6. Penambahan 5 ml HNO₃



7. Dipanaskan dari 150 ml menjadi 100m



8. Penambahan 1 ml HClO_4



9. Pemanasan kembali dari 100 ml menjadi 50 ml



10. Tahap filtrasi



Stasiun I
TIMUR



Stasiun II
BARAT

11. Disimpan dalam botol



Stasiun I
TIMUR



Stasiun II
BARAT

Lampiran 7 Tahap Pengujian SSA

1. Sterilisasi alat



2. Pembuatan larutan standar



3. Pengujian Spektrofotometri serapan atom (SSA)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Hardinawati. Lahir di Takalar, pada tanggal 30 Juni 1994 yang merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Baco. Dg. Maling dan Isa Dg. Sakking .

Adapun jenjang pendidikan yang telah dilalui di antaranya pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kajang No. 66 pada tahun 2001 hingga lulus 2007 . pada tahun 2007 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 MARBO hingga lulus pada tahun 2010. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 TAKALAR hingga lulus pada tahun 2013. Tahun 2013 hingga dengan penulisan Skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pada tahun 2016 tepatnya semester 7 penulis juga pernah menjadi Asisten Biologi Terapan.