

**PENENTUAN SUHU DAN WAKTU OPTIMUM PENYEDUHAN  
DAUN TEH HIJAU (*Camellia Sintesis L.*) P+2 TERHADAP  
KANDUNGAN ANTIOKSIDAN KAFEIN,  
TANIN DAN KATEKIN**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Penyelesaian Studi S1

Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K RAMLAH S A R  
60500113027

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah  
NIM : 60500113027  
Tempat/Tgl Lahir : Ujunugpandang/20 Juli 1995  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Villa Samata Sejahtera Blok A2.13 Samata-Gowa  
Judul : Penentuan Suhu dan Waktu Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis L*) P+2 Terhadap Kandungan Antioksidan Kafein, Tanin dan Katekin.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh batal menurut hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun

**RAMLAH**  
**NIM. 60500113027**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penentuan Suhu dan Waktu Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau P+2 (*Camellia Sinensis* L) Terhadap Kandungan Antioksidan Kafein, Tanin dan Katekin" yang disusun oleh RAMLAH, NIM: 60500113027, mahasiswa Jurusan Kimia di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, Agustus 2017 M  
3 Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: H. Asri Saleh, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisyi I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. D	(.....)
Munaqisyi II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisyi III	: Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Muh. Qaddafi, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa tercurahkan dalam setiap proses yang dilewati selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw sebagai suri tauladan menuju cahaya Ilahi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang selama ini telah memberikan motivasi dan dukungan penuh dalam mengkaji ilmu agama dan mengkaji berbagai ilmu serta melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Teruntuk saudara-saudaraku yang selalu mendukung setiap langkah, keputusan serta memberikan dorongan untuk selalu bisa mengakses pendidikan.

Terimah kasi pula kepada dosen pembimbingku, ibunda Dra. Sitti Chadijah, M.Si dan ayahanda Dr. H. Qaddafi, S.Si., M.Si yang tidak hanya membimbing, memotivasi, memberikan arahan dan tuntunan dalam proses penyusunan skripsi. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, Aisyah, S.Si., M.Si, Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag, Selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Khususnya seluruh dosen pengajar di Jurusan Kimia.

6. Segenap Laboran, Ismawanti, S.Si., Nuraini, S.Si., Awaluddin Iwan Perdana, S.Si , Fitriani, S.Si., S.Pd., Nurahma, S.Si dan Ahmad Yani, S.Si., yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
7. Usman, S.Si., M.Si dari laboratorium Forensik POLRI yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
8. Kakak Ira selaku staf dan operator Jurusan Kimia.
9. Sahabat sekaligus partner penelitianku (Hj.Musdalifah dan Nurul Mutmainnah) yang tiada hentinya untuk saling mensupport dan memotivasi satu sama lain. Saling berbagi pengalaman dan ilmu serta menjadi partner penelitian yang sangat luar biasa. Terimah kasih atas segala pengalaman baik suka dan duka yang telah kita lewati bersama. Don't think to be the best but think to do the best and do your best.
10. Teman- teman angkatan 2013 yang sejak awal telah menjadi kawan berbagi dalam menuntut ilmu, serta berbagi pengalaman suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada semua pihak pembaca, apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang tidak berkenang atau kurang dipahami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.


Samata-Gowa, Agustus 2017

**PENULIS**

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv-v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi-vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10-35</b>
A. Sejarah Teh ( <i>Camellia sinensis</i> L).....	10
B. Taksonomi Teh.....	11
C. Jenis-Jenis Teh dan Proses Pengolahannya.....	15
D. Kode Pemetikan Teh.....	18
E. Kandungan Teh.....	19
1. Kafein.....	23
2. Tanin.....	25
3. Katekin.....	26
F. Antioksidan.....	29
G. Metode DPPH.....	33
H. Manfaat Teh.....	33
I. Instrumen UV-VIS.....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36-43</b>
A. Waktu dan Tempat .....	36
B. Alat dan Bahan .....	36
C. Prosedur Kerja.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44-64</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Kandungan Alami Setiap 1 Gram Daun Teh.....	21
<b>Tabel 2.2</b> Konsentrasi Mineral Pada Daun Teh.....	22
<b>Tabel 2.3</b> Kandungan Kafein .....	23
<b>Tabel 4.1</b> Uji Kualitatif Senyawa Kafein, Tanin dan Katekin .....	45
<b>Tabel 4.2</b> Analisis Kadar Kafein, Tanin dan Katekin .....	47



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Teh ( <i>Camellia Sinensis L</i> ) .....	11
<b>Gambar 2.2</b> Teh Hitam .....	16
<b>Gambar 2.3</b> Teh Hijau .....	17
<b>Gambar 2.4</b> Teh Oolong .....	17
<b>Gambar 2.5</b> Teh Putih.....	18
<b>Gambar 2.6</b> Struktur Kafein .....	24
<b>Gambar 2.7</b> Struktur Tanin .....	26
<b>Gambar 2.8</b> Struktur Katekin .....	28
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Reaksi Kompleks Kafein dengan $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ .....	52
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Reaksi Kompleks Tanin dengan $\text{FeCl}_3$ .....	53
<b>Gambar 4.3</b> Struktur Reaksi Kompleks Katekin dengan $\text{FeCl}_3$ .....	54
<b>Gambar 4.4</b> Struktur Reaksi Kafein .....	55
<b>Gambar 4.5</b> Suhu dan Waktu Penyeduhan terhadap Kadar Kafein.....	56
<b>Gambar 4.6</b> Suhu dan Waktu Penyeduhan terhadap Kadar Kadar Tanin	59
<b>Gambar 4.7</b> Suhu dan Waktu Penyeduhan terhadap Kadar Katekin.....	60
<b>Gambar 4.8</b> Suhu Penyeduhan yang Baik Yaitu Pada Suhu 70/10 menit	61
<b>Gambar 4.9</b> Reaksi Pnenetralan Radikal DPPH oleh Senyawa Tanin ..	63
<b>Gambar 4.9</b> Reaksi Penetralana Radikal DPPH oleh Senyawa Katekin	64

## ABSTRAK

**Nama : Ramlah**  
**NIM : 60500113027**  
**Judul : Penentuan Suhu dan Waktu Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L) P+2 Terhadap Kandungan Antioksidan Kafein, Tanin dan Katekin.**

---

Teh hijau (*Camellia Sinensis* L) P+2 merupakan minuman herbal yang memiliki aktivitas antioksidan. Di mana dalam daun teh P+2 terdapat senyawa kafein, tanin dan katekin. Khasiat antioksidan dan dampak yang berbahaya dalam mengkonsumsi teh tergantung dari proses penyeduhannya. Penentuan suhu dan waktu optimum penyeduhan teh terhadap kandungan aktivitas antioksidan kafein, tanin, dan katekin memiliki waktu optimum yang berbeda-beda. Suhu dan waktu optimum penyeduhan teh terbaik pada penelitian ini ditinjau berdasarkan kandungan kadar dari ketiga senyawa tersebut melalui proses penyeduhan. Proses penyeduhan dilakukan dengan metode ekstraksi biasa menggunakan pelarut air. Sehingga diperoleh suhu dan waktu optimum untuk kafein pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit sebesar 1,2393%, tanin yaitu pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit diperoleh sebesar 3,506%, sedangkan katekin pada 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit sebesar 2,3000%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suhu dan waktu optimum penyeduhan teh terbaik (rendah kafein) yaitu pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 10 menit diperoleh aktivitas antioksidan dengan metode DPPH sebesar 78,85% yang dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kandungan kafein suatu teh maka semakin bagus aktivitas antioksidannya.

**Kata kunci:** Teh hijau, metode ekstraksi, UV-VIS, DPPH tanin, kafein katekin dan antioksidan

## ABSTRACT

**Name : Ramlah**

**NIM : 60500113027**

**Title : Determination of Optimum Time Temperature and Leaf Green Tea (Camellia Sinensis L) P + 2 on Antioxidant Caffeine, Tanin and Catechin.**

---

Green tea (Camellia Sinensis L) P + 2 is an herbal drink that has antioxidant activity. Where in P + 2 tea leaves there are compounds of caffeine, tannins and catechins. Efficacy of antioxidants and harmful effects in consuming tea depends on the brewing process. Determination of temperature and optimum time of tea brewing on the content of caffeine, tannin antioxidant activity, and catechins have different optimum time. The best temperature and optimum time of tea brewing in this study was reviewed based on the content of the three compounds through the brewing process. The brewing process is carried out by the usual extraction method using a water solvent. So that the optimum temperature and time for caffeine at 85 °C with 5 min up time of 1,2393%, tannin at 85 °C with 5 minutes of brewing time is 3,506%, while catechin at 100 °C with 5 minutes of brewing time 2.3000%. Based on research that has been done, the best temperature and optimum time of best tea brewing (low caffeine) that is at 70 °C with 10 minutes of brewing time is obtained by antioxidant activity with DPPH method equal to 78,85% analyzed by UV-VIS spectrophotometer. So it can be concluded that the lower the caffeine content of a tea the better the antioxidant activity.

**Keywords:** Green tea, extraction method, UV-VIS, tannin DPPH, catechin caffeine and antioxidants

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara penghasil dan pengeksport teh utama di dunia. Teh (*Camellia sinensis*. L) merupakan minuman non alkohol yang banyak diminati oleh masyarakat. Minuman teh dibuat dari pucuk muda (P+2) yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Daun teh (P+2) merupakan pucuk peko dengan dua daun mudah dibawahnya yang mengandung khasiat serta manfaat bagi kesehatan tubuh dari berbagai jenis penyakit.

Berbagai cara telah dilakukan dalam upaya menurunkan resiko penurunan fungsi organ tubuh dari penyakit dan penuaan dini yang disebabkan oleh radikal bebas akibat induksi MSG. Pemberian antioksidan dapat menurunkan jumlah produksi radikal bebas di dalam tubuh. Berbagai macam antioksidan meliputi, superoksida dismutase, katalase, glutathion peroksidase, vitamin A, D, E dan C, namun penggunaan antioksidan tersebut masih terkendala oleh keterbatasan bahan dan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan berbagai cara pengembangan pengetahuan terhadap senyawa yang dapat menurunkan resiko radikal bebas dalam tubuh yang dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit.<sup>1</sup>

Berbagai jenis penyakit menyebabkan kondisi masyarakat saat ini cenderung memprihatinkan. Perubahan kondisi lingkungan serta adanya perubahan pola

---

<sup>1</sup>Reza Anindita, "Tri Retnaningsih Soeprbowati Dan Nanik Heru Suprati, Potensi Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L.) dalam Perbaikan Fungsi Hepar Pada Mencit yang Diinduksi Monosodium Glutamat (MSG)", *Buletin Anatomi dan Fisiologi* Vol. XX No. 2 (2012), h. 16.

konsumsi pangan yang terjadi di masyarakat.<sup>2</sup> Perubahan tersebut yaitu perubahan dari pola konsumsi pangan tradisional yang banyak mengandung pati (karbohidrat kompleks) dan serat menjadi pola konsumsi modern. Sehingga kandungan protein, lemak, gula dan garamnya tinggi.<sup>3</sup>

Akibatnya timbul berbagai jenis penyakit degeneratif diantaranya kegemukan, penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus, maupun kanker yang jumlah penderitanya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hingga muncul minuman teh hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu minuman yang dapat dijadikan sebagai minuman antioksidan yang dapat menghambat radikal.<sup>4</sup>

Teh hijau banyak dipasarkan dengan berbagai macam bentuk produk yang dapat mengatasi keberadaan radikal bebas di dalam tubuh, mulai dari produk minuman sampai suplemen makanan dengan berbagai kandungan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antikanker, antimikroba, menurunkan kolesterol darah, mengurangi gula darah, mencegah arthritis, mencegah kerusakan hati, mencegah gigi berlubang, mencegah resiko keracunan makanan, penurunan berat badan dan sebagai antioksidan.<sup>5</sup>

Antioksidan berkemampuan memperlambat atau mencegah oksidasi molekul lain. Reaksi oksidasi dapat menghasilkan radikal bebas dan memicu reaksi rantai

---

<sup>2</sup>Murdijati Gardjito dan Dimas Rahadian A.M, *Sejarah dan Tradisi Minum Teh Cara Benar Menyeduh dan Menikmati Khasiat Teh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h.25

<sup>3</sup>Dewi Indarwati, “Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Pengeringan dan Konsentrasi, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 4

<sup>4</sup>Nita Noriko, “Potensi Daun Teh (*Camelia Sinensiss*) dan Daun Anting-Anting (*Acalypha Indica* L) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella typhi*”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi* 2 No. 2 (Jakarta Selatan: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), h. 105

<sup>5</sup>Ajiaкса, *Teh Khasiat Dahsyat*, (Surabaya: Stomata, 2012), h, 1

panjang yaitu menyebabkan kerusakan sel tubuh. Sekarang ini, pemakaian antioksidan makin berkembang ke arah pengobatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah senyawa polifenol.<sup>6</sup>

Daun teh mengandung 30-40% polifenol yang sebagian besar dikenal dengan katekin, kafein dan tanin. Komposisi daun teh terkenal sangat kompleks. Lebih dari 400 komponen kimiawi yang sangat bermanfaat dan telah diidentifikasi pada daun teh.<sup>7</sup> Seperti halnya penciptaan tumbuhan Allah SWT telah menentukan dengan amat detail dan sempurna berbagai kandungan serta manfaat dari senyawa yang terkandung dalam setiap jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kandungan senyawa kimia secara umum telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Dimana Al-Qur'an telah menggariskan dan telah menerangkan bahwa alam semesta merupakan lukisan pengetahuan apabila manusia senantiasa berfikir dan mempelajari apa-apa yang terpampang di bumi secara realitas.<sup>8</sup> Khususnya terhadap tumbuhan dengan berbagai macam bentuk serta jenis dan manfaat yang terkandung di dalamnya.



---

<sup>6</sup>Dewi Indrawati,” Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* l.) dengan Variasi Pengeringan dan Konsentrasi, h. 3

<sup>7</sup>Titta H Sutarna, dkk., “Ahmad Ngadeni dan Resi Anggiani, Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L.) dan Madu Hitam (*Apis dorsata*) Sebagai Antioksidan”, *Jurnal Ilmia Farmasi* 1 No.1 (Cimahi: Universitas Jendral Achmad Yani, 2013), h. 2.

<sup>8</sup>Mehdi Golshani, *The Holy Qur'an and The Sciences of Nature* Terj. Agus Effendy, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an*, Edisi Baru (Bandung: Mizan, 2003), h. 26.

Sebagaimana dalam Q.S Al-An'nam /6: 99 berikut.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا  
مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.<sup>9</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan tersebut, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengelolah komposisi zat-zat tersebut untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon atau tumbuhan termasuk buah dan biji.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.140.

<sup>10</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cetakan 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 574

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan bukti–bukti yang kuat mengenai bioaktivitas dari polifenol teh hijau (P+2) dalam meningkatkan sistem imunitas, yaitu membantu proses fagositosis, meningkatkan sekresi INF- $\gamma$  dan respon proliferasi limfosit dalam tubuh.<sup>11</sup> Misalnya Senyawa katekin pada daun teh berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh dan juga mampu mencegah berkembangnya sel kanker. Katekin juga berperan dalam menentukan rasa, warna dan aroma pada teh.<sup>12</sup>

Pengamatan kandungan senyawa katekin dilakukan dengan mengekstrak sampel pucuk kering dengan air mendidih, kemudian ditambah *ethyl acetat*, lalu diinjek menggunakan HPLC dengan kadar tertinggi yaitu 16,44%. Selain itu, kandungan senyawa katekin dapat pula diketahui kadarnya dengan cara maserasi menggunakan pelarut organik etil asetat 95%. Adapun kadar katekin tertinggi diperoleh pada kondisi operasi suhu maserasi 60°C dengan waktu maserasi 6 jam yaitu sebesar 87,14%.<sup>13</sup> Hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa selain senyawa katekin senyawa polifenol lain seperti tanin, memiliki peran penting pada seduhan teh.<sup>14</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

---

<sup>11</sup>Anif Nur Artanti, dkk, “Pengaruh Pemberian Polifenol Teh Hijau Terhadap Sekres Nitrit Oksida (No) Sel Fagosit Pada Manusia”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2006), h. 2.

<sup>12</sup>Ara Rossi, *1001 Teh dari Asal Usul, Tradisi, Khasiat hingga Racikan Teh* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), h. 53.

<sup>13</sup> Desta Donna Putri Damanik, dkk., “Ekstraksi Katekin dari Daun Gambir dengan Metode Maserasi”, *Jurnal Teknik Kimia 2*, Vol. 3 (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara-Press, 2014), h. 10.

<sup>14</sup>Bambang Sriyadi, “Seleksi Klon Teh Assamica Unggul Berpotensi Hasil Dan Kadar Katekin Tinggi”, *Jurnal Penelitian Teh dan Kina 15*, Vol.1 (Bandung: Pasirjambu Pusat Penelitian Press, 2012), h. 2.

Pada tanaman teh kadar tanin paling tinggi terdapat pada pucuk teh, sehingga pucuk memiliki kualitas tinggi. Kandungan tanin dalam teh dapat digunakan sebagai pedoman mutu, karena tanin dapat memberikan cita rasa yang khas.<sup>15</sup>

Begitupun kandungan senyawa kafein. Kafein banyak terdapat pada kopi dan juga teh. Kafein dapat memberikan rasa segar dan mendorong kerja jantung manusia. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar akan memberikan efek yang buruk bagi kesehatan. Pengamatan tersebut dilakukan dengan meneliti pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap kadar kafein di dalam teh. Dimana kadar kafein tertinggi ditemukan pada suhu 100°C yaitu sebesar 31,280 mg/g dengan waktu ekstraksi 4 menit.<sup>16</sup> Selain itu, penelitian lain terkait kadar kafein tertinggi yaitu diperoleh pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 10 menit diperoleh kadar kafein sebesar 0,124%.<sup>17</sup>

Proses penyeduhan merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dengan menggunakan pelarut air. Perlu diketahui bahwa proses ini sangatlah penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas khusus masyarakat yang senang mengkonsumsi minuman herbal seperti teh. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyeduhan yaitu faktor suhu dan waktu penyeduhan. Semakin tinggi suhu air maka kemampuan air untuk mengekstrak senyawa kimia yang terkandung di dalam teh akan semakin tinggi. Demikian pula dengan waktu atau lama penyeduhan. Waktu akan sangat berpengaruh terhadap kadar kandungan bahan kimia yang terlarut,

---

<sup>15</sup>J.B. Harborne, *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, terj. Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro, *Phytochemical Methods* (Bandung: ITB, 1987), h. 102-103.

<sup>16</sup>Dianita Devi Putrid an Ita Ulvi, "Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kadar Kafein dalam Teh Hitam", *Jurnal Sains dan Seni ITS* 2, Vol. 3 (Surabaya: ITS-Press, 2015), h. 105.

<sup>17</sup>Dwi Rahayuningsih, "Pengaruh Suhu dan Waktu Penyeduhan Teh Celup Terhadap Kadar Kafein", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta-Press, 2014), h. 3.

intensitas warna serta aroma teh yang akan dikonsumsi. Teknik penyeduhan cukup bermanfaat menghasilkan senyawa antioksidan secara maksimal. Proses penyeduhan tersebut berfungsi mempertahankan kualitas senyawa yang kita inginkan. Sehingga tidak terjadi degradasi terhadap kandungan senyawa kimia teh.<sup>18</sup>

Menurut SNI 01-1902 tahun 2000 bahwa syarat minimal kandungan kimia yang dapat larut dalam air adalah sekitar 32%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penyeduhan memiliki peranan yang cukup besar terhadap kualitas minuman teh. Misalnya terhadap warna dan rasa seduhan teh yang dihubungkan terhadap kemampuan air untuk mengekstrak komponen senyawa pada teh.<sup>19</sup> Dari uraian diatas maka terdapat beberapa permasalahan terkait kondisi masyarakat era modern khususnya terhadap proses penyeduhan teh yang tidak terlalu dipahami, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Penentuan Suhu dan Waktu Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L) P+2 Terhadap Kandungan Antioksidan Kafein, Tanin dan Katekin”. Kiranya dapat memberikan informasi lebih kepada masyarakat luas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan terkait judul penelitian, diantaranya:

1. Berapa suhu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan senyawa kafein, tanin dan katekin ?
2. Berapa waktu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan senyawa kafein, tanin dan katekin ?

---

<sup>18</sup>Ajisaka, *Teh Khasiatnya Dahsyat*, Surabaya: Stomata, 2012 h. 28

<sup>19</sup> Ajisaka, *Teh Khasiatnya Dahsyat*, Surabaya: Stomata, h. 30-31

3. Bagaimana aktivitas antioksidan pada suhu dan waktu optimum penyeduhan teh hijau P+2 ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menentukan suhu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan kafein, tanin dan katekin.
2. Untuk menentukan waktu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan kafein, tannin dan katekin.
3. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan terhadap suhu dan waktu optimum penyeduhan teh hijau P+2.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi ilmiah terkait suhu dan waktu optimum penyeduhan terhadap aktivitas antioksidan teh hijau. Sehingga masyarakat dapat mengetahui suhu dan waktu penyeduhan teh yang baik, agar kandungan senyawa metabolit sekunder (Kafein, tanin dan katekin) memberikan efek yang baik bagi kesehatan.
2. Untuk memberikan informasi terhadap instansi baik pemerintah maupun industri yang berkaitan dengan produksi minuman yang baik bagi kesehatan. Agar pada plastik kemasan atau pembungkus teh dapat dicantumkan proses penyeduhan sesuai dengan suhu dan waktu penyeduhan teh yang baik.

3. Untuk memberikan dan meningkatkan kajian pengetahuan atau keilmuan. Agar mahasiswa juga dapat mengembangkan penelitian tentang teh yang lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan berbagai informasi ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Sejarah Teh (Camelia Sinensis. L)***

Cerita legenda terkait sejarah awal ditemukannya tanaman teh. Cerita tersebut menggambarkan kisah seorang raja China yang sedang melakukan perjalanan dalam sebuah hutan, raja tersebut menyempatkan diri beristirahat setelah melewati perjalanan yang cukup panjang. Mereka beristirahat sambil memanaskan minuman. Secara tiba-tiba sehelai daun masuk dalam air tersebut. Pada saat sang raja meminum minuman lalu merasakan kesegaran dari air minum tersebut. Maka sejak kejadian tersebut dikenalah minuman teh di China. Tanaman teh didokumentasikan pada masa kepemimpinan raja Han. Tanaman teh ditanam secara independen oleh para birawan dan diberi nama “ch”a. Tanaman teh tersebut disebar di beberapa negara. Salah satunya adalah negara Indonesia.<sup>1</sup>

Tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684, kemudian pada tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam untuk melengkapi koleksi tanaman Kebun Raya di Bogor dan pada tahun 1827 ditanam di Kebun Percobaan Cisarupan, Garut, Jawa Barat. Adapun jenis teh yang masuk ke Indonesia (Jawa) *Assam* berasal dari Sri Lanka (*Ceylon*). Masuknya teh *Assam* tersebut ke Indonesia, secara berangsur tanaman teh China diganti dengan teh *Assam*. Sejak itu pula perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Soehardjo, Dkk, " *Vademecum Bidang Tanaman Teh PT. Perkebunan Nusantara IV* "( Bah Jambi, Pematang Siantar, 1996), h.2

<sup>2</sup>Dian Sharaswati, "Analisis Produktivitas Teh (*camellia sinensis (L) o. kuntze*) di PT. Pagilaran, Batang, Jawa Tengah", *Skripsi*, (Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian, 2008), h. 17.

Perkembangan tanaman teh diberbagai negara menyebabkan timbulnya nama nama yang berbeda pula. Teh di negara China dikenal dengan istila “ch”a, di India “tsch”, di Jepang “cha”, dan di Rusia “caj”. Sedangkan dalam bahasa Inggris “tea” dan dalam bahasa Jerman yaitu “tee”. Pada awal sejarah di Eropa, minuman teh disebut dengan “cha” di Inggris, Belanda dan Portugal. Kata “cha” pada akhir abad ke 17 berubah menjadi “tay” dan tidak lama kemudian menjadi “tee” dan “tea”. Beberapa negara memiliki waktu penyeduhan yang berbeda-beda. Selain itu, tanaman teh juga memiliki taksonomi dalam ilmu biologi tumbuhan.<sup>3</sup>

### **B. Taksonomi Teh (*Camelia Sinensis.L*)**

Teh adalah suatu tanaman yang berasal dari famili *theaceae*, memiliki daun berwarna hijau dengan tinggi pohon 10 - 15 meter di alam bebas dan tinggi 0,6 - 1,5 meter jika dibudayakan sendiri. Daun dari tanaman ini berwarna hijau muda dengan panjang 5 - 30 cm dan lebar sekitar 4 cm. Tanaman ini memiliki bunga yang berwarna putih dengan diameter 2,5 - 4 cm. Buahnya berbentuk pipih, bulat dan terdapat satu biji dalam masing-masing buah dengan ukuran sebesar kacang.<sup>4</sup>



**Gambar. 2.1** Teh (*Camelia Sinensiss L*)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Novianty, Syah Fitri, “Pengaruh Berat dan Waktu Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein dari Bubuk Teh”, h. 18.

<sup>4</sup>Biswas, K.P, “*Description Of Tea Plants*” In: Encyclopaedia Of Medicinal Plants, (New Delhi: Dominant Publisherers and Distributor, 2006), h.14

<sup>5</sup>Tuminah, S, “Teh *Camellia Sinensis* O.K *Asammica* (Mast) Sebagai Salah Satu Sumber Antioksidan”, (Tinjauan Pustaka: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departement Kesehatan RI No. 144: 52-54, 2004).

Tanaman diatas diduga berasal dari daerah pegunungan Himalaya dan daerah-daerah pegunungan yang berbatasan dengan RRC, India dan Birma. Hingga saat ini tanaman teh telah menyebar hampir keseluruhan dunia. Tanaman ini juga dapat ditanam didataran rendah sampai ketinggian 800 m dpl, dataran sedang 800-1.200 m dpl serta dataran tinggi yaitu diatas 1.200 m dpl. Kondisi yang dibutuhkan untuk tumbuh optimal dipengaruhi oleh curah hujan yaitu 2.000 mm/tahun, suhu udara 13-25°C dan kelembapan kurang dari 70%. Tanaman teh dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 6-9 meter.<sup>6</sup>

Semakin tinggi tempat tanaman menyebabkan kadar kafein semakin rendah. Terdapat pengaruh yang signifikan anantara perbedaan ketinggian tempat tanaman terhadap kadar kafein daun teh, hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa ketinggian tempat tanam berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan. Kadar kafein teh paling tinggi pada ketinggian 800 m dpl yaitu 185,194002 mg/gram sampel. Selain itu, kandungan metabolit sekundernya yang diperoleh dapat berbeda. Hal ini disebabkan karena varietas dalam taksonomi teh juga berbeda.<sup>7</sup>

Taksonomi teh dapat dilihat dan diketahui berdasarkan jenis atau varietas dari berbagai jenis teh yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

Superdivisi : Spermatophyta (tumbuhan biji)

Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)

---

<sup>6</sup>Murdijati, Gardjito dan Dimas, Rahadian A.M, *Sejarah dan Tradisi Minum Teh Cara Benar Menyeduh dan Menikmati Khasiat Teh*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 11.

<sup>7</sup>Anif Nur Artanti, dkk, “Perbedaan Kadar Kafein Daun Teh (*Camellia Sinensis* (L). Kuntze Berdasarkan Status Ketinggian Tempat Tanam dengan Metode HPLC”, *Journal Of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, (Surakarta: Universitas Celebes Mare Sirakarta, 01: 37-44, 2016), h. 42

<sup>8</sup>Tuminah, S, “Teh *Camellia Sinensis* O.K *Asammica* (Mast) Sebagai Salah Satu Sumber Antioksidan”, (Tinjauan Pustaka: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departement Kesehatan RI No. 144: 52-54, 2004), h. 2

Kelas : Dicotyledoneae (tumbuhan biji belah)

Sub Kelas : Dilleniidae

Ordo (bangsa) : Theales

Familia (suku) : Theaceae

Genus (marga): Camellia

Spesies (jenis) : *Camellia sinensis* L

Berdasarkan taksonominya teh memiliki bagian-bagian tumbuhan termasuk daun, batang, buah dan bijinya mengandung kandungan senyawa kimia dengan berbagai takaran atau ukuran sebagaimana di jelaskan dalam Q. S Al-Hijr/15: 19-20 berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾  
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

(19). Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran.

(20). Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.<sup>9</sup>

Dalam tafsir *Al-Muntakhab* sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab menegaskan suatu temuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan dilaboratorium yaitu setiap kelompok tanaman masing-masing memiliki kesamaan dilihat dari sisi luarnya demikian juga sisi dalamnya. Meskipun antara satu jenis dan lainnya dapat dibedakan akan tetapi semuanya dapat diklasifikasikan kedalam satu kelompok yang sama. Penggalan ayat 19 ( وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ) menerangkan bahwa

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.263.

Allah swt menumbuh kembangkan sesuai dengan takaran dengan anekah ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi setiap tanaman masa pertumbuhan dan penuaan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup dimuka bumi. Penggalan ayat 20 ( *وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ* ) yang berbicara tentang makhluk-makhluk Ilahi yang lemah dan bertebaran dibumi. Penggalan ayat ini menggaris bawahi bahwa Allah swt telah menyiapkan segala sesuatu guna kenyamanan hidup manusia dibumi (dianugrahi rezeki oleh Allah swt). Salah satu tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal yaitu minuman teh yang banyak digemari diberbagai negara.<sup>10</sup>

Teh pada umumnya banyak digemari di Eropa, bagian utara Amerika dan dibagian utara Afrika (kecuali Morocco).<sup>11</sup> Daun teh mengandung khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, salah satunya adalah sebagai antioksidan. Khasiat dari teh berasal dari kandungan bahan kimia yang terdapat dalam daun teh.<sup>12</sup> Hasil penelitian Simanjutak, menyatakan bahwa teh herbal mengandung antioksidan tertinggi pada suhu 85°C dengan lama pengeringan 180 menit, yaitu sebesar  $3,95 \times 10^{-34}$  ppm dan terendah 0,0876 ppm pengeringan 90°C.<sup>13</sup>

Teh juga mengandung banyak bahan-bahan aktif yang bisa berfungsi sebagai antioksidan maupun antimikroba. Teh hijau tidak mengalami proses atau tahap

---

<sup>10</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 438-439.

<sup>11</sup>Astri Dwi Ananda, “Aktivitas Antioksidan dan Karakteristik Organoleptik Minuman Fungsional Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) Rempah Instan”, *Skripsi*, (Bogor: Universitas Pertanian Institut Pertanian, 2009), h. 2.

<sup>12</sup>Lintang Ayu, dkk., “Pertumbuhan Hasil dan Kualitas Pucuk Teh (*Camellia Sinensis*(L.) Kuntze) di Berbagai Tinggi Tempat”, h. 2.

<sup>13</sup>Ida Rukyani, “Antioxidant Activity and Organoleptic Test Of Tea Bag Stem and Flower Of Kecombrang *With Variations Temperature Drying*”, *Skripsi* (Suryakarta: Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 7.

fermentasi. Teh hijau kerap digunakan untuk membantu proses pencernaan dan juga karena kemampuannya dalam membunuh bakteri.<sup>14</sup> Kandungan polifenol yang tinggi dalam teh hijau dimanfaatkan untuk membunuh bakteri-bakteri perusak dan juga bakteri yang menyebabkan penyakit di rongga mulut (penyakit *periodontal*). Jenis dan proses pengolahan teh juga sudah sangat beragam diberbagai industri.<sup>15</sup>

### **C. Jenis-jenis Teh dan Proses Pengolahannya**

Berdasarkan proses pengolahannya, produk teh dibagi menjadi empat jenis yaitu teh hijau, teh hitam, teh putih dan teh oolong. Dengan demikian, jenis teh memiliki varietas yang berbeda-beda. Varietas tersebut dibagi berdasarkan tempat tanaman tersebut ditemukan dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan jenis dan varietasnya.<sup>16</sup>

Semua jenis teh dihasilkan dari bahan baku yang sama yaitu tanaman teh yang dibudidayakan secara komersial terdiri dari dua varietas utama, yaitu *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze var. *sinensis* dan *Camellia sinensis* (Master) Kitamura var. *assamica*. *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze var. *sinensis* mempunyai daya tahan yang baik terhadap cuaca dingin maupun panas.<sup>17</sup> Varietas ini banyak dibudidayakan di China dan Jepang untuk membuat teh hijau. Sedangkan *Camellia sinensis* (Master)

<sup>14</sup>Oryza Sativa Daroini, “Kajian Pembuatan Teh Herbal dari Campuran Teh Hijau (*Camellia sinensis* L), Rimpang bangle (*Zingiber cassumunar* Roxb) dan Daun Cermay (*Phyllanthus acidus* (L) *Skeels*), Skripsi, (Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, 2006), hal.18.

<sup>15</sup>Tuminah, Teh *Camellia Sinensis* O.K *Asammica* (Mast) Sebagai Salah Satu Sumber Antioksidan” S, h. 2

<sup>16</sup>B.A Martinus, dkk., “Perbandingan Kadar Fenolat Total dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Daun Teh (*Camellia Sinensis* [L.] O.K.) dari Kayu Aro dengan Produk Teh Hitamnya yang Telah Beredar”, h.75.

<sup>17</sup> Dewi Anjasari Intan Ratna., dkk.,” Pengaruh Kombinasi Pupuk dan Kompos Terhadap Pertumbuhan Tanaman Teh (*Camellia Sinensis* (L) O. Kuntze) Belum Menghasilkan Klon Gambung 7. *Skripsi* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2007), h.1

Kitamura *var. assamica* mempunyai produktivitas dan kualitas yang lebih baik. Varietas ini banyak dibudidayakan di negara-negara produsen teh seperti India, Srilanka, Kenya dan Indonesia. Dengan berbagai macam proses pengolahan.<sup>18</sup>

Berdasarkan bentuk fisiknya dan proses pengolahannya teh dibedakan menjadi tiga jenis, diantaranya:

1. Teh hitam merupakan hasil pengolahan pucuk daun teh yang mengalami tahap fermentasi, melalui tiga jenis tahapan, diantaranya tradisional, konvensional dan modern. Selain itu, proses pengolahannya dimulai dari pengangkutan pucuk segar, pelayuan, penggilingan dan sortasi basa, fermentasi, pengeringan, sortasi kering, penyimpanan serta pengemasan.<sup>19</sup>



Gambar 2.2 Teh Hitam<sup>20</sup>

2. Teh hijau merupakan hasil pengolahan teh tanpa melalui teknik fermentasi, sekedar melalui proses pengeringan daun setelah dipetik. Tahapan pengolahannya dimulai dari pelayuan, penggilingan, pengeringan sortasi dan grading serta pengemasan. Metode paling umum digunakan adalah metode penguapan sebelum dikeringkan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Dadan Rohdiana, "Proses, Karakteristik dan Fungsional Teh", *Jurnal Foodrevie Indonesia* X No. 8, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Kina, 2015), h. 35

<sup>19</sup> Marisi Silaban, "Pengaruh Jenis Teh dan Lama Fermentasi Pada Proses Pembuatan Teh Kombucha", *Skripsi USU Repotary* (Sumatera Utara: Departemen Teknologi Pertanian, 2005), h.7-9.


<sup>20</sup> Oryza Sativa Daroini, "Kajian Proses Pembuatan Teh Herbal Dari Campuran Teh Hijau (*Camellia Sinensis*), Rimpang Bangle (*Zingiber Cassumunar* Roxb.) Dan Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus* (L.) Skeels.)", h. 5.

<sup>21</sup> Sandiantoro, *Teh Khasiatnya Dahsyat*, 2012, h. 13-14



**Gambar 2.3** Teh Hijau<sup>22</sup>

3. Teh oolong merupakan daun teh yang telah dilayukan kemudian dipanaskan dengan panas api atau udara, difermentasi terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling, setelah itu dilakukan proses penggulungan yang berfungsi untuk menghentikan proses fermentasi.<sup>23</sup>



**Gambar 2.4** Teh Oolong<sup>24</sup>

4. Teh putih merupakan selaput lapisan berwarna putih lempengan putih yang terbuat dari kuncup teh atau daun teh yang belum mekar. Jenis teh ini merupakan jenis teh yang langkah sekaligus paling mahal di dunia. Teh putih terbaik dibuat dari tunas dan dua daun teh termuda. Teh ini dihasilkan dari pucuk daun teh yang tidak mengalami proses oksidasi dan sebelum dipetik teh ini dilindungi dari sinar matahari untuk mencegah pembentukan klorofil. Proses produksinya dilakukan secara tradisional

---

<sup>22</sup>Oryza Sativa Daroini, “Kajian Proses Pembuatan Teh Herbal Dari Campuran Teh Hijau (*Camellia Sinensis*), Rimpang Bangle (*Zingiber Cassumunar Roxb.*) dan Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus* (L.) Skeels.)”, h. 5.

<sup>23</sup> Marisi Silaban, “Pengaruh Jenis Teh dan Lama Fermentasi Pada Proses Pembuatan Teh Combucha”, h.7-9.

<sup>24</sup>Oryza Sativa Daroini, “Kajian Proses Pembuatan Teh Herbal Dari Campuran Teh Hijau (*Camellia Sinensis*), Rimpang Bangle (*Zingiber Cassumunar Roxb.*) Dan Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus* (L.) Skeels.)”, h. 5.

hanya meliputi pelayuan dan pengeringan segera setelah proses pemetikan dilakukan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu terhadap kualitas kandungan senyawa antioksidan dalam teh.<sup>25</sup>



**Gambar 2.5** Teh Putih<sup>26</sup>

Berdasarkan proses produksinya dapat diketahui bahwa salah satu faktor penentu kualitas dari suatu produk teh yaitu berdasarkan kode pemetikannya. Dimana kode pemetikan ini memiliki peranan penting dalam penentuan jumlah dan kualitas senyawa metabolit sekunder yang terkandung didalam teh.

#### **D. Kode Pemetikan Teh**

Parameter penentu kualitas teh ialah kode pemetikan dari variabilitas karakter dari fenotipik suatu tanaman. Untuk karakter hasil perdu, jumlah peko dan jumlah pucuk burung menunjukkan variabilitas yang cukup luas. Sedangkan karakter bobot P+3, P+2 dan bobot pucuk burung tergolong sempit. Kode pemetikan berperan dalam penentuan bobot senyawa metabolit sekunder yang terkandung didalam berbagai jenis teh, seperti teh hijau, hitam dan teh oolong.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sandiantoro, *Teh Khasiatnya Dahsyat*, 2012, h. 18-19

<sup>26</sup>Oryza Sativa Daroini, “Kajian Proses Pembuatan Teh Herbal Dari Campuran Teh Hijau (*Camellia Sinensis*), Rimpang Bangle (*Zingiber Cassumunar* Roxb.) Dan Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus* (L.) Skeels.)”, h. 5.

<sup>27</sup>Heri Syahriani Khomael dan bambang Sriyadi, “Variabilitas dan Seleksi Awal Populasi Tanaman Teh Hasil Persilangan Buatan”, *Jurnal* (Bandung: Pusat Penelitian Teh dan Kina Gmbung), 2011, h. 74-75.

Daun teh yang sudah diolah menjadi teh hijau, teh hitam, teh oolong atau teh wangi dapat dikelolah lebih lanjut menjadi beragam jenis produk yang dapat dikonsumsi. Menurut cara penyeduhannya teh dalam pemetikan, memiliki rumus tertentu seperti P+2 yang memiliki arti pucuk peko dan dua daun muda di bawahnya. P+3 memiliki arti pucuk peko dan tiga daun muda di bawahnya. B+1 memiliki arti memetik pucuk burung dan satu daun muda dibawahnya. B+2 memiliki arti pucuk burung dan dua daun muda di bawahnya.<sup>28</sup>

#### **E. Kandungan Teh (*Camelia Sinensis*.L)**

Teh menghasilkan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, triterpenoid. Komposisi bahan aktif dalam daun teh lainnya adalah kafein, theophylline, theobromine, lemak, saponin, minyak esensial, karoten, vitamin C, A, B1, B2, B12, P. Kandungan metabolit sekunder pada daun teh akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia tanaman dan proses pengolahannya.<sup>29</sup>

Teh memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat mengalami proses perubahan-perubahan secara kimiawi selama proses pengolahannya. Sehingga pelaku industri harus mengetahui hal tersebut terutama pelaku industri teh misalnya para petani dan pengusaha teh.<sup>30</sup> Dengan demikian, produk teh yang dihasilkan memiliki tingkatan produksi dengan cita rasa dan aroma serta memiliki khasiat yang lebih khas. Hal tersebut akan meningkatkan mutu dan kualitas dari produk teh sehingga dapat

---

<sup>28</sup> Murdijati Gardjito dan Dimas Rahadian A.M, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 20.

<sup>29</sup>Nita Noriko, “Potensi Daun Teh (*Camelia Sinensis*) dan Daun Anting-Anting (*Acalypha Indica* L) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella typhi*”, h. 106

<sup>30</sup>Triva Murtina Lubis, dkk, “Pengaruh Pemberian Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* L.) Terhadap Penurunan Kadar Hemoglobin dan Nilai Hematokrit Pada tikus Wistar (*Rattus norvegicus*)”, *Jurnal Medika Veterinaria*, 2, Vol. 10 (2016), hal. 141.

bersaing dengan teh produksi luar negeri dengan kandungan metabolit yang lebih bagus.<sup>31</sup>

Kandungan senyawa-senyawa metabolit sekunder dalam teh hijau sangatlah kompleks yaitu protein (15-20%); asam amino seperti tanin, asam aspartat, tirosin, triptofan, glisin, serin, valin, leusin, arginin (1-4%); karohidrat seperti selulosa, pektin, glukosa, fruktosa, sukrosa (5-7%); lemak dalam bentuk asam linoleat dan asam linolena.<sup>32</sup> Sterol dalam bentuk stigmasterol dan teofilin, pigmen seperti karotenoid dan klorofil; senyawa volatil seperti aldehida, alkohol, lakton, ester dan hidrokarbon; mineral dan elemen-elemen lain seperti Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, Se, Na, P, Co, Sr, Ni, K, F dan Al (5%) serta kandungan senyawa alami lainnya.<sup>33</sup>

Daun teh mengandung komponen senyawa volatil sebanyak 404 macam pada teh hitam dan sekitar 203 pada teh hijau. Komponen senyawa volatil tersebut berfungsi untuk memberi cita rasa yang khas pada minuman teh. Komponen aktif yang terkandung dalam teh baik yang volatil maupun nonvolatil seperti polifenol, alkaloid maupun flavonoid merupakan komponen penting pada daun teh karena kandungan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, teh mengandung senyawa-senyawa alami lain.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Juniaty Towaha dan Balittri, "Kandungan Senyawa Kimia Pada Daun Teh (*Camelia Sinensis*)", *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri* Vol. 19 No. 3 (2013), h. 1.

<sup>32</sup>SR, Senthilkumar, dkk., "Gas Chromatography-Mass Spectroscopy Evaluation Of Bioactive Phytochemical Of Commercial Green Teas (*Camellia Sinensis* L) Of Indian", *Asian Journal Of Pharmaceutical and Clinical Research* 8 No. 3 (2015), h.278.

<sup>33</sup>Tuminah, "Teh (*Camelia Sinensis* L)", h. 2-3

<sup>34</sup>Heroniaty, "Sintesis Senyawa Dimer Katekin dari Ekstrak Teh Hijau dengan Menggunakan Katalis Enzim Peroksidase dari Kulit Bawang Bombay (*Allium cepa* L.)", hal. 8

Ada banyak kandungan senyawa alami dalam teh. Untuk mengetahui lebih detail perhatikan tabel berikut ini:<sup>35</sup>

**Tabel 2.1** Kandungan Alami Setiap 100 gram Daun Teh

No	Kandungan Alami Teh	Besarnya
1	Kalori	17 KJ
2	Air	75-80%
3	Polifenol	10-25%
4	Protein	20%
5	Karbohidrat	4%
6	Kafein	2,5-4,5%
7	Serat	27%
8	Pectin	6%
9	Vitamin E	25-70%
10	Vitamin K	300-500 IU/g
11	Vitamin C	150-259%
12	B-Carotene	13-20%
13	Asam Tanin	9-20%
14	Kalium	1795 mg%

Berdasarkan hasil penelitian oleh PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) teh selain mengandung senyawa metabolit sekunder seperti polifenol (23-25%).<sup>36</sup> Teh juga mengandung beberapa komponen penting yang memiliki banyak manfaat bagi

<sup>35</sup>Sofyan Tsauri, *1001 Teh dari Asal Usul, Tradisi, Khasiat, Hingga Racikan Teh*, Yogyakarta: CV ANDI OFESET, 2012, h.51

<sup>36</sup>Khoirina Dwi Nugrahaningtyas, "Isolasi Senyawa Flavonoid dalam Rimpang Temu Ireng (*Curcuma aeruginosa* Roxb.) *Jurnal Biofarmasi* 3, Vol. 1 (2005), hal. 33.

kesehatan seperti metilxantin, asam amino, peptida, karbohidrat, vitamin K, karetenoid dan berbagai jenis mineral-mineral yang juga sangat bermanfaat seperti kalium, magnesium, mangan, flour, zinc, selenium, copper, iron, kalsium dan alkaloid lainnya.<sup>37</sup> Kandungan produk teh memiliki konsentrasi mineral yang berbeda-beda.<sup>38</sup>

Adapun konsentrasi mineral pada daun teh dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Konsentrasi mineral pada daun teh<sup>39</sup>

No	Mineral ( $\mu g$ )	Daun Muda	Daun Tua	Batang Muda	Kulit Tipis	Akar
1	Aluminium	400	5813	541	497	1693
2	Boron	19	18	12	6	6
3	Barium	11	49	28	25	20
4	Kalsium	3,70	11	2,70	3,00	1,90
5	Cadmium	0,10	1,02	0,20	0,05	0,20
6	Kobalt	2,30	3,40	8,50	3,90	7,40
7	Krom	1,00	2,00	1,30	0,20	0,90
8	Tembaga	127	66	136	42	31
9	Besi	89	138	302	164	295
10	Kalium	21,50	12,40	10,00	5,50	8,30
11	Magnesium	1,90	1,70	0,90	0,60	1,40
12	Mangan	174	489	177	128	88
13	Nitrogen	41,50	32,00	13,70	10,40	10,60

<sup>37</sup>Mei Ambar Sari, “Aktivitas Antioksidan Teh Daun Alpukat (*Persea americana* Mill) dengan Variasi Teknik dan Lama Pengeringan”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hal. 6.

<sup>38</sup>Evy Damayanthi, dkk., “Studi Tentang Kandungan Katekin dan Turunannya Sebagai Antioksidan Alami serta Karakteristik Organoleptik Produk Teh Murbei dan Teh Kamelia-Murbei”, *Media Gizi dan Keluarga* 32 No. 1 (Gambang: Dept. Gizi Masyarakat, 2008), h. 96

<sup>39</sup>Ari Rossi, *1001 Teh dari Asal Usul, Tradisi, Khasiat, Hingga Racikan Teh*, Yogyakarta: CV ANDI OFESET, 2012, h.51

## 1. Kafein( $C_8H_{10}N_4O_2$ )

Kafein merupakan produk sekunder dari proses metabolisme tanaman, semakin tinggi laju fotosintesis maka kafein yang dihasilkan akan semakin tinggi, pada ketinggian 800 m dpl diperoleh kadar kafein sebesar 559,353834 mg/g. Hal ini dapat disebabkan karena pada ketinggian tersebut, intensitas cahaya matahari masih tinggi dan suhu uadaranya juga tinggi. Jika intensitas cahaya matahari tinggi maka proses fotosintesis akan berjalan maksimal, sehingga kadar metabolit sekunder yang dihasilkan juga maksimal. Pada ketinggian 1200 m menunjukkan kadar kafein paling rendah yaitu 186,194022 mg/g sampel.<sup>40</sup> Selain itu, di dalam teh juga terdapat zat kafein yang berbeda-beda sesuai dengan jenis produk teh. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.<sup>41</sup>

**Tabel 2.3** Kandungan Kafein


Produk	Kafein (mg)
Teh Hitam	20-90
Teh Oolong	10-45
Teh Hijau	6-30
Teh Instan	10-5

Jumlah kafein dalam tanaman teh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tempat tumbuh, umur tanaman, umur daun, panjang musim tanaman, kondisi lapangan, nutrisi tanah, curah hujan dan hama tanaman. Akan tetapi proses produksi teh lebih mempengaruhi kandungan kadar kafein jika dibandingkan faktor yang

<sup>40</sup>Anif Nur Artanti, dkk., "Perbedaan Kadar Kafein Daun Teh (*Camellia Sinensis* ((L). Kuntze) Berdasarkan Status Ketinggian Tempat Tanaman dengan Metode HPLC", *Jurnal Of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 1(2016), h. 42.

<sup>41</sup> Tuminah, Teh (*Camelia Sinensis* L), h. 4

lainnya. Kadar kafein dipengaruhi oleh waktu ekstraksi. Waktu penyeduhan yang terlalu singkat dapat membuat kadar kafein dalam teh belum terekstrak sepenuhnya. Sehingga kadar kafein terendah diperoleh pada waktu penyeduhan tersingkat. Begitupun dengan suhu penyeduhan semakin tinggi suhu penyeduhan maka semakin terekstrak pula kandungan kadar kafein, akan tetapi dalam proses tersebut kafein dapat saja teroksidasi dengan udara sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Struktur senyawa katekin dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini<sup>42</sup>



**Gambar 2.6** Struktur Kafein

Teh telah diverifikasi untuk meningkatkan mutu atau potensi gizi berdasarkan pada kandungan senyawa aktif pada daun teh, sehingga memiliki nilai plus dari segi cita rasa, aroma maupun manfaat dalam menjaga kesehatan (antioksidan) dan mengurangi radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, terdapat pula senyawa tanin dalam teh.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Dianita Devi Putri dan Ita Ulfir, “Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kadar Kafein dalam Teh Hitam”, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2. Vol 4 (Surabaya; Institut Teknologi Sepuluh, 2015), h. 107.

<sup>43</sup>Evy Damayanthi, dkk., “Studi Tentang Kandungan Katekin dan Turunannya Sebagai Antioksidan Alami serta Karakteristik Organoleptik Produk Teh Murbei dan Teh Kamelia-Murbei”, h. 96.

## 2. Tanin (C<sub>76</sub>H<sub>52</sub>O<sub>46</sub>)

Merupakan kelompok polifenol yang dapat larut dalam air dengan berat molekul 500-1000 gram/mol. Tanin mampu mengendapkan alkaloid, gelatin dan protein lainnya membentuk warna merah tua dengan kalium ferrisianida dan ammonia serta dapat diendapkan oleh garam-garam Cu, Pb dan kalium kromat, tanin diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya: (1) *Condensed Tanin* merupakan golongan tanin yang dapat terkondensasi dan tidak dapat dihidrolisis kecuali dalam suasana asam.<sup>44</sup> Misalnya senyawa katekin dan proantocianidin. (2) *Hidrolisable tanin* merupakan golongan tanin yang dapat dihidrolisis dalam air seperti gallotanin.<sup>45</sup> Tanin memiliki berat molekul 1701,22 dapat diidentifikasi menggunakan kromatografi dengan identifikasi warna berwarna kuning kecokelatan. Tanin terasa sepat, tidak dapat mengkristal tetapi dapat mengendapkan protein larutannya. Tanin memiliki sifat sebagai senyawa pengkelat logam disebabkan karena adanya pengaruh fenolik.<sup>46</sup>

Tanin atau lebih dikenal dengan asam tanat, biasanya mengandung 10% H<sub>2</sub>O. Struktur kimia tanin adalah kompleks. Asam tanat tersusun 5-10 residu ester galat, sehingga galotanin sebagai salah satu turunan tanin dikenal dengan nama asam tanat. Penentuan tanin menggunakan orto fenantrolin merupakan alternatif dari metode yang telah ada melalui pembentukan senyawa kompleks tanin-orto


---

<sup>44</sup>Liberty P. Malangngi., dkk, "Penentuan Kandungan Tanin dan Uji Antioksidan Ekstrak Biji Buah Alpukat (*Persea Americana Mill.*), *Jurnal MIPA Unsrat Onlin*, 1 vol 1 (Manado : Unsrat, 2012), h. 5

<sup>45</sup>Imelda Fajriaty, "Optimasi Metode Penentuan Tanin (Analisis Secara Spektrofotometri dengan Pereaksi Orto-Fenantrolin), h.109-110.

<sup>46</sup>Nita Noriko, "Potensi Daun The (*Camelia Sinensiss*) dan Daun Anting-Anting (*Acalypha Indica L*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella typhi*", h. 3

fenantrolin warna merah yang stabil. Larutan Fe (III) dapat tereduksi menjadi Fe (II) oleh tanin setelah dipanaskan pada suhu tertentu.<sup>47</sup>



**Gambar 2.7** Struktur Tanin<sup>48</sup>

Salah satu jenis senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam teh sebagai bahan bioaktif, antosianin, tanin berfungsi menangkap radikal bebas sehingga dapat menghambat terjadinya kerusakan pada membran sel dalam tubuh. Kandungan senyawa metabolit sekunder lain seperti katekin dalam daun teh juga berfungsi sebagai penangkal radikal bebas (antioksidan) dan antibakteri.<sup>49</sup>

### 3. Katekin (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>)

Katekin merupakan senyawa metabolit sekunder yang paling utama pada daun teh. Pucuk dan daun muda tanaman teh mengandung senyawa katekin sebanyak 70-80%.<sup>50</sup> Katekin merupakan senyawa flavanoid utama yang terkandung dalam daun muda tanaman teh sekitar 25-30% dari berat kering. Karakter yang diamati pada

<sup>47</sup>Imelda Fajriaty, "Optimasi Metode Penentuan Tanin (Analisis Secara Spektrofotometri dengan Pereaksi Orto-Fenantrolin), h. 108-109.

<sup>48</sup>Fridaqua Sada Yunitauli Sibuea, "Ekstraksi Tanin dari Kluwak (*Pangium Edule R.*) Menggunakan Pelarut Etanol dan Aquades dan Aplikasinya Sebagai Pewarna Makanan", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 11.

<sup>49</sup>Reza Anindita, dkk., "Potensi Teh Hijau (*Camelia Sinensis L.*) dalam Perbaikan Fungsi Hepar Pada Mencit yang Diinduksi Monosodium Glutamat (MSG)", *Buletin Anatomi dan Fisiologi XX No. 2* (Sumatera, Universitas Diponegoro, 2012), h. 16.

<sup>50</sup>Verawaty, dkk., "Efektivitas Sistem Penghantaran Liposom Pada Katekin Sebagai Antioksidan", *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*, 2, Vol 2 (2016), hal. 176.

proses pengolahan teh adalah kandungan katekin, jumlah bulu daun muda, ukuran (panjang, lebar, luas) daun indung, kandungan klorofil daun indung, frekuensi stomata daun indung, ketebalan daun indung dan sudut daun indung memiliki pengaruh terhadap karakter morfologi dan kandungan senyawanya.<sup>51</sup>

Karakter morfologi yang berkorelasi nyata dengan kandungan katekin adalah karakter kerapatan stomata dan sudut daun indung. Karakter sudut daun indung dapat dijadikan indikator seleksi tidak langsung terhadap kandungan katekin. Peninjauan secara fisik mengenai kandungan katekin dapat dilakukan dengan memperhatikan morfologi dan karakteristik teh secara kasat mata.<sup>52</sup> Pada proses oksidasi enzimatis katekin mengalami proses oksidasi yang akan terurai menjadi senyawa theaflavin yang berfungsi memberi warna kuning dan senyawa thearubigin yang berperan memberi warna merah kecoklatan.<sup>53</sup> Kandungan katekin akan mengalami proses penurunan yang disebabkan proses pelayuan, oksidasi enzim, penggilingan dan pengeringan yang pada dasarnya senyawa ini akan memberikan cita rasa khas pada teh.<sup>54</sup> Katekin digolongkan kedalam senyawa antioksidan dengan ikatan gugus fenol.



---


<sup>51</sup> Hery Syahrian Khomaeni, dkk., “Korelasi Genotipik Morfologi Daun dengan Kandungan Katekin Pada Tanaman Teh (*Camelia Sinensiss* (L), *O Kuntze*”, *Jurnal Penelitian Teh dan Kina* 18 No. 1 (Bandung: Fakultas Pertanian Universitas Padjajara, 2015), h. 37-38.

<sup>52</sup>Hery Syahrian Khomaeni, dkk., “Korelasi Genotipik Morfologi Daun dengan Kandungan Katekin Pada Tanaman Teh (*Camelia Sinensiss* (L), *O Kuntze*”, h. 37-38.

<sup>53</sup>Andasuryani, dkk, “Prediksi Kandungan Katekin Gambir (*Uncaria gambir* Roxb.) Dengan Spektroskopi NIR”, *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 24, Vol. 1 (2014), hal. 46.

<sup>54</sup>Juniati Towaha dan Balitri, Kandungan Senyawa Kimia Pada Daun Teh (*Camelia Sinensiss*), h. 13.

Katekin memiliki dua gugus fenol (cincin A dan B) dengan satu gugus hidropiran (cincin C).<sup>55</sup>



**Gambar 2.8** Struktur Katekin<sup>56</sup>

Ketekin memiliki sifat fisik dan kimia yaitu tidak berwarna, larut dalam air, serta memberi rasa pahit dan sepet pada seduhan teh, kandungan total katekin pada teh *Camelia Sinensiss* berkisar 11,90% sampai dengan 17,10%.<sup>57</sup> Senyawa-senyawa utama yang berperan sebagai pelindung kimiawi dalam teh hijau adalah stuktur kompleks flavonoid seperti *epigallocatechin gallate* (EGCG), *epicatechin gallate* (ECG) dan *epigallocatechin* (EGC).<sup>58</sup> Akhir-akhir ini, katekin di dalam teh hijau dipercayai dapat mencegah terjadinya kanker dengan struktur dan fungsi yang sama dengan *chaperone* yang juga tergolong kedalam senyawa flavonoid.<sup>59</sup>

<sup>55</sup>Susiana Prasetyo S, “Pengaruh Rasio Biji Teh/Pelarut Air dan Temperatur pada Ekstraksi Saponin Biji Teh Secara *Batch*”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2011), h. 6.

<sup>56</sup>Fridaqua Sada Yunitauli Sibuea, “Ekstraksi Tanin dari Kluwak (*Pangium Edule R.*) Menggunakan Pelarut Etanol dan Aquades dan Aplikasinya Sebagai Pewarna Makanan”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 11.

<sup>57</sup>Evy Damayanti, dkk., Studi Kandungan Katekin dan Turunannya Sebagai Antioksidan Alami dan Karakteristik Organolepik Produk Teh Murbei dan Teh *Camelia-Murbei*, h. 99-100

<sup>58</sup>Bambang, Sriyadi, “Seleksi Klon Teh Assamica Unggul Berpotensi Hasil dan Kadar Katekin Tinggi”, *jurnal Penelitian Kimia dan Kina* 15, vol. 1 (2012), hal. 3-4.

<sup>59</sup>Tuminah, Teh (*Camelia Sinensis L.*), h. 5-6

Flavanol atau yang dikenal dengan katekin yang memiliki kandungan berat 20-30% dari daun teh yang sudah kering. Flavonol biasanya ditemukan dalam bentuk *glycosidic* karena bentuk yang *non-glycosidic* tidak dapat larut dalam air. Selain itu, Karena sifatnya yang hidrofilik menyebabkan katekin termasuk komponen yang memiliki peranan mengatur kelarutan teh.<sup>60</sup> Gugus hidroksil fenolik yang dimiliki oleh katekin merupakan donor elektron yang potensial untuk berikatan dengan dengan radikal bebas. Selain itu, gugus hidroksil fenolik juga berperan sebagai penghidrolisis lemak.<sup>61</sup> Kadar flavanoid tertinggi dapat dilihat dari intensitas warna yang dihasilkan, warna yang lebih pekat menunjukkan kadar flavanoid yang tinggi dengan aktivitas antioksidan yang tinggi pula.<sup>62</sup>

#### **F. Antioksidan**

Antioksidan merupakan senyawa yang terdapat secara alami pada bahan pangan. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan karena terjadinya reaksi oksidasi lemak atau minyak yang menjadikan bahan pangan berasa dan beraroma tengik. Antioksidan dapat membatasi efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh. Efek yang diberikan oleh antioksidan terhadap tubuh dapat secara langsung

---

<sup>60</sup>Fitria Sari Wulaningsih, "Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Campuran Derivat Kurkumin dan Katekin Hasil Isolasi dari daun teh", *Skripsi*, (Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2008), hal 18.

<sup>61</sup>Erna Susanti, "Aktivitas Antioksidan Terhadap Stabilisasi Plak (dalam Rangka Memperkecil Resiko Serangan Jantung)", *Jurnal El-Hayah* 2, Vol. 2 (2012), hal. 79.

<sup>62</sup>Jepri Agung Priyanto" Flavanoids Production Capability Test Of Tea Mistletoe (*Scurrulla Antropurpurea* BL. Dans) Endopityc Bacteria Isolate", *Jurnal Sains dan Matematika*. 4 vol 22 (Semarang: Diponegoro Univercity), h. 94-95.

mereduksi radikal bebas dalam tubuh dan secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya pembentukan efek radikal terhadap ketahanan daya tahan tubuh.<sup>63</sup>

Antioksidan dapat menetralkan radikal bebas dengan cara menerima atau mendonorkan satu elektron untuk menghilangkan kondisi “elektron tidak berpasangan”.<sup>64</sup> Fungsi antioksidan yaitu untuk menetralisasi radikal bebas, sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit degeneratif dan kanker. Fungsi senyawa antioksidan yaitu untuk membantu menekan proses penuaan yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan tubuh.<sup>65</sup> Antioksidan dapat menunda, memperlambat dan mencegah terjadinya proses oksidasi dalam tubuh. Berdasarkan fungsinya bagi tubuh, antioksidan dibagi menjadi tiga, yaitu antioksidan primer, sekunder dan tersier. Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, seperti mengubah radikal bebas yang ada menjadi suatu molekul yang dampak negatifnya lebih kecil sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Contoh antioksidan primer adalah *Superoksida Dismutase* (SOD), *Glutation Peroksidase* (GPx) dan protein pengikat logam.<sup>66</sup>

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C,  $\beta$ -caroten. Antioksidan

---

<sup>63</sup>Astri Dwi Ananda, “Aktivitas Antioksidan Dan Karakteristik Organoleptik Minuman Fungsional Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) Rempah Instan”, *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009), h.12.

<sup>64</sup>Yosie Andriani, “Uji aktivitas Antioksidan Ekstrak Betaglukan dari *Saccharomyces Cerevisiae*”, *Jurnal Gradien*, 1, Vol. 3, hal. 226.

<sup>65</sup>Ida Rokyani, “Aktivitas Antioksidan dan Uji Organoleptik Teh Celup Batang dan Bunga Kecombrang Pada Variasi Suhu Pengeringan”, h. 6.

<sup>66</sup>Astri Dwi Ananda, “Aktivitas Antioksidan Dan Karakteristik Organoleptik Minuman Fungsional Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) Rempah Instan”, h.12

tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase.<sup>67</sup>

Reaksi oksidasi dapat menghasilkan radikal bebas dan memicu reaksi rantai panjang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh. Pemakaian antioksidan makin berkembang serta mengalami peningkatan kearah pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit.<sup>68</sup> Radikal bebas yaitu produk samping dari sebuah proses biokimiawi didalam tubuh yang karena bersifat karsinogenik. Secara eksogen radikal bebas dapat berasal dari polusi lingkungan (asap rokok, pestisida), radiasi sinar ultraviolet, makanan, injeksi (obat-obatan) dan melalui penyerapan kulit. Radikal bebas merupakan sumber berbagai penyakit seperti kanker kulit, diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit kardiovaskuler, katarak dan penuaan dini.<sup>69</sup>

Teh memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi memiliki total fenol yang tinggi, sedangkan sampel teh yang memiliki aktivitas antioksidan rendah memiliki total fenol yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Atmaja, bahwa semakin tinggi kandungan fenolik maka akan memberikan aktivitas antioksidan yang semakin besar. Sehingga dengan mudah menebak dan mengetahui efektivitas antioksidan melalui keberadaan senyawa fenol dalam suatu tumbuhan tertentu.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Astri Dwi Ananda, “Aktivitas Antioksidan Dan Karakteristik Organoleptik Minuman Fungsional Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) Rempah Instan”, h.1

<sup>68</sup>Dewi Indarwati, “Aktivitas Antioksidan Dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Metode Pengeringan dan Konsentrasi”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 4.

<sup>69</sup>Dewi Indarwati, “Aktivitas Antioksidan Dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Metode Pengeringan dan Konsentrasi”, h. 4.

<sup>70</sup>Dewi Indrawati, “Aktivitas Antioksidan Dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Metode Pengeringan dan Konsentrasi”, h. 10.

Fenol merupakan antioksidan yang efektif karena dapat bereaksi dengan radikal intermediet menghasilkan radikal fenolik yang stabil dan tidak reaktif. Pembentukan radikal yang tidak reaktif tersebut, mengakhiri proses oksidasi radikal yang tidak dikehendaki dalam tubuh. Salah satu kandungan dalam teh yaitu flavonoid merupakan salah satu antioksidan alami.<sup>71</sup> Antioksidan alami memiliki beberapa keunggulan antara lain aman bagi tubuh karena tidak terkontaminasi zat kimia dan tidak mempunyai efek samping. Senyawa fenolik dan flavanoid ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam teh, baik pada daun maupun batang teh. Kandungan senyawa tersebut merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat dan mencegah peningkatan radikal bebas.<sup>72</sup> Selain itu, senyawa flavanoid ini juga sangat berperan penting dalam proses penetralan senyawa atau zat-zat kimia dalam tubuh melalui tahapan metabolisme.<sup>73</sup>

Sistem antioksidan dalam tubuh mengontrol reaktivitas radikal bebas, secara berkelanjutan dibentuk sendiri oleh sel tubuh. Tetapi dalam keadaan tertentu tubuh tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga tubuh memerlukan zat-zat antioksidan dari luar tubuh untuk mencegah terjadinya reaksi reaktif radikal bebas tersebut. Antioksidan mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh, bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat dan dinetralkan oleh senyawa metabolit yang terkandung dalam suatu tumbuhan tertentu dengan

---

<sup>71</sup>Elok Zubaidah dan Prasis Nursyam Suhardini, "Studi Aktivitas Antioksidan Kombucha dari Beebagai Jenis Daun Selama Fermentasi", *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 1, Vol. 4 (2016), hal. 194.

<sup>72</sup>Abdul Rohman, "Aktivitas Antioksidan, Kandungan Fenolik Total dan Flavonoid Total yang Terkandung Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.), *Jurnal Agritech*, 4, Vol. 27 (2007), hal. 148.

<sup>73</sup>Dewi Indarwati, "Aktivitas Antioksidan Dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Metode Pengeringan dan Konsentrasi", h. 4.

beragam manfaat dalam bidang kesehatan. Aktivitas antioksidan dapat pula dilakukan dengan menggunakan metode DPPH.<sup>74</sup>

### **G. Metode DPPH**

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil dalam larutan berair atau larutan dalam metanol yang pada prinsip dasarnya berkemampuan untuk mengalami reaksi menangkap hidrogen dari senyawa antioksidan. DPPH mampu menerima elektron atau radikal hidrogen dari senyawa lain, sehingga membentuk molekul diamagnetik yang lebih stabil.<sup>75</sup>

Analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan alat spektrofotometer UV-VIS. DPPH digunakan karena merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu ruang. Interaksi antioksidan dengan DPPH, baik secara transfer elektron akan menetralkan karakter dan reaksi radikal bebas dari DPPH itu sendiri. Sehingga dapat dibuktikan bahwa melalui senyawa antioksidan yang terkandung dalam teh sangatlah bermanfaat untuk menstabilkan radikal bebas dalam tubuh.<sup>76</sup>

### **H. Manfaat Teh (*Camelia Sinensis*.L)**

Bila dibandingkan dengan jenis minuman lain, teh ternyata lebih banyak manfaatnya. Manfaat yang dihasilkan dari minuman teh adalah memberikan rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan terbukti tidak menimbulkan dampak

---

<sup>74</sup>Titta H Sutarna, "Ahmad Ngadeni dan Resi Anggiani, Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L.) dan Madu Hitam (*Apis dorsata*) Sebagai Antioksidan", h. 2.

<sup>75</sup>Hadi Winata, "Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Kimiawi Ekstrak daun Wungu (*Graptophyllum pictum* L. Griff), *Skripsi* (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2011), h. 4.

<sup>76</sup>Ida Rokyani, "Aktivitas Antioksidan dan Uji Organoleptik Teh Celup Batang dan Bunga Kecombrang Pada Variasi Suhu Pengeringan", h. 8.

negatif. Khasiat yang dimiliki oleh minuman teh berasal dari kandungan zat bioaktif yang terdapat dalam daun teh.<sup>77</sup>

Terdapat banyak manfaat teh bagi kesehatan tubuh yang secara tidak langsung akan sangat berpengaruh. Berikut disebutkan beberapa manfaat teh:<sup>78</sup>

1. Teh memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan kanker.
2. Teh mampu mencegah penyakit jantung dan stroke.
3. Teh hijau mampu mencegah serangan influenza.
4. Dapat memperkuat gigi, melawan bakteri dalam mulut, serta mencegah osteoporosis.
5. Pada saluran pencernaan, teh membantu melawan keracunan makanan.
6. Teh dapat menurunkan kadar kolesterol, glukosa darah dan mengurangi kerusakan hati.

### **I. Instrument Spektrofotometri UV-VIS**

Spektrofotometer UV-VIS merupakan rangkaian alat yang sangat beragam mulai dari yang manual spektronik 20 sampai yang digital atau yang dihubungkan dengan peralatan komputer. Spektrofotometer UV disatukan dengan Visble (sinar tampak), sehingga pemakaiannya dapat disesuaikan. Secara umum komponen-komponen spektrofotometer baik yang sinar tunggal maupun yang sinar ganda yaitu

---

<sup>77</sup> B.A Martinus, dkk., “Perbandingan Kadar Fenolat Total dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Daun Teh (*Camellia Sinensis* [L.] O.K.) dari Kayu Aro dengan Produk Teh Hitamnya yang Telah Beredar”, h.75.

<sup>78</sup>Dian Sundari, dkk, “Toksitas Akut (LD<sub>50</sub>) dan Uji Gelagat Ekstrak Daun Teh Hijau (*Cammelia Sinensis* (Linn) Kunze) pada Mencit)”, *Media Peneliti dan Pengembang Kesehatan* 110, no. 4 (2009): h. 198.

sumber radisasi (cahaya), monokromator, sel atau tempat sampel dan detektor. Detektor inilah yang dihubungkan dengan rangkaian alat komputer.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Marham Sitorus, "*Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 25

## BAB III METODE PENELITIAN

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan (Januari-Juli) 2017 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Organik dan Laboratorium Riset, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **B. Alat dan Bahan**

#### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan adalah spektrofotometri UV-Vis Varian Cary 50 conc, bom kalorimeter, neraca analitik, oven, termometer, cawan porselin, rangkaian alat soxhletasi, rangkaian alat destilasi, magnetik stirrer, corong, mikro pipet, pipit tetes, pipet skala 1 mL, 5 mL, 10 mL, pipet volum 25 mL, blender, erlenmeyer 250 mL, labu takar 50 mL, labu takar 100 mL, gelas kimia 100 mL, gelas kimia 250 mL, batang pengaduk, spatula, gelas ukur 100 mL, tabung reaksi dan rak tabung.

#### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan adalah daun teh hijau (*camellia sinensis*, L.) P+2, aquades ( $H_2O$ ), asam klorida (HCl) 37% (merck), asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 98% (merck), aluminium foil, besi (III) klorida ( $FeCl_3$ ), kalium heksasianoferrat ( $K_3Fe(CN)_6$ ), kafein (sigma Aldrich), katekin ( $C_6H_6O_2$ ) (sigma Aldrich), kobal nitrat ( $Co(NO_3)_2$ ), methanol p.a ( $CH_3OH$ ), N-heksan, tanin ( $C_{76}H_{52}O_{46}$ ) (sigma Aldrich), Timbal II asetat  $Pb(CH_3COO)_2$ , Reagen Parry, kertas saring dan *tissue*.

### C. Prosedur Kerja

#### 1. Preparasi sampel

Sampel diambil di perkebunan teh yang berada di kawasan puncak Malino Highland Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Daun teh diambil dari teh jenis *camellia sinensis* L. Daun teh P+2 dipetik dan dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, daun teh dikukus menggunakan panci pengukus, setelah itu di sangrai diatas wajan. Sampel dikeringkan pada suhu ruangan selama 5 kali 24 jam. Selanjutnya dilakukan proses penghalusan atau penggilingan sampel menggunakan blender.

#### 2. Analisis kadar air

Penentuan kadar air pada daun teh dilakukan dengan cara, cawan kosong yang akan digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, setelah dingin lalu ditimbang untuk mengetahui bobot kosong cawan. Bubuk daun teh ditimbang sebanyak 1 gram lalu dimasukkan ke dalam cawan kemudian dikeringkan dalam oven selama 2 jam pada suhu 105°C. Cawan kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang kembali. Setelah ditimbang, cawan di oven kembali hingga diperoleh bobot konstan. Hitung persentase kadar air.<sup>80</sup>

#### 3. Analisis kadar lemak

Penentuan kadar lemak pada teh yang terbuat dari daun teh P+2 dilakukan dengan menimbang teh sebanyak 25 gram, lalu labu lemak dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105°C selama 15 menit. Preparasi soxhlet dengan menggunakan pelarut N-heksan sebanyak 250 mL dengan 20 kali sirkulasi.

---

<sup>80</sup>Ria Kusumaningrum, dkk, "Karakteristik dan Mutu Teh Bunga Lotus (*Nelumbo nucifera*)", *Fishtech* II, no. 01 (2013): h. 11.

Hasilnya kemudia didestilasi, kemudian hitung kadar lemak yang terkandung pada daun teh P+2.<sup>81</sup>

#### 4. Pembuatan Larutan Pereaksi

##### a. Besi (III) Klorida 0,1 M ( $\text{FeCl}_3$ )

Besi (III) klorida ditimbang sebanyak 1,625 gram kemudian dilarutkan dengan akuades, selanjutnya dimasukkan kedalam labu takar 100 mL. Dihimpitkan menggunakan aquades sampai tanda batas, lalu dihomogenkan.

##### b. Kalium Heksasianoferat 0,008 M $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$

Kalium heksasianoferat ditimbang sebanyak 0,2632 gram, kemudian dilarutkan menggunakan aquades, selanjutnya dimasukkan kedalam labu takar 100 mL, dihimpitkan menggunakan aquades hingga tanda batas, lalu dihomogekan.

##### c. Timbal (II) Asetat 2 M ( $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ )

Timbal (II) asetat ditimbang sebanyak 65 gram, dilarutkan menggunakan aquades, selanjutnya dimasukkan kedalam labu takar 100 mL, dihimpitkan menggunakan aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan.

##### d. Asam Klorida 0,1 M

Asam klorida 37% dipipet sebanyak 0,82 mL kedalam labu takar 100 mL, selanjutnya dihimpitkan menggunakan aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan.

---

<sup>81</sup>Yohanes Zega, "Pengembangan Produk *Jelly Drink* Berbasis Teh (*Camelia Sinensis*) Dan Secang (*Caesalpinia Sappan* L.) Sebagai Pangan Fungsional", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, 2010): h. 26-27.

**e. Asam Sulfat 3 M (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)**

Asam sulfat p.a dipipet sebanyak 16,47 mL kedalam labu takar 100 mL kemudian diencerkan menggunakan aquades sampai tanda batas, lalu dihomogenkan.

**f. Reagen Parry**

Kobat (II) nitrat (CO (NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>) ditimbang sebanyak 0,5002 gram, kemudian dilarutkan kedalam 30 mL methanol, selanjutnya dimasukkan kedalam labu takar 100 mL, lalu diencerkan menggunakan methanol hingga tanda batas dan dihomogenkan.

**5. Analisis Kualitatif**

**a. Pembuatan Laruan ekstrak**

Serbuk teh P+2 ditimbang sebanyak 2,5 gram kemudian diseduh dengan aquades sebanyak 100 mL pada suhu 70°C. Kemudian diaduk menggunakan magnetik stirrer dengan variasi waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit, hingga diperoleh ekstrak teh. Kemudian disaring menggunakan kain blacu. Perlakuan yang sama dilakukan pada suhu 85°C dan 100°C.

**b. Analisis Senyawa Tanin dan Katekin**

Ekstrak sampel daun teh P+2, kemudian dipipet secukupnya kedalam plat tetes, tambahkan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 0,1 M pada variasi suhu dan waktu penyeduhan. Kemudian amati perubahan yang terjadi.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Taty Sulastri, "Analisis Kadar Tanin Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol pada Biji Pinang Sirih (*reca Catechu L*)", *Jurnal Chemica* 10, no. 1 (2019): h. 61.

### c. Analisis Kadar Kafein

Ekstrak sampel daun teh P+2, kemudian dipipet secukupnya kedalam plat tetes, tambahkan beberapa tetes reagen parry. Pada variasi suhu dan waktu penyeduhan. Kemudian amati perubahan yang terjadi.

## 6. Pembuatan Larutan Standar

### a. Pembuatan standar kafein

- (1) Pembuatan larutan baku kafein 100 mg/L konsentrasi 100 ppm

Kafein ditimbang 0,1002 gram ke dalam gelas kimia 100 mL, lalu dilarutkan dengan aquades secukupnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL. Diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Dihomogenkan.

- (2) Pembuatan deret standar 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm dan 25 ppm

Kafein konsentrasi 100 ppm dipipet berturut-turut sebanyak 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL dan 25 mL. Lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL diencerkan hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Masing-masing deret dipipet sebanyak 10 mL untuk diberikan perlakuan yang sama dengan sampel. Dipipet sebanyak 10 mL ke dalam labu takar 100 mL, kemudian ditambahkan 4 mL HCl 0,01 M dan 1 mL  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  2 M. Lalu himpitkan sampai tanda batas dan homogenkan. Kemudian dipipet 25 mL ke dalam labu ukur 50 mL lalu ditambahkan 0,3 mL larutan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  3M. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga tanda batas, lalu disaring. Filtrat yang diperoleh diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum.

## **b. Pembuatan standar katekin**

### (1) Pembuatan larutan baku katekin 100 mg/L konsentrasi 100 ppm

Kafein ditimbang 0,1002 gram ke dalam gelas kimia 100 mL, lalu dilarutkan dengan aquades secukupnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL. Diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Dihomogenkan.

### (2) Pembuatan deret standar 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm dan 25 ppm

Kafein konsentrasi 100 ppm dipipet berturut-turut sebanyak 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL dan 25 mL. Lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL diencerkan hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Masing-masing deret dipipet sebanyak 2 mL untuk diberikan perlakuan yang sama dengan sampel. Dipipet sebanyak 2 mL kemudian ditambahkan methanol p.a sebanyak 50 mL. Lalu dipanaskan selama 5 menit. Dinginkan lalu ukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis.<sup>83</sup>

## **7. Analisis Kuantitatif**

### **a. Pembuatan Ekstrak Teh**

Serbuk teh P+2 ditimbang sebanyak 1 gram kemudian diseduh dengan aquades sebanyak 100 mL pada suhu 70°C. Kemudian diaduk menggunakan magnetik stirrer dengan variasi waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit, hingga diperoleh ekstrak teh. Kemudian disaring menggunakan kain blacu. Perlakuan yang sama dilakukan pada suhu 85°C dan 100°C.

---

<sup>83</sup>Novianty Syah Fitri, "Pengaruh Berat dan Waktu Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein dari Bubuk Teh", h. 30.

## b. Analisis Kadar Senyawa

### (1) Analisis Kadar Tanin

Penentuan kadar tanin dalam ekstrak daun teh P+2 pada suhu penyeduhan 70°C dengan variasi waktu penyeduhan 5, 10 dan 15 menit. Selanjutnya ekstrak daun teh dipipet sebanyak 10 mL kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditambahkan 3 mL  $\text{FeCl}_3$  0,1 M. Lalu di homogenkan, kemudian ditambahkan 3 mL  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  0,008 M. Didiamkan selama 10 menit dan disaring menggunakan kertas saring. Diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Prosedur yang sama juga dilakukan pada suhu penyeduhan 85°C dan 100°C.<sup>84</sup>

### (2) Analisis Kadar Kafein

Penentuan kadar kafein dalam ekstrak daun teh P+2 pada suhu penyeduhan 70°C dengan variasi waktu penyeduhan 5, 10 dan 15 menit. Sampel teh hijau dipipet sebanyak 10 mL ke dalam labu ukur 100 mL lalu ditambah 4 mL HCl 0,01 M dan 1 mL  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  2 M. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Larutan disaring menggunakan kertas saring kemudian dimasukkan 25 mL filtrat kedalam labu ukur 50 mL lalu ditambahkan 0,3 mL larutan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  3M. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga tanda batas, apabila terdapat endapan maka dilakukan kembali proses penyaringan dengan kertas saring. Kemudian filtrat diukur dengan menggunakan UV-Vis. Prosedur yang sama juga dilakukan pada suhu penyeduhan 85°C dan 100°C.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Riana Dyah Suryaningrum, dkk, "Peningkatan Kadar Tanin dan Penurunan Kadar Klorin Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Gunna Teh Celup", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

<sup>85</sup>Dianita Devi Putri dan Ita Ulfin, "Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kadar Kafein dalam Teh Hitam", h. 105.

### (3) Analisis Kadar Katekin

Penentuan kadar katekin dalam ekstrak daun teh P+2 pada suhu penyeduhan 70°C dengan variasi waktu penyeduhan 5, 10 dan 15 menit. Filtrat teh hijau dipipet sebanyak 2 ml ditambah 50 ml methanol p.a. kemudian dilakukan pemanasan selama 5 menit. Larutan diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Prosedur yang sama juga dilakukan pada suhu penyeduhan 85°C dan 100°C.

## 8. Analisis Aktifitas Antioksidan

### a. Pembuatan Larutan DPPH

Kristal DPPH ditimbang sebanyak 4 mg, kemudian dilarutkan dalam 100 mL methanol p.a. setelah itu, dihomogenkan.

### b. Pembuatan Blanko

Larutan DPPH 0,004% dimasukkan kedalam tabung reaksi sebanyak 2 mL methanol p.a kemudian ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C. Kemudian diukur serapan absorbansinya pada panjang gelombang maksimum.<sup>86</sup>

### c. Pembuatan Larutan Ekstrak

Ditimbang sebanyak 1 gram teh P+2 kemudian diseduh menggunakan 100 mL aquades pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 5 menit.

d. Pembuatan Larutan Analisis Memipet 1 mL sampel ditambah 3 mL larutan DPPH, setelah itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 25 menit. Kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-VIS.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Ria Kusumaningrum, dkk, "Karakteristik dan Mutu Teh Bunga Lotus (*Nelumbo nucifera*)", h. 11.

<sup>87</sup>Ria Kusumaningrum, dkk, "Karakteristik dan Mutu Teh Bunga Lotus (*Nelumbo nucifera*)", h. 11.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Kadar Air**

Analisis kadar air merupakan metode gravimetri yang bertujuan untuk menentukan mutu, kualitas dan untuk mengetahui berat kering dari suatu bahan pangan. Penentuan kadar air dilakukan menggunakan cara dikeringkan dengan metode oven. Semakin rendah kadar air suatu teh, maka semakin bagus mutu dan kualitas produk teh yang akan dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil 10,08 % kadar air pada daun teh P+2 *camellia sinensis* L.

##### **2. Analisis Lemak**

Adapun proses analisis kadar lemak yaitu menggunakan metode ekstraksi soxhletasi dan metode destilasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak kadar lemak yang terkandung dalam teh daun teh hijau P+2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kadar lemak sebesar 17,56 % pada daun teh P+2.

##### **3. Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif senyawa kafein, tanin dan katekin merupakan metode identifikasi yang cukup mudah untuk dilakukan. Analisis kualitatif ini digunakan untuk uji pendahuluan terhadap suatu sampel yang ingin diteliti lebih lanjut. Hal ini berdampak positif karena dapat memberikan data awal sehingga dalam proses penelitian dapat memberikan kontribusi berupa dugaan atau rasa yakin terhadap proses lanjutan yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,

maka dapat dilihat hasil uji kualitatif dari senyawa tanin, kafein dan katekin pada tabel berikut.

**Tabel 4.1** Uji Kualitatis Senyawa Tanin Tanin dan Katekin Pada Daun P+2

No.	Sampel	Waktu (T) (Menit)	Senyawa Tanin	Senyawa Kafein	Senyawa Katekin
1.	A <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>2</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>3</sub>	(+)	(+)	(+)
2.	A <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>2</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>3</sub>	(+)	(+)	(+)
3.	A <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>2</sub>	(+)	(+)	(+)
		T <sub>3</sub>	(+)	(+)	(+)

**Keterangan:**

- tanda (+) menyatakan teh hijau P+2 positif mengandung ketiga senyawa diatas
- Pereaksi yang digunakan pada uji kualitatif tanin dan katekin yaitu besi (III) klorida (FeCl<sub>3</sub>)
- Pereaksi yang digunakan pada uji kualitatif kafein yaitu reagen parry
- A<sub>1</sub> (70°C), A<sub>2</sub> (85°C), A<sub>3</sub> (100°C), T<sub>1</sub> (5 menit), T<sub>2</sub> (10 menit) dan T<sub>3</sub> (15 menit)

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa didalam ekstrak daun teh hijau P+2 terkandung senyawa kafein, tanin dan katekin. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata melalui perubahan fisik berupa perubahan warna, aroma, rasa ataupun endapan yang dihasilkan pada proses pengujian. Setiap variabel suhu dan waktu penyeduhan memberikan hasil positif yang menandakan bahwa pada ekstrak daun teh tersebut positif mengandung tiga elemen senyawa yaitu kafein, tanin dan katekin.

#### a. Identifikasi senyawa tanin

Identifikasi senyawa tanin pada daun teh P+2 dapat dilakukan dengan cara menambahkan pereaksi FeCl<sub>3</sub> 0,1 M ke dalam larutan sampel pada cawan porselin. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat dilihat bahwa dari kesembilan

sampel berdasarkan variasi suhu dan waktu penyeduhan diperoleh hasil positif. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna biru kehijauan.

#### **b. Identifikasi Senyawa Kafein**

Identifikasi senyawa kafein pada daun teh hijau P+2 terhadap kandungan senyawa kafein maka diperoleh hasil positif yaitu sampel mengalami perubahan warna dari kuning kehijauan berubah menjadi biru tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa dari kesembilan sampel yang ditinjau dari variasi suhu dan waktu penyeduhan dinyatakan semua positif mengandung senyawa kafein.

#### **c. Identifikasi Senyawa Katekin**

Identifikasi senyawa katekin dapat dilihat dari perubahan warna dari kuning kehijauan berubah menjadi warna hijau keunguan. berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kesembilan sampel diatas positif mengandung senyawa katekin.

### **4. Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif merupakan suatu metode penentuan kadar metabolit sekunder yang terkandung didalam suatu organisme baik tumbuhan maupun hewan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh data secara akurat melalui berbagai macam metode. Pada penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan menggunakan alat instrument UV-VIS.

Spektrofotometer UV-VIS adalah alat instrument untuk menganalisis suatu gugus kromofor pada suatu sampel. Bila cahaya UV-VIS dikenakan pada suatu senyawa sebagian dari cahaya tersebut akan diserap oleh molekul yang mempunyai tingkat energi yang spesifik. Setiap molekul memiliki tingkatan energi yang berbeda-beda. Aspek kuantitatif pada penyerapan sinar radiasi elektromagnetik

berdasarkan hukum lambert yang menyatakan hubungan tebal sel dengan penurunan intensitas sinar dan Beer yaitu hubungan penurunan sinar dengan konsentrasi, sehingga persamaan matematik yang diperoleh dapat dijabarkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-VIS dalam penentuan kadar senyawa kafein, tanin dan katekin dalam ekstrak teh hijau P+2 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2** Analisis Kadar Tanin, Kafein dan Katekin

No.	Suhu °C	Waktu (Menit)	Kadar Kafein (%)	Kadar Tanin (%)	Kadar Katekin (%)
1.	A <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	0,9290	2,964	1,4817
		T <sub>2</sub>	0,8632	1,844	1,5181
		T <sub>3</sub>	0,8814	2,358	1,6969
2.	A <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	1,2393	3,506	1,6471
		T <sub>2</sub>	1,0882	1,663	1,6923
		T <sub>3</sub>	1,2193	2,976	1,8192
3.	A <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	1,0279	1,756	2,3000
		T <sub>2</sub>	0,9445	2,470	1,8729
		T <sub>3</sub>	1,1474	2,414	1,9957

Keterangan: - A<sub>1</sub> (70°C), A<sub>2</sub> (85°C), A<sub>3</sub> (100°C), T<sub>1</sub> (5 menit), T<sub>2</sub> (10 menit) dan T<sub>3</sub> (15 menit)

Berdasarkan tabel 4.2 pada halaman 47 dapat dilihat secara sistematis bahwa persen kadar senyawa tanin, kafein dan katekin pada ekstrak daun teh P+2 memiliki kontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Ketiga senyawa tersebut memiliki peranan penting sebagai senyawa penangkal radikal bebas. Sehingga penting untuk diketahui kandungan kadar pada setiap variabel suhu dan waktu penyeduhan.

Persen kadar yang diperoleh pada masing-masing senyawa akan mempengaruhi kemampuan daya hambat dari tiap senyawa terhadap radikal bebas. Dengan demikian kontribusi persen kadar senyawa tanin, kafein dan katekin akan sangat membantu untuk mengetahui proses penyeduhan teh yang baik bagi kesehatan. Sehingga penting untuk diketahui seberapa banyak persen kadar yang terkandung dalam seduhan ekstrak teh yang diperoleh berdasarkan variasi suhu dan waktu penyeduhan yang optimum terhadap ketiga senyawa berikut:

**a. Analisis Kadar Tanin**

Analisis kadar tanin pada daun teh hijau P+2 dapat dihitung berapa banyak kadar tanin dalam 1 gram serbuk daun teh hijau yang diseduh pada suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5, 10 dan 15 menit dapat ditentukan dengan melihat nilai absorbansi sampel pada variabel suhu dan waktu penyeduhan terhadap hasil pembacaan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 720 nm. Hal tersebut dapat narasikan pada tabel 4.2 halaman 47. Dimana diperoleh kadar tanin tertinggi yaitu 3,506% pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit.

**b. Analisis Kadar Kafein**

Analisis kadar kafein dapat ditentukan dengan melihat nilai absorbansi sampel pada variabel suhu dan waktu penyeduhan terhadap hasil pembacaan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 273 nm. Sehingga dapat digunakan persamaan regresi pada absorbansi sampel yang diperoleh. Dengan memperhatikan konsentrasi sampel serta faktor pengenceran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kadar kafein tertinggi pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit yaitu 1,2393%.

### c. Analisis Kadar Katekin

Analisis persen kadar katekin dalam 1 gram serbuk teh P+2 digunakan persamaan regresi pada absorbansi sampel yang diperoleh. Dengan memperhatikan konsentrasi sampel dengan faktor pengenceran pada proses pengerjaan sebelum dianalisis menggunakan UV-VIS pada panjang gelombang 279 nm. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kadar katekin tertinggi pada suhu 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit yaitu sebesar 2,3000%.

## B. Pembahasan

### 1. Preparasi Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suhu dan waktu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan aktivitas antioksidan dari senyawa tanin, katekin dan kafein. Daun teh hijau (*Camellia Sinensis* L) P+2 dipetik diperkebunan teh Malino Highland Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Daun teh P+2 merupakan satu daun peko dengan dua daun mudah dibawahnya. Daun teh P+2 dikukus menggunakan panci pengukus hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada teh dari kisaran 70%-80%. Selain itu, pengukusan berfungsi untuk memberikan proses pelayuan dan penonaktifan enzim. Dimana dalam proses pelayuan terjadi penurunan kadar air dan peningkatan komponen pendukung seperti karbohidrat akan mengalami perubahan menjadi asam organik. Sehingga kualitas rasa dan warna teh lebih terjamin. Kemudian disangrai diatas wajan agar enzim yang masih aktif pada proses pengukusan akan dinonaktifkan kembali. Selanjutnya, sampel daun teh dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 5 x 24 jam, hal ini bertujuan untuk menurunkan kadar air sebesar 3%. Setelah kering sampel teh dihaluskan

menggunakan blender, proses ini bertujuan agar diperoleh serbuk teh yang mudah untuk diekstraksi.

## **2. Analisis Kadar Air**

Analisis kadar air merupakan analisis gravimetri yang sangat berperang penting dalam penentuan mutu dan kualitas suatu bahan pangan. Untuk menentukan kadar air pada sampel teh hijau P+2 dilakukan dengan cara mengoven cawan porselin selama 15 menit, kemudian didesikator selama 5 menit untuk menguapkan kandungan air pada teh. Kemudian didesikator dan di oven kembali, perlakuan tersebut dilakukan hingga diperoleh bobot konstan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh bobot kadar air pada daun teh P+2 sebesar 10,08%.

Menurut SNI (3836: 1995) kadar air pada produk teh yaitu 12%. Dengan demikian hasil penelitian terhadap kadar air daun teh P+2 telah sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan BSNI (Badan Standar Nasional Indonesia). Dengan demikian kadar air yang diperoleh pada daun teh P+2 sesuai dengan mutu dan kualitas produk teh yang baik.

Kontribusi dari analisis kadar air pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kelembaban terhadap ketahanan daun teh hijau P+2. Dimana faktor kelembaban dapat memicu pertumbuhan jamur pada teh, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan kualitas produk teh yang dihasilkan.

## **3. Analisis Kadar Lemak**

Analisis kadar lemak pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode soxhletasi dan metode destilasi. Metode ini merupakan metode ekstraksi menggunakan pelarut n-heksan yang berfungsi sebagai bahan pelarut untuk mengekstrak kandungan lemak dan minyak pada daun teh P+2. Metode ekstraksi ini

memberikan ekstrak yang lebih tinggi karena pada cairan digunakan teknik pemanasan yang akan mempermudah kelarutan ekstrak. Serbuk daun teh hijau P+2 ditimbang sebanyak 25 gram dan dibuatkan selongsong pada preparasi soxhlet dengan 250 mL pelarut n-heksan. Proses ekstraksi dilakukan selama 20 kali sirkulasi. Sehingga diperoleh kadar lemak sebesar 17,56%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan kadar lemak pada teh hijau memiliki batas maksimal yaitu 8% dalam 10 kali sirkulasi<sup>88</sup>

Kontribusi analisis kadar lemak pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis kandungan lemak nabati atau asam lemak tak jenuh yang ada dalam ekstrak teh. Kandungan lemak yang tinggi akan menghambat proses kelarutan zat aktif pada teh. Hal ini disebabkan karena karakter kelarutan lemak dengan senyawa air yang digunakan dalam proses penyeduhan teh sangat bertentangan, sehingga kandungan lemak dalam teh dapat menghambat kemampuan air untuk melarutkan zat aktif yang ada pada teh. Dengan demikian, analisis kadar lemak dalam penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut proses ekstraksi zat aktif. Semakin tinggi kandungan lemak pada daun maka akan mempengaruhi dan menghambat kemampuan air dalam proses ekstraksi sampel.

#### **4. Analisis Kualitatif**

##### **a. Pembuatan ekstrak teh**


Menimbang serbuk teh P+2 sebanyak 2,5 gram diseduh kedalam 50 mL aquades pada variasi suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit.

---

<sup>88</sup>Rossi, Ara. *1001 The dari Asal Usul, Tradisi, Khasiat hingga Racikan Teh*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

### b. Analisis Senyawa Kafein

Ekstrak teh berdasarkan variasi suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit, ditambahkan beberapa tetes reagen parry, yang berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks, lalu didiamkan selama beberapa saat. Diperoleh hasil uji kualitatif yaitu ekstrak sampel teh P+2 mengalami perubahan warna dari kuning kehijauan menjadi biru kehitaman. Hal ini disebabkan karena pada saat penambahan reagen, terjadi pembentukan senyawa kompleks antara kobal (II) nitrat dalam reagen parry yang berikatan dengan gugus karbonil pada senyawa kafein membentuk biru tua.<sup>89</sup> Hal tersebut menandakan bahwa uji kualitatif positif mengandung senyawa kafein. Sehingga dapat diilustrasikan pada reaksi berikut.




**Gambar 4. 1** Struktur Reaksi Komplek Kafein dengan  $\text{CO}(\text{NO}_3)_2$

### c. Analisis Senyawa Tanin

Ekstrak teh dipipet kedalam cawan porselin berdasarkan variasi suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Ekstrak teh yang telah dingin kemudian ditambahkan beberapa tetes pereaksi besi klorida ( $\text{FeCl}_3$  0,1 M), yang berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks, lalu didiamkan

<sup>89</sup>Rialita Kesia Maramis., dkk, "Analisis Kafein dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS" *Jurnal Ilmia Farmasi*, 4 Vol .2 (Manado: FMIPA UNSART, 2013), H. 124-125.

selama beberapa saat. Sehingga diperoleh hasil uji kualitatif yaitu ekstrak sampel teh P+2 mengalami perubahan warna dari kuning kehijauan menjadi biru tua dan menghasilkan endapan biru kehitman. Hal ini disebabkan karena gugus hidroksil pada struktur tanin akan mereduksi  $\text{Fe}^{3+}$  menjadi  $\text{Fe}^{2+}$  sehingga terjadi perubahan warna yang signifikan serta menghasilkan endapan berwarna biru hitam yang menandakan bahwa uji kualitatif positif mengandung senyawa tanin. Reaksi kompleks yang terjadi dapat diilustrasikan melalui reaksi berikut.




**Gambar 4. 2** Reaksi Kompleks Tanin dengan  $\text{FeCl}_3$

#### d. Analisis Senyawa Katekin

Ekstrak teh dipipet kedalam cawan porselin berdasarkan variasi suhu  $70^\circ\text{C}$ ,  $85^\circ\text{C}$  dan  $100^\circ\text{C}$  dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Ekstrak teh yang telah dingin kemudian ditambahkan beberapa tetes pereaksi besi klorida ( $\text{FeCl}_3$  0,1 M), yang berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks, lalu didiamkan selama beberapa saat. Dimana senyawa katekin ini merupakan turunan dari senyawa tanin yang terkondensasi. Penambahan pereaksi besi (III) klorida akan memicu terjadinya reaksi reduksi yang disebabkan oleh gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa katekin. Dimana  $\text{Fe}^{3+}$  tereduksi menjadi  $\text{Fe}^{2+}$  membentuk senyawa kompleks

sehingga menghasilkan warna hijau keunguan dan endapan biru kehitman. Hal tersebut menandakan bahwa uji kualitatif, positif mengandung senyawa katekin. Sehingga dapat diilustrasikan melalui reaksi berikut.




**Gambar 4.3** Struktur Reaksi Kompleks Katekin dengan  $\text{FeCl}_3$

## 5. Analisis Kuantitatif

### a. Analisis Kadar Kafein


Penentuan kadar kafein dilakukan pada variabel suhu  $70^\circ\text{C}$ ,  $85^\circ\text{C}$  dan  $100^\circ\text{C}$  dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Kemudian ditambahkan asam klorida ( $\text{HCl}$  0,01 M) yang berfungsi memberikan sifat asam agar senyawa kafein dalam teh lebih muda untuk diidentifikasi, dimana pada umumnya senyawa

alkaloid ketika ingin diidentifikasi maka harus ada penambahan asam. kemudian ditambahkan dengan Timbal (II) asetat  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  2M yang berfungsi sebagai peraksi pengkomplek. Setelah itu, diencerkan dan dihomogenkan. Selanjutnya, ditambahkan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  3M yang bertujuan memberikan suasana asam dan sebagai larutan pengkompleks, yang dapat dilihat pada ilustrasi berikut.



**Gambar 4.4** Struktur Reaksi Kafein

Kemudian diencerkan sampai tanda batas dan disaring. Setelah itu dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-VIS, untuk memperoleh nilai absorbansi untuk menentukan persen kadar kafein dapat ditinjau dari nilai absorbansi pada variabel suhu  $70^\circ\text{C}$ ,  $85^\circ\text{C}$  dan  $100^\circ\text{C}$  dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit.



**Gambar 4.5** Hubungan antara suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar kafein

Berdasarkan gambar 4.5 diatas maka dapat dilihat bahwa suhu dan waktu penyeduhan dengan persen kadar kafein dalam seduhan daun teh P+2. Maka dapat diketahui bahwa kadar kafein pada proses penyeduhan untuk memperoleh ekstrak teh P+2 memiliki suhu dan waktu optimum yaitu pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kadar kafein sebesar 1,2393 %.

Secara umum semakin tinggi suhu penyeduhan maka semakin besar pula kemampuan air untuk mengekstrak dan mengikat senyawa yang ada dalam teh, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka persen kadar kafein tertinggi diperoleh pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, sedangkan persen kadar terendah berada pada suhu 70°C dengan lama waktu penyeduhan 10 menit yaitu sebesar 0,8632%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka semakin terekstrak pula kafein yang ada dalam teh. Hal ini dapat disebabkan pada proses


kelarutan kafein akibat perlakuan panas atau suhu yang mengakibatkan proses pemecahan senyawa kompleks kafein menjadi tidak stabil sehingga variabel suhu dalam penelitian ini dianggap tidak signifikan terhadap persen kadar kafein yang diperoleh. Semakin tinggi suhu pelarut maka proses pemecahan dari senyawa kompleks kafein akan berlangsung lebih cepat, yang mengakibatkan kafein menjadi bebas dengan ukuran kadar yang tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5 halaman 57 bahwa dari suhu 70°C ke 85°C kadar kafein mengalami peningkatan sedangkan dari suhu 85°C ke 100°C kadar kafein mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada suhu tinggi kandungan senyawa kafein akan terdegradasi menyebabkan struktur kafein pada teh berubah menjadi struktur senyawa lain.

Sedangkan kontribusi dari waktu penyeduhan teh hijau P+2 yaitu semakin lama waktu penyeduhan maka semakin sedikit pula kadar kafein yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidak stabilan suhu terhadap lama waktu penyeduhan pada proses pemecahan senyawa kafein. Waktu penyeduhan dalam penelitian ini dianggap signifikan terhadap kandungan persen kadar kafein yang diperoleh. Karena dapat diketahui bahwa semakin lama waktu penyeduhan maka semakin berkurang kadar kafein dalam teh.

Secara umum teh mengandung kafein sebanyak 3% percangkir atau pada kisaran 40 mg, para ahli menyarankan 200-300 mg batas konsumsi kafein dalam sehari merupakan jumlah yang cukup untuk orang dewasa (Syah Fitri, 2009). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teh hijau P+2 memiliki persen kafein yang cukup rendah jika dibandingkan dengan jenis produk teh kemasan. Selain itu, tanin juga merupakan senyawa metabolit sekunder yang juga berperan penting dalam penentuan mutu dan kualitas teh.

## b. Penentuan Kadar Tanin


Penentuan kadar tanin dilakukan dengan cara ekstrak teh pada variabel suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Pereaksi FeCl<sub>3</sub> 0,1 M berfungsi sebagai senyawa pengkompleks di dalam ekstrak teh. Pada saat penambahan FeCl<sub>3</sub> ke dalam larutan ekstrak teh maka ekstrak teh yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi kuning kehijauan. Disebabkan karena gugus hidroksil pada senyawa tanin mengalami ikatan koordinasi dengan Fe<sup>3+</sup> yang tereduksi menjadi Fe<sup>2+</sup> sehingga membentuk kompleks dan menghasilkan perubahan warna pada ekstrak teh. Setelah itu, ditambahkan larutan kalium heksasianoferat K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> 0,008 M yang berfungsi sebagai senyawa pemberi warna sekaligus sebagai pengkompleks dalam pembentukan reaksi, dimana pada larutan ekstrak teh akan mengalami perubahan warna dari kuning kehijauan berubah menjadi biru tua dan menghasilkan endapan berwarna biru kehitaman, dikarenakan gugus sianida (CN)<sub>6</sub> pada kalium heksasianoferat berfungsi untuk mempertajam warna (meningkatkan kromofor pada ekstrak sampel). Seperti yang terlihat pada reaksi berikut:



Karena terdapatnya ion-ion tersebut maka akan bergabung dan membentuk endapan larutan yang berwarna biru tua.<sup>90</sup> Dimana pada reaksi kompleks tersebut Fe<sup>3+</sup> membentuk 6 ikatan koordinasi dengan gugus hidroksil pada struktur senyawa tanin. Pada pengukuran spektrofotometri UV-VIS untuk memperoleh hasil yang lebih

<sup>90</sup>Svehla, "Text Book Of Macro and Semimikro Qualitative Inorganic Analysis", Terj. Setiono dan Pudjaatmaka "Buku Teks Anorganik Kualitatif Makro dan Semi Mikro", (Jakarta: PT Kalman Media Pustaka, 1990), h. 259

akurat yang dapat ditinjau dari nilai absorbansi sampel, yang selanjutnya akan diolah datanya menjadi data matematik berdasarkan absorbansi sampel pada variabel suhu dan waktu penyeduhan. Sesuai dengan struktur reaksi kompleks tanin pada gambar 4.2 pada halaman 54. Dalam penentuan kadar tanin dapat ditinjau dari nilai absorbansi pada variabel suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit maka diperoleh hasil sebagai berikut.




**Gambar 4.6** Hubungan antara suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar tanin

Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa suhu dan waktu penyeduhan pada sampel teh P+2 memiliki peranan penting terhadap persen kadar yang diperoleh. Maka dapat diketahui bahwa senyawa tanin pada proses penyeduhan ekstrak teh P+2 memiliki suhu dan waktu optimum yaitu pada suhu 85°C dengan waktu penyeduhan 5 menit sebesar 3,506 %.

### c. Analisis Kadar Katekin

Penentuan kadar katekin dilakukan dengan cara menimbang serbuk teh P+2 sebanyak 1 gram kemudian di seduh pada variabel suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Setelah diseduh, ekstrak teh yang diperoleh kemudian ditambahkan methanol p.a yang berfungsi sebagai pelarut dan sekaligus pereaksi yang dapat melarutkan dan mengikat senyawa katekin. Kemudian dipanaskan selama 5 menit. Pemanasan yang dilakukan bertujuan agar mempercepat proses pemecahan senyawa katekin dalam sampel sehingga dapat terikat baik oleh pelarut.

Dalam penentuan kadar katekin dapat ditinjau dari nilai absorbansi pada variabel suhu 70°C, 85°C dan 100°C dengan waktu penyeduhan 5 menit, 10 menit dan 15 menit maka dapat dilihat perbandingan antara suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar katekin berikut ini.




**Gambar 4.7** Hubungan antara suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar katekin

Berdasarkan gambar 4.7 pada hal 60, maka dapat diketahui bahwa suhu dan waktu optimum untuk senyawa katekin berada di suhu 100°C dengan lama penyeduhan 10 menit dengan persen kadar katekin yang diperoleh 2,3000%.

#### d. Penentuan Suhu dan Waktu Optimum Penyeduhan Terbaik

Penentuan suhu dan waktu optimum penyeduhan teh dengan cara meninjau persen kadar tanin dan katekin yang tinggi pada kisaran suhu dan waktu penyeduhan yang sama, kemudian meninjau dan menyamakan pada suhu berapa dan waktu penyeduhan berapa persen kafeinnya rendah maka itulah suhu dan waktu optimum penyeduhan teh yang baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan persen kadar senyawa dengan suhu penyeduhan berdasarkan waktu penyeduhan yang sama.



**Gambar 4.8** Suhu 70 dengan Waktu Penyeduhan 10 Menit

Berdasarkan gambar diagram batang pada halaman 62 maka dapat ditentukan suhu dan waktu optimum penyeduhan daun teh hijau P+2 berada pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 10 menit. Dimana pada suhu dan waktu penyeduhan tersebut persen kadar tanin 1.8440% dan katekin 1.5181% lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kafein yaitu 0.8632%.

## 6. Analisis Aktifitas Antioksidan


Uji aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode serapan DPPH. Metode DPPH merupakan metode yang cukup muda dan sederhana. Metode ini banyak digunakan karena dapat menguji sampel dalam jumlah yang kecil dan tidak memakan waktu lama. Dimana metode DPPH ini pada dasarnya memiliki prinsip yang didasarkan pada kemampuan suatu senyawa antioksidan dalam menetralkan senyawa radikal bebas. Pada metode ini DPPH berfungsi sebagai radikal bebas, dimana pada dasarnya DPPH memiliki warna yang cukup pekat (ungu pekat) sesuai dengan konsentrasinya. Hal ini disebabkan karena DPPH memiliki elektron yang tidak berpasangan. Sehingga untuk mencapai kestabilan maka DPPH atau senyawa radikal bebas ini membutuhkan suatu senyawa lain untuk bisa stabil.

Pembuatan larutan DPPH dilakukan ditempat yang gelap, sehingga terhindar dari sinar matahari langsung ataupun cahaya yang dapat menyebabkan terjadinya proses dekomposisi pada larutan. Proses pembuatan larutan DPPH digunakan pelarut methanol p.a yang berfungsi sebagai larutan kontrol atau pembanding dalam menentukan potensi antioksidan pada sampel. Selain itu, methanol p.a juga berfungsi untuk mengetahui absorbansi radikal DPPH sebelum bereaksi dengan sampel (mengalami proses reduksi oleh senyawa antioksidan). Pembuatan larutan DPPH dilakukan pula proses inkubasi pada suhu 37°C yang bertujuan agar reaksi antara senyawa antioksidan dengan senyawa radikal DPPH berlangsung secara optimal. Dengan demikian, sebelum dilakukan uji aktivitas antioksidan maka terlebih dahulu dilakukan proses inkubasi hal ini akan mempercepat reaksi senyawa antioksidan.

Senyawa antioksidan banyak terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah daun teh hijau P+2. Dimana daun teh hijau P+2 ini mengandung

senyawa flavanoid dan alkaloid, serta senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya. Flavanoid merupakan metabolit sekunder yang tergolong keadalm senyawa aktif yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan alami. Flavanoid merupakan golongan polifenol yang memiliki banyak gugus hidroksi (OH). Dimana pada gugus hidroksi atom hidrogen dapat didonorkan pada senyawa radikal bebas agar membentuk suatu senyawa baru yang besifat stabil.


Mekanisme kerja dari suatu senyawa antioksidan yaitu mendonorkan elektron yang dimilikinya kepada senyawa radikal bebas. Dimana pada penelitian ini senyawa flavanoid pada daun teh yaitu senyawa tanin dan katekin. Reaksi penetralan radikal bebas DPPH oleh senyawa tanin dapat diilustrasikan sebagai berikut.



**Gambar 4.9** Reaksi Penetralkan Radikal DPPH oleh Senyawa Tanin

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa senyawa tanin yang terkandung di dalam daun teh P+2 dapat menetralkan radikal bebas DPPH pada gugus nitrogen. Dalam ini gugus nitrogen yang memiliki radikal bebas dinetralkan menjadi senyawa amina dengan adanya donor elektron oleh gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa tanin. Selain itu, dalam teh P+2 terdapat pula jenis tanin terkondensasi atau biasa disebut dengan senyawa katekin yang merupakan senyawa turunan dari tanin.

Dengan demikian senyawa katekin ini juga dapat menetralkan senyawa radikal bebas DPPH yang dapat diilustrasikan pada reaksi berikut.



**Gambar 4.10** Reaksi Penentralan Radikal Bebas DPPH oleh Senyawa Katekin

Radikal bebas DPPH dalam penelitian ini diuji cobakan dengan senyawa polifenol yaitu tanin dan katekin yang terkandung dalam daun teh hijau P+2. Berdasarkan penentuan persen kadar tanin dan katekin serta kafein dalam ekstrak teh yang diperoleh, maka yang diuji aktivitas antioksidannya adalah ekstrak teh pada suhu dan waktu penyeduhan optimum. Dimana pada penelitian ini diperoleh suhu dan waktu penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kandungan antioksidan yaitu pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 10 menit. Diperoleh kadar tanin dan katekin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kafein. Sehingga pada penelitian ini diperoleh nilai daya hambat radikal bebas DPPH oleh senyawa kafein, tanin dan katekin sebesar 78,85%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Suhu optimum penyeduhan teh hijau P+2 terhadap kadar senyawa kafein pada suhu 85°C, tanin yaitu pada suhu 85°C dan katekin pada suhu 100°C.
2. Waktu optimum penyeduhan daun teh hijau P+2 terhadap kadar senyawa kafein pada waktu penyeduhan 5 menit, tanin yaitu pada waktu penyeduhan 5 menit dan katekin pada waktu penyeduhan 5 menit.
3. Aktivitas antioksidan pada suhu dan waktu optimum penyeduhan terbaik yaitu pada suhu 70°C dengan waktu penyeduhan 10 menit dimana diperoleh nilai daya hambat sebesar 78,85% menggunakan metode DPPH.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan uji aktivitas antioksidan secara spesifik terhadap suhu dan waktu optimum penyeduhan teh dari masing-masing senyawa. Karena ketiga senyawa tersebut memiliki suhu dan waktu optimum penyeduhan yang berbeda.
2. Perlu dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap kandungan tanin dan katekin pada teh hijau khususnya pada daun teh P+2. Karena selain dapat berperan menangkal radikal bebas senyawa tanin dan katekin juga memiliki sifat toksik terhadap mikroorganisme pada konsentrasi yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Ajisaka, *Teh Khasiatnya Dahsyat*. Surabaya: Stomata, 2012

Ananda, Astri Dwi. "Aktivitas Antioksidan Dan Karakteristik Organoleptik Minuman Fungsional Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) Rempah Instan". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, (2009).

Anindita, Reza, dkk., "Potensi Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L.) dalam Perbaikan Fungsi Hepar Pada Mencit yang Diinduksi Monosodium Glutamat (MSG)". *Buletin Anatomi dan Fisiologi XX* No. 2. Sumatera: Universitas Diponegoro, 2012, h. 15-23.

Andasuryani., dkk. "Prediksi Kandungan Katekin Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) dengan Spektroskopi NIR". *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*. 24 Vol. 1 (2014), hal. 30-48.

Artanti, Anif Nur., dkk. "Pengaruh Pemberian Polifenol Teh Hijau Terhadap Sekres Nitrit Oksida (No) Sel Fagosit Pada Manusia". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, (2006).

Artanti, Anif Nur, dkk, "Perbedaan Kadar Kafein Daun Teh (*Camellia Sinensis* (L). Kuntze Berdasarkan Status Ketinggian Tempat Tanam dengan Metode HPLC". *Journal Of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, Surakarta: *Universitas Celebes Mare Sirakarta*, 01 (2016), h. 34-45

Ayu, Lintang., dkk. "Pertumbuhan Hasil dan Kualitas Pucuk Teh (*Camellia Sinensis* (L.) Kuntze) di Berbagai Tinggi Tempat". *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian Universitas Gadjadara, (2013), h. 1-12.

Biswas, K.P. "Description Of Tea Plants" In: *Encyclopaedia Of Medicinal Plants*, New Delhi: Dominant Publishers and Distributor. (2006). h. 8-15

Damayanthi, Evy dkk. "Studi Tentang Kandungan Katekin dan Turunannya Sebagai Antioksidan Alami serta Karakteristik Organoleptik Produk Teh Murbei dan Teh Kamelia-Murbei". *Media Gizi dan Keluarga* 32 No. 1. Gombang: Dept. Gizi Masyarakat. (2008), h. 95-103.

Daroini, Oryza Sativa. "Kajian Pembuatan Teh Herbal dari Campuran Teh Hijau (*Camellia sinensis* L), Rimpang bangle (*Zingiber cassumunar* Roxb) dan Daun Cermay (*Phyllanthus acidus* (L) Skeels)". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, (2006).

Devi Putri, Dianita dan Ita Ulfina, "Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kadar Kafein dalam Teh Hitam". *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2. Vol 4 Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, (2015), h 1-8.

Dewi Anjasari Intan Ratna., dkk. "Pengaruh Kombinasi Pupuk dan Kompos Terhadap Pertumbuhan Tanaman Teh (*Camellia Sinensis* (L) O. Kuntze) Belum


- Menghasilkan Klon Gambung 7. *Skripsi* II. Bandung: Universitas Padjajaran, 2007.
- Dian Sharaswati, "Analisis Produktivitas Teh (*Camellia sinensis* (L.) o. kuntze) di PT. Pagilaran, Batang, Jawa Tengah". *Skripsi*, Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian. 2008,
- Dwi Nugrahaningtyas. "Khoirina Isolasi Senyawa Flavonoid dalam Rimpang Temu Ireng (*Curcuma aeruginosa* Roxb.)". *Jurnal Biofarmasi* 3, Vol. 1 (2005). h.1-7
- Fajriaty, Imelda. "Optimasi Metode Penentuan Tanin (Analisis Secara Spektrofotometri dengan Pereaksi Orto-Fenantrolin)". *Jurnal Kaunia* II. No.2 Bandung: ITB (2006), h. 1-14.
- Gardjito, Murdijati dan Rahadian A.M, Dimas. *Sejarah dan Tradisi Minum Teh, Cara Benar Menyeduh dan Menikmati Teh Khasiat Teh*. Yogyakarta: Kansius, 2011.
- Golshani, Mehdi. *The Holy Qur'an and The Sciences of Nature* Terj. Agus Effendy, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an*". Edisi Baru. Bandung: Mizan, 2003.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, terj. Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro, *Phytochemical Methods*. Bandung: ITB, 1987.
- Harismah Kun, dkk. "Pembuatan Sirup Sosela Rendah Kalori dengan Pemanis Daun Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni)". *Simposium Nasional Teknologi Terapan* 2, no. 2 (2014), h. 44-47.
- H Sutarna, Titta dkk., "Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L.) dan Madu Hitam (*Apis dorsata*) Sebagai Antioksidan". *Jurnal Ilmia Farmasi* 1 No.1 Cimahi: Universitas Jendral Achmad Yani. 2013, h. 17-23.
- Indarwati, Dewi. "Aktivitas Antioksi dan Dan Total Fenol Seduhan Teh Herbal Daun Pacar Air (*Impatiens Balsamina* L.) dengan Variasi Metode Pengeringan dan Konsentrasi". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Lestari Puji. "Isolasi dan Identifikasi Komponen kimia Ekstrak Etanol Buah Merah (*Pandanus conoideus* Lam.)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2011.
- Lubis, Triva Murtina dkk, "Pengaruh Pemberian Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* L.) Terhadap Penurunan Kadar Hemoglobin dan Nilai Hematokrit Pada tikus Wistar (*Rattus norvegicus*), *Jurnal Medika Veterinaria*, 2, Vol. 10, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- Kesia Maramis, Rialita ., dkk, "Analisis Kafein dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS" *Jurnal Ilmia Farmasi*, 4 Vol .2 Manado: FMIPA UNSART (2013), h. 120-126.

- Kusumaningrum Ria, dkk. "Karakteristik dan Mutu Teh Bunga Lotus (*Nelumbo nucifera*), *Fishtech* II, no. 01 (2013): h. 9-20.
- Khomael, Heri Syahrani dan bambang Sriyadi. "Variabilitas dan Seleksi Awal Populasi Tanaman Teh Hasil Persilangan Buatan". *Jurnal*. Bandung: Pusat Penelitian Teh dan Kina Gmbung (2011), h. 70-76.
- Khomaeni, Hery Syahrani dkk. "Korelasi Genotipik Morfologi Daun dengan Kandungan Katekin Pada Tanaman Teh (*Camelia Sinensiss* (L), O.Kuntze)". *Jurnal Penelitian Teh dan Kina* 18 No. 1. Bandung: Fakultas Pertanian Universitas Padjajara (2015), h.35-44.
- Malangngi, Liberty P., dkk. "Penentuan Kandungan Tanin dan Uji Antioksidan Ekstrak Biji Buah Alpukat (*Persea Americana* Mill.), *Jurnal MIPA Unsrat Onlin*, 1 vol 1, Manado: Unsrat, (2012), h. 5-10
- Maramis., Rialita Kesia dkk. "Analisis Kafein dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS". *Jurnal Ilmia Farmasi*, 4 Vol .2 Manado: FMIPA UNSART (2013), h. 120-129.
- Martinus, B.A dkk. "Perbandingan Kadar Fenolat Total dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Daun Teh (*Camellia Sinensis* [L.] O.K.) dari Kayu Aro dengan Produk Teh Hitamnya yang Telah Beredar". *Scientia* 4 No.2. Padang: Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, 2012.
- Nugrahaningtyas, Khoirina Dwi. "Isolasi Senyawa Flavonoid dalam Rimpang Temu Ireng (*Curcuma aeruginosa* Roxb.)". *Jurnal Biofarmasi* 3, Vol. 1 (2005), h.30-3
- Noriko, Nita. "Potensi Daun Teh (*Camelia Sinensiss*) dan Daun Anting-Anting (*Acalypha Indica* L) dalam Menghambat Pertumbuhan *Salmonella typhil*". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi* 2 No. 2. Jakarta Selatan: Universitas Al-Azhar Indonesia (2013), h. 104-110.
- Pratama. Mamat. dkk. "Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Tomat Buah (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *pyriforme* Alef) dan Daun Tomat Sayur (*Lycopersicon esculentum* Mill, var. *commune* Bailey) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2- Picryl Hydrazil). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*. 1, Vol. 2 (2014). hal. 1-7.
- Priyanto, Jepri Agung. "Flavanoids Production Capability Test Of Tea Mistletoe (*Scurrulla Antropurpurea* BL. Dans) Endopityc Bacteria Isolate", *Jurnal Sains dan Matematika*. 4 vol 22. Semarang: Diponegoro Univercity (2014), h. 89-96.
- Prasetyo S, Susiana "Pengaruh Rasio Biji Teh/Pelarut Air dan Temperatur pada Ekstraksi Saponin Biji Teh Secara *Batch*". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2011.
- Rohdiana, Dr. Dadan. "Proses Karakteristik dan Fungsional Teh". *Jurnal Foodrevie Indonesia* X No. 8. Jakarta: Pusat Penelitian dan Kina, (2015), h. 34-37.
- Rohman, Abdul. "Aktivitas Antioksidan, Kandungan Fenolik Total dan Flavonoid Total yang Terkandung Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.)". *Jurnal Agritech*, 4, Vol. 27 (2007), hal. 147-152.

- Rossi, Ara., "1001 Teh dari Asal Usul Kasiat Hingga Racikan Teh, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010.
- Rukyani, Ida "Antioxidant Activity and Organoleptic Test Of Tea Bag Stem and Flower Of Kecombrang *With Variations Temperature Drying*", *Skripsi* Suryakarta: Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Sada Yunitauli Sibuea, Fridaqua "Ekstraksi Tanin dari Kluwak (*Pangium Edule R.*) Menggunakan Pelarut Etanol dan Aquades dan Aplikasinya Sebagai Pewarna Makanan". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Sari, Mei Ambar. "Aktivitas Antioksidan Teh Daun Alpukat (*Persea americana* Mill) dengan Variasi Teknik dan Lama Pengeringan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (2015), hal. 1-12
- Sharaswati, Dian. "Analisis Produktivitas Teh (*camellia sinensis* (L) o. kuntze) di PT. Pagilaran, Batang, Jawa Tengah. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian, 2008.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sibuea, Fridaqua Sada Yunitauli. "Ekstraksi Tanin dari Kluwak (*Pangium Edule R.*) Menggunakan Pelarut Etanol dan Aquades dan Aplikasinya Sebagai Pewarna Makanan". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Silaban, Marisi. "Pengaruh Jenis Teh dan Lama Fermentasi Pada Proses Pembuatan Teh Combucha". *Skripsi USU Repotary*. Sumatera Utara: Departemen Teknologi Pertanian, 2005.
- Sitorus, Marham. *Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 25
- Sulastri, Taty. "Analisis Kadar Tanin Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol pada Biji Pinang Sirih (*reca Catechu L*)". *Jurnal Chemica* 10, no. 1 (2019), h. 59-63.
- Sundari, Dian, dkk. "Toksitas Akut (LD<sub>50</sub>) dan Uji Gelagat Ekstrak Daun Teh Hijau (*Cammelia Sinensis* (Linn) Kunze) pada Mencit". *Media Peneliti dan Pengembang Kesehatan* 110, no. 4 (2009): h. 198-203.
- Sutarna, Titta H, dkk. "Formula Sediaan Masker Gel dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* L) dan Maddu Hitam (*Apis dorsata*) Sebagai Antioksidan". *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi* 1 No. 1 (2013), h. 17-23.
- Suryaningrum, Riana Dyah dkk, "Peningkatan Kadar Tanin dan Penurunan Kadar Klorin Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Gunna Teh Celup", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Susanti, Erna "Aktivitas Antioksidan Terhadap Stabilisasi Plak (dalam Rangka Memperkecil Resiko Serangan Jantung)", *Jurnal El-Hayah* 2, Vol. 2 (2012), hal. 78- 80.

- Soehardjo, Dkk, "Vademecum Bidang Tanaman Teh PT. Perkebunan Nusantara IV". Bah Jambi: Pematang Siantar, 1996.
- SR, Senthilkumar, dkk. "Gas Chromatography-Mass Spectroscopy Evaluation Of Bioactive Phytochemical Of Commercial Green Tea (*Camellia Sinensis* L) Of Indian". *Asian Journal Of Pharmaceutical and Clinical Research* 8 No. 3 (2015), h.278-282.
- Sriyadi, Bambang "Seleksi Klon Teh Assamica Unggul Berpotensi Hasil dan Kadar Katekin Tinggi", *jurnal Penelitian Kimia dan Kina* 15, vol. 1 (2012), h
- Syah Fitri, Novianty. "Pengaruh Berat dan Waktu Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein dari Bubuk Teh.". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Svehla, "Text Book Of Macro and Semimikro Qualitative Inorganic Anallysis", Terj. Setiono dan Pudjaatmaka. "Buku Teks Anorganik Kualitatif Makro dan Semi Mikro". Jakarta: PT Kalman Media Pustaka, 1990.
- Tuminah, Teh *Camellia Sinensis* O.K Asammica (Mast) Sebagai Salah Satu Sumber Antioksidan". *Skripsi*, 2004.
- Towaha, Juniaty dan Balittri. "Kandungan Senyawa Kimia Pada Daun Teh (*Camelia Sinensiss*)". *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri* 19 No. 3 (2013), h. 1-5.
- Tsauri, Sofyan. *1001 Teh dari Asal Usul, Tradisi, Khasiat, Hingga Racikan Teh*. Yogyakarta: CV ANDI OFESET, 2012.
- Verawaty, dkk, "Efektivitas Sistem Penghantaran Liposom Pada Katekin Sebagai Antioksidan", *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*, 2, Vol 2 (2016), hal. 176.
- Winata, Hadi. "Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Kimiawi Ekstrak daun Wungu (*Graptophyllum pictum* L. Griff)". *Skripsi*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (2011), h. 1-30
- Weerawatanakorn, Monthana, dkk., "Chemistry and Healt Beneficial Of Oolong Tea and Theasintesins", *Jurnal Food Science and Human Wellnes* 4 (2015), h. 133-146.
- Zega Yohanes. "Pengembangan Produk *Jelly Drink* Berbasis Teh (*Camelia Sinensis*) Dan Secang (*Caesalpinia Sappan* L.) Sebagai Pangan Fungsional". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, 2010.
- Zubaidah, Elok dan Prasis Nursyam Suhardini, "Studi Aktivitas Antioksidan Kombucha dari Beebagai Jenis Daun Selama Fermentasi". *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 1, Vol, 4 (2016), hal. 190- 195.

### Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian



## Lampiran. 2. ANALISIS DATA

### 1. Analisi Kadar Air

Diketahui;

$$\text{Bobot Sampel} = 1,0005 \text{ g}$$

$$\text{Bobot cawan kosong} = 32,2773 \text{ g}$$

$$\text{Berat awal} = 33,6100 \text{ g}$$

$$\text{Bobot akhir} = 33,5020 \text{ g}$$

Penyelesaian:

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{\text{Berat awal} - \text{Berat akhir}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{33,6100 \text{ g} - 33,5020 \text{ g}}{1,0005 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,108 \text{ g}}{1,0005 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 10,08 \%$$

### 2. Analisi Kadar Lemak

$$\text{Berat labu lemak awal (A)} = 306,4 \text{ g}$$

$$\text{Berat sampel awal (C)} = 25 \text{ g}$$

$$\text{Bobot labu lemak (B)} = 312,6 \text{ g} + 1,86 \text{ g} = 310,74 \text{ g}$$

Penyelesaian;

$$\% \text{ Lemak} = \frac{B-A}{C} \times 100\%$$

$$= \frac{310,74 \text{ g} - 306,4 \text{ g}}{25} \times 100\%$$

$$= \frac{4,34 \text{ g}}{25} \times 100\%$$

$$= 17,56\%$$

### 3. Analisis Kualitatif

#### a. Pembuatan Pereaksi

##### 1) Besi (III) klorida ( $\text{FeCl}_3$ ) 0,1 M

Mr  $\text{FeCl}_3$  : 162,5 gr/mol

Volume : 100 mL  $\rightarrow$  0,1 L

M : 0,1 M

$$\begin{aligned} \text{gr} &= \text{Mr} \times \text{C} \times \text{L} \\ &= 162,5 \text{ gr/mol} \times 0,1 \text{ M} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 1,625 \text{ gr} \end{aligned}$$

##### 2) Kalium heksasianoferrat ( $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ ) 0,008 M

Mr  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  : 329 gr/mol

Volume : 100 mL  $\rightarrow$  0,1 L

M : 0,008 M

$$\begin{aligned} \text{gr} &= \text{Mr} \times \text{C} \times \text{L} \\ &= 329 \text{ gr/mol} \times 0,008 \text{ M} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 0,2632 \text{ gr} \end{aligned}$$

##### 3) Timbal (II) nitrat ( $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ) 2 M

Mr  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  : 325 gr/mol

Volume : 100 mL  $\rightarrow$  0,1 L

M : 2 M

$$\begin{aligned} \text{gr} &= \text{Mr} \times \text{C} \times \text{L} \\ &= 325 \text{ gr/mol} \times 2 \text{ M} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 65 \text{ gr} \end{aligned}$$

**4) Asam klorida (HCl) 0,01 M**

Mr HCl : 36,5 gr/mol  
 Volume : 100 mL → 0,1 L  
 M : 0,1 M  
 % : 37 %  
 BJ : 1,19 gr/mol

$$M = \frac{\% \cdot BJ \cdot 1000}{BM}$$

$$= \frac{37 \% \cdot 1,19 \text{ gr/mol} \cdot 1000}{36,5 \text{ gr/mol}}$$

$$= 12,063 \text{ mol/mL}$$

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$100 \cdot 0,1 = V_2 \cdot 12,063$$

$$V_2 = \frac{10}{12,063}$$


$$= 0,82 \text{ mL}$$

**5) Asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 3 M**

Mr H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> : 98 gr/mol  
 Volume : 100 mL → 0,1 L  
 M : 3 M  
 % : 97 %  
 BJ : 1,84 gr/mol

$$\begin{aligned}M &= \frac{\% \cdot BJ \cdot 1000}{BM} \\ &= \frac{97\% \cdot 1,84 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} \cdot 1000}{36,5 \frac{\text{gr}}{\text{mol}}} \\ &= 18,212 \text{ mol/mL}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_1 \cdot M_1 &= V_2 \cdot M_2 \\ 100 \cdot 3 &= V_2 \cdot 18,212 \\ V_2 &= \frac{300}{18,212} \\ &= 16,47 \text{ mL}\end{aligned}$$



#### 4. Analisis Kuantitatif

##### a. Analisis Kadar Kafein

##### 1) Larutan Standar Kafein

Keterangan;

X = Konsentrasi Sampel

Y = Absorbansi Sampel

n = Jumlah Sampel

No.	Konsentrasi (x) (ppm)	Absorbansi (y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1.	5	0,0329	25	0,00108241	0,1645
2.	10	0,0627	100	0,00393129	0,6270
3.	15	0,0982	225	0,00964324	1,4730
4.	20	0,1359	400	0,01846881	2,7180
5.	25	0,1648	625	0,0275904	4,2100

Diketahui;

Absorbansi Blanko =

Panjang Gelombang = 279

$$\sum x = 75$$

$$\sum y = 2,4559$$

$$\sum x^2 = 1.375$$

$$\sum y^2 = 1,4787$$

$$\sum xy = 45,0510$$

$$(\sum x)^2 = 5.62$$

- Untuk nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{(n \cdot \sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{(n \cdot \sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(5 \cdot 45,0510) - (75 \cdot 2,4559)}{(5 \cdot 1.375) - (75)^2}$$

$$b = \frac{(5 \cdot 9.1095) - (75 \cdot 0,4945)}{(5 \cdot 1,375) - (5625)}$$

$$b = \frac{(225,255) - (184,1925)}{(6,875) - (5625)}$$

$$b = \frac{(41,0625)}{(1.250)}$$

$$b = 0,03285$$

- Untuk nilai a

$$y_{rata-rata} = \frac{\sum y}{n} = \frac{2,4559}{5} = 0,49118$$

$$x_{rata-rata} = \frac{\sum x}{n} = \frac{75}{5} = 15$$

$$y = a + bx_{rata-rata}$$

$$a = y_{rata-rata} - (0,03285 \cdot 15)$$

$$a = 0,49118 - 0,049275$$

$$a = -0,00157$$

- Untuk nilai R<sup>2</sup>

$$R^2 = \frac{(n \cdot \sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{[(n \cdot \sum xy) - (\sum x)^2] [(n \cdot \sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

$$R^2 = \frac{(5 \cdot 45,0510) - (75 \cdot 2,4559)}{\sqrt{[(5 \cdot 1.375) - (75)^2] [(5 \cdot 1,4787) - (2,4559)^2]}}$$

$$R^2 = \frac{(225,255) - (184,1925)}{\sqrt{[(6,875) - (5,625) ((7,3935) - (6,0314))])}}$$

$$R^2 = \frac{(41,0625)}{\sqrt{[(1,250) (1,3621)]}}$$

$$R^2 = \frac{(41,0625)}{\sqrt{[1,702,625]}}$$

$$R^2 = 0,9951$$

### Suhu 70°C Waktu Penyeduhan 10 Menit (A<sub>1</sub>T<sub>2</sub>)

Diketahui;

$$\begin{aligned} y &= 1,4194 \\ \text{Berat sampel} &= 1 \text{ g} = 1.000 \text{ mg} \end{aligned}$$

Penyelesaian;

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi (x)} &= \frac{\text{Absorbansi sampel} - a}{b} \\ &= \frac{1,4194 - 0,00157}{0,03285} = 43,1607 \end{aligned}$$

$$A_1T_2 \text{ (mg/g)} = \frac{\text{Konsentrasi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times \text{Volume (L)} \times Fp}{\text{Berat Sampel (g)}}$$

$$= \frac{43,1607 \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 0,01 \text{ (L)} \times 20}{1 \text{ g}}$$

$$= 8,6321 \text{ mg/g}$$

$$\% A_1T_2 = \frac{8,6321 \text{ mg/g}}{1.000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 0,8632\%$$

## 2) Analisis Kadar Tannin

$$X = \text{Absorbansi Sampel}$$

Y = Absorbansi Blanko

V = Volume Sampel

**Suhu 70°C Waktu Penyeduhan 10 Menit (A<sub>1</sub>T<sub>2</sub>)**

$$\% A_1 T_2 = \frac{\text{Absorbansi Sampel}}{\text{Absorbansi Blanko}} \times \frac{100}{\text{Volume Sampel}} \times 1.000$$

$$= \frac{0,3077}{1,6679} \times \frac{100}{1} \times 1.000$$

$$= 0,1844 \times 100 \times 1.000$$

$$= 18.1844 \text{ ppm}$$

$$= 1,844\%$$

### 3) Analisis Kadar Katekin

No	Konsentrasi (x) (ppm)	Absorbansi (y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1.	5	0,1910	25	0,0364	0,9550
2.	10	0,2882	100	0,0830	2,8820
3.	15	0,4998	225	0,2498	7,4970
4.	20	0,6411	400	0,4110	12,8220
5.	25	0,8358	625	0,6985	20,8950

Diketahui:

$$\text{Absorbansi Blanko} = 0,1497$$

Absorbansi Blanko =

Panjang Gelombang = 279

$$\sum x = 75$$

$$\sum y = 2,4945$$

$$\sum x^2 = 1.375$$

$$\sum y^2 = 1,4787$$

$$\sum xy = 9,1025$$

$$(\sum x)^2 = 5.625$$

- Untuk nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{(n \cdot \sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{(n \cdot \sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(5 \cdot 9,1095) - (75 \cdot 0,4945)}{(5 \cdot 1,375) - (75)^2}$$

$$b = \frac{(5 \cdot 9,1095) - (75 \cdot 0,4945)}{(5 \cdot 1,375) - (5625)}$$

$$b = \frac{(45,5125) - (37,0875)}{(6,875) - (5625)}$$

$$b = \frac{(8,4250)}{(1,250)}$$

$$b = 0,00674$$

- Untuk nilai a


$$y_{rata-rata} = \frac{\sum y}{n} = \frac{2,4945}{5} = 0,0989$$

$$x_{rata-rata} = \frac{\sum x}{n} = \frac{75}{5} = 15$$

$$y = a + bx_{rata-rata}$$

$$a = y_{rata-rata} - (0,00674 \cdot 15)$$

$$a = 0,0989 - 0,1011$$



$$a = -0,0022$$

- Untuk nilai  $R^2$

$$R^2 = \frac{(n \cdot \sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{[(n \cdot \sum xy) - (\sum x)^2] (n \cdot \sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$R^2 = \frac{(5 \cdot 9,1095) - (75 \cdot 0,4945)}{\sqrt{[(5 \cdot 1,375) - (75)^2] [(5 \cdot 0,06028479) - (0,24453025)^2]}}$$

$$R^2 = \frac{(45,5125) - (37,0875)}{\sqrt{[(6,875) - (5,625)] [(0,30142395) - (0,24453025)]}}$$

$$R^2 = \frac{(8,425)}{\sqrt{[(1,250) - (0,0568937)]}}$$

$$R^2 = \frac{(8,425)}{\sqrt{[71,117125]}}$$

$$R^2 = 0,999$$

**Suhu 70°C Waktu Penyeduhan 10 Menit ( $A_1T_2$ )**

Diketahui;

$$y = 2,0486$$

$$\text{Berat sampel} = 1 \text{ g} = 1.000 \text{ mg}$$

Penyelesaian;

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi (x)} &= \frac{\text{Absorbansi sampel} - a}{b} \\ &= \frac{2,0486 - 0,0022}{0,00674} = 303,6201 \end{aligned}$$

$$A_1T_2 \text{ (mg/g)} = \frac{\text{Konsentrasi } \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times \text{Volume (L)} \times Fp}{\text{Berat Sampel (g)}}$$

$$= \frac{303,6201 \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 0,002 \text{ (L)} \times 25}{1 \text{ g}}$$

$$= 15,1810 \text{ mg/g}$$

$$\% A_1 T_2 = \frac{15,1810 \text{ mg/g}}{1.000 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$= 1,5181\%$$

## 5. Analisis Aktivitas Antioksidan

Diketahui:

- Absorbansi Blanko = 0,5437

- Absorbansi Sampel = 0,1150



$$\text{Aktivitas Antioksidan P+2} = \frac{(\text{Absorbansi Blanko} - \text{Absorbansi Sampel})}{\text{Absorbansi Blanko}} \times 100\%$$

$$= \frac{(0,5437 - 0,1150)}{0,5437} \times 100\%$$



$$= 78,85\%$$

### Lampiran 3. Hasil Analisis Spektrofotometri UV-VIS



#### 1. Analisis Kadar Kafein



## 2. Analisis Kadar Tanin



### 3. Analisis Kadar Katekin



#### 4. Analisis Larutan Standar Kafein

Concentration [C:\...Kafein 13062017.BCN]- Online[Calibrated]

Commands Setup... Graph Help

Abs VARIAN

Read Abs nm

Zero (0.1606) 279.0

Calibration  
Collection time 3/11/2010 12:11:14 AM

Standard	Concentration mg/L	F	Mean	SD	*RSD	Readings
Std 1	5.0		0.1912	0.0002	0.12	0.1913 0.1914 0.1910
Std 2	10.0		0.2883	0.0001	0.04	0.2883 0.2884 0.2882
Std 3	15.0		0.5538	0.0924	16.6	0.5011 0.6605 0.4998
Std 4	20.0		0.6406	0.0005	0.08	0.6406 0.6401 0.6411
Std 5	25.0		0.8348	0.0017	0.21	0.8328 0.8357 0.8358

Calibration eqn: Abs = 0.03333\*Conc  
Correlation Coefficient: 0.98727  
Calibration time: 3/11/2010 12:17:39 AM

Results Flags Legend  
U = Uncalibrated O = Overrange  
N = Not used in calibration R = Repeat reading

Read sequence complete

#### 5. Analisis Larutan Standar Katekin

Concentration [C:\...Katekin 15062017.BCN]- Offline[Calibrated]

File Edit View Commands Setup... Graph Help

0.1644 Abs VARIAN

Read Abs nm

Zero (0.1092) 279.0

Calibration  
Collection time 3/11/2010 12:06:48 AM

Standard	Concentration mg/L	F	Mean	SD	*RSD	Readings
Std 1	5.0		0.0328	0.0002	0.62	0.0325 0.0329 0.0329
Std 2	10.0		0.0626	0.0001	0.15	0.0625 0.0626 0.0627
Std 3	15.0		0.0984	0.0002	0.21	0.0984 0.0986 0.0982
Std 4	20.0		0.1361	0.0002	0.16	0.1362 0.1363 0.1359
Std 5	25.0		0.1643	0.0004	0.24	0.1641 0.1640 0.1648

Calibration eqn: Abs = 0.00683\*Conc  
Correlation Coefficient: 0.96257  
Calibration time: 3/11/2010 12:17:31 AM

Results Flags Legend  
U = Uncalibrated O = Overrange  
N = Not used in calibration R = Repeat reading

Editing Report

## 6. Analisis Aktivitas Antioksidan



## Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

### 1. Preparasi Sampel



(Daun teh P+2 dipetik)



(Daun yang telah dipetik)



(Daun P+2 dikukus)



(Dihaluskan dengan blender)



(Daun dikeringkan P+2)



(Daun teh P+2 disangrai)



(Serbuk daun P+2)

## 2. Analisis Kadar Air



(Dikeringkan dengan oven)



(Dikeringkan dengan desikator)



(Cawan kosong  
Ditimbang)



(Daun teh P+2/B15, B16 dan B17 ditimbang)



(Ditimbang 1,0005 gram)

## 3. Analisis Kadar Lemak



(Daun P+2 ditimbang 25 gram)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



(Daun P+2 didestilasi)



(Lemak ditimbang)

#### 4. Uji Kualitatif

##### a. Analisis Senyawa Tanin




(Ekstrak Teh P+2)



(Ekstrak Teh P+2 + FeCl<sub>3</sub>)

##### b. Analisis Senyawa Kafein



(Ekstrak Teh P+2)



(Ekstrak Teh P+2 + Reagen Parry)

## 5. Analisis Kuantitatif

### a. Pembuatan Ekstrak

- Suhu 70°C Penyeduhan 10 Menit



(Ditimbang sebanyak 1 gram)



(Air dipanaskan hingga suhu 70°C)



(Ekstrak teh P+2)



(Proses pengadukan)

**b. Analisis Kadar Tanin**

- Suhu 70°C dengan Waktu Penyeduhan 10 menit



(Ditambahkan  $\text{FeCl}_3$  0.1M)

(Ditambahkan  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ )



(Setelah dilakukan proses penyarangan)

**c. Analisis Kadar Kafein**

- Suhu 70°C dengan Waktu Penyeduhan 10 menit



(Ekstrak HCl 0.1 M +  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ )

(Ditambah  $\text{H}_2\text{SO}_4$  3 M)



**d. Analisis Kadar Katekin**

- **Suhu 70°C dengan Waktu Penyeduhan 10 menit**



(Ekstrak teh + Methanol p.a)



(Dipansakan selama 5 menit)

**6. Pembuatan Larutan Standar****a. Deret standar Kafein****b. Deret standar Katekin**

# BIOGRAFI

**" The More Your Praticce The More You Know"**



Nama saya Ramlah , biasa dipanggil ala'. Saya lahir di Makassar pada hari kamis 20 S juli tahun 1995 dan merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Nama ayah saya adalah Rani dan nama ibu saya Hasnawati dg. Jinne. Pendidikan yang saya jalani sejak kecil sampai sekarang yaitu saya mulai memasuki awal pendidikan di **SD INPRES SAPAYA** kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di **SMPN 1 BUNGAYA** selanjutnya saya masuk pada pendidikan menengah atas di **SMAN 1 BONTONOMPO** dan pada akhirnya saya kuliah di **UIN ALAUDDIN MAKASSAR JURUSAN KIMIA SAINS**.

Pepatah bijak mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang renang ketepian. Mungkin pribahasa inilah yang dapat menjelaskan sesuatu yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan laporan ini. *Tiada kata tanpa suara tiada makna tanpa memahami*. Kesuksesan itu diraih dari perjuangan yang keras. Maka dari itu, tetaplah berusaha dan berdoa. Maka perhatikanlah apa yang akan terjadi hari ini, esok atau dimasa yang akan datang (masa depan kita).

Semua hal ini memberi penjelasan kepada kita, bahwa keindahan hidup tidak diukur dari panjang pendeknya umur, tidak juga diukur dari kaya miskinnya orang, tetapi dari bagaimanaia mengisi hidupnya. Hidup menjadi berarti jika kita mengisinya dengan kerja dan usaha tentang hal hal yang baik. Yang paling penting dari semua itu adalah meskipun hidup ini siasia. Tetapi hidup ini adalah pemberian Tuhan. Maka selama kita hidup nikmatilah hidup kita dengan kerja, suka cita dan harapan. Hanya dengan demikian kita dapat menemukan keindahan hidup, pendek atau panjang umur kita. Kita dapat menikmati keindahan hidup, kaya atau miskin keadaan kita. Karena hidup adalah Anugerah.