

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KAPANG ENDOFIT  
MAKROALGA *Eucheuma* sp.**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**INNA SHINTIA**

60300113020

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inna Shintia  
NIM : 60300113020  
Tempat / Tgl. Lahir : Pinrang / 12 Juni 1995  
Jurusan/Prodi : Biologi/S1  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : JL.Mustafa dg. bunga, Perumahan graha surandar permai  
02.  
Judul : Uji aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga  
*Eucheuma* sp.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2017  
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INNA SHINTIA  
**NIM: 60300113020**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Uji aktivitas antioksidan kapang endofit Makroalga *Eucheuma sp.***", yang disusun oleh **Inna Shintia**, NIM: 60300113020, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 21 Agustus 2017 M  
1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr.H.Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si, M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm.Apt	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Burhanuddin, Lc., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,**

**Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad M.Ag.**  
NIP. 19710412 200003 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Inna Shintia**, NIM: 60300113020, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “**Uji aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma sp.***”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2017

Pembimbing I



---

Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes  
NIP. 19181216 200912 1 003

Pembimbing II



Eka Sukmawaty S.Si., M.Si Eka  
NIP. 19860716 201503 2006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamina segala puji dan syukur bagi Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah sebagai penuntun kehidupan umat manusia.

Atas Ridho, berkah dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Uji aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang telah kami lakukan pada saat penelitian yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan, namun berkat kerja keras, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Akil Naing dan Ibunda Hj. Nurlela Maru atas doa dan dukungan morilnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih

secara mendalam kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, penyusun skripsi ini tidak terlepas dari:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejawarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejawarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mashuri Masri, S.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Eka Sukmawaty S.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc., Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm.Apt., Dr. Burhanuddin, Lc., M.Th.I selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Kepala Laboratorium dan seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu, arahan, dan membantu selama penelitian ini.
9. Kepala perpustakaan beserta jajarannya, terima kasih atas bantuannya selama ini.

10. Spesial Keluarga dan Saudara-saudariku terima kasih memberikan semangat, doa dan dukungannya.
11. Spesial untuk sahabat seperjuanganku (Siti Latifa Wulandari, Sri Wahyuni, Dewi fitriana Yul Fitriani, Retno Budiati dan Lindawanti) suka dan duka hidup sebagai mahasiswa kita rasakan bersama dan selalu setia menemani terima kasih atas do'a dan dukungannya.
12. Sahabat dan Teman-teman "BRACHIALIS 2013" yang selalu memberi dukungan dan semangat, terkhusus seperjuanganku Siti Latifa Wulandari, dan Muhammad Maslan yang selalu ada dan membantu saat penelitian di dalam laboratorium. sukses untuk kita semua.
13. Teman-Teman KMP 013 Terima kasih banyak waktu, kebersamaan dan semangatnya kawanku.
14. Teman-teman GSP 02 yang tak pernah lelah memberi dukungan, doa dan semangat.
15. Teman-teman KKN Bontonompo terima kasih atas bantuan, doa dan selalu ada
16. Kakanda senior Biologi terkhusus Muhammad Yusuf terima kasih atas bantuannya dalam pengambilan sampel dan doa serta dukungannya
17. Bapak Eris Septiana pembimbing PKL LIPI terima kasih atas bimbingan arahan dan dukungannya.
18. Teman – teman SD, SMP, SMA, yang masih selalu ada memberi dukungan semangat dan doanya.
19. Adik-adik angkatan 2014, 2015, dan 2016 terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
20. Serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, untuk itu dalam menyelesaikan skripsi ini masih merasa banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya hanya kepada

Allah-lah segala sesuatu kembali dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua, Amin yaarabbal alamin.

Makassar, Agustus 2017  
Penulis

**INNA SHINTIA**  
**NIM: 60300113020**





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v-viii
DAFTAR ISI .....	ix-x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang .....	1-4
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5-7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8-38</b>
A. Ayat dan Hadis yang Relevan.....	8-11
B. Tinjauan Umum Radikal Bebas .....	11-12
C. Tinjauan Umum Antioksidan.....	12-17
D. Tinjauan Umum Kapang Endofit.....	17-19
E. Tinjauan Botani.....	20-25
F. Tinjauan Umum Isolasi.....	23-25
G. Identifikasi Kapang Endofit .....	25-29
H. Tinjauan Umum Fermentasi .....	30-32
I. Tinjauan Umum Ekstraksi .....	32-34
J. Tinjauan Umum Uji Aktivitas Antioksidan.....	34-35
K. Tinjauan Umum Spektrofotometri.....	35-38
L. Kerangka Fikir .....	39

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	40-46
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
	C. Variabel Penelitian.....	40
	D. Definisi Operasional Variabel.....	41
	E. Instrumen Penelitian .....	41
	F. Prosedur Kerja .....	42-46
	G. Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47-63
	A. Hasil Penelitian .....	47-53
	B. Pembahasan .....	54-64
BAB V	PENUTUP .....	65
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	65
	KEPUSTAKAAN.....	66-73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	73-85
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	86



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Karakteristik isolat kapang endofit makroalga <i>Eucheuma</i> sp. secara makroskopik dan mikroskopik .....	51
Tabel 4.2.	Hasil uji aktivitas antioksidan .....	52
Tabel 4.3.	Bobot Ekstrak Hasil Fermentasi .....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	<i>Eucheuma</i> sp. ....	23
Gambar 2.2.	Tipe-tipe karpus seksual yang dihasilkan <i>Ascomycota</i> .....	27
Gambar 2.3.	Berbagai bentuk konidia .....	28
Gambar 2.4.	<i>Aspergillus</i> secara umum .....	29
Gambar 4.1.	Hasil Isolasi Kapang Endofit .....	49
Gambar 4.2.	Karakteristik Isolat Kapang Endofit .....	50
Gambar 4.3.	PDB sebelum fermentasi, dan PDB sesudah fermentasi .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Penelitian.....	74
Lampiran 2	Daftar Tabel .....	75
Lampiran 3	Analisis Data Aktivitas Antioksidan .....	76-78
Lampiran 4	Daftar Kurva .....	79
Lampiran 5	Perhitungan Komposisi Pembuatan Media Pertumbuhan.....	80
Lampiran 6	Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan Uji .....	81
Lampiran 7	Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan Vitamin C.....	82
Lampiran 8	Skema Pengukuran Absorbansi Peredaman Radikal Bebas Menggunakan Spektrofotometri.....	83-84
Lampiran 9	Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan DPPH 0,4 mM .....	85
Lampiran 10	Dokumentasi Penelitian .....	86



## ABSTRAK

**Nama** : Inna Shintia  
**NIM** : 60300113020  
**Judul Skripsi** : Uji Aktivitas Antioksidan Kapang Endofit Makroalga *Eucheuma* sp.

---

---

*Eucheuma* sp. merupakan makroalga yang tidak mengandung lemak, tetapi kaya selenium yang bersifat antioksidan, sehingga mampu membantu tubuh mencegah penyerapan zat kimia beracun, termasuk sampah radioaktif dan polusi. Potensi makroalga tersebut berhubungan dengan kapang endofit, yaitu mikroba yang hidup dalam periode tertentu dan membentuk koloni di dalam jaringan tumbuhan tanpa merugikan inangnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui spesies kapang endofit dan seberapa besar aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. yang dilakukan dengan metode peredaman radikal bebas dengan menggunakan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) dengan berbagai konsentrasi sampel 5 bpj, 10 bpj, 25 bpj, 50 bpj, dan 100 bpj serta vitamin C sebagai kontrol dengan konsentrasi 3 bpj, 6 bpj, 9 bpj, 12 bpj, dan 15 bpj. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. adalah *Aspergillus* sp. diperoleh  $IC_{50}$  sebesar 38,64 ppm dan dikatakan kuat dalam meredam radikal bebas. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai  $IC_{50}$  berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan.

Kata kunci: Makroalga *Eucheuma* sp., kapang endofit *Aspergillus* sp., dan Vitamin C.

## ABSTRACT

**Nama** : Inna Shintia  
**NIM** : 60300113020  
**Judul Skripsi** : **Examination of the Antioxidant Activity from Endophytic Fungi Macroalgae *Eucheuma* sp.**

---

---

*Eucheuma* sp. is macroalgae that does not contain fat but rich of cellenium with antioxidant activity and able to avoid toxic compound absorption include radioactive waste and pollution. The potential of macroalgae related to endophytic fungi; microbe that living in certain period and forming colony in the plant tissue without harm its host. This research has done for knowing endophytic fungi species and the antioxidant activity of endophytic fungi used DPPH method with various concentration, 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm and c vitamin as control with 3 ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm, and 15 ppm concentration. Identification result showed that species of endophytic fungi from Euchmea sp was *Aspergillus* sp. and IC<sub>50</sub> was 38,64, as strong antioxidant. It because of the smaller of IC<sub>50</sub> value means the higher antioxidant activity .

Key Word: *Eucheuma* sp macroalgae., *Aspergillus* sp endophytic fungi., dan Vitamin C.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai mukjizat sehingga al-Qur'an ini dapat dijadikan petunjuk-petunjuk dalam melakukan setiap aktivitas di dunia termasuk aktivitas berpikir, menganalisis dan melakukan penelitian. Sebagai seorang ilmuwan muslim yang baik sebaiknya dapat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yakni terdapat dalam QS.az-Zumar/39: 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, Kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal (Kementrian Agama RI, 2012).



Pada ayat ini dijelaskan bahwa bumi ini terdiri atas lautan dan daratan. Empat perlima dari bumi ini merupakan lautan sedangkan seperlima adalah daratan. Lalu maksud dari menghidupkan bumi sesudah mati (kering), maka diturunkannya air dari langit untuk menumbuhkan tumbuhan (Hamka, 1992).

Selanjutnya dalam Tafsir Ibnu Katsir (2004) dijelaskan Firman Allah: *tsumma yukhriju bihi zar'am mukhtalifan alwaanuhuu* (Kemudian, ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya) yaitu, kemudian dengan air yang turun dari langit dan muncul dari bumi itu, Dia tumbuhkan bermacam-macam tanaman yaitu warna, bentuk, rasa, bau dan manfaatnya.

Berdasarkan tafsir ayat tersebut diketahui bahwa Allah telah menciptakan beragam tumbuhan dengan bermacam manfaat sehingga sebagai seorang peneliti informasi tersebut dijadikan acuan untuk mengeksplor potensi tumbuhan baik yang terdapat di daratan ataupun lautan untuk pemanfaatannya diberbagai bidang. Salah satu tumbuhan laut yang banyak dimanfaatkan adalah makroalga. Indonesia memiliki tidak kurang dari 628 jenis makroalga dari 8000 jenis makroalga yang ditemukan di seluruh dunia (Luning 1990).

*Eucheuma* sp. merupakan salah satu makroalga dari kelas Rhodophyta yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, di antaranya sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium, dan hormon seperti *auxin* dan *citokinin* yang dapat meningkatkan daya pertumbuhan tanaman dalam berbunga dan berbuah, bahan pengental (*thickener*), pembentuk gel, pengemulsi dan

pengimbang (stabilisator) pada industri makanan, pasta gigi, farmasi, kosmetik, tekstil, cat, karet, dan kertas (Nugroho, 2006). Dalam dunia kedokteran dan farmasi, *Eucheuma* sp. digunakan sebagai bahan obat asma, bronkhitis, TBC, cacangan, sakit perut, demam, rematik, anti hiperkolesterol, sumber iodium, seng, selenium, dan vitamin seperti vitamin B1, B2, B6, B12, dan  $\beta$ -karoten, anti kanker karena kandungan antioksidannya yang tinggi, menurunkan kadar gula darah, dan dapat meningkatkan jumlah limfosit (Pringgenies, 2005).

*Eucheuma* sp. tidak mengandung lemak, tetapi kaya selenium yang bersifat antioksidan, sehingga makroalga mampu membantu tubuh mencegah penyerapan zat kimia beracun, termasuk sampah radioaktif dan polusi. Di samping itu, *Eucheuma* sp. juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan (Nugroho, 2006).

Antioksidan merupakan senyawa atau molekul yang dapat mencegah terjadinya proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Tubuh manusia sebenarnya dapat menghasilkan antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti: enzim SOD (*Superoksida Dismutase*), *gluthatione*, dan *katalase* (Prakash, 2001). Tetapi jumlah antioksidan dalam tubuh tidak mencukupi untuk menetralkan radikal bebas yang jumlahnya semakin menumpuk di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh memerlukan antioksidan dari luar berupa makanan atau suplemen (Rahardjo, 2005). Antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E dan betakaroten serta senyawa fenolik.

Potensi tumbuhan sebagai obat berhubungan dengan mikroorganisme yang hidup di jaringan tumbuhan. Mikroorganisme tersebut dikenal sebagai mikroba endofit, yaitu mikroba yang hidup dalam periode tertentu dan membentuk koloni di dalam jaringan tumbuhan tanpa merugikan inangnya (Andriana, 2012). Kemampuan mikroba endofit menghasilkan senyawa bioaktif yang sama dengan tumbuhan inangnya merupakan peluang untuk mendapatkan sumber bahan obat antioksidan yang alami, murah dan ramah lingkungan. Beberapa kajian tentang mikroba endofit terbukti memiliki potensi ekonomi yang tinggi sebagai bahan baku obat (Rajangjulu, 2011).

Antioksidan alami dapat ditemukan pada spesies tumbuhan laut seperti makroalga. Makroalga *Eucheuma* sp. digunakan sebagai alternatif mikroba simbiosis alga untuk dapat memanfaatkan kandungan alga dalam skala besar. Mikroba simbiosis alga dapat menjadi salah satu solusi paling baik. Namun, hingga saat ini masih kurang informasi mengenai aktivitas antioksidan kapang endofit pada *Eucheuma* sp. tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui “**Uji aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesies kapang endofit apa saja yang terdapat dalam makroalga *Eucheuma* sp.?
2. Seberapa besar konsentrasi antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.?

### ***C. Ruang Lingkup Penelitian***

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapang endofit pada penelitian ini diisolasi dari makroalga *Eucheuma* sp. yang diperoleh dari Teluk Laikang Puntondo Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 – April 2017 dilakukan di laboratorium mikrobiologi dan biologi dasar, Fakultas Sains dan Teknologi, dan laboratorium mikrobiologi dan laboratorium Farmasi Biologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### ***D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu***

1. Thamrin, (2006) telah melakukan penelitian tentang uji aktivitas senyawa antioksidan dari rumput laut *Halymenia harveyana* dan *Eucheuma cottonii*. Aktivitas antioksidan dan uji toksisitasnya diamati terhadap ekstrak kasar, fraksi n-heksana, dan fraksi metanol dari rumput laut segar dan kering, serta identifikasi senyawa aktif menggunakan GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak rumput laut segar lebih tinggi dari pada ekstrak rumput laut kering. Ekstrak fraksi metanol dari *Halymenia harveyana* segar memiliki aktivitas antioksidan yang paling poten. Pada kedua jenis rumput laut tersebut, toksisitas ekstrak dari sampel kering lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak dari rumput laut segarnya. Ekstrak *Halymenia harveyana* mengandung senyawa-senyawa antioksidan mirip BHT (butil hidroksi toluen), ester dan

hidrokarbon aromatis, demikian pula ekstrak *Eucheuma cottonii* banyak mengandung antioksidan tetapi mempunyai toksisitas yang tinggi terhadap *Artemia salina*.

2. Edward, (2015) telah melakukan penelitian tentang antidiabetes dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi kapang endofit dari ranting tumbuhan mahoni (*Swietenia macrophylla* King) yang aktif sebagai antidiabetes dan antioksidan. Aktivitas antidiabetes dilakukan dengan menggunakan metode inhibisi  $\alpha$ -glucosidase dan aktivitas antioksidan menggunakan metode peredaman radikal bebas dengan pereaksi 1,1-diphenyl-2,2-picrylhydrazyl (DPPH). Isolasi dilakukan pada media tanam Corn Meal Malt Agar (CMMA) dan Potato Dextrose Agar (PDA) dan diperoleh 7 isolat kapang. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas inhibisi  $\alpha$ -glucosidase untuk ekstrak filtrat dan biomassa untuk isolat A.Sm.2F (72,59 dan 92,22%), A.Sm.3F (81,87 dan 79,37%), B.Sm.1F (63,40 dan 96,09%), B.Sm.2F (65,60 dan 62,72%), B.Sm.3F (93,91 dan 51,48%) dan B.Sm.4F (87,48 dan 74,64%) sehingga berpotensi sebagai antidiabetes. Isolat B.Sm.1F adalah satu-satunya isolat yang aktif sebagai antioksidan dengan  $IC_{50}$  sebesar 84,41.
3. Khristanto, (2011) telah melakukan penelitian tentang kapang endofit kunyit yang diduga dapat menghasilkan senyawa yang mirip dengan senyawa yang dihasilkan tanaman inangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi dan uji antioksidan dari senyawa hasil bioproduksi kapang endofit kunyit (*Curcuma longa*). Bioproduksi dilakukan dengan cara fermentasi isolat kapang endofit

K.Cl.Sb.A9 dalam media PSB (*Potato Sucrose Broth*) selama 14 hari, partisi hasil fermentasi dengan n-butanol dan etil asetat, pemurnian dengan kromatografi kolom (SiO<sub>2</sub>, n-heksan-etil asetat [20:1, 15:1, 10:1, 8:1, 6:1, 4:1]), kemudian dilakukan identifikasi dengan KG-SM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat kapang endofit K.Cl.Sb.A9 mampu memproduksi senyawa beraktivitas sebagai antioksidan dengan persen inhibisi 83,17% dan diperkirakan senyawa tersebut adalah suatu ester dengan nama benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester, dengan rumus molekul C<sub>18</sub>H<sub>28</sub>O<sub>3</sub> dan bobot molekul 292 g/mol.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.
2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.

#### ***F. Kegunaan Penelitian***

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp.
2. Menemukan tumbuhan lain yang dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan yang baru untuk menggantikan obat-obatan kimia.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Ayat dan Hadis yang Relevan

##### 1. Ayat tentang tumbuh-tumbuhan

Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di bumi yang bermanfaat bagi umat manusia. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt. dalam QS. Thaaha/20: 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahan:

Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama RI, 2012).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa al-Qur'an sebagai bukti kebenaran. Dimana, maksud dari "yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan". Menurut sebagian ahli qira-at, yakni hamparan yang kalian tinggal, berdiri, dan tidur di atasnya, serta melakukan perjalanan di atas permukaannya. "Dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan" yakni, dia telah membuatkan jalan bagi kalian, yang kalian dapat berjalan dipermukaannya. "Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam” yakni berbagai macam tumbuh-tumbuhan berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, baik yang asam, manis, maupun pahit, dan berbagai macam lainnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni bukti-bukti bagi orang-orang yang berakal (Tafsir Ibnu Katsir, 2003)

## 2. Ayat tentang penyakit

Allah memberikan cobaan kepada umatnya yang berupa penyakit dan Allah pula yang menyembuhkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Asy-Syu'araa/26: 79-80 yang berbunyi:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٧٩﴾

Terjemahan:

Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian Agama RI, 2012).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt., menurunkan sebuah penyakit kepada makhluk-Nya, sekalipun itu merupakan qadha, qadar dan ciptaan Allah tetapi Allah sandarkan hal itu kepada hamba-Nya sebagai sikap beradab. Hal ini berarti jika seseorang hamba menderita sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa memberikannya kesembuhan selain dari Dia sesuai takdir-Nya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Tafsir Ibnu Katsir, 2011).

Tafsir di atas menjelaskan bahwa tiadalah Allah menurunkan atau menyandarkan sebuah penyakit kepada hamba-Nya melainkan dengan maksud tertentu. Dengan demikian hakikat kesembuhan berada di tangan Allah swt. dengan



segala bentuk adalah sebuah sebab (upaya) seseorang untuk mendapatkan kesembuhan dari-Nya (Tafsir Ibnu Katsir, 2011).

### 3. Hadis Tentang penyakit

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam shahihnya, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

*“Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”* (H.R. Bukhari).

Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda,

لِكُلِّ عِدَا دَوَاءٍ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءَ رَأَى الدَّاءَ، بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

*“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.”* (HR.Muslim)

Dari Ibnu Mas’ud , bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ مَعَهُ عِلْمٌ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa*

*mengetahuinya.”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13)

Hadis-hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya.

#### **B. Tinjauan Umum Radikal bebas**

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbit luarnya. Radikal bebas dapat timbul dari proses metabolisme dalam tubuh dan dapat juga berasal dari lingkungan, seperti pencemaran udara, bahan kimia dari makanan dan air, alkohol, rokok, radiasi UV dan sebagainya (Mayes, 2003).

Radikal bebas ini bersifat reaktif dan tidak stabil sehingga untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat elektron molekul tersebut. Proses ini pada akhirnya akan menimbulkan radikal bebas baru terhadap molekul yang elektronnya diambil sehingga jumlahnya terus bertambah. Oleh karena itu, reaksi radikal bebas cenderung berupa reaksi berantai. Reaksi berantai ini akan terus menerus berlangsung dalam tubuh dan bila tidak segera dicegah dapat merusak sel-sel penting dalam tubuh. Hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan

dini, serta penyakit degeneratif lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan akibat radikal bebas tersebut maka tubuh memerlukan suatu substansi penting, yaitu antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas (Francine, 1996).

Radikal bebas terpenting dalam tubuh adalah radikal derivat dari oksigen yang disebut kelompok oksigen reaktif (*reactive oxygen species/ROS*), termasuk didalamnya adalah triplet ( $3O_2$ ), tunggal (singlet/ $^1O_2$ ), anion superoksida ( $O_2^-$ ), radikal hidroksil ( $-OH$ ), nitrit oksida ( $NO^-$ ), peroksinitrit ( $ONOO^-$ ), asam hipoklorus ( $HOCl$ ), hidrogen peroksida ( $H_2O_2$ ), radikal alkoxy ( $LO^-$ ), dan radikal peroksil ( $LO_2$ ). Radikal bebas yang mengandung karbon ( $CCL_3^-$ ) yang berasal dari oksidasi radikal molekul organik. Radikal yang mengandung hidrogen hasil dari penyerangan atom H ( $H^+$ ). Bentuk lain adalah radikal mengandung sulfur yang diproduksi pada oksidasi glutation menghasilkan radikal thiol ( $R-S^-$ ) (Araujo, 1998).

### **C. Tinjauan Umum Antioksidan**

Antioksidan merupakan senyawa atau molekul yang dapat mencegah terjadinya proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas (Prakash, 2001). Antioksidan adalah bahan yang digunakan untuk mencegah oksidasi lemak, misalnya digunakan pada bahan pangan yang akan digoreng, makanan dari biji-bijian, dan makanan-makanan lain yang mengandung banyak lemak (Winarno 1997).

Senyawa antioksidan dapat ditemukan didalam tubuh yaitu senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti: enzim SOD (*Superoksida Dismutase*), *Gluthatione*, dan *Katalase*. Antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan makanan

yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan betakaroten serta senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, seperti rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran seperti buah tomat, papaya, jeruk, dan sebagainya (Prakash, 2001).

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Antioksidan sintetis (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Contoh antioksidan sintetis yang diizinkan penggunaannya secara luas diseluruh dunia untuk digunakan dalam makanan adalah *Butylated Hydroxyanisol* (BHA), *Butylated Hydroxytoluene* (BHT), *Tert-Butylated Hydroxyquinon* (TBHQ) dan tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan yang telah diproduksi secara sintesis untuk tujuan komersial (Buck, 1991).
- 2) Antioksidan alami adalah antioksidan yang diperoleh secara alami yang sudah ada bahan pangan, baik yang terbentuk selama dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan maupun yang diisolasi dari sumber alami. Contoh antioksidan alami vitamin A untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh sangat diperlukan vitamin A untuk fungsi sistem imun dan proses penglihatan. Karotenoid, adalah sebagai prekursor vitamin A, antioksidan, peningkatan daya tahan tubuh, dan pengubahan metabolisme kanker (Gross, 1991). Vitamin C (*Ascorbic Acid*) berfungsi untuk mengikat O<sub>2</sub> sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi (*oxygen scavenger*). Vitamin E merupakan antioksidan larut lemak yang utama dan terdapat dalam membran seluler dimana vitamin ini mereduksi radikal bebas lipid

lebih cepat dari pada oksigen. Vitamin E dengan nama kimia tokoferol dikenal sebagai antioksidan yang dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung koroner, katarak dan sebagainya dengan cara menjinakkan molekul-molekul radikal bebas yang berbahaya serta menghambat laju proses penuaan. Radikal bebas tergantung pada kualitasnya, merupakan bagian integral dari makanan yang dikonsumsi atau mungkin diproduksi melalui proses oksidatif dalam tubuh. Antosianin memiliki fungsi fisiologis yaitu sebagai antioksidan, perlindungan terhadap sel-sel hati. Isoflavon merupakan salah satu golongan flavonoid yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung koroner, prostat dan kanker. Selenium dapat meminimalkan resiko kanker karena selenium berfungsi untuk pencegahan terbentuknya radikal bebas (Pokorny, *et al.*, 2001).

Antioksidan berdasarkan enzimatis dan non enzimatis, yaitu:

- 1) Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutathion peroksidase.
- 2) Antioksidan non enzimatis, dibagi dalam 2 kelompok lagi:
  - a) Antioksidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan bilirubin.
  - b) Antioksidan larut air, seperti asam askorbat, protein pengikat logam.

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya antioksidan dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak

negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk awal. Contoh antioksidan primer adalah *Superoksida Dismutase* (SOD), *Butylated hidroxytoluene* (BHT), *Propylgallate* (PG), *Nordi hidroguairitic Acid* (NDGA), *Glutation Peroksidase* (GPx), katalase dan protein pengikat logam. *Superoksida Dismutase* (SOD), GPx disebut juga dengan antioksidan enzimatis yaitu antioksidan endogenus yang melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas oksigen seperti anion superoksida ( $O_2^{\cdot-}$ ), radikal hidroksil ( $OH^{\cdot}$ ), dan hidrogen peroksida ( $H_2O_2$ ).

- 2) Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, pengurai hidropersida menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C,  $\beta$ -karoten, isoflavon, bilirubin dan albumin. Potensi antioksidan ini dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya (*scavenger free radical*) sehingga radikal bebas tidak beraksi dengan komponen seluler.
- 3) Antioksidan tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase (Putra, 2008 dan DepKes, 2008)

Antioksidan berdasarkan gugus fungsinya dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan fenol, amin, dan aminfenol. Adapun penggolongannya menurut Ketaren (1986), adalah sebagai berikut:

- 1) Antioksidan golongan fenol. Antioksidan yang termasuk golongan ini biasanya memiliki ciri intensitas warna yang rendah atau tidak berwarna dan banyak digunakan karena tidak beracun. Antioksidan golongan fenol meliputi sebagian besar antioksidan yang dihasilkan alam dan sejumlah kecil antioksidan sintetis. Beberapa contoh antioksidan yang termasuk golongan ini antara lain *hidrokuinon*, *gosipol*, *katekol*, *resorsiol* dan *eugenol*.
- 2) Antioksidan golongan amin. Antioksidan yang mengandung gugus amino dan
- 3) diamino yang terikat pada cincin benzena berpotensi tinggi sebagai antioksidan, namun beracun dan biasanya menghasilkan warna yang intensif jika dioksidasi atau bereaksi dengan ion logam, selain itu umumnya stabil pada suhu panas dan ekstraksi dengan kaustik. Antioksidan yang termasuk dalam golongan ini adalah *N, N difenilen diamin difenilhidrasin*, *difenil guanidin*, dan *difenil amin*.
- 4) Antioksidan golongan aminfenol. Antioksidan golongan aminfenol biasanya mengandung gugus fenolat dan amino sebagai gugus fungsional penyebab aktivitas antioksidan. Golongan amin fenol banyak digunakan dalam industri petroleum, untuk mencegah terbentuknya gum dalam gasolin, contohnya antara lain *N-butil-p-amino-fenol* dan *Nsikloheksil-p-amino-fenol*. Adanya gugus hidroksil (-OH) dan amino (-NH<sub>2</sub>) yang terikat pada cincin aromatis memegang

peranan penting dalam aktivitas antioksidan. Potensi antioksidan tersebut diperbesar oleh adanya substitusi gugus lain yang terikat pada cincin aromatis.

#### ***D. Tinjauan Umum Kapang Endofit***

Mikroorganisme pada umumnya dapat didefinisikan sebagai bakteri atau kapang yang menghabiskan separuh atau seluruh siklus hidupnya didalam jaringan tanaman inangnya tanpa menyebabkan gejala penyakit pada tanaman inangnya (Tan dan Zou, 2001).

Mikroorganisme endofit secara alami hidup di dalam jaringan tumbuhan, namun tidak memberikan dampak negatif terhadap tumbuhan tersebut (Tan dan Zou 2001). Mikroorganisme endofit dapat berupa bakteri atau fungi (Simarmata *dkk.* 2007), namun yang paling banyak ditemukan berupa fungi (kapang atau khamir) (Strobel dan Daisy 2003: 493). Mikroba endofit adalah mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan tanaman inang tanpa menyebabkan gejala-gejala penyakit. Beberapa jenis mikroba endofit diketahui mampu menghasilkan senyawa aktif yang bersifat antioksidan, antibiotik dan antifungi (Castillo, 2003).

Koloni mikroorganisme endofit dari suatu spesies tanaman dapat terdiri dari banyak spesies mikroorganisme, namun mikroorganisme endofit yang lebih umum diisolasi adalah kapang. Kapang endofit dapat diisolasi dari jaringan tanaman dan dikultur pada media yang sesuai. Hubungan antara kapang endofit dengan tanaman inangnya dapat berupa simbiosis mutualisme atau komensalisme (Strobel, 2003).



Kapang adalah sekelompok mikroba yang tergolong dalam fungi dengan ciri khas memiliki filament (miselium). Kapang disebut juga jamur benang atau molds, mikroba jenis ini berbentuk benang atau filament, multiseluler, bercabang-cabang dan tidak berklorofil. Perbandingan kapang dengan khamir dan jamur adalah kapang merupakan fungi multiseluler yang mempunyai filament dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang (Pelczar, 1986).

Kapang dapat tumbuh dalam medium atau substrat dengan konsentrasi gula yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara umum. Kapang dapat lebih bertahan dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan jasad renik lainnya. Sebagai contoh, kapang dan khamir dapat tumbuh dalam suatu substrat atau medium berisikan konsentrasi gula yang dapat menghambat pertumbuhan kebanyakan bakteri. Kapang dan khamir umumnya dapat bertahan terdapat keadaan yang lebih asam dari pada kebanyakan mikroba lain (Pelczar, 1986).

Kapang endofit merupakan kapang yang hidup di bagian dalam tumbuhan, seperti daun, ranting, cabang kecil atau akar (Gandjar, 2006). Selain itu, jika dibandingkan dengan jamur patogen pada tumbuhan dan isolat kapang dari tanah, relatif sedikit metabolit sekunder yang telah diisolasi dari kapang endofit (Tan and Zou, 2001). Sekitar 6500 kapang endofit diisolasi dari tanaman herbal dan pohon serta alga untuk mengetahui aktivitas biologis dan profil kimianya. Proporsi kapang

endofit dari yang diisolasi dari tanaman, alga dan tanah untuk menghasilkan aktivitas biologis masing-masing sebesar 80%, 83% dan 64% (Schulz, 2002).

Kapang endofit dapat menghasilkan senyawa yang mirip secara fitokimia dengan tanaman inangnya. Hal ini terjadi karena proses transformasi genetik antara kapang endofit dengan tanaman inangnya (Tan, 2001).

Kapang endofit merupakan jamur yang hidupnya berada dalam jaringan tumbuhan hidup dan biasanya tidak merugikan inangnya (Noverita, 2009). Melimpahnya kandungan nutrisi dan mikroorganisme didalam perairan yang mengakibatkan tumbuhnya kapang didalam jaringan makroalga. Kapang dapat masuk ke dalam makroalga dengan cara masuknya hifa ke dalam akar melalui rongga intrasel epidermis sehingga mengakibatkan sel akar berlubang dan terjadinya penetrasi hifa (Handayani, 2011 dalam Rahmahwaty, 2012).

#### ***E. Tinjauan Botani***

Makroalga merupakan tanaman yang tidak memperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang, dan daun. Secara keseluruhan tanaman ini mempunyai morfologi yang mirip yakni bentuk-bentuknya berupa thallus. Adapun morfologi *Eucheuma* sp. adalah permukaan licin, bulat silindris, warna merah, abu-abu, hijau kekuningan, dan hijau, bercabang berselang tidak teratur, memiliki benjolan-benjolan dan duri-duri, dan lunak. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kekuningan, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik

yaitu penyusuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan (Aslan, 1998). Alga laut merupakan sumber yang paling penting Senyawa bioaktif termasuk vitamin A, B, B12, C, D dan E selain itu, mineral seperti Ca, P, Na Dan K (Krish, 2014 dalam Ibrahim, 2016).

Berdasarkan pigmennya, makroalga dapat dibedakan menjadi kelas alga merah (*Rhodophyceae*), alga coklat (*Phaeophyceae*), alga hijau (*Chlorophyceae*) dan alga biru-hijau (*Cyanophyceae*) (Aslan,1991). Beberapa jenis rumput laut Indonesia yang bernilai ekonomis dan sejak dulu sudah diperdagangkan yaitu: *Eucheuma* sp., *Hypnea* sp., *Glacilaria* sp. dari kelas *Rhodophyceae* serta *Sargassum* sp. dari kelas *Phaeophyceae*. *Eucheuma* sp. sendiri digunakan sebagai pemanis, bahan dasar karagenan, campuran sayur dan bahan obat (Pancomulyo, 2006).

Pada hakekatnya *Eucheuma* sp. tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang berfungsi seperti pada tumbuhan darat tetapi *Eucheuma* sp. terdiri dari semacam batang yang disebut thallus (Afrianto, 1993). *Eucheuma* sp. mempunyai thallus silindris, permukaan yang licin, berwarna merah atau merah coklat yang disebabkan oleh pigmen fikoeritin, memiliki benjolan dan duri, bercabang ke berbagai arah dengan batang–batang utama keluar saling berdekatan ke daerah pangkal (Andraeni, 2005).

Adapun habitat dari *Eucheuma* sp. memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, makroalga jenis ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu mencapainya. Di alam, jenis ini biasanya hidup berkumpul dalam satu komunitas atau koloni dan indikator

jenisnya (spesies indikator) antara lain jenis *Caulerpa*, *Hypnea*, *Turbibaria*, *Padina*, *Bracilaria*, dan *Gelidium*. *Eucheuma* sp. tumbuh dari rata-rata trumbu karang dangkal sampai kedalaman 6 meter, melekat di batu karang, cangkang kerang, dan benda keras lainnya. Faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan jenis ini yaitu cukup arus dengan salinitas (kadar garam) yang stabil, yaitu berkisar 28-34 per mil. Oleh karenanya, makroalga jenis ini akan hidup bila jauh dari muara sungai. Jenis ini telah dibudidayakan dengan cara diikat pada tali sehingga tidak perlu melekat pada substrat karang atau benda lainnya (Anggadireja, 2006).

*Eucheuma* sp. banyak ditemukan dan dibudidayakan di sepanjang pesisir perairan Indonesia yang dangkal seperti Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Seribu, Bali, Lombok, Flores, Sumba, Kepulauan Karimun Jawa, dan Jawa Tengah bagian selatan.

Di samping itu, *Eucheuma* sp. juga mengandung senyawa penting bagi tubuh, seperti asam amino-asam amino (leusin, arginin, lisin, treonin, valin, isoleusin, dan fenil alanin), mineral (zinc, iodium, sulfur, calcium, selenium, sulfur), vitamin A, B1 (tiamin), B2 (riboflacin), asam folat, niasin, asam pantotenat, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin A, C, dan E serta selenium tersebut merupakan antioksidan. Pemberian antioksidan yang terkandung dalam *Eucheuma* sp. diharapkan mampu mengatasi kerusakan dan penurunan jumlah limfosit. Dengan demikian, maka kerusakan sel-sel limfosit oleh karena peningkatan radikal bebas berlebih dapat dicegah sehingga diharapkan pemberian makroalga dapat meningkatkan jumlah limfosit (Bray, 1999).

*Eucheuma* sp. banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang di masyarakat, di antaranya sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium, dan hormon seperti auxin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya pertumbuhan tanaman dalam berbunga dan berbuah, bahan pengental (thickener), pembentuk gel, pengemulsi dan pengimbang (stabilisator) pada industri makanan, pasta gigi, farmasi, kosmetik, tekstil, cat, karet, dan kertas. Selain itu *Eucheuma* sp. dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dan makanan tambahan berupa agar (Nugroho, 2006).

Dalam dunia kedokteran dan farmasi, *Eucheuma* sp. digunakan sebagai bahan obat asma, bronkhitis, TBC, cacangan, sakit perut, demam, rematik, anti hiperkolesterol, sumber iodium, seng, selenium. dan vitamin seperti vitamin B1, B2, B6, B12, dan  $\beta$  – karoten, anti kanker karena kandungan antioksidannya yang tinggi, menurunkan kadar gula darah, dan dapat meningkatkan jumlah limfosit (Pringgenies, 2005). *Eucheuma* sp. mengandung senyawa karagenan yang mampu menahan laju absorpsi glukosa darah dari saluran cerna menuju pembuluh darah sehingga mampu menahan laju peningkatan kadar glukosa darah (Nugroho, 2006). Dengan mencegah peningkatan kadar glukosa diharapkan dapat mencegah peningkatan radikal bebas (Nugroho, 2004).

Antioksidan alami terdapat dalam jumlah tidak terbatas pada spesies tumbuhan. Antioksidan ini juga ditemukan pada spesies tumbuhan laut seperti makroalga. Makroalga tidak mengandung lemak yang bermakna, tetapi kaya selenium yang bersifat antioksidan. Ini artinya rumput laut mampu membantu tubuh

mencegah penyerapan zat kimia beracun, termasuk sampah radioaktif dan polusi. Di samping itu, *Eucheuma* sp. juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Nutrisi yang optimal dalam makroalga membuatnya mampu memberikan fungsi imun terbaik bagi tubuh (Nugroho, 2006).



**Gambar 2.1** *Eucheuma* sp. (Kamlasi, 2008).

Adapun klasifikasi dari Makroalga dari *Eucheuma* sp. sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Rhodophyta
Classis	: Rhodophyceae
Ordo	: Gigartinales
Familia	: Solierisceace
Genus	: <i>Eucheuma</i>
Spesies	: <i>Eucheuma</i> sp. (Doty, 1985).

#### **F. Tinjauan Umum Isolasi**

Isolasi merupakan cara untuk memisahkan suatu mikroorganisme dari lingkungannya, sehingga diperoleh biakan yang sudah tidak tercampur dengan biakan lain atau disebut biakan murni (Gandjar *dkk.*,1992). Sebelum dilakukan

isolasi, diperlukan perlakuan-perlakuan awal (*pretreatments*) untuk keberhasilan proses isolasi tersebut. *Pretreatments* yang dilakukan tergantung dari karakteristik substrat atau inang tempat kapang endofit berada (Ando *dkk.*, 2003). Metode *surface sterilization* digunakan sebagai perlakuan awal (*pretreatment*) untuk mengisolasi kapang endofit (Ando *dkk.*, 2003) yang berasal dari organ tumbuhan yang masih dalam keadaan segar (Agusta, 2009). Metode tersebut bertujuan menghilangkan mikroorganisme epifit yang berada di permukaan tumbuhan, sehingga koloni yang diperoleh merupakan koloni endofit yang berasal dari dalam jaringan tumbuhan (Larran *dkk.*, 2001). Metode *surface sterilization* menggunakan alkohol dan hipoklorit sebagai disinfektan (Ando *dkk.*, 2003). Disinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan dalam proses disinfeksi, yaitu proses mengurangi mikroorganisme patogen termasuk spora bakteri pada permukaan suatu objek (Rao, 2008). Disinfektan dalam metode *surface sterilization* digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme epifit pada tumbuhan (Larran *dkk.*, 2001). Alkohol dan hipoklorit yang digunakan memiliki spektrum aktivitas yang berbeda. Alkohol bekerja dengan cara merusak lapisan membran sel mikroorganisme (Rao, 2008).

Alkohol dapat melarutkan lipid dan mendenaturasi protein yang ada pada membran sel. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi membran sel dalam mengatur transportasi cairan ke dalam dan keluar sel sehingga membuat sel mikroorganisme menjadi lisis (McDonnell dan Russell, 1999). Alkohol memiliki spektrum aktivitas yang relatif sempit, sehingga dalam proses *surface sterilization* dikombinasikan dengan disinfektan lain seperti natrium hipoklorit (NaOCl) (Agusta, 2009). Natrium

hipoklorit merupakan senyawa klorin (Rao, 2008). Senyawa klorin diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel mikroorganisme dengan cara mengganggu proses oksidasi dari enzim-enzim penting sehingga fungsi metabolisme dari sel tersebut terganggu dan sel mikroorganisme tidak dapat tumbuh (Valera *dkk.*, 2009).

Proses isolasi umumnya diikuti dengan proses pemurnian atau purifikasi untuk mendapatkan kultur murni (Cappuccino dan Sherman, 1996). Salah satu teknik pemurnian yang umum digunakan adalah metode *quadrant streak*. Metode *quadrant streak* menggunakan jarum inokulasi untuk membantu persebaran selsel mikroorganisme dengan cara menggoreskan ujung jarum tersebut pada medium agar di dalam cawan petri. Proses purifikasi kemudian diikuti dengan inkubasi pada kondisi yang sesuai, hingga diperoleh koloni tunggal yang representatif. Koloni tunggal yang representatif tersebut diasumsikan berasal dari pertumbuhan sel tunggal sehingga seragam secara genetik (Hogg, 2005).


### **G. Identifikasi Kapang Endofit**

Identifikasi kapang secara konvensional dapat dilakukan dengan pengamatan karakter fenotipik di antaranya karakter morfologi dan selanjutnya dibandingkan dengan deskripsi suatu kapang pada literatur atau monograf. Tujuan dari pengamatan morfologi adalah memperoleh deskripsi dari suatu kapang untuk mengetahui identitas dari kapang tersebut. Pengamatan karakter morfologi dilakukan secara mikroskopik dan makroskopik (Gandjar *dkk.*, 1999).



Kapang merupakan fungi yang berasal dari filum *Ascomycota* dan *Zygomycota*. Karakter utama yang membedakan kapang dari kedua filum tersebut adalah struktur alat reproduksi seksual atau spora seksual. Spora seksual dari *Ascomycota* disebut askospora, sedangkan spora seksual dari *Zygomycota* disebut zigospora (Benson, 2001). Apabila ditemukan struktur spora seksual, maka kapang tersebut berada pada fase teleomorf, sedangkan apabila hanya ditemukan struktur spora aseksual maka kapang tersebut berada pada fase anamorf (Webster dan Weber, 2007). Apabila hanya terdapat struktur hifa dan tidak ditemukan struktur spora, maka kapang tersebut merupakan hifa steril (Barnett dan Hunter, 2003).

Filum *Ascomycota* bereproduksi secara seksual menghasilkan askospora. Askospora berada di dalam askus, dan askus terdapat pada tubuh buah atau karpus atau disebut juga askomata. Terdapat empat tipe askomata, yaitu *apothecium*, *perithecium*, *pseudothecium*, dan *cleistothecium*. *Apothecium* berbentuk seperti cawan yang lebar, atau seperti cangkir. *Perithecium* berbentuk seperti labu dengan leher panjang yang pada ujungnya terdapat lubang atau osteol. *Pseudothecium* berbentuk bulat seperti *perithecium* yang tidak memiliki leher namun memiliki osteol. *Cleistothecium* berbentuk bulat bulat yang seluruh permukaannya tertutup oleh hifa-hifa yang rapat mirip suatu dinding yang disebut peridium (Gandjar dkk., 2006).




**Gambar 2.2.** Tipe-tipe karpus seksual yang dihasilkan *Ascomycota* (Gandjar dkk., 2006)

Spora aseksual pada kapang filum *Zygomycota* disebut sporangiospora karena dihasilkan di dalam suatu struktur kantung yang disebut sporangium. Sporangium dapat berbentuk bulat (seperti ditemukan pada *Rhizopus*, *Mucor*, dan *Absidia*) (Webster dan Weber, 2007) atau berbentuk silindris (seperti ditemukan pada *Syncephalastrum*) (Gandjar dkk., 2006).

Spora aseksual pada kapang filum *Ascomycota* disebut konidiospora atau konidia dan dihasilkan oleh sel konidiogenus atau sel penghasil konidia. Berdasarkan ukurannya, konidia dikelompokkan menjadi makrokonidia dan mikrokonidia (Benson, 2001). Bentuk dari konidia bervariasi, dapat berbentuk bulat, semibulat, oval, silindris, elips, seperti benang (*scoleospora*), seperti bulan sabit (*lunata*), seperti ginjal (*reniform*), seperti bintang (*staurospora*), atau berbentuk menggulung (*helicospora*). Selain itu terdapat jenis-jenis spora aseksual lainnya seperti klamidospora, arthrospora, dan blastokonidia (Gandjar dkk., 2006). Hal-hal lain yang

harus diperhatikan dalam pengamatan konidia kapang meliputi jumlah sel (uniselular atau multiselular), pengaturan konidia (tunggal, membentuk rantai, atau membentuk klaster), dan pengukuran konidia (Gandjar *dkk.*, 1999).




**Gambar 2.3.** Berbagai bentuk konidia (Gandjar *dkk.*, 2006).

Kapang tersusun atas filamen-filamen yang disebut hifa. Hifa dapat dibedakan dengan ada atau tidaknya septum atau sekat (Benson, 2001). Hifa yang bersekat merupakan karakteristik dari fungi tingkat tinggi (*higher fungi*) yaitu fungi dari filum *Ascomycota* (Hogg, 2005). Hifa yang memiliki sekat disebut juga hifa *septate*. Sekat membagi hifa menjadi kompartemen-kompartemen (Benson, 2001), dan didalam setiap kompartemen terdapat satu inti sel (Gandjar *dkk.*, 2006). Sebaliknya, hifa yang tidak memiliki sekat dimiliki oleh fungi tingkat rendah (*lower fungi*), yaitu dari filum *Zygomycota*. Hifa yang tidak bersekat disebut hifa *aseptate*,

memiliki sejumlah inti sel yang tersebar di dalam sitoplasma sehingga disebut juga hifa *coenocytic* (Hogg, 2005). Hal-hal lain yang harus diamati pada hifa adalah pigmentasi, yaitu dapat berpigmentasi hialin (tidak berwarna) atau gelap, dan perhitungan lebar hifa (Gandjar *dkk.*, 1999).

Genus-genus kapang dari filum *Ascomycota* yang umum ditemukan antara lain adalah *Aspergillus* Mich. dan *Fusarium* Link. *Aspergillus* dapat dikenali dengan adanya struktur konidia yang berbentuk oval, semibulat, atau bulat dan ada membentuk rantai. Konidia melekat pada fialid (sel konidiogenus) dan fialid melekat pada bagian ujung konidiofor yang mengalami pembengkakan atau disebut vesikel. Fialid dapat melekat langsung pada vesikel (tipe sterigmata uniseriat) atau dapat melekat pada struktur metula (tipe sterigmata biseriata) (Samson *dkk.*, 2004). Secara makroskopik, warna koloni *Aspergillus* bervariasi dari kuning, hijau, kebiruan, putih, hingga hitam (Koneman dan Roberts, 1985). *Aspergillus* merupakan kapang anamorf karena hanya menghasilkan struktur konidia. Teleomorf dari *Aspergillus* antara lain adalah *Eurotium* Link. (Webster dan Weber, 2007). *Eurotium* dan *Emericella* menghasilkan askomata tipe *cleistothecium* (Samson *dkk.*, 1981). Struktur morfologi *Aspergillus* secara umum:



**Gambar 2.4.** *Aspergillus* secara umum (Benson, 2001).

## ***H. Tinjauan Umum Fermentasi***

Fermentasi merupakan suatu cara mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroorganisme dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). Semua mikroorganisme membutuhkan sumber energi untuk tumbuh, sumber energi ini di peroleh dari hasil metabolisme dari bahan pangan tempat mikroorganisme tersebut tumbuh. Bahan baku energi yang paling banyak digunakan oleh mikroorganisme adalah glukosa (Hogg, 2005).

Fermentasi dapat dilakukan dengan metode kultur permukaan dan kultur terendam (*Submerged*). Medium kultur permukaan dapat berupa medium padat, semi padat atau cair. Sedangkan kultur terendam dapat dilakukan dalam medium cair menggunakan bioreactor yang dapat berupa labu yang diberi aerasi, labu yang digoyang dengan shaker atau fermentor. Teknik kultur terendam lebih banyak digunakan dalam proses fermentasi dibandingkan dengan kultur permukaan diinginkan, dapat memberikan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan, dan pemakaian medium lebih efisien (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

Hasil fermentasi diperoleh sebagai akibat metabolisme mikroba-mikroba pada suatu bahan pangan dalam keadaan anaerob. Mikroba yang melakukan fermentasi membutuhkan energi yang umumnya diperoleh dari glukosa. Dalam keadaan aerob, mikroba mengubah glukosa menjadi air, CO<sub>2</sub> dan energi (ATP). Beberapa mikroba hanya dapat melangsungkan metabolisme dalam keadaan anaerob dan hasilnya adalah substrat yang setengah terurai. Hasil penguraian adalah air, CO<sub>2</sub>, energi dan

sejumlah asam organik lainnya, seperti asam laktat, asam asetat, etanol serta bahan-bahan organik yang mudah menguap (Rahman, 1990).

Adapun menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi adalah sebagai berikut:

#### 1) Substrat dan nutrient

Medium fermentasi menyediakan semua nutrient yang diperlukan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan memperoleh energi. Beberapa substrat sumber karbon dapat berupa pati, glukosa, sukrosa, dan laktosa. Beberapa sumber nitrogen adalah garam-garam ammonium, urea, nitrat, dan tepung kedelai. Perlu adanya substrat yang murah, mudah didapat, dan efisien penggunaannya dalam suatu proses fermentasi.

#### 2) pH

Kontrol pH optimum dipertahankan selama fermentasi. pH optimum bakteri 6,7-7,5. Di bawah pH 5,0 dan di atas pH 8,5 bakteri tidak tumbuh dengan baik. Kapang memiliki pH optimum antara 5,0 dan 7,0 dan dapat tumbuh pada kisaran pH 3,0-8,5.

#### 3) Suhu

Fermentasi dilakukan pada suhu dimana pertumbuhan sel atau produksi metabolit tertinggi. Berdasarkan suhu pertumbuhan optimum mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi tergolong mesofil dengan suhu optimum 20-45°C dan termofil pada suhu optimum 45°C.

#### 4) Aerasi dan agitasi

Aerasi bertujuan agar pemasukan oksigen cukup memadai, mempertahankan kondisi aerobik serta membuang gas karbondioksida yang dihasilkan selama fermentasi. Sedangkan agitasi bertujuan untuk meratakan penyebaran mikroorganisme, nutrient dan oksigen didalam medium.

### **I. Tinjauan Umum Ekstraksi**

Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen-komponen yang terpisah. Ekstraksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *aquoeus phase* dan *organic phase*. *Aquoeus phase* dilakukan dengan menggunakan pelarut air dan *organic phase* ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut organik (Winarno, 1973).

Ekstraksi adalah isolasi senyawa yang terdapat dalam campuran larutan atau campuran padatan dengan menggunakan pelarut yang cocok. Adapun prinsip dari ekstraksi adalah melarutkan komponen senyawa yang berada dalam campuran secara selektif dengan pelarut yang sesuai. Hasil dari proses ekstraksi disebut ekstrak. Ekstraksi dapat dilakukan dengan pelarut organik terhadap bahan segar atau bahan yang telah dikeringkan. Berdasarkan energi yang digunakan, ekstraksi dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Hal yang harus diperhatikan pada proses ekstraksi adalah kestabilan dari senyawa yang diisolasi. Untuk senyawa tersebut tidak rusak, sedangkan senyawa yang tahan panas dapat diekstraksi dengan cara panas (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

Metode ekstraksi dikelompokkan menjadi dua yaitu ekstraksi sederhana dan ekstraksi khusus (Harbone 1984). Ekstraksi sederhana antara lain terdiri atas maserasi, perkolasi, reperiolasi, evakolasi, dan diakolasi. Ekstraksi sederhana menurut Harbone (1984) adalah sebagai berikut:

- 1) Maserasi, yaitu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel dalam pelarut dengan atau tanpa pengadukan;
- 2) Perkolasi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan;
- 3) Reperiolasi, yaitu perlokasi dimana hasil perkolasi digunakan untuk melarutkan sampel di dalam perkolator sampai senyawa kimianya terlarutkan;
- 4) Evakolasi, yaitu perkolasi dengan pengurangan tekanan udara;
- 5) Diakolasi, yaitu perkolasi dengan penambahan tekanan udara.

Metode ekstraksi khusus tersebut antara lain soxhletasi, arus balik, dan ultrasonik.

Ekstraksi khusus menurut Harbone (1984) adalah sebagai berikut:

- 1) Oxhletasi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan untuk melarutkan sampel kering dengan menggunakan pelarut bervariasi;
- 2) Arus balik, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan dimana sampel dan pelarut saling bertemu melalui gerakan aliran yang berlawanan;
- 3) Ultrasonik, yaitu ekstraksi dengan menggunakan alat yang menghasilkan frekuensi bunyi atau getaran antara 25-100 KHz.

Secara umum ekstraksi bertingkat dilakukan secara berturut-turut dimulai dengan pelarut non polar (heksana) lalu dengan pelarut yang kepolarannya menengah



(etil asetat/ dietil eter) kemudian dengan pelarut polar (metanol/etanol), dengan demikian akan diperoleh ekstrak kasar yang mengandung berturut-turut senyawa non polar, semi polar, dan polar. Prosedur untuk memperoleh kandungan senyawa organik adalah dengan menggunakan alat soxhlet dengan sederetan pelarut secara berganti-ganti, mulai dengan pemisahan lipid, kemudian digunakan pelarut organik yang lebih polar. Metode ini berguna bila kita bekerja dengan skala gram. Tetapi jarang sekali proses pemisahan kandungan mencapai proses yang sempurna, dan senyawa yang sama mungkin terdapat dalam beberapa fraksi (Harbone, 1984).

#### **J. Tinjauan Umum Uji Aktivitas Antioksidan**

Uji aktivitas antioksidan yang dilakukan menggunakan metode pengukuran serapan radikal DPPH. Uji radikal DPPH secara luas digunakan, dikarenakan metode DPPH cepat dan terpercaya untuk menguji kemampuan antioksidan dalam meredam radikal bebas (Brand, 1995 dalam Srujana, 2017). Metode DPPH didasarkan pada 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) yang terlihat pada spektroskopometer, DPPH memberikan penyerapan kuat di 517 nm karena ganjilnya elektron. Sebagai elektron yang tidak berpasangan radikal ini dipasangkan dengan adanya penangkapan radikal bebas, ketika penyerapan berkurang dan larutan DPPH diturunkan maka warna berubah dari ungu tua ke kuning muda dan yang dihasilkan sehubungan dengan jumlah elektron yang ditangkap (Blois, 1958 dalam Srujana, 2017).

Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi. Akibatnya, penambahan senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal akan menurunkan konsentrasi DPPH dan menyebabkan penurunan absorbansinya dibandingkan dengan absorbansi kontrol yang tidak diberi senyawa uji yang diduga mempunyai aktivitas antiradikal (Dini, 2010).

Metode ini dipilih karena secara teknis cara kerjanya sederhana dan cepat dengan pengukuran aktivitas yang baik untuk berbagai senyawa terutama fenol. Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari larutan metanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Prosedur ini melibatkan pengukuran penurunan serapan DPPH pada panjang gelombang maksimalnya, yang mana sebanding dengan konsentrasi penghambat radikal bebas yang ditambahkan sebagai konsentrasi efektif (*Efective Concentration*),  $EC_{50}$  atau  $IC_{50}$  (Shivarsad, 2005).

#### **K. Tinjauan Umum Spektrofotometri**

Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya berdasarkan pengukuran absorbansi senyawa kimia terhadap radiasi energi tertentu dengan menggunakan sinar monokromat. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam

spektrofotometri disebut spektrofotometer. Cahaya yang dimaksud dapat berupa variabel, UV dan inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul namun yang lebih berperan adalah elektron yang ada pada atom ataupun molekul yang bersangkutan (Underwood, 1985).

Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan serapan pada pengukuran di daerah ultraviolet dan cahaya monokromatik. *Spectrum absorbs* daerah ini adalah 190-780 nm. Pengukuran serapan dapat dilakukan didaerah ultraviolet pada panjang gelombang 190-380 nm atau pada daerah cahaya tampak pada panjang gelombang 380-780 nm. Pelarut yang sering digunakan pada spektrofotometri UV-Vis adalah metanol, air, etanol, kloroform.

Menurut Hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel (b) yang disinari, dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah.

$$A = k \cdot b$$

Menurut Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi.

$$A = k \cdot c$$

Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar akan bertambah, sehingga serapan juga bertambah. Kedua persamaan ini digabungkan dalam Hukum Lambert-Beer, maka diperoleh bahwa serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan sel yang dapat ditulis dengan persamaan:

$$A = k \cdot c \cdot b$$

Umumnya digunakan dua satuan  $c$  (konsentrasi zat yang menyerap) yang berlainan, yaitu gram per liter atau mol per liter. Nilai tetapan ( $k$ ) dalam hukum Lambert-Beer tergantung pada sistem konsentrasi mana yang digunakan. Bila  $c$  dalam gram per liter, tetapan disebut dengan absorptivitas ( $a$ ) dan bila dalam mol per liter, tetapan tersebut adalah absorptivitas molar ( $\epsilon$ ). Jadi dalam sistem dikombinasikan, hukum Lambert-Beer dapat dinyatakan dalam rumus berikut:

$$A = a \cdot b \cdot c \text{ (g/liter) atau } A = \epsilon \cdot b \cdot c \text{ (mol/liter)}$$

Dimana:

- $A$  = Absorbansi tidak mempunyai satuan, karena  $A = \text{Log } P_0/P$
- $a$  = Absorbsivitas ( $\text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}$ )
- $\epsilon$  = Absorbsivitas molar ( $\text{L/mol cm}$ )
- $b$  = Panjang sampel, dalam hal ini adalah panjang kuvet yang berisi larutan (cm)
- $c$  = Konsentrasi senyawa dalam larutan (mol/L)


Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri dimana konsentrasi dapat dihitung berdasarkan rumus di atas. Absorptivitas ( $a$ ) merupakan konstanta yang tidak tergantung pada konsentrasi, tebal kuvet dan intensitas radiasi yang mengenai larutan sampel. Absorptivitas tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi (Day and Underwood, 1989).

Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk analisis kuantitatif, hal yang perlu diperhatikan antara lain, panjang gelombang maksimum serapan, daya serap, serapan

jenis, dan spektrum serapan. Menurut Ismail (1996) suatu spektrofotometer UV-Vis tersusun atas:

- 1) Sumber cahaya harus stabil untuk daerah sinar tampak digunakan lampu wolfram dan untuk daerah UV digunakan lampu hidrogen atau deuterium.
- 2) Monokromator merupakan alat untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis.
- 3) Kuvet (wadah sampel) merupakan wadah untuk menepatkan cairan didalam sinar dari spektrofotometer. Kuvet mempunyai tebal 1 cm. Kuvet yang digunakan untuk pengukuran pada daerah UV dibuat dari kaca silika atau kuarsa, sedangkan pengukuran untuk daerah cahaya tampak dibuat dari kaca.
- 4) Detector merupakan alat pendeteksi yang mengubah energy radiasi menjadi sinyal listrik.
- 5) Penguat arus (*Amplifier*) merupakan sistem yang berfungsi menggunakan sinyal listrik.
- 6) Rekorder merupakan suatu sistem pembacaan yang dapat menunjukkan besarnya sinyal listrik.

### L. Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan pendekatan penelitian yakni menggunakan penelitian eksploratif yang merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang belum diketahui, belum dipahami dan belum dikenali.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 – April 2017 pada Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Dasar, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Farmasi Biologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu kapang endofit *Euchema* sp. yang menghasilkan senyawa antioksidan.

#### **D. Defenisi Operasional Variabel**

Kapang endofit adalah jenis mikroorganisme yang bersimbiosis dengan makroalga *Eucheuma* sp. dari Teluk Laikang Puntondo Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang diuji aktivitas antioksidannya di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

#### **E. Instrumen Penelitian**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Laminar air flow*, *spektrofotometer* UV-Vis, cawan petri, labu erlenmeyer, pipet tetes, *Hot plate*, *magnetic* dan *stirrer*, corong *buchner*, autoklaf, water bath, gelas ukur, gelas pial, tabung reaksi, mikropipet, oven, *shaker*, aluminium foil, rak tabung, spatula, corong pemisah, neraca ohaus, dan neraca analitik.

Bahan yang digunakan adalah medium sampel kapang endofit yang digunakan dalam penelitian makroalga (*Eucheuma* sp.), medium yang digunakan yaitu *Potato Dextrose Broth* (PDB) dengan komposisi (4,8 g Dextrosa, 1 g CaCO<sub>3</sub>, dan 200 ml aquadest), 1,1-*Diphenyl-2-picrylhydrazyl* (DPPH), Vitamin C, etil asetat, metanol, natrium hipoklorit, dan alkohol.



## **F. Prosedur Kerja**

### 1. Persiapan medium

#### a. Pembuatan PDA

Media PDA dengan 2,25 g dextrose dan 2,25 g agar dalam takaran 150 ml aquades kemudian dituangkan kedalam labu Erlenmeyer dan dipanaskan dengan menggunakan alat *hot plate* selama 30 menit untuk melarutkan dekstrosa dan agar, kemudian media ditutup rapat dan disterilkan menggunakan autoklaf suhu 121 °C selama 15 menit. Erlenmeyer yang berisi PDA dikeluarkan dari autoklaf setelah itu menuang PDA kedalam cawan petri, dikerjakan secara aseptik didalam *Laminar Air Flow* (LAF) yang akan digunakan sebagai media peremajaan.

#### b. Media fermentasi

Media PDB dibuat dengan cara mengupas kentang dan memotong menjadi bentuk dadu, mencuci potongan kentang tersebut, lalu ditimbang sebanyak 40 gram dan dimasukkan kedalam labu erlenmeyer, kemudian didihkan dengan 200 ml aquadest, hasil dari ekstrak kentang kemudian ditambahkan 4,8 g Dextrose, 1 g CaCO<sub>3</sub>. Kemudian media ditutup dan sterilkan di autoklaf (LIPI, 2016).

### 2. Isolasi Kapang Endofit

Sampel makroalga *Eucheuma* sp. sebagai sumber isolat yang akan diisolasi dicuci bersih kemudian disterilisasi permukaan dengan cara merendam sampel kedalam larutan natrium hipoklorit 5 menit, alkohol 1 menit dan dibilas dengan

akuades steril (Petrini, 1992 dan Strobel, 2003). Makroalga *Eucheuma* sp. dipotong-potong  $\pm 1$  cm dan disebar pada media PDA (*Potato Dextrosa Agar*). Kemudian, inkubasi dilakukan selama satu minggu pada suhu ruang (Tarman, 2011). Kapang endofit yang tumbuh dari jaringan tanaman diisolasi dan dimurnikan lebih lanjut. Setelah proses pemurnian, pembuatan *stock culture* dan *working culture* dilakukan dengan menginokulasi koloni tunggal biakan kapang ke dalam tabung reaksi berisi medium agar miring. Medium yang digunakan adalah medium PDA (*Potato Dextrose Agar*). Tabung biakan digunakan sebagai *working culture* dan disimpan pada suhu ruang, sedangkan tabung lainnya digunakan sebagai *stock culture* dan disimpan pada suhu dalam lemari pendingin sebelum diuji lebih lanjut.

### 3. Inokulasi dan Isolasi Kapang Endofit

#### a. Pada Media PDA

Isolat kapang endofit yang terpilih dinokulasi pada media PDA (*Potato Dextrose Broth*) didalam cawan petri kemudian diinkubasi selama 7 hari.

#### b. Pada media PDB

Isolat kapang endofit yang telah tumbuh di cawan petri, diambil serabut hifanya dengan ose yang sudah steril lalu difermentasi pada 100 ml media PDB (*Potato Dextrose Broth*) didalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya diinkubasi pada *rotary shaker* selama 10 hari.

### 4. Identifikasi Kapang Endofit

Identifikasi kapang endofit dilakukan menurut Susiana (2009) dengan membersihkan gelas benda dengan alkohol dan di fiksasi sampai bebas lemak dan

debu. Biakan kapang diambil secara aseptis menggunakan ose kemudian diletakkan di atas gelas benda yang telah diberi sedikit alkohol. Preparat ditutup dengan kaca penutup dan difiksasi lalu dilihat dibawah mikroskop untuk mendapatkan ciri mikroskopiknya. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan karakteristik kapang endofit yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan buku identifikasi Barnett and Hunter (1998).

#### 5. Ekstraksi hasil fermentasi

Ekstraksi hasil fermentasi yakni dengan labu erlenmeyer yang mengandung masing-masing 100 ml hasil fermentasi dari isolat dipisahkan antara biomassa dengan filtrat. Filtrat diekstraksi sebanyak dua kali dengan 50 ml etil asetat menggunakan corong pisah, lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara fase etil asetat dan air. Fase etil asetat dikumpulkan kemudian diuapkan dengan cara mengeringkan ekstrak. Hasil ekstraksi filtrat yang sudah kering kemudian diuji aktivitas antioksidannya (LIPI, 2016).

#### 6. Uji aktivitas antioksidan ekstrak filtrat

Aktivitas antioksidan ditentukan dengan metode peredaman radikal bebas menggunakan DPPH (LIPI, 2016).

##### a) Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM

Menimbang  $\pm 0,00789$  g DPPH dan dilautkan dengan metanol 50 ml kemudian tempatkan dalam botol gelap.

b) Pembuatan larutan blangko

Larutan DPPH 0,4 mM dipipet 1 mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ditara 5 mL, dilarutkan dalam metanol pro analisis hingga tanda, dihomogenkan.

c) Pembuatan larutan uji

Secara seksama ditimbang 10 mg ekstrak kental dari fraksi menggunakan timbangan analitik, dilarutkan dengan metanol pro analisis sampai 10 mL (1000 bpj). Larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian dipipet 25  $\mu$ L, 50  $\mu$ L, 125  $\mu$ L, 250  $\mu$ L, dan 500  $\mu$ L larutan induk tersebut ke dalam tabung reaksi yang telah ditara 5 mL untuk mendapatkan konsentrasi sampel 5 bpj, 10 bpj, 25 bpj, 50 bpj, dan 100 bpj.

d) Pembuatan larutan vitamin C (Kontrol positif)

Menimbang 10 mg vitamin C, lalu dilarutkan metanol pro analisis sampai 10 ml (1000 bpj) larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian dipipet 15  $\mu$ L, 30  $\mu$ L, 45  $\mu$ L, 60  $\mu$ L dan 75  $\mu$ L larutan induk ke dalam labu terukur 5 ml untuk mendapatkan konsentrasi sampai 3 bpj, 6 bpj, 9 bpj, 12 bpj, dan 15 bj.

7. Uji aktivitas antioksidan

Larutan uji dan kontrol positif dimasukkan ke dalam masing – masing tabung reaksi lalu ditambahkan 1 ml larutan DPPH kemudian ditambahkan metanol pro analisis hingga 5 mL, lalu dihomogenkan dengan larutan blanko, larutan uji dan kontrol positif diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit dan absorbansi dari

masing-masing larutan dibaca pada gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer UV-VIS (LIPI, 2016).

### **G. Analisis Data**

Uji aktivitas antioksidan ini mengacu pada penelitian LIPI (2016) pada sampel yang telah dihasilkan kemudian dilakukan analisis, yaitu:

- a) Serapan blangko, kontrol positif dan serapan larutan uji yang telah diukur pada spektrofotometer UV-Vis dicatat dengan cara memasukkan hasil serapan masing-masing konsentrasi pada rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{\text{serapan blangko} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan blangko}} \times 100 \%$$

- b) Dibuat persamaan regresi linear dengan memasukkan nilai konsentrasi larutan uji sebagai sumbu x dan % hambatan sebagai sumbu y.
- c) Dihitung  $IC_{50}$  dengan cara memasukkan % hambatan sebesar 50 % pada persamaan regresi linear.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian**

Allah swt. telah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan baik yang di darat maupun di laut. Salah satunya adalah kapang endofit dari makroalga *Eucheuma* sp. yang merupakan salah satu tumbuhan laut yang diciptakan Allah swt. yang memiliki manfaat yang sangat penting bagi umat manusia di muka bumi ini, hal ini sesuai dengan bukti Allah pada firman-Nya dalam Q.S. al-Hijr/15: 19-20 yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾  
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya (Kementerian Agama RI, 2012).

Lafadz “*wal ardho madadnaahaa*” pada ayat tersebut menjelaskan bahwa semua kekayaan alam yang ada di bumi ini diciptakan Allah swt. hanya untuk manusia dan supaya manusia mau mengambil manfaat untuk kemaslahatan dan

kesejahteraan hidupnya, karena semua kekayaan alam yang kecil maupun yang besar sudah pasti memiliki manfaat masing-masing (Shiddieqy, 2000).

Lafadz “*wa anbatna fiihaa minkulli syain mauzun*” pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah menumbuhkan di muka bumi ini segala jenis tumbuhan menurut timbangan dan ukurannya masing-masing. Maka tidak ada di muka bumi yang tidak mengandung faidah. Semua tumbuhan mempunyai hikmah dan maslahat, walaupun tidak diketahui oleh kebanyakan manusia (Shiddieqy, 2000).


Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terdapat dimuka bumi ini adalah ciptaan Allah swt., dan tak sedikitpun dari ciptaan-Nya itu ada kekeliruan dari manfaat dan keberadaannya, karena Allah swt. menciptakan seluruh yang ada dimuka bumi ini sesuai dengan kadar dan ukurannya masing-masing. Seperti halnya kapang endofit yang memiliki banyak kegunaan untuk kesehatan dan hal-hal lainnya.

Adapun pada pengambilan sampel makroalga *Euccheuma* sp. di Puntondo, Takalar yaitu dengan mengambil makroalga tersebut di laut dan mengisolasi di laboratorium mikrobiologi, fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Dari hasil isolasi kapang endofit makroalga *Euccheuma* sp. diperoleh satu isolat.

### **1. Isolasi Kapang Endofit**

Kapang endofit diisolasi dari organ tumbuhan yang masih dalam keadaan segar dan telah disterilkan permukaannya (Agusta 2009). Isolasi kapang endofit dari sampel tumbuhan dapat dilakukan dengan metode *surface sterilization* menggunakan hipoklorit dan alkohol 70% sebagai disinfektan (Ando dkk. 2003) dan kemudian sampel tumbuhan tersebut diletakkan pada medium agar (Tan dan Zou 2001).

Metode *surface sterilization* digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme epifit pada tumbuhan (Larran *dkk.* 2001). Kapang endofit yang telah diisolasi, umumnya diidentifikasi untuk mengetahui identitas dari kapang tersebut. Identifikasi kapang secara konvensional secara umum dapat dilakukan dengan pengamatan karakter morfologi secara mikroskopik dan makroskopik. Tujuan dari pengamatan morfologi adalah memperoleh deskripsi karakter dari suatu kapang. Deskripsi yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan literatur atau monograf untuk mengetahui identitas kapang tersebut (Gandjar *dkk.* 1999).




**Gambar 4.1.** Hasil Isolasi Kapang Endofit (a) setelah 7 hari dan (b) setelah 10 hari.

## 2. Karakteristik Isolat Kapang Endofit

Untuk mengetahui karakteristik isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. maka dilakukan pengamatan secara makroskopik dengan mengamati secara langsung dan mencocokkan hasil dengan buku identifikasi Burnett dan Hunter (1998), sedangkan pada pengamatan mikroskopik dilakukan dengan menggunakan mikroskop diperoleh hasil sebagai berikut:





**Gambar 4.2.** Karakteristik Isolat Kapang Endofit (a) Makroskopik (Warna permukaan koloni), (b) Warna balik koloni, (c) Mikroskopik, dan (d) *Aspergillus* sp. (Barnett dan Hunter, 1998).

Tabel 4.1. Karakteristik isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. secara makroskopik dan mikroskopik.

Pengamatan									
Makroskopis							Mikroskopis		
Warna Permukaan	Warna Balik Koloni	Tekstur	Topografi	Tetes Eksudat	Garis Radial	Lingkar Konsentris	Bentuk Konidia	Bentuk Hifa	Genus
Hijau Kecoklatan	Hijau kekuningan	<i>Velvety</i>	<i>Rugose</i>	-	✓	-	Bulat	Bersekat	<i>Aspergillus</i> sp.

Keterangan:

1. Tekstur : *Velvety* (koloni dengan hifa aerial yang pendek menyerupai kain beludru),
2. Topografi : *Rugose* (koloni yang memiliki alur-alur yang ketinggiannya tidak beraturan dan tampak merupakan garis radial).


### 3. Uji Aktivitas Antioksidan

Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran serapan radikal DPPH tereduksi pada panjang gelombang 517 nm karena memiliki serapan kuat yang diperoleh dengan cara mengatur alat spektrofotometer UV-vis. Adapun hasil dari uji aktivitas antioksidan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil uji aktivitas antioksidan

No.	Sampel	Konsentrasi (bpj)	% Hambatan	IC <sub>50</sub> (bpj)	Keterangan
1.	<i>Aspergillus</i> sp.	5	12,3	38,64	Sangat Kuat
		10	25,2		
		25	40,3		
		50	84,4		
		100	95,4		
2.	Vitamin C	3	44,8	3,03	Sangat Kuat
		6	61,7		
		9	86,7		
		12	93,6		
		15	95,2		

Adapun kurva dari hasil uji aktivitas antioksidan antara vitamin C (kontrol positif) dan kapang endofit *Aspergillus* sp. dapat dilihat sebagai berikut:



## B. Pembahasan

### 1. Isolasi Kapang Endofit

Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media pertumbuhan PDA (*Potato Dextrose Agar*) pertumbuhan yang merupakan salah satu media kultur yang paling umum digunakan karena formulasinya yang sederhana dan merupakan media terbaik karena kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan pada berbagai jamur (Saha *et al*, 2008), sedangkan pada media alternatif memiliki nutrisi yang lebih kompleks sehingga pertumbuhan jamur belum seoptimal media PDA (*Potato dextrose Agar*). Hal tersebut dipertegas oleh Gandjar (2006) menyatakan bahwa


kandungan kompleks dalam media menyebabkan jamur uji membutuhkan waktu lebih lama untuk menguraikan menjadi komponen-komponen sederhana yang dapat diserap sel yang digunakan untuk sintesis sel dan energi.

Berdasarkan hasil penelitian pada media PDA (*Potato dextrose Agar*) dapat tumbuh dengan baik kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. yang merupakan *Aspergillus* sp. Hal ini dikarenakan media PDA (*Potato dextrose Agar*) mampu mendorong pertumbuhan miselium dan sporulasi. Berdasarkan hal tersebut dipertegas oleh Sharma (2010) bahwa diameter koloni, karakteristik (tekstur, permukaan, dan pewarnaan sebaliknya, zonasi) dan sporulasi jamur uji sangat dipengaruhi oleh jenis medium pertumbuhan yang digunakan.

Isolat kapang endofit yang telah diremajakan dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml yang berisi medium PDB (*Potato Dextrose Broth*) 100 ml yang telah disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit kemudian selanjutnya medium diinkubasi selama 10 hari pada *shaker* dengan kecepatan 120 rpm yang bertujuan mempercepat transfer nutrisi ke dalam sel untuk mensuplai oksigen bagi aktivitas metabolik sel dan untuk meratakan mikroorganisme dalam medium sehingga selama mikroorganisme mendapat kesempatan yang sama kontak dengan oksigen.

Medium PDB (*Potato Dextrose Broth*) sebelum dikultur kapang endofit berwarna putih pekat. Kultur kapang endofit setelah berumur 10 hari terlihat kapang endofit yang berbentuk melingkar menempel pada erlenmeyer dan ada juga yang berbentuk butiran kecil yang berwarna putih kecoklatan. Hal tersebut membuktikan

bahwa kapang endofit dapat tumbuh pada medium PDB (*Potato Dextrose Broth*) karena memperoleh nutrisi yang cukup.



**Gambar 4.3.** (a) PDB sebelum fermentasi, dan (b) PDB sesudah fermentasi.

Adapun kandungan dari media PDB (*Potato Dextrose Broth*), yaitu sebagai sumber karbon yang berasal dari kentang dan *dextrose*. Sumber karbon merupakan komponen terpenting dalam medium pertumbuhan, karena sel-sel mikroba sebagian besar terdiri dari unsur-unsur karbon dan nitrogen (Kusumaningtyas *et al.*, 2010).

Kapang endofit yang digunakan pada penelitian ini diisolasi dari makroalga *Eucheuma* sp. Kapang laut umumnya diisolasi dari tumbuhan yang hidup di dalam laut dan sekitarnya dari alga, hewan laut dan juga dari buih air laut (Gandjar *et al.*, 2006). Hasil isolasi kapang endofit pada makroalga *Eucheuma* sp. diperoleh satu isolat kapang endofit. Isolat kapang yang telah diisolasi dapat tumbuh pada berbagai media yaitu media air laut dan media dengan menggunakan aquades.

Isolasi kapang endofit mengacu pada penelitian yang dilakukan Tarman, (2011) dengan cara sterilisasi permukaan. Sampel dipotong sebesar  $\pm 1$  cm dan

ditanam didalam media PDA (*Potato Dextrose Agar*) air laut yang telah ditambahkan kloramfenikol dan diinkubasi pada suhu ruang. Setelah 7 hari isolat kemudian dipindahkan pada media PDA (*Potato Dextrose Agar*) yang baru dan diinkubasi kembali.

Media yang digunakan untuk isolasi kapang ini ditambahkan kloramfenikol . Hal ini dilakukan agar dapat mencegah pertumbuhan bakteri pada media. Kumala dan Siswanto (2007) menyatakan bahwa kapang endofit dapat tumbuh pada media PDA (*Potato Dextrose Agar*) yang telah ditambahkan dengan kloramfenikol sebagai bahan antibakteri untuk pertumbuhan kapang. Isolat kapang yang telah diisolasi diremajakan pada media PDA (*Potato Dextrose Agar*) cawan dan dilihat secara makroskopik dan mikroskopik pada bagian miselia kapang.

Kapang endofit laut ini dapat tumbuh pada media dengan penggunaan aquades dan air laut. Hal ini diduga kapang tersebut merupakan fungi laut yang fakultatif, dimana fungi dari lingkungan air tawar atau terrestrial mampu tumbuh dan bersporulasi di lingkungan laut (Gandjar *et al.*, 2006).

Pengukuran pH ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan kapang endofit dengan menggunakan media PDA (*Potato Dextrosa Agar*). Kapang yang sebelumnya telah diremajakan dalam cawan petri dengan media PDA (*Potato Dextrosa Agar*) kemudian difermentasi dalam media PDB (*Potato Dextrosa Broth*) selama 10 hari pada *Rotary shaker*. Setelah itu, pH pertumbuhan kapang endofit diperiksa menggunakan pH universal.

Berdasarkan hasil pengamatan membuktikan bahwa pada media padat PDA (*Potato Dextrose Agar*) dengan pH 7 kapang endofit dapat tumbuh dengan baik begitupun pada media cair PDB (*Potato Dextrosa Broth*) yang mengandung sumber karbon yang berasal dari kentang,  $\text{CaCO}_3$ , dan *Dextrose*. Sumber karbon merupakan komponen terpenting dalam medium pertumbuhan, karena sel-sel mikroba sebagian besar terdiri dari unsur-unsur karbon dan nitrogen (Kusumaningtyas *et al.*, 2010). Hal ini membuktikan bahwa kapang memiliki pH optimum antara 5 dan 7 dan dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 8,5.

## 2. Karakteristik Kapang Endofit

Isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. diremajakan pada media PDA (*Potato Dextrose Agar*) lalu diinkubasi selama 7 hari pada suhu ruang. Setelah 7 hari terlihat pertumbuhan kapang dan diamati secara makroskopik dan mikroskopiknya untuk mengetahui karakteristik morfologi makroalga *Eucheuma* sp.

Adapun hasil pengamatan isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. memiliki ciri-ciri morfologi makroskopis dan mikroskopis, pada pengamatan makroskopis: warna permukaan hijau coklat, warna balik koloni hijau kekuningan, tekstur *Velvety* (koloni dengan hifa aerial yang pendek menyerupai kain beludru), topografi *Rugose* (koloni yang memiliki alur-alur yang ketinggiannya tidak beraturan dan tampak merupakan garis radial), tidak memiliki tetesan eksudat, dan terdapat garis radial. Pada pengamatan mikroskopis: bentuk konidia bulat, bentuk hifa bersekat, dan terdapat konidifor, konidia dan hifa.



Hal ini sesuai dengan teori Barnett dan Hunter (1998) bahwa ciri mikroskopis cendawan *Aspergillus* yaitu konidiofor tegak, sederhana, ujung bulat, memancar dari ujung atau seluruh permukaan konidia bulat, sering berwarna warni. Berdasarkan hasil deskripsi kapang dan merujuk pada Barnett & Hunter (1998), Samsons, et al (1984) dan Pitt & Hocking (1985) diketahui bahwa kapang endofit yang diisolasi dari makroalga *Eucheuma* sp. adalah kelompok kapang dari genus *Aspergillus* sp. yang teridentifikasi sebagai kapang spesies *Aspergillus* sp. yang bersimbiosis dengan makroalga *Eucheuma* sp. yang memiliki aktifitas biologis sebagai antijamur antiviral, antikanker, dan manajemen rumput (Kuncoro dan Sugijanto, 2011).

*Aspergillus* sp. adalah salah satu jenis mikroorganisme yang termasuk dan termasuk dalam mikroorganisme eukariotik. *Aspergillus* sp. secara mikroskopik dicirikan sebagai hifa bersepta dan bercabang, konidiofor muncul di *foot cell* (miselium yang bengkak dan berdinding tebal) membawa stigmata dan akan tumbuh konidia yang membentuk rantai berwarna hijau, coklat atau hitam (Srikandi F., 1992).

*Aspergillus* sp. secara makroskopis mempunyai hifa fertil yang muncul di permukaan dan hifa vegetatif di bawah permukaan. Jamur tumbuh membentuk koloni *mold* berserabut, *smooth*, cembung serta koloni yang kompak berwarna hijau kelabu, hijau coklat, hitam, putih. Warna koloni dipengaruhi warna spora misalnya spora berwarna hijau, maka koloni hijau, yang semula berwarna putih tidak tampak lagi (Srikandi F., 1992).

Diantara spesies-spesies *Aspergillus* dapat menghasilkan mikotoksin yang disebut alfatoksin. Dalam pembentukan mikotoksin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan (substrat, kelembaban, suhu, pH) dan lamanya kontak antara jamur dengan substrat. Mikotoksin diidentifikasi sebagai zat yang diproduksi oleh jamur dalam bahan makanan, dan bersifat tahan terdapat panas, sehingga dengan pengolahan, pemasaran tidak menjamin berkurangnya aktifitas toksin tersebut (Srikandi F., 1992). Adapun klasifikasi *Aspergillus* sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Fungi  
 Filum : Ascomycota  
 Classis : Eurotiomycetes  
 Ordo : Eurotiales  
 Familia : Trichomaceae  
 Genus : *Aspergillus*  
 Spesies : *Aspergillus* sp. (Barnett dan Hunter, 1998).

Senyawa aktif yang terdapat pada *Eucheuma* sp. tidak mengandung lemak, tetapi kaya selenium yang bersifat antioksidan, sehingga makroalga mampu membantu tubuh mencegah penyerapan zat kimia beracun, termasuk sampah radioaktif dan polusi. Di samping itu, *Eucheuma* sp. juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan (Nugroho, 2006). Senyawa aktif yang dimiliki oleh rumput makroalga *Eucheuma* sp. tersebut dimiliki juga oleh kapang endofit *Aspergillus* sp. yang bersimbiosis dengannya. Kapang endofit merupakan kapang (jamur) yang hidup berasosiasi dengan tumbuhan dan hidup pada jaringan

tumbuhan tersebut (Bacon dan Hinton, 2006). Kapang endofit ini umumnya menghasilkan senyawa bioaktif yang memiliki sifat struktural dan fungsional sama dengan senyawa bioaktif yang diproduksi inang (Tan dan Zou, 2001). Hubungan antara kapang endofit dengan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis mutualisme (Simarmata *et al*, 2007). Organisme inang memberikan nutrisi dan proteksi bagi kapang endofit, kapang endofit memberikan keuntungan berupa proteksi terhadap mikroorganisme yang bersifat patogen bagi inang (Tan dan Zou, 2001; Simarmata *et al*, 2007).

*Aspergillus* sp. merupakan kapang endofit yang hidup dalam jaringan tumbuhan, hewan, dan biota laut yang mampu menghasilkan bioaktif metabolit primer (karbohidrat, protein, dan lemak), dan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai bahan obat dan pangan. Metabolit primer kapang endofit yang dapat dijadikan sebagai bahan obat atau pangan ini adalah polisakarida, dinding sel *Aspergillus* sp. banyak mengandung polisakarida yang memberikan struktur pada sel (Gastebois *et al*, 2009). Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *Aspergillus* sp. endofitik ditemukan menghasilkan fenol fitokimia, flavonoid, tanin dan alkaloid merupakan indikator penggunaannya sebagai obat sintetis (Shan *et al*, 2012 dalam D.Prabavathy, Phoebe M., G.L, 2017). *Aspergillus* sp. sebagai kapang endofit telah diisolasi dan dilaporkan menghasilkan senyawa bioaktif (Satte, 2006 dalam D.Prabavathy, Phoebe M., G.L, 2017). Polisakarida dari kapang endofit *Aspergillus* sp. ini memiliki aktivitas antioksidan yang diisolasi dari alga laut (Chen *et al*, 2011).

### 3. Ekstraksi Hasil Fermentasi

Ekstraksi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan etil asetat sebagai pelarut. Etil asetat ini merupakan pelarut semi polar yang mudah menguap (*Volatil*). Pelarut tersebut digunakan karena yang diinginkan adalah senyawa kimia yang larut dalam pelarut tersebut. Ekstraksi ini bertujuan agar senyawa dalam isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. diharapkan dapat terlarut dengan baik sesuai polaritasnya yakni dapat terpisah antara biomassa dan ekstraknya.

Hasil fermentasi diekstraksi dengan menggunakan pelarut organik *n*-heksana (etil asetat) yang dimasukkan kedalam corong pisah dan dikocok kuat. Setelah dikocok, didiamkan sampai didapatkan 2 lapisan yaitu fase atil asetat dan fase air, dimana pada fase etil asetat merupakan hasil metabolik dari kapang endofit yang kemudian lapisan atasnya diambil karena merupakan super natan yang akan diuji aktivitas antioksidannya. Pengocokan dilakukan sebanyak dua kali tau 1:1 atau sesuai dengan banyaknya media yang digunakan untuk fermentasi setara dengan banyaknya metanol yang ditambahkan pada proses ekstraksi. Selanjutnya filtrat yang didapat dikeringkan sampai diperoleh ekstrak kental. Karena ekstrak yang diperoleh belum kental dan masih mengandung air maka dilanjutkan untuk mendapatkan ekstrak kering. Berdasarkan hasil pengamatan hasil ekstraksi diperoleh bobot ekstrak sebanyak 6,5 g yang akan di uji aktivitas antioksidannya.

#### 4. Uji Aktivitas Antioksidan

Dalam penelitian ini uji aktivitas antioksidan yang dilakukan menggunakan metode pengukuran serapan radikal DPPH yakni dengan DPPH tereduksi pada panjang gelombang 517 nm yang menggambarkan besar aktivitas suatu antioksidan dalam meredam radikal bebas. Metode ini dipilih karena secara teknis cara kerjanya mudah dan cepat dengan pengukuran aktivitas yang baik untuk berbagai senyawa terutama fenol (Bios, 1958 dalam Molyneux, 2004). Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari larutan metanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Prosedur ini melibatkan pengukuran penurunan serapan DPPH pada panjang gelombang maksimalnya, dimana semakin besar konsentrasi semakin besar pula persen penghambatnya (Maliandari, 2012).

Metode ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar daya peradamannya maka dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis. Peradaman (Inhibisi) terhadap radikal bebas dinyatakan dalam persen, dan aktivitas antioksidan dinyatakan dengan  $IC_{50}$  yang menunjukkan konsentrasi sampel antioksidan dapat meredam aktivitas DPPH sebesar 50%. Nilai  $IC_{50}$  yang semakin kecil menunjukkan aktivitas antioksidan semakin tinggi (Jun *et al.*, 2003). Perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan vitamin C sebagai kontrol positif. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui nilai absorbansi dari media PDB (*Potato Dextrosa Broth*) melalui tabel 4.2.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa media PDB (*Potato Dextrosa Broth*) dengan menggunakan

isolat kapang endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* sp. diperoleh  $IC_{50}$  sebesar 38,64 ppm dan dikatakan kuat dalam meredam radikal bebas. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai  $IC_{50}$  berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan.

Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan yang sangat kuat apabila nilai  $IC_{50}$  kurang dari 50 ppm, kuat apabila  $IC_{50}$  antara 50-100 ppm, sedang apabila  $IC_{50}$  bernilai 100-150 ppm, dan lemah bila  $IC_{50}$  150-200 ppm (Bios, 1958 dalam Molyneux, 2004).

Meskipun makroalga *Eucheuma* sp. tergolong sangat kuat sebagai antioksidan, tetapi apabila dibandingkan dengan aktivitas antioksidan vitamin C (sebagai kontrol positif) yang mempunyai daya hambat terhadap radikal bebas sebesar 3,03 ppm dan berfungsi sebagai antioksidan alami dan digolongkan menjadi golongan pengikat oksigen. Hal tersebut dikarenakan vitamin C merupakan senyawa murni yang memiliki aktivitas antioksidan kuat terbukti dengan nilai  $IC_{50}$  yang kecil (Arindah, 2010). Vitamin C mudah mengalami oksidasi oleh radikal bebas karena mempunyai ikatan rangkap serta terdapat 2 gugus -OH yang terikat pada ikatan rangkap tersebut. Vitamin C mampu menangkap radikal bebas dengan atau tanpa katalisator enzim. Reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih cepat dibandingkan dengan komponen cair lainnya (Winarsi, 2007).

Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa kandungan *dietary fiber* dan nutrisi dari *Eucheuma* sp. ini bermanfaat sebagai antioksidan, antimutagenik, anti koagulan, anti tumor, dan metabolisme lipid. Makroalga juga sebagai sumber iodium alami (Zada, 2009). *Eucheuma* sp. tidak mengandung lemak, tetapi kaya selenium

yang bersifat antioksidan, sehingga makroalga mampu membantu tubuh mencegah penyerapan zat kimia beracun, termasuk sampah radioaktif dan polusi. Di samping itu, *Eucheuma* sp. juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan (Nugroho, 2006).

Selain sebagai antioksidan, *Eucheuma* sp. ini juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang di masyarakat, di antaranya sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium, dan hormon seperti auxin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya pertumbuhan tanaman dalam berbunga dan berbuah, bahan pengental (*thickener*), pembentuk gel, pengemulsi dan pengimbang (stabilisator) pada industri makanan, pasta gigi, farmasi, kosmetik, tekstil, cat, karet, dan kertas. Selain itu *Eucheuma* sp. dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dan makanan tambahan berupa agar (Nugroho, 2006).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Penelitian yang telah dilakukan tentang uji aktivitas antioksidan kapang endofit makroalga *Eucheuma* sp. asal Puntondo, dengan melakukan isolasi hingga uji aktivitas antioksidan. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Spesies kapang endofit yang diperoleh dari makroalga *Eucheuma* sp. terdapat 1 isolat kapang endofit yang telah diidentifikasi yaitu *Aspergillus* sp. yang kemudian dilakukan uji aktivitas antioksidannya dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis.
2. Uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa media PDB (*Potato Dextrosa Broth*) dengan menggunakan isolat kapang endofit *aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* sp. diperoleh  $IC_{50}$  sebesar 38,64 ppm dan dikatakan kuat dalam meredam radikal bebas. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai  $IC_{50}$  berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan.

#### ***B. Saran***

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil identifikasi dan uji aktivitas antioksidan yang lebih baik dan akurat.



## KEPUSTAKAAN

### Al-Quranulkarim

- A. Gastebois, C. Clavaud, V. Aimananda and J.P. Latge, "Aspergillus fumigatus: Cell Wall Polysaccharides, their biosynthesis and organization". *Future Microbiology* 4(5). 2009.

Abadi AL. *Ilmu Penyakit Tumbuhan*. Malang: Bsyu Media Publishing, 2003.

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsiir min Ibni Katsiir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M. Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsiir min Ibni Katsiir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M. Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Afrianto, E. dan Liviawaty, E. *Budidaya Rumput Laut dan Cara Pengolahannya*. Jakarta: Pustaka Desa, 1993.

Agusta, A. *Biologi dan kimia jamur endofit*. Penerbit ITB, Bandung: vii + 110 hlm. 2009.

Ando, K., C. Nakashima, J.Y. Park, & M. Otoguro. Workshop on isolation methods of microbes. Research and Development Center for *Biotechnology Indonesia Institute of Science*: 44 hlm. 2003.

Andraeni F. *Pengaruh Ekstrak Euchema sp. Terhadap Pertumbuhan Chlorella sp.* Semarang: Universitas Diponegoro. 11 – 15, 2005.

Andriana, G., Sandro, A.R., Celso, J.R.F., Nakamura, C.V. & Joao, A.P. *Diversity of Foliar Endophytic Fungi From the Medicinal Sapindus saponaria L, and Their Localization by Scanning Electron Microscopy*. *Biological Research J*, Vol. 45(2), 139-148. 2012.

Anggadiredja, J.T. *Zatnika. Rumput laut*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.

Araujo V, Arnal C, Boronat M, et.al. *Oxidant-anti oxidant imbalance in blood of children with juvenile rheumatoid arthritis*. *Bio Factor*, 1998: Vol. 8: 155-9.

Arindah, D. *Fraksinasi dan Identifikasi Golongan Senyawa pada Daging Buah Pepino (Solanum muricatum Aiton) yang berpotensi sebagai Antioksidan*. Malang: UIN Malang, 2010.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul majid An-Nur*, Jilid 2. Cetakan Ke-2. Edisi ke-2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Aslan LM. *Budidaya Rumput Laut cetakan ke-1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Aslan, L. *Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Bacon CW, Hinton DM. Bacterial Endophytes: the endophytic niche, its occupants, and its utility. Dalam Gnanamanickam SS, editor. *Plant Associated Bacteria*. Netherland (NL): Springer, 2006.
- Barnett HL. dan Hunter BB. *Illustrated Genera of Imperfect Fungi*. Minneapolis: Burgess Publ.Co, 1998.
- Barnett, J.A., R.W. Payne, D. Yarrow, & L. Barnett. 2000. *Yeast: Characteristics and identification*. 3rd ed. Cambridge University Press, Cambridge: 1150 hlm.
- Barnett, H.L. & B.B. Hunter. *Illustrated genera of imperfect fungi*. 4th ed. Prentice Hall, Inc., U.S.A: xxi + 218 hlm. 2003.
- Benson, H.J. *Microbiological application: Laboratory manual in general microbiology*. The McGraw-Hills Company, Inc., New York: xi + 478 hlm. 2001.
- Blois MS dalam Srujana, M., Lakhmidevi, N. Antioxidant Studies of Methanolic Extract and Active Fraction Obtained From *Ichnocarpus frutescens*. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. International Journal of Pharma and Bio Science, 2017; 8(1): (B) 110-117.
- Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C, dalam Srujana, M., Lakhmidevi, N. Antioxidant Studies of Methanolic Extract and Active Fraction Obtained From *Ichnocarpus frutescens*. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. International Journal of Pharma and Bio Science, 2017; 8(1): (B) 110-117.
- Bray TM. *Antioxidants, Activation, and Diabetogenesis*. PSEBM, Vol. 222: 205-213. 1999.
- Buck DF. Antioksidant. J. Smith (eds). Food Additive User's Handbook. Galsgow-UK : Blakie Academic & Profesional, 1991.
- Cappuccino, J.G. & N. Sherman. *Microbiology: a laboratory manual*. The Benjamin/Cummings Publishing Inc., California: xvii + 477 hlm. 1996.

- Castillo U. Kakadumycins, novelantibiotics from *Streptomyces* sp. NRRL 30566, an Endophyte of *Grevillea pteridifolia*. *FEMS Microbiol. Lett. et al.* Vol. 224: 180-190. 2003.
- Day, R. A dan Underwood, A.L. diterjemahkan oleh Pudjaatmaka, A.H. Analisis Kimia Kuantitatif. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DKRI). *Buku Panduan Teknologi Ekstrak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan: h. 6-16, 2000.
- Dini. *Isolasi Fungi Endofit Penghasil Senyawa Antioksidan dari Tanaman Kleinhovia hospital* Linn. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010.
- Doty MS. *Eucheuma alvarezii* sp.nov (Gigartinales, Rhodophyta) from Malaysia. Didalam: Abbot IA, Norris JN (editors). *Taxonomy of Economic Seaweeds*. CaliforniaSea Grant College Program. p 37 ± 45, 1985.
- Dwijoseputro. *Pengantar Mikologi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Francine. *Zat Gizi Antioksidan Penangkal Senyawa Radikal Pangan Dalam Sistem Biologis, Prosiding Seminar Senyawa Radikal dan Sistem Pangan, Reaksi Biomolekular, Dampak Terhadap Kesehatan dan Penangkalan*, 1996.
- Gandjar, I., I.R. Koentjoro, W. Mangunwardoyo, & L. Soebagya. *Pedoman praktikum mikrobiologi dasar*. Jurusan Biologi FMIPA UI, Depok: vii +79 hlm. 1992.
- Gandjar, I., R.A. Samson, K. van den Tweel-Vermeulen, A. Oetari, & I. Santoso. *Pengenalan kapang tropik umum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: xiii + 136 hlm. 1999.
- Gandjar, I., W. Sjamsuridzal, dan A. Oetari. *Mikologi dasar dan terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Gross, Jeana. *Pigments In Vegetables (Chlorophylls and Carotenoids)*. Van Nostrand Reinhold. New York. 7. 75, 1991.
- Hamka. *"Tafsir Al-Azhar Juzu XXIV"*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1992.
- Harborne JB. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Padmawinata K, penerjemah. Edisi Kedua. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Terjemahan dari: *Phytochemical Methods*, 1984.

- Hogg, S. *Essential microbiology*. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex: x + 468 hlm. 2005.
- Ismail. *Analisis Kimia Kuantitatif*. Edisi IV. Diterjemahkan oleh Haydana A. Jakarta: Erlangga, H. 383-404. 1996..
- Jun. M.H.Y., J., Fong, X., Wan, C.S., dan Yang, C.T. Comparison of Antioxidant Activities of Isoflavones from Kudzu Root (*Pueraria lobata* Ohwl). *Journal Food Science*. 68 (6): 2117-2122. 2003.
- Kementerian Agama Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Penafsir al-Qur'an oleh Lajnah Penashih Mushaf al-Qur'an. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Ketaren S. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Krish S, Das A. dalam Ibrahim, Eman A. Marine Algal Sterol Hydrocarbon with Anti-Inflammatory, Anticancer and Anti-Oxidant Properties. In-vitro bioactivity of marine seaweed, *Cladophora rupestris*. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*. 2016;7(3): (B) 392-398.
- Koneman, E.W. & G.D. Roberts. *Practical laboratory mycology*. 3rd ed. Williams and Wilkins Publisher, Baltimore: vii + 211 hlm. 1985.
- Kumala, S., dan E.B. Siswanto. Isolation and screening of endophytic microbes from *Morinda citrifolia* and their ability to produce anti-microbial substances. *J. Mikrobiologi Indonesia*, 3(1):145-148. 2007.
- Kumari, CH.M., Chitturi, P. Jeevana Lakshmi. Isolation, Screening Of Phytate Degrading Fungi (*Aspergillus niger*) and Optimiation Of Submerged Fermentative Production Of Phytase. *Int J Pharm Bio Sci* 2016 July ; 7(3): (B) 860 – 865.
- Kuncoro, H., dan Sugijanto, N.E. Jamur Endofit, Biodiversitas, Potensi Dan Prospek Penggunaannya Sebagai Sumber Bahan Obat Baru. *J. Trop. Pharm. Chem*. Vol 1. No. 3. 2011.
- Kusumaningtyas, E., M. Natasia, dan Darmono. Potensi metabolit kapang endofit rimpang lengkuas merah dalam menghambat pertumbuhan *Eschericia coli* dan *Staphy-lococcus aureus* dengan media fermentasi PDB dan PDY. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Hlm.:819-824. 2010.

- Larran, S., C. Mónaco, & H.E. Alippi. Endophytic fungi in leaves of *Lycopersicon esculentum*. *World J. Microbiol. Biotechnol.* **17**: 181--184. 2001.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Uji Aktivitas Antioksidan Kapang Endofit Bo.Ci.Cl.A3 asal Tanaman Kunyit (*Curcuma longa* Linn) dengan Variasi Nitrogen pada Media Fermentasi. Bogor: LIPI, 2016.
- Mailandari, M. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Garcinia kydia Roxb. Dengan mMetode DPPH dan Identifikasi Senyawa Kimia Fraksi yang Aktif*. Universitas Indonesia: FMIPA. 2012.
- Molyneux, P. The Use Of The Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Extimating Antioxidant Activity. *Journal of Science and Technology.* **26** (2): h.211-219. 2004.
- Maulida D, Zulkarnaen N. *Ekstraksi antioksidan (likopen) dari buah tomat dengan menggunakan solven campuran n-heksan, aseton, dan etanol* (skripsi). Semarang: Universitas Diponegoro, H. 1-2. 2010.
- Mayes P A. *Biokimia. Spesies Oksigen Reaktif Dapat (ROS) dapat Memicu Penyakit. Dalam: Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. Biokimia Harper. Edisi 25. Alih bahasa : Hartono A. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC: 619-20. , 2003:*
- McDonnell, G. & A.D. Russell. Antiseptic and disinfectants: Activity, action, and resistance. *Clinical Microbiology Review* **12**(1): 147—179. 1999.
- Moon JY, Yim EY, Song G, Lee NH, Hyun CG. Screening of elastase and tyrosinase inhibitory activity from Jeju Island plants. *EurAsia J. BioSci.* 2010 Dec 1;4:41.
- Noverita. Dinah Fitria, Ernawati Sinaga. *Isolasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Jamur Endofit Dari Daun Dan Rimpang Zingiber ottensii*. Val. *Jurnal Farmasi Indonesia*: Vol. 4 No. 4 (171-176), 2009.
- Nugroho BA, Puwaningsih E. *Pengaruh Diet Ekstrak Rumput Laut (Eucheuma sp.) terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih (attus norvegicus) Hiperglikemik*. *Media Medika Indonesia* Vol.39 No. 3: 154 – 60, 2004.
- Nugroho BA, Puwaningsih E. *Perbedaan Diet Ekstrak Rumput Laut (Eucheuma sp.) dan Insulin dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Tikus Putih (Rattus norvegicus) Hiperglikemik*. *Media Medika Indonesia* Vol. 41 No. 1: 23-30, 2006.


- Pelczar M, Chan ECS. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Hardioetomo R, dkk. Jakarta: UI-Pres. H. 189-198, 1986.
- Petrini, O., Sieber, T.N., Toti, L., Viret, D. Ecology Metabolite Production and Substrate Utilization in Endophytic Fungi. *Natural Toxin* 1, 185–196, 1992.
- Pitt, J.I., Hocking, A.D. *Fungi and Food Spoilage, Food Science and Technology*. Australia: Academic Press, 1985.
- Pringgenies D, Rudiana E, Pujiastuti MJ. *Measurement of Iodium Content of Some Seaweed from Jepara Coastal Waters*. UNDIP Newsletter Vol VII No.12: 6, 2005.
- Poncomulyo T, Maryani H, Kristiani L. *Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut cetakan ke- 1*. Jakarta : Agro Media Pustaka, 2006.
- Prakash, A. *Antioxidant Activity*. Medallion Laboratories: Analithycal Progres, Vol 19 No : 2. 1 –4. 2001.
- Rahardjo, M., & Hernani. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2005.
- Rahman A. *Teknologi Fermentasi*. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, H 149-150, 162-168. 1990.
- Rahmawaty. *Potensi Aspergillus niger dan Penicillium spp. Sebagai Endosymbion Pelarut Fosfat Pada Akar Serealia*. [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Rajangjulu, S.K., Hyung, J.K., Byung, K.H. *Taxol Producing Fungal Endophyte, Pestalotiopsis species, Isolated from Taxus cuspidata*. J.of Bioscience and Bioengineering: Vol. 111 (6), 731. 2011.
- Rao, S. Sterilization and disinfection. Juni 2008: 10 hlm. [www.microrao.com/micronotes/sterilization.pdf](http://www.microrao.com/micronotes/sterilization.pdf). 19 Mei 2017. pk. 07.56. 2008.
- Saeed N., Khan MR., Shabbir M., Antioxidant activity, total phenolic and total flavonoid contents of whole plant extracts *Torilis leptophylla* L. BMC Complement Altern Med., 12: 1-12, (2012).
- Saha, A., Mandal, P., Dasgupta, S., Saha, D. Influence of Culture Media and Environmental Factors on Mycelia Growth and Sporulation of *Lasiopodia*



- theobromae(Pat.) Griffon and Maubl. *Journal of Enviromental Biology*, 29(3):407-410. 2008.
- Samson, R.A., Hoekstra, A.S., Van Oorschot, C.A. *Introduction to Food-Borne Fungi*, Second. ed. Institute of The Royal Netherlands, Netherlands, 1984.
- Samson, R.A., E.S. Hoekstra, & J.C. Frisvad. *Introduction to food and airborne fungi*. Centraalbureau Voor Schimmelcultures, Utrecht: 383 hlm. 2004.
- Sette L.D, ZPassarini M.R. Delarmerina C. Salati, F. Duarte M.C.T dalam D.Prabavathy, Phoebe M., G.L.  $\alpha$ -Amylase and  $\alpha$ -Glucoidase Inhibitory Activity of Ethyl Acetate Extract of *Aspergillus tamari* Isolated from *Justicia beddomei*. Molecular characterisation and antimicrobial activity of endophytic fungi from coffee plants. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*, 2017; 8(2): (B) 337-341.
- Schulz, B., C. Boyle, S. Draeger, A.K. Römmert, and K. Krohn. *Endophytic fungi: a source of novel biologically active secon-dary metabolites*. *J. Mycological Research*, Vol. 106(9): 996-1004. 2002.
- Shan, Tijing, *et al.* dalam D.Prabavathy, Phoebe M., G.L.  $\alpha$ -Amylase and  $\alpha$ -Glucoidase Inhibitory Activity of Ethyl Acetate Extract of *Aspergillus tamari* Isolated from *Justicia beddomei*. Antibacterial activity of the endophytic fungi from medicinal herb, *Macleaya cordata*. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*, 2017; 8(2): (B) 337-341.
- Sharma, G., Pandey, R.R. Influence of Culture Media on Growth, Colony Character and Sporulation of Fungi Isolated From Decaying Vegetable Wastes. *Journal of Yeast and Fungal Research*, 1 (8): 157-164. 2010.
- Shimada K, Fujikawa K, Yahara K and Nakamura T, Antioxidative properties of xanthan on the autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. *J Agri Food Chem*, 1992 40 (6):945-948.
- Shivarsad, HN., S. Molan., M.D. Kharya. *In-Vitro Models for Antioxidant Activity Evaluation*. 2005.
- Simarmata R, Lakatompessy S, Sukiman H. *Isolasi Mikroba Endofit dari tanaman obat sambung nyawa (Gynura procumbens) dan Analisis Potensinya sebagai Antimikroba*. *Berkala Penelitian Hayati* 13:85-90. 2007.
- Srikandi F. *Mikrobiologi Pangan 1*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Srikandace, Yoice. *Potensi Polisakarida Kapang Endofit Aspergillus sp. dari terumbu karang Seroja kol sebagai Sumber Antioksidan*. Bandung: SNIPS, 2015.

- Strobel, G. dan B. Daisy. *Bioprospecting for microbial endophytes and their natural products*. Microbiology and molecular Biology Review: Vol. 67(4), 491-502. 2003.
- Suyoto. *Pengaruh inokulasi cendawan endofit akar Aspergillus niger dan perlakuan fosfat terhadap pertumbuhan tanaman padi gogo (Oryza sativa) dan jagung (Zea mays)*. Bogor: IPB, 2009.
- Tan, R.X. and W.X. Zou. *Endophytes: a rich source of functional metabolites*. J. of Natural Products Rep: Vol. 18: 448-459. 2001
- Tarman, K. Biological and chemical investigations of Indonesian marine-derived fungi and their secondary metabolites [disertasi]. *Germany: Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald*. 178p. 2011.
- Underwood I.A. *Analisis Kimia Kuantitatif*. Edisi VI. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Valera, M.C., K. da Silva, L.E. Maekawa, C. Carvalho, C.Y. Koga-Ito, C.H. Camargo, & R.S. Lima. Antimicrobial activity of sodium hypochlorite associated with intracanal medication for *Candida albicans* and *Enterococcus faecalis* inoculated in root canals. *J. Appl. Oral Sci.* **17**(6): 555--559. 2009.
- Webster, J. & R.W.S. Weber. *Introduction to fungi*. 3rd ed. Cambridge University Press, New York: xix + 841 hlm. 2007.
- Winarno FG, Fardiaz D, Fardiaz S. *Ekstraksi, Kromatografi, dan Elektroforesis*. Bogor. Institut Pertanian Bogor, 1973.
- Winarno FG. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Winarsi, H. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas: Potensi dan Aplikasinya dalam Kesehatan*. Jakarta: Konsius, 2007.
- Winarti, Sri. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta, 2010.
- Y. Chen, W. Mao, H. Tao, W. Zhu, X. Qi, H. Li, C. Zhao, Y. Yang, Y. Hou, C. Wang and N. Li, "Structural characterization and antioxidant properties of an exopolysaccharide produced by the mangrove endophytic fungus *Aspergillus* spY16". *Bioresource Technology* 102(7), 2011.



**Lampiran 1. Skema Penelitian**

## Lampiran 2. Daftar Tabel

**Tabel IV.A.3** Bobot Ekstrak Hasil Fermentasi

Sampel	Berat Pial (g)	Berat Ekstrak (g) + Berat Pial (g)	Berat Ekstrak (g)
PDB ( <i>Potato Dextrosa Broth</i> )	16,693	16,758	0,065

**Tabel IV.A.4** Hasil Uji Aktivitas Antioksidan

1. Sampel Kapang Endofit *Aspergillus* sp. makroalga *Eucheuma* sp.

Konsentrasi Sampel (bpj)	Absorbansi (bpj)	% Hambatan
5	0,389	12,3
10	0,332	25,2
25	0,265	40,3
50	0,069	84,4
100	0,065	95,4

2. Kontrol Positif (Vitamin C)

Konsentrasi Sampel (bpj)	Absorbansi (bpj)	% Hambatan
3	0,245	44,8
6	0,170	61,7
9	0,059	86,7
12	0,028	93,6
15	0,021	95,2

### Lampiran 3. Analisis Data Uji Aktivitas Antioksidan

#### 1. % Hambatan untuk Uji Antioksidan pada Skrining menggunakan DPPH

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{\text{Serapan Blangko} - \text{Serapan Sampel}}{\text{Serapan Blangko}} \times 100 \%$$

Serapan blangko = 0,444 dan 0,340

##### a. Medium *Potato Dextrose Broth* (PDB)

###### 1) PDB 5

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,389}{0,444} \times 100 \% = 12,3 \%$$

###### 2) PDB 10

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,332}{0,444} \times 100 \% = 25,2 \%$$

###### 3) PDB 25

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,265}{0,444} \times 100 \% = 40,3 \%$$

###### 4) PDB 50

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,069}{0,444} \times 100 \% = 84,4 \%$$

###### 5) PDB 100

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,065}{0,444} \times 100 \% = 95,4 \%$$

b. Vitamin C

1) Vitamin C 3

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,245}{0,444} \times 100 \% = 44,8 \%$$

2) Vitamin C 6

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,170}{0,444} \times 100 \% = 61,7 \%$$

3) Vitamin C 9

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,059}{0,444} \times 100 \% = 86,7 \%$$

4) Vitamin C 12

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,028}{0,444} \times 100 \% = 93,6 \%$$

5) Vitamin C 15

$$\% \text{ Hambatan} = \frac{0,444 - 0,021}{0,444} \times 100 \% = 95,2 \%$$

2. Perhitungan Konsentrasi (bpj)

Dengan konsentrasi (bpj) sebagai sumbu x dan % hambatan sebagai y. Maka diperoleh persamaan garis :

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{50 - b}{a}$$

a. PDB

$$R^2 = 0,792$$

$$y = 0,7738x + 20,096$$

$$50 = 0,7738x + 20,096$$

$$x = \frac{50 - 20,096}{0,7738} = 38,64 \text{ bpj}$$


b. Vitamin C

$$R^2 = 0,8939$$

$$y = 4233x + 36.59$$


$$50 = 4.4233x + 36.59$$

$$x = \frac{50 - 36,59}{4,4233} = 3,03 \text{ bpj}$$




**Lampiran 4.** Daftar Ilustrasi**Tabel IV.A.4** Hasil Uji Aktivitas Antioksidan

1. Sampel Kapang Endofit *Aspergillus* sp. makroalga *Eucheuma* sp.



2. Kontrol Positif (Vitamin C)



### Lampiran 5. Perhitungan Komposisi Pembuatan Media Pertumbuhan

#### 1. Pembuatan media PDA (*Potato Dextrose Agar*)

Diketahui untuk pembuatan media PDA 1 L dengan komposisi sebagai berikut:

Kentang = 200 g

Dextrose = 15 g

Agar = 15 g

Aquadest = 1000 ml

Jadi untuk pembuatan media PDA dengan 150 ml, maka dibutuhkan:

$$\text{Kentang} = \frac{200}{1000} \times 150 = 30 \text{ g}$$

$$\text{Dextrose} = \frac{15}{1000} \times 150 = 2,25 \text{ g}$$

$$\text{Agar} = \frac{15}{1000} \times 150 = 2,25 \text{ g}$$

#### 2. Pembuatan media PDB (*Potato Dextrose Broth*)

Diketahui untuk pembuatan media PDB 1 L dengan komposisi sebagai berikut:

$$\text{Kentang} = 200 \text{ g}$$

$$\text{Dextrose} = 24 \text{ g}$$

$$\text{CaCO}_3 = 5 \text{ g}$$

$$\text{Aquadest} = 1000 \text{ ml}$$

Jadi untuk pembuatan media PDB dengan 200 ml, maka dibutuhkan:

$$\text{Kentang} = \frac{200}{1000} \times 200 = 40 \text{ g}$$

$$\text{Dextrose} = \frac{24}{1000} \times 200 = 4,8 \text{ g}$$

$$\text{CaCO}_3 = \frac{5}{1000} \times 200 = 1 \text{ g}$$



### Lampiran 6. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan Uji

Dik: 10 mg (10 x 1000) = 10.000  $\mu$ L

10 ml metanol

$$\text{bpj} = \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{10000 \mu\text{m}}{10 \text{ ml}} = 1000 \text{ bpj}$$

untuk 5 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 5 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{25 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,025 \text{ mL} = 25 \mu\text{m}$$

untuk 10 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 10 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,05 \text{ mL} = 50 \mu\text{m}$$

untuk 25 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 25 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{125 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,125 \text{ mL} = 125 \mu\text{m}$$

untuk 50 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 50 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{250 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,25 \text{ mL} = 250 \mu\text{m}$$

untuk 100 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 100 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{500 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,5 \text{ mL} = 500 \mu\text{m}$$

### Lampiran 7. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan Vitamin C

Dik: 10 mg (10 x 1000) = 10.000  $\mu$ L

10 ml metanol

$$\text{bpj} = \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{10000 \mu\text{m}}{10 \text{ ml}} = 1000 \text{ bpj}$$

untuk 3 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 3 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{15 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,015 \text{ mL} = 15 \mu\text{m}$$

untuk 6 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 6 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{30 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,03 \text{ mL} = 30 \mu\text{m}$$

untuk 9 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 9 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{45 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,045 \text{ mL} = 45 \mu\text{m}$$

untuk 12 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 12 \text{ bpj}$$

$$V_1 = \frac{60 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,06 \text{ mL} = 60 \mu\text{m}$$


untuk 15 bpj  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ bpj} = 5 \text{ ml} \times 15 \text{ bpj}$$


$$V_1 = \frac{75 \text{ bpj.ml}}{1000 \text{ bpj}} = 0,075 \text{ mL} = 75 \mu\text{m}$$

**Lampiran 8.** Skema Pengukuran Absorbansi Peredaman Radikal Bebas Menggunakan Spektrofotometri

1. Untuk Uji Ekstrak



## 2. Untuk Uji Vitamin C



**Lampiran 8.** Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Larutan DPPH 0,4 mM

Diketahui:

$$\text{Larutan DPPH} = 0,4 \text{ mM} = 0,0004 \text{ mol/L}$$

$$\text{Mr} = 394,33 \text{ g/mol}$$

$$\text{Volume} = 50 \text{ mL} = 0,05 \text{ L}$$

$$\text{Massa} = \text{gram?}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} 0,4 \text{ mM} &= \frac{\text{Massa}}{\text{Mr} \times V} \\ 0,0004 \text{ mol/L} &= \frac{\text{Massa}}{394,33 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 0,05 \text{ L}} \\ &= 0,00789 \text{ g} = 7,89 \text{ mg} \end{aligned}$$

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Pengambilan Sampel



### 2. Isolasi



### 3. Identifikasi



### 4. Ekstraksi



### 5. Uji Aktivitas Antioksidan





## BIOGRAFI

Nama saya Inna Shintia, biasanya dipanggil dengan sebutan Inna. Saya dilahirkan di Pinrang pada tanggal 12 Juni 1995. Saya anak tunggal dari pasangan keluarga Akil Naing dan Hj.Nurlela.

Saya mulai menempuh pendidikan dari bangku sekolah dasar di SD Inpres Labolong Selatan, Pinrang, Setelah tamat dari sekolah dasar saya melanjutkan ke SMPN 3, Mattiro Sompe, Pinrang. Kemudian saya melanjutkan lagi ke SMAN 3, Mattiro Sompe. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Universitas Islam Negeri Makassar dengan mengambil Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi.