


**GAMBARAN PEMBERIAN AUDITORY MUROTTAL TERHADAP
PENURUNAN RASA NYERI IBU INPARTU KALA I FASE AKTIF DI
RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI KABUPATEN GOWA
SULAWESI SELATAN TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
70400011070
MAKASSAR**

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Agustus 2016 M

24 Dzulkaidah 1437 H

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ULFA DIANA

70400011070

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : ULFA DIANA
NIM : 70400011070
JUDUL : GAMBARAN PEMBERIAN AUDITORY MUROTTAL
TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI IBU
INPARTU KALA I FASE AKTIF DI RUMAH
BERSALIN MATTIRO BAJI KAB. GOWA TAHUN
2015

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Samata, 27 Agustus 2016 M

MAKASSAR

24 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing



dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M. kes

NIP: 19800701 200604 2 005

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Gambaran Pemberian Auditory Murottal Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016” yang disusun oleh **Ulfa Diana**, NIM: 70400011070, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah pada hari Selasa, 30 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 27 Dzulkaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 03 Agustus 2017 M

10 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S.KM., M.Keb (.....)

Pembimbing : dr.Syatirah Jalaluddin, Sp.A, M.Kes (.....)

Penguji 1 : Firdayanti, S.SiT, M.Keb (.....)

Penguji 2 : Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

ap Dekan

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalaamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, pemelihara seluruh jagad raya, atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Adapun penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan, dengan judul Karya Tulis Ilmiah yaitu **“Gambaran Pemberian Auditory Murottal Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016”**.

Terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda almarhumah Amusriani Usman dan Ayahanda Drs. Mustari Salta, yang telah begitu sabar dan gigih dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga dewasa. Terima kasih atas cinta, doa, dan motivasi yang tidak terhingga. Terutama untuk Ayahanda yang begitu sabar akan terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini tanpa memaksakan atau menekan mental penulis yang sudah cukup terjatuh. Sungguh, Ananda tidak akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan kalian. Terima kasih pula kepada keluarga yang sudah penulis anggap orang tua sendiri,

yaitu Hj.Ima (Tante Ima), Bunda Dra.Rosdiana Fata, Tante Ibu Jamalia,BA yang memiliki hati yang lembut serta memberikan motivasi yang tidak pernah padam menghadapi anak, cucu dan ponakannya dalam menyelesaikan tugas akhirnya ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih teramat kepada Tante Tuti Pratiwi Usman sekeluarga, Kakak Yunita Kartawati, Ahmad Mustari, Rizal Mustari, Dermawan Mustari dan adik-adik tercinta Nurfadillah Mustari dan Salman Mustari yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis selama menyelesaikan *study*-nya. Terima kasih.

Melalui kesempatan ini pula, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb. selaku ketua prodi kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh Ahli Madya Kebidanan.

4. Ibu dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb. selaku Penguji I, yang dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah telah banyak memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Penguji II, yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan, dan nasihat selama penulis menuntut ilmu di prodi kebidanan UIN Alauddin Makassar.
8. Sahabat seperjuangan yang tak pernah meninggalkan saat sedang jatuh-jatuhnya dan paling cerewet dalam mengingatkan tugas akhir, Indian Arisnawati, Sri Wahyuni, Safira Az-zahrah Al-hadar, Kak Atira, dan Auliah Fauzani Anwar. Terima kasih banyak.
9. Wanita-wanita shalihah berhati baik penghuni Asrama FM, saudara seperantauan, sesusah senang bersama, Cici Namira Basri, S.Psi, Herni Baharuddin, Nurzarina

Basri, Nani Hasir Tanriale, Nurul Iqraini Darussalam, S.Si, Kak Nurmadinah, S.Pd, M.Pd, yang tidak pernah jemu memberikan motivasi maupun bantuan tenaga dan pikiran kepada penulis hingga titik terakhir. Terima kasih atas kehidupan yang penuh cinta di asrama.

10. Teman dunia maya yang terasa nyata. Afriyan Arya Saputra yang selalu meneror pertanyaan tentang tugas akhir; Cherry Nanako dan Bang Roni Efriza yang menemani di saat penulis butuh ruang menenangkan diri dan refleksi pikiran; Kak Bee Benz yang sebagai kakak begitu sabar mendengar unek-unek dan ocehan penulis; Kak Yul Yati, Kak Riris Nue, Andi Wi, Kak Reza Kurniawan, Wawan Gustiawan dan seluruh member Kafe Curcol maupun KBM yang memberikan masukan dan keceriaan pada proses penyelesaian tugas akhir penulis. Terima kasih, merupakan anugrah terbesar bisa kenal dengan kalian semua.
11. Seluruh adik-adik Kebidanan angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar yang menemani penulis selama kurang lebih enam bulan dalam jatuh bangun perjuangan mengejar Ahli Madya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya.

Penulis sangat sadar bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan dalam penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga karya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslhatan bersama, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Samata, 03 Agustus 2017 M

10 Dzulhijjah 1438 H

Penulis,

Ulfa Diana



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	4
3. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan umum tentang Persalinan.....	6
1. Pengertian Persalinan.....	6

2. Klasifikasi atau Jenis Persalinan	7
B. Tinjauan Umum tentang Nyeri.....	8
1. Definisi Nyeri.....	8
2. Fisiologi Nyeri	11
3. Teori Nyeri	13
4. Klasifikasi Nyeri	15
5. Pengkajian Nyeri.....	17
6. Intensitas Nyeri	19
7. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri	21
C. Tinjauan Umum tentang Nyeri Persalinan	24
1. Definisi Nyeri Persalinan	24
2. Penyebab Nyeri Persalinan	25
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan	26
4. Jenis Nyeri Persalinan.....	29
5. Fisiologi Nyeri Persalinan.....	29
6. Lama Nyeri Persalinan.....	32
7. Akibat Tidak Mengatasi Nyeri Persalinan	32
8. Managemen Nyeri.....	33
D. Tinjauan Umum tentang Auditory Murottal	39
1. Pengertian Murotttal.....	39
2. Manfaat Mendengarkan Al-Qur'an.....	41
3. Penurunan Nyeri degan Mendengarkan Al-Qur'an	47
E. Kerangka konsep.....	48

1. Dasar Pemikiran Variabel	49
2. Skema Kerangka Konsep	50
3. Definisi Operasional, Variabel dan Skala Penelitian	50
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Populasi	52
D. Sampel.....	53
1. Kriteria Inklusi	53
2. Kriteria Eksklusi.....	54
E. Besar Sampel.....	54
F. Metode Pengumpulan Data.....	55
G. Alur Penelitian	56
H. Pengolahan dan Analisis Data.....	56
1. Pengolahan Data.....	56
2. Analisis Data	57
I. Penyajian Data	58
J. Etika Penelitian	58
1. Informed Consent.....	58
2. Tanpa Nama (Anonymity)	59
3. Kerahasiaan (Confidentiality)	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian	60

B. Pembahasan.....	63
BAB V. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69-70

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Mekanisme Terjadinya Nyeri.....	13
Gambar 2.2 Skala Deskriptif Verbal.....	20
Gambar 2.3. Skala Numerik.....	20
Gambar 2.4. Skala Analog Visual.....	21
Gambar 2. 5. Skema Kerangka Konsep.....	50
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 4.1. Hasil Penelitian <i>Pre-test, Post-test</i>	60
Gambar 4.2 Data Dasar (Demografi) Responden	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Surat Permohonan Pengambilan Data Awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa
- Lampiran III : Surat Rekomendasi Pengambilan Data Awal dari Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Rumah Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa.
- Lampiran IV : Surat izin/rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Rumah Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa.
- Lampiran V : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.

ABSTRAK

Jurusan Kebidanan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Karya Tulis Ilmiah, Agustus 2016

Nama : Ulfa Diana

NIM : 70400011070

Judul : Gambaran Pemberian Auditory Murottal Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu Kala I fase Aktif di Rumah Bersalin mattiro Baji Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2016

Nyeri persalinan yang berat dan lama dapat mempengaruhi ventilasi, sirkulasi metabolisme dan aktivitas uterus. Nyeri saat persalinan bisa menyebabkan tekanan darah meningkat dan konsentrasi ibu selama persalinan menjadi terganggu, tidak jarang kehamilan membawa “stress” atau rasa khawatir/cemas yang membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun pada janin yang dikandungnya. Misalnya mengakibatkan kecacatan jasmani dan kemunduran kepandaian serta mental emosional nyeri dan rasa sakit yang berlebihan akan menimbulkan rasa cemas. Rasa cemas yang berlebihan juga menambah nyeri (Mander, 2004).

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh auditory murottal terhadap rasa nyeri Ibu Inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini dilaksanakan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa tahun 2016, yang dilakukan sejak bulan April hingga Juni 2016 dengan populasi sebanyak 9 responden dan jumlah sampel sebanyak 5 responden.

Adapun hasil penelitian adalah terdapat 80% responden (4 dari 5 orang) mengalami penurunan yang bervariasi yang dimulai dari 4 hingga 9 poin, sedangkan 1 responden mengalami peningkatan skala atau intensitas nyeri sebanyak 7 poin. Terdapat tingkat nyeri ibu inpartu kala I fase aktif sebelum diberikan *auditory murottal* berkisar antara 45-77 poin. Terdapat penurunan tingkat rasa nyeri persalinan setelah pemberian *auditory murottal* pada ibu inpartu kala I fase aktif pada 80% responden, yaitu sebanyak 4 orang. Terdapat penurunan tingkat rasa nyeri sebanyak 4-9 poin pada 80% responden.

Referensi : 39 (2002-2015)

Kata kunci : nyeri persalinan, *auditory murottal*

ABSTRACT

**Departement of Midwifery
Alauddin State Islamic University of Makassar
Scientific Writings, August 2016**

Name : Ulfa Diana

NIM : 70400011070

Title : The Overview of Auditory Murottal in Decreasing the Pain Stage I the Active Phase of Inpartu Motherin the Maternity Hospital Mattiro Baji Gowa Regency, South Sulawesi 2016

The pain of heavy and long labor can affect the ventilation, circulation, metabolism and uterine activity. Pain during childbirth can lead to increased blood pressure and distract the mother during labor and delivery. It is not uncommon for pregnancy to bring “stress” or a sense of worry/anxiety that brings impact and influence the physical and psychic, both for the mother and her fetus. For example resulted in disability physical and mental setbacks as well as emotional pain and the pain that will cause excessive anxiety. A sense of anxiety also add to the pain (Mander, 2004).

The general objective of this study is to describe the influence of auditory murottal against the pain of the stage I the active phase of inpartu mother in the Maternity Hospital Mattiro Baji in Gowa Regency 2016.

The type of research used is descriptive research, which was conducted in the Maternity Hospital Mattiro Baji Gowa Regency 2016, which is carried out since the month of April to June 2016 with a population of as many as 9 respondents and the total sample of 5 respondents.

As for the results of the study is that there are 80% of the respondents (4 out of 5 people) decline in pain varies severity from 4 up to 9 points, while 1 of the respondents experienced an increase in the scale or intensity of pain as much as 7 points. There is a level of pain at the stage I the active phase of inpartu mother before a given auditory murottal ranged from 45 to 77 points. There is a decrease in the level of the pain of labor after the administration of the auditory murottal on stage I the active phase of inpartu mother in 80% of the respondents, i.e. as much as 4 people. There is a decrease in the level of pain as much as 4-9 points in 80% of the respondents. There was tendency in pain severity to decrease during this study, but lack of samples encourage further research.

Keywords : labor pain, auditory murottal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun kedalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2010).

Rasa tidak nyaman dan nyeri dalam persalinan adalah unik. Oleh karenanya, pengalaman persalinan mempunyai suatu kekuatan tinggi terhadap perolehan pereda nyeri yang memuaskan (Maryunani, 2010).

Nyeri persalinan yang berat dan lama dapat mempengaruhi ventilasi, sirkulasi metabolisme dan aktivitas uterus. Nyeri saat persalinan bisa menyebabkan tekanan darah meningkat dan konsentrasi ibu selama persalinan menjadi terganggu, tidak jarang kehamilan membawa “stress” atau rasa khawatir/cemas yang membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun pada janin yang dikandungnya. Misalnya mengakibatkan kecacatan jasmani dan kemunduran kepandaian serta mental emosional nyeri dan rasa sakit yang berlebihan akan

menimbulkan rasa cemas. Rasa cemas yang berlebihan juga menambah nyeri (Mander, 2004).

Payne dan Martin (2002) menyatakan apabila nyeri tidak cepat teratasi maka dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, karena nyeri menyebabkan pernapasan dan denyut jantung ibu akan meningkat yang menyebabkan aliran darah dan oksigen ke plasenta terganggu (Husna, 2010).

Terapi musik religi dipercaya dapat menenangkan fisik, psikis dan spiritual yang pada akhirnya dapat menurunkan kala nyeri persalinan. Sri Karyati dan Noor Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul “*Aplikasi Terapi Musik Religi sebagai Upaya Menurunkan Skala Nyeri Persalinan di Kab.Kudus Tahun 2015*” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan skala nyeri antara kelompok yang mendapat terapi musik religi dengan yang tidak mendapatkannya dengan nilai $p=0,00$ (Karyati dan Hidayah, 2015).

Bacaan ayat-ayat al-Qur’an dapat menenangkan hati, sebagaimana diterangkan dalam surah ar-ra’d ayat 28, yaitu :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.” (Qs Ar-Ra’d/13: 28)

Ayat di atas kemudian diperkuat oleh hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْهِمْ وَنَزَلَتْ وَغَشِيَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَفَّتُهُمْ إِلَّا وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ يَذْكُرُونَ قَوْمٌ يَفْعُدُ لَا

عِنْدَهُ فِيمَنْ اللَّهُ وَذَكَرَهُمُ السَّكِينَةُ

Terjemahnya:

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah (masjid) Allah, mereka membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya” (HR. Muslim, no.2700).

Dalam Remolda (2009), salah-satu teknik distraksi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan adalah terapi murottal (mendengarkan bacaan ayat-ayat suci al-Qur’an). Hasil penelitian yang telah dilakukan dr. Al-Qadhi, direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika Serikat tentang pengaruh mendengarkan ayat suci al-Qur’an pada manusia terhadap perspektif fisiologis dan psikologis. Berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur’an dapat merasakan perubahan fisiologis dan psikologis yang sangat besar. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan 97% bahwa mendengarkan ayat suci al-Qur’an memiliki pengaruh mendatangkan ketenangan dan menurunkan ketegangan urat syaraf reflektif. (Handayani dkk, 2014).

Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa merupakan salah-satu rumah bersalin yang ada di kabupaten gowa dengan jumlah persalinan yang cukup banyak, yakni pada tahun 2014 tercatat jumlah persalinan sebanyak 707 orang dan dari data yang diperoleh sejak bulan Juli sampai dengan Agustus di tahun 2015 tercatat

jumlah persalinan sebanyak 63 orang, 60 orang dan 63 orang.. Dengan melihat jumlah persalinan ditambah dengan para bidan yang berkompeten di rumah bersalin tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Pemberian Auditory Murottal Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah “Bagaimana gambaran pemberian auditory murottal terhadap penurunan rasa nyeri Ibu inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh auditory murottal terhadap rasa nyeri Ibu Inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat nyeri Ibu Inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016 sebelum diberikan auditory murottal.
- b. Untuk mengetahui tingkat nyeri Ibu Inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016 setelah diberikan auditory murottal.

- c. Untuk melihat tingkat perubahan rasa nyeri dengan menggunakan auditory murottal pada Ibu Inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan petugas kesehatan tentang pengaruh positif mendengarkan murottal (ayat al-Qur'an) dalam mengurangi rasa nyeri Ibu inpartu kala I fase aktif.
2. Merupakan pengalaman sangat berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang gambaran pemberian auditory murottal terhadap penurunan rasa nyeri ibu inpartu kala I fase aktif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi di Perpustakaan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai tambahan dalam memberikan pengetahuan dan informasi dari hasil peneliti yang dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses fisiologis atau proses alamiah, namun apabila tidak dikelola secara baik akan berubah menjadi patologi. Dalam persalinan ada dua faktor penting yang terkait dengan Ibu, yaitu resiko kehamilan dan perjalanan/proses persalinan (Saleha, 2009).

Persalinan merupakan prseses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir (Lailiyana, dkk, 2012).

Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung tidak lebih dari 18 jam tanpa komplikasi baik bagi ibu maupun janin (Maryunani, 2010)

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun kedalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung

dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2010).

Wiknjosastro (2008) mengatakan bahwa persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yang mampu hidup, dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Asrinah dkk, 2010).

2. Klasifikasi atau Jenis Persalinan

a. Menurut cara persalinan :

- 1) Partus biasa (normal) disebut juga partus spontan adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala (LBK) dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam.
- 2) Partus Buatan (abnormal) adalah persalinan yang berlangsung dengan bantuan dari tenaga luar.
- 3) Persalinan anjuran adalah bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan (Asrinah dkk, 2010).

b. Menurut usia kehamilan dan berat janin yang dilahirkan :

- 1) *Abortus* (keguguran) adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram (Prawirohardjo, 2010)
- 2) *Partus prematurus* atau *preterm*: persalinan dengan usia kehamilan 28-36 minggu dengan berat janin kurang dari 2.499 gram.

- 3) *Partus Maturus* atau Aterm (cukup bulan): adalah persalinan dengan usia kehamilan 37-42 minggu dan berat janin diatas 2500 gram.
- 4) *Partus Postmaturus (serotinus)* adalah persalinan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu atau 2 minggu lebih dari waktu partus yang ditaksir (Asrinah dkk, 2010).

B. Tinjauan Umum tentang Nyeri

1. Definisi Nyeri

Secara umum nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007).

a. Definisi secara Medis

Mouncaste mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensori yang dibawa oleh stimulus sebagai akibat adanya ancaman atau kerusakan jaringan, dapat disimpulkan bahwa nyeri adalah ketika seseorang terluka (secara fisik). (Prasetyo, 2010)

International Association for Study of Pain (1979), mendefinisikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang bersifat actual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi kerusakan. (Prasetyo, 2010)

Arthur C. Curton (1983) mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak, dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri. (Prasetyo, 2010).

Ketiga definisi di atas merupakan definisi yang diterima sebagai definisi medis, meskipun begitu definisi di atas hanya membatasi nyeri sebagai bentuk dari kerusakan jaringan tubuh, padahal tidak setiap nyeri mengidentifikasi adanya kerusakan jaringan tubuh, sebagai contoh nyeri psikogenik (misal: perasaan seseorang ketika berduka ditinggalkan anggota keluarganya) atau nyeri yang dialami seseorang saat sakit kepala (Prasetyo, 2010).

b. Definisi secara Psikologis

Sternbach mengartikan nyeri sebagai sesuatu yang abstrak, dimana nyeri terhadap padanya :

- 1) *Personality*, dimana sensasi terhadap nyeri yang dirasakan individu bersifat pribadi (subjektif), artinya antara individu satu dengan yang lainnya mengalami sensasi nyeri yang berbeda.
- 2) Adanya stimulus yang merugikan sebagai peringatan terhadap kerusakan jaringan.
- 3) Pola respon dari individu terhadap nyeri, sebagai alat proteksi untuk melindungi dirinya dari kerugian yang ditimbulkan oleh nyeri.

McMahon (1994) menemukan empat atribut pasti untuk pengalaman

nyeri, yaitu nyeri bersifat individu, tidak menyenangkan, merupakan suatu kekuatan yang mendominasi dan bersifat tidak berkesudahan (Prasetyo, 2010).

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya (Hidayat, 2008).

Nyeri persalinan adalah nyeri kontraksi uterus yang dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas sistem syaraf simpatis. Nyeri yang hebat pada persalinan dapat menyebabkan perubahan-perubahan fisiologi tubuh seperti; tekanan darah menjadi naik, denyut jantung meningkat, laju pernafasan meningkat, dan apabila tidak segera diatasi maka akan meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut dan stress (Andriana, 2013).

Peningkatan konsumsi glukosa tubuh pada ibu bersalin yang mengalami stres menyebabkan kelelahan dan sekresi katekolamin yang menghambat kontraksi uterus, hal tersebut menyebabkan persalinan lama yang akhirnya menyebabkan cemas pada ibu, peningkatan nyeri dan stres berkepanjangan (Bobak, 2005). Rasa takut menyebabkan pembuluh-pembuluh arteri yang mengarah ke rahim berkontraksi dan menegang, sehingga menimbulkan rasa sakit (nyeri) (Andriana, 2013).

Kalau tanpa adanya rasa takut, otot-otot melemas dan melentur, serviks (leher rahim) dapat menipis serta membuka secara alami sewaktu tubuh

berdenyut secara berirama dan mendorong bayi dengan mudah sehingga membuat persalinan berlangsung secara lancar relatif lebih cepat dengan keluhan nyeri yang sangat minimal. Dengan terbiasanya ibu melakukan relaksasi, jalan lahir untuk janin akan lebih mudah terbuka sehingga ibu tidak akan terlalu kelelahan saat melahirkan. Jadi dengan latihan relaksasi yang rutin, ibu akan terbiasa pada kondisi ini dan akan sangat terbantu dalam proses persalinannya (Andriana, 2013).


2. Fisiologi Nyeri

Menurut Barbara C Long (1989), munculnya nyeri sangat berkaitan erat dengan reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nociceptor, merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas yang memiliki atau bahkan myelin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada organ visceral, persendian, dinding arteri, hati dan kandung empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulasi atau rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa zat kimiawi seperti histamine, bradikinin, prostaglandin dan macam-macam asam yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Stimulasi yang lain dapat berupa termal, listrik atau mekanis (Maryunani, 2010).

Selanjutnya stimulasi yang diterima oleh respon tersebut ditransmisikan berupa impuls-impuls nyeri ke sumsum tulang belakang oleh dua jenis serabut yang bermielin rapat atau serabut A (delta) dan serabut lamban (serabut C). impuls-

impuls yang ditransmisikan oleh serabut delta A mempunyai sifat inhibitor yang ditransmisikan ke serabut C. Serabut-serabut aferen masuk ke spinal melalui akar dorsal (*dorsal root*) serta sinaps pada dorsal horn, dorsal horn sendiri terdiri atas beberapa lapisan atau laminae yang saling bertautan. Diantara lapisan dua dan tiga membentuk *substansia gelatinosa* yang merupakan saluran utama impuls. Kemudian impuls nyeri menyebrang sumsum tulang belakang pada *interneuron* dan bersambung ke jalur *spinal asendens* yang paling utama, yaitu jalur *spinothalamic tract* (SST) atau jalur *spinothalamus* dan *spinoreticular tract* (SRT) yang membawa informasi mengenai sifat dan lokasi nyeri. Dari proses transmisi terdapat dua jalur mekanisme terdapat dua jalur terjadinya nyeri yaitu jalur opiate dan jalur nonopiate, jalur opiate ditandai oleh pertemuan reseptor pada otak yang terdiri atas jalur sinapsal desenden dari thalamus yang melalui otak tengah dan medulla ke tanduk dorsal sumsum tulang belakang yang berkonduksi dengan nociceptor impuls supresif. Serotonin merupakan neurotransmitter dalam impuls supresif. sistem supresif lebih mengaktifkan stimulasi nociceptor yang ditransmisikan oleh serabut A. jalur nonopiate merupakan jalur desenden yang tidak memberikan respon terhadap *naloxone* yang kurang banyak diketahui mekanismenya (Maryunani, 2010).

Berikut adalah uraian secara singkat dengan menggunakan gambar tentang mekanisme terjadinya nyeri.



Gambar 2.1 Mekanisme Terjadinya Nyeri

Sumber: <http://www.slideshare.net/miaramadhini/patofisiologi-nyeri-demam-serta-obat-analgetik>

3. Teori Nyeri

Terdapat beberapa teori tentang terjadinya rangsangan nyeri, yaitu :

a. Teori Pemisahan (*Specificity Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa reseptor nyeri tertentu distimulasikan oleh tipe stimulus sensori spesifik yang mengirimkan impuls ke otak. Teori ini menguraikan dasar fisiologis adanya nyeri tetapi tidak menjelaskan komponen-komponen fisiologis dari nyeri maupun derajat toleransi nyeri. (Hidayat, 2008)

b. Teori Pola (*Pattern Theory*)

Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medulla spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respons

yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks serebri, serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Persepsi dipengaruhi oleh modalitas respons dari reaksi sel T (Hidayat, 2008)

c. Teori Pengendalian Gerbang (*Gate Control Theory*).

Terdapat berbagai teori yang berusaha menggambarkan bagaimana nosireseptordapat menghasilkan rangsang nyeri. Sampai saat ini dikenal berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana nyeri dapat timbul, namun teori *Gate control theory* dianggap paling relevan (Tamsuri, 2007).

Teori *gate control* dari Melzack dan Wall (1965) menjelaskan bahwa impuls nyeri diatur oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Keseimbangan aktivitas dari neuron sensori dan serabut control desenden dari otak mengatur proses pertahanan. Neuron delta-A dan C melepaskan substansi C melepaskan substansi P untuk mentranmisi impuls melalui mekanisme pertahanan. Selain itu terdapat mekanoreseptor, neuron beta-A yang lebih tebal, yang lebih cepat yang melepaskan neurotransmitter penghambat. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A, maka akan menutup mekanisme pertahanan. Mekanisme penutupan ini dapat terlihat saat seorang perawat menggosok punggung klien dengan lembut. Pesan yang dihasilkan akan menstimulasi mechano reseptor, apabila masukan yang dominan berasal dari serabut delta A dan serabut C, maka akan membuka pertahanan tersebut dan klien mempersepsikan sensasi nyeri (Prasetyo, 2010)

Bahkan jika impuls nyeri dihantarkan ke otak, terdapat pusat kortek yang lebih tinggi di otak yang memodifikasi nyeri. Alur saraf desenden melepaskan opiat endogen, seperti endorfin dan dinorfin, pembunuh nyeri alami yang berasal dari tubuh. Neuromodulator ini menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat pelepasan substansi P. Teknik distraksi, musik, konseling dan pemberian plasebo merupakan upaya untuk melepaskan endorfin (Prasetyo, 2010)

d. Teori Transmisi dan Inhibisi

Adanya stimulus pada nociceptor memulai implus-impuls saraf, sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Kemudian, inhibisi impuls nyeri menjadi efektif oleh implus-impuls pada serabut-serabut besar yang memblok implus-impuls pada serabut lamban dan endogen opiate system supresif (Hidayat, 2008)

4. *Klasifikasi Nyeri*

a. Berdasarkan Lokasi / Letak

1) Cutaneus/ superficial, yaitu nyeri yang mengenai kulit/ jaringan subkutan.

Biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam. Contoh: Terkena ujung pisau atau gunting, jarum suntik.

2) Deep somatic/ nyeri dalam, yaitu nyeri yang muncul dari ligament, pembuluh darah, tendon dan syaraf, nyeri menyebar & lebih lama daripada cutaneus.

Contoh: Sensasi pukul, sensasi terbakar misalnya ulkus lambung.

3) Nyeri Alih, merupakan fenomena umum dalam nyeri visceral karena banyak

organ tidak memiliki reseptor, biasanya nyeri terasa di bagian tubuh yang terpisah dari sumber nyeri dan dapat terasa dengan berbagai karakteristik. Contoh : Infark miokard yang menyebabkan nyeri alih ke rahang, lengan kiri, dan bahu kiri, batu empedu yang dapat mengalihkan nyeri ke selangkangan.

- 4) Radiasi, sensasi nyeri meluas dari tempat awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Biasanya nyeri terasa seakan menyebatr ke bagian tubuh bawah atau sepanjang bagian tubuh. Nyeri dapat menjadi intermitten atau konstan. Contoh : Nyeri punggung bagian bawah akibat diskus intravetebral yang ruptur disertai nyeri yang meradiasi sepanjang tungkai dari iritasi saraf skiatik.

b. Berdasarkan penyebabnya

- 1) Fisik : Bisa terjadi karena stimulus fisik (contoh: fraktur femur).
- 2) Psychogenic, terjadi karena sebab yang kurang jelas/susah diidentifikasi, bersumber dari emosi/psikis dan biasanya tidak disadari. (contoh: orang yang marah-marah, tiba-tiba merasa nyeri pada dadanya), Biasanya nyeri terjadi karena perpaduan 2 sebab tersebut.

c. Berdasarkan lama/durasinya

Menurut Smeltzer (2002), nyeri diklasifikasikan berdasarkan durasinya yaitu:

1) Nyeri akut

Nyeri akut merupakan kumpulan pengalaman yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan sensori, persepsi dan emosi serta berkaitan dengan respon autonomi psikologi dan perilaku. Nyeri akut merupakan

peristiwa yang baru, tiba-tiba dan durasinya singkat. Disamping itu nyeri ini dapat diidentifikasi, rasa nyerinya dapat berkurang atau hilang, sifatnya jelas dan mungkin sekali untuk berakhir atau hilang dalam batas nyeri sedang sampai berat, dan durasinya kurang dari 6 bulan. Contoh aktual nyeri akut adalah nyeri pasca bedah, nyeri akibat prosedur pengobatan atau trauma dan nyeri oleh karena adanya penyakit yang bersifat aktual.

2) Nyeri kronik

Nyeri kronik adalah situasi atau keadaan pengalaman nyeri yang menetap atau kontinyu selama beberapa bulan atau tahun setelah fase penyembuhan dari suatu penyakit atau injuri. Karakteristiknya adalah nyeri dalam skala berat, dan intensitas nyeri sukar diturunkan.

5. *Pengkajian Nyeri*

a. Agar alat-alat pengkajian yang bermanfaat, alat tersebut harus memenuhi kriteria

- 1) Mudah dimengerti dan digunakan
- 2) Memerlukan sedikit upaya pada pihak pasien
- 3) Mudah dinilai
- 4) Sensitif terhadap perubahan kecil dalam intensitas nyeri.

b. Dalam melakukan pengkajian fisik nyeri terdapat tiga kategori data objektif,

yaitu :

- 1) Respon simpatik, respon ini muncul pada nyeri ringan sampai sedang atau nyeri *superficial*.

- a) Respon pertahanan utama tubuh akan muncul sebagai bentuk pertahanan atau pelarian (*fight or flight*)
 - b) Hal objektif yang dapat dilihat adalah pucat, tekanan darah, nadi dan respirasi rate meningkat, penegangan otot skeletal, dilatasi pupil dan diaphoresis.
- 2) Respon Parasimpatik. Respon ini muncul pada nyeri hebat atau nyeri dalam. Pada tingkat ini respon pertahanan tubuh sudah tidak mampu lagi menghadapi nyeri, tanda dan gejalanya meliputi : tekanan darah dan nadi menurun, mual dan muntah, kelelahan, lesu, pucat dan mungkin kehilangan kesadaran.
- 3) Respon Tingkah Laku, mencakup:
- a) Mencari sikap postur tertentu untuk meminimalkan nyeri seperti miring dengan kaki, sikap melindungi, menarik kaki ke atas atau fetal position.
 - b) Menangis, berteriak, menggigit atau mengkatubkan rahang atau menghindari orang lain.
 - c) Melindungi daerah yang sakit, muram, sedih, takut, dan lain-lain.
 - d) Vokal (menangis, berteriak, merintih, bicara terengah)
 - e) Gerakan tubuh (Gelisah, Imobilisasi, Ketegangan otot, mengusap, bergerak melindungi, bagian tubuh yang sakit, membuat posisi tertentu.
 - f) Ekspresi wajah (menangis, mengatubkan gigi, melotot, menggigit bibir, gemeletuk gigi/rahang.

- g) Interaksi sosial (menghindari percakapan, menghindari kontak sosial, penurunan rentang perhatian, fokus pada aktivitas menghilangkan nyeri).

Individu yang mengalami nyeri dengan awitan mendadak dapat bereaksi sangat berbeda terhadap nyeri yang berlangsung selama beberapa menit atau menjadi kronis. Nyeri dapat menyebabkan kelelahan dan membuat individu terlalu letih untuk merintih atau menangis. Pasien dapat tidur, bahkan dengan nyeri hebat. Pasien dapat tampak rileks dan terlibat dalam aktivitas karena menjadi mahir dalam mengalihkan perhatian terhadap nyeri.

6. *Intensitas Nyeri*

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual. Kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama bisa dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda pula. Sedangkan pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif adalah menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun, pengukuran dengan tehnik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007).

Menurut Prasetyo (2010), untuk mengetahui tingkatan atau besarnya nyeri dapat dilakukan melalui beberapa skala, yaitu:

a. Skala Deskriptif Verbal (*Verbal Descriptor Scale*)

Merupakan salah satu alat ukur tingkat keparahan yang lebih bersifat objektif. Skala deskriptif verbal ini merupakan sebuah garis yang terdiri dari

c. Skala Analog Visual (*Visual Analog Scale, VAS*)

Merupakan suatu garis lurus yang mewaliki intensitas nyeri yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala ini memberikan kebebasan penuh pada pasien untuk mengidentifikasi tingkat keparahan nyeri yang ia rasakan. Skala Analog Visual merupakan penguku keparahan nyeri yang lebih sensitif karena pasien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian daripada dipaksa memilih satu kata atau angka (McGuire, 1984) dalam (Prasetyo, 2010)



Gambar 2.4, Skala Analog Visual

Sumber: <http://majalah1000guru.net/2015/02/skala-nyeri/>

7. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nyeri*

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri menurut Perry & Potter (2005), antara lain :

a. Usia

Usia merupakan variabel penting yang mempengaruhi nyeri, khususnya pada anak-anak dan lansia. Perbedaan perkembangan, yang ditemukan diantara kelompok usia ini dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak dan lansia bereaksi terhadap nyeri.

b. Jenis Kelamin

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara makna dalam respon terhadap nyeri. Diragukan apakah hanya jenis kelamin saja yang merupakan suatu faktor dalam mengekspresikan nyeri. Toleransi nyeri sejak lama telah menjadi subyek penelitian yang melibatkan pria dan wanita, akan tetapi toleransi terhadap nyeri dipengaruhi oleh faktor-faktor biokimia dan merupakan hal yang unik pada setiap individu tanpa memperhatikan jenis kelamin.

c. Kebudayaan

Keyakinan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Menurut Clancy dan Vicar (Cit Perry & Potter, 2005), menyatakan bahwa sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis seseorang. Dengan demikian, hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran fisiologis opiate endogen dan sehingga terjadilah persepsi nyeri.

d. Makna nyeri

Pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Hal ini juga dikaitkan secara dekat dengan latar belakang budaya individu tersebut. Individu akan mempersepsikan nyeri dengan cara berbeda-beda apabila nyeri tersebut memberikan kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman dan tantangan. Misalnya seorang wanita yang melahirkan akan mempersepsikan nyeri, akibat cedera karena pukulan pasangannya. Derajat dan kualitas nyeri yang dipersiapkan nyeri klien

berhubungan dengan makna nyeri.

e. Perhatian

Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat sedangkan upaya pengalihan dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi klien pada stimulus yang lain, maka perawat menempatkan nyeri pada kesadaran yang perifer. Biasanya hal ini menyebabkan toleransi nyeri individu meningkat, khususnya terhadap nyeri yang berlangsung hanya selama waktu pengalihan.

f. Ansietas

Hubungan antara nyeri dan ansietas bersifat kompleks. Ansietas seringkali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan ansietas. Pola bangkitan otonom adalah sama dalam nyeri dan ansietas. Price (Cit Perry, Potter 2005), melaporkan suatu bukti bahwa stimulus nyeri mengaktifkan bagian sistim limbik dapat memproses reaksi emosi seseorang terhadap nyeri, yakni memperburuk atau menghilangkan nyeri.

g. Keletihan

Keletihan meningkatkan persepsi nyeri, rasa kelelahan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan menurunkan kemampuan coping. Hal ini dapat menjadi masalah umum pada setiap individu yang menderita penyakit dalam jangka lama. Apabila keletihan disertai kesulitan tidur, maka persepsi nyeri terasa lebih berat dan jika mengalami suatu proses periode tidur yang baik maka nyeri berkurang.

h. Pengalaman sebelumnya

Pengalaman nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu akan menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa yang akan datang. Apabila individu sejak lama sering mengalami serangkaian episode nyeri tanpa pernah sembuh maka rasa takut akan muncul, dan juga sebaliknya. Akibatnya klien akan lebih siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan nyeri.

i. Gaya Koping

Pengalaman nyeri dapat menjadi suatu pengalaman yang membuat merasa kesepian, gaya koping mempengaruhi mengatasi nyeri.

j. Dukungan Keluarga dan Sosial

Faktor lain yang bermakna mempengaruhi respon nyeri adalah kehadiran orang-orang terdekat klien dan bagaimana sikap mereka terhadap klien. Walaupun nyeri dirasakan, kehadiran orang yang bermakna bagi pasien akan meminimalkan kesepian dan ketakutan. Apabila tidak ada keluarga atau teman, seringkali pengalaman nyeri membuat klien semakin tertekan, sebaliknya tersedianya seseorang yang memberi dukungan sangatlah berguna karena akan membuat seseorang merasa lebih nyaman, kehadiran orang tua sangat penting bagi anak-anak yang mengalami nyeri (Judha dkk, 2012).

C. Tinjauan Umum tentang Nyeri Persalinan

1. Definisi Nyeri Persalinan

Merupakan bagian integral dari persalinan dan melahirkan (Melzack, 1984)

dikutip oleh mander (2003). Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri), yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjastro, 2005). Sedangkan menurut (Varney, 2002), Persalinan adalah rangkaian proses fisiologis yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses yang fisiologis pada umumnya dimulai dengan adanya kontraksi yang ditandai dengan perubahan progresif pada servik, dan diakhiri dengan kelahiran plasenta.

Nyeri persalinan disebabkan adanya regangan segmen bawah rahim (Farer, 2001). Intensitas nyeri sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang terjadi, nyeri bertambah ketika mulut rahim dalam dilatasi penuh akibat tekanan bayi terhadap struktur panggul diikuti regangan dan perobekan jalan lahir.

Nyeri persalinan unik dan berbeda pada setiap individu karena nyeri tidak hanya dikaitkan dengan kondisi fisik semata, tetapi berkaitan juga dengan kondisi psikologis ibu pada saat persalinan.

2. *Penyebab Nyeri Persalinan*

Rasa nyeri saat persalinan merupakan hal yang normal terjadi. Penyebabnya meliputi faktor fisiologis dan psikis (Hartanti, 2005).

a. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis yang dimaksud adalah kontraksi. Gerakan otot ini menimbulkan rasa nyeri karena saat itu otot-otot rahim memanjang dan kemudian memendek. Serviks juga akan melunak, menipis dan mendatar, kemudian tertarik.

Saat itulah kepala janin menekan mulut rahim dan membukannya. Jadi, kontraksi merupakan bagian dari upaya membuka jalan lahir.

Intensitas rasa nyeri dari pembukaan satu sampai pembukaan sepuluh akan bertambah tinggi dan semakin sering sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan bayi terhadap struktur panggul, diikuti regangan bahkan perobekan jalan lahir bagian bawah. dari tak ada pembukaan sampai pada pembukaan 2 bisa berlangsung sekitar 8 jam. Rasa sakit pada pembukaan 3 cm sampai selanjutnya rata-rata 0,5-1cm perjam. Maka lama dan frekuensi nyeri makin sering dan makin bertambah kuat sampai mendekati proses persalinan.

b. Faktor Psikis

Rasa takut dan cemas yang berlebihan akan mempengaruhi rasa nyeri. Setiap ibu mempunyai versi sendiri-sendiri tentang nyeri persalinan, karena ambang batas rangang nyeri setiap orang berlainan dan subyektif sekali. Ada yang merasa tidak sakit hanya perutnya yang terasa kencang. Adapula yang merasa tidak tahan mengalami rasa nyeri. Beragam respon itu merupakan suatu mekanisme proteksi diri dari rasa nyeri yang dirasakan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

a. Faktor Internal

1) Pengalaman dan pengetahuan tentang nyeri

Pengalaman sebelumnya seperti persalinan terdahulu akan membantu ibu dalam mengatasi nyeri, karena ibu telah memiliki coping terhadap nyeri. Ibu

multipara dan primipara kemungkinan akan berespon terhadap nyeri berbeda-beda walaupun menghadapi kondisi yang sama yaitu suatu persalinan. Hal ini dikarenakan ibu multipara telah memiliki pengalaman pada persalinan sebelumnya.

2) Usia

Usia muda cenderung dikaitkan dengan kondisi psikologis yang masih labil, yang memicu terjadinya kecemasan sehingga nyeri yang dirasakan menjadi lebih berat. Usia juga dipakai sebagai salah satu faktor dalam menentukan toleransi terhadap nyeri. Toleransi akan meningkat seiring bertambahnya usia dan pahaman terhadap nyeri.

3) Aktifitas Fisik

Aktifitas ringan bermanfaat mengalihkan perhatian dan mengurangi rasa sakit menjelang persalinan, selama itu tidak melakukan latihan-latihan yang tidak terlalu keras dan berat, serta menimbulkan kelelahan pada wanita karena hal ini justru akan memicu nyeri yang lebih berat.

4) Kondisi Psikologi

Situasi dan kondisi psikologis yang labil memegang peranan penting dalam memunculkan nyeri persalinan yang lebih berat. Salah satu mekanisme pertahanan jiwa terhadap stress adalah konversi yaitu memunculkan gangguan secara psikis menjadi gangguan fisik.

b. Faktor Eksternal

1) Agama

Semakin kuat kualitas keimanan seseorang maka mekanisme pertahanan tubuh terhadap nyeri semakin baik karena berkaitan dengan kondisi psikologis yang relative stabil.

2) Lingkungan Fisik

Lingkungan yang terlalu ekstrim seperti perubahan cuaca, panas, dingin, ramai, bising memberikan stimulus terhadap tubuh yang memicu terjadinya nyeri.

3) Budaya

Budaya tertentu akan mempengaruhi respon seseorang terhadap nyeri, ada budaya yang mengekspresikan nyeri secara bebas, tapi ada pula yang tidak perlu diekspresikan secara berlebihan.

4) Support System

Tersedianya sarana dan support system yang baik dari lingkungan dalam mengatasi nyeri, dukungan keluarga dan orang terdekat sangat membantu mengurangi rangsang nyeri yang dialami oleh seseorang saat menghadapi persalinan.

5) Sosial Ekonomi

Tersedianya sarana dan lingkungan yang baik dapat membantu mengatasi rangsang nyeri yang dialami. Seringkali status ekonomi mengikuti

keadaan nyeri persalinan. Keadaan ekonomi yang kurang, pendidikan yang rendah, informasi yang minimal dan kurang sarana kesehatan yang memadai akan menimbulkan ibu kurang mengetahui bagaimana mengatasi nyeri yang dialami dan masalah ekonomi berkaitan dengan biaya dan persiapan persalinan sering menimbulkan kecemasan tersendiri dalam menghadapi persalinan.

4. Jenis Nyeri Persalinan

Persalinan berhubungan dengan dua jenis nyeri yang berbeda. Pertama nyeri berasal dari otot rahim, pada saat otot ini berkontraksi nyeri yang timbul disebut nyeri viseral. Nyeri ini tidak dapat ditentukan dengan tepat lokasinya (*Pain-Pointed*). Nyeri viseral juga dapat dirasakan pada orang lain yang bukan merupakan asalnya disebut nyeri alih (*Reffered pain*). Pada persalinan nyeri alih dapat dirasakan pada orang yaitu punggung bagian bawah dan sacrum. Sedangkan nyeri yang kedua timbul pada saat mendekati kelahiran. Tidak seperti nyeri viseral, nyeri ini terlokalisir di daerah vagina, rectum dan perineum sekitar anus. Nyeri jenis ini disebut nyeri somatik dan disebabkan peregangan stuktur jalan lahir bagian bawah akibat penurunan bagian terbawah janin.

5. Fisiologi Nyeri Persalinan

Sensasi nyeri dihasilkan oleh jaringan serat saraf kompleks yang menghasilkan sistem saraf perifer dan sentral. Dalam nyeri persalinan, sistem saraf otonom dan terutama komponen simpatis berperan dalam sensasi (Mender, 2012)

a. Sistem Saraf Otonom

Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas otot polos dan viseral, uterus yang dikenal sebagai sistem saraf involunter karena organ ini berfungsi tanpa kontrol kesadaran. Terdapat dua komponen yaitu sistem simpatis dan parasimpatis. Sarafsimpatis mensuplay uterus dan membentuk bagian yang sangat penting dari neuroanatomi nyeri persalinan. *Neuron aferen* menstransmisikan informasi dari rangsang nyeri dari sistem saraf otonom menuju sistem saraf pusat dari visera terutama melalui serat saraf simpatis. Neuron aferensomatik dan otonom bersinaps dalam region kornu dorsalis dan aling mempengaruhi, menyebabkan fenomena yang disebut nyeri alih. Nyeri ini adalah nyeri yang peling dominan dirasakanselama bersalin terutama selama kala 1 (Mander, 2012).

Neuron aferen otonom berjalan keatas melalui *medulla spinalis* dan batang otak berdampingan dengan *neuron aferensomatik*, tetapi walaupun sebagian besar saraf aferen otonom berjalan menuju hipotalamus sebelum menyebar ke thalamus dan kemudian terakhir pada korteks serebri. Gambaran yang berada lebih lanjut dari sistem saraf otonom adalah fakta bahwa neuron aferen yang keluar dari sistem saraf pusat hanya melalui tiga region:

- 1) Dalam otak (Nervus kranialis III, VII, IX, dan X)
- 2) Dalam region torasika (T1 sampai T12, L1 dan L3)
- 3) Segmen sakralis kedua dan ketiga medulla spinalis.

Region torasika membentuk aliran keluar sistem saraf simpatis yang menyuplai organ viseral, misalnya uterus (Mender, 2012).

b. Jaras Perifer Nyeri Pesalinan

Karya eksperimental pada sistem saraf otonom menunjukkan bahwa baik komponen simpatis dan parasimpatis menyuplai sebagian besar organ abdomen dan pelvis, termasuk uterus. Secara anatomis, otot polos uterus disuplai sebagian besar oleh serat-C yang tidak bermielin dan sebagian oleh serat- A delta kecil yang bermielin.

Selama kala 1 persalinan, nyeri diakibatkan oleh dilatasi serviks dan segmen bawah uterus dan distensi korpus uteri. Nyeri selama kala ini diakibatkan oleh kekuatan kontraksi dan tekanan yang dibangkitkan. Hasil temuan bahwa tekanan cairan amnion lebih dari 15mmHg diatas tonus yang dibutuhkan untuk meregangkan segmen bawah uterus dan serviks dan dengan demikian menghasilkan nyeri (Mander, 2012).

Dengan demikian, logis untuk megarapkan bahwa makin tinggi tekanan cairan amnion, makin besar distensi sehingga menyebabkan nyeri yang lebih. Nyeri ini dilanjutkan ke dermaton yang disuplai oleh segmen *medulla spinalis* yang sama dengan segmen yang menerima input nosiseptif dari uterus dan serviks. Nyeri persalinan selama kala 1 disebabkan oleh kontraksi rahim yang dihantarkan oleh serabut saraf simpatis dan serabut saraf thorakal 11 dan 12. Nyeri yang disebabkan peregangan mulut rahim. Nyeri disebarkan melalui saraf dari medulla spinalis yaitu

thorakal 11 dan 12 serta lumbal 1. Rasa nyeri yang timbul dirasakan sebagai nyeri punggung 10%, nyeri pinggang 20% dan sebagian besar nyeri pada bagian bawah perut 70% (Maya, 2010).

Pada kala II persalinan, nyeri tambahan disebabkan oleh regangan dan robekan jaringan misalnya pada perineum dan tekanan pada otot skelet perinium. Nyeri diakibatkan oleh rangsangan struktur somatik superfisial dan digambarkan sebagai nyeri yang tajam dan terlokalisasi, terutama pada daerah yang disuplai oleh syaraf pudendus. Nyeri pada kala II disebabkan karena peregangan perineum, tarikan peritonium, kekuatan yang mendorong pengeluaran janin serta tekanan dari traktus urinarius bagian bawah dan pelvis. Rangsangan nyeri disebarkan melalui saraf parasimpatis dari jaringan perinium. Nyeri yang timbul dirasakan pada daerah dasar panggul dan selangkangan maupun paha (Maya, 2010).

6. *Lama Nyeri Persalinan*

Nyeri selama persalinan dirasakan selama kala pembukaan dan makin hebat dalam kala pengeluaran. Pada ibu yang baru pertama kali bersalin, kala pembukaan berlangsung kira-kira 13 jam dan kala pengeluaran kira-kira 1 ½ jam. Pada wanita yang pernah melahirkan kala pembukaan berlangsung lebih singkat yaitu sekitar 7 jam dan kala pengeluaran sekitar 1/2 jam (Maya, 2010).

7. *Akibat Tidak Mengatasi Nyeri*

Menurut Mander (2004), nyeri persalinan yang berat dan lama dapat mempengaruhi ventilasi, sirkulasi metabolisme dan aktivitas uterus. Nyeri saat

persalinan bisa menyebabkan tekanan darah meningkat dan konsentrasi ibu selama persalinan menjadi terganggu, tidak jarang kehamilan membawa “stress” atau rasa khawatir/cemas yang membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun pada janin yang dikandungnya. Misalnya mengakibatkan kecacatan jasmani dan kemunduran kepandaian serta mental emosional nyeri dan rasa sakit yang berlebihan akan menimbulkan rasa cemas. Rasa cemas yang berlebihan juga menambah nyeri (Mender, 2012)

8. *Managemen Nyeri*

a. *Managemen Farmakologi*

Managemen farmakologi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan obat-obatan. Obat merupakan bentuk pengendalian nyeri yang paling sering diberikan oleh perawat dengan kolaborasi dengan dokter. Terdapat tiga kelompok obat nyeri yaitu:

1) *Analgetik non opioid –Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS)*

Efektif untuk penatalaksanaan nyeri ringan sampai sedang terutama asetomenofn (Tylenol) dan OAINS dengan anti piretik, analgetik dan anti inflamasi, Asam asetilsalisilat (aspirin) dan Ibuprofin (Morfin, Advil) merupakan OAINS yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri akut derajat ringan. OAINS menghasilkan analgetik dengan bekerja ditempat cedera melalui inhibisi sintesis prostaglandin dari prekursor asam arokidonat. Prostaglandin mensintesis nosiseptor dan bekerja secara sinergis dengan prodok inflamatorik

lain di tempat cedera, misalnya bradikinin dan histamin untuk menimbulkan hiperanalgetik. Dengan demikian OAINS mengganggu mekanisme transduksi di nosiseptor aferen primer dengan menghambat sintesis prostaglandin.

2) Analgesia opioid

Merupakan analgetik yang kuat yang tersedia dan digunakan dalam penatalaksanaan nyeri dengan skala sedang sampai dengan berat. Obat-obat ini merupakan patokan dalam pengobatan nyeri pasca operasi dan nyeri terkait kanker. Morfin merupakan salah satu jenis obat ini yang digunakan untuk mengobati nyeri berat. Berbeda dengan OAINS yang bekerja di perifer, Morfin menimbulkan efek analgetiknya di sentral. Morfin menimbulkan efek dengan mengikat reseptor opioid di nukleus modulasi di batang otak yang menghambat nyeri pada sistem ascendens.

3) Adjuvan / Koanalgetik

Merupakan obat yang memiliki efek analgetik atau efek komplementer dalam penatalaksanaan nyeri yang semula dikembangkan untuk kepentingan lain. Contoh obat ini adalah Karbamazepin (Tegretol) atau Fenitoin (Dilantin) (Price & Wilson, 2006).

b. Manajemen Non-Farmakologi

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi (memanajemen) nyeri saat persalinan, yaitu salah-satunya dengan memberikan terapi non farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu terapi yang digunakan yakni dengan tanpa

menggunakan obat-obatan, tetapi dengan memberikan berbagai teknik yang setidaknya dapat sedikit mengurangi rasa nyeri saat persalinan tiba. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah:

1) Distraksi

Distraksi adalah memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri. Ada empat tipe distraksi, yaitu distraksi visual, misalnya membaca atau menonton televisi. Distraksi auditory, misalnya mendengarkan music. Distraksi taktil, misalnya menarik nafas dan massase. Distraksi kognitif, misalnya bermain puzzle.

Distraksi adalah mengalihkan perhatian klien dari nyeri. Teknik distraksi yang dapat dilakukan di antaranya adalah :

- a) Bernapas lambat dan berirama secara teratur.
- b) Menyanyi berirama ydan menghitung ketukannya.
- c) Mendengarkan music
- d) Mendorong untuk mengkhayal (*guided imagenary*) yaitu melakukan bimbingan yang baik kepada klien untuk mengkhayal.
- e) Massase (pijatan). (Asmadi, 2009).

2) Hypnosis-diri

Hypnosis-diri dengan membantu merubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Hypnosis-diri menggunakan sugesti dari dan kesan tentang perasaan yang rileks dan damai. Individu memasuki keadaan rileks dengan menggunakan bagian ide pikiran dan kemudian kondisi-kondisi yang menghasilkan respons tertentu

bagi mereka (Edelman & Mandel, 1994). Hypnosis-diri sama sepertidengan melamun. Konsentrasi yang efektif mengurangi ketakutan dan stres karena individu berkonsentrasi hanya pada satu pikiran. Selain itu juga mengurangi persepsi nyeri merupakan salah satu sederhana untuk meningkatkan rasa nyaman ialah membuang atau mencegah stimulasi nyeri. Hal ini terutama penting bagi klien yang imobilisasi atau tidak mampu merasakan sensasi ketidaknyamanan. Nyeri juga dapat dicegah dengan mengantisipasi kejadian yang menyakitkan, misalnya seorang klien yang dibiarkan mengalami konstipasi akan menderita distensi dan kram abdomen. Upaya ini hanya klien alami dan sedikit waktu ekstra dalam upaya menghindari situasi yang menyebabkan nyeri (Mander, 2012).

Hipnotis adalah suatu teknik yang menghasilkan suatu keadaan tidak sadar diri yang dicapai melalui gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pehipnotis (Asmadi, 2009).

3) Stimulus Kutaneus

Terapi stimulasi kutaneus adalah stimulasi kulit yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri massase, mandi air hangat, kompres panas atau dingin dan stimulasi saraf elektrik transkutan (TENS) merupakan langkah-langkah sederhana dalam upaya menurunkan persepsi nyeri. Cara kerja khusus stimulasi kutaneus masih belum jelas. Salah-satu pemikiran adalah cara ini menyebabkan pelepasan endorfin, sehingga memblokir transmisi stimulasi nyeri.

Teori Gate-kontrol mengatakn bahwa stimulasi kutaneus mengaktifkan transmisi tersebut saraf sensori A-Beta yang lebih besar dan lebih cepat. Proses ini menurunkan transmisi nyeri melalui serabut dan delta-A berdiameter kecil. Gerbang sinaps menutup transmisi impuls nyeri. Bahwa keuntungan stimulasi kutaneus adalah tindakan ini dapat dilakukan di rumah, sehingga memungkinkan klien dan keluarga melakukan upaya kontrol gejala nyeri dan penanganannya. Penggunaan yang benar dapat mengurangi persepsi nyeri dan membantu mengurangi ketegangan otot.

Stimulasi kutaneus jangan digunakan secara langsung pada daerah kulit yang sensitif (misalnya luka bakar, lukamemar, cram kulit, inflamasi dan kulit dibawah tulang yang fraktur) (Mander, 2004).

4) Massase

Masasse adalah melakukan tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya otot, atau ligamentum, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan posisi sendi untuk meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi, dan/atau memperbaiki sirkulasi. Masase adalah terapi nyeri yang paling primitive dan menggunakan refleks lembut manusia untuk menahan, menggosok, atau meremas bagian tubuh yang nyeri (Smeltzer & Bare, 2002).

5) Terapi Hangat dan Dingin

Terapi hangat dan dingin bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri (non-nosiseptor). Terapi dingin dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitifitas reseptor nyeri. Agar efektif es harus diletakkan di area sekitar

pembedahan. Penggunaan panas dapat meningkatkan aliran darah yang dapat mempercepat penyembuhan dan penurunan nyeri (Smeltzer & Bare, 2002).

6) Teknik relaksasi

Teknik ini didasarkan kepada keyakinan bahwa tubuh berespon pada antietas yang merangsang pikiran karena nyeri atau kondisi penyakitnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan kepala ditopang dalam posisi berbaring atau duduk di kursi. Hal utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknik relaksasi adalah klien dengan posisi yang nyaman, klien dengan pikiran yang beristirahat, dan lingkungan yang tenang (Asmadi, 2009).

Teknik relaksasi banyak jenisnya, salah-satunya adalah relaksasi autogenic. Relaksasi ini mudah dilakukan dan tidak beresiko. Prinsipnya klien harus mampu berkonsentrasi sambil membaca mantra/doa/dzikir dalam hati seiring dengan ekspirasi paru (Asmadi, 2009).

7) Relaksasi pernafasan

Relaksasi pernafasan yang merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan, yang dalam hal ini perawat mengajak pada klien bagaimana cara melakukan pernafasan, nafas lambat (menahan inspirasi secara maksimal) dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi pernafasan juga dapat meningkatkan ventilasi parudan meningkatkan oksigenasi darah (Smeltzer & Bare, 2002).

Menurut kegunaanya teknik relaksasi pernafasan dianggap mampu meredakan nyeri, prosesnya menarik nafas lambat melalui hidung (menahan inspirasi secaramaksimal) dan menghembuskan nafas melalui mulut secara perlahan-lahan.

Kesakitan yang dialami seorang Ibu ketika hendak melahirkan telah dibahas dalam firman Allah SWT QS. Maryam/19: 23

نَسِيًا وَكُنْتَ هَذَا أَقْبَلَ مَتِيْلِيْتِنِي قَالَتْ النَّخْلَةَ جِدْعٍ إِلَى الْمَخَاضِ فَأَجَاءَهَا

مَنْسِيًا ﴿٢٣﴾

Terjemahan-Nya:

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan." (QS. Maryam/19 : 23).

Ayat di atas menjelaskan bahwa rasa sakit yang mendahului kelahiran anak terjadi karena desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Maka rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar (Shihab, 2007).

D. Tinjauan Umum tentang Auditory Murottal

1. Pengertian Murottal

Murottal adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang qori' (pembaca Al-Qur'an) (Purna, 2006). Lantunan Al-Qur'an secara fisik

mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik (Heru, 2008).

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diyakini kebenarannya, dan dijadikan salah satu syarat keimanan bagi setiap muslim. Dalam sejarah turunnya Al-Qur'an Ayat suci Al-Qur'an diturunkan di kota Makkah dan di kota Madinah Munawarah (Asti, 2009).

2. Manfaat

Al-Qur'an merupakan obat yang komplet untuk segala jenis penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik, baik penyakit dunia maupun penyakit akhirat (Ad-Dihami, 2005), sedangkan Yani Ahmad (2002) menyatakan bahwa Al-Qur'an bermanfaat untuk menjadi obat, penawar dan penyembuh dari berbagai persoalan hidup manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari murottal (mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an) menurut Heru (2008) antara lain:

- a. Mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tartil akan mendapatkan ketenangan jiwa.
- b. Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia, suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

Berikut ini akan saya sebutkan beberapa bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa Al- Qur'an bermanfaat bagi kesehatan baik jasmani dan rohani.

1) Memberikan ketenangan/ketentraman

Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar.

Penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang

yang menjadi objek penelitiannya. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya ia berkesimpulan, bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.

Penelitian Dr. Al Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, Al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya. Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi dua sesi, yakni membacakan Al-Quran dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur'an. Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur'an. Selain itu, Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan Dr. Nurhayati dari Malaysia dalam Seminar Konseling dan Psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari tape recorder menunjukkan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang.

Maka jelaslah firman Allah SAW :

تَخَشُّونَ الَّذِينَ جُلُودٌ مِنْهُ تَقَشَعُ مَثَانِي مُمْتَشِبَهَا كِتَابًا الْحَدِيثَ أَحْسَنَ نَزَلَ اللَّهُ
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ بِيَدِهِ يَهْدِي اللَّهُ هُدًى ذَٰلِكَ اللَّهُ ذِكْرٌ إِلَىٰ وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ تَلِينُ ثُمَّ رَحِمَهُمْ
 هَادٍ مِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ يُضِلُّ وَ

Terjemahannya :

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur`an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya.” (QS. Az-Zumar/39: 23).

Dapat pula kita lihat dalam firman Allah SWT yang laindalam surah Ar-

Ra'd ayat 28 :

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ بِذِكْرِهِ إِلَّا اللَّهُ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ آمِنُوا الَّذِينَ

Terjemahannya :

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.” (QS. Ar-Ra'd/13: 28)

Dari hadits Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah (masjid) Allah, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat

menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya” (HR. Muslim).

2) Mencerdaskan Otak

Pada asalnya, milyaran sel saraf dalam otak manusia bergetar secara konstan. Sel ini berisi program yang rumit dimana milyar sel-sel di sekitar berinteraksi dalam sebuah koordinasi yang luar biasa yang menunjukkan kebesaran Allah.

Sebelum bayi lahir, sel-sel otaknya mulai bergetar berirama secara seimbang. Tapi setelah kelahirannya, tindakan masing-masing akan mempengaruhi sel-sel otak dan cara mereka bergetar. Jadi jika beberapa sel otak tidak siap untuk mentoleransi frekuensi tinggi, ini dapat menyebabkan gangguan dalam sistem getar otak yang pada gilirannya menyebabkan banyak penyakit fisik dan psikologis.

Seorang peneliti bernama Enrick William Dube menemukan bahwa otak bereaksi terhadap gelombang suara tertentu. Dan gelombang tersebut dapat berpengaruh secara positif dan negatif. Ketika beredar informasi bahwa musik klasik berpengaruh terhadap perkembangan otak manusia, banyak kalangan menggunakan musik klasik sebagai obat terapi. Tapi Beberapa orang peneliti dari University of Vienna, Austria yakni Jakob Pietschnig, Martin Voracek dan Anton K. Formann mengumpulkan semua pendapat dan temuan para ahli terkait dampak musik Mozart terhadap tingkat intelegensi seseorang. kemudian mereka membuat riset terhadap 3000 partisipator. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Berdasarkan penelitian terhadap ribuan partisipator itu, Pietschnig dan rekan-rekannya menyimpulkan

bahwa tidak ada stimulus atau sesuatu yang mendorong peningkatan kemampuan spasial seseorang setelah mendengarkan musik Mozart/Klasik.

Maka, Al-Qur'an tetaplah obat yang terbaik. Terapi dengan Al-Qur'an terbukti mampu meningkatkan kecerdasan seorang anak, menyembuhkan berbagai penyakit, dsb. Ini dikarenakan frekuensi gelombang bacaan Al-Qur'an memiliki kemampuan untuk memprogram ulang sel-sel otak, meningkatkan kemampuan, serta menyeimbangkannya.

Selain itu, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, yakni bahasa yang memiliki nilai sastra yang tinggi, dan bahasa nomor satu yang paling sulit untuk dipelajari. Kita tahu, bahwa tidak ada satupun dari kita yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an.

3) Menyehatkan Mata

Dari hasil seminar di malaysia menemukan kenyataan bahwa syaraf-syaraf pada mata manusia sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran sehingga orang yang membaca Al-Quran, matanya akan sehat dan menyehatkan mata yang sakit.

Dapat dilihat dari hadits Rasulullah SAW, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluh sakit mata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Lihatlah mushaf Al-Qur'an,*" (HR Ibnu Asakir)

Demikian agungnya al-Qur'an yang merupakan kumpulan dari Kalamullah. Melihat mushaf saja akan menyehatkan mata, apalagi membacanya. Riwayat menjelaskan bahwa para salaf menganjurkan, bahwa jika kita ingin mendapatkan

manfaat dari membaca Al-Qur'an maka hendaklah kita membaca Al-Quran seolah-olah sedang berbicara dengan Allah SWT.

3. *Penurunan Nyeri dengan Mendengarkan Al-qur'an*

Salah satu pendengaran atau perangsangan yang akan digunakan yaitu perangsangan dengan menggunakan ayat Suci Al-Quran dipakai terhadap intensitas nyeri pada pasien pascabedah digestif. Perangsangan dengan menggunakan ayat suci Al-Quran juga bertujuan untuk mengalihkan intensitas nyeri pada pasien pascabedah digestif dengan memperdengarkan ayat-ayat Suci Al-Quran dicoba dengan memakai teknik perangsangan selama 10-15 menit.

Ayat Suci al-Quran melalui pemutaran kaset *murotal*. Menurut Hawari (2009, hal.121) didalam al-Quran surat Ar-Rad/13:28 :

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ بِذِكْرِهِ إِلَّا بِاللَّهِ يُدْخِرُ لِقُلُوبِهِمْ وَتَطْمَئِنُّ عِامَنُوا الَّذِينَ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya denganmengingati Allah-lah hati menjadi tenteram” (QS.Ar-Rad/13:28).

Dalam tafsir al-Misbah tentang surah ar-Ra'd ayat 28 mengatakan bahwa ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni al-Quran yang sangat memesona kandungan dan redaksinya (Shihab, 2002).

Selain itu, merasakan kesakitan ketika hendak melakukan persalinan merupakan fitrah bagi setiap manusia yang kemudian ingat pada penciptanya, bahkan hidup dan matinya. Seperti pada ayat berikut:

لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ



Terjemahannya:

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (QS. Al-Mulk/67:2)

Dalam tafsir Jalalain, diketahui bahwa (yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia. Nutfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia mempunyai perasaan. Pengertian mati adalah kebalikannya. Pengertian lafal al-khalqu berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan (supaya Dia menguji kalian) atau mencoba kalian dalam kehidupan ini. (Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya), maksudnya yang paling taat kepada Allah, (dan Dia Maha Perkasa) di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepada-Nya (lagi Maha Pengampun) kepada orang yang bertaubat kepada-Nya .

Sedangkan dapat dilihat pula dalam tafsir al-Misbah surah al-Mulk ayat 2, yaitu yang menciptakan mati dan hidup untuk suatu tujuan, yaitu menguji siapa di antara kalian yang paling benar perbuatannya dan paling tulus niatnya. Dia Maha

Perkasa yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkan-Nya. Maha Pengampun terhadap orang-orang yang teledor (Shihab, 2002)

Biasanya orang yang sedang menderita sakit diliputi kecemasan dan kesedihan serta keduanya dapat memperberat penyakit yang sedang dideritanya Oleh karena itu, pengobat rasa cemas hendaknya berdoa sebagaimana dalam firman Allah berikut :

لَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا أَصْحَاءُ مَنْ فَمَنْ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ نُرْسِلُ وَمَا
مُحْزَنُونَ هُمُ

Terjemahannya :

“Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul melainkan untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan maka barang siapa yang beriman dan berbuat baik, bagi mereka tidak ada kekhawatiran (kecemasan) dan tidak pula berduka cita dan bersedih hati”(QS.Al-An’am/6:48).

E. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Oleh karna konsep merupakan abstraksi, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel. Jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi.


1. Dasar Pemikiran Variabel

Persalinan yang berlangsung lama dapat menyebabkan nyeri, kecemasan dan stress yang tinggi pada Ibu saat persalinan. Hal ini Ibu dapat merasakan nyeri yang cukup hebat karena akan berpengaruh buruk pada fisiologis persalinan, meskipun nyeri salah-satu mekanisme pertahanan tubuh yaitu suatu tanda bahaya atau peringatan selama persalinan (Suheimi, 2008).

Terapi musik mempunyai sifat terapiutik dan bersifat menyembuhkan. Musik menghasilkan rangsangan ritmis yang ditangkap oleh organ pendengaran dan diolah dalam sistem saraf tubuh dan kelenjar pada otak yang merekam interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengar. Ritme internal ini mempengaruhi metabolisme tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan lebih baik. Metabolisme yang lebih baik akan mampu membangun sistem kekebalan tubuh yang lebih baik dan dengan sistem kekebalan yang lebih baik, tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit (Silvia, 2009).


Pada penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah auditory murottal dan variabel independen pada penelitian ini adalah penurunan nyeri Ibu inpartu kala I fase aktif.

2. Skema Kerangka Konsep



Gambar 2.5. Skema Kerangka Konsep

Keterangan :



3. Definisi Operasional, Variabel dan Skala Penelitian

a. Auditory murottal

Auditori murottal adalah metode mendengarkan ayat-ayat al-qur'an (auditori murottal) pada ibu inpartu. Terpai ini akan diberikan selama 30 menit yang berguna untuk menurunkan intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif.

Kriteria Objektif:

- 1) Memperdengarkan surah ar-Rahman dengan durasi 11 menit 59 detik sebanyak 2x.
 - 2) Menggunakan skala nominal.
- b. Tingkat Nyeri Ibu Inpartu Kala I fase aktif.

Merupakan tingkat nyeri yang terjadi pada pasien persalinan normal kala I sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa pemberian auditory murottal

Kriteria Objektif:


- 1) Menggunakan skala nominal.

c. Skala Pengukuran

Skala psikososial merupakan jenis instrumen self-report yang digunakan oleh peneliti perawat yang dikombinasikan dengan jenis pengukuran wawancara dan kuesioner. Skala merupakan bagian dari desain penelitian penomoran terhadap pendapat subjek mengenai hal-hal yang dirasakan ataupun keadaan fisiologis subjek. (Nursalam, 2008)

Visual Analog Scale (VAS). Jenis pengukuran ini dipergunakan untuk mengukur pengalaman subjektif, misalnya nyeri, mual, sesak. Jenis ini dapat diukur dengan menggunakan suatu garis dimulai dari garis paling awal (paling ringan) sampai garis paling akhir (paling berat).

Pengukuran VAS pada nyeri biasanya digambarkan seperti di bawah ini dengan nilai mulai dari 0-100;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan, memberi suatu nama, situasi atau fenomena dalam menemukan ide baru (Nursalam, 2008).

Peneliti akan menggunakan instrumen berupa skala pengukuran *visual analog scale* (VAS) yang bertujuan untuk melihat gambaran pemberian auditory murottal terhadap penurunan rasa nyeri Ibu inpartu kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016

C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ibu inpartu primigravida kala I fase aktif yang datang ke Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa tahun 2016, yang diambil sejak bulan April sampai dengan Juni 2016, yaitu sebanyak 9 orang.

D. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi (Hidayat, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *non random (nonprobability)* sampling berupa *consecutive sampling*. Menurut Sugiyono (2001), *consecutive sampling* merupakan cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi (Hidayat, 2007).

Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dalam suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2008).

- a. Ibu inpartu primigravida kala I fase aktif di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa
- b. Persalinan fisiologis (tanpa penyulit)
- c. Ibu tidak mengalami gangguan jiwa
- d. Ibu beragama Islam
- e. His adekuat
- f. Ibu belum pernah diberi perlakuan auditory murottal

- g. Ibu inpartu kala I fase aktif hadir pada saat penelitian
- h. Ibu inpartu kala I fase aktif bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah karakteristik sampel yang layak untuk diteliti, tetapi suatu hal sehingga sampel tersebut tidak layak untuk diteliti (Nursalam, 2008).

- a. Ibu inpartu patologis kala I fase aktif yang datang ke Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa.
- b. Keadaan pada kala I fase aktif yang tiba-tiba menjadi patologis.
- c. Ibu inpartu fisiologi kala I fase aktif yang tidak bersedia untuk diteliti

E. *Besar sampel*

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Solvin (Saryono, 2010) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi (pada bulan terakhir)

e : standar error (10%)

Diketahui : N : (63 + 60 + 63) : 3 = 62 orang

e : 0,1 → e²=0,01

$$n = \frac{62}{1+62(0,1)^2}$$

$$n = \frac{62}{1+62(0,1)}$$

$$n = \frac{62}{1 + 6,2}$$

$$n = \frac{62}{7,2}$$


$$n = 8,6$$

Jadi, besar sampel sebanyak 9 orang.

F. Metode Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah lembar instrumen skala pengukuran nyeri. Dalam penelitian, pengamatan (observasi) adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Notoatmojo, 2012). Lembar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur intensitas nyeri yang sedang dialami klien atau responden.

G. Alur Penelitian



Gambar 3.1

H. Pengolahan dan Analisis Data

I. Pengolahan Data

Data yang diperoleh nantinya akan diolah secara manual serta disajikan dalam bentuk tabel. Setelah itu, data tersebut kemudian akan dianalisa secara deskriptif. Adapun proses pengolahan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Seleksi data (*Editing*)

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. Pemberian kode (*Coding*)

Merupakan pemberian kode numerik terhadap data. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode yang artinya dalam satu buku (*code book*) untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel.

c. Memasukkan data (*Entry*)

Data yang sudah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer untuk diolah.

d. Pengelompokan data (*Tabulating*)

Setelah dilakukan kegiatan *editing* dan *coding*, dilanjutkan dengan mengelompokkan data ke dalam suatu tabel menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian dicari besarnya persentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada.

I. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah kemudian dibuat dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

J. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Informed consent

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan peneliti, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada dalam *informed consent* tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain.

2. Tanpa Nama (*Anonimity*)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencamtumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Agustus 2016 dengan jumlah sampel 5 responden dari 9 responden, diperoleh setelah melakukan identifikasi data pasien yang masuk dalam kriteria inklusi peneliti, dan data primer yang diperoleh melalui perlakuan yang diberikan kepada responden. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara manual dan dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No. Responden	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	Perubahan
1	77	84	+7
2	48	39	-9
3	55	51	-4
4	58	51	-7
5	45	36	-9

Tabel: 4.1 (Hasil penelitian *pre-test*, *post-test*)

Berikut merupakan data dasar (demografi) dari responden yang telah diteliti sebagai responden:

Responden	Usia	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan	Pendamping Persalinan
1	20 tahun	SMP	IRT	Suami
2	26 tahun	SMA	IRT	Suami, Tante (kerabat)
3	24 tahun	SMA	IRT	Suami, Ibu, (kerabat)
4	27 tahun	SMA	Wiraswasta	Suami, Ibu,

				Nenek
5	26 tahun	SMA	IRT	Suami, Ibu

Tabel: 4.2 Data Dasar (demografi) Responden

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa, hasil responden 1: Ada perubahan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan perlakuan *auditory murottal*, tercatat dari 77 menjadi 84. Dalam hal ini, terjadi peningkatan skala atau intensitas nyeri sebanyak 7 poin. Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari data sekunder responden, yaitu buku Keesehatan Ibu dan Anak, maka diperoleh informasi, bahwa: Responden I ketika melakukan persalinan pertama (*Primigravida*) saat itu berusia 20 tahun, dengan tingkat pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), serta didampingi oleh suami ketika melewati proses persalinan (dari kala I sampai kala III).

Responden 2: Ada perubahan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan perlakuan *auditory murottal*, tercatat dari 48 menjadi 39. Berbeda dengan responden sebelumnya, responden ini mengalami penurunan skala atau intensitas nyeri sebanyak 9 poin. Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari data sekunder responden, yaitu buku Keesehatan Ibu dan Anak, maka diperoleh informasi, bahwa: Responden 2 ketika melakukan persalinan pertama (*Primigravida*) saat itu berusia 26 tahun, dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), serta didampingi oleh suami dan tante (kerabat) ketika melewati proses persalinan (dari kala I sampai kala III).

Responden 3: Ada perubahan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan perlakuan *auditory murottal*, tercatat dari 55 menjadi 51. Dalam hal ini, terjadi penurunan skala atau intensitas nyeri sebanyak 4 poin. Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari data sekunder responden, yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak, maka diperoleh informasi, bahwa: Responden 3 ketika melakukan persalinan pertama (*Primigravida*) saat itu berusia 24 tahun, dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), ketika melewati proses persalinan (dari kala I sampai kala III), responden 3 didampingi oleh suami dan ibunya.

Responden 4: Ada perubahan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan perlakuan *auditory murottal*, tercatat dari 58 menjadi 51. Tak jauh berbeda dengan responden sebelumnya, dalam hal ini terjadi penurunan skala atau intensitas nyeri sebanyak 7 poin. Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari data sekunder responden, yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak, maka diperoleh informasi, bahwa: Responden 4 ketika melakukan persalinan pertama (*Primigravida*) saat itu berusia 27 tahun, dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai wiraswasta, ketika melewati proses persalinan (dari kala I sampai kala III), responden 4 didampingi oleh suami dan ibu dan neneknya.

Terakhir, yaitu Responden 5: Ada perubahan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan perlakuan *auditory murottal*, tercatat dari 45 menjadi 36. Sama halnya dengan ke-tiga responden sebelumnya, pada responden kali ini mengalami

penurunan skala atau intensitas nyeri sebanyak 9 poin. Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari data sekunder responden, yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak, maka diperoleh informasi, bahwa: Responden 5 ketika melakukan persalinan pertama (*Primigravida*) saat itu berusia 26 tahun, dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), ketika melewati proses persalinan (dari kala I sampai kala III), responden 5 didampingi oleh suami dan ibunya.

B. Pembahasan

Dari hasil yang didapat, 80% responden (4 dari 5 orang) mengalami penurunan yang bervariasi yang dimulai dari 4 hingga 9 poin, sedangkan 1 responden mengalami peningkatan skala atau intensitas nyeri sebanyak 7 poin.

Persepsi nyeri tiap individu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Intensitas nyeri yang dirasakan setiap individu dapat sangat subjektif dan bisa dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda pula.

Hal ini mendorong dilakukannya metode penurunan skala atau derajat nyeri yang lebih objektif. Umur, pekerjaan (aktivitas fisik) dan pendamping persalinan (support system) seseorang dapat mempengaruhi persepsi nyeri terhadap penurunan nyeri.

Hal di atas sejalan dengan teori menurut Perry & Potter (2005), bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri, antara lain; usia, jenis kelamin,

kebudayaan, makna nyeri, perhatian, ansietas, kelelahan, pengalaman sebelumnya, gaya coping, dukungan keluarga dan sosial (Judha dkk, 2012).

Dalam Hartanti (2005), mengatakan bahwa usia, aktivitas fisik dan *support system* merupakan sebagian dari beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri. Dalam hal ini, usia muda cenderung dikaitkan dengan kondisi psikologis yang masih labil, yang memicu terjadinya kecemasan sehingga nyeri yang dirasakan menjadi lebih berat. Serta tersedianya sarana dan *support system* yang baik dari lingkungan dalam mengatasi nyeri, dukungan keluarga dan orang terdekat sangat membantu mengurangi rangsang nyeri yang dialami seseorang saat mengalami persalinan.

Dari semua responden yang diteliti, ternyata responden 1 merupakan responden termuda dari segi usia, dan yang paling sedikit memiliki pendamping ketika hendak melakukan persalinan, yaitu suami saja. Berbeda dengan responden lain yang suami, ibu dan kerabat juga ikut serta dalam memberikan *support system*.

Walaupun semua responden merupakan pasien *primigravida*, yaitu pasien dengan kehamilan yang pertama tanpa penyulit ketika melakukan persalinan, tetapi dampak dari perlakuan yang diberikan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Terbukti dari 5 responden yang diteliti, ternyata hanya ada 1 responden yang mengalami peningkatan skala atau intensitas nyeri, sedangkan 4 lainnya mengalami penurunan setelah diberikan perlakuan berupa memperdengarkan *auditory murottal*.

Dari data dasar, ternyata responden 1 yang paling muda usianya, sehingga hal ini kemungkinan mempengaruhi tingkat persepsi nyeri seseorang dan kemampuan seseorang dalam mengatasi rasa nyeri.

Terapi musik religi dipercaya dapat menenangkan fisik, psikis dan spiritual yang pada akhirnya dapat menurunkan kala nyeri persalinan. Sri Karyati dan Noor Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul “*Aplikasi Terapi Musik Religi sebagai Upaya Menurunkan Skala Nyeri Persalinan di Kab.Kudus Tahun 2015*” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan skala nyeri antara kelompok yang mendapat terapi musik religi dengan yang tidak mendapatkannya dengan nilai $p=0,00$ (Karyati dan Hidayah, 2015)

Bacaan ayat-ayat al-Qur’an dapat menenangkan hati, sebagaimana diterangkan dalam surah ar-ra’d ayat 28, yaitu :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.” (Qs Ar-Ra’d/13: 28)

Ayat di atas kemudian diperkuat oleh hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْهِمْ وَنَزَلَتْ وَعَشِيَّتُهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَفَّتُهُمْ إِلَّا وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ يَذْكُرُونَ قَوْمٌ يَقْعُدُ لَا

عِنْدَهُ فِيمَنْ اللَّهُ وَذَكَرَهُمُ السَّكِينَةُ

Terjemahnya:

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah (masjid) Allah, mereka membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya” (HR. Muslim, no.2700).

Dalam hadits ini disebutkan keutamaan “sekelompok orang yang berdzikir kepada Allah”. Dalam hadits lain lebih dijelaskan bentuk dzikir yang mereka lakukan, sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah; mereka membaca Kitab Allah dan saling belajar diantara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan (para malaikat) di hadapanNya.” [HR Muslim, no. 2699; Abu Dawud, no. 3643; Tirmidzi, no. 2646; Ibnu Majah, no. 225; dan lainnya].

Dalam Remolda (2009), salah-satu teknik distraksi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan adalah terapi murottal (mendengarkan bacaan ayat-ayat suci al-Qur’an). Hasil penelitian yang telah dilakukan dr. Al-Qadhi, direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika Serikat tentang pengaruh mendengarkan ayat suci al-Qur’an pada manusia terhadap perspektif fisiologis dan psikologis. Berhasil membuktikan hanya dengan

mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dapat merasakan perubahan fisiologis dan psikologis yang sangat besar. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan 97% bahwa mendengarkan ayat suci al-Qur'an memiliki pengaruh mendatangkan ketenangan dan menurunkan ketegangan urat syaraf reflektif. (Handayani dkk, 2014).

Abdurrachman dkk (2008) mengatakan bahwa stimulan murottal al-Qur'an sebagai terapi audio dapat memunculkan gelombang delta di daerah frontal dan sentral sebelah kanan dan kiri otak. Daerah frontal sebagai pusat intelektual umum dan pengontrol emosi, sedangkan daerah sentral sebagai pusat pengontrol gerakan yang dilakukan (Maryati dan Hartanti, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmi Handayani, dkk yang berjudul *Pengaruh Terapi Murottal al-Qur'an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan dan Kecemasan dalam Persalinan Primigravida Kala I Fase Aktif di RSUD Prof. dr. Margono Soekardjo Tahun 2014* dengan jenis penelitian *pre-eksperimen* dengan rancangan *one group pretest and posttest design*. Sampel penelitian ini sebanyak 42 ibu bersalin. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *consecutive sampling*. Analisis menggunakan uji *paired t test*. Rata-rata intensitas nyeri sebelum terapi murottal adalah 6,57, rata-rata setelah dilakukan terapi murottal adalah 4,93.

Uji *paired t-test* menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata penurunan intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal dengan nilai $p \text{ value} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Rata-rata kecemasan sebelum terapi

murottal adalah 26,67, rata-rata setelah dilakukan terapi murottal adalah 20,52. Uji *Paired t test* menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata penurunan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal dengan nilai $p\text{ value} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Bidan sebaiknya menerapkan terapi murottal pada setiap ibu bersalin karena dapat mengurangi nyeri persalinan secara mudah dan ada perbedaan rerata penurunan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal.

Kekurangan penelitian ini adalah jumlah sampel yang kurang sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Waktu penelitian yang kurang sehingga mempengaruhi pengumpulan sampel yang *representatif*. Masalah lain yang dihadapi di lahan adalah menurunnya jumlah ibu-ibu partus di Rumah Bersalin Mattiro Baji akibat makin meningkatnya peran bidan desa dan bidan setempat yang memiliki BPS (Bidan Praktek Swasta). Maka berhubung jumlah responden tidaklah memenuhi jumlah sampel yang seharusnya, maka penelitian ini tidak disuguhkan dalam bentuk analitik sebagaimana mestinya, melainkan hanya diobservasi per kasus saja.

Kelebihannya adalah penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang dilakukan di Rumah Bersalin Mattiro Baji, sehingga pasien dan keluarga maupun para bidan yang bertugas cukup heran dengan apa yang sedang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Terdapat 80% responden (4 dari 5 orang) mengalami penurunan yang bervariasi yang dimulai dari 4 hingga 9 poin, sedangkan 1 responden mengalami peningkatan skala atau intensitas nyeri sebanyak 7 poin.
- b. Terdapat tingkat nyeri ibu inpartu kala I fase aktif sebelum diberikan *auditory murottal* berkisar antara 45-77 poin.
- c. Terdapat penurunan tingkat rasa nyeri persalinan setelah pemberian *auditory murottal* pada ibu inpartu kala I fase aktif pada 80% responden, yaitu sebanyak 4 orang.
- d. Terdapat penurunan tingkat rasa nyeri sebanyak 4-9 poin pada 80% responden.

B. Saran

1. Bagi Praktek Kebidanan

Untuk bidan di klinik maupun rumah sakit supaya menggunakan metode masase sebagai salah satu intervensi dalam mengurangi nyeri persalinan kala I fase aktif.

2. Bagi Penelitian Kebidanan

Penelitian ini dapat diperkuat dengan banyaknya jumlah sampel yang akan diteliti disertai dengan data dasar (demografi) yang cukup memadai dari sebelumnya.

3. Bagi Responden

Untuk dapat melakukan *auditory murottal* ataupun pendamping persalinan yang melakukannya sebagai salah satu intervensi untuk mengurangi skala atau intensitas nyeri ibu selama proses persalinan kala I fase aktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Digital Versi 0.2. Freeware Hak Cipta hanya Milik Allah SWT, 2004
- Andriana, Evariny. *Melahirkan Tanpa Rasa Sakit dengan Metode Relaksasi HypnoBirthing*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2013.
- Asmadi. *Teknik Prosedural Keperawatan Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika, 2009
- Asrinah dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Handayani, Rohmi dkk. *Jurnal Ilmiah Kebidanan: Pengaruh terapi murottal al-Qur'an untuk Penurunan Nyeri Persalinan dan Kecemasan pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif, Vol. 5 No. 2 Edisi Desember 2014*. Diakses pada 23 April 2015.
- Hartanti. *Relaksasi Klien Post Operasi Sectio Ceasare*. Jakarta: Henderon, 2005.
- Hidayat, A Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2007
- Hidayat, A Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika, 2009
- Hidayat, A Aziz Alimul. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008
- Husna, Ulya. *Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Perbedaan Intensitas Nyeri Persalinan Fase Aktif Kala I Pada Primigravida di Wilayah Kerja Puskesmas Dgung-Dangung Tahun 2010*. Diakses pada 28 Oktober 2015, pukul 12.24 Wita <http://repository.unand.ac.id/17931>
- Judha, Mohammad dkk. *Teori Pengukuran Nyeri & Nyeri Persalinan*. Yogyakarta: Muha Medika, 2012.
- Karyati, Sri, Noor Hidayah. *Aplikasi Terapi Musik Religi sebagai Upaya Menurunkan Skala Nyeri Persalinan di Kab.Kudus Tahun 2015*. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 18.07 Wita <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1575>
- Lailiyana, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC, 2012.

- Mander, Rosemary. *Nyeri Persalinan*. Jakarta : EGC, 2004
- Mander, Rosemary. *Nyeri Persalinan*. Jakarta : EGC, 2012
- Maryani, Eva Dwi dan Hartati, Elis. *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirmn Journal of Nursing): Intervensi Terapi Audio denagn Murottal Surah Ar-rahman Trhadap Perilaku Anak Autis*. Volume 8, No.2, Juli 2013.
- Maryunani, Anik. *Nyeri dalam Persalinan "Teknik dan Cara Penanganannya"*. Jakarta: Trans Info Media, 2010
- Maya. *Buku Pintar Kehamilan*. Jakarta: EGC, 2010
- Notoatmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika, 2008
- Prasetyo, Sigit Nian. *Konsep dan Proses Perawatan Nyeri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 4. Jakarta: Bina Pustaka, 2010
- Saleha, Siti. *Asuhan pda Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2009
- Saryono, A. *Metodologi Penelitian Kebidanan DIII, DIV, S1, S2*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an Vol. VI, Vol. VIII, dan Vol. XI*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Silvia, R. *Terapi Musik sebagai Teraupeutik*. Diakses pada 27 Mei 2014, pukul 15.50 Wita. <http://forum.psikologi.ugm.ac.id>
- Smeltzer, Suzanne, dan Bare, Brende. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Sudarth*. Jakarta: EGC, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*. Bandung : Alfabeta, 2013

Suheimi. *Perawatan Masa Nifas*. Yogyakarta: Fitramaya, 2008

Tamsuri, Anas. *Konsep dan Penatalaksanaan Nyeri*. Jakarta: EGC, 2007

Wahida S, dkk. *Jurnal Kedokteran Brawijaya: Terapi Murotal Al-Qur'an Surat Ar-rahman Meningkatkan Kadar β -Endorphin dan Menurunkan Intensitas Nyeri pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif, Vol. 28, No. 3, Februari 2015*. Diakses pada 17 Oktober 2015, pukul 16.20 Wita
<http://www.jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/672/441>

<http://tafsirq.com/67-al-mulk/ayat-2> diakses pada 31 Oktober 2015.

<http://ana-sukmawatikadir87.blogspot.com/2012/04/manfaat-alquran-bagi-kesahatan.html> Diakses pada 27 April 2014, pukul 20.00 Wita

<http://www.slideshare.net/miaramadhini/patofisiologi-nyeri-demam-serta-obat-analgetik>. Diakses pada 1 November 2015, pukul 10.30 Wita

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../4/Chapter%20I>. Diakses pada 1 November 2015, pukul 10.35 Wita

<http://majalah1000guru.net/2015/02/skala-nyeri/>, Diakses pada 1 November 2015, pukul 10.45 Wita

<http://almanhaj.or.id/3001-keutamaan-dan-bentuk-majlis-dzikir.html>. Diakses pada 10 November 2016, pukul 20.10 Wita.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : FIK/PP.00.9/ /2015

Makassar, November 2015

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa

di-

Gowa

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Semester IX (Sembilan) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Ulfa Diana
NIM	: 70400011070
Judul	: Gambaran Pemberian Auditory Marattal Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif di Rumah Bersalin Mattiro baji Kab.Gowa Tahun 2015

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal penelitian .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes./
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 03 November 2015

K e p a d a

Nomor : 070/ 3415 /BKB.P/2015

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data

Yth. Ka. RB Mattiro Baji

Kab. Gowa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor : FIK/PP.00.9/2365/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Rekomendasi Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Ulfa Diana**
Tempat/Tanggal Lahir : Wonomulyo, 27 November 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Manruruki Raya No. 12 A

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"GAMBARAN PEMBERIAN AUDITORY MUROTTAL TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI IBU INPARTU KALA I FASE AKTIF DI RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI KAB. GOWA TAHUN 2015"**.


Selama : 02 s/d 11 November 2015
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Wakil Dekan Bid. Akademik FIK UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 13 Juli 2016

K e p a d a

Nomor : 070/1471/BKB.P/2016

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ka. RB. Mattiro Baji Kab. Gowa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 9374/S.01.P/P2T/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Ulfa Diana**
Tempat/Tanggal Lahir : Wonomulyo, 27 November 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Mannuruki Raya No. 12 A

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"GAMBARAN PEMBERIAN AUDITORY MUROTAL TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI IBU INPARTU KALA I FASE AKTIF DI RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI KABUPATEN GOWA TAHUN 2016"**.

Selama : 01 Juli s/d 15 Agustus 2016
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Camat Somba Opu Kab. Gowa;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 9374/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.00.9374562016 tanggal 27 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ULFA DIANA**
Nomor Pokok : 70400011070
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GAMBARAN PEMBERIAN AUDITORY MUROTTAL TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI IBU INFARTU KALA I FASE AKTIF DI RUMAH BERSALIN MATTIRO BAJI KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 15 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan kelentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth

1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal

SIMAP BKPM 30-06-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Ulfa Diana
Nim : 70400011070
Tempat/tanggal lahir : Wonomulyo, 27 November 1993
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Lr2 19A, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poewali Mandar,
Sulawesi Barat. 91352
No. Telepon : 085340652110
Email : ulfadianamustari@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN 007 Sidodadi
SMPN 1 Wonomulyo
SMAN 1 Wonomulyo
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Mustari Salta
Nama Ibu : Almh. Amusriani Usman