

**PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK  
TERHADAP UKURAN *TIBIA* DAN *FEMUR* AYAM *BROILER***



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Peternakan Pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
60700113015  
M A K A S S A R

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Ukuran *Tibia* dan *Femur* Ayam Broiler” yang disusun oleh **MUDARSYAH**, NIM: **60700113015**, mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, dinyatakan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan.

Samata, Agustus 2017 M  
Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T.,M.T.	(.....)
Sekretaris	: Astati, S.Pt., M.,Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irmawaty, S.Pt.,M.P.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Khaerani Kiramang, S.Pt.,M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P.	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahamat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta shalawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman khalifah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Melengkapi rasa syukur atas segala himbauan dan pengarahan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ambo H. Lapaleng dan Ibunda Hasniah, Saudara-saudara, keluarga tersayang atas semangat, kasih sayang, do'a dan dukunganya.
2. Kepada Pimpinan Institusi Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fak. Sains dan Teknologi Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si, Sekertaris jurusan Ibu Astati, S.Pt., M.Si dan staf jurusan ilmu peternakan Andi Afriana, S.E.
3. Dosen Pembimbing Ibu Khaerani Kiramang S.Pt., M.P sebagai pembimbing 1 dan Bapak Muh, Nur Hidayat S.Pt., M.P selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada para penguji yang senantiasa memberikan kritik, saran dan masukan, Ibu Irmawaty S.Pt.,M.P selaku penguji 1 dan Bapak Dr. Thahir Maloko M.Ag selaku penguji 2.
5. Tim Laboratorium Jurusan Ilmu Peternakan Ibu Drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si, Kak Muh Arsan Jamili S.Pt., M.Si dan Kak Hikmawati S.Pt atas segala bantuan dan arahannya selama penelitian berlangsung.
6. Teman-teman Tim Penelitian Probiotik yang senantiasa menyemangati, menemani dalam proses penelitian, memberi dukungan dan setia memberi bantuan, sampai pada penghujung ujian tutup.
7. Teman-teman Banteng 2013 yang tiada hentinya selalu mendampingi dalam suka dan duka, memberikan semangat dan canda serta kakanda-kakanda 2011, 2012 dan adik-adik tercinta angkatan 2014, 2015 dan 2016.
8. Teman-teman KKN Angkakan 53 Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng atas semangat dan dukungannya.
9. Ikhwa-ikhwa MPM UIN Alauddin Makassar dan LK An-Nuur Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberi support.
10. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik itu waktu serta pemikirannya.

Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat amal yang setimpal disisi Allah swt dan dapat bermanfaat terkhusus pada mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Amin.


Samata, 8 Agustus 2017

Penulis  
Mudarsyah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Defenisi Operasional .....	3
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
G. Hipotesis .....	5
H. Kajian Terdahulu .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Ayam Broiler .....	6
B. Tinjauan Al Quran dan Ternak .....	12
C. Probiotik .....	16
D. Panjang Serta Besar <i>Tibia</i> dan <i>Femur</i> .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Waktu dan Tempat .....	43
B. Alat dan Bahan .....	43
C. Jenis Penelitian .....	43

D. Metode Penelitian.....	44
E. Parameter yang di Ukur .....	46
F. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Pengamatan .....	47
B. Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Bahan Penyusun Ransum Penelitian.....	45
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian.....	45
Tabel 3. Rataan panjang <i>tibia</i> dan <i>femur</i> .....	47
Tabel 4. Rataan besar <i>tibia</i> dan <i>femur</i> .....	47



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Ayam.....	42





**ABSTRAK**

**Nama Penyusun** : Mudarsyah  
**Nim** : 60700113015  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul Skripsi** : “Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Ukuran *Tibia* Dan *Femur* Ayam Broiler”

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap ukuran *tibia* dan *femur* pada ayam broiler yang dilaksanakan di kandang unggas dan Laboratorium animal husbandry Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode yang digunakan adalah eksperimen rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan. Parameter yang diukur yaitu pertambahan besar dan panjang *tibia* dan *femur* yang diukur setelah pemeliharaan selama 5 minggu, pengukuran dilakukan dengan menggunakan mistar dan meteran. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu, tanpa penambahan probiotik (P0), penambahan probiotik 1 ml (P1), penambahan probiotik 3 ml (P2) dan penambahan probiotik 5 ml (P3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata ( $P < 0.05$ ) terhadap panjang dan besar *tibia*.

*Kata kunci: Probiotik, Broiler, Tibia, Femur.*

**ABSTRACT**

**Name** : Mudarsyah  
**Nim** : 60700113015  
**Majors** : Science Animal Husbandry  
**Title Thesis** : “The Effect of Probiotics on Size *Tibia* And *Femur* of Broiler”

---

Research aims to understand the effect probiotics to size the *tibia* and *femur* of broiler to be implemented in poultry cage and laboratory Animal Husbandry of the Science and Technology Faculty of Islamic State University Alauddin Makassar. Methods used is using random design complete (RAL) with 4 treatment 3 test. Parameter examined is Long and large of the *tibia* and *femur* after maintenance 5 weeks, measuring with use bar and the meter. Ration used was consisted of, without additional probiotics (P0), the addition of probiotics 1 ml (P1), 3 ml (P2) and 5 ml (P3). The results showed that treatment influential real ( $P < 0.05$ ) of long and large *tibia* broilers.

*keywords: Probiotics, Broilers, Tibia, Femur.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Broiler adalah salah satu komoditas unggas yang menjadi penghasil daging potensial di Indonesia. Broiler juga memiliki peranan penting dan mendukung ketersediaan protein hewan yang murah. Seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pola makan dan besarnya kebutuhan tubuh akan nutrisi. Membuat kebutuhan daging di Indonesia juga semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan daging yang cukup dan berkualitas. Sebagai produk utama, daging memiliki peran besar dalam usaha pemeliharaan ternak potong. Ketersediaan pakan baik kuantitas ataupun kualitasnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daging yang akan dihasilkan, sedangkan faktor penting lainnya adalah jenis bibit dan bagaimana manajemen pemeliharaan yang diterapkan.

Tulang pada broiler seolah luput dari perhatian, sehingga terkadang banyak masalah yang timbul dari kekurangan gizi pada tulang. Misalnya tulang yang masih sangat kecil, lembek dan biasa terjadi kelumpuhan. Para peneliti mengembangkan genetik broiler agar dapat menghasilkan daging yang maksimal dalam waktu singkat. Akan tetapi, Pertumbuhan daging yang cukup signifikan tersebut ternyata tidak didukung oleh pertumbuhan organ-organ lainnya termasuk tulang dan sendi. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas genetik ayam yang menghasilkan daging dalam waktu singkat maka berimbas pada semakin tingginya kasus kelumpuhan

pada ayam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat sehingga menghasilkan pakan yang mempunyai kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan ternak dengan efisiensi penggunaan pakannya yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada tulang serta bisa menekan biaya produksi. Salah satunya digunakan tepung probiotik. Serangkaian penelitian pemanfaatan probiotik dalam pakan telah dilakukan di Balai Penelitian Temak secara *in vitro* maupun *in vivo* dengan basil yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap peningkatan pencernaan komponen serat pakan maupun terhadap produktivitas ternak (Haryanto dan Djajanegara, 1998).

Mikroba yang dapat tumbuh dan berkembang dalam usus ayam, antara lain jenis Bakteri Asam Laktat (BAL) dan *Bacillus* sp. Seiring dengan meningkatnya kerja saluran pencernaan dalam mengkonsumsi dan menyerap zat-zat nutrisi dalam usus terutama protein, maka pemberian probiotik akan meningkatkan produksi daging dan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi pada tulang, khususnya pada tulang tibia dan femur.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu diadakannya penelitian terhadap penggunaan pakan aditif, berupa tepung probiotik bagi broiler untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ukuran tibia dan femur broiler.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh pemberian probiotik terhadap ukuran tibia dan femur ayam broiler ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan yang terdapat pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap ukuran tibia dan femur ayam broiler.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga peternak dan pelaku bisnis di dalam rantai usaha peternakan broiler, sebagai objek penelitian dan pihak lainnya yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat mengenai manfaat probiotik sebagai pakan aditif yang dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan besar serta panjang, tibia dan femur.
2. Sebagai sumber informasi, bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang manfaat probiotik.
3. Memberi informasi, masukan, wawasan serta pengalaman sarana pembelajaran dan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh bagi peneliti.
4. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang membutuhkan.
5. Menjadi sarana pengetahuan untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat menerapkan tambahan pakan tepung probiotik bagi broiler agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.

### ***E. Defenisi Operasional***

Broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (*Broiler*) adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik.

Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain/inangnya beberapa contoh pada makanan suplemen diet menjadikan bakteri asam laktat (*Lactic Acid Bacteria*–LAB) sebagai mikroba yang paling umum dipakai.

Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraselular. Matriks tulang adalah bagian terkeras yang terletak dilapisan luar tulang, yang diakibatkan oleh pengendapan mineral dalam matriks, sehingga tulang pun mengalami kalsifikasi.

Tibia adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan dua ujung. Ujung atas memperlihatkan adanya kondil medial dan kondil lateral. Kondi-kondil ini merupakan bagian yang paling atas dan paling pinggir dari tulang. Permukaan superior memperlihatkan dua dataran permukaan persendian untuk femur dalam formasi sendi lutut.

Femur adalah tulang yang terbesar dan terkuat dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Femur atau tulang paha juga tempat melekat untuk banyak otot dan ligamen. Femur adalah yang terbesar dan terkuat tulang dalam tubuh manusia dan membuat seperempat dari tinggi tubuh.

### ***F. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh probiotik terhadap ukuran tibia dan femur broiler.

### ***G. Hipotesis***

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa pemberian probiotik dapat mempengaruhi ukuran tibia dan femur broiler.

### ***H. Kajian Terdahulu***

Widodo dkk, (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh lama periode pemberian pakan terhadap laju pertumbuhan pada beberapa bagian tubuh ayam pelung umur 1 sampai 11 minggu. Dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh lama periode pemberian pakan terhadap laju pertumbuhan pada beberapa bagian tubuh ayam pelung umur 1 sampai 11 minggu yaitu tidak terdapat pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tulang.

Penelitian Azis dkk (2013), tentang penggunaan berbagai jenis probiotik dalam ransum ayam Arab berpengaruh tidak nyata ( $P > 0.05$ ) terhadap konsumsi pakan dan *Income Over Feed cost*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan berbagai jenis probiotik dalam ransum ayam Arab tidak memengaruhi efisiensi konsumsi pakan dan *Income Over Feed cost* ayam Arab umur 91 minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Ayam Broiler***

##### **1. Sejarah Ayam Broiler**

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Sebenarnya broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan panggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5 sampai 6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia (Anonim, 2016).

##### **2. Klasifikasi Ayam Broiler**

Taksonomi ayam menurut Khalid (2011) adalah sebagai berikut:

Filum	: Chordata
Subfilum	: Vertebrata
Kelas	: Aves
Ordo	: Galliformes
Keluarga	: Phasianidae
Genus	: Gallus



Spesies : Gallus domesticus

Broiler adalah salah satu jenis ternak ayam yang mudah dipelihara, paling cepat pertumbuhannya, dan murah biaya pemeliharaannya. Daging broiler dapat segera dipasarkan dan dikonsumsi dalam waktu singkat (Suhaeni, 2007). Pemeliharaan ayam ras pedaging (broiler) diperlukan cara yang baik dan benar, sebab kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal pada pertumbuhan ayam (Hartono, 2001). Pemeliharaan itu sendiri adalah suatu kegiatan tata laksana peternakan secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang optimal (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).

Broiler adalah istilah yang dipakai untuk menyebut ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakter ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan cepat, penghasil daging dengan konversi pakan irit dan siap potong pada usia relatif muda. Pada umumnya broiler siap dipotong pada usia 35-45 hari (Murtidjo, 1993).

Menurut Rahayu dkk, (2011), broiler dan ayam pedaging dapat menghasilkan relatif banyak daging dalam waktu yang singkat. Adapun cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran badan ayam pedaging relatif besar, padat, kompak, dan berdaging penuh, sehingga disebut tipe berat.
- b. Jumlah telur relatif sedikit.
- c. Bergerak lambat dan tenang.
- d. Biasanya lebih lambat mengalami dewasa kelamin.
- e. Beberapa jenis ayam pedaging, mempunyai bulu kaki dan masih suka mengeram.

Broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Murtidjo, 1987).

Broiler mampu memproduksi daging secara optimal dengan hanya mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ciri-ciri broiler antara lain: ukuran badan relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, dan tenang serta lambat dewasa kelamin. Broiler baru dikenal menjelang periode 1980-an, sekalipun galur murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an ketika peternak mulai memeliharanya. Akan tetapi, broiler komersial seperti sekarang ini memang baru populer pada periode 1980-an. Sebelum ayam yang dipotong adalah ayam petelur seperti ayam *White Leghorn* jengger tunggal. Pada akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam untuk menggantikan atau membantu konsumsi daging ruminansia yang saat itu semakin sulit keberadaannya. Dari sinilah broiler komersial atau broiler final stock mulai dikenal dan secara perlahan mulai diterima orang (Rasyaf, 2007).

Kemampuan broiler mengubah ransum menjadi bobot hidup jauh lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung. Bahkan kemampuannya menyamai ternak poikilothermik seperti ikan emas. Nilai konversi makanannya sewaktu dipanen sekarang ini sudah mencapai nilai dibawah 2. Nilai ini berarti bahwa jika

mortalitas normal sekelompok broiler hanya memerlukan ransum kurang dari 2 untuk menghasilkan 1 kg bobot hidup (Amrullah, 2003).

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan pemeliharaan broiler adalah faktor lingkungan. Lingkungan pemeliharaan yang nyaman akan mengurangi level stress pada broiler. Daya tahan tubuh broiler akan lebih baik dalam lingkungan yang tidak berdebu, cukup oksigen, temperatur dan kelembaban sesuai, dan tidak terlalu padat. Kepadatan kandang yang ideal untuk daerah tropis adalah 8-10 ekor/m<sup>2</sup>, lebih dari angka tersebut, suhu kandang cepat meningkat terutama siang hari pada umur dewasa yang menyebabkan konsumsi pakan menurun, ayam cenderung banyak minum, stress, pertumbuhan terhambat dan mudah terserang penyakit. Sanitasi adalah usaha pemeliharaan dan pengawasan kebersihan secara menyeluruh yang meliputi kandang, alat, karyawan, dan bahkan ternak (Arifien, 2005).

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan broiler adalah pakan. Pakan merupakan 60-70% biaya pemeliharaan. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan (nutrisi) yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, sehingga penambahan berat badan perhari (*Average Daily Gain/ADG*) tinggi. Pemberian pakan dengan sistem *ad libitum* (selalu tersedia/tidak dibatasi). Apabila menggunakan pakan dari pabrik, maka jenis pakan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ayam, yang dibedakan menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama disebut tahap pembedaran (umur 1 sampai 20 hari), yang harus mengandung kadar protein minimal 20%. Tahap kedua disebut penggemukan (umur diatas 20 hari), yang memakai pakan berkadar protein 20%. Efisiensi pakan

dinyatakan dalam perhitungan FCR (Feed Conversion Ratio). Cara menghitungnya adalah, jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total bobot ayam yang dipanen (El-Kabumaini dan Ranuatmaja, 2008).

Pemeliharaan broiler terbagi menjadi dua periode yaitu periode *brooding* dan periode *finisher*. Periode *brooding* yaitu periode pemeliharaan sejak DOC (*Day Old Chicken*) datang sampai ayam dilepas dari induk buatan atau pemanas. Periode *finisher* yaitu pemeliharaan sejak dilepasnya induk buatan sampai ayam dipanen. Pemeliharaan periode *brooding* sampai *finisher* dapat berlangsung dalam waktu 6-9 minggu (Suhaeni, 2007). Periode *brooding* dan *finisher* saling berkaitan, sehingga periode ini membutuhkan perhatian khusus dalam pemeliharaannya demi tercapainya hasil yang maksimal.

### 3. Perkembangan Broiler Komersial di Indonesia

Perkembangan produksi broiler di Indonesia sempat mengalami pasang-surut. Perkembangan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga periode, yaitu :

#### a. Periode perintisan (1953-1960)

Pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi pasar lokal, di antara jenis ayam yang diimpor adalah *White Leghorn* (WL), *Island Red* (IR), *New Hampshire* (NHS) dan *Australop*. Impor ayam tersebut dilakukan oleh GAPUSI (Gabungan Penggemar Unggas Indonesia). Aksi yang dilakukan adalah melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan itu hanya sebagai kesenangan dan hobi, bukan untuk komersial.

b. Periode pengembangan (1961-1970)

Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 1967. Saat itu, Direktorat Jendral Peternakan dan Kehewan saat itu menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi perkapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 3,5 gram/kapita/hari.

c. Periode pertumbuhan (1971-1980)

Bimas broiler tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi saat itu. Sejalan dengan itu, permintaan penduduk terhadap broiler meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemilikan ayam di Indonesia ditingkat peternak menurun hingga lebih dari 50%. Pada tahun 1999 usaha broiler dan layer mulai mengalami kebangkitan.

Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihan. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia.

Cepatnya perkembangan usaha di bidang peternakan ayam didasarkan pada pertimbangan konsumsi ayam di Indonesia masih rendah, sebesar 4,6-4,8 kg per kapita per tahun. Keadaan ini jauh berbeda dibandingkan dengan konsumsi ayam di Negara Asia lainnya yang sebesar 30-40 kg per kapita per tahun. Perkembangan ini juga ditunjang oleh pergeseran taraf dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang

cenderung mengarah ke kehidupan modern. Selain itu, dipicu oleh adanya kesadaran untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, adanya sifat gengsi yang tinggi, serta sifat konsumtif masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia berada pada daerah yang tropis perkembangan usaha broiler komersial dari tahun ketahun semakin bertambah. Keadaan ini menunjukkan walaupun banyak kendala yang perlu dihadapi, usaha broiler tersebut tetap menjanjikan.

Berkembangnya usaha peternakan broiler komersial di Indonesia secara otomatis akan meningkatkan produksi daging ayam. Meningkatnya produksi daging broiler komersial menunjukkan semakin tinggi minat masyarakat terhadap produk tersebut. Peningkatan produksi ini juga menunjukkan masyarakat semakin sadar akan konsumsi protein hewani (Fadhilah, 2004).

### ***B. Tinjauan Al-Qur'an dan Ternak***

Salah satu jenis makhluk hidup yang Allah ciptakan yaitu mikrobia, produk yang dihasilkannya adalah probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak (Tomas Saputro, 2016).

Penjelasan singkat mengenai keberadaan mikrobia ini telah disampaikan dalam secara tidak langsung oleh Allah swt dalam firmanNya yang bisa dilihat pada beberapa ayat, salah satunya adalah QS. Al-Baqarah/2: 26,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا .....﴾ ٢٦

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu (Kementrian Agama, RI 2012).

Lafadz *fama fauqohaa* (atau yang lebih rendah dari itu) pada ayat tersebut menerangkan tentang makhluk yang lebih rendah dari nyamuk dalam hal makna fisik, mengingat bahwa nyamuk adalah makhluk yang tidak berarti.

Menurut Ibnu Katsir dalam Kitabnya ia menyatakan bahwa Makna ayat tersebut ialah bahwa Allah swt memberitahukan bahwa Dia tidak memandang remeh sesuatu pun. Ada yang mengartikan, tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja baik dalam bentuk yang kecil maupun besar.

Kata “maa” disini menunjukkan sesuatu yang kecil atau sedikit. Sedang kata “ba’uudlatan” dalam ayat itu berkedudukan sebagai badal (pengganti). Sebagaimana jika dikatakan, *la adlribanna dlarban maa* (aku akan memberikan perumpamaan apa pun), yang berarti sekecil apa pun itu. Atau “maa” berkedudukan sebagai nakirah (indefinite noun) yang disifati dengan kata *ba’udhah* (nyamuk).

Firman-Nya: *famaa fauqaHaa*. Mengenai penggalan ayat ini terdapat dua pendapat. Salah satu pendapat mengatakan: “Artinya lebih kecil dan lebih hina.” Sebagaimana seseorang yang disifati dengan tabiat “keji” dan “kikir”. Maka orang yang mendengarnya berkata: “Benar, bahkan ia lebih dari itu.” Maksudnya apa yang disifatkan. Ini adalah pendapat al-Kisa’i dan Abu Ubaid menurut ar-Razzi dan mayoritas muhaqqiqin.

Pendapat kedua menyatakan: “Lebih besar darinya” karena tidak ada yang lebih hina dan kecil daripada nyamuk. Ini pendapat Qatadah dan Ibnu Di’amah, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ مُحِيتَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ – مسلم

Artinya

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tidaklah dari seorang Muslim yang tertusuk duri hingga apa-apa yang lebih berat darinya, kecuali dicatat baginya derajat dan dihapus darinya dengan hal itu kesalahan (HR. Muslim).

Maka Allah memberitahukan bahwa Dia tidak pernah menganggap remeh segala sesuatu yang telah dijadikan-Nya sebagai perumpamaan. Meskipun hal yang hina dan kecil seperti nyamuk. Sebagaimana Dia tidak memandang enteng penciptaan-Nya, Dia pun tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk itu sebagaimana Dia telah membuat perumpamaan dengan lalat (lihat surah al-Hajj: 73) dan laba-laba (lihat surah Al-Ankabut: 41).

Adapun hewan yang lebih kecil dari ukura nyamuk, salah satunya adalah bakteri. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariotik serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik (mikroskopis). Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup didarat hingga lautan atau pada tempat-tempat yang ekstrim. Terdapat bakteri yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan (Warsinto, 1995)

Diayat yang lain Allah swt juga menjelaskan dan mempertegas bahwa setiap yang Allah ciptakan diatas permukaan bumi ini diketahui oleh-Nya, pada QS.

Yunus/10 : 61 sebagai berikut:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦١



Terjemahnya:

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) (Kementrian Agama RI, 2012).

Allah memberi kabar kepada Nabi-Nya saw. bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua keadaannya, keadaan umatnya dan keadaan semua makhluk dalam setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Dan sesungguhnya tidak luput dari pengetahuan dan penglihatan-Nya, perbuatan sebesar biji dzarah yang paling kecil dan paling rendah, baik di langit maupun di bumi, tidaklah yang lebih kecil atau yang lebih besar darinya, kecuali tercatat dalam Kitab yang nyata (Katsir, 2013).

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Nya tidak terlepas dari pengetahuan Allah meskipun hal tersebut sangat kecil melebihi benda yang terkecil. Misalnya saja mikroorganisme dalam hal ini bakteri yang tidak tampak oleh mata kita jika tanpa bantuan mikroskop, Allah swt lebih mengetahui hikmah yang terkandung dari makhluk kecil, yaitu meskipun bakteri sangat kecil tetapi bisa mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup lain.

Beberapa pakan ternak juga mengandung berbagai jenis bakteri, dimana bakteri-bakteri tersebut berbeda-beda sifatnya, ada yang bersifat toksin (berbahaya) dan ada juga yang bersifat non toksin (tidak berbahaya) bahkan ada yang bermanfaat seperti bakteri pada Probiotik. Probiotik adalah pakan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan

mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Fuller, 1997). Allah swt menyampaikan dalam ayat al-Qur'an untuk memperhatikan makanan, pada QS. Abasa/80: 24 :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ٢٤

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Kementrian Agama RI, 2012).

Adapun maksud dari ayat tersebut menurut Muhammad Quraisy Shihab (2002), dalam kitabnya yang berjudul tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat 24 mengajak untuk memerhatikan bahan makanannya dengan mata kepala dan mata hati. Ayat 24 seakan-akan berkata, Kalau manusia hendak melaksanakan tugasnya dengan baik maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan.

Begitupun dengan probiotik sebagai pakan tambahan untuk ternak, maka harus dilihat dan diperhatikan apakah baik atau berbahaya untuk ternak itu sendiri. Pakan yang digunakan juga harus diperhatikan sumber, kandungan dan proses pengolahannya, disebabkan karna hal itu bisa mempengaruhi halal atau haramnya daging ternak yang dihasilkan jika dikonsumsi oleh ternak.

### **C. Probiotik**

Probiotik adalah pakan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Fuller, 1997). Jasa mikroorganisme sebenarnya telah banyak dimanfaatkan manusia sejak lama. Berdasarkan gambar-gambar pada dinding dalam goa dari zaman purba, telah ada indikasi yang kuat bahwa bangsa Sumaria

pada tahun 2500 sebelum Masehi, telah mempunyai kebiasaan menambahkan inokulum pada susu untuk menstimulasi fermentasi, dan kebiasaan tersebut masih dilakukan sampai sekarang (Kroger, 1989).

Hampir semua bangsa di dunia mempunyai makanan tradisional, yang pembuatannya atau pengawetannya menggunakan mikroba. Pada umumnya, mereka menggunakan bakteri asam laktat saja atau dikombinasikan dengan mikroba lainnya. Di Indonesia, makanan yang disiapkan menggunakan mikroba antara lain adalah tape, asinan, bakasang, tempe, dan oncom. Dengan demikian, konsumsi mikroba dalam bentuk hidup maupun metabolitnya untuk kesehatan telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Namun apakah mereka sadar atau mengetahui manfaat mengonsumsi, tidak diketahui dengan pasti. Secara umum probiotik didefinisikan sebagai mikroba hidup yang digunakan sebagai pakan imbuhan dan dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya (Fuller, 1989).

Pemberian mikroba hidup tersebut dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan ekosistem mikroflora pencernaannya. Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan unggas mempengaruhi untuk kinerja dan kesehatan ternak. Ketidak seimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan karena terjadinya kolonisasi bakteri patogen atau mikroflora yang dapat mengganggu kinerja ternak. Sebagai bahan alternatif untuk pemacu tumbuh, probiotik dalam penggunaannya pada ternak dapat meningkatkan kinerja ternak. Hal demikian terjadi karena adanya variasi respon yang tinggi dari individual ternak terhadap jenis pakan imbuhan. Probiotik bukan bertindak sebagai nutrisi esensial

dimana tidak ada dosis respon, tetapi hanya ada level batas pemakaian. Cara kerja probiotik terutama melalui modifikasi populasi bakteri usus dan efektivitasnya tergantung atas status mikroba pada satu kelompok ternak dan pada individu ternak. Dengan demikian, dapat dimengerti jika efek yang terjadi mempunyai variasi yang tinggi. Perbedaan cara kerja dari *strain* probiotik sejauh ini belum dipahami, tetapi metabolit bakteri yang dihasilkan seperti asam organik khususnya pada bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH atau juga peroksida dan bakteriosin diperkirakan bertanggung jawab atas sifat antagonis terhadap bakteri patogen Gram positif seperti *Salmonella* (Fooks dan Gibson, 2002).

Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrisi. Terdapat beberapa mekanisme respon probiotik yaitu meliputi produksi bahan penghambat secara langsung, penurunan pH luminal melalui produksi asam lemak terbagi rantai pendek, kompetisi terhadap nutrisi dan tempat pelekatan pada dinding usus, interaksi bakterial (CE), resistensi kolonisasi contohnya *Lactobacilli* vs bakteri patogen, merubah respon imun, dan mengatur ekspresi gen *colonocyte* (Fooks dan Gibson, 2002)

Satu dari alasan penggunaan probiotik yaitu untuk menstabilkan mikroflora pencernaan dan berkompetisi dengan bakteri patogen, dengan demikian *strain* probiotik harus mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup. Secara umum, ada beberapa karakteristik dan kriteria keamanan yang harus dimiliki oleh probiotik (Gaggia, 2010) yaitu:

1. Nontoksik dan nonpatogenik.
2. Mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas.
3. Dapat hidup dalam spesies target.
4. Dapat bertahan, berkolonisasi dan bermetabolisme secara aktif dalam target

yang ditunjukkan dengan:

- a) Tahan terhadap cairan pencernaan dan empedu.
  - b) Persisten dalam saluran pencernaan.
  - c) Menempel pada ephitelium atau mucus.
  - d) Berkompetisi dengan mikroflora inang.
5. Memproduksi senyawa antimicrobial.
  6. Antagonis terhadap pathogen.
  7. Dapat merubah respon imun.
  8. Tidak berubah dan stabil pada waktu proses penyimpanan dan lapangan.
  9. Bertahan hidup pada populasi yang tinggi.
  10. Mempunyai sifat organoleptik yang baik.

Bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu *Lactobacillus* dan *Bifidobacteria*, kedua jenis bakteri ini dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan karena dapat menstimulasi respon imun dan menghambat patogen. Satu faktor kunci dalam seleksi *starter* probiotik yang baik yaitu kemampuannya untuk bertahan dalam lingkungan asam pada produk akhir fermentasi secara *in vitro* dan kondisi buruk dalam saluran pencernaan atau *in vivo*. Ketahanan probiotik pada kondisi *in vitro* dapat dipengaruhi oleh pembentukan metabolit oleh *starter* seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida dan bakteriosin (Saarela, 2000).

Berbagai jenis mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik diisolasi dari isi usus pencernaan, mulut, dan kotoran ternak atau manusia. Pada saat ini, mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai probiotik yaitu *strain Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Bacillus* spp., *Streptococcus*, *yeast* dan *Saccharomyces cereviceae*. Mikroorganisme tersebut harus non-patogen, Gram positif, *strain* yang spesifik, anti *E. coli*, tahan terhadap cairan empedu, hidup, melekat pada mukosa usus, dan minimal mengandung  $30 \times 10^9$  cfu/g (cfu: *colony forming units*) (Pal, 2006).

Lebih dari 21 bahan probiotik diijinkan penggunaannya sebagai pakan imbuhan di Uni Eropa, 13 diantaranya disahkan digunakan untuk anak babi dan hanya beberapa diantaranya untuk induk dan penggemukan babi. Tujuh dari bahan probiotik tersebut diseleksi dari *strain E. faecium* (penghuni usus pencernaan), dua *strain S. cereviceae* (dari buah-buahan) dan hanya satu produk mengandung *L. farciminis* dan *Pediococcus acidilactici* yang masing-masing penghuni usus pencernaan dan produk susu. Konsentrasi yang direkomendasi untuk hampir semua probiotik yaitu kira-kira  $10^8$  cfu/kg pakan (Simon, 2005).

Pada tahun-tahun terakhir ini, penelitian tentang probiotik telah difokuskan pada pembuktian dalam aspek keamanan dan kemanjuran *strain* yang terseleksi. Strategi penelitian untuk pembuktian kemanjuran meliputi pengaruh terhadap imunitas, studi anti-infeksi, percobaan secara klinis, kolonisasi dan perjalanannya sepanjang usus pencernaan, sedangkan untuk pembuktian keamanannya yaitu melalui karakterisasi toksisitas dengan mengukur pengaruhnya terhadap status kesehatan, konsumsi pakan dan morfologi mukosa pencernaan. Satu hal yang

sangat penting yaitu membuktikan bahwa aktivitas lisis dari enzim yang dikeluarkan oleh *strain* bakteri tidak dapat mencerna lapisan mucin. Hal lain yang dapat mempengaruhi kemanjuran penggunaan probiotik yaitu adanya antibiotik dan antimikoplasma dalam pakan (Pal, 2006).

Penelitian mengenai probiotik saat ini mencakup studi genomik dan sistematik struktur, kandungan dan evolusi genom secara menyeluruh. Penelitian terhadap kandungan gen dari *strain* memberi harapan ditemukannya gen yang penting dan pemahaman mekanisme yang ditempuh berasal dari hasil aktivitas bakteri probiotik yang menguntungkan. Penelitian genomik akan membawa pada pemahaman hubungan gen dan jaringan gen terhadap sifat fenotip, dan analisis ekspresi gen menjadi sangat penting untuk mengungkap sifat fungsional dan perilaku *strain* probiotik. Diperlukan serangkaian disiplin ilmu untuk memilih *strain* probiotik dan prebiotik yang tepat untuk penggunaan yang spesifik, dan menguji pengaruhnya terhadap mikroflora pencernaan juga pengaruhnya pada kesehatan inang (Haryati dkk, 2011).

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah jenis mikroba yang paling umum dipakai. BAL telah dipakai dalam industri makanan bertahun-tahun karena mereka mampu untuk mengubah gula (termasuk laktosa) dan karbohidrat lain menjadi asam laktat. Ini tidak hanya menyediakan rasa asam yang unik dari *dairy food* fermentasi seperti susu fermentasi, tetapi juga berperan sebagai penyedia, dengan cara mengurangi pH dan membuat kesempatan organisme merugikan untuk tumbuh lebih sedikit.

Bakteri Asam laktat (BAL) yaitu kelompok bakteri gram positif, katalase negatif yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi karbohidrat, selnya berbentuk kokus, tersusun berpasangan atau berbentuk rantai, tidak bergerak, tidak berspora, anaerob fakultatif, bersifat non motil dan mesofil (Ray, 2004).

Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari fermentasi glukosa termasuk didalam kelompok bakteri asam laktat bersifat homofermentatif, sedangkan Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan satu molekul asam laktat dan satu molekul etanol serta satu molekul karbon dioksida dikenal dalam kelompok Bakteri asam laktat bersifat heterofermentatif (Reddy *et al.*, 2008).

Bakteri Asam Laktat menghasilkan antibakteri berupa asam organik, bakteriosin, metabolit primer, hidrogen peroksida, diasetil, karbondioksida, asetaldehid dan menurunkan pH lingkungannya dengan mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat bakteri patogen (Usmiati, 2012).

Beberapa genera yang memproduksi bakteriosin dan mempunyai aktivitas hambat besar terhadap pertumbuhan beberapa bakteri patogen adalah *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Bifidobacterium* dan *Propioni bacterium* terdapat di dalam saluran pencernaan (Usmiati, 2012).

Ada 2 kelompok BAL (Prescott *et al.*, 2002) yaitu: Bakteri homofermentatif yaitu glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat sebagai satu-satunya produk. Contoh: *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan *Lactobacillus*. Kedua bakteri heterofermentatif yaitu glukosa difermentasikan menghasilkan asam



laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya seperti etanol, asam asetat, dan CO<sub>2</sub>.

Sebagian bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia, beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti (pencernaan) laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Sebagian keuntungan tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan dan aksi bakteri selama pengolahan makanan, sedangkan sebagian lainnya hasil dari pertumbuhan beberapa BAL di dalam saluran usus saat mencerna makanan yang mengandung BAL sendiri (Gilliland, 1990).

Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin, diproduksi oleh *Lactobacillus lactis* ssp. *lactis*. Nisin dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, yaitu *Bacillus*, *Clostridium*, *Staphylococcus*, dan *Listeria*. Senyawa bakteriosin yang diproduksi BAL dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin (Pieter Walstra dkk, 2005).

Selain bakteriosin, senyawa antimikroba (penghambat bakteri lain) yang dapat diproduksi oleh BAL adalah hidrogen peroksida, asam lemah, reuterin, dan diasetil. Senyawa-senyawa tersebut juga berfungsi untuk memperlama masa simpan dan meningkatkan keamanan produk pangan. BAL menghasilkan hidrogen peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) untuk melindungi selnya terhadap keracunan oksigen. Namun,

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dapat bereaksi dengan senyawa lain (contohnya tiosianat endogen dalam susu mentah) hingga menghasilkan senyawa penghambat mikroorganisme lain. Mekanisme ini disebut sebagai sistem antimikroba laktoperoksidase (Steve Taylor, 2004).

Asam laktat dan asam lemah lain yang dihasilkan BAL dapat memberikan efek bakterisidal untuk bakteri lain karena pH lingkungan dapat turun menjadi 3-4,5. Pada pH tersebut, BAL tetap dapat hidup sedangkan bakteri lain, termasuk bakteri pembusuk makanan yang merugikan akan mati (Iis Rostini, 2007).

Reuterin adalah senyawa antimikrobal efektif untuk melawan berbagai jenis bakteri (bersifat spektrum luas), yang diproduksi oleh *Lactobacillus reuteri* selama pertumbuhan anaerobik terjadi dengan keberadaan gliserol. Diaseteil adalah senyawa yang menentukan rasa dan aroma mentega, serta aktif melawan bakteri gram negatif, khamir, kapang. Sebagian BAL dapat mengurangi jumlah bakteri patogen secara efektif pada hewan ternak, contohnya bakteri jahat *E. coli* O157 dan *Salmonella*. Di samping itu, BAL juga dikonsumsi manusia dan hewan sebagai bakteri probiotik, yaitu bakteri yang dimakan untuk meningkatkan kesehatan atau nutrisi tubuh. Beberapa spesies BAL merupakan probiotik yang baik karena dapat bertahan melewati pH lambung yang rendah dan menempel atau melakukan kolonisasi usus. Akibatnya, bakteri jahat di usus akan berkurang karena kalah bersaing dengan BAL (Steve Taylor, 2004).

Berikut ini adalah jenis-jenis BAL yang sering digunakan:

1. *Lactobacillus* sp.

*Lactobacillus* adalah genus bakteri gram-positif, anaerobik fakultatif atau mikroaerofilik. Genus bakteri ini membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri asam laktat, dinamakan demikian karena kebanyakan anggotanya dapat mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat (Anonim, 2016).

Berikut Klasifikasi *Lactobacillus*:

Kerajaan	: Bacteria
Divisi	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Ordo	: Lactobacillales
Famili	: Lactobacillaceae
Genus	: <i>Lactobacillus</i>

Genus *Lactobacillus* untuk saat ini terdiri atas lebih dari 125 spesies dan mencakup jenis organisme yang luas. Genus *Paralactobacillus* termasuk di dalam kelompok *L. salivarius*. Dalam beberapa tahun ini, anggota lain dari genus *Lactobacillus* (dulunya dikenal dengan cabang *Leuconostoc* dari *Lactobacillus*) telah diklasifikasi ulang ke dalam genera *Atopobium*, *Carnobacterium*, *Weissella*, *Oenococcus*, dan *Leuconostoc*. Baru akhir-akhir ini, *P. dextrinicus*, yang merupakan spesies *Pediococcus*, telah diklasifikasi ulang sebagai spesies *Lactobacillus*. Kebanyakan dari bakteri ini umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari *Lactobacillus* memiliki kemampuan membusukkan

materi tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan beberapa bakteri merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genom sendiri. *Lactobacillus* termasuk golongan bakteri asam laktat yang sering dijumpai pada makanan fermentasi, produk olahan ikan, daging, susu, dan buah-buahan (Napitupulu dkk, 1997).

Sejauh ini telah diketahui bahwa keberadaan bakteri ini tidak bersifat patogen dan aman bagi kesehatan sehingga sering digunakan dalam industri pengawetan makanan, minuman dan berpotensi sebagai produk probiotik. Sifat yang menguntungkan dari bakteri *Lactobacillus* dalam bentuk probiotik adalah dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kesehatan. Bakteri tersebut berperan sebagai flora normal dalam sistem pencernaan. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan asam dan basa sehingga pH dalam kolon konstan (Anonim, 2016).

Salah satu syarat dari suatu bakteri probiotik yang baik adalah bahwa bakteri tersebut harus memiliki kemampuan menempel pada dinding saluran cerna, sehingga bakteri tersebut dapat berkoloni dan melakukan fungsinya yang memiliki manfaat bagi ayam broiler . Usus merupakan organ dengan sistem imun terluas di tubuh udang, sel-sel yang menyusun usus dilindungi oleh lapisan pelindung mucus yang secara terus-menerus mengalami proses regenerasi. Dipermukaan mucus ini terjadi proses penyerapan nutrisi dan menjadi media melekatnya probiotik di dinding usus. Melekatnya probiotik pada mukus ini diakibatkan oleh suatu zat protein yang dinamakan *MBP/Mucus Binding Protein* (Protein Pengikat Mukus),

dengan adanya protein ini maka bakteri probiotik dapat menempel pada mukus saluran cerna dan melakukan perlindungan terhadap ayam broiler . Selain itu, *Mucus Binding Protein* ini juga memicu produksi protein imunoglobulin yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu peranan *Mucus Binding Protein* ini juga penting dalam meningkatkan sistem daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit (Anonim, 2016).

## 2. *Bacillus* sp.

Genus *Bacillus* termasuk batang besar aerob, gram-positif, dalam bentuk rantai. Sebagian besar anggota genus ini adalah organisme saprofit, sering dijumpai pada tanah, air, dan udara dan pada vegetasi, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis* (Kusnadi, dkk. 2003)

Berikut Klasifikasi *Bacillus* sp:

Kingdom : Procaryotae

Divisi : Bacteria

Kelas : Schizomycetes

Ordo : Eubacteriales

Family : Bacillaceae

Genus : *Bacillus*

Species : *Bacillus* sp.

*Bacillus* sp. merupakan bakteri berbentuk batang (basil), dan tergolong dalam bakteri gram positif yang umumnya tumbuh pada medium yang mengandung oksigen (bersifat aerobik) sehingga dikenal pula dengan istilah aerobic sporeformers. Kebanyakan anggota genus *Bacillus* sp. dapat membentuk endospora

yang dibentuk secara intraseluler sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, oleh karena itu anggota genus *Bacillus* sp. memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Beberapa anggota *Bacillus* sp. memiliki S-layer yang merupakan lapisan *crystalline* dipermukaan subunit protein atau glikoprotein. Bagian kapsul kebanyakan anggota *Bacillus* sp. mengandung D atau *L-glutamic acid*, sedangkan beberapa lainnya memiliki kapsul yang mengandung karbohidrat. Variasi struktur dinding sel seperti pada kebanyakan bakteri gram negatif tidak ditemukan pada genus *Bacillus* sp. (Rheinheimer, 1980).

Dinding sel vegetatif kebanyakan anggota *Bacillus* sp. terbuat dari peptidoglikan yang mengandung *Meso-Diaminopimelic Acid* (DAP) dengan tipe *Glyserol Teichoic Acid* sangat bervariasi diantara spesies. Kebanyakan anggota genus *Bacillus* sp. merupakan bakteri yang bersifat motil dan memiliki flagela tipe peritrik. *Bacillus* sp. digolongkan ke dalam kelas bakteri heterotrofik, yaitu protista bersifat uniseluler, termasuk dalam golongan mikroorganisme reducen atau yang lazim disebut sebagai dekomposer. Sebagian besar bakteri laut termasuk dalam kelompok bakteri bersifat heterotrofik dan saprofitik (Rheinheimer, 1980).

Jenis *Bacillus* sp. menunjukkan bentuk koloni yang berbeda-beda pada medium agar. Warna koloni pada umumnya putih sampai kekuningan atau putih suram, tepi koloni bermacam-macam namun pada umumnya tidak rata, permukaannya kasar dan tidak berlendir, bahkan ada yang cenderung kering berbubuk, koloni besar dan tidak mengkilat. Bentuk koloni dan ukurannya sangat bervariasi tergantung dari jenisnya. Selain itu setiap jenis juga menunjukkan

kemampuan dan ketahanan yang berbeda-beda dalam menghadapi kondisi lingkungannya, misalnya ketahanan terhadap panas, asam, kadar garam, dan sebagainya (Rheinheimer, 1980).

Bakteri *Bacillus* sp. biasanya banyak ditemukan di tanah. Cara untuk mendapatkan bakteri *Bacillus* sp. yaitu dengan mengambil sampel tanah menggunakan sendok yang telah disterilisasikan terlebih dahulu kemudian ambil tanah sekitar kedalaman 3 cm dari permukaan tanah. *Bacillus* sp. merupakan bakteri gram positif dengan sel batang berukuran  $0,3-22 \times 1,27-7 \mu\text{m}$ , sebagian bersifat motil (mampu bergerak), mobilitasnya ini disebabkan oleh flagel yang jika dipanaskan akan membentuk endospora, yaitu bentuk dorman sel vegetatif sebagai bentuk pertahanan diri yang muncul saat kondisi ekstrim yang tidak menguntungkan bagi bakteri (Rahmawati, 2011).

Kandungan air endospora sangat rendah bila dibandingkan dengan sel vegetatifnya, maka endospora berbentuk sangat padat dan sangat refraktil bila dilihat di bawah mikroskop. Endospora dibentuk dalam sporangium di dalam sel dan dibentuk saat sel masak. Endospora memiliki dinding tebal, reaktif, dan sangat resisten. Letak endospora dalam sel ukuran selama pembentukannya tidak sama antara spesies satu dengan lainnya. Beberapa spesies memiliki spora sentral, terminal, atau letal. Endospora dapat berbentuk oval, silindris, bulat, atau lainnya. *Bacillus* sp. bersifat aerob sampai anaerob fakultatif, metabolisme dengan fermentasi dan respirasi. Isolat-isolat murni tersebut dipelihara dalam medium agar miring (Rahmawati, 2011).

Sebuah koloni bakteri dapat dipastikan sebagai koloni *Bacillus*, yakni dengan cara melakukan serangkaian pengujian yang bersifat spesifik yaitu pengecatan gram, pengecatan negatif dan motilitasnya. *Bacillus* dibedakan dari anggota familia *Bacillaceae* lainnya berdasarkan sifat-sifatnya yaitu: keseluruhannya merupakan pembentuk spora, hidup pada kondisi aerob baik sebagai jasad yang sepenuhnya aerob maupun aerob fakultatif, selnya berbentuk batang, dan memproduksi katalase (Faisal Yatim, 2004). Bakteri ini kebanyakan dapat hidup pada suhu lingkungan yang panas, dan menghasilkan enzim yang mampu menguraikan bahan organik jenis karbohidrat, protein dan lemak. Bakteri *Bacillus* mampu tumbuh pada konsentrasi garam tinggi diatas 10 ppt, dan masih bekerja dengan baik pada fluktuasi pH antara 7,3 sampai 10,5. Beberapa spesies bahkan mampu hidup pada kondisi pH sangat tinggi hingga  $> 11$  (Anonim, 2006).

### 3. *Lactobacillus acidophilus*

*Lactobacillus acidophilus* adalah salah satu dari delapan genera umum dari bakteri asam laktat. Tiap genus dan spesies nya mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun, secara umum mereka merupakan bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, bersifat non motil, dan nonspora yang memproduksi asam laktat sebagai produk utama dari metabolisme fermentasi dan menggunakan laktosa sebagai sumber karbon utama dalam memproduksi energi (Buttris, 1997).

*L. acidophilus* dapat tumbuh baik dengan oksigen ataupun tanpa oksigen, dan bakteri ini dapat hidup pada lingkungan yang sangat asam sekalipun, seperti pada pH 4-5 atau dibawahnya dan bakteri ini merupakan bakteri homofermentatif



yaitu bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai satu-satunya produk akhir. Bakteri ini merupakan bakteri *Lactobacillus* yang dikenal sangat baik, umumnya bakteri ini ditemukan di dalam gastro intestinal manusia, hewan, mulut, dan vagina (Sandine, 1979).

#### 4. *Lactobacillus bulgaricus*

*Lactobacillus bulgaricus* adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria bernama Stamen Grigorov, pada tahun 1905. Oleh karena itu dinamakan menurut Bulgaria. (Grigoroff, 1905)

Bakteri ini hidup dari "memakan" laktosa (gula susu) dan mengeluarkan asam laktat. Asam ini sekaligus mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa (gula susu) sehingga orang yang tidak toleran terhadap susu murni dapat mengonsumsi yogurt tanpa mendapat masalah kesehatan.

#### 5. *Streptococcus*

*Streptococcus* adalah salah satu genus dari bakteri nonmotil yang mengandung sel gram positif, berbentuk bulat, oval dan membentuk rantai pendek, panjang atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia dan hewan. Ada juga jenis yang digunakan untuk fermentasi makanan dan minuman. Beberapa jenis ada yang bersifat patogen (Hartanto dkk, 2001).

Spesies bakteri *Streptococcus* yang bersifat patogen diantaranya dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia, meningitis, necrotizing fasciitis, erisipelas, radang tenggorokan, dan endokarditis. Jenis bakteri dari genus

ini juga banyak digunakan dalam produksi keju dan yogurt. Klasifikasi bakteri dari genus *Streptococcus* disusun berdasarkan sifat-sifat hemolitik yang dimiliki yaitu *Streptococcus hemolitik alpha*, *hemolitik beta*, dan *hemolitik gamma*. (Anonim, 2014)

Berdasarkan kombinasi sifat antigen, hemolitik dan fisiologisnya, genus dari bakteri ini dibagi menjadi grup A, B, C, D, F, dan G. Grup A dan D dapat ditularkan pada manusia melalui makanan. Grup A terdiri dari satu spesies dengan 40 tipe antigen. Spesies dari grup A tersebut adalah *S. Pyogenes* (Anonim, 2014).

#### 6. *Leuconostoc mesenteroides*

*Leuconostoc mesenteroides* merupakan bakteri Gram positif, filum Firmicutes, dimana termasuk dalam bakteri asam laktat dan, Ciri umum dari bakteri asam laktat yakni memiliki bentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, tidak motil, katalase negatif dan oksidasi positif, suhu optimum nya 40 derajat celsius, jika dilihat kebutuhannya terhadap O<sub>2</sub> bakteri asam laktat bersifat anaerob aerotoleran karena meskipun tanpa adanya O<sub>2</sub>, bakteri ini bisa tumbuh baik pada lingkungan yang terdapat atau tidak terdapat O<sub>2</sub>. Bakteri asam laktat ini memiliki sifat khusus yaitu mampu hidup pada kadar gula, garam dan alkohol yang tinggi serta mampu memfermentasi monosakarida dan disakarida. Memiliki beberapa karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki porfirin dan sitokrom, katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya mendapatkan energi dari fosforilasi substrat. Bakteri asam laktat memperoleh energinya dari hasil metabolisme gula oleh sebab itulah habitatnya pada lingkungan yang cukup gula atau lingkungan yang kaya akan nutrisi (Anonim, 2011). Berdasarkan hasil

fermentasinya *Leuconostoc* masuk ke dalam kelompok bakteri heterofermentatif yaitu bakteri yang menghasilkan ethanol dan senyawa lain seperti karbondioksida dari fermentasi glukosa (Salle, 1979).



*Leuconostoc mesenteroides* berbentuk bulat secara berpasangan atau membentuk rantai pendek. *Leuconostoc mesenteroides* menghasilkan enzim ekstraselular yang disebut dextransucrase yang mengubah glukosa dari molekul sukrosa menjadi dekstran dan melepaskan fruktosa ke lingkungan. Oleh karena itu hasilnya adalah pembentukan polimer subunit glukosa yang terikat dalam posisi alpha 1-6. sebenarnya, subunit glukosa ditambahkan ke glukosa pada awal molekul primer sukrosa. sehingga setiap molekul dekstran memiliki satu sub unit fruktosa gula terminal. Dekstran digunakan secara komersial sebagai extender plasma darah.



Dekstran adalah polimer dari glukosa yang manfaatnya sangat penting dalam industri farmasi sebagai bahan formulasi obat-obatan juga dalam industri makanan sebagai bahan pengental. Dalam fermentasi dekstran, sukrosa adalah sumber karbon utama yang akan dikonversi menjadi dekstran oleh enzim Dextransucrase. Pemanfaatan nira tebu seringkali digunakan dalam fermentasi dekstran karena nira tebu banyak mengandung sukrosa yang baik bagi pertumbuhan sel bakteri *Leuconostoc mesenteroides*. Namun dari sisi petani tebu dekstran merugikan dalam proses pembuatan gula tebu (Triantarti dan Hendro, 2007).

Meskipun begitu sangatlah penting peran *Leuconostoc mesenteroides* dalam menghasilkan dekstran. Dekstran merupakan salah satu contoh EPS yang

banyak dimanfaatkan. EPS atau eksopolisakarida adalah polisakarida yang diproduksi dan diekskresikan dari mikroba. Dextran merupakan produk komersial sejak bertahun-tahun yang lalu (Amarila dkk, 2008).

Dekstran telah banyak diteliti di bidang farmasi sebagai salah satu matriks pada sistem penghantaran obat baru berbentuk konjugat. Dekstran juga dilaporkan memiliki efek farmakologi sebagai anti platelet, antifibrin, dan plasma volume expansion pada kondisi hipovolemia, serta digunakan pada transplantasi microvascular dan microsurgery sebagai pelindung pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah (Malik dkk, 2008). Dekstran juga sebagai obat antikoagulan (Imam, 2011) juga sebagai barier adhesi atau mekanisme pada pencegahan perlekatan pasca operasi karena kembali lagi memiliki efek antikoagulan (Primariawan, 2010) Keunikan dari struktur dekstran adalah adanya dominasi ikatan 1,6-alpha-D- , sehingga dapat berfungsi sebagai sumber serat. Dekstran yang telah digabung dengan gliserin melalui ikatan eter dapat berfungsi sebagai penyembuh luka dan adsorben bakteri atau toksin bakteri (Wagner, 1993).

#### 7. *Bifidobacterium*

*Bifidobacterium* menurut Joshi (2007) adalah salah satu genus bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus besar manusia dan hewan. Beberapa karakteristik dari bakteri ini menurut Robert (2006) adalah gram-positif, anaerobik, non-motil (tidak bergerak), tidak membentuk spora, berbentuk batang, dan memiliki persen G+C (guanodin-sitosin) yang tinggi (55-67%).<sup>[2]</sup> Sel umumnya terlihat berpasangan membentuk huruf V atau Y. Suhu optimal untuk

pertumbuhan *Bifidobacterium* adalah 37-41 °C dan pH optimum antara 6,5-7. Dalam penelitiannya Joshi (2007) menjelaskan bahwa dari 30 spesies *Bifidobacterium* yang ditemukan, beberapa di antaranya digunakan sebagai probiotik, yaitu *B. infantis*, *B. lactis*, *B. adolescentis*, *B. bifidum*, *B. breve*, *B. longum*, *B. animalis*, dan *B. thermophilum*. Bakteri ini telah digunakan secara komersial menurut Robert (2006) sebagai probiotik dalam pembuatan yogurt dan produk olah susu lainnya.

*Bifidobacterium* adalah organisme sakarolitik dan mampu menghasilkan asam laktat dan asam asetat tanpa CO<sub>2</sub>. Semua *Bifidobacterium* yang diisolasi dari manusia dapat menggunakan sumber karbon berupa sukrosa, glukosa, galaktosa, dan laktosa. Substrat fermentasi yang dimanfaatkan oleh sebagian besar spesies bakteri ini meliputi D-galakosamin, D-glukosamin, amilosa, dan amilopektin. Untuk mengenai *Bifidobacterium*, dapat digunakan uji untuk mengetahui keberadaan enzim fruktosa-6-fosfat fosfoketolase yang merupakan enzim kunci dari spesies tersebut. Bakteri ini termasuk organisme fastidius (rewel), sehingga tidak dapat tumbuh di sembarang media. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan *Bifidobacterium* adalah agar MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) (Ramesh dkk, 2006).

Apabila tubuh memiliki *Bifidobacterium* dalam jumlah yang cukup, maka bakteri tersebut dapat menempel pada usus dan berkompetisi mendapatkan makanan dan tempat untuk hidup dengan organisme patogen lain, seperti *Candida albicans*. Patogen yang tidak dapat bertahan akan keluar dari dalam tubuh melalui saluran pencernaan. *Bifidobacterium* juga dapat hidup di lokasi tanpa oksigen dan

di lingkungan asam karena menghasilkan asam asetat dan asam laktat. Tubuh akan terlindungi dari bakteri lain yang memerlukan oksigen atau lingkungan basa untuk hidup. Selain itu, bakteri ini juga memiliki beberapa manfaat positif bagi kesehatan manusia, seperti mampu menghasilkan beberapa vitamin B-kompleks yang bermanfaat bagi tubuh, membantu pengaturan diet bagi sebagian manusia yang menderita kondisi liver tertentu, dan mencegah bakteri yang mengubah nitrat (pada air dan makanan) menjadi nitrit, yang merupakan penyebab kanker (Natasha, 1998).

## 8. *Enterococcus*

### a. *Enterococcus faecalis*

Spesies *Enterococcal* adalah unsur inti dari flora usus dari banyak spesies mulai dari manusia sampai lalat (Macovei dan Zurek, 2006). *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri kokus Gram positif berbentuk ovoid berdiameter antara 0,5 – 1 um yang dapat berkoloni secara rantai, berpasangan ataupun soliter. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, mempunyai kemampuan untuk hidup dan berkembang biak dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Bakteri ini mengkatabolisme berbagai sumber energi antara lain karbohidrat, gliserol, laktat, malate, sitrat, arginin, agmatin dan asam  $\alpha$  keto lainnya. *Enterococcus faecalis* merupakan mikroorganisme yang dapat bertahan dalam lingkungan yang sangat ekstrim, termasuk pH yang sangat alkalis dan konsentrasi garam yang tinggi (6,9) (Evan dkk, 2002)

Probiotik strain *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri dengan karakteristik Gram positif dan berbentuk kokus. Genus bakteri ini kurang dikenal karena hanya memiliki kurang dari 20 spesies. Bakteri ini termasuk bakteri Gram

positif dengan sel berbentuk seperti telur dalam bentuk tunggal, berpasangan atau rantai pendek dan tidak membentuk spora. Strain bakteri yang paling sering digunakan adalah *Enterococcus faecalis*. Pertumbuhan optimal pada suhu 35-37°C dan kebanyakan spesies dapat tumbuh pada suhu 42-45°C. bakteri ini bersifat homofermentatif yang mengubah glukosa seluruhnya menjadi asam laktat. Genus *Enterococcus* termasuk dalam kelompok mikroorganisme dikenal sebagai Bakteri Asam laktat (BAL) (De Vos, *et al.*, 2009).

Strain yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia telah terisolasi dari saluran pencernaan manusia dan biasanya termasuk spesies genera *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Namun, strain milik spesies BAL lainnya, di antaranya *Enterococci*, telah digunakan di masa lalu sebagai probiotik juga, seperti *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. thermophilus*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Propionibacterium freudenreichii*, *Pediococcus acidilactici*, *Sporolactobacillus inulinus*, *Bacillus cereus* dan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. Meskipun jenis *E. faecium* dan *E. faecalis* telah diaplikasikan pada manusia, suplemen probiotik, strain *E. faecalis* juga ada dan telah banyak digunakan sebagai suplemen pakan hewan (Fuller, 1989).

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecium* diaplikasikan pada manusia dan hewan

sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Badrinon, 2010).

*Enterococci* terdistribusikan secara luas pada lingkungan, terutama pada sistem saluran pencernaan manusia dan hewan. *E. faecalis* sering mendominasi spesies di usus manusia, meski pada beberapa individu dan di beberapa negara *E. faecium* melebihi *E. Faecalis*. Namun, kehadiran umum *E. faecalis* pada banyak produk makanan tidak selalu berhubungan dengan kontaminasi feses (tinja) secara langsung. Pada tahun 1992, Uni Eropa menetapkan tingkat maksimum untuk kehadiran *Coliform* dan *Escherichia coli*, keduanya dianggap sebagai indikator kebersihan, sementara tidak ada batas yang ditetapkan untuk *enterococci*. Selanjutnya, telah ditunjukkan bahwa *Enterococci* memiliki nilai yang kecil sebagai indikator kesehatan dalam industri pengolahan makanan. Meskipun *E. faecalis*, *E. faecium*, dan *E. Durans* sering terisolasi dari kotoran manusia, bakteri ini jauh lebih sedikit pada ternak, seperti babi, sapi, dan domba (Fuller, 1989).

b. *Enterococcus faecium*

Selanjutnya, probiotik seharusnya dapat menambah efisiensi produksi, meningkatkan kesehatan dan menguatkan hewan (Brittain *et al*, 2002). Probiotik Potensial Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan kandidat probiotik yang potensial di *aquaculture* dan juga ditemukan pada usus ikan yang sehat. *Enterococcus faecium* adalah salah satu bakteri asam laktat yang paling sering digunakan sebagai nutrisi bagi hewan. *Enterecoccus* merupakan bakteri Gram positif, anaerob fakultatif yang tersebar secara luas di alam dan diyakini sebagai bakteri yang paling tidak berbahaya (Klare *et al*, 2003).



Infeksi yang ditimbulkan dari penggunaan probiotik *Enterococcus* tidak pernah ditemukan pada ilmu medis veteriner, maka dari itu risiko yang mungkin muncul dari penggunaannya sangatlah kecil. Eaton dan Gasson (2001) menemukan bahwa *strain E. faecium* secara umum bebas dari faktor virulensi. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik, pengujian profil antibiotik dari *Enterococcus* yang digunakan sebagai probiotik sangatlah relevan. Namun, resistensi antibiotik tersebut biasanya spesifik pada spesies atau pada spesies maupun genus tertentu (Klare *et al*, 2003).

Jika probiotik *Enterococcus* telah teridentifikasi dengan akurat, maka dapat diuji resistensi spesifiknya. Beberapa mekanisme penting probiotik dalam memproduksi asam laktat (misalnya *E. faecium*) dapat menunjukkan manfaat bagi performa dalam meningkatkan keseimbangan mikroba usus (Fuller, 1989), menstimulasi sistem imun, serta mengurangi pH dengan cara pelepasan bakteriosin (Rolfe, 2000).

Bakteriosin adalah peptide kecil yang dikenali dari kemampuannya untuk menghambat bakteri patogen, beberapa jenis diantaranya memiliki spectrum aktivitas yang sempit dan lainnya mampu menghambat spectrum bakteri yang lebih luas. Penelitian *Enterococcus* Kajian invitro dengan menggunakan metode spot agar (Roskopf, 2010) telah menunjukkan bahwa *Enterococcus faecium* memiliki kemampuan penghambatan terhadap spesies pathogen yang luas. Spesies pathogen tersebut meliputi *Yersinia ruckeri*, *Vibrio harveyi*, *Streptococcus agalactiae*, dan *Aeromonas veronii*. Sebuah penelitian yang sama yang dilakukan oleh Swan *et al* (2009) yang membuktikan aktivitas penghambat dari *E. faecium* yang diisolasi dari

ikan di perairan Brackwish terhadap *v. harveyi* dan *v. parahaemolyticus*. Penelitian ini menunjukkan potensi aplikasi dari *E. faecium* yang berasal dari usus ikan untuk mengontrol agen vibriosis pada budidaya udang. Selain itu juga telah dilaporkan daya tahan hiup dari belut di eropa (*Anguila Anguila L.*) yang diberi tambahan pakan dengan *E. Faecium* lebih mampu bertahan hidup, daripada kelompok control yang tidak diberi *E. Faecium* setelah ditantang dengan Edward siellatarda (Chang and Liu, 2002).


Wang *et al* (2008) juga meneliti tentang penambahan *E. faecium* ( $1 \times 10^7$  CFU/ml) pada air akuarium dapat meningkatkan berat akhir dan pencapaian berat harian dari tilapia secara signifikan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa parameter kekebalan tilapia (myeloperoxidase dan aktivitas *bursti* respirasinya) yang meningkat. Peningkatan performa pertumbuhan kemungkinan disebabkan karena berkurangnya bakteri berbahaya, yang diperoleh dari manfaat *innate immunity* yang non spesifik pada ikan jenis ini. Panigrahi *et al* (2007) meneliti modul asli imun yang melibatkan ekspresi gen cytokine pada ikan *rainbow trout* (*Oncorhynchus mykiss*) dan menunjukkan bahwa parameter ini meningkat oleh adanya pemberian pakan sediaan kering beku probiotik *Lactobacillus rhamnosus*, *Enterococcus faecium* atau *Bacillus subtilis* ( $10^9$  CFU/g) selama 45 hari. Khususnya ikan yang diberi pakan *Enterococcus faecium* menunjukkan performa yang lebih baik yang dihubungkan dengan kondisi suhu yang sesuai untuk perkembangan *strain* ini.

#### ***D. Panjang Serta Besar Tibia dan Femur***

Beberapa hasil penelitian menjelaskan penambahan bobot badan rata-rata ayam kampung adalah 64 g/ekor/minggu (Iskandar dkk, 1998). Lisin adalah salah satu asam amino esensial yang sering kekurangan dalam bahan pakan asal nabati. Penambahan asam amino lisin sintetis bisa dilakukan guna menyeimbangkan asam amino ransum. Protein dan lisin akan mempengaruhi pertumbuhan terutama tulang pada ayam fase starter. Tulang yang lebih panjang diduga memiliki ruang massa daging yang lebih besar, sehingga tulang dengan panjang optimal akan menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi. Menurut Prayitno (1994) terdapat korelasi positif antara panjang tulang dan bobot badan akhir dengan nilai korelasi sebesar 0,400.

Lisin sangat dibutuhkan oleh ternak dalam pertumbuhannya karena fungsi dari asam amino lisin dalam pertumbuhan ayam kampung yaitu dapat membantu penyerapan Ca dalam pembentukan tulang sehingga Ca untuk pertumbuhan tulang terpenuhi (Harland dan Oberleas, 2001). Ca pada ayam kampung kebanyakan dideposisikan di tulang terutama terjadi pada saat starter yaitu dimana saat ayam baru memulai pertumbuhan. Indikator pertumbuhan ayam bisa dilihat dari pertumbuhan tulangnya. Pertumbuhan tulang akan optimal apabila bahan penyusun tulangnya terpenuhi, terutama mineral Ca.

Untuk lebih jelasnya maka perhatikan gambar berikut:



**Gambar 1. Kerangka Ayam Kampung**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2017. Bertempat di kandang unggas dan dilanjutkan di Laboratorium Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti ember, gasolek, gelas ukur 100 ml, kandang, koran, lampu pijar 45 watt, pisau/cutter, spoid, tabung gas, tempat pakan gantung, tempat air minum manual 800 ml, jangka sorong, meteran dan timbangan.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan yaitu broiler umur satu hari atau *day old chick* (DOC) strain *Cobb 500* sebanyak 48 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), desinfektan *Rhodalon*, gula merah, litter/serbuk gergaji, ransum dalam bentuk tepung, tali rafia, probiotik cair, vaksin *ND-IB* dosis 100 ekor.

#### ***C. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

## ***D. Metode Penelitian***

### **1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor ayam broiler sehingga terdapat 15 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P0 = Ransum basal (Kontrol)

P1 = Ransum basal + Probiotik (1%) / kg pakan

P2 = Ransum basal + Probiotik (1,5 %) / kg pakan

P3 = Ransum basal + Probiotik (2 %) / kg pakan

### **2. Persiapan dan Pemeliharaan Ayam Broiler**

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan ayam broiler yaitu :

#### **a. Kandang**

Sebelum broiler/DOC dimasukkan ke dalam kandang, terlebih dahulu dilakukan sanitasi. Sanitasi kandang dilakukan setelah kandang dicuci dengan air dan detergen. Setelah kandang disanitasi kandang dibiarkan sampai kering kemudian ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, dan menyediakan tempat pakan dan minum. Luas unit kandang yang digunakan yakni 60 x 60 cm dengan tinggi 70 cm. Persiapan broiler dipelihara dari DOC sampai umur 30 hari dengan kandang menggunakan alas sekam. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 45 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 15 watt sebanyak 1 buah dan penambahan gasolek.

## b. Ransum

Pemberian ransum dan air minum dilakukan secara *Adlibitum*. Ransum tersebut diberikan setiap hari pada ayam yang dicampur dengan tepung probiotik dengan konsentrasi 1% dan 1,5% dari ransum yang diberikan setiap harinya mulai dari DOC (*Day Old Chick*) sampai panen.

Adapun bahan penyusun dan kandungan nutrisi ransum yang digunakan pada penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Bahan Penyusun Ransum Penelitian

Bahan Pakan	Jumlah (%)
Jagung	58
Polard	6
Tepung Ikan	10
Kacang Kedelai	9
Dedak	4
Bungkil kelapa	3
MBM	9
Premix	1

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian\*

Kandungan Nutrisi	Jumlah
Protein (%)	20.2724
Energi Metabolisme (kkal/kg)	3026.46
Lemak Kasar (%)	6.8991
Serat Kasar (%)	3.4895
Kalsium (%)	1.6518
Posfor (%)	1.0532

Sumber: Data Primer Yang telah dihitung berdasarkan SNI (2006)

\*Disusun berdasarkan SNI 2006

### ***E. Parameter yang Diukur***

Setelah proses pemeliharaan, parameter yang digunakan untuk mengukur penyerapan kalsium tulang dan morfologi tulang ayam broiler adalah pertambahan panjang serta besar tulang *tibia* dan *femur*. Pada akhir penelitian dilakukan pengukuran panjang dan besar tibia dan femur pada tiap objek penelitian (broiler) untuk diamati panjang dan besar tulang *tibia* dan *femur* (cm/ekor) menggunakan cara manual. Tulang *tibia* dan *femur* yang sudah dipisahkan dari daging, diukur panjangnya dengan menggunakan jangka sorong dan meteran pita dengan satuan cm (Siahaan, 2015).

### ***F. Analisis Data***

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel dan Torrie (1991), Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

$Y_{ij}$  = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian probiotik ulangan ke-j.

$\mu$  = Nilai rata-rata sesungguhnya

$\alpha_i$  = Pengaruh perlakuan pada  $i$  = P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub> (perlakuan)

          taraf ke-i

$j$  = 1,2,3 (ulangan)

$\epsilon_{ij}$  = Galat



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

Data hasil pengukuran pertambahan panjang serta besar *tibia* dan *femur* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rataan panjang *tibia* dan *femur*

Parameter yang Diukur	Perlakuan			
	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>
<i>Tibia</i> (cm)	7,33 <sup>b</sup>	6,43 <sup>a</sup>	7,46 <sup>b</sup>	7,16 <sup>b</sup>
<i>Femur</i> (cm)	5,30 <sup>a</sup>	5,00 <sup>a</sup>	5,20 <sup>a</sup>	5,20 <sup>a</sup>

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perlakuan berbeda nyata ( $P < 0,05$ )

Berdasarkan hasil uji *anova* pada perlakuan P<sub>2</sub> (7,46 cm) dan P<sub>3</sub> (7,16 cm) (Panjang *tibia*) berpengaruh nyata ( $P < 0,05$ ), perlakuan P<sub>0</sub> (7,33 cm) dan P<sub>1</sub> (6,43 cm) tidak berbeda nyata pada panjang *tibia*. Selanjutnya pada hasil uji duncan perlakuan P<sub>0</sub>, P<sub>2</sub>, dan P<sub>3</sub> tidak berbeda, tapi berbeda dengan P<sub>1</sub> pada panjang *tibia*.

Tabel 4. Rataan besar *tibia* dan *femur*

Parameter yang Diukur	Perlakuan			
	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>
<i>Tibia</i> (cm)	0,99 <sup>a</sup>	0,89 <sup>a</sup>	1,45 <sup>b</sup>	0,93 <sup>a</sup>
<i>Femur</i> (cm)	0,76 <sup>a</sup>	0,83 <sup>a</sup>	1,10 <sup>a</sup>	0,85 <sup>a</sup>

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perlakuan berbeda nyata ( $P < 0,05$ )

Berdasarkan hasil uji *anova* pada perlakuan P<sub>2</sub> (Besar *tibia*) penambahan probiotik berpengaruh nyata ( $P < 0,05$ ) dan perlakuan P<sub>0</sub>, P<sub>1</sub> dan P<sub>3</sub> tidak

berpengaruh nyata pada besar *tibia*. Selanjutnya pada hasil uji duncan perlakuan P0, P1, dan P3 tidak berbeda, tapi berbeda dengan P2 pada besar *tibia*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Panjang *Tibia***

Hasil analisa keragaman terhadap panjang tibia memperlihatkan bahwa pemberian probiotik berpengaruh sangat nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap panjang tibia broiler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P2 memiliki panjang yang lebih baik dengan rata-rata 7,46 cm, sedangkan panjang tulang tibia terendah terdapat pada perlakuan P1 dengan rata-rata 6,43 cm. Perlakuan yang lainnya seperti P0, dan P3 memiliki panjang rata-rata berturut-turut adalah 7,33 cm dan 7,16 cm. Hasil uji lanjut uji jarak berganda Duncan didapatkan bahwa perlakuan P2 berbeda nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap P0, P1, dan P3 yang dapat dilihat pada tabel 3 Hal ini diduga dengan pemberian probiotik pada ternak berpengaruh terhadap panjang tibia. Probiotik berisi bakteri menguntungkan yang dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan daya cerna dan menekan bakteri patogen (tidak menguntungkan). Menurut Lilly dan Stillwell dalam Kompiani (2003), probiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme menguntungkan lainnya, jadi merupakan kebalikan dari antibiotik.

Pemberian probiotik memperlihatkan terjadinya peningkatan panjang tibia, sesuai dengan yang dilaporkan Wiryawan (2003) bahwa probiotik dapat berperan dalam membantu mengoptimalkan fungsi saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap nutrisi pakan. Hal ini menegaskan bahwa pemberian

probiotik dengan level atau dosis tertentu mampu meningkatkan jumlah bakteri asam laktat dan penyerapan nutrisi akan meningkat sehingga dapat terjadi pertambahan panjang *tibia* broiler. Dalam pencernaan terdapat bakteri patogen yang akan menghambat dan mengganggu penyerapan nutrisi, sehingga dibutuhkan bakteri menguntungkan dalam jumlah yang lebih besar untuk menekan dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut. Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah salah satu jenis bakteri menguntungkan.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Klaenhammer (2005) bahwa bakteri asam laktat (BAL) merupakan golongan mikroorganisme yang bermanfaat dengan sifat tidak toksik bagi inangnya dan mampu menghasilkan senyawa yang dapat membunuh bakteri patogen. Senyawa yang dihasilkan oleh bakteri jenis ini adalah asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan, dapat menyebabkan terjadinya penurunan pH lingkungan. pH yang rendah dapat menghambat kontaminasi mikroba pembusuk dan mikroba patogen (Sperling, 1968 dalam Suriawiria, 1983). Penurunan pH disebabkan karena adanya asam-asam organik yang dihasilkan oleh BAL. Selain asam organik, BAL juga dapat menghasilkan senyawa antimikroba lain seperti bakteriosin dan hidrogen peroksida (Suriawiria,1983). Hal inilah yang menyebabkan penurunan jumlah bakteri patogen dalam usus dan membuat proses pencernaan serta penyerapan nutrisi bisa lebih efektif. Diantaranya adalah penyerapan kalsium yang dibutuhkan oleh tulang, Menurut Pond, *et al* (1995) kalsium yang dikonsumsi ini akan diserap dalam usus halus, kemudian masuk dalam darah dan ditransportasikan ke jaringan tubuh termasuk *tibia*. Pemberian probiotik ini juga mampu meningkatkan kemampuan dalam mencerna nutrisi

terkhusus dalam absorpsi mineral Ca tulang yang berlangsung baik, sehingga deposisi Ca pada tulang tibia tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan tulang. Talaty, *et al* (2009) menyatakan bahwa kekuatan patah tulang tibia berbanding lurus dengan komposisi mineral tulang dan densitas mineral tulang. Kalsium yang dikonsumsi ini diserap oleh usus halus masuk ke dalam darah dan ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan (tulang dan daging) dalam tiga bentuk yaitu berupa ion bebas, terikat dengan protein dan ion yang tidak dapat larut (Pond., *et al* 1995). Semakin tinggi konsentrasi kalsium dalam darah yang dapat diserap, aktifitas enzim Ca-ATPase semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan panjang tulang. Menurut Stryer (1988), CaATPase memegang peranan penting dalam proses mineralisasi matriks tulang. Aktivitas Ca-ATPase pada jaringan tulang epifisis menunjukkan adanya hubungan yang spesifik antara ion Ca dalam darah dengan panjang tulang.

## **2. Panjang Femur**

Secara berturut-turut panjang *femur* mulai dari yang tertinggi hingga terendah adalah P0 (5,3 cm), P3 (5,2 cm), P2 (5,2 cm) dan P1 (5 cm). Berdasarkan Tabel 2 rata-rata panjang *femur* tertinggi yaitu, P0 (5,3 cm) tanpa penambahan probiotik, sedangkan panjang *femur* terbesar kedua dengan penambahan probiotik adalah P2 (5,2 cm) dan P3 (5,2 cm) dengan penambahan probiotik berturut-turut 3 ml/hari dan 5 ml/hari, dan yang terendah adalah P1 (5,0 cm) dengan penambahan probiotik sebanyak 1 ml/hari.

Secara umum, pemberian probiotik cair pada tiap perlakuan memberikan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan P0, setelah dilakukan uji hasil

analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian probiotik cair tidak berpengaruh nyata ( $P>0,05$ ) terhadap panjang *femur*.

Hasil dalam penelitian ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan teori dikemukakan oleh Wiryawan (2003) bahwa probiotik dapat berperan dalam membantu mengoptimalkan fungsi saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap nutrisi pakan. Jika ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan unggas yang disebutkan oleh Wahyu (1992) bahwa pertumbuhan unggas dipengaruhi oleh bangsa, jenis kelamin, umur, kualitas ransum, dan lingkungannya. Menurut Wahyu (2004), bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan broiler antara lain faktor nutrisi yang meliputi protein, vitamin, mineral dan kalsium. Menurut Pond, *et al* (1995) kalsium yang dikonsumsi ini akan diserap dalam usus halus kemudian masuk dalam darah dan ditransportasikan ke jaringan tubuh.

Dari sini bisa dijelaskan bahwa salah satu penyebab tidak terlihatnya pengaruh nyata setelah dilakukan penambahan probiotik adanya faktor-faktor pertumbuhan yang tidak terpenuhi dalam proses pemeliharaan. Hal ini diduga juga bisa terjadi akibat penyerapan Ca (Kalsium) yang kurang optimal pada *femur*, sesuai dengan pendapat Corzo *et al.* (2002), pertumbuhan ayam tergantung dari protein dan kandungan asam amino dalam ransum yang dikonsumsi oleh ayam tersebut. Menurut Williams *et al.* (1999) yang disitasi oleh Driver *et al.* (2005) bahwa kebutuhan Kalsium (Ca) yang perlu tersedia dalam ransum diperlukan pada pertumbuhan tulang ayam yang masih muda. Menurut Nguyen dan Bunchasak

(2005) bahwa ayam yang masih muda lebih sensitif terhadap kecukupan nutrisi yang berasal dari asupan ransum.

### 3. Besar *Tibia*

Hasil analisa keragaman terhadap besar *tibia*, yaitu P0, P1 dan P3 memiliki besar *tibia* beturut-turut adalah 0,99 cm, 0,89 cm dan 0,93 cm. Hasil uji lanjut uji jarak berganda Duncan didapatkan bahwa Perlakuan P2 (1,45 cm) menunjukkan hasil yang berbeda nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap kontrol yaitu P0 (0,99) yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P2 memiliki *tibia* terpanjang dengan rata-rata 1,45 cm, sedangkan panjang *tibia* yang terpendek terdapat pada perlakuan P1 dengan rata-rata 0,89 cm. Hal ini disebabkan oleh penyerapan nutrisi yang baik oleh usus yang ditandai dengan peningkatan mutu tulang *tibia*, penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mountzouris (2010) bahwa Probiotik dapat mengubah pergerakan mucin dan populasi mikroba didalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus, memperbaiki komposisi mikroflora pada sekum, serta meningkatkan penyerapan zat makanan.

### 4. Besar *Femur*

Hasil analisis keragaman terhadap besar *femur* memperlihatkan bahwa pemberian probiotik tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ). Pemberian probiotik memperlihatkan Secara berturut-turut konsumsi air minum mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah P0 (0,76 cm), P1 (0,83 cm), P3 (0,85 cm) dan P2 (1,10 cm).

Berdasarkan Tabel 3 rata-rata besar *femur* yaitu, P1 P0 (0,76 cm) dengan penambahan probiotik 1 ml/hari, sedangkan besar *femur* tertinggi P2 (1,10 cm) dengan penambahan probiotik 3 ml/hari. Walaupun secara statistik pemberian probiotik tidak berpengaruh nyata pada setiap perlakuan, namun P2 cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya. Secara umum, pemberian probiotik cair pada tiap perlakuan memberikan hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan P0 dan pemberian probiotik dengan dosis sebesar 3 ml/hari berupa mikroorganisme alami yang terdapat dalam probiotik cair dapat meningkatkan besar *femur* pada ayam pedaging.

Penelitian ini menggunakan bakteri probiotik dengan dosis  $9,8 \times 10^7$  cfu/ml, dimana level pemberian probiotik cair pada perlakuan P1 (1 ml/hari), P2 (3 ml/hari) dan P3 (5 ml/hari). Probiotik ini memperlihatkan peningkatan pada besar femur, terutama pada P3 dengan dosis pemberian 3 ml/hari. Hal ini menunjukkan bahwa probiotik mampu meningkatkan daya cerna, penyerapan kalsium dan mineral yang dibutuhkan dalam perkembangan tulang broiler. Sesuai dengan pernyataan Kurniawan (2012) bahwa sel-sel tulang (*osteoblast*) membentuk kolagen, yaitu protein pengikat kalsium yang berfungsi membawa Ca untuk dideposisikan dalam tulang. Jumlah kalsium tulang tidak menunjukkan hasil yang signifikan namun secara relatif dapat dilihat terjadi peningkatan. Keadaan ini dapat terjadi akibat kandungan Ca ransum meningkat seiring meningkatnya penambahan protein dengan level tertentu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, adalah:

1. Pemberian probiotik dalam air minum berpengaruh nyata ( $P < 0.05$ ) terhadap panjang dan besar *tibia* pada broiler.
2. Pemberian probiotik dalam air minum tidak berpengaruh nyata ( $P > 0.05$ ) terhadap panjang dan besar *femur* pada broiler.

#### ***B. Saran***

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis probiotik ini sebaiknya dilakukan uji coba atau aplikasi dalam penggunaan pakan.
2. Perlu dilakukan analisa kandungan mineral dan kalsium.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan jenis probiotik yang berbeda atau probiotik yang mengandung jenis bakteri yang berbeda dan menggunakan jenis unggas yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aberle, E. D., J. C. Forrest, D. E. Gerrard, E. W. Mills, H. B. Hendrick, M. D. Judge dan R. A. Merkel. 2001. *Principles of Meat Science*. 4th Ed. Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa.
- Amerine, M.A., R.M. Pangborn, E.B. Roessler. 1965. *Principles of sensory Evaluation of Food*. In: Food Science and Technology Monographs. pp.338-339. Academic Press, New York.
- Anonim, 2016. *Probiotik*. [http://shrimpbiotek.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55&Itemid=53](http://shrimpbiotek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=53) (online). Diakses tanggal 21 September 2016.
- \_\_\_\_\_, 2011. <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22819-6.%20BAB%20II.pdf> (online). Diakses tanggal 27 Juli 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. [http://rakhmatul-binti-fk12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-82466-Umum-Bakteri%20gram%20positif.html](http://rakhmatul-binti-fk12.web.unair.ac.id/artikel_detail-82466-Umum-Bakteri%20gram%20positif.html) (online). Diakses tanggal 27 Juli 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Lactobacillus*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus> (online). Diakses tanggal 18 Desember 2016.
- Buttris, J. 1997. Nutritional properties of fermented milk products. *International Journal of Dairy Technology*.
- Arifien, M. 2005. *Rahasia Sukses Memelihara Ayam Broiler Di Daerah Tropis*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Aziz Safingi ,M. Mufti, Ning Iriyanti. 2013. *Penggunaan Berbagai Jenis Probiotik dalam Ransum Ayam Arab terhadap Konsumsi Pakan dan Income Over Feed Cost*. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/682/346>. Diakses tanggal 12 September 2016
- Bahar B. 2003. *Panduan Praktis Memilih Produk Daging Sapi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Batrinon, A. 2010. The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria. *Thei of Athena*.
- Bouton, P.E., Harris, P.v, Shaw, F.D. 1978. Effect of Low Voltage Stimulation of Beef Carcasses on Muscle Tenderness and pH. *Journal Food Science*, 43: 1392- 1397.

- Chang, C.I., W.Y. Liu, 2002. *An evaluation of two probiotic bacterial strains, Enterococcus faecium SF68 and Bacillus toyoi, for reducing edwardsiellosis in cultured European eel, Anguilla anguilla L.* J. Fish Dis. 25:311-315.
- De Vos P., Garrity, Jones, Krieg, Ludwig, Rainey, Schleifer, Witman. 2009. *Bergey's Manual of Systematic Bacteria Second Edition.* Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York.
- Eaton, T. J. Gasson, M. J. (2001). *Molecular screening of Enterococcus virulence determinants and potential for genetic exchange between food and medical isolates.* Applied and Environmental Microbiology.
- Edi hartono, Ning Iriyanti, R. Singgih Sugeng Santosa. 2013. *Penggunaan Pakan Fungsional terhadap Daya Ikat Air, Susut Masak, dan Keempukan Daging Ayam Broiler.* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117339&val=5351> (online). Diakses pada 27 Juli 2017
- El-Kabumaini, N. Ranuatmaja. T.S. 2008. *Yuk, Beternak Ayam Pedaging dan Petelur.* PT. Puri Pustaka. Bandung.
- Evan M, Davies JK, Sundqvist G, Fidgor D. *Mechanisms involved in the resistance of the Enterococcus faecalis to calcium hydroxide.* Int Endod J 2002;35: 221-8.
- Fadilah, R. 2004. *Ayam Broiler di Daerah Tropis.* Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Fooks, L.J. G.r. Gibson. 2002. *In-vitro investigation of The Effect of Probiotics and Prebiotics on Selected human Intestinal Pathogens.* Fems Microbiol.
- Fuller, M. F. 1989. *Probiotics in Man and Animal.* J. Appl. Bacteriol 66 : 365-378
- Gaggia ,f.,p.M Attarelli, B.b Iavati. 2010. *Probiotic and Prebiotics in Animal Feeding For Safe Food Production.* Intl. J. Food Microbiol .14: 515–528
- Grigoroff, Stamen. Étude sur une lait fermenté comestible. Le “Kissélo mléko” de Bulgarie. *Revue Médicale de la Suisse Romande.* Genève. Georg&G., Libraires-Éditeurs. Librairie de L’Université. 1905.
- Hamm, R. 1960. *Postmortem Change in Muscle Affecty the Quality of Comminuted Meat Products.* Dalam Lawrie, R. A. 1985. *Meat Science.* Peargamon Press, New York.
- Harland, B.F. D.Oberleas. 2001. *Effect of Dietary Fiber and Phytate on Homeostatis and Bioavibility of Minerals.* CRC of Dietary Fiber in Human Nutrition, 3rd Ed. G.A Spller, Ed. CRC Press, Boca Raton.

- Hartanto, Mahatmi, Huriawati, Nisa (2001). *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Edisi 4*. USA: Elisabert Haigh. p. 1094.
- Haryanto, B. Andi Djajanegara, 1997. *Pemenuhan Kebutuhan Zat -Zat Pakan Ruminansia Kecil, dalam Produksi Kambing dan Domba Di Indonesia*, editor : Monica W. sebelas Maret University Press, Solo.
- Haryati, T. ,Si upriyatdan I .W. R. Susana. 2010. *Senyawa Oligosakarida dari Bungkil Kedelai dan Ubi Jalar Sebagai Probiotik untuk Ternak*. Pros Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 3–4 Agustus 2010.Puslitbang Peternakan, Bogor.
- Hoffman, L.C., M. Muller, S.W.P. Cloete, D. Schmidt. 2003. *Comparison of Six Crossbred Lamb Types: Sensory, Physical and Nutritional Meat Quality Characteristics*. Meat Science.
- Joshi, S.R. (2007). *Microbes: Redefined Personality*. APH Publishing Corporation. ISBN 978-81-313-0230-9.
- Kementrian Agama RI 2012. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Bandung
- Komariah, I.I. Arief, Y. Wiguna. 2004. *Kualitas Fisik dan Mikrobial Daging Sapi yang Ditambah Jahe (Zinger Officinale Roecoe) Pada Konsentrasi dan Lama Penyimpanan Yang Berbeda*. Media Peternakan Vol. 28.
- Kompiang, I P., Supriyati, O. Sjojfan. 2004. *Pengaruh Suplementasi Bacillus Apiarius terhadap Penampilan Ayam Petelur*. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 9: 1-4.
- Iskandar, S., D. Zainuddin, S. Sastrodihardjo, T. Sartika, P. Setiadi, T. Susanti. 1998a. *Respon Pertumbuhan Ayam Kampung dan Ayam Silangan Pelung Terhadap Pakan Berbeda Kandungan Protein*. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner* 3(1): 8-14.
- Kroger, M., J.A. Kurmann, J.L. Rasic.1989. *Fermented Milks-Past and Present*. Food Technol.
- Kusnadi. 2003. *Common Textbook Mikrobiologi*. JICA UPI, Bandung.
- Kusumawati, N., L.J. Bettysri, S. Siswa, Ratihdewanti, Hariadi. 2003. *Seleksi Bakteri Asam Laktat Indigenous Sebagai Galur Probiotik Dengan Kemampuan Menurunkan Kolesterol*. *Journal Mikrobiologi Indonesia*. 8(2): 39-43
- Lawrie, R.A. 1995. *Meat Science Third Edition*. The Avi Publishing Company, Inc. Westport. Connecticut.

- Macovei, L., Zurek, L., 2006. *Ecology of antibiotic resistance genes: characterisation of enterococci from houseflies collected in food setting*. Appl. Environ, Mikrobiolo.
- Malik, Amarilla. *Skrining Gen Glukosiltransferase (Gtf) Dari Bakteri Asam Laktat Penghasil Eksopolisakarida Makara, Sains*, Volume 12, NO. 1. Departemen Farmasi, FMIPA, Universitas Indonesia. 2008, Depok.
- Maruddin, F. 2004. Kualitas Daging Sapi Asap Pada Lama Pengasapan dan Penyimpanan. *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 4(2).
- Murtidjo, B.A. 1993. *Memelihara Domba*. Kanisius, Yogyakarta.
- Myron F. Roskopf. Version of Record online: 17 MAR 2010. DOI: 10.1111/j.1949-8594.1948.tb06559.x. 1948 School Science and Mathematics Association.
- Natasha Trenev (1998). *Probiotics: Nature's Internal Healers*. Avery Trade. ISBN 978-0-89529-847-8.
- Napitupulu N.R., A. Kanti, T. Yuliner y, R. Hardiningsih, Julistiono, H. 1997. DNA plasmid Lactobacillus Asal Makanan Fermentasi Tradisional yang Berpotensi dalam Pengembangan Sistem Inang Vektor untuk Bioteknologi Pangan. *Jurnal Mikrobiologi Tropis*.
- Pal, A., L. Ray, P.Chattopadhyay. 2006. *Purification and immobilization of an Aspergillus terreus xylanase: Use of continuous fluidized column reactor*. Ind. J. Biotechnol.
- Panigrahi A, Kiron V, Satoh S, Hirono I, Kobayashi T, Sugita H. 2007. Immune modulation and expression of cytokine genes in rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* upon probiotic feeding. *Dev Comp Immunol*.
- Pond, W. G., D. C. Church, K. R. Pond. 1995. *Basic animal nutrition and feeding*. 4th Ed. John and Willey, New York.
- Prayitno, D. S. 1994. *The Effects of Colour and Intensity of Light on the Behaviour and Performance of Broilers*. University of Wales, Bangor, Gwynedd, United Kingdom. (Thesis).
- Priyani. N., Liliyanto., dan Kiki. N. 2006. *Uji Potensi Bacillus sp. dan Escherichia coli dalam Mendegradasi Alkil Benzen Sebagai Bahan Aktif*. diakses tanggal 21 September 2016.

- Primariawan, Relly Y. 2010. Operasi Laparoscopi. *Medicinus Scientific Journal of Pharmaceutical Development and Medical Application* Vol 23 No 3. Dexa Medica, Tangerang.
- Rasjidi, Imam. 2011. *Manual Hesterektomi*. EGC, Surabaya.
- Rahayu, Iman, Sudaryani, Titik., Santosa, Hari.2011. *Panduan Lengkap Ayam*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rahmawati. 2011. “Mikroorganisme *Lactobacillus* sp. Dan *Bacillus* sp.” <https://savitrirachmawati.wordpress.com/2012/12/13/bacillus-sp/> (online). Diakses tanggal 10 Oktober 2016.
- Ramesh C. Chandan, Charles H. White, Arun Kilara, Y. H. Hui PhD (2006). *Manufacturing yogurt and fermented milks*. Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-8138-2304-1.
- Rasyaf, 2007. *Beternak Ayam Broiler*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta
- Rheinheimer, G. 1980. *Aquatic Microbiology*. Half.com. diakses tanggal 21 September 2016.
- Robert Wayne Hutkins (2006). *Microbiology and Technology of Fermented Foods*. Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-8138-0018-9.
- Rolfe, R.D. 2000. The Role of Probiotic Cultures in the Control of Gastrointestinal Health. *Journal of Nutrition* 130: 396S-402S.
- Rose, S.P. 2001. *Principles of Poultry Science*. CAB International.
- Saarela, M., Mogensen, R., Fonde, J., Matto and T.M. Sandholm. 2000. Probiotic Bacteria: Safety, Functional and Technological Properties. *J Biotechnol* .84(2000).
- Salle, A.J. *Fundamental Principles of Bacteriology*. New Delhi : Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Ltd. 1979.
- Sandine WE. 1979. Roles of Lactobacillus in the Intestinal Tract. *J Food Protection*
- Shihab, M. Qurais. Tafsir Al-Misbah; *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Simon, O .2005. *Micro-organism as Feed Additives Probiotics*. Advances in Pork Production.

- Soeparno, 1998. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suharjono, 1988. *Konsumsi Pakan pada domba*. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Stryer, L. 1988. *Biochemistry*. W. H. Freeman and Company, New York. pp. 890-1004.
- Talaty, P. N., M. N. Katanbaf, and P. Y. Hester. 2009. *Life cycle changes in bone mineralization and bone size traits of commercial broilers*. *Poult. Sci.* 88:1070– 1077
- Triantarti, Hendro Santoso M. Pengaruh Substitusi Terhadap Sukrosa Murni Oleh Nira Tebu Sebagai Sumber Karbon pada Fermentasi Produksi Dekstran (Effect of Substituting Pure Sucrose by Sugarcane Juice as Carbon Source on the Fermentation of Dextran Production). *Jurnal Ilmu Dasar*, Vol. 8 No. 2, Juli 2007 : 193-198 193. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Surabaya, Indonesia.
- Wagner, 1993. T. Wagner *Chamomille production in Slovenia*. *Acta Horticult.*, 344 (1993).

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Kegiatan



**Gambar 1. Persiapan kandang penelitian, pakan dan kelengkapannya**



**Gambar 2. DOC yang digunakan berjumlah 48 ekor**



Gambar 3. Probiotik cair yang digunakan jenis bakteri *Entrococcus facialis*



Gambar 4. Bohlam 40 watt untuk menjaga suhu DOC tetap stabil





**Gambar 5. Proses pemberian air minum dan penambahan probiotik**



**Gambar 6 dan 7. Proses pemisahan dan pengambilan sampel tulang dari daging**

## RIWAYAT HIDUP



**Mudarsyah**, lahir di Sinjai 10 Maret 1995, Penulis merupakan putra kelima dari sembilan bersaudara dari pasangan Ambo H.L dan Hasniah. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada SD Negeri 45 Lembangan pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bikeru Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tahun 2007 dan lulus di tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bikeru Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2010 dan lulus dengan nilai memuaskan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Berkat Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa orang tua, saudara, sahabat seperjuangan penulis dan menempuh pendidikan Strata-1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis dapat menyelesaikan study dan berhasil menyusun skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Ayam Broiler”**.