

**PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK TERHADAP JUMLAH
KOLONI *Eschericia coli* PADA FESES BROILER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**FELIS GUNAWAN
NIM: 60700113052**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felis Gunawan
NIM : 60700113052
Tempat/Tanggal Lahir : Lamedde/24 April 1995
Jurusan : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. H. Muh. Yasin Limpo
Judul : Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Jumlah Koloni *Escheherichia coli* pada Feses Broiler

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh dinyatakan batal karena hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Felis Gunawan

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Jumlah Koloni *Escherichia coli* pada Feses Broiler**” yang disusun oleh **Felis Gunawan**, NIM: 60700113052, mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 21 Agustus 2017
Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Astaty, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irmawaty, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

Nip: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puja dan puji bagi Allah swt. Senang tiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang diutus oleh Allah swt. kepermukaan bumi ini untuk menjadi contoh dalam menjalani kehidupan dunia ini..

Limpahan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih tiada tara kepada **Ayahanda** tercinta **Suardi** dan **Ibunda Jundariah** yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis sampai saat ini dan senantiasa memanjatkan do’a dalam kehidupannya untuk keberhasilan penulis. Adiku yang tersayang, serta keluarga besarku yang selama ini banyak memberikan do’a, semangat dan saran. Semoga Allah swt. senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Nya.

Terima kasih tak terhingga kepada Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** selaku Pembimbing I dan kepada Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku Pembimbing II atas didikan, bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk dan menyumbangkan pikirannya dalam membimbing penulis mulai dari perencanaan penelitian sampai selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si.** dan **Ibu Astaty M. Si.** sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
5. **Ibu Irmawaty, S.Pt., M.P.** dan **Bapak Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada adik-adik senior-senior dan rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terkhusus **Banteng Angkatan 2013 (13ANTENG)** karena sudah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sehingga penulis tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** Angkatan 53 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, yang senangtiasa memotivasi sehingga penulis tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada teman-teman di **Mahasiswa Pencinta Masjid UIN Alauddin Makassar**, dan **Lembaga Kajian An-Nur Fakultas Sains dan Teknologi** yang senangtiasa memotivasi dan mengingatkan, sehingga penulis tidak lalai untuk beribadah kepada Allah swt, pada saat menyusun skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga besar **ISEH (I Study English Here)** karena telah memberikan segalanya sehingga penulis bisa menulis skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan selama penelitian, tim Penelitian Probiotik atas kerjasamanya **Andi Tenri Ikasari, Sartika, Jusmi, Siti Hardianti Basri, Amirullah, Mudarsyah.**
11. Terima Kasih banyak kepada kakak **Andi Afriana, SE** selaku pegawai jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas, Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku kepala laboratorium ilmu peternakan, Kakak **Muh. Arsan Jamili S.Pt**, dan **Hikmawati S.Pt**, selaku laboran jurusan ilmu peternakan yang ikut membimbing, memberi kritikan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah swt. Amin.

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, Agustus 2017

Penulis

Felis Gunawan


DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	3
c. Tujuan Penelitian	3
d. Manfaat Penelitian	3
e. Hipotesis	4
f. Defenisi Operasional	4
g. Ruang Lingkup Penelitian	5
h. Kajian Terdahulu	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
a. Broiler	6
1. Karakterisrik Broiler	8
2. Kebutuhan Nutrisi	11
3. Kandang dan Pencegahan Penyakit	11
b. Bakteri	12
1. Ukuran Bakteri	12
2. Bentuk Bakteri	13
3. Menghitung Bakteri	14
c. Probiotik	16
1. Mekanisme Kerja Probiotik	20
2. Mikroflora Usus	22
3. Bakteri Asam Laktat	24
4. Bakteri Asam Laktat Sebagai Probiotik.....	26

d. <i>Enterococcus faecalis</i>	29
e. <i>Escherichia coli</i>	32
1. Faktor-Faktor Virulensi <i>Escherichia coli</i>	34
2. Patogenesitas	36
3. Kolibasilosis	37
4. Cara penularan.....	38
5. Gejala Klinis	39
6. Perubahan Makroskopis dan Mikroskopis	40
7. Diagnosa	42
f. Tinjauan Islam Tentang Hewan Ternak dan Mikroorganisme	43
1. Hewan Ternak Dalam Al-Qur'an	44
2. Mikroorganisme Dalam Al-Qur'an	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
a. Waktu dan Tempat	52
b. Alat dan Bahan Penelitian	52
c. Jenis Penelitian	53
d. Rancangan Penelitian	53
e. Prosedur penelitian	54
1. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler.....	54
2. Proses perhitungan bakteri <i>Escherichia coli</i>	55
f. Parameter yang Diukur	57
g. Analisis Data	58
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
a. Hasil Penelitian	59
b. Pembahasan	59
BAB V. PENUTUP	
a. Kesimpulan	63
b. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii

DAFTAR TABEL

No 1. Standar Pertumbuhan Broiler.....	10
No 2. Kebutuhan Nutrisi Pakan Broiler.....	11
No 3. Jumlah Kebutuhan Pakan Broiler.....	11
No 4. Program Pencegahan Penyakit Dalam Pemeliharaan Broiler.....	12
No 5. Bahan Penyusun Ransum Penelitian.....	55
No 6. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian.....	55
No 7. Rataan Jumlah koloni <i>Eschericia coli</i> pada Feses Broiler.....	59



ABSTRAK

Nama : Felis Gunawan
Nim : 60700113052
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Jumlah Koloni *Escherichia coli* Pada Feses Broiler

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap jumlah koloni bakteri *Escherichia coli* pada feses broiler. Penelitian ini dilakukan di kandang unggas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dilanjutkan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buataan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (STPP Gowa), Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 43 hari. Percobaan dilakukan dalam rancangan acak lengkap 4 Perlakuan P0 (Tanpa Probiotik), P1 (1ml/hari), P2 (3ml/hari) P3 (5ml/hari) dengan 3 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan mikroba probiotik *Enterococcus faeceaalis* yang mengandung $9,8 \times 10^7$ cfu/ml. Parameter yang diukur adalah menghitung koloni bakteri *Escherichia coli*. Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan pemberian probiotik cair berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler.

Kata Kunci: Broiler, Probiotik, *Escherichia coli*.

ABSTRACT

Name : Felis Gunwan
Nim : 60700113052
Major : Ilmu Peternakan
Title Of Research : **The Influence of Probiotics on the Number of Colonies of *Escherichia coli* In Broiler Feces**

This study aims to determine the effect of probiotics on the number of colonies of *Escherichia coli* in broiler feces. The research was conducted at the poultry cage State Islamic University of Alauddin Makassar, and continued in Animal Health Laboratory and Insemination Built by Agricultural Extension School Gowa (STPP Gowa), of Makassar, South Sulawesi. This study was conducted for 43 days. The experiments were performed in complete randomized design 4 Treatment P0 (No Probiotics), P1 (1ml / day), P2 (3ml / day) P3 (5ml / day) with 3 replications. This study used the probiotic microbes *Enterococcus faecalis* containing 9.8×10^7 cfu / ml. The parameters measured were calculating colonies of *Escherichia coli* bacteria. Based on analysis of variance showed the provision of liquid probiotic significantly ($P < 0.05$) to the number of colonies *Escherichia coli* in broiler feces.

Keywords: *Broiler, Probiotics, Escherichia coli.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah, dibanding dengan daging sapi atau kambing. Keunggulan broiler adalah pertumbuhannya yang sangat cepat, sehingga dapat dijual sebelum usia lima minggu, dengan bobot rata-rata 1,5 kg. Broiler sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Pakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pemeliharaan ayam, khususnya ayam broiler.

Biaya pakan mencapai 60-70% dari total biaya produksi dan berperan meningkatkan efisiensi protein. Penggunaan bahan pakan lokal menjadi alternatif untuk menekan biaya produksi. Bahan pakan lokal yang digunakan tentunya harus memiliki beberapa fungsi pakan antara lain: memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh ternak, murah serta mudah didapat. Kandungan gizi utama yang berperan penting bagi pertumbuhan ayam pedaging adalah protein, energi (karbohidrat dan lemak), vitamin, mineral serta air (Farida dkk., 2015).

Salah satu *Feed additive* pakan yang dapat digunakan untuk mencapai produktivitas yang optimal dan efisien adalah dengan memberikan probiotik. Probiotik adalah jasad renik nonpatogen yang apabila dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat memberi manfaat bagi kesehatan dan fisiologi tubuh. Probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara memodulasi mikroflora usus dan sistem imun mukosa

terutama mukosa saluran cerna. Penggunaan probiotik dikalangan peternak ayam telah banyak dilakukan karena mempunyai berbagai fungsi, antara lain mampu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, mencegah radang usus dan diare, meningkatkan produksi telur dan memperbaiki kualitas telur (Farida dkk., 2015).

Ayam diketahui merupakan salah satu reservoir penting dari bakteri *Escherichia coli* yang perlu diwaspadai selain sapi sebagai reservoir utamanya (Heuvelink dkk., 1999). Sebagai salah satu serotipe *Escherichia coli* yang bersifat zoonosis, patogenitas dari bakteri ini ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan satu atau lebih sitotoksin yang sangat potensial yang dikenal dengan nama *shiga like toxin* atau *verotoxin*, di samping kemampuan bakteri ini untuk melakukan penempelan dan perlekatan terutama tidak memiliki kemampuan untuk merusak eritrosit dikelompokkan ke dalam kelompok *non-hemolitik* (McKane dan Kandel, 1998).

Penggunaan antibiotik untuk pengobatan, pemacu pertumbuhan dan pencegahan infeksi pada saluran pencernaan mengakibatkan ketidakseimbangan mikroorganisme yang menguntungkan dalam saluran pencernaan, residu dan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Untuk itu perlu alternatif pengganti dalam menanggulangi penyakit ini. Selama ini penggunaan probiotik pada ternak unggas digunakan sebagai pemacu pertumbuhan yang dapat menunjang performan optimum ternak yang bersangkutan. Probiotik dapat mempertahankan keseimbangan mikroorganisme yang menguntungkan dalam saluran pencernaan dan mengeliminasi mikroorganisme yang patogen melalui pengecualian kompetitif.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mengacu pada penelitian Sumardi dkk. (2010), yang menyatakan bahwa mikroba probiotik dapat menurunkan populasi bakteri *Escherichia coli*, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Jumlah Koloni *Escherichia coli* pada Feses Broiler”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian probiotik terhadap jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas broiler yang akan di produksi, bagi para peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian tersebut.
2. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan berkualitas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2003).

Untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk mengemukakan hipotesis sementara yakni: pemberian probiotik cair pada ransum dapat menurunkan jumlah koloni bakteri *Escherichia coli* pada feses broiler.

F. Defenisi Operasional

Broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (*Broiler*) adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik.

Probiotik merupakan mikroorganisme non patogen yang diberikan kepada ternak untuk mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi ransum, konversi ransum dan kesehatan ternak.

Escherichia coli merupakan salah satu anggota famili *enterobacteriaceae* yang sering menimbulkan penyakit diare.

Feses atau dalam bahasa kasarnya disebut tahi adalah produk buangan saluran pencernaan hewan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka.

Jumlah koloni adalah jumlah suatu organisme hidup, baik uniselular maupun multiselular dapat berada sebagai individu terpisah atau sebagai kumpulan yang bebas satu sama lain.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh probiotik terhadap jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Sumardi dkk. (2010), menunjukkan bahwa hasil secara *in vivo* dan *in vitro* pada broiler ternyata diketahui bahwa mikroba probiotik tersebut dapat menurunkan populasi bakteri *Escherichia coli*.

Penelitian Farida dkk. (2015), menunjukkan bahwa penambahan probiotik dalam pakan ayam pedaging dapat menekan mortalitas ayam pedaging. Disini nampak bahwa fungsi probiotik sama dengan antibiotik yaitu meningkatkan kekebalan. Perbedaannya adalah antibiotika merupakan zat kimia yang diserap didalam usus, yang dapat menimbulkan residu dalam jaringan dan dapat menyebabkan adanya mutasi mikroorganisme, sedangkan probiotik merupakan mikroorganisme hidup, tanpa menyebabkan residu dan mutasi, karena kerjanya hanya mendesak mikroorganisme patogen keluar dari dalam tubuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Broiler

Gordon dan Charles (2002), menyebutkan bahwa broiler adalah strain ayam hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangkan oleh perusahaan pembibitan khusus. Kata broiler berasal dari kata kerja "to broil" (sate) yang sering disama artikan dengan makna bahasa Inggris Amerika yaitu "to grill" (memanggang). Ensminger *et al.* (1992), menyatakan bahwa broiler adalah ayam muda yang berumur 6-9 minggu dengan jenis kelamin yang berbaaur dalam pemeliharaannya. Ciri-ciri broiler mempunyai tekstur kulit dan daging daging yang lembut, serta tulang dada merupakan tulang rawan yang fleksibel. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syura/26:133 sebagai berikut:

أَمْذَكُّرٍ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنٍ (١٣٣)

Terjemahnya:

Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak (Kementrian Agama RI, 2012).

Allah swt. menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak maksudnya sejumlah karunia Allah kepada kalian berupa unta, sapi dan domba, serta anak keturunan yang kuat, yang dapat memelihara ternak dan membantu kalian menanggung beban kehidupan (Shihab, 2010).

Broiler merupakan hasil teknologi yaitu persilangan antara ayam *Cornish* dengan *Plymouth rock*. Karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan rendah, dipanen cepat karena pertumbuhannya yang cepat, dan sebagai penghasil daging dengan serat lunak (Murtidjo, 1987).

Broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Disya, 2010).

Persyaratan mutu bibit broiler menurut Badan standardisasi nasional Indonesia (2005), yaitu berat *Day Old Chicken* (DOC) per ekor minimal 37 Gram dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ditemukan kelainan bentuk dan cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering. Warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan berkembang serta jaminan kematian *Day Old Chicken* (DOC) maksimal 2 %.

Untuk mewujudkan kemampuan genetik broiler diperlukan pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemberian ransum yang baik maka *National Research Council* (NRC) (1994), membuat patokan kebutuhan nutrisi bagi broiler. Kebutuhan protein untuk umur 0-3 minggu, 3-6 minggu dan 6-8 minggu masing-masing 23%, 20% dan 18% pada tingkat energi metabolisme protein (EMP) 3200 kkal/kg. Agustina (1995), menyatakan bahwa kandungan protein 22,51% dan

energi sebesar 2.813 kkal menghasilkan penambahan bobot badan, konsumsi, dan konversi yang paling baik.

Neto *et al.* (2000), menyatakan bahwa dengan pemberian energi sebesar 3.000 kkal dan protein 24% sangat nyata memberikan penambahan bobot badan dan konversi ransum yang paling baik pada umur 0-21 hari. Temim *et al.* (1999), berpendapat bahwa dengan peningkatan pemberian kadar protein dari 20 sampai 25% dapat memperbaiki pertumbuhan dan efisiensi ransum pada umur 4-6 minggu. Hal ini erat kaitannya dengan efisiensi ransum karena semakin dewasa ayam maka nilai efisiensi ransum akan semakin besar. Situasi ini terjadi karena ayam yang semakin berat akan makan lebih banyak ransum untuk menjaga ukuran berat badan, maka dari itu penggunaan protein sebesar 80% untuk menjaga berat badannya yang besar dan 20% untuk pertumbuhan sehingga efisiensi ransumnya menjadi kurang baik.

1. Karakteristik Broiler

Menurut Rasyaf (2004), broiler adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur di bawah 8 minggu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang banyak. Di Indonesia, broiler sudah dapat dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup antara 1,4-1,7 kg walaupun laju pertumbuhan belum mencapai maksimum, karena ayam broiler yang terlalu berat sulit dijual. Ciri khas daging broiler adalah rasanya khas dan enak, dagingnya empuk dan banyak, dan pengolahannya mudah tetapi cepat hancur dalam perebusan yang terlalu lama.

Menurut Suprijatna *et al.* (2005), Broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu rapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Siregar *et al.* (1980), bahwa ayam Broiler dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-sifat antara lain: ukuran badan besar, penuh daging yang berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat serta efisiensi penggunaan ransum tinggi.

Menurut Fadillah (2004), keunggulan broiler terlihat dari pertumbuhan berat badan yang terbentuk yang sangat didukung oleh temperatur udara di lokasi peternakan, temperatur yang stabil dan ideal untuk ayam adalah 26-28 °C, terjaminnya kuantitas dan kualitas pakan sepanjang tahun, teknik pemeliharaan yang tepat guna sehingga dihasilkan produk yang memberikan keuntungan maksimal dan kawasan peternakan yang terbebas dari penyakit. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Thaha/20:54 sebagai berikut:

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ (٥٤)

Terjemahnya:

Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal (Kementerian Agama RI, 2012).

Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Maksudnya, sebagian untuk makanan dan buah-buahan kalian dan sebagian lainnya untuk ternak kalian, yakni buat makanan ternak berupa dedaunan yang hijau dan yang kering. *Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.* Yakni dalil-dalil, bukti-bukti, dan tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal sehat

dan lurus. Semuanya itu menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada rabb selain Dia (Shihab, 2010).

Bukti ayat Al-Qur'an tersebut memerintahkan kita untuk memakan makanan dari apa yang kita tanam yaitu makanan yang halal contohnya seperti biji-bijian, buah-buahan dan memerintahkan untuk memelihara dan mengembalikan binatang-binatang ternak seperti unggas sapi dan lain-lain kerana itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. bagi orang-orang yang berakal.

Periode pemeliharaan broiler berdasarkan kecepatan pertumbuhannya umumnya dibagi menjadi dua, yaitu periode *starter* dan periode *finisher*. Periode *starter* dimulai pada umur 1-21 hari dan periode *finisher* dimulai pada umur 22-35 hari atau sesuai umur dan bobot potong yang diinginkan (Murwani, 2010). Broiler pada periode *starter* dan *finisher* memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda (Murtidjo, 2006).

Standar pertumbuhan broiler per minggu diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Standar Pertumbuhan Broiler

Umur (minggu)	Bobot Badan (gram)	Konsumsi Pakan (gram)	Konversi Pakan
1	162	139	0,858
2	420	460	1,095
3	784	1014	1,288
4	1260	1821	1,446
5	1789	2819	1,576
6	2340	3973	1,698
7	2879	5241	1,820

Sumber: Abidin (2002)

2. Kebutuhan Nutrisi

Kebutuhan nutrisi pakan broiler berdasarkan Standar Nasional Indonesia diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi Pakan Broiler

Nutrisi Pakan	Periode Pemeliharaan	
	<i>Starter</i>	<i>Finisher</i>
Kadar air (%)	Maks. 14,0	Maks. 14,0
Protein kasar (%)	Min. 19,0	Min. 18,0
Lemak kasar (%)	Maks. 7,4	Maks. 8,0
Serat kasar (%)	Maks. 6,0	Maks. 6,0
Abu (%)	Maks. 8,0	Maks. 8,0
Kalsium (Ca) (%)	0,90-1,20	0,90-1,20
Fosfor (P) (%)	0,60-1,00	0,60-1,00
Energi metabolisme (EM) (kkal/kg)	Min. 2900	Min. 2900

Sumber: SNI (2006)a-b.

Tabel 3. Jumlah Kebutuhan Konsumsi Pakan Broiler

Umur Broiler	Jumlah Kebutuhan Konsumsi Pakan
1-7 hari	17 gram/hari/ekor
8-14 hari	43 gram/hari/ekor
15-21 hari	66 gram/hari/ekor
22-29 hari	91 gram/hari/ekor
30-36 hari	111 gram/hari/ekor
37-43 hari	129 gram/hari/ekor

Sumber: Anonimous (2014)

3. Kandang dan Pencegahan Penyakit

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan antara lain kandang dan pencegahan penyakit. Kandang yang digunakan harus memiliki cukup ventilasi dan memiliki luas sesuai kapasitas broiler. Kapasitas pemeliharaan yang disarankan menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006), serta Rasyaf (2010) adalah sebanyak 11-12 ekor per meter persegi pada lokasi dataran tinggi dan 8-10 ekor per meter persegi pada lokasi dataran rendah.

Program pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan sanitasi yang baik serta vaksinasi. Program pencegahan penyakit pada ayam broiler menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006), diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Program Pencegahan Penyakit dalam Pemeliharaan Ayam Broiler

Umur (hari)	Vaksin/Obat	Teknik Pemberian	Tujuan
1-2	Hidrostress	Melalui air minum	Mengurangi stress
1-6	Vaksin ND	Melalui tetes mata	Mencegah ND
3-5	Obat	Melalui air minum	Mencegah CRD, <i>E.coli</i>
6-8	Vitamin	Melalui air minum	Mengurangi stress
9-11	Terapi	Melalui air minum	Mencegah Coccidiosis
12	Vaksin Gumboro	Melalui tetes mata	Mencegah Gumboro
12-15	Hidrostress	Melalui air minum	Mengurangi stress
16-17	Terapi	Melalui air minum	Mencegah Coccidiosis
18-19	Hidrostress	Melalui air minum	Mengurangi stress
21	Vaksin ND	Melalui tetes mata	Mencegah ND
22-23	Terapi	Melalui air minum	Mencegah Coccidiosis
24-27	Hidrostress	Melalui air minum	Mengurangi stress

Sumber: Kartasudjana dan Suprijatna (2006).

B. Bakteri

Bakteri berasal dari bahasa Yunani "*Bacterion*" yang berarti batang atau tongkat. Bakteri merupakan suatu kelompok mikroorganisme prokariotik bersel tunggal, yaitu tubuhnya terdiri atas sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. Bakteri berkembangbiak dengan membelah diri, dan karena begitu kecil maka hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop (Dwidjoseputro, 1998).

1. Ukuran Bakteri

Pada umumnya ukuran tubuh bakteri sangat kecil, umumnya bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali atau lebih. Pelczar dan Chan (1986), menjelaskan bahwa "Satuan ukuran bakteri ialah mikrometer (μm), yang setara dengan $1/1000$ mm atau 10^{-3} mm". Bakteri berbentuk kokus yang berdiameter $0,5 \mu$, ada pula berdiameter

sampai 2,5 μ , sedangkan bakteri berbentuk basil ada yang lebarnya 0,2 μ sampai 2,0 μ (Waluyo, 2004). Lebih lanjut Pelczar dan Chan (1986), mengatakan bahwa “Ukuran bakteri *Salmonellatyphi* adalah 0,6 - 0,7 μm ”.

2. Bentuk Bakteri

Menurut Waluyo (2004), menjelaskan bahwa bentuk bakteri dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Basil (*Bacillus*)

Basil merupakan bakteri yang mempunyai bentuk tongkat pendek/batang kecil dan silindris. Berdasarkan jumlah koloni dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni monobasil (*Monobacillus*), yaitu basil yang hidup menyendiri, diplobasil (*Diplobacillus*), yaitu koloni basil terdiri dari 2 basil, sedangkan streptobasil (*Streptobacillus*), yaitu koloni bakteri berbentuk rantai.

b. Kokus (*Coccus*)

Kokus adalah bakteri yang mempunyai bentuk bulat seperti bola-bola kecil. Berdasarkan jumlah koloni, kokus dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yakni monokokus (*Monococcus*), yaitu kokus yang hidup menyendiri, diplokokus (*Diplococcus*), yaitu koloni yang terdiri dari dua kokus, streptokokus (*Streptococcus*), yaitu koloni yang berbentuk seperti rantai, stafilokokus (*Staphylococcus*) yaitu koloni bakteri kokus yang membentuk untaian seperti buah anggur, sarsina (*Sarcina*), yaitu koloni bakteri mengelompok seperti kubus dan tetrakokus (*Tetracoccus*), yaitu koloni yang terdiri dari empat kokus.

c. Spiril (*Spirillum*)

Spiril merupakan bakteri yang berbentuk bengkok atau berbengkok-bengkok seperti spiral. Bakteri yang berbentuk spiral sangat sedikit jenisnya. Golongan ini merupakan golongan yang paling kecil jika dibandingkan dengan golongan basil dan golongan kokus.

3. Menghitung Bakteri

Fardiaz (1989) menyatakan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah jasad renik di dalam suatu suspensi atau bahan, yang dapat dibedakan atas beberapa kelompok yaitu :

a. Perhitungan Jumlah Sel

- 1) Hitungan mikroskopik
- 2) Hitungan cawan
- 3) MPN (Most Probable Number)

b. Perhitungan Massa Sel Secara Langsung

- 1) Volumetrik
- 2) Gravimetrik
- 3) Kekeruhan (Turbidimetri)

c. Perhitungan Massa Sel Secara Tidak Langsung

- 1) Analisis komponen sel
- 2) Analisis produk katabolisme
- 3) Analisis konsumsi nutrient

Dari metode-metode tersebut, metode hitungan cawan paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan metode hitungan cawan merupakan cara yang paling sensitif untuk menghitung jumlah mikroba karena:

- a. Hanya sel yang masih hidup yang dihitung
- b. Beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus
- c. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari satu sel dengan penampakan pertumbuhan yang spesifik.

Prinsip dari metode hitungan cawan adalah menumbuhkan sel mikrobia yang masih hidup pada metode agar, sehingga sel mikrobia tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop (Fardiaz, 1993).

Menurut Fardiaz (1993), Metode hitungan cawan dapat dibedakan atas dua cara yaitu :

- a. Metode tuang (Pour Plate)
- b. Metode permukaan (Surface /Spread Plate)

Pada perhitungan menggunakan metode cawan, diperlukan suatu pengenceran agar jumlah koloni mikrobia yang ada pada cawan dapat dihitung dan sesuai standar, yaitu berjumlah 30-300 per cawan. Pengenceran dilakukan secara decimal untuk memudahkan perhitungan.

Perhitungan metode cawan menggunakan rumus sebagai berikut :

Faktor pengenceran = pengenceran x jumlah yang ditumbuhkan

Jumlah koloni Standard Plate Count (SPC) = jumlah koloni x

C. Probiotik

Probiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya *for life* (untuk hidup) memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Istilah probiotik pertama kali digunakan oleh Lilley dan Stiwell pada tahun (1965), menyatakan bahwa substansi yang dihasilkan mikroba untuk menstimulir pertumbuhan mikroba lainnya dalam saluran pencernaan. Probiotik adalah mikroba hidup atau spora yang dapat hidup atau berkembang di dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolitnya. Substrat dapat mengubah mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik (Kompiang, 2009).

Probiotik diartikan sebagai suplemen pakan yang berisi mikrobia hidup (*direct feed microbials*) baik bakteri, kapang dan khamir yang dapat menguntungkan bagi inangnya dengan jalan memperbaiki keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan. Probiotik banyak dijadikan alternatif untuk menggantikan penggunaan antibiotik yang berlebihan atau paling tidak menurunkan dosis yang digunakan, karena penggunaan antibiotik yang terus menerus pada pakan akan meninggalkan residu pada produk ternak dan dapat meningkatkan resistensi bakteri patogen terhadap antibiotik (Fuller, 1992).

Probiotik yang efektif harus memiliki kriteria antara lain: memberikan efek menguntungkan bagi induk semangnya, tidak menyebabkan penyakit dan tidak beracun atau tidak toksik, mengandung sel hidup lebih dari 10^6 , mampu bertahan pada suasana asam dan melakukan aktivitas metabolisme dalam saluran pencernaan, tetap hidup dalam selama penyimpanan dan tidak terjadi

kekebalan terhadap keberadaan probiotik baru. Pemberian probiotik memberikan efek menguntungkan seperti pengurangan kemampuan mikroorganisme patogen dalam memproduksi toksin, menstimulir enzim pencernaan serta dihasilkannya vitamin dan substansi *antimicrobial* sehingga meningkatkan status kesehatan inang. Keuntungan lain penggunaan probiotik adalah dapat mengurangi tekanan negatif yang diakibatkan adanya hambatan pakan (berupa anti nutrisi) pada pakan karena probiotik mampu menstimulasi peningkatan ketersediaan zat gizi bagi induk semang (Fuller, 1992).

Kriteria probiotik menurut FAO/WHO (2001), adalah strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Syarat lain probiotik ialah mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan kesehatan. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses fisikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Probiotik digunakan pada pemberian pakan ternak yang disuplementasi dengan mikroba pada tahun 1960 untuk membantu hewan ternak khususnya dalam saluran pencernaannya. Sejalan dengan perkembangan zaman maka banyak

dilakukan penelitian mengenai mekanisme probiotik yang menggunakan hewan percobaan untuk diekstrapolasikan pada manusia (Fuller, 1992).

Penggunaan probiotik pada ternak unggas bertujuan untuk memperbaiki saluran pencernaan dengan cara: (1) menekan reaksi pembentukan racun dan metabolit yang bersifat karsinogenik (penyebab kanker), (2) merangsang reaksi enzim yang dapat menetralkan senyawa beracun yang tertelan atau dihasilkan oleh saluran pencernaan, (3) merangsang produksi enzim (enzim protease dan alfaamilase) yang digunakan untuk mencerna pakan, (4) memproduksi vitamin dan zat-zat yang tidak terpenuhi oleh tubuh (Seifert and Gessler, 1997).

Menurut Kompiang (2009), menyatakan bahwa dampak penggunaan probiotik yang hasilnya bervariasi dimungkinkan, karena probiotik bukan merupakan faktor tunggal, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja probiotik antara lain adalah: komposisi mikrobiota inang, cara pemberian probiotik, umur dan jenis inang, serta kualitas dan jenis probiotik yang digunakan.

a. Komposisi Mikrobiota Inang

Kinerja ternak seperti diuraikan di atas dipengaruhi oleh komposisi mikrobiota dalam ususnya. Oleh karena itu, agar probiotik mempunyai dampak, mikrobiota pada usus harus mengandung mikroba yang mempunyai dampak negatif terhadap inangnya, misalnya mikroba yang menekan pertumbuhan bobot hidup. Bila mikroba semacam itu tidak ada maka penambahan probiotik tidak ada atau kurang manfaatnya. Kenyataan ini juga berlaku pada penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan.

Walaupun dalam mikrobiota usus terdapat berbagai jenis mikroba, probiotik tidak harus mengandung kesemuanya, karena ternak kemungkinan hanya kekurangan satu atau beberapa strain saja. Dengan demikian, apakah probiotik mengandung mikroba yang benar atau tidak, sesuai dengan kebutuhan, bergantung pada jenis mikroba yang tidak dimiliki ternak.

b. Cara Pemberian

Penggunaan probiotik yang sama kemungkinan akan memberi hasil yang berbeda pada lokasi yang berlainan bila cara pemberiannya berbeda, seperti diberikan secara terus-menerus atau dengan menggunakan dosis tunggal. Sampai saat ini belum diketahui dosis probiotik minimal yang efektif. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa pengaruh probiotik biasanya akan cepat atau lambat hilang setelah pemberiannya dihentikan. Umur dan Jenis Inang Komposisi mikrobiota pada usus ternak terus berubah dengan bertambahnya umur. Pada umumnya, probiotik akan lebih efektif bila diberikan pada ternak yang masih muda.

c. Kualitas dan Jenis Probiotik yang Digunakan

Viabilitas probiotik sangat berpengaruh pada hasil penggunaannya. Pada percobaan atau aplikasi di lapang, sangat jarang dilakukan verifikasi untuk mengetahui apakah kandungan probiotik yang digunakan sesuai dengan yang tertera pada label, baik jumlah maupun strain mikroba. Hasil yang kurang memuaskan kemungkinan besar dapat terjadi karena viabilitas mikroba tidak sebaik yang tertera pada label. Di samping itu, mikroba dari spesies yang sama namun beda strain, kemungkinan mempunyai efektivitas yang berbeda.

Menurut Fuller (1992), bakteri probiotik harus memiliki persyaratan yaitu memberikan efek yang menguntungkan pada host, tidak patogenik dan tidak toksik, mengandung sejumlah besar sel hidup, mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan melakukan kegiatan metabolisme dalam usus, tetap hidup selama dalam penyimpanan sampai waktu digunakan, mempunyai sifat sensori yang baik, diisolasi dari *host*.

Beberapa mikroba yang mempunyai potensi sebagai probiotik antara lain adalah *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus delbrueckii*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus cellobiosus*, *Lactobacillus brevis*, *Aspergillus oryzae*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium pseudologum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium suis*, *Bifidobacterium thermophilum*, *Bacillus subtilis*, *Enterococcus faecum*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Streptococcus faecium* dan *Streptococcus intermedius* (Kompiani, 2009).

1. Mekanisme Kerja Probiotik

Mekanisme kerja dari probiotik menurut Fuller (2001), antara lain adalah:

a. Menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan.

Kemampuan probiotika untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus adalah sesuatu yang diinginkan. Hal ini merupakan tahap pertama untuk berkolonisasi, dan selanjutnya dapat dimodifikasi untuk sistem imunisasi/kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba-mikroba probiotika berkembang dengan baik dan mikroba-mikroba patogen tereduksi dari sel-sel

usus hewan inang, sehingga perkembangan organisme-organisme patogen yang menyebabkan penyakit seperti *Eshericia coli*, *Salmonella thyphimurium* dalam saluran pencernaan akan mengalami hambatan. Sejumlah probiotik telah memperlihatkan kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus manusia seperti *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum* dan sejumlah besar *bifidobacteria* (McNaught dan MacFie, 2000).

b. Berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat anti *microbial* mikroba.

Probiotik menghambat organisme patogenik dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah terbatas substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat bahan makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotika dapat berkembang dengan baik. Sejumlah probiotik menghasilkan senyawa/zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba-mikroba probiotik penghasil asam laktat dari spesies *Lactobacillus*, menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah komponen serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan ternak unggas. Saat ini penggunaan bahan makanan ternak (pakan) untuk unggas kebanyakan berasal dari limbah industri atau limbah pertanian yang pada umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan mikroba-mikroba probiotika yang menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dari limbah industri dan pertanian tersebut, dan mikroba probiotika membantu proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan penambahan bobot

badan. Mikroba probiotik juga mensekresikan produk anti *microbial* yang dikatakan *bacteriocin*. Sebagai contoh *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan dua komponen *bacteriocin* yaitu *bacteriocin lactacin B* dan *acidolin*. *Bacteriocin lactacin B* dan *acidolin* bekerja menghambat berkembangnya organisme patogen (McNaught dan MacFie, 2000).

c. Menstimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang.

Mikroorganisme probiotika mampu mengatur beberapa aspek dari system kekebalan hewan inang. Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang mereduksi/menghambat perkembangan mikroba-mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin-toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotik bagi mikroba-mikroba patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut akan bekurang dan dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya. Hal ini akan memberikan keuntungan terhadap kesehatan hewan inang sehingga tahan terhadap serangan penyakit. Penggunaan probiotik pada ternak unggas dilaporkan dapat menurunkan aktivitas urease, suatu enzim yang bekerja menghidrolisis urea menjadi amonia sehingga pembentukan amonia menjadi berkurang. Amonia adalah suatu bahan yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak unggas (Yeo dan Kim, 1997).

2. Mikroflora Usus

Mikroflora usus adalah mikroorganisme yang umum ditemukan hidup pada saluran pencernaan dan memberikan efek menguntungkan bagi inangnya. Flora normal pada usus manusia memiliki fungsi perlindungan

yang penting. Bakteri asam laktat menekan bakteri dan virus menstimulir daya tahan lokal dan sistemik serta merubah aktivitas metabolik mikroba dalam usus (Salminen and Wright, 1993).

Saluran pencernaan manusia dihuni oleh mikroflora berupa bakteri. Jenisnya mencapai lebih dari 300 spesies dengan jumlah lebih dari 100 triliun. Secara alami mikroflora saluran pencernaan dapat mencegah pertumbuhan berlebih bakteri patogen. Probiotik menambah jumlah mikroflora dalam usus untuk meningkatkan kerja mikroflora normal sehingga meningkatkan fungsi pertahanan mukosa usus (Parves *at al.*, 2006).

Menurut Husoda *et al.* (1996), pada saluran pencernaan, pH merupakan faktor penting yang mendukung fungsi pencernaan. Perut mempunyai pH yang sangat rendah antara 2-4. kondisi ini penting untuk pencernaan dan membunuh bakteri patogen dalam makanan. Pada saluran pencernaan pH meningkat secara bertahap sampai pada usus besar. Bakteri asam laktat lebih menyukai lingkungan asam, sedangkan kondisi basa lebih disukai oleh bakteri putreaktif. Ada persaingan pada saluran pencernaan antara bakteri fermentatif dan putreaktif.

Bakteri fermentatif menghasilkan asam organik untuk menjaga pH rendah yang mendukung pertumbuhan dan aktivitasnya. Bakteri putreaktif menghasilkan amonia untuk meningkatkan pH. Jika pH meningkat, bakteri putreaktif dan candida dapat hidup dan menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat yang dapat membuat gangguan pada pencernaan. Penggunaan bakteri probiotik sebagai bahan pangan memberikan beberapa keuntungan pada sistem pencernaan. Salah

satu keuntungan tersebut adalah membantu mengendalikan mikroorganisme patogen di dalam saluran pencernaan.

Hasil beberapa penelitian mengungkapkan bahwa mengonsumsi susu yang mengandung bakteri asam laktat berpengaruh terhadap mikloflora pada feses manusia maupun hewan percobaan. Hasil penelitian secara umum adalah bahwa mengonsumsi probiotik menyebabkan peningkatan jumlah bakteri yang menguntungkan seperti *Laktobasili* dan *Bifidobakteria*, dan menekan jumlah bakteri usus yang berpotensi sebagai pathogen seperti bakteri *koliform* dan *enterobacteriaceae* (Husoda *et al.*, 1996).

3. Bakteri Asam Laktat

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram-positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella* (Salminen *et al.*, 2004).

Sebagian besar bakteri asam laktat BAL dapat tumbuh sama baiknya di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki O₂ (tidak sensitif terhadap O₂), sehingga termasuk *anaerob aerotoleran* (Madigan end Martinko, 2006). Bakteri yang tergolong dalam BAL memiliki beberapa karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki porfirin dan sitokrom, katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya mendapatkan energi dari fosforilasi substrat (Salminen

et al., 2004). Hampir semua BAL hanya memperoleh energi dari metabolisme gula sehingga habitat pertumbuhannya hanya terbatas pada lingkungan yang menyediakan cukup gula atau bisa disebut dengan lingkungan yang kaya nutrisi. Kemampuan mereka untuk menghasilkan senyawa (biosintesis) juga terbatas dan kebutuhan nutrisi kompleks bakteri asam laktat BAL meliputi asam amino, vitamin, purin, dan pirimidin (Madigan and Martinko, 2006).

Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin, diproduksi oleh *Lactobacillus lactis ssp.* Nisin dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, yaitu *Bacillus*, *Clostridium*, *Staphylococcus*, dan *Listeria*. Senyawa bakteriosin yang diproduksi BAL dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membahayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin (Walstra *et al.*, 2005).

Selain bakteriosin, senyawa antimikroba (penghambat bakteri lain) yang dapat diproduksi oleh BAL adalah hidrogen peroksida, asam lemah, reuterin, dan diasetil. Senyawa-senyawa tersebut juga berfungsi untuk memperlama masa simpan dan meningkatkan keamanan produk pangan. BAL menghasilkan hidrogen peroksida (H_2O_2) untuk melindungi selnya terhadap keracunan oksigen. Namun, H_2O_2 dapat bereaksi dengan senyawa lain (contohnya tiosianat endogen dalam susu mentah) hingga menghasilkan senyawa penghambat mikroorganisme lain. Mekanisme ini disebut sebagai sistem antimikroba laktoperoksidase (Taylor, 2004).

Asam laktat dan asam lemah lain yang dihasilkan BAL dapat memberikan efek bakterisidal untuk bakteri lain karena pH lingkungan dapat turun menjadi 3-4,5. Pada pH tersebut, BAL tetap dapat hidup sedangkan bakteri lain, termasuk bakteri pembusuk makanan yang merugikan akan mati (Rostini, 2007). Reuterin adalah senyawa antimikrobia efektif untuk melawan berbagai jenis bakteri (bersifat spektrum luas), yang diproduksi oleh *Lactobacillus reuteri* selama pertumbuhan anaerobik terjadi dengan keberadaan gliserol. Diasetil adalah senyawa yang menentukan rasa dan aroma mentega, serta aktif melawan bakteri gram negatif, khamir, kapang (Taylor, 2004).

Sebagian bakteri BAL dapat mengurangi jumlah bakteri patogen secara efektif pada hewan ternak, contohnya bakteri jahat *Escherichia coli* O157 dan *Salmonella*. Di samping itu, BAL juga dikonsumsi manusia dan hewan sebagai bakteri probiotik, yaitu bakteri yang dimakan untuk meningkatkan kesehatan atau nutrisi tubuh. Beberapa spesies BAL merupakan probiotik yang baik karena dapat bertahan melewati pH lambung yang rendah dan menempel atau melakukan kolonisasi usus. Akibatnya, bakteri jahat di usus akan berkurang karena kalah bersaing dengan BAL (Taylor, 2004).

4. Bakteri Asam Laktat sebagai Probiotik

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan mikrobia yang berpotensi sebagai probiotik. Organisme pembentuk asam laktat terbagi dua spesies, yaitu yang pertama spesies *homofermentatif* yang mampu mengubah 95% *Heksosa* menjadi asam laktat, kemudian yang kedua spesies *heterofermentatif*, merupakan grup yang memproduksi

asam laktat dalam jumlah sedikit dan produk yang dihasilkan yaitu etil alkohol, asam asetat, asam format dan karbondioksida (Purwandhani dan Rahayu, 2003).

Bakteri asam laktat yang tergolong *homofermentatif* adalah *Lactobacillus sp*, *Streptococcus sp*, *Peddiococcus sp*, sedangkan yang tergolong *heterofermentatif* adalah *Leuconostoc sp* (McDonald *et al.*, 1981). Bakteri asam laktat secara fisiologis dikelompokkan sebagai bakteri gram positif, bentuk *coccus* atau batang yang tidak berspora dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Bakteri asam laktat pada proses fermentasi karbohidrat dapat menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH. Penurunan nilai pH dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, terutama bakteri patogen (Harimurtz *et al.*, 2005).

Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai probiotik adalah bakteri dari golongan *Lactobacillus* karena golongan bakteri ini memiliki hampir semua karakteristik yang diperlukan suatu bakteri untuk digunakan sebagai probiotik. *Lactobacillus* dapat menurunkan pH lingkungan usus dengan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen. Keistimewaan ini yang membuat bakteri golongan *Lactobacillus* menjadi agen untuk bermacam produk probiotik di seluruh dunia.

Allah menciptakan makhluk-Nya mempunyai fungsi dan tujuan, tidak satupun ciptaan-Nya yang sia-sia, termasuk BAL yang diciptakan oleh Allah dengan banyak manfaat, Allah berfirman dalam QS. Shaad/38: 27 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧)

Terjemahnya:

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka (Kementrian Agama RI, 2012).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan makhlukNya di antara langit dan bumi tidaklah sia-sia, tetapi dengan hikmah yang nyata dan berguna bagi manusia apabila manusia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Wardhana, 2004).

Dasar penelitian untuk mengetahui perkembangan probiotik adalah peran mereka untuk melindungi inang melawan kolonisasi oleh mikroorganisme non indigenus pada saluran pencernaan. Menurut Fuller (1989) dan Havenaar (1993), efek probiotik dari BAL dapat dibagi menjadi 3 mekanisme aksi yaitu:

1. Penekanan mikroorganisme pada saluran pencernaan, yaitu dengan memproduksi substansi antibakteria seperti asam laktat, asam asetat, karbondioksida, diasetil, asetaldehid, hidrogen peroksida dan bakteriosin yang merupakan protein yang meningkatkan aktifitas antimikrobal terhadap bakteri lain dengan kekerabatan yang dekat.
2. Perubahan metabolisme mikrobial pada saluran pencernaan:
 - a. Peningkatan aktifitas dari enzim yang penting seperti galaktosidase pada pengurangan laktosa yang tidak bisa dicerna pada orang yang mengalami *lactosa intolerance*.

- b. Penurunan aktifitas dari beberapa enzim kolon seperti glucuronidase, glukosidase, nitroreduktase, azoreduktase dan steroid-7, denydroxylase yang diketahui mempunyai efek karsinogenik.
3. Stimulasi pada kekebalan tubuh Beberapa laporan menunjukkan bahwa penggunaan *Lactobacilli* dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan meningkatkan sirkulasi dan produksi antibodi alami dari tubuh, konsentrasi interferon gamma, aktifitas makrofag dan jumlah sel pembunuh alami. Pemasukan dari BAL sebagai anggota dari mikroflora usus pada mukosa dan organ lainnya merupakan langkah penting untuk meningkatkan mukosa normal dan kekebalan tubuh (Havenaar, 1993).

D. *Enterococcus faecalis*

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecum* diaplikasikan pada manusia dan hewan sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Batrinon, 2010).

Enterococcus faecalis merupakan bakteri kokus Gram positif berbentuk ovoid berdiameter antara 0,5–1 um yang dapat berkoloni secara rantai, berpasangan ataupun soliter. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, mempunyai kemampuan untuk hidup dan berkembang biak dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Bakteri ini mengkatabolisme berbagai sumber energi antara lain

karbohidrat, gliserol, laktat, malate, sitrat, arginin, agmatin dan asam α keto lainnya. *Enterococcus faecalis* merupakan mikroorganisme yang dapat bertahan dalam lingkungan yang sangat ekstrim, termasuk pH yang sangat alkalis dan konsentrasi garam yang tinggi (6,9) (Evan *et al.*, 2002).

Pada studi invitro, *Enterococcus faecalis* menunjukkan kemampuan untuk menginvasi tubuli dentin, dimana tidak semua bakteri memiliki kemampuan tersebut. *Enterococcus faecalis* dapat memasuki fase *Viable But Non Culturable* (VBNC) suatu fase bakteri yang dapat bertahan hidup tetapi tidak berkembang biak. Mekanisme pertahanan hidup ini dimiliki beberapa spesies bakteri ketika berada dalam lingkungan yang sulit. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga lingkungan kembali normal. Habitat bakteri ini adalah pada saluran pencernaan, saluran kemih dan juga dapat berkoloni dalam rongga mulut manusia. *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri yang tidak membentuk spora, fakultatif anaerob, kokus Gram positif dan tidak menghasilkan reaksi katalase dengan hidrogen peroksida (Kundabala dan Suchitra, 2002).

Dinding sel bakteri *Enterococcus faecalis* ini terdiri dari peptidoglikan 40%, sisanya merupakan *teichoic acid* dan polisakarida (Luis *et al.*, 2004) Sintesis peptidoglikan dihasilkan oleh keseimbangan antara enzim polimerisasi dan hidrolitik. Peptidoglikan merupakan makromolekul utama yang terlibat dalam penentuan bentuk sel dan pemeliharaannya. Zat ini juga berguna sebagai lapisan pelindung dari kerusakan oleh tekanan osmotik sitoplasma yang tinggin (Signoretto dkk., 2000).

Faktor-faktor virulen yang dimiliki *Enterococcus faecalis* menyebabkan bakteri ini memiliki kemampuan untuk membentuk kolonisasi pada *host*, dapat bersaing dengan bakteri lain, resisten terhadap mekanisme pertahanan *host*, menghasilkan perubahan patogen baik secara langsung melalui produksi toksin atau secara tidak langsung melalui rangsangan terhadap mediator inflamasi. Faktor-faktor virulen tersebut adalah komponen *aggregation substance*, *surface adhesins*, *sex pheromones*, *lipoteichoic acid*, *extraceluller superoxide production*, *gelatinase lytic enzyme*, *hyalurodinase*, dan *cytolysin toxin* (Kayaoglu dan Orstavik, 2004). Faktor-faktor virulensi ini berperan penting dalam patogenesis, sehingga *Enterococcus faecalis* dapat melekat pada sel hospes dan matrik ekstraselular, memudahkan invasi ke jaringan, mempunyai efek *immunomodulasi*, dan menimbulkan kerusakan melalui media toksinnya (Portenier, 2003).

Bakteri *Enterococcus faecalis* menghasilkan perubahan patogen baik secara langsung melalui produksi toksin atau secara tidak langsung dengan cara menginduksi proses inflamasi. *Sex pheromones*, *lipoteichoic acid* dan *peptide corresponding inhibitor* memodulasi proses inflamasi lokal dengan cara menstimulasi leukosit untuk melepas beberapa mediator yang ikut berperan dalam kerusakan periradikular. *Lipoteichoic acid* menstimulasi leukosit untuk melepas beberapa mediator inflamasi berupa TNF interleukin 1 beta (IL-1 β), interleukin 6 (IL-6), interleukin 8 (IL-8) dan *superoxide anion* yang dikultur dari monosit dan leukosit manusia (Kayaoglu dan Orstavik, 2004).

Enterococcus faecalis resisten terhadap banyak antibiotik spektrum luas. Resistensi *Enterococcus faecalis* terhadap antimikroba diperoleh secara intrinsic maupun *acquired* (didapat) melalui transfer gen. Resistensi *acquired* diperoleh dari mutasi DNA atau dapat juga dari gen yang baru melalui transfer plasmid dan transposons (Kundabala dan Suchitra, 2002). Selain itu, adanya mekanisme yang mempertahankan level pH *cytoplasmic* tetap optimal menyebabkan bakteri tersebut juga resisten terhadap antimikroba kalsium hidroksida. Seperti diketahui bahwa dalam lingkungan alkali *Enterococcus faecalis* akan menjaga homeostasis melalui pH internal yang berfungsi untuk menjaga agar enzim dan protein berfungsi normal. Prinsip homeostasis terdiri dari dua komponen, yaitu fungsi pasif dan aktif. Fungsi pasif terdiri dari permeabilitas membran yang rendah dan kemampuan buffer sitoplasma. Sedangkan mekanisme aktif melalui kontrol transport kation (kalium, natrium dan proton) melalui membran sel. Pada lingkungan asam sistem *antiport* kation akan meningkatkan pH internal dengan keluarnya proton melalui membrane sel. Pada keadaan basa kation/proton akan dipompa ke dalam sel agar pH internal lebih rendah. Fungsi pompa proton intraseluler merupakan faktor utama dari resistensi *Enterococcus faecalis* terhadap pH (Evan *et al.*, 2002).

E. Escherichia coli

Bakteri *Escherichia coli* merupakan spesies dengan habitat alami dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. *Escherichia coli* pertama kali diisolasi oleh Theodor Escherich dari tinja seorang anak kecil pada tahun 1885. Bakteri ini berbentuk batang, berukuran 0,4-0,7 x 1,0-3,0 μm , termasuk gram

negatif, dapat hidup soliter maupun berkelompok, umumnya motil, tidak membentuk spora, serta fakultatif anaerob (Carter and Wise, 2004).

Reservoir *Escherichia coli* yang paling penting adalah pada saluran pencernaan hewan, termasuk unggas. Pada ayam terdapat sekitar 10^9 Colony Forming Units (CFU) bakteri per gram feses dan 10^6 CFU merupakan *Escherichia coli*. *Escherichia coli* juga sering diisolasi dari saluran pernapasan bagian atas dan juga didapatkan dari kulit unggas dan bulu (Kabir, 2010). Bakteri ini ditularkan secara horisontal yaitu melalui burung lain, feses, air, dan pakan. Tikus pun ikut berperan dalam membawa bakteri *Escherichia coli* strain APEC yang merupakan sumber kontaminasi untuk burung lainnya (Barnes *et al.* 2003).

Bakteri *Escherichia coli* dapat membentuk koloni pada saluran pencernaan manusia maupun hewan dalam beberapa jam setelah kelahiran. Faktor predisposisi pembentukan koloni ini adalah mikroflora dalam tubuh masih sedikit, rendahnya kekebalan tubuh, faktor stres, pakan, dan infeksi agen patogen lain. Kebanyakan *Escherichia coli* memiliki virulensi yang rendah dan bersifat oportunistik (Post, 2005).

Koloni yang tumbuh berbentuk bulat, halus, cembung dan berwarna merah-hitam atau berwarna hijau mengkilap atau biru kehitaman sampai coklat dengan pendar metallic sheen pada media *Eosin Methylene Blue* (EMB) (Quinn *et al.*, 2002). Fermentasi laktosa dan sukrosa menyebabkan koloni pada EMB berwarna gelap, presipitasi gelap ini dikarenakan MB-eosinate yang dipresipitasi oleh koloni yang memfermentasi laktosa dan sukrosa. Larutan gelap terabsorpsi ke dalam koloni (Howard *et al.*, 1987). Semua bakteri *Escherichia coli* memfermentasi

glukosa, laktosa, dan sukrosa, juga memproduksi gas tetapi tidak memproduksi H₂S, memberikan hasil positif pada uji *indol*, *motility*, *methyl red*, dan negatif pada uji *Voges proskauer dan citrat* (Barnes & Gross, 1997).

Struktur sel *Escherichia coli* dikelilingi oleh membran sel, terdiri dari sitoplasma yang mengandung *Nucleoprotein*. Membran sel *Escherichia coli* ditutupi oleh dinding sel berlapis kapsul. Flagela dan pili *Escherichia coli* menjulur dari permukaan sel. Tiga struktur antigen utama permukaan yang digunakan untuk membedakan *Serotipe* golongan *Escherichia coli* adalah dinding sel, kapsul dan flagela. Dinding sel *Escherichia coli* berupa lipopolisakarida yang bersifat pirogen dan menghasilkan endotoksin serta diklasifikasikan sebagai antigen O. Kapsul *Escherichia coli* berupa polisakarida yang dapat melindungi membran luar dari fagositik dan sistem komplemen, diklasifikasikan sebagai antigen K. Flagela *Escherichia coli* terdiri dari protein yang bersifat antigenik dan dikenal sebagai antigen H. Faktor virulensi *Escherichia coli* juga disebabkan oleh *enterotoksin*, *hemolisin*, *kolisin*, *siderophor*, dan molekul pengikat besi (*aerobaktin dan entrobaktin*) (Quinn *et al.*, 2002).

1. Faktor-faktor virulensi *Escherichia coli*

Escherichia coli memiliki struktur antigenik O, K, dan H. Struktur antigenik tersebut dapat digunakan untuk klasifikasi *Escherichia coli*. Antigen O merupakan endotoksin yang menyebabkan autolisis pada otot polos. Antigen K dihubungkan dengan virulensi, Biasanya antigen K (A) tahan terhadap panas, tetapi rusak pada pemanasan 120 °C selama 2 jam. Antigen K (A) tersusun dari polisakarida. Antigen K (B) rusak pada pemanasan 100 °C dan tersusun dari lipopolisakarida. Antigen

fimbria (F) berfungsi sebagai alat untuk adhesi, yang melindungi bakteri saat melewati brush border sel epitel pada usus halus. Antigen H jarang digunakan untuk identifikasi *Escherichia coli* dan tidak ada hubungannya dengan patogenesis (Barnes dan Gross, 1997). Berbagai serotipe *Escherichia coli* dapat menginfeksi sebagian besar mammalia dan unggas. Khusus pada ayam dinamakan Avian Pathogenic *Escherichia coli* (APEC). *Escherichia coli* yang menyebabkan gangguan pada ayam umumnya berasal dari bakteri *Escherichia coli* dengan antigen O1, O2 dan O78, serotipe O8:K50 dan O9:K30 mampu menyebabkan kematian pada anak ayam umur satu hari (Arne *et al.*, 2000).

Beberapa faktor virulensi yang terdapat pada *Escherichia coli* galur APEC diantaranya: *aerobactin iron transport*, fimbria C, P dan S, D, protein tsh, *hly E* dan protein *Ibe A*, *hemolisin F*. *Aerobactin* merupakan sistem uptake *Fe* yang memungkinkan *Escherichia coli* dapat bertahan dengan kadar *Fe* rendah atau terbatas (Quinn *et al.*, 2002). Pada saat jaringan berada dalam kondisi *Fe* yang rendah, *siderophore* dieksresikan ke jaringan dan mengikat *Fe* dari *transferring* (Dho-Moulin, 2000). *Siderophore* (pengikat *Fe*) yang berhubungan dengan sistem uptake *Fe* pada *Escherichia coli* dibagi menjadi 3 tipe: *enterobaktin* yang mampu memindah *Fe* dari protein *binding-Fe* ke dalam sel bakteri, *aerobactin* yang dapat dibedakan dari *enterobaktin* melalui kemampuannya menghindari dari ikatan *serum albumin* dan *non-native siderophore* yang terdapat pada fungi yaitu *siderophore ferrichrome* dan *coprogen rhodrorulic acid*. *Escherichia coli* juga dapat menggunakan sitrat untuk menghasilkan *Fe* (Carter dan Wise, 2004).

2. Patogenesisitas

Escherichia coli diklasifikasikan berdasarkan sifat karakteristik dari virulensinya dan tiap kelompok menyebabkan penyakit dengan mekanisme yang berbeda, yaitu *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC), *Enterotoxigenic Escherichia coli* (ETEC), *Enterohemorrhagic Escherichia coli* (EHEC), *Enteroinvasive Escherichia coli* (EIEC), *Enteroadgregative Escherichia coli* (EAEC) (Brooks *et al.*, 1995).

- a. *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC) Merupakan penyebab penting terjadinya diare. EPEC melekat pada sel mukosa usus halus. Hilangnya *mikrovili* (effacement), pembentukan *filamentous actin* atau struktur seperti cangkir, dan biasanya EPEC masuk ke dalam mukosa. Karakteristik lesi dapat dilihat diatas mikograf elektron dari lesi biopsi usus halus. Akibat dari infeksi EPEC adalah diare yang cair, biasanya susah diatasi namun tidak kronis. Diare EPEC berhubungan dengan berbagai serotipe spesifik dari *Escherichia coli*. Strain diidentifikasi dengan antigen O dan seringkali dengan antigen H. Waktu diare EPEC dapat diperpendek dan diare kronis dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik (Brooks *et al.*, 1995).
- b. *Enterotoxigenic Escherichia coli* (ETEC) Merupakan penyebab umum diare. Beberapa strain ETEC memproduksi sebuah *eksotoksin* yang sifatnya labil terhadap panas atau LT (BM 80.000) dibawah kontrol plasmida (Brooks *et al.*, 1995).
- c. *Enterohemorrhagic Escherichia coli* (EHEC) Memproduksi verotoksin, dan dinamakan berdasarkan efek *sitotoksik* pada *sel vero*. EHEC banyak dihubungkan dengan *hemoragik kolitis*, sebuah bentuk diare yang parah, dan

dengan *sindrom uremik hemolitik, mikroangiopathi hemolitik anemia*, dan *trombositopenia* (Brooks *et al.*, 1995).

- d. *Enteroinvasive Escherichia coli* (EIEC). Strain EIEC memfermentasi laktosa dengan lambat atau tidak memfermentasi laktosa dan tidak motil. EIEC menyebabkan penyakit dengan menyerang *sel epithelial* mukosa usus (Brooks *et al.*, 1995).
- e. *Enterogregative Escherichia coli* (EAEC). Patogenesis EAEC penyebab diare tidak begitu dipahami dengan baik, meskipun demikian dinyatakan bahwa EAEC melekat pada mukosa intestinal dan menghasilkan *enterotoksin* dan *sitotoksin*. Akibatnya adalah mukosa rusak, pengeluaran sejumlah besar mukus dan terjadinya diare (Brooks *et al.*, 1995).

3. Kolibasilosis

Kolibasilosis merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh *Avian Pathogenic Escherichia coli* (APEC), yang menyebabkan kerugian ekonomi industri perunggasan di seluruh dunia (Mellata *et al.*, 2003). Istilah umum lain untuk penyakit ini adalah koliseptikemia dan infeksi *Escherichia coli* (Purchase *et al.*, 1989). *Escherichia coli* dapat menyebabkan penyakit primer pada ayam, tetapi dapat juga bersifat sekunder mengikuti penyakit lainnya, misalnya berbagai penyakit pernapasan dan pencernaan (Tabbu, 2000).

Escherichia coli telah tersebar di seluruh dunia dan ditularkan bersama air minum yang terkontaminasi oleh feses. Mikroorganisme ini juga merupakan mikroorganisme indikator sebagaimana dalam analisis air, dimana kehadirannya merupakan bukti bahwa air tersebut terkontaminasi oleh bahan dari manusia atau

hewan berdarah panas (Merchant dan Parker,1996). Infeksi *Escherichia coli* hingga tampak secara klinis dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang jelek atau agen infeksi lainnya yang biasanya muncul menyertai (Purchase,*et al.*,1989), pada lingkungan yang kotor dan berdebu atau pada sekelompok ayam yang mengalami immunosupresif akibat penyakit infeksius atau yang mengalami stres akibat lingkungan. Kuman ini dapat ditemukan di dalam litter, kotoran ayam, debu/kotoran lain dalam kandang serta lingkungannya, pakan dan minuman. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung antara ayam yang sakit dengan ayam yang sensitif. Penularan secara tidak langsung dapat terjadi melalui kontak antara ayam yang sensitif dengan bahan-bahan yang tercemar oleh leleran tubuh atau feses ayam yang menderita Kolibasilosis (Tabbu, 2000).

4. Cara Penularan

Kebanyakan *Escherichia coli* hidup di lingkungan kandang unggas melalui kontaminasi feses. Permulaan kejadian patogen dari *Escherichia coli* mungkin terjadi di *hatchery* dari infeksi atau telur yang terkontaminasi, tetapi infeksi sistemik biasanya membutuhkan lingkungan predisposisi atau sebab-sebab infeksi (Aiello, 1998). Akoso (1998) menambahkan infeksi *kolibasilosis* terjadi melalui kontak langsung dengan lingkungan tempat tinggal ayam yang basah dan kotor, dan bukan dari ayam ke ayam.

Kualitas udara yang buruk dan stres yang berasal dari lingkungan juga kemungkinan untuk predisposisi infeksi *Escherichia coli* (Aiello, 1998). Tabbu (2000), berpendapat bahwa faktor pendukung timbulnya kolibasilosis meliputi sanitasi yang kurang optimal, sumber air minum yang tercemar bakteri, sistem

perkandangan dan peralatan kandang yang kurang memadai dan adanya berbagai penyakit yang bersifat immunosupresi.

5. Gejala Klinis

Gejala yang ditimbulkan pada penyakit ini disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh bakteri akibat pertumbuhan dan multiplikasi. Invasi primer terjadi pada sistem pernafasan dan sistem *gastrointestinal*. Gejala klinis dari kolibasilosis tidak spesifik dan berbeda-beda tergantung umur, lamanya infeksi, organ yang terlibat dan terlihat adanya septisemia akut, kematian akibat periode *anoreksia* dan inaktivitas (Purchase *et al.*, 1989). Tanda-tanda ayam yang terserang kolibasilosis adalah kurus, bulu kusam, nafsu makan turun dan murung, pertumbuhan terganggu, diare, bulunya kotor atau lengket disekitar pantatnya (Akoso, 1998).

Berbagai sindroma dari *Escherichia coli* yang terisolasi meliputi:

- a. *Airsacculitis*. Air sac menebal dan pada beberapa kasus, terdapat eksudat kaseosa. Biasanya terdapat perikarditis adhesif dan perihepatitis fibrinosa.
- b. *Omfalitis*. *Escherichia coli* selalu terisolasi dalam biak murni dari tetasan burung yang mengalami depresi, septicemia, kematian tidak tetap. Tali pusat membengkak, meradang dan unggas demam.
- c. *Koliform septisemia* pada itik. Pada *koliform septisemia* biasanya basah, granula hingga *eksudat koagulase* dari berbagai pembunguan berada di abdomen dan torak serta permukaan air sac. Lien dan hati membengkak dan hitam gelap dengan empedu mewarnai hati.

- d. Akut *septicemia*. Akut *septicemia* disebabkan oleh *Escherchia coli* yang menyerupai *fowl typhoid* dan *fowl cholera*. Terjadi kematian tiba-tiba, mortalitas dan morbiditas tidak tetap. Organ parenkim membengkak dengan kongesti pada muskulus pektoral. Hati berwarna hijau dan bisa terdapat foki nekrotik kecil.
- e. *Enteritis*. Terjadi diare. Pada *nekropsis* terdapat *enteritis*, selalu bersama dengan mukus
- f. *Salpingitis*. Lesi ini terdapat bersamaan dengan masuknya bakteri *coliform* dari vagina pada ayam layer. Unggas terinfeksi biasanya mati selama enam bulan pertama setelah infeksi dan tidak pernah bertelur.
- g. *Koligranuloma*. Nodul *koligranuloma* terdapat sepanjang saluran pencernaan, usus dan hati. Lesi menyerupai tuberkulosis.
- h. *Sinovitis* dan *arthritis*. Unggas yang terinfeksi pincang atau ambruk.
- i. *Panophthalmitis*. Unggas mengalami hypopyon, biasanya satu matanya buta.
- j. *Perikarditis*. Sebagian besar serotipe *Escherchia coli* setelah *septicemia*, menyebabkan *perikarditis* (Whiteman and Bickford, 1983).

6. Perubahan Makroskopis dan Mikroskopis

a. *Airsaculitis*

Infeksi pada kantong udara biasanya diikuti *perikarditis* dan *perihepatitis* (Tabbu, 2000). Secara mikroskopis lesi mengandung *edema* dan *infiltrasi heterofil*. Terdapat banyak *proliferasi fibroblastik* dan akumulasi sejumlah besar *heterofil nekrotik* di dalam *eksudat kaseosa* (Calnek, 1997).

b. *Omfalitis*

Saat abdomen membengkak dan anak ayam dibuka akan tampak *yolk sac* tidak diabsorpsi, tapi dipenuhi oleh cairan tidak berwarna atau coklat dan infeksi telah menyebar ke seluruh rongga perut. Kandungan normal *yolk sac* berubah dari viskositas, kuning kehijauan dan cair, kuning kecoklatan atau masa kaseosa (Calnek, 1997)

c. *Koliseptisemia*

Ginjal membesar dan berwarna hitam. Pada septisemi akut perubahan yang tersifat adalah hati yang berwarna kehijauan dan otot pektoralis yang kongesti, terdapat eksudat fibrinus yang menutupi permukaan hati. Secara mikroskopis hati menunjukkan kongesti disertai *infiltrasi heterofil* (Tabbu, 2000).

d. Enteritis

Enterotocsigenic (ETEC) yang membebaskan toksin dapat menyebabkan akumulasi cairan pada usus. Selama infeksi *E. coli* akut selalu terdapat cairan menguning (Calnek, 1997). Mukosa usus biasanya mengalami kongesti dan kadang-kadang mengalami deskuamasi akibat endotoksin yang dihasilkan oleh *Escherichia coli* (Tabbu, 2000).

e. *Salpingitis*

Ditandai dengan bentuk *ova* yang tidak teratur, *ova* berwarna kekuningan dan kerap kali ditemukan adanya folikel yang berubah menjadi *cyst* atau ruptur. Oviduk dapat mengalami obstruksi oleh adanya material yang menggeju ataupun bagian dari telur yang pecah (Tabbu, 2000). Reaksi jaringan dalam oviduk ringan dan mengandung sebagian besar akumulasi heterofil di bawah epitelium. Estrogen yang tinggi tampak berhubungan dengan pertumbuhan *E. coli* di oviduk (Whiteman and Bickford, 1983).

f. *Koligranuloma*

Terdapat granuloma di hati, duodenum, sekum, dan mesenterium. Lesi tampak menyerupai tumor, organ mengeras, belang dan membesar (Calneck, 1972).

g. *Sinovitis dan artritis*.

Persendian yang terkena akan membengkak dan jika dibuka dapat ditemukan cairan bening atau mengkeju di dalam persendian tersebut (Tabbu, 2000).

h. *Panopthalmitis*.

Terjadi pamanahan, biasanya pada satu mata dan mengakibatkan kebutaan. Secara mikroskopis terdapat infiltrasi heterofil dan pagositosis mononuklear di mata serta giant cell terbentuk di sekitar area nekrosis (Calnek, 1972).

7. Diagnosa

Kolibasilosis dapat didiagnosa berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan makroskopis maupun mikroskopis serta isolasi dan identifikasi bakteri *Escherichia coli*. Isolasi bakteri dapat berasal dari swab organ visceral seperti hepar, jantung, lien, perikardium, air sac dan yolk sac yang ditanam pada Eosine Methylene Blue (EMB) yang merupakan media selektif untuk *Escherichia coli* yang diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37⁰ C, yang akan menghasilkan koloni berwarna metallic sheen. Identifikasi *Escherichia coli* berdasarkan tes laboratorium yang meliputi pengecatan Gram atau sederhana, dan uji biokimia (Giovanardi end Campanari, 2005).

Diagnosa terhadap *kolibasilosis* dapat dibedakan berdasarkan strain *Escherichia coli* yang bersifat patogenik dan nonpatogenik. Tempat pengambilan sampel, kondisi karkas dan lesi alami sangat berguna dalam menentukan apakah isolasi *Escherichia coli* yang dilakukan tersebut relevan. Strain patogenik dapat

menyebabkan kematian atau lesi karakteristik *Escherichia coli* dalam waktu 3 hari. Teknik kultur menggunakan media *Congo Red* telah dianjurkan untuk identifikasi *Escherichia coli* patogenik (Calnek, 1997).

F. Tinjauan Islam Tentang Hewan Ternak Dan Mikroorganisme

Islam adalah agama yang sempurna, yang dengannya Allah swt, muliakan manusia. Dan dengan islam pula terwujudnya kebahagiaan manusia di dunia dan akherat. Allah swt. telah menciptakan alam ini, dan menjadikan setiap makhluk yang ada didalamnya tunduk kepada hukum Allah swt. atau tabiat yang berlaku atasnya. Dengannyalah Allah mewujudkan kehendak-Nya, oleh karena itu segala sesuatu yang telah ditetapkan atasnya hukum Allah swt. tersebut tidak bisa diubah kecuali hanya dengan perintah Allah swt. saja.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-fath/48:23 sebagai Berikut:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ^ط وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣)

Terjemahnya:

Sebagai suatu sunnatullah (hukum Allah yang telah ditetapkannya) yang Telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu (Kementrian Agama RI, 2012)

Matahari memiliki sunnatullah, malam memiliki sunnatullah, siang memiliki sunnatullah, tumbuh-tumbuhan memiliki sunnatullah, hewan-hewan memiliki sunnatullah, begitu juga angin, air, bintang-bintang, mikroorganisme (bakteri), lautan, dan gunung-gunung. setiap mereka memiliki sunnatullah (hukum Allah) yang berlaku atas mereka.

Allah swt, berfirman dalam QS. Yasiin/36:40 sebagai berikut:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ (٤٠)

Terjemahnya:

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya (Kementrian Agama RI, 2012)

Manusia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang butuh akan jalan yang dilalui disetiap keadaan, untuk menggapai kesuksesan dunia dan akherat, dan jalan tersebut adalah agama (Islam) yang Allah memuliakan manusia dengannya serta meridhoinya untuk mereka, tidak diterima agama manapun selainnya, kebahagiaan dan kesengsaraan itu tergantung kepada sejauh mana ia berpegang teguh atau mengingkarinya, dan ia bisa memilih dalam menerimanya atau menolaknya.

1. Hewan Ternak Dalam Al-Qur'an

Ternak merupakan komoditi yang sudah lama akrab dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslimin. Di dalam Al Quran terdapat beberapa nama hewan ternak yang dijadikan sebagai nama surat, misalnya ternak sapi betina (Al Baqarah), hewan ternak (Al An'am), dan lebah (An Nahl). Banyak sekali ayat Al Quran yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak, misalnya ternak unggas (QS. Al-Baqarah/2:260; QS. Ali-'Imran/3:49; QS. Al-Maidah/5:110; QS. Al-An'am/6:38; QS. An-Nahl/16:79 ; QS. Al-Mu'minin/23:41; QS. An-Naml/27:

16; QS. Al-Mulk/67:19). Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum banyak pakar maupun ilmuwan yang melakukan penelitian tentang hewan ternak khususnya ternak unggas, Al-Qur'an telah menginformasikan secara wahyu mengenainya.

Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam kehidupannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba dan kerbau) yang mampu mengkonversi rumput menjadi daging dan susu. Atau kemampuan lebah madu yang mampu mengkonversi cairan nektar tanaman menjadi madu (QS. An Nahl/16: 68-69). Sedemikian besarnya peranan peternakan dalam memacu pembangunan ekonomi umat, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum Muslimin.

Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minun/23:21-22 sebagai berikut:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya pada binatang-binatang ternak (Al-An'am) terdapat 'ibrah bagi manusia. 'Ibrah dapat ditafsirkan sebagai pelajaran atau tanda bagi manusia, 'ibrah dapat pula ditafsirkan sebagai sesuatu yang perlu diseberangi atau dieksplorasi. Hal ini berarti bahwa manusia perlu

mengeksplorasi segala sesuatu yang ada pada binatang ternak, melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak, sehingga manusia dapat mengetahui kekuasaan Allah dan memperoleh karunia-Nya.

Allah telah menciptakan binatang ternak bukan tanpa maksud dan tujuan, hal ini semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl/16:5 sebagai berikut:

وَاللّٰتَّعَمَّرَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

Terjemahnya:

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan (Kementrian Agama RI, 2012).

Berdasarkan ayat di atas, terdapat lafadz “*Manafi’u*” yang artinya adalah berbagai manfaat. Shihab (2010) menafsirkan bahwa Allah telah menciptakan hewan ternak dan memiliki keistimewaan antara lain memiliki bulu yang dapat menghangatkan kamu. Dengan demikian penggalan ayat ini merupakan uraian menyangkut sebagian nikmat Allah kepada manusia yaitu nikmatnya melalui binatang ternak.

Diayat yang lain Allah swt, berfirman dalam QS. Al-An'am/6:142 sebagai berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٤٢)

Terjemahnya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Kementerian Agama RI, 2012).

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak yaitu pertama binatang ternak sebagai alat angkut atau alat transportasi (hamulatan) seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan (farsya). Kata (farsya) yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu seperti kambing, domba dan sapi (Shihab, 2010).

Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, bahwa ayam termasuk kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang dimanfaatkan manusia sebagai binatang ternak untuk diambil daging atau telurnya. Salah satu jenis ayam tersebut adalah ayam pedaging (broiler).

2. Mikroorganisme Dalam Al-Qur'an

Istilah *zarrah* sebagai wujud zat atau substansi materi yang paling kecil yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk mempelajari mikroorganisme dan materi mikromos lainnya. Konsep sel sebagai materi

fungsional terkecil ternyata dapat dipatahkan oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sebagai organisme sel tunggal merupakan bukti adanya materi fungsional di bawah sel. Itulah materi *zarrah*, Al-Qur'an menunjuk pada konsep *zarrah* sebagai materi terkecil, dengan demikian masih ada substansi potensial dalam suatu zat yang lebih kecil dari sel (Subandi, 2010).

Selain itu, adanya makhluk kecil seperti bakteri juga disebutkan dalam QS.

Al-Baqarah/2:26 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۙ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?" dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik (Kementerian Agama RI, 2012).

Ibnu Katsir menasirkan bahwa kata (yang lebih rendah dari itu), menunjukkan bahwa Allah swt. kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan obyek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah swt. tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah swt, memiliki manfaat bagi kehidupan manusia (Al-Mubarak, 2006). Sekalipun perumpamaan yang Allah

ciptakan itu merupakan hal yang paling kecil, misalnya sebesar nyamuk atau bahkan lebih kecil yaitu mikroorganisme, Allah swt. tidak akan meninggalkan perumpamaan itu , karena Allah yang menciptakanya dan Allah lebih mengetahui hikmah serta maslahat dari penciptaan tersebut. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, sadar dan mempunyai pandangan secara seksama, maka ketika mendengar perumpamaan tersebut mereka justru mendapatkan suatu petunjuk dan inspirasi. Sebab, mereka akan selalu menghargai sesuatu sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing.

Allah swt, berfirman dalam ayat yang lain yaitu QS. Al-Furqan/25:2 sebagai berikut:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (٢)

Terjemahnya:

Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Kementrian Agama RI, 2012).

Hanya Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan ukuran dan aturan yang sangat cermat kepada masing-masing berupa rahasia-rahasia yang dapat menjamin keberlangsungan tugasnya secara teratur (sistematis) (Shihab, 2010).

Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa semua makhluk, dari sisi kejadian dan perkembangan yang berbeda-beda, berjalan sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan bersifat konstan. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah, Zat Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa. Dari sisi kejadiannya, sudah jelas bahwa semua makhluk--terlepas dari perbedaan jenis dan bentuknya--terdiri atas kesatuan unsur-unsur yang sangat terbatas jumlahnya, hampir seratus unsur. Dari jumlah itu, baru sembilan puluh unsur di antaranya sudah dikenal saat ini.

Sifat-sifat alami, kimiawi dan berat atomnya tumbuh secara berangsur-angsur. Dimulai dengan unsur nomor satu, yaitu hidrogen yang memiliki berat atom 1. Sementara ini yang terakhir ditemukan adalah unsur kesembilanpuluh enam, yaitu unsur uranium yang berat atomnya sampai saat ini belum diketahui. Unsur terakhir yang ditemukan berat atomnya adalah uranium yang memiliki berat atom 238,57. Kesatuan unsur-unsur tadi kemudian membentuk sebuah komposisi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan pernah melenceng. Demikian pula yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Masing-masing terbagi pada kelompok dan jenis yang berbeda. Sedangkan dalam tahapan perkembangannya, sifat-sifatnya berkembang dari makhluk hidup bersel satu, seperti mikrobat, sampai kepada makhluk hidup yang bersel banyak, seperti manusia yang dapat dikatakan paling sempurna. Setiap jenis memiliki sifat-sifat tertentu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Semua itu berjalan menurut hukum dan aturan yang bersifat konstan dan teliti yang menggambarkan secara jelas kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Kemudian Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat yang lain yaitu QS. Yunus/10:61 sebagai berikut:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (١٠)

Terjemahnya;

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit. tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh) (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Nya tidak terlepas dari pengetahuan Allah swt. meskipun hal tersebut sangat kecil melebihi benda yang terkecil. Misalnya saja mikroorganisme yang tidak tampak oleh mata, tanpa bantuan mikroskop, Allah swt. lebih mengetahui hikmah yang terkandung dari makhluk kecil tersebut, yaitu meskipun mikroorganisme sangatlah kecil tetapi juga bisa mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai 12 Mei 2017 .Bertempat di kandang unggas, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dilanjutkan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buataan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (STPP Gowa), Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

- a. Alat-alat yang digunakan pada saat pemeliharaan ayam yaitu gasolek, kandang litter, lampu pijar 40 watt, tempat pakan gantung, tempat air minum manual 800 ml, timbangan, talenan untuk pemeliharaan broiler
- b. Alat-alat yang digunakan untuk menghitung koloni *Escherichia coli* di laboratorium yaitu: autoclave, aluminium foil, baskom, buku catatan, bag stomacher, cawan petri, erlenmeyer, gunting, gelas ukur, incubator, jarum ose, kapas, laminar air flow, pinset, paper oil, pulpen, sendok, sepidol, talenan, rak tabung, sendok, tabung pengencer, tabung reaksi, timbangan analitik, oven, vortex, dan waterbath.

2. Bahan

- a. Bahan yang digunakan pada saat pemeliharaan ayam yaitu broiler umur satu hari atau *day old chick* (DOC) dengan strain 707 sebanyak 48 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), gula merah, tali rafia, plastik klip, kantong plastik, probiotik.
- b. Bahan yang digunakan untuk menghitung koloni *Escherichia coli* di laboratorium yaitu: alkohol 75%, aquades, feses ayam 12 Gram, media *Buffered Pepton Water* (BPW) 14 Gram, *Levine Eosin Methylen Blue Agar* (L-EMBA) 9,5 Gram, label, masker, kapas, palstik gloves dan tissue.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 4 ekor ayam broiler sehingga terdapat 12 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P0 = Ransum basal (Kontrol).

P1 = Ransum basal + Probiotik 1 ml/hari ($9,8 \times 10^7$ CFU/ml).

P2 = Ransum basal + Probiotik 3 ml/hari ($2,9 \times 10^8$ CFU/ml).

P3 = Ransum basal + Probiotik 5 ml/hari ($4,9 \times 10^8$ CFU/ml).

E. Prosedur Penelitian

1. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan ayam broiler yaitu:

a. Kandang

Sebelum broiler/*Day Old Chik* (DOC) dimasukkan kedalam kandang, terlebih dahulu dilakukan sanitasi. Sanitasi kandang dilakukan setelah kandang dicuci dengan air dan detergen lalu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat pakan dan minum. Luas unit kandang yang digunakan yakni 75 x 100 cm. Persiapan broiler dipelihara dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang dengan menggunakan alas sekam. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 48 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan kedalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 4 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi lampu pijar 40 watt sebanyak 1 buah dan penambahan gasolek.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian ransum dan air minum dilakukan secara *adlibitum*. Ransum tersebut diberikan setiap hari pada ayam yang dicampur dengan tepung probiotik dengan konsentrasi 1% dan 1,5% dari ransum yang diberikan setiap harinya mulai dari DOC sampai panen.

Bahan penyusun dan kandungan nutrisi ransum yang digunakan pada penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Bahan Penyusun Ransum Penelitian

Bahan Pakan	Komposisi (%)
Jagung	58
Polard	6
Tepung Ikan	10
Kacang Kedelai	9
Dedak	4
Bungkil kelapa	3
MBM	9
Premix	1
Total	100

Tabel 6. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian*

Kandungan Nutrisi	Jumlah
Protein (%)	20.2724
Energi Metabolisme (kkal/kg)	3026.46
Lemak Kasar (%)	6.8991
Serat Kasar (%)	3.4895
Kalsium (%)	1.6518
Posfor (%)	1.0532

Sumber: Data Primer Yang telah dihitung berdasarkan SNI (2006)

*Disusun berdasarkan SNI 2006

2. Proses perhitungan bakteri *Escherichia coli*

Setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 gram tiap perlakuan berupa feses tiap objek penelitian (broiler) untuk diamati di laboratorium dengan metode perhitungan bakteri sebagai berikut:

a. Sterilisasi Alat

Sterilisasi dilakukan untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat dalam suatu alat. Alat-alat yang sudah dipakai sebaiknya dimasukkan kedalam *autoclave* dengan suhu 121 °C, kemudian di angkat lalu bersihkan dengan air dan masukkan kedalam baskom beri sunlight dan air kemudian

rendam, setelah direndam lalu cuci hingga bersih dan tiriskan. Sebelum dimasukkan kedalam oven bungkus dengan aluminium foil seperti gunting, pinset, botol pengencer dan erlenmeyer. Sedangkan cawan petri dibersihkan dulu dengan kapas alkohol, tabung reaksi tanpa penutup, di tutup dengan gulungan kapas, kemudian di bungkus dengan paper oil, setelah di bungkus lalu di masukkan kedalam dos kemudian dimasukkan kedalam oven. Untuk tabung reaksi yang mempunyai penutup disusun dalam dos kemudian dimasukkan kedalam oven.

b. Penimbangan Sampel

Pada proses penimbangan sampel ini pertama dilakukan yaitu siapkan timbangan analitik, gunting, pinset, talenan, baskom dan sepidol. Setelah semua alat dan bahan sudah siap kemudian sempel feses ayam broiler yang telah diambil masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram.

c. Pembuatan Media

- a. Proses pembuatan media *Buffer Pepton Water* (BPW), menimbang media BPW sebanyak 14 Gram diatas timbangan analitik yang sudah diberi *paper oil*, kemudian memasukkan ke dalam erlenmeyer di encerkan dengan aquades sebanyak 700 ml, dan diberi label kemudian dihomogenkan, setelah dihomogenkan dimasukkan kedalam *autoclave* selama 15 menit dengan suhu 121°C , diturunkan suhunya sekitar $40-45^{\circ}\text{C}$ di *waterbath*.
- b. Proses pembuatan media *Eosin Methylene Blue Agar* (EMBA), menimbang EMBA, sebanyak 9,5 gram diatas timbangan analitik yang sudah diberi *paper oil*, kemudian dimasukkan kedalam erlenmeyer di encerkan dengan aquades sebanyak 250 ml, dan diberi label kemudian dihomogenkan, setelah

dihomogenkan dimasukkan kedalam *autoclave* selama 15 menit dengan suhu 121°C , diturunkan suhunya sekitar $40-45^{\circ}\text{C}$ di *waterbath* seteah dingin di tuangkan ke dalam cawan petri hingga padat.

d. Pengenceran

Pengenceran dari Pengamatan *Eschericia coli*, yaitu menuangkan media BPW sebanyak 9 ml, ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel yang telah di timbang sebanyak 1 gram, selanjutnya di *stomacher* dengan kecepatan sedang selama 1-2 menit, proses ini untuk memperoleh larutan pengencer 10^1 pindahkan 1 ml sampel dari 10^1 ke dalam larutan 9 ml BPW, untuk mendapatkan pengenceran 10^2 , pindahkan 1 ml sampel dari 10^2 untuk mendapatkan pengencer 10^3 sampai mendapatkan pengencer 10^8 dan setiap 1 sampel terdiri dari 8 tabung yang di isi BPW.

e. Penumbuhan Bakteri

Untuk menumbuhkan bakteri *Eschericia coli* dipipet 1 ml dari masing pengenceran 10^6 , 10^7 , 10^8 kemudian dipindahkan ke cawan petri yang telah disediakan sebanyak 3 buah, kemudian dituangkan media EMBA yang sudah disterilisasi, kemudian dihomogenkan dan masing-masing cawan di beri tanda agar tidak tertukar dengan pengenceran yang lain, selanjutnya diinkubasi selama 18-24 jam di inkubator dengan suhu 37°C .

F. Parameter yang Diukur

Setelah proses pemeliharaan pada hari ke 35 dilakukan pengambilan sampel berupa feses. Pengambilan dilakukan secara acak yaitu 1 ekor broiler dari masing-masing petak percobaan. feses diambil sebanyak ± 2 gram, kemudian

dimasukkan pada kantong plastik klip dan disimpan ke dalam *freezer*, Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode hitungan cawang. Sampel yang diperoleh dianalisis total bakteri *Escherichia coli* dengan menggunakan metode *Standart Plate Count* (SPC). Data yang diperoleh diuji keragamannya apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji ganda Duncan.

Perhitungan metode cawan menggunakan rumus sebagai berikut :

Faktor pengenceran = pengenceran x jumlah yang ditumbuhkan

Jumlah koloni SPC = jumlah koloni x

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam yaitu menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan.

Menurut Steel dan Torrie (1991), Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian probiotik ulangan ke-j.

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3 (perlakuan)

j = 1,2,3, (ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Hasil penelitian selama 43 hari yang mencakup pemberian probiotik terhadap jumlah *Escherichia coli* pada feses broiler yang di pelihara selama 35.

Tabel 7. Rataan jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler setelah perhitungan sebagai berikut:

Parameter yang Diukur	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
Koloni <i>Escherichia coli</i>	35×10^6 ^a	34×10^6 ^{ab}	84×10^6 ^a	6×10^6 ^b

Keterangan: Superkrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata ($P < 0.05$)

B. Pembahasan

Nilai rata-rata jumlah koloni *Escherichia coli* pada penelitian ini berkisar antara 6×10^6 - 84×10^6 . Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian probiotik cair berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses broiler. Hal ini diduga karena kandungan mikroorganisme pada probiotik bekerja secara sempurna di dalam saluran pencernaan sehingga berpengaruh pada semua perlakuan. Hasil uji lanjut wilayah berganda Duncan menunjukkan, P0 (35×10^6 cfu/g), P1 (34×10^6 cfu/g), dan P2 (84×10^6 cfu/g), tidak berbeda nyata ($P > 0,05$), dari P1 (34×10^6 cfu/g), dan P3 (6×10^6 cfu/g). Tetapi P0 (35×10^6 cfu/g) dan P2 (84×10^6 cfu/g), berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan P3 (6×10^6 cfu/g). Perbedaan jumlah koloni *Escherichia coli* ini diduga ada dua penyebab yang pertama disebabkan oleh perlakuan yang diberikan kepada

broiler, kemudian yang kedua karena probiotik yang diberikan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara memodulasi mikroflora usus dan system imun mukosa terutama mukosa saluran cerna.

Berdasarkan Tabel 7. di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P3 memiliki hasil lebih baik karena memiliki rata-rata jumlah koloni 6×10^6 cfu/g disusul dengan P1 dan P0 yang memiliki rata-rata jumlah koloni 34×10^6 cfu/g dan 35×10^6 cfu/g. sedangkan terendah terdapat pada perlakuan P2 karena memiliki rata-rata jumlah koloni 84×10^6 cfu/g. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah koloni *Escherichia coli* dari setiap perlakuan semuanya berada di atas kisaran normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Kabir (2010), yang menyatakan bahwa jumlah koloni bakteri pada feses ayam terdapat 10^9 cfu/g dan 10^6 cfu/g merupakan *Escherichia coli*.

Secara statistik pemberian probiotik berpengaruh nyata pada setiap perlakuan, namun P3 dengan penambahan probiotik cair 5 ml/hari ($4,9 \times 10^8$ cfu/ml) hasilnya lebih baik dari perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah probiotik yang di berikan pada broiler, maka semakin baik untuk menurunkan populasi bakteri *Escherichia coli* pada broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardi, dkk., (2010), bahwa hasil secara *in vivo* dan *in vitro* pada broiler menunjukan bahwa mikroba probiotik dapat menurunkan populasi bakteri *Escherichia coli*. Penambahan probiotik 5 ml/hari ($4,9 \times 10^8$ cfu/ml) telah cukup untuk bekerja dengan baik pada saluran pencernaan broiler sehingga dapat menurunkan jumlah koloni *Escherichia coli*. Hal ini karena

terjadi penambahan jumlah populasi mikroba yang menguntungkan, sehingga dapat menurunkan atau mencegah berkembangnya mikroba yang merugikan seperti *Escherichia coli*. Probiotik dapat mengubah pergerakan mucin dan populasi mikroba didalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus dan memperbaiki komposisi mikroflora pada sekum (Mountzouris *et al.*, 2010). Dimana menurut Lay dan Hastowo (1992), bahwa bakteri *Escherichia coli* dapat menimbulkan penyakit yang digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama *Escherichia coli* yang bersifat *oportunistik*, artinya dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan tertentu, misalnya kekurangan makanan atau mengikuti penyakit lain. Kedua bersifat *enteropatogenik/enterotoksigenik*, *Escherichia coli* yang mempunyai antigen perlekatan dan memproduksi *enterotoksin* sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Kemudian selanjutnya dilihat dari hasil penelitian, P2 dengan rata-rata jumlah koloni 84×10^6 cfu/g terlihat lebih tinggi dari P0, P1 dan P3, hal ini berhubungan dengan tingkat palatabilitas. Adanya kondisi yang kompleks dan dinamis dari mikroflora saluran cerna mungkin dapat menjawab pertanyaan, mengapa penggunaan probiotik yang mengandung satu atau beberapa spesies mikroflora saluran cerna terkadang memberikan respon atau hasil yang kurang memuaskan seperti yang ditunjukkan P2. Hal ini sesuai dengan pendapat Nirmalasanti (2002), menyatakan bahwa probiotik tidak akan bekerja dengan baik jika dosis probiotik yang diberikan belum sesuai, pemeliharaan kandang yang kurang benar dan komposisi mikroflora saat probiotik diberikan tidak tepat selain karena cara penyimpanan, jenis bakteri dan cara pemberian probiotik yang kurang

tepat. Kompiang (2009), menyatakan bahwa viabilitas probiotik sangat berpengaruh pada hasil penggunaannya. Pada percobaan atau aplikasi di lapang, sangat jarang dilakukan verifikasi untuk mengetahui apakah kandungan probiotik yang digunakan sesuai dengan yang tertera pada label, baik jumlah maupun strain mikroianya. Hasil yang kurang memuaskan kemungkinan besar dapat terjadi karena viabilitas mikroba tidak sebaik yang tertera pada label. Di samping itu, mikroba dari spesies yang sama namun beda strain, kemungkinan mempunyai efektivitas yang berbeda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian probiotik dapat menurunkan jumlah koloni *Escherichia coli* pada feses Broiler.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian probiotik pada air minum Broiler dengan penambahan dosis 5 ml untuk membuktikan lebih lanjut hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2002. *Meningkatkan Produktifitas Ayam Ras Pedaging*. PT Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Agustina, L. 1995. *Pemanfaatan Limbah Sari Buah Markisa (Passifora Edulis) Sebagai Bahan Ransum Ayam Broiler*. Proceeding. Seminar Nasional Sains dan Peternakan. Balai Penelitian Ternak Bogor, Bogor.
- Al-Mubarak, A. Z. 2006. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "ala" M.Shahrur*. eLSAQ, Yogyakarta.
- Anonimous. 2014. *Budidaya Ayam Ras Pedaging*. <http://www.Slide share.net/hendrahermawan77377/ayam-pedaging-29350112>. Jakarta (ID): Kantor Deputi Menegistek Bidang Pendayagunaan dan Pemasaryakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (diakses 05 Oktober 2016).
- Aiello, S. 1998. *The Merck Veterinary Manual*. Merck and co, Usa.
- Akoso, B.T. 1998. *Kesehatan Unggas: Panduan bagi Petugas Teknis, Penyuluh, dan Peternak*. Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Arne, P., D. Marc, A. Bree, C. Scholer, M. D. Moulin. 2000. *Increased Tracheal Colonization in Chicken Without Impairing Pathogenic Properties of Avian Pathogenic Escherichia coli MT78 with a fimH Deletion*. *Avian Diseases*(44): 343-345
- Barnes, H.J., W.B. Gross. 1997. *Colibacillosis, In: Disease of Poultry*. Tenth Edition. Iowa State University Press. Ames. Pp. 131 - 132, 134 - 138.
- Barnes, H. J., J. P. Vaillancourt, W. B. Gross. 2003. *Diseases of Poultry*. 11th ed. Blackwell Publishing Ltd, IA (USA).
- Brooks, 1995. *Genetic Elements in Escherichia coli, Macmillan Molecular biology series*. London, p. 1-9, 49-54.
- Badan Standar Nasional Indonesia (SNI)^a. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)*. <http://ditjennak.go.id.pdf>. (diakses 05 Oktober 2016).
- Badan Standar Nasional Indonesia (SNI)^b. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging Masa Akhir (Broiler Finisher)*. <http://ditjennak.go.id.pdf>. (diakses 05 Oktober 2016).
- Badan Standardisasi Nasional. 2005. *[SNI 01-4868.1-2005] Bibit Niaga (Final Stock) Ayam Ras Tipe Pedaging Umur Sehari (kuri/doc)*.

- Batrinon, A. 2010. *The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria*. Thei of Athena.
- Carter, G. R., Wise, D. J. 2004. *Essential of Veterinary Bacteriology and Mycology 6 th Ed*. Blackwell Publishing, Iowa.
- Calnek, B.W. 1997. *Disease of Poultry. 10 th edition*. Iowa State University Press. Iowa. USA. Pp 179-185
- Dwidjoseputro, D. 1982. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Disya, F. 2010. *Manajemen Beternak Broiler Modern*. Kalamedia, Surabaya.
- Ensminger. M. E., J. E. Oldfield, J. E. Heinemann. 1992. *Feeds and Nutrition. 2nd Edition*. Ensminger Publishing Company, California USA.
- Evan, M., J. K. Davies, G. Sundqvist, D. Fidgor. 2002. *Mechanisms involved in the resistance of the *Enterococcus faecalis* to calcium hydroxide*. Int Endod.
- Fadillah, R. 2004. *Panduan Mengelola Peternakan Ayam Broiler Komersial*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Fardiaz, S. 1993. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farida, K. A., W. Busono, O. Sjojfan. 2015. *Pengaruh Penambahan Probiotik Cair Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi Pada Ayam Pedaging Program Magister Ilmu Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya*. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fuller, R. 1992. *Probiotics the Scientific Basis*. Chapman and Hall, London.
- Fuller, R. 2001. *The chicken Gut Microflora and Probiotic Supplements*. J of Poultry Sci. 38 : 189 -196.
- Fuller, R. 1989. *Probiotics in Man and Animals*. Journal Application Bacteriol. Vol. 66. No. 1: 365-378
- [FAO/WHO] Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. 2001. *Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria*. Amerian Córdoba Park Hotel, Córdoba, Argentina.
- Gordon, S.H., D.R. Charles. 2002. *Niche and Organic Chicken Products: Their Technology and Scientific Principles*. Nottingham University Press, Definitions: III-X, UK,

- Giovanardi, D., E. Campanari. 2005. *Avian Pathogenic Escherichia Coli Transmission from Broiler Breeders to Their Progeny in An Integrated Poultry Production Chain*, *Avian Pathology*, 34, pg 313 – 318
- Harimurtz, S., E. S. Rahayu, Nasroedin, Kurniasih. 2005. *Bakteri Asam Laktat dari Intestin Ayam Sebagai Agensiaprobiotik*. *Animal Production* 9 (2) : 82-91.
- Heuvelink, A.E., J. T. M. Zwartkruis, R. R. Beumer, E.D. Boer. 1999. *Occurrence and Survival of Verocytotoxin Producing Escherichia coli O157 in Meats Obtained from Retail Outlets in the Netherlands*. *J. Food Protect.* 62(10):1115-1121.
- Havenaar, R., B.T. Brink, 1993. *Selection of Strain for Probiotics Use*. Di dalam: Fuller R, editor. *Probiotics: The Scientific Basic*. Chapman & Hill, London.
- Husoda. M., H. Hashimoto, H. Morita, A. Hosono. 1996. *Effect of Administration of Milk Fermented with Lactobacillus acidophilus LA-2 on Fecal Mutagenicity and Mikloflora in The Human Intestine*. *J. Dairy Science* 79: 754-749
- Kundabala, M., U. Suchitra. 2002. *Enterococcus faecalis: An Endodontic Pathogen*. *J Endod.*
- Kayaoglu, G., D. Orstavik. 2004. *Virulence Factors of Enterococcus faecalis Relationship of Endodontic Disease*. *Crit Rev Oral Biol Med* 2004; 15(5) : 308.
- Kompiang, IP. 2009. *Pemanfaatan Mikroorganisme sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Produksi Ternak di Indonesia1*). *Pengembangan Inovasi Pertanian*. 2(3):177-191
- Kabir, SML. 2010. *Avian Colibacillosis And Salmonellosis: A Closer Look at Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, Control, and Public Health Concerns*. *Int J Environ Res Publ Heal*. 7: 89-114
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. <https://kemenag.go.id/> (diakses Tanggal 22 Juli 2017).
- Kartasudjana, R., E. Suprijatna. 2006. *Manajemen Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Luis, M., T. Marie, Pezzlo. 2004. *Color Atlas of Medical Bacteriology*. American Society for Microbiology Press, Washington DC.
- Lay, B. W., S. Hastowo. (1992), *Mikrobiologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lilley, D. M., R. H. Stilwell. 1965. *Probiotic: Growth Promoting Factors Produced by Microorganism*. *J. Back*.

- McMullin, J. A., J. Cairney. 2004. *Self-Esteem and The Intersection of Age, Class, and Gender*. Journal of Aging Studies, 75-90
- McDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalg. 1981. *Animal Nutrition*. 3rd ed. Longman Group Ltd, London.
- McNaught, C.E., J. Macfie, 2000. *Probiotics in Clinical Practice: A critical Review of The Evidence*. Nutr. Research 21 : 343-353.
- McKane, L., J. Kandel. 1998. *Microbiology Essentials and Applications*. 2nd ed. McGraw-Hill Inc, Philadelphia.
- Madigan, M.T., J.M. Martinko. 2006. *Brock: Biology of Microorganism*. Pearson Education International. ISBN 0-13-196893-9. Page.375-377
- Murtidjo, B. A. 1987. *Pedoman Meramu Pakan Unggas*. Kanisius, Yogyakarta
- Murtidjo B. A. 2006. *Pedoman Meramu Pakan Unggas*. Kanisius, Yogyakarta.
- Murwani R. 2010. *Broiler Modern*. Widya Karya, Semarang.
- Mountzouris. K., C. P. Tsitsrikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr K. Fegeros. 2010. *Effects of Probiotik Inclusion Levels in Broiler Nutrition on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Plasma Immunoglobulins, and Cecal Microflora Composition*. Poult. Sci. 89:58-67
- Nirmalasanti, N. 2002. *Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Gambaran Mikroskopis Usus Ayam*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- National Research Council. 1994. *Nutrient Requirements of Poultry*. 9th Revised Edition. National Academy Press, Washington, D.C.
- Neto, M. G., G. M. Pesti, R. I. Bakali. 2000. *Influence of Dietary Protein Level on The Broiler Chicken's Response to Methionine and Betaine Supplements*. Poultry Science. 79: 1478-1484.
- Pelczar, M.J., E.C.S. Chan. 1986. *Dasar-Dasar Mikrobiologi 1*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Post, K. W. 2005. *Veterinary Microbiology Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease*. CRC Pr, New York.
- Purchase, H. G., L. H. Arp, C. H. Domermuth, J. E. Pearson. 1989. *Alaboratory Manual for The Isolation and Identification of Avian Pathogens*. Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa. Hal.: 114-121.
- Parvez, S., K. A. Malik, S. Ah Kang, HY. Kim. 2006. *Probiotics and Their Fermented Food Products are Beneficial for Health*. Journal of Applied Microbiology. 100: 1171-1185.

- Purwandhani, S. N., E. S. Rahayu. 2003 *Isolasidan Seleksi Lactobacillus yang Berpotensi sebagai Agensia Probiotik*. *Agritech* 23 (2) : 67 – 74.
- Portenier, I., T. M. Waltimo, M. Haapsalo. 2003. *Enterococcus faecalis- the root canal survival and star in post treatment disease*. *Endodontic Topics*.2003;6: 135-59.
- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, C. R. Soccol. 2008. *Trends in Non-Dairy Probiotic Beverages*. *Food Research Internaional*. 41(2):111-123.
- Quinn, P. J., B. K. Markey, M. E. Carter, W. J. Donnelly, F. C. Leonard. 2002. *Veterinary Microbiology and Microbial Disease*. Blackwell Science, London.
- Rasyaf, M. 2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rasyaf, M. 2010. *Panduan Beternak Ayam pedaging . Cetakan ke-III*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Rostini, I. 2007. *Peranan Bakteri Asam Laktat (Lactobacillus Plantarum) Terhadap Masa Simpan Filet Nila Merah Pada Suhu Rendah*. (PDF).
- Siregar, A.P., M. Sabrani, S. Pramu. 1980. *Teknik Beternak Ayam Pedaging di Indonesia*. Penerbit Margie Group, Jakarta.
- Seifert, H. S. H., F. Gessler. 1997. *Continous Oral Application of Probiotic B.Cereus An Alternative to Prevention of Enteroxamia*. *Anim Res and Dev*. 46: 30-38.
- Steel, R., J. Torrie. 1991. *Prinsip dan Prosedur Statistika : Suatu Pendekatan Biometrik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Signoretto, C., M. C.Tafi, P. Canepari. 2000. *Cell Wall Chemical Composition of Enterococcus faecalis in The Viable But Nonculturable State*. *Applied and Enviromental Microbiology*. 66(5):1953-9
- Salminen, S., A. V. Wright, A. Ouwehand. 2004. *Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects, Fourth Edition*. CRC Press. ISBN 978-0-8247-5332-0. Page.1
- Shihab, M.Q. 2010. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Subandi, M. 2010. *Mikrobiologi Perkembangan, Kajian, dan Pengamatan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salminen, S., A. Wright, Von. 1993. *Lactic Acid Bacteria*. Marcel Dekker, Inc. New York.

- Suprijatna, E., U. Atmomarsono, R. Kartasudjana. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya. Jakarta. P. 38, 40.
- Sumardi, M. Hartono, K. Handayani. 2010. *Pengaruh Pemberian Biakan Bacillus sp terhadap Pertumbuhan Salmonella dan Escherichia coli pada Broiler*. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-III. Unila, Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.
- Taylor, S. 2004. *Advances in Food and Nutrition Research, Vol. 50*. Academic Press. ISBN 978-0-12-016450-9.
- Tabbu, C. R. 2000. *Kolibasilosis. Dalam: Penyakit Ayam dan Penanggulangannya*. Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). Yogyakarta. Volume 1. Pp. 31 – 35.
- Temim, S., A. M. Chagneau, S. Guillaumin, J. Michel, R. Pereson, P.A. Geraert, S. Tesseraud. 1999. *Effect of Chronic Heat-Exposed and Protein Intake on Growth Performance, Nitrogen Retention and Muscle Development in Broiler Chickens*. Reproduction Nutrition Development.
- Waluyo, L. 2004. *Mikrobiologi*. UMM Pres, Malang.
- Wardhana, W.A., 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Whiteman, C. E., A. A. Bickford. 1983. *Avian Disease Manual. Second editions. University of Pennsylvania, New Bolton Center*. Pennsylvania.
- Walstra, P., T. M. Wouters, T. J. Geurts. 2005. *Dairy Science and Technology, Second Edition*. CRC Press. ISBN 978-0-8247-2763-5.
- Yeo, J., I. K. Kim. 1997. *Effect of Feeding Diets Containing An Antibiotic, A Probiotic, Or Yucca Extract on Growth and Intestinal Urease Activity in Broiler Chicks*. Poultry Sci. 76: 381 – 385

L

A

M

P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A

N

Lampiran 1. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Pemberian Probiotik Jumlah *Escherichia coli* pada Feses Broiler

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.852	3	.951	4.192	.047
Within Groups	1.814	8	.227		
Total	4.666	11			

E. coli

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
3	3	6.5468	
1	3	7.2368	7.2368
0	3		7.5208
2	3		7.8750
Sig.		.068	.154

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.

1. Proses pemeliharaan broiler.

a. Persiapan Kandang



b. DOC Strain Cobb 500



c. Pemberian Probiotik



2. Proses perhitungan koloni Bakteri *E. coli*


a. Sterilisasi Alat



b. Penimbangan Sampel




c. Pengencer BPW



d. Media L-MBA



e. Penumbuhan bakteri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FELIS GUNAWAN Lahir di Kabupaten Bone tepatnya di Lamedde, Desa Barugae, Kecamatan Lamuru pada tanggal 24 April 1995 M atau bertepatan dengan 24 Dzul Qai'dah 1415 H merupakan Anak pertama dari dua bersaudara, buah cinta dari pasangan Suardi dan Jundaria. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Inpres 5/81 Mattampawalie, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone pada Tahun 2007. Pada Tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lamuru, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan tamat pada Tahun 2010. kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lamuru, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan tamat pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Ilmu Peternakan. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kegigihan peneliti menyelesaikan Strata satu (S1) pada tahun 2017.