

**HUBUNGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN
TERHADAP BOBOT BADAN SAPI BALI
DI KECAMATAN DONGGO
KABUPATEN BIMA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**RANO KARNO
NIM. 60700112052**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

Pernyataan Keaslian Skripsi

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rano Karno

NIM : 60700112052

Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 5 November 1993

Jurusan/Prodi : Ilmu Perternakan

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Alamat : Jalan Sultan Alauddin 2

Judul : **Hubungan Umur dan Jenis Kelamin terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum

Makassar, Agustus 2017

Penyusun

Rano Karno

NIM : 60700112052

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Umur Dan Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima” yang disusun oleh **RANO KARNO**, **NIM: 607001120 52**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan.

Samata, Agustus 2017
Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	
Sekretaris	: Astaty, S.Pt., M. Si.	
Munaqisy I	: Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si	
Munaqisy II	: Abbas, S.Pt., M.Sc.	
Munaqisy III	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	
Pembimbing I	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.	
Pembimbing II	: Irmawati, S.Pt., M.P.	

M A K A S S A R

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar




Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP: 19691105 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang lebih mulia penulis persembahkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan segala nikmat berupa kesempatan, kesehatan, ketabahan, petunjuk, dan kekuatan iman sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salam serta salawat tak lupa penulis hantarkan kepada nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang tetap istiqamah di jalan Allah.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah "Hubungan Umur Dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima". Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan akan tetapi, semua itu dapat diatasi berkat petunjuk dari Allah Swt, serta kerja keras dan rasa percaya diri dari penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan ikhlas segala kritikan dan masukan-masukan guna penyempurnaan tulisan ini agar kelak dapat bermanfaat.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dengan setulusnya kepada semua pihak yang turut serta

memberikan bantuan baik berupa materi maupun moral. Ananda haturkan penghormatan dan terima kasih yang setulusnya kepada:

H. Abakar dan Timalah yaitu kedua orang tua yang telah mendidik, mengasuh, dan membimbing, serta berkorban dengan sepenuh hati dan seluruh jiwa raganya dalam membiayai pendidikan sampai bisa menyelesaikan studi dan tidak lupa pula saya ucapkan teima kasih kepada adik yaitu, Juerdin, Doni Setiawan yang telah membantu kedua orang tua dalam mengirim biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari selama berada di Makassar.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.si sebagai ketua Jurusan, Ibu Astaty, S.Pt.,M.Si Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt. M.P selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Ibu Irmawaty, S. Pt., M.P selaku dosen pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk

membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini.

5. Bapak Dr.Ir. Muh. Basi Paly, M.Si Dan Bapak Abbas, S.Pt, M.P selaku penguji yang telah memberikan saran dan keritikan demi kesempurnaan penulis dan penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar khususnya angkatan 2012: Hamsah Andy Saputra, Radya Lestri, Amal Saputra,serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Teristimewa kepada senior-senior Magfira Baharudin, S.Pt, Hikmawati, S.Pt, Muhammad Ilias, S.Pt, Nurwahidah, S.Pt, jusriadin, S.Pt yang banyak membantu dan memberikan motifasi serta masukan kepada penulis dikala suka maupun duka.

Segenap kemampuan, tenaga, dan daya pikir telah dicurahkan dalam menyelesaikan penulisan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun, sesempurnanya manusia adalah ketika ia melakukan kesalahan karena dengan kesalahan dapat mengambil pelajaran yang berharga dan itu semua tidak dapat diraih dengan begitu saja tanpa pengorbanan, ikhtiar, dan doa. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam tulisan ini dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Makassar, Oktober2017

Penulis

Rano Karno

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Definisi Operasional	5
E. Kajian Terdahulu.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Islam Tentang Hewan Ternak	8
B. Tinjauan Umum Sapi Bali	10
C. Cara Menentukan Umur Pada Ternak.....	11
D. Pengukuran Tubuh Ternak Sapi Bali.....	16
E. Pendugaan Bobot Badan Ternak Dengan Berbagai Macam Rumus... 18	
F. Tinjauan Umum tentang Jenis Kelamin Sapi Bali	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Pengumpulan Data	35

E. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Umur terhadap Pertambahan Bobot Badan Sapi Bali	37
B. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Pertambahan Bobot Baban Sapi	38
C. Pengaruh Umur Dan Jenis Kelamin Terhadap Pertambahan Bobot Badan Sapi Bali	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Gigi dan Dugaan Umur Ternak Sapi.....	14
Tabel 2.2. Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali Jantan dan Sapi Bali Betina (SNI 7355: 2008).....	24
Tabel 4.1. Rata-rata Bobot Badan (BB) Sapi Bali di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Selama Penelitian	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Analisis Ragam Anova Pengaruh Umur Dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali	47
Lampiran 2. Pemberian Pakan Pada Sapi Bali Di Kecamatan Donggo	48
Lampiran 3. Proses Penimbangan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo	49
Lampiran 4. Penelitian Melakukan Wawancara Pada Responden Di Kecamatan Donggo.....	50
Lampiran 5. Kandan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kurva Pertumbuhan Sejak Lahir Sampai Ternak Mati	27
Gambar 2.2. Kurva Pertumbuhan Sapi (Manurung, 2008)	29
Gambar 4.1. Diagram Batang Interaksi Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.....	39
Gambar 4.2. Pengaruh Umur Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.....	40



ABSTRAK

Nama : Rano Karno
Nim : 60700112052
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Hubungan Umur Dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap bobot badan sapi bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Eksperimen dengan menggunakan metode RAK pola Faktorial dengan ulangan yang sama, untuk mengetahui pengaruh umur dan jenis kelamin Sapi Bali yang ada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun sampel yang gunakan adalah sapi bali sebanyak 20 ekor yang terdiri 5 ekor jantan umur 2 tahun, 5 ekor betina umur 2 tahun, 5 ekor jantan umur 1,5 tahun dan 5 ekor betina ,5 tahun. Data analisis yang di dengan ANOVA dari RAK pola Factorial dengan ulangan yang sama berdasarkan RAK Factorial.

Hasil Penelitian pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap bobot badan sapi Bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. rata-rata bobot badan (BB) sapi Bali dengan umur 1.5 tahun diantaranya jantan dengan rata-rata 166,32 kg, dan betina dengan rata-rata 155 kg, dan jumlah total sapi jantan dan betina yang berumur 1,5 tahun mencapai jumlah rata-rata 160,66. Sedangkan rata-rata bobot badan sapi bali yang berumur 2 tahun diantaranya jantan dengan rata-rata 162,32 dan betina dengan rata-rata 162,42, dengan total keseluruhan sapi bali jantan dan betina yang berumur 2 tahun mencapai rata-rata 162,37. Kemudian selanjutnya dilakukan pembagian antara sapi jantan yang berumur 1,5 tahun dengan sapi jantan berumur 2 tahun, rata-rata 164, 32, dan sapi betina berumur 1,5 tahun dengan sapi betina berumur 2 tahun, rata-rata 158,71. Adapun jumlah kategori dari hasil penjumlahan sapi jantan dan betina yang berumur 1,5 tahun dan berumur 2 tahun dengan total keseluruhan rata-rata 161,51 kg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata ($P>0,05$), antara umur dengan pertambahan bobot badan sapi bali yang berumur 1,5 tahun dan berumur 2 tahun.

Kata Kunci: Sapi Bali, Umur dan jenis kelamin, Bobot badan

ABSTRACT

Nama : Rano Karno
Nim : 60700112052
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Hubungan Umur Dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

This study aims to describe the influence of age and sex on the body weight of bali cattle in Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

The type of research used by the researcher is experimental research using RAK Factorial pattern with the same repetition, to know the influence of age and sex of Cow Bali in District Donggo Kabupaten Bima. The samples used are 20 Balinese cows consisting of 5 male males aged 2 years, 5 female aged 2 years, 5 male male 1.5 years and 5 female, 5 years. The analytical data were in with ANOVA from Factorial Factor RAK with the same replication based on Factorial RAK.

Result of research influence of age and gender to body weight of Bali cattle in District of Donggo Sub-Province of Bima. The average weight of a Balinese cow (BB) of 1.5 years of age is males with an average of 166.32 kg, and females with an average of 155 kg, and the total number of bulls and females aged 1.5 years reaches the average 160,66. While the average weight of 2-year-old bali cattle body of males with an average of 162.32 and females with an average of 162.42, with a total of 2-year-old male and female bulls reaching an average of 162.37 . Then the division between the male bulls aged 1.5 years with 2-year-old bulls, an average of 164, 32, and 1.5-year-old female cow with 2 year old cow, an average of 158.71. The number of categories from the sum of male and female cows aged 1.5 years and aged 2 years with a total overall average of 161.51 kg.

The results of this study indicate that there is no significant effect ($P > 0,05$), between age and body weight of bali cattle aged 1.5 years and 2 years old.

Keywords: *Bali Cattle, Age and sex, Body weight*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana sektor ini memiliki nilai strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani. Kebutuhan pangan tersebut yang terus meningkat atas pertambahan jumlah penduduk, dan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia diantara hidup masyarakat.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan telah memunculkan peningkatan permintaan terhadap daging khususnya daging sapi. Sementara itu populasi ternak sapi di dalam negeri, sebagai bahan baku produksi daging, tidak dapat mengimbangi laju permintaan tersebut, sehingga seringkali terjadi kelangkaan daging di pasar dalam negeri.

Pada tahun 2013 kebutuhan daging sapi mencapai 549,7 ribu ton/ tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 474,4 ribu ton yang mampu dipenuhi oleh peternak domestik. Selama ini, untuk memenuhi kekurangan tersebut pemerintah telah melakukan impor bakalan sapi potong dari beberapa negara seperti Australia. Sayangnya, kebijakan ini justru merugikan peternak lokal. Harga daging sapi impor lebih murah dari pada sapi lokal sehingga mengancam usaha pemotongan sapi lokal, walaupun sebenarnya kualitas daging lokal tidak kalah dengan kualitas daging impor. Kenaikan impor bakalan sapi potong yang cukup signifikan yaitu

40,3 ribu ton ke 55,84 ribu ton kenaikan tersebut dikarenakan sulitnya konsumen mendapat bakalan sapi potong dalam negeri. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya kinerja usaha budidaya sapi potong lokal yang digeluti oleh sekitar 12.94 juta rumah tangga peternak pada tahun 2013 (Suswono, 2014).

Usaha peternakan di Indonesia hampir selalu menghadapi kendala yang mengakibatkan produktivitas ternak masih rendah. Salah satu kendala tersebut adalah kematian dan rendahnya atau lambatnya pertumbuhan berat badan ternak. Peningkatan tingkat kematian menyebabkan penurunan populasi ternak (Toelihere, 1997)

Jenis sapi yang paling banyak dipelihara di Indonesia adalah sapi bali sapi bali adalah banteng yang telah dijinakkan berabad-abad lalu. Abad ke 19 Sapi Bali mulai ke lombok, kemudian abad ke 20 sapi bali masuk ke sulawesi selatan dan sejak tahun 1962 masuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Tidak hanya di indonesia, sapi bali diketahui sampai ke Australia, Malaysia, bahkan Thailand, dan Filipina.

Sapi bali yang berasal dari banteng mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena cara hidupnya dan bukan karena pengaruh kawin silang dengan sejenis sapi lain. Salah satu perubahan tersebut adalah ukuran sapi bali yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Banteng, terutama bobot dan tinggi badan.

Kemampuan reproduksi sapi bali merupakan yang terbaik di antara sapi-sapi lokal. Hal ini disebabkan sapi bali bisa beranak setiap tahun. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik, penambahan berat badan hariannya mencapai

0,7 kg/hari. Keunggulan lainnya sapi bali mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga sering disebut ternak perintis. Karena perbaikan manajemen pemeliharaan, khususnya di pulau bali, di laporkan bahwa dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan mutu genetik sapi bali.

Keunggulan sapi bali diantaranya memiliki daya tahan terhadap wilayah subtropis, pertumbuhan tetap baik walaupun dengan pakan yang jelas dengan karkas yang tinggi dan kualitas daging baik. Umumnya, faktor genetik dan lingkungan juga sangat berperan dalam menyediakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan seekor ternak. Oleh karena itu, dalam upaya memperoleh produksi ternak yang baik, usaha yang dilakukan harus dimulai sedini mungkin terutama pada ternak yang memproduksi daging. Jadi, kecepatan pertumbuhan merupakan kunci sukses pada peternakan yang bertujuan memproduksi daging (Cole, 1966).

Pertumbuhan mempunyai tahap cepat dan tahap lambat. Tahap cepat terjadi sebelum dewasa kelamin dan tahap lambat terjadi pada fase awal dan saat dewasa tubuh telah tercapai (Tillman, 1991).

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir hingga usia penyapihan dan puberitas namun, setelah usia puberitas hingga usia dewasa laju pertumbuhan berangsur menurun dan akan terus menurun (Tomaszeweska, 1933 dalam Manurung. 2008).

Menurut Bamualim dkk (2003) potensi pertumbuhan ternak ditentukan oleh genetik yang dinyatakan dalam hubungan hormonal didalam tubuh, hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan bobot dewasa yang dicapai.

Pada saat pembuahan pertumbuhan berlangsung lambat, kemudian menjadi agak cepat pada saat menjelang kelahiran. Setelah kelahiran *pedet* pertumbuhan semakin cepat hingga usia penyapihan. Dari usia penyapihan hingga usia pubertas laju pertumbuhan masih bertahan pesat, namun dari usia setelah pubertas hingga dewasa laju pertumbuhan berangsur menurun dan akan terus menurun (Bambang, 2005).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian “Pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap bobot badan Sapi Bali” dilakukan agar diperoleh suatu data atau informasi mengenai bagaimana pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap penambahan bobot badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh umur terhadap bobot badan Sapi Bali di Kecamatan, Donggo Kabupaten Bima?
2. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap bobot badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap bobot badan sapi bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap bobot badan sapi bali.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap bobot badan Sapi Bali.
- b. Sebagai bahan kajian pemerintah di Kecamatan Donggo.

D. Definisi Operasional

1. Sapi Bali (*Bos Sondaicus*) adalah sapi asli Indonesia hasil penjinakan (domestikasi) banteng liar.
2. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran tubuh yang meliputi perubahan bobot hidup, bentuk dan komposisi tubuh, termasuk perubahan komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan organ serta komponen-komponen kimia termasuk air, lemak, protein, dan abu.
3. Ternak sapi adalah hewan herbivora yang termasuk spesies bos dalam kelas bovidae yang dipelihara oleh masyarakat di Desa Kodokan, Kunduran, Blora dengan tujuan untuk menggemukkan dan memperbanyak sapi.

E. Kajian Terdahulu

Suastina dan Kayana (2005) melakukan penelitian tentang Analisis Finansial Usaha Agribisnis Peternakan Sapi Daging. Metode yang digunakan dalam perhitungan aspek finansialnya adalah *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (B/C) dan juga *Break Even Point* (BEP). Penelitian dilakukan di Desa Petang Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan populasi sapi potong sebanyak 50 ekor sapi. Hasil penelitian ini menunjukkan usaha tersebut akan mencapai *Break Even Point* (BEP) pada penjualan 80.479.452,05 atau 17 ekor sapi. Selain itu dari perhitungan NPV-nya

didapatkan hasil sebesar 5.651.378,00, yang berarti bahwa usaha ternak sapi potong layak karena NPV-nya bernilai positif. Selain dari 2 perhitungan diatas, dilakukan juga perhitungan *Benefit Cost Ratio* (B/C) yang menunjukkan hasil B/C sebesar 1,008. Dimana hal ini menunjukkan bahwa dengan *discount factor* 30% menghasilkan B/C >1. Sedangkan *Internal Rate of Ratio* (IRR) didapatkan sebesar 44,04%. Dari perhitungan NPV dan IRR juga menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi potong di Desa Petang layak untuk dilanjutkan.

Putri dan Sukanata (2012) melakukan penelitian mengenai. Kelayakan Finansial Pemanfaatan Skim Kredit KUPS pada Pengembang biakan Sapi Bali di Desa Tangkas Kabupaten Klungkung. Hasil yang di dapatkan menunjukkan bahwa berdasarkan biaya tunai, usaha pengembang biakan sapi bali di Desa Tangkas layak untuk dijalankan. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan biaya total, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan biaya tunai, usaha tani pengembang biakan sapi bali di Desa Tangkas masih tetap layak dilaksanakan jika bunga KUPS masih di bawah 19,97 % tahun. Namun berdasarkan perhitungan biaya total, usaha tani pengembang biakan sapi bali di Desa Tangkas Kabupaten Klungkung tidak layak dilaksanakan jika suku bunga KUPS masih di atas 2,24%.

Nomleni (2005) melakukan. Analisis Finansial pada Usaha Peternakan Sapi Potong dengan Menerapkan Hasil Teknologi Pakan Ternak (Kasus Amanda Farm di Kabupaten Gianyar, Bali). Metode yang digunakan dalam perhitungan aspek finansial adalah analisis laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio provabilitas. Selain itu juga digunakan analisis kriteria

investasi yaitu menghitung *Net Present Value* (NPV) dan analisis *Pay Back Period* (PBP) serta titikimpas (*break even*) harga jual dan skala pemeliharaan sapi potong. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap usaha peternakan sapi potong dari tahun 2001-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi potong Amanda Farmme memiliki tingkat rasio yang likuid, solvabel dan menguntungkan. Titik impas harga penjualan dan skala pemeliharaan sapi potong yang dicapai dari tahun 2001-2004 berturut-turut adalah Rp 32. 632. 352,94 atau 7 ekor, Rp 58.910.714,29 atau 15 ekor, Rp 56.879.310,34 atau 15 ekor dan Rp 51.546.875 rata 11 ekor. Kelayakan vestasi peternakan sapi potong Amanda Farm ditunjukkan dengan nilai NPV sebesar Rp 441.481.529,26 dengan *discount factor* sebesar 16% dan nilai PB selama 4 tahun bulan 28 hari, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam tentang Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan salah satu ciptaan Allah yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Baik untuk dikonsumsi ataupun sebagai alat transportasi. Pada dasarnya penciptaan hewan ternak sangat berbeda dengan penciptaan makhluk Allah swt yang lain, misalnya manusia diciptakan dari tanah sedangkan jin dan setan diciptakan dari api, akan tetapi konsep penciptaan itu tentu adalah rahasia Allah swt agar hiruk-pikuk kehidupan berpasang-pasangan itu sudah menjadi keadilan sang khalik.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah Ayat 67

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَنَّبُوا بِقَرَّةٍ ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya;

Dan (ingatlah), ketika Musa Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".

Penciptaan hewan ternak tidak hanya memberikan manfaat untuk kehidupan manusia melainkan juga dapat dijadikan pelajaran. Dari hewan ternak tersebut kita dapat mengetahui betapa besar kuasa Allah dengan segala

ciptaannya. Dari dalam tubuh hewan tersebut terdapat daging dan susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia dengan berbagai khasiat, Sungguh besar kuasa Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah Ayat 68

قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾

Terjemahannya;

Mereka menjawab: "mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada Kami; sapi betina apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu".

Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja) (membajak tanah) untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan. (dan tidak pula untuk mengairi tanaman) atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat (tidak ada belangnya.") tidak ada warna lain dari warna aslinya. (Kata mereka, "Sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran.") Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. (Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya) karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak

tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah.

B. Tinjauan Umum Sapi Bali

Sapi Bali (*Bos Sondaicus*) merupakan sapi asli Indonesia yang berasal dari Pulau bali. Sapi Bali merupakan hasil domestikasi banteng. Para ahli meyakini bahwa domestikasi tersebut telah dilakukan sejak akhir abad ke 19 di Bali sehingga sapi jenis ini dinamakan Sapi Bali. Sapi Bali tersebar hampir terdapat di semua provinsi di Indonesia (Fikar & Ruhyadi, 2010).

Menurut Williamson dan Payne (1993), bangsa sapi Bali memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut:

Kindom	: <i>Amalia</i>
Phylum	: <i>Chordata</i>
Subphylum	: <i>Vertebrata</i>
Class	: <i>Mamalia</i>
Ordo	: <i>Artiodactyla</i>
Sub Ordo	: <i>Ruminantia</i>
Family	: <i>Bovidae</i>
Genus	: <i>Bos (cattle)</i>
Spesies	: <i>(BosSondaicus)</i>

Adapun ciri-ciri khas Sapi Bali diantaranya rambut berwarna merah keemasan pada jantan akan menjadi hitam setelah dewasa, dari lutut ketangkai bawah berwarna putih seperti memakai kaus kaki, bagian pantat berwarna putih membentuk setengah lingkaran, ujung ekor berwarna hitam, serta terdapat garis

belut warna hitam di punggung betina, sapi Bali memiliki kepala pendek dengan dahi datar, Sapi Bali jantan memiliki tanduk panjang dan besar yang tumbuh kesamping belakang. Sebaliknya, Sapi Bali betina memiliki tanduk yang lebih pendek dan kecil, Sapi Bali mampu beradaptasi terhadap kondisi pakan yang jelek dan lingkungan tropis, serta memiliki persentase karkas yang tinggi. Namun, Sapi Bali ini rentan terhadap penyakit jembrana. Sapi Bali merupakan sapi lokal dengan penampilan produksi yang cukup tinggi. Penyebaran telah meluas di Indonesia, meskipun masih tetap terkonsentrasi di Pulau Bali. Sampai saat ini yang kemurnian genetik Sapi Bali masih tetap terjaga karena ada pembatasan masuknya sapi jenis lain ke Pulau Bali (Fikar & Ruhya di, 2010).

Kemampuan reproduksi Sapi Bali merupakan yang terbaik diantara sapi-sapi lokal. Dibanding dengan sapi potong lokal lain, Sapi Bali mempunyai performans produksi yang lebih efisien, dengan angka kebuntingan dan angka kelahiran yang tinggi yaitu berkisar (80 %), penambahan bobot badan dengan pakan yang baik dapat mencapai 0,7 kg/hari (jantan dewasa) dan 0,6 kg/hari (betina dewasa), serta persentase karkas berkisar antara 51,5-59,8 %, dengan persentase tulang kurang dari 15 % berat karkas, dan dagingnya berkadar lemak rendah (Pane dan Ismed, 1986).

C. Cara Menentukan Umur Pada Ternak

Umur ternak dalam pemeliharaan mempunyai peran yang penting, karena melalui umur. peternak dapat mengetahui kapan ternak dapat dikawinkan maupun digemukkan. Cara yang paling tepat untuk mengetahui umur ternak adalah dengan melihat catatan produksi atau dari kartu rekording ternak yang bersangkutan.

Namun, di Indonesia pencatatan merupakan hal yang belum biasa dilakukan peternak. Apabila tidak terdapat kartu rekording, umur ternak dapat diperkirakan dengan mengamati pergantian giginya, karena pergantian gigi waktunya relatif teratur. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bobot. Umur berpengaruh terhadap pertumbuhan badan sapi yang berpengaruh juga terhadap bobot sapi. Pertumbuhan dari tubuh hewan mempunyai arti penting dalam suatu proses produksi, karena produksi yang tinggi dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan yang cepat dari hewan tersebut. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap makhluk hidup dan dapat pula dimanifestasikan sebagai suatu pertumbuhan dari pada bobot organ ataupun jaringan tubuh yang lain, antara lain tulang, daging, urat dan lemak dalam tubuh (Soeparno, 2005 dalam Pradana, W.dkk, 2014). Pendugaan umur pada sapi potong dapat dilakukan dengan cara melihat perubahan jumlah gigi seri, mengamati kondisi/ keadaan bulu pada ternak, dan recording cara/metode menentukan umur ternak :

1. Recording Pada Ternak

Rekording ternak merupakan proses pencatatan semua kegiatan dan kejadian yang dilakukan pada suatu usaha peternakan. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sangat mendukung upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan. Kegiatan pencatatan (rekording) ini dapat meliputi aspek peternaknya, aspek organisasi dan semua kejadian yang dialami dalam usaha peternakan dan performans ternak yang bersangkutan. Variabel yang biasa dicatat dalam rekording ternak adalah identitas sapi (umur, keturunan, dll), performans produksi (khusus pada sapi perah ditambah dengan

data produksi susu), performans reproduksi dan kesehatan ternak (Hardjosubroto, 1994 dalam Hakim, L.dkk, 2010).

Hal utama yang paling membantu dalam penentuan umur yaitu dengan ketersediaan catatan atau recording dari ternak itu sendiri. Misalnya tanggal lahir, dikawinkan, beranak pertama kali dan seterusnya. Waktu kelahiran, catatan ini penting, untuk mengetahui umur ternak yang dilahirkan secara tepat dan akurat, selain itu berguna untuk menentukan umur penyapihan dan waktu mengawinkan kembali domba induk setelah beranak. Dengan adanya pencatatan tersebut, peternak dapat memperoleh keuntungan seperti: peternak dapat membuat beberapa perencanaan diantaranya menentukan waktu mengawinkan setelah beranak agar jarak beranak dapat diperpendek, mengamati jika ada induk berahi kembali setelah dikawinkan.

2. Mengamati Gigi Ternak

Umumnya metode ini sudah sangat dikenal pada masyarakat peternak di Indonesia. Istilah yang biasa dikenal adalah “poel”. ‘Poel” menunjukkan adanya pergantian gigi ternak, sehingga seberapa banyak tingkat pergantian gigi bisa menjadi dasar menduga umur ternak. Semakin banyak gigi yang “poel” maka umur ternak juga semakin tua.

Gigi ternak mengalami erupsi dan keterasahan secara kontinyu. Pola erupsi gigi pada ternak memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan untuk menduga umur ternak. Gerakan mengunyah makanan yang dilakukan ternak mengakibatkan terasahnya gigi (Heath dan Olusanya, 1988).

Pertumbuhan gigi ternak dibagi menjadi 3 fase yaitu : fase tumbuh gigi (gigi susu), fase pergantian gigi dan fase keausan gigi.

1. Fase gigi susu : Terjadi pada ternak mulai lahir sampai dengan gigi seri bertukar dengan yang baru.
2. Pergantian gigi : masa awal dari pergantian gigi sampai dengan selesai
3. Keausan gigi : gigi sudah tidak berganti-ganti lagi, melainkan sedikit demi sedikit aus.

Tabel 2.1. Kondisi Gigi dan Dugaan Umur Ternak Sapi

No	Kondisi Gigi	Perkiraan Umur
1.	Gigi seri sudah tumbuh, kecuali gigi seri luar	15 hari
2.	Gigi seri susu sudah tumbuh semuanya	1 bulan
3.	Gigi seri susu dalam sudah terasah sebagian	6 bulan
4.	Gigi seri susu dalam sudah terasah seluruhnya	10-12 bulan
5.	Gigi seri luar sudah terasah seluruhnya	16-18 bulan
6.	Gigi seri susu dalam sudah berganti dengan gigi tetap	1,5-2 tahun
7.	Gigi seri susu tengah dalam sudah berganti dengan gigi tetap	2,5 tahun
8.	Gigi seri susu tengah luar sudah berganti menjadi gigi tetap	3 tahun
9.	Gigi seri susu luar sudah berganti menjadi gigi tetap	3,5 tahun

Sumber : Guntoro (2002)

3. Wawancara Dengan Peternak

Menanyakan kepada pemilik ternak mengenai umur ternak tersebut. Akan tetapi metode ini mengandalkan kejujuran dari peternak dan apakah peternak tersebut lupa apa tidak.

4. Mengamati Tanduk Ternak

Poespo (1986) menyatakan bahwa keadaan cincin tanduk dapat digunakan untuk menafsirkan umur sapi. Rumus yang digunakan yaitu :

$$Y = X + 2$$

Dimana Y merupakan umur sapi, X merupakan jumlah cincin tanduk dan 2 merupakan koefisien rata-rata sapi bunting pada umur 2 tahun. Tiap cincin tanduk berhubungan erat dengan kelahiran, periode laktasi dan jalannya pemeliharaan. Sesudah selesai periode kebuntingan pertama, pangkal tanduknya timbul suatu alur melingkar dan selanjutnya setiap kali bunting hal demikian akan terjadi lagi. Pengaruh pencemaran, penyakit dan musim panas menyebabkan cincin tanduk kelihatan dangkal dan tidak terang.

Secara umum sejak umur 6 bulan, tanduk sapi normal akan tumbuh dan secara bertahap pada dasar tanduk akan terlihat lingkaran-lingkaran yang mengelilingi. Pada sapi betina yang secara teratur melahirkan, dapat dilihat jelas pertumbuhan tanduknya. Maka pedoman memberikan taksiran umur sapi betina dewasa adalah banyaknya lingkaran pada tanduk ditambah 4 tahun. Namun untuk sapi jantan dapat dihitung jumlah lingkaran pada tanduk ditambah 5 tahun. Yang perlu diingat adalah penaksiran dengan metode lingkaran tanduk ini hanya dapat digunakan pada sapi dewasa, maka perlu dilengkapi dengan taksiran dengan metode gigi sapi.

Penentuan umur ternak dengan melihat lingkaran cincin tanduk adalah dengan cara menjumlahkan angka dua pada tiap lingkaran cincin tanduk. Misalnya terdapat satu lingkaran cincin tanduk berarti sapi tersebut berumur tiga tahun. Asumsi dari penambahan angka dua tersebut adalah sapi telah dewasa kelamin dan siap melahirkan pada umur dua tahun (Timan, 2003).

Pendugaan umur sapi berdasarkan tumbuhnya tanduk dan cincin tanduk adalah yang paling kurang akurat. Oleh karena itu pendugaan dengan cara ini

jarang dipergunakan. Prinsip pendugaan umur berdasarkan cincin tanduk didasarkan pada pengaruh pakan. Alasannya, diIndonesia terjadi musim kemarau dan musim hujan (Undang Santosa, 1995).

5. Mengamati Bulu Ternak

Pendugaan umur dapat dilakukan dengan cara pengamatan keadaan/kondisi bulu ternak sapi potong. Ternak muda memiliki bulu yang panjang dan kasar, sedangkan pada ternak tua bulu lebih pendek dan halus. Bulu yang kasar juga dapat disebabkan oleh keadaan ternak yang sedang sakit ataupun faktor pakan. Sapi ropis umumnya memiliki bulu yang panjang dan kasar sebagai termoregulator, sedangkan sapi tropis umumnya pendek dan halus (Arbi, 2009).

6. Mengamati Tingkah Laku Ternak

Dengan melihat habitusnya (tingkah laku) kebiasaan terhadap ternaknya secara alami. Ternak yang sehat atau masih muda mempunyai temperamen yang lebih lincah dari pada ternak yang kurang sehat atau sudah tua.

D. Pengukuran Tubuh Ternak Sapi Bali

Pengukuran tubuh ternak sapi dapat digunakan untuk menduga bobot badan seekor ternak sapi dan sering juga dipakai sebagai parameter teknis penentuan bibit sapi (Santosa, 2005).

Selanjutnya Sumadi(2008) menjelaskan bahwa ukuran tubuh ternak dapat menggambarkan kemampuan dan produksi yang baik dari seekor ternak, ukuran-ukuran tubuh tersebut antara lain, panjang badan, tinggi gumba, lingkar dada, dalam dada, lebar dada, dan indeks kepala.

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mengukur bobot badan sapi maka akan digunakan rumus yang dikenal sebagai rumus *school* dengan menggunakan variabel lingkar dada dan rumus modifikasi yang menggunakan variabel lingkar dada, dan panjang badan (Abidin, 2002).

Sapi Bali dewasa, tinggi badannya mencapai 1-2 meter dengan berat antara 300-400 kg. Sapi Bali kaki pendek tetapi badannya panjang dan lingkar dada cukup besar (Suharno & Nazarudin, 1994).

Berat badan Sapi Bali jantan dewasa, sekitar 400 kg, lingkar dada 192 cm, tinggi gumba, 127 cm, dan panjang badan 120 cm. Berat Sapi Bali betina, dewasa, sekitar 260 kg, lingkar dada 165 cm, tinggi gumba 114 cm, dan panjang badan 103 cm (Pane dan Ismed, 1986).

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa panjang badan Sapi Bali jantan umur < 1 tahun 120 ± 86 cm dan umur > 1-2 tahun $120,67 \pm 0,81$ cm. Selanjutnya panjang badan Sapi Bali jantan secara berurutan pada umur < 1 tahun, > 1-2 tahun dan > 2-3 tahun sekitar $103,62 \pm 3,76$ dan $115,50 \pm 2,60$ cm. Pengukuran lingkar dada menurut hasil penelitian yakni $170,14 \pm 1,35$ cm dan $170,53$ untuk jantan dan betina $150,88$ cm. (Arlina & Khasrad, 2003).

Abidin (2006) menyatakan dalam dada, tinggi pundak, lebar pundak, dan umur mempunyai pengaruh pada bobot tubuh. Adapun bobot badan dapat dilihat dengan rumus yang menggunakan variabel lingkar dada sebagai berikut:

$$\text{Bobot badan (Kg)} = \frac{(\text{Lingkar Dada (cm)} + 22)^2}{100}$$

Model persamaan garis regresi yang diperoleh sangat baik digunakan untuk menduga bobot badan Sapi Bali jantan (Sudirman, 2005).

Berdasarkan koefisien persamaan garis regresinya dapat diketahui bahwa perubahan bobot badan Sapi Bali jantan yang berumur 3-5 tahun lebih ditentukan oleh perubahan lingkar dada dari pada perubahan panjang badannya. Bobot badan suatu ternak sangat penting diketahui karena sangat menentukan harga jual atau beli sapi tersebut. Penentuan umur dapat juga ditentukan melalui catatan kelahiran dan pertumbuhan gigi seri ternak. Data-data ini digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan usaha budidaya sapi potong. Sebagai contoh umur sapi, biasa digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan calon bibit. Bahwa kondisi gigi dan dugaan umur dapat dilihat pada tabel beriku.

Sapi Bali memiliki ukuran lebih kecil dari banteng akibat proses domestikasi (Bandini, 2003). Selanjutnya Santosa, (2015) Mengataka Pengukuran tubuh ternak sapi dapat digunakan untuk menduga bobot badan seekor ternak sapi danseringkali dipakai sebagai parameter teknis penentuan sapi bibit.

E. Pendugaan Bobot Badan Ternak Dengan Berbagai Macam Rumus

Pendugaan berat badan sangat penting dilakukan oleh para pemilik ternak untuk mengetahui bobot tubuh ternak. Cara ini merupakan cara lain untuk mengetahui berat badan ternak selain penimbangan berat badan. Apabila setiap kali harus selalu dilakukan penimbangan, hal ini dirasa kurang praktis di samping timbangan itu jumlahnya terbatas. Pada ternak potong, bobot badan menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan karena produk utama dari sapi potong adalah daging dimana untuk mengetahui pertambahan bobot daging peternak perlu melakukan penimbangan terlebih dahulu. Selain dengan cara penimbangan ada

banyak cara yang bisa digunakan salah satunya dengan menggunakan dugaan bobot dengan pita ukur atau dengan menggunakan berbagai rumus yang lazim digunakan seperti rumus shoort, winter dan lain sebagainya.

Bobot badan merupakan bobot yang didapatkan selama sapi dipelihara dan dalam keadaan hidup, sedangkan bobot potong merupakan bobot yang ditimbang sesaat sebelum sapi dipotong (Narasasmita dan Mudikdjo, 1979). Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi (Kadarsih, 2003). Perbedaan bobot badan dewasa sapi pedaging yang berbeda-bedaakan menghasilkan tingkat kegemukannya yang berbeda pula pada umur dan makanan yang sama (Parakkasi, 1999). Perbedaan bobot badan tersebut dikarenakan adanya perbedaan penambahan bobot badan harian, rataan pakan yang dikonsumsi masing-masing individu, jumlah penambahan otot tiap hari serta perbedaan jumlah lemak yang telah disimpan oleh tubuh. Perbedaan tersebut akan menjadikan komposisi tubuh atau frame size ternak berbeda (Field dan Taylor, 2002).

Ukuran-ukuran linear tubuh merupakan suatu ukuran dari bagian tubuh ternak yang pertambahannya satu sama lain saling berhubungan secara linear. Kadarsih (2003) menyatakan bahwa ukuran linear tubuh yang dapat dipakai dalam memprediksi produktivitas sapi antara lain panjang badan, tinggi badan, lingkaran dada. Ukuran linear tubuh menurut Minish dan Fox (1979) dapat mengidentifikasi pola atau tingkat kedewasaan fisiologis ternak sehingga dapat dijadikan parameter penduga bobot badan ternak. Penentuan frame size menurut

Field dan Taylor (2002) dapat ditentukan berdasarkan nilai parameter tubuh ternak tersebut.

Tujuan pendugaan bobot badan ternak sebagai Berikut:

1. Memperkirakan BB ternak
2. Menentukan harga penjualan dan pembelian
3. Menaksir jumlah karkas

Pengukuran Tubuh Ternak

1. Panjang badan

- a) Panjang badan absolut jarak antara samping tulang baku (tuberculum humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk (tuberculum ischiadum)
- b) Panjang badan relatif : proyeksi (garis datar) dari pada panjang badan absolut

2. Tinggi gumba/ tinggi pundak/ tinggi badan jarak lurus dari titik tertinggi tulang gumba sampai ke tanah datar

3. Lingkaran dada panjang melingkar/ keliling yang diukur pada bagian dada tepat di bagian belakang tulang gumba pada tulang rusuk ke 3-4

4. Lebar dada Jarak antara kedua bagian samping (lateral) kanan kiri tulang bahu

5. Dalam dada Jarak antara titik tertinggi tulang gumba sampai dengan bagian tepi bawah tulang dada.

a. Beberapa Rumus Pendugaan Bobot Badan Sapi :

1. Rumus Schoorl : $BB = (LD + 22)2100$

Keterangan :

a) BB = Bobot Badan (kg)

b) LD = Lingkar Dada (cm)

c) Rumus ini hanya berlaku untuk sapi dewasa, sedangkan untuk pedet rumus ini kurang tepat, karena faktor penambah 22 untuk lingkar dada pada sapi yang sedang tumbuh terlalu besar.

2. Rumus Winter : $BB = (LD)^2 \times (PB)300$

Keterangan :

a) BB = Bobot Badan (pounds);

b) LD = Lingkar Dada (inchi)

c) PB = Panjang Badan (inchi)

d) Rumus ini merupakan gabungan antara panjang badan dan lingkar dada (Willianson dan Payne, 1986). Tingkat kesalahan rumus ini dibandingkan dengan penimbangan berkisar 2-6% (Hermanto. 1988).

3. Rumus Pendugaan yang digunakan di Denmark $BB = (LD + 18)2100$

Keterangan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a) BB = Bobot Badan (kg)

b) LD = Lingkar Dada (cm)

b. Rumus Pendugaan Bobot Badan Untuk Domba/ Kambing

1. Rumus Ardjodarmoko (1975) $BB = (LD)^2 \times (PB)104$

Keterangan :

a) BB = Bobot Badan (kg)

b) LD = Lingkar Dada (cm)

c) PB = Panjang Badan (cm)

d) Rumus ini merupakan penyempurnaan dari rumus Winter, yang diaplikasikan pada kambing / domba.

c. Rumus Pendugaan Bobot Badan Untuk Kerbau

1. Rumus Sutardi (1975) $BB \text{ (kg)} = - 920,72 + 11,904 LD \text{ (cm)} - 28,869 LD^2$

2. Rumus Camoens (1976)

$$Y = 40 TP - 11 LD - 450$$

Keterangan :

a) Y = Bobot badan (pounds)

b) TP = Tinggi Pundak (inchi)

c) LD = Lingkar Dada (inchi)

Sejumlah peneliti mencoba membuktikan keakuratan rumus-rumus itu diuji-cobakan terhadap beberapa kelompok sapi antara bobot taksir dan bobot timbangan. Hasilnya rumus Scheiffer dan Lambourne lebih mendekati berat real sapi sebenarnya dengan tingkat kesalahan di bawah 10 persen. Sedangkan rumus Schoorl tingkat kesalahannya mencapai 22,3 persen. Perbedaan perhitungan berat pada makhluk hidup adalah wajar, karena bobot hewan sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan, yakni gelisah (stress), habis makan, banyak minum atau baru buang feses. Hewan yang ditimbang sekalipun, akibat buruk perlakuan dan pengangkutan dapat menyebabkan susut tubuh 5-10%.

Dengan memperoleh angka taksiran bobot hidup, maka persentase karkas dan daging dapat segera diketahui. Karkas sapi berkisar 47-57 persen dari bobot hidupnya dan daging 75 persen dari karkas. Untuk domba persentase karkasnya sekitar 45 persen dan dagingnya 75 persen dari karkas.

F. Tinjauan Umum tentang Jenis Kelamin Sapi Bali

Morfometrik merupakan ukuran-ukuran tubuh seperti tinggi pundak, panjang badan, lingkaran dada, panjang telinga, berat badan sapi, panjang ekor dan tinggi panggul (Suhaima, 1999).

Morfometrik memberi gambaran bentuk tubuh Sapi Bali sebagai ciri khas bangsa ternak tertentu (Dwiyanto, 1982). Morfometrik merupakan salah satu alat untuk melakukan seleksi pada Sapi Bali (Muljana, W. 1996).

Ukuran-ukuran tubuh ternak merupakan sifat kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara jenis ternak Sapi Bali ataupun seleksi. Ukuran tubuh ternak Sapi Bali sering juga digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan karena ukuran merupakan indikator penting dari pertumbuhan. Ukuran tubuh yang umum diamati pada ternak Sapi Bali meliputi lingkaran dada, dan panjang tubuh (Suhaima, 1999).

Ukuran tubuh dapat digunakan untuk menaksir bobot badan serta tubuh dan berat karkas, serta memberi gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas suatu bangsa ternak Sapi Bali tertentu (Erfan, 2004).

Sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur dari ternak Sapi Bali memiliki derajat dan sifat yang diamati atau terlihat dari tubuh ternak itu sendiri seperti panjang badan, adapun pengukuran panjang badan dilakukan dengan cara membentangkan mistar ukur mulai dari sendi bahu (*humerus*) sampai tulang tapis (*tuber ischii*). Tinggi pundak, diukur dari titik tertinggi pundak tegak lurus sampai ke tanah dengan menggunakan tongkat ukur. Tinggi pinggul, diukur dari bagian tertinggi pinggul tegak lurus sampai ke tanah dengan menggunakan tongkat

ukur. Lingkar dada, pengukuran lingkar dada dilakukan dengan cara melingkari pita ukur pada tubuh ternak Sapi Bali tepat dibelakang kaki depan. Pita ukur harus dikencangkan sehingga pita ukur pada bagian dada terasa dalam dada yaitu jarak antara titik tertinggi pundak dan tulang dada (Santosa, 2005).

Pengukuran ukuran tubuh ternak Sapi Bali dapat digunakan untuk menduga bobot badan seekor ternak sapi dan seringkali dipakai sebagai parameter teknis penentuan sapi bibit (Santosa, 2005).

Ukuran standar bibit Sapi Bali jantan dan Sapi Bali betina menurut SNI 7355: 2008 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali Jantan dan Sapi BaliBetina (SNI 7355: 2008)

No	Jenis Kelamin	Parameter cm	Kelas I cm	Kelas II cm	Kelas III Cm
Umur (Bulan)					
Sapi Bali Jantan					
1.	18-24	Lingkar dada	176	162	155
		Tinggi pundak	119	113	107
		Panjang badan	124	117	110
2.	24	Lingkar badan	189	173	167
		Tinggipendek	127	121	115
		Panjangbadan	135	125	118
Sapi Bali Betina					
1.	18-24	Lingkar dada	138	130	125
		Tinggi pundak	105	99	93
		Panjang dadan	107	101	95
2.	24	Lingkar dada	147	135	13
		Tinggi pundak	109	103	97
		Panjang badan	113	107	101

Sumber : Badan Standar Nasional SNI 7355:2008

G. Tinjauan Umum tentang Pertambahan Bobot Badan Sapi Bali

Menurut Riyanto& Purbowati (2009), pertumbuhan adalah perubahan bentuk atau ukuran seekor ternak yang dapat dinyatakan dengan panjang, volume atau masa. Pertumbuhan dapat dinilai dengan semakin bertambahnya tinggi,

panjang, ukuran lingkaran dan bobot badan yang terjadi pada seekor ternak. Pertumbuhan sapi merupakan penambahan bobot badan dan perkembangan dari bagian-bagian tubuh.

Proses pertumbuhan pada sapi dimulai dari terjadinya pembuahan, kebuntingan, kelahiran dan kemudian mengalami masa remaja atau pubertas hingga menjadi dewasa. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir hingga usia penyapihan dan pubertas (Syamsudin, 2003).

Pertumbuhan dan perkembangan anak sapi tergantung genetik, jenis kelamin, pakan, dan perawatan (Yulianto & Saparinto, 2010).

Pertumbuhan ternak biasanya dinyatakan dengan adanya perubahan bobot hidup, perubahan tinggi atau panjang badan. Makin berat kenaikan bobot badan perhari makin baik pertumbuhannya. Secara genetik pertumbuhan dibatasi sampai pada dewasa tubuh. Sapi Bali biasanya bobot sesudah dewasa tubuh terjadi karena adanya penimbunan lemak secara populer, penggemukan. Pertumbuhan akan menurun setelah usia pubertas sampai dewasa hingga usia jual. Pada sapi yang dewasa, penggunaan ransum untuk meningkatkan bobot badan sudah tidak efisiensi lagi. Oleh karena, itu untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi haruslah diketahui saat yang tepat untuk pengemukandan saat yang tepat untuk menjual sapi (Yasin, 1993).

Pertumbuhan bobot badan sapi ditentukan oleh berbagai faktor antara lain jenis sapi, jenis kelamin, umur, ransum yang diberikan, dan teknis pemeliharaannya (Riyanto & Purbowati, 2009). Selanjutnya Wello (2007) perubahan bentuk tubuh atau dalam hal penambahan berat badan sangat berguna


untuk seleksi pada pemuliaan ternak sebagai petunjuk dalam performan kondisi pada “*grazing*” atau *feedlot*, meskipun demikian yang penting bahwa makin mendekati dewasa tubuh pertambahan berat badan semakin rendah.

Pertumbuhan dipengaruhi oleh zat-zat makanan, genetik, jenis kelamin dan hormon (Davies,1982). Selanjutnya Tomaszeweska, (1991). Dalam Manurung, (2008) menyatakan laju pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh umur, lingkungan dan genetik dimana bobot badan awal fase penggemukan berhubungan dengan bobot badan dewasa. Pola pertumbuhan ternak tergantung pada sistem manajemen yang dipakai, tingkat nutrisi yang tersedia, kesehatan dan iklim. Pertumbuhan dapat dinyatakan dengan pengukuran kenaikan bobot badan, yaitu dengan penimbangan berulang-ulang dan dibuat dalam pertambahan bobot badan harian, mingguan atau per satuan waktu lain (Tillman, 1991).

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir hingga usia penyapihan dan pubertas, namun setelah usia pubertas hingga usia dewasa, laju pertumbuhan mulai menurun dan akan terus menurun hingga usia dewasa. Pada usia dewasa, pertumbuhan sapi berhenti. Sejak sapi dilahirkan sampai dengan usia pubertas (sekitar umur 12-15 bulan) merupakan fase hidup sapi yang laju pertumbuhannya sangat cepat (Siregar, 1990).

Padapertumbuhan terdapat dua fase, yaitu: *self accelerating phase*, dimana kecepatan tumbuh meningkat, dan *self inhibiting phase* dimana pertambahan bobot badan per unit waktu turun sampai pertambahan bobot badan tersebut menjadi nol dan dalam keadaan ini bobot badan dewasa telah tercapai. Titik antara kedua fase ini disebut titik balik (“*inflection point*”).

Kurva laju pertumbuhan kumulatif adalah kurva bobot badan versus waktu, bentuk kurva ini sigmoid. Kurva pertumbuhan kumulatif diperoleh dengan cara menimbang bobot hidup ternak sesering mungkin, selanjutnya dibuat kurva dengan aksisnya adalah umur dan ordinatnya adalah bobot hidup. Di bawah kondisi lingkungan yang terkendali, bobot ternak muda akan meningkat terus dengan laju pertambahan bobot badan yang tinggi sampai dicapainya pubertas. Setelah pubertas dicapai bobot badan meningkat terus dengan laju pertambahan bobot badan yang semakin menurun, dan akhirnya tidak terjadi peningkatan bobot badan setelah dicapai kedewasaan.



Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Sejak Lahir Sampai Ternak Mati

Keterangan:

Y=Bobot hidup, pertambahan bobot badan harian atau laju pertumbuhan (Kg)

X = Umur, tahun

M = Dewasa tubuh

C = Pembuahan

B = Kelahiran

P = Pubertas

D = Mati

1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bobot Badan Sapi Bali

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran tubuh yang meliputi perubahan bobot hidup, bentuk dan komposisi tubuh, termasuk perubahan komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan organ serta komponen-komponen kimia termasuk air, lemak, protein dan abu (Soeparno, 1998).

Suatu individu erat kaitannya dengan perkembangan dimana perkembangan adalah perubahan bentuk suatu komformasi tubuh, termasuk perubahan struktur tubuh, perubahan kemampuan dan komposisi, Jadi dalam pertumbuhan seekor ternak ada dua hal yang terjadi, yaitu (1) bobot badannya meningkat sampai mencapai bobot badan dewasa, yang disebut pertumbuhan dan, (2) terjadinya perubahan konformasi dan bentuk tubuh serta berbagai fungsi dan kesanggupannya untuk melakukan sesuatu menjadi wujud penuh yang disebut perkembangan (Purbowati, 2009).

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir hingga usia penyapihan dan puberitas namun, setelah usia puberitas hingga usia dewasa laju pertumbuhan berangsur menurun dan akan terus menurun (Tomaszeweska, 1933 dalam Manurung. 2008).

Menurut Bamualim dkk (2003) potensi pertumbuhan ternak ditentukan oleh genetik yang dinyatakan dalam hubungan hormonal didalam tubuh, hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan bobot dewasa yang dicapai.



Sumber : Gambar. Kurva Pertumbuhan Sapi (Manurung, 2008)

Gambar 2 menjelaskan bahwa kurva membentuk huruf S dimana menunjukkan pertumbuhan saat pembuahan berlangsung lambat, kemudian menjadi agak cepat pada saat menjelang kelahiran. Setelah kelahiran *pedet* pertumbuhan semakin cepat hingga usia penyapihan. Dari usia penyapihan hingga usia puberitas laju pertumbuhan masih bertahan pesat, namun dari usia setelah puberitas hingga dewasa laju pertumbuhan berangsur menurun dan akan terus menurun (Bambang, 2005).

Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa ternak yang masih muda membutuhkan lebih sedikit makanan dibandingkan yang lebih tua untuk setiap unit pertumbuhan bobot badannya. Salah satu faktornya antara lain penambahan bobot badan hewan muda sebagian disebabkan oleh pertumbuhan otot-otot, tulang-tulang dan organ-organ vital, sedangkan hewan yang lebih tua bobot badannya disebabkan karena perletakan (deposit) lemak. Lemak mengandung

sedikit air dan lebih banyak energi dibandingkan dengan unit jaringan tubuh lainnya (Parakkasi, 1999).

Jikatelah mencapai kedewasaan dan pertumbuhannya telah terhenti tetapi mereka mengalami perubahan maka perubahan tersebut karena penimbunan lemak bukan pertumbuhan murni lebih lanjut (Bambang, 2005).

Hormon androgen pada hewan jantan dapat merangsang pertumbuhan sehingga hewan jantan lebih besar dibandingkan dengan hewan betina. Perbedaan tingkat pertumbuhan dan bobot dewasa antara jantan dan betina memberi petunjuk bahwa hormon kelamin memegang peranan penting untuk merangsang pertumbuhan ternak ruminan (Kay dan Housseman, 1975).

Penggunaan estrogen-sintesis pada hewan kastrasi dapat meningkatkan pertumbuhan rata-rata sebanyak 15% dan efisiensi penggunaan makanan sebanyak 10% selama fase akhir dari program *finishing* (Parakkasi, 1999).

Peningkatan tingkat pertumbuhan sapi estrogen meningkatkan konsentrasi 2 hormon protein yaitu insulin dan hormon pertumbuhan. Estrogen menangkap hipotalamus/pituatary yang selanjutnya meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan, kelenjar pituatory bagian anterior, meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Selanjutnya hormon pertumbuhan meningkatkan rata-rata pertambahann bobot badan, efisiensi penggunaan makanan, penambahan protein dan kadar insulin dan glukosa dalam plasma tetapi menurunkan pertumbuhan jaringan lemak (Parakkasi, 1999).

2. Faktor Penghambat Pertumbuhan Bobot Badan Sapi Bali

Salah satu upaya untuk meningkatkan populasi adalah dengan cara pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak yang baik sangat mempengaruhi perkembangan biakan serta terjaminnya kesehatan ternak (Hernowo, 2006).

Peternak dalam memelihara ternaknya harus berdasarkan prinsip-prinsip pemeliharaan dan pembiakan hewan tropis yaitu pengawasan lingkungan, pengawasan status kesehatan, pengawasan pegawai, pengawasan makan dan air minum, pengawasan sistem pengelolaan dan pengawasan kualitas hewan ternak (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).

Sistem pemeliharaan sapi potong dikategorikan dalam tiga cara yaitu sistem pemeliharaan intensif yaitu ternak dikandangkan, sistem pemeliharaan semi intensif yaitu ternak dikandangkan pada malam hari dan dilepas di ladang penggembalan pada pagi hari dan sistem pemeliharaan ekstensif yaitu ternak dilepas di padang penggembalan (Hernowo, 2006).

Menurut Abidin (2002), kandang memiliki fungsi penting dalam suatu usaha sapi potong yaitu: (1) melindungi sapi potong dari gangguan cuaca, (2) tempat sapi beristirahat dengan nyaman, (3) mengontrol sapi agar tidak merusak tanaman di sekitar lokasi peternakan, (4) tempat pengumpulan kotoran sapi, (5) melindungi sapi dari hewan pengganggu, (6) memudahkan pemeliharaan, terutama dalam pemberian pakan, minum dan mempermudah pengawasan kesehatan.

Pembuatan kandang harus memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain: (1) luas kandang harus dibuat sesuai dengan jumlah sapi, (2) kandang terbuat dari

bahan-bahan berkualitas sehingga tahan lama, (3) kandang menghadap ke timur sehingga matahari pagi dapat masuk secara langsung, (4) sistem ventilasi kandang harus baik, (5) kandang dibangun dengan memperhatikan arah angin yang dominan dan bagian muka sapi tidak kontak langsung dengan angin yang bertiup.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2008). Kandang yang akan dibangun harus kuat, memenuhi syarat kesehatan, mudah dibersihkan, mempunyai drainase yang baik, sirkulasi udara yang bebas dan dilengkapi tempat makan dan minum sapi serta baik desain fektan (Abidin, 2002).

Usaha ternak sapi potong yang efisien dan ekonomis bisa menjadi kenyataan apabila tuntutan hidup mereka terpenuhi, salah satu tuntutan utama adalah pakan, dengan adanya pakan tubuh hewan akan mampu bertahan hidup dan kesehatan terjamin. Pemberian pakan kepada ternak sapi potong bertujuan untuk kebutuhan pokok hidup dan perawatan tubuh dan keperluan berproduksi (Sugeng dan Bambang S. Y, 2000).

Pemberian zat-zat pakan yang disajikan harus disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Tujuan pemberian pakan dibedakan menjadi dua yaitu makanan perawatan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan, serta makanan produksi untuk pertumbuhan dan penambahan berat (Bambang S. Y, 2000).

Pakan menurut Sarwono & Arianto (2003) adalah makanan yang diberikan kepada ternak untuk kebutuhan hidup dan berproduksi. Kebutuhan pakan sapi tropis berbeda dengan sapi subtropis. Sapi tropis yang beradaptasinya terhadap lingkungan cukup bagus membutuhkan pakan relatif lebih sedikit daripada sapi subtropis.

Pengelolaan pakan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pemeliharaan sapi. Ketersediaan padang penggembalaan pada pemeliharaan ternak sapi diperlukan sekali sebagai sumber pakan hijauan. Pemberian pakannya dapat dilakukan dengan pemotongan rumput tersebut, kemudian diberikan padaternak sapi yang ada di dalam kandang. Pemberian pakan seperti ini disebut cutand carry. Selain itu, rumput juga dapat dikonsumsi langsung oleh sapi diareal padang penggembalaan berdasarkan pada stocking rate (daya tampun) dan penggembalaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan penggembalaan setiap Unit Ternak (UT) (Santosa, 2005).

Ketersediaan pakan harus mencukupi kebutuhan ternak, baik yang berasal dari hijauan atau rumput, maupun pakan konsentrat yang dibuat sendiri atau berasal dari pabrik (Direktorat Jenderal Peternakan, 2000).

Pememilihan bahan pakan, ada beberapa pengetahuan penting berikut ini harus diketahui sebelumnya yaitu mudah diperoleh, tersedia sepanjang waktu, harga yang layak dan mempunyai fluktuasi harga yang tidak besar, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, bahan pakan harus dapat diganti dengan bahan pakan lain yang setara kandungan zatnya, tidak mengandung racun (Santosa, 2005).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 24 Juni sampai dengan 01 Juli 2017, di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian rancangan acak yang dikelompok (RAK) pola faktorial yang digunakan adalah metode percobaan yang menggunakan pola faktorial dengan 2 faktor yang umur dan jenis kelamin dengan ulangan yang sama terdiri dari

Faktor A - Umur

A1 = 1.5 Tahun

A2 = 2 Tahun

Faktor B – Jenis Kelamin

B1 = Jantan

B2 = Betina

C. Materi Penelitian

Bahan utama penelitian ini adalah sapi bali sebanyak 20 ekor yang terdiri dari 5 ekor jantan umur 2 tahun dan 5 ekor betina 2 tahun, 5 ekor jantan 1.5 tahun dan 5 ekor betina 1.5 tahun, bahan pendukung/airnya adalah kajian dan konsentrasi

D. Parameter Yang Diukur

Pertambahan bobot badan (PBB).

Pertambahan di reflesikan dengan pertambahan bobot hidup dengan ternak karena waktu tertentu. Penimbangan bobot hidup dilakukan tiap bulan. PBB dihitung dengan rumus:

$$PBB = \frac{\text{bobot badan hidup akhir (Kg)} - \text{bobot hidup awal (Kg)}}{\text{waktu pengamatan}}$$

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan RAK Faktorial 2x2 dengan ulangan yang sama. Apabila perlakuan berpengaruh nyata maka diuji lanjut dengan menggunakan uji BNT (Corsrer, 1991). Adapun model matematikanya adalah sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

$$i = 1, 2$$

$$j = 1, 2$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

Keterangan

Y_{ij} = hasil pengamatan dalam perlakuan $\alpha - k$ dan alasan α_{ij}

μ = rata - rata umur pengamatan

α_i = pengaruh umur taraf kei terhadap parameter yang diukur

β_j = Pengaruh Jenis Kelamin Taraf Kerja

$(\alpha\beta)_{ij}$ = Pengaruh Interaksi Dari Umur Dan Jenis Kelamin Ke j

ϵ_{ijk} = pengaruh taraf percobaan dari perlakuan ke i dan ulangan ke j



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Hasil penelitian terhadap rata-rata bobot badan (BB) Sapi Bali dengan umur dan jenis kelamin yang berbeda dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Rata-rata Bobot Badan (BB) Sapi Bali di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Selama Penelitian

<i>Umur</i>	<i>Jenis Kelamin (Rata-rata)</i>		<i>Jumlah Rata-rata</i>
	<i>Jantan</i>	<i>Betina</i>	
1.5 Tahun 10 Ekor	144	136,62	140,31
	185,5	172,62	179
	195,87	177,25	186,56
	129,75	129,5	129,62
	176,5	159,12	167,81
<i>Rata-rata</i>	<i>166,32</i>	<i>155</i>	<i>160,66</i>
2 Tahun 10 Ekor	136,5	138,62	137,56
	176	181,75	178,87
	183,75	183,25	183,5
	184,12	136,75	160,43
	131,25	171,75	151,5
<i>Rata-rata</i>	<i>162,32</i>	<i>162,42</i>	<i>162,37</i>
Jumlah Rata-rata	164,32	158,71	161,51 kg


Keterangan: Angka pada kolom pertama dengan rata-rata **164,32**, sedangkan angka pada kolom kedua dengan rata-rata **158,71**, maka angka yang berbeda kearah kolom menunjukkan perbedaan yang sangat nyata pada taraf signifikat 0,05%

Berdasarkan tabel diatas rata-rata bobot badan (BB) Sapi Bali dengan umur 1.5 tahun diantaranya jantan 144, 185,5, 195,87, 129,75, 176,5 dengan rata-rata 166,32 kg, dan betina 136,62, 172,62,177,25,129,5,159,12 dengan rata-rata 155 kg, dan jumlah total sapi jantan dan betina yang berumur 1,5 tahun mencapai jumlah rata-rata 160,66. Sedangkan rata-rata bobot badan sapi bali yang berumur 2 tahun diantaranya jantan 136,5,176,183,75,184,12,131,25, dengan rata-rata 162,32 dan betina 138,62,181,75, 183,25,136,75, 171,75 dengan rata-rata 162,42, dengan total keseluruhan sapi bali jantan dan betina yang berumur 2 tahun mencapai rata-rata 162,37. Kemudian selanjutnya dilakukan pembagian antara sapi jantan yang berumur 1,5 tahun dengan sapi jantan berumur 2 tahun, rata-rata 164, 32, dan sapi betina berumur 1,5 tahun dengan sapi betina berumur 2 tahun, rata-rata 158,71. Adapun jumlah kategori dari hasil penjumlahan sapi jantan dan betina yang berumur 1,5 tahun dan berumur 2 tahun dengan total keseluruhan rata-rata 161,51 kg.

B. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan (BB) Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan (BB) Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan proses terjadinya pengaruh jenis kelamin pada semua jenis hewan terkadang berlansung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun lingkungan. Dengan adanya faktor tersebut, pencapaian garis pada pengaruh jenis kelamin tidak selalu sesuai dengan usia kronologis hewan sebagian pada gambar 4.1

Adapun gambar Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan (BB) Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.1. Diagram Batang Interaksi Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Dari Gambar 4.1. Dapat dilihat bahwa pengaruh bobot badan sapi bali jantan berumur 1.5 tahun yang lebih tinggi dibandingkan bobot badan sapi Bali jantan yang berumur 2 tahun. Pertambahan bobot badan jantan 1.5 tahun lebih besar dari pada jantan berumur 2 tahun karena adanya perlakuan yang dilakukan oleh perternak.. Hal ini sesuai dengan pendapat Kay dan Housseman (1975) yang menyatakan bahwa hormon androgen pada hewan jantan dapat merangsang dan menstimulan pertumbuhan, pertumbuhan yang cepat pada saat pubertas sebagian disebabkan oleh pengaruh anabolik protein dari androgen sehingga hewan jantan dapat lebih besar dibandingkan dengan hewan betina (Purbowati, 2009).

C. Pengaruh Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali (BB) Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Pengaruh Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan (BB) Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan proses terjadinya pengaruh umur pada jenis kelamin pada semua jenis hewan terkadang berlangsung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun lingkungan. Dengan adanya faktor tersebut, pencapaian garis pada pengaruh umur dan jenis kelamin tidak selalu sesuai dengan usia kronologis hewan yaitu:

Adapun tabel pengamatan Pengaruh umur dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan (BB) Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Pengaruh Umur Terhadap Bobot Badan Sapi Bali Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Dari Gambar 4.2. Dapat dilihat bahwa pertambahan bobot badan sapi bali betina berumur 2 tahun yang lebih tinggi dibandingkan bobot badan sapi bali

betina yang berumur 1.5 tahun. Pertambahan bobot badan sapi bali betina yang berumur 2 tahun dibandingkan dengan yang berumur 1.5 tahun, karena adanya pengaruh pakan dan lingkungan setempat perlakuan yang dilakukan oleh perternak memberikan pakan terhadap sapi-sapinya. Hal ini dapat disebabkan karena pada usia 2 tahun (24 bulan) adalah usia puncak pertumbuhan dan setelah itu pertumbuhannya berangsur menurun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Gambar 2. Selain itu salah satu faktor perbedaan bobot badan dapat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi pakan dimana pemberian pakan secara *ad-libitum* akan meningkatkan konsumsi pakan dan akan mempengaruhi bobot badan. Parakkasi (1999) menjelaskan beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa ternak yang masih muda membutuhkan lebih sedikit makanan dibandingkan yang lebih tua untuk setiap unit pertumbuhan bobot badannya. Salah satu faktornya antara lain bobot badan hewan muda sebagian disebabkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umur sapi bali tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap bobot badan sapi bali yang ada di kecamatan donggo.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata ($P>0,05$), antara umur dengan penambahan bobot badan sapi bali yang berumur 1,5 tahun dan berumur 2 tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas sapi Bali khususnya yang ada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Z, 2002. *Kiat mengatasi Permasalahan Praktis Penggemukan Sapi Potong*: Agromedia Pustaka, Jakarta.
- _____. Z. 2002 *Penggemukan Sapi Potong*, media pustaka, Jakarta.
- Anonim^a. 2012. *Beternak Sapi Bali*. [http:// uripsantoso. wordpress. com/2010/01 /17/beternak-sapi-bali-3/](http://uripsantoso.wordpress.com/2010/01/17/beternak-sapi-bali-3/)(Diakses tanggal 10 Oktober 2015).
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. Kurva Pertumbuhan. [www. damandiri. or.id/file/ harap ini pbtinjpustaka. pdf](http://www.damandiri.or.id/file/harap_ini_pbtinjpustaka.pdf). Diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- Bambang S. Y. 2005. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Bamualim, A. dan R. B. Wirdahayati. 2012. *Nutrition and Management Strategiesto Improve Bali Cattle Productivity in Nusa Tenggara. Proc. of an ACIAR Workshop on Strategies to Improve Bali Cattle in Eastern Indonesia, Skripsi Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.*
- Cole, H.H. 1966. *Introduction to Livestock Production 2nd Edition*. W.H. Freeman and Company, San Francisco.
- Darmaja, S. G. N. D., 1980. *Setengah abad Peternakan Sapi Tradisional dalam Ekosistem Pertanian di Bali*. Thesis UNPAD.
- Davies HL. 1982. *Principle on Growth of Animal*. In H. L. Davies, Nutrition on Growth Manual. Canberra. AUIDP.
- Direktorat Jendral Peternakan. 2008 *Statistik Peternakan*. Jendral Peternakan, Jakarta.
- _____. Jendral Peternakan 2000. *Peluang Pencapaian dan kebijakan swasewbada Daging 2014* dalam seminar Ternak Peternakan Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Heath, E. dan S. Olusanya. 1988. *Anatomi and Physiology of Tropical Livestock*, Longmann Singapore Publishers PT. LTD. Singapore.
- Gaspersz, V. 1991. *Metode Rancangan Percobaan*. Armico Bandung.

- Hakim, L.dkk. 2010. “*Model Rekording Data Performans Sapi Potong Lokal di Indonesia*”. Ternak Tropika. Vol. 11 (2):-61-73.
- Hermanto. 1988. *Bagaimana cara penanganan sapi perah pada masa kering?* Swadaya Peternakan Indonesia, (42) 1988: 24-25.
- Hrernowo B. 2006. *Prosepek Pengembangan Usaha Pengembangan Sapi Potong di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi*. (Skripsi): Program studi Sosial Ekonomi Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Kadarsih, S. 2003. *Peranan Ukuran Tubuh terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Provinsi Bengkulu*. Jurnal penelitian UNIB, IX (1)
- Kay M. and R. Housseman. 1975. *The Influence of Sex on Meat Production*. In Meat. Edited by Cook DJ, Lawrrie RA. London. Butterworth.
- Manurung L. 2008. *Analisis Ekonomi Uji Rasum Berbasis Pelepah Daun Sawit, Lumpur Sawit dan Jerami Padi Fermentasi dengan Phanerochate Chysosporium pada Sapi Peranakan Ongole*. Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara Medan. – Skripsi.
- Muljana, W. 1996. *Pemeliharaan dan Ternak Kegunaan Sapi Perah*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Pradana, W.dkk, 2014. “*Hubungan Umur, Bobot dan Karkas Sapi Bali Betina yang Dipotong Di Rumah Potong Hewan Temesi*”. Indonesia Medicus Veterinus. Vol. 3 (1) : 37-42
- Parulian S. T. 2009. *Efek Pelepah Daun Sawit Limbah Industrinya sebagai Pakan terhadap Pertumbuhan Sapi Peranakan Ongole pada Fase Pertumbuhan*. Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara Medan.
- Parakkasi, A. 1999. *Ilmu Makanan dan Ternak Ruminansia*. UI Press, Jakarta.
- _____1999. *Ilmu Gizi dan makan ternak mogastrik*. Angkasa, Bandung.
- _____1999. *Ilmu Nutrisi Ternak Sapi*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purbowati, E. 2009. *Pertumbuhan dan Perkembangan Ternak Potong dan Kerja*. <http://id.scribd.com/.86474629/Pertumbuhan-Dan-an> Diakses tanggal 10 Oktober 2015.

- Putra, S. 1999. *Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan Mutu Pakan dan Suplementasi Seng Asetat*. Institut Pertanian Bogor.
- Rianton, E. dan Purbowati, E. 2009. *Sapi Potong Penebas* Swadaya Jakarta.
- Santoso U. 2005. *Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi*. Jakarta (ID) Penebar Swadaya.
- Sampurna, I., Putu I., dan Ketut Suatha. 2010. *Pertumbuhan Alometri Dimensi Panjang dan Lingkar Tubuh Sapi Bali Jantan*. Jurnal Veteriner Universitas Undayana. Vol. 11.No.1.
- Sarwono, W. Dan Arianto. (2003) *Manajemen Pemeliharaan Sapi Potong* Jakarta: Penebas Swadaya.
- Siregar, S. B. 1990. *Ransum Ternak Ruminansia*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Smith dan Mangkoewidjojo, 1988. *Pemeliharaan, Pembiakan dan penggunaan hewan percobaan dan daerah Tropis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soeparno. 1998. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan ke-2. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Taylor, J. R. 1996. *Marketing Research: an Applied Approach*. 5th Ed. McGraw-Hill, Inc.
- Tomaszewska, M.W. 1991. *Reproduksi, Tingkah Laku, dan Produksi Ternak di Indonesia*. Alih bahasa oleh Utama, I.K., I.G. Putu, dan T.D. Chaniago. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tillman, A.D, H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S. Lebosoekojo., 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tillman, D., H. Hartadi, S. Prawirokusumo, S. Reksohadiprodjo dan S. Lebosoekojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yudith Taringan A. 2010. *Pemamfaatan Pelepah Sawit dan Hasil Ikutan Industri Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Sapi Peranakan Simental Fase Pertumbuhan*. Departemen Pendidikan Fakultas Sumatra Utara.
- Wello, B. 2007. *Bahan Ajar Manajemen Ternak Potong dan Kerja*. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Williamson, G dan W.J.A Payne. 1993. *Pengantar Peternakan di Daerah Tropis*.
Alih Bahasa :Djiwa Darmadja. UGM_Press.Yogyakarta.

Yasin S, Dilaga SH. 1993. *Peternakan Sapi Bali dan Permasalahannya Bumi
Akasara*, Jakarta

Yulianto, P dan Saparinto, C. 2010. *Pembebasan Sapi Potong Secara Intensif
Penebar*, Jakartan.




L

A

M

P

I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

A

N

Lampiran 5 Gambar 1. Kandang Sapi Bali



Gambar 2. Pemberian Pakan Sapi Bali di Kecamatan Donggo



Gambar 3. Proses Penimbangan Sa pi Bali di Kecamatan Donggo



Gambar 4. Peneliti melakukan Wawancara pada Responden di Kecamatan Donggo



Lampiran 1. Hasil Analisis Ragam Anova Pengaruh Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan Sapi Bali

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
jantan_2th	Between Groups	85.937	3	28.646	.042	.988
	Within Groups	11017.700	16	688.606		
	Total	11103.638	19			
jantan_1.5th	Between Groups	543.738	3	181.246	.212	.887
	Within Groups	13674.400	16	854.650		
	Total	14218.138	19			
Betina_2th	Between Groups	118.638	3	39.546	.075	.972
	Within Groups	8397.600	16	524.850		
	Total	8516.238	19			
Betina_1.5th	Between Groups	84.337	3	28.112	.062	.979
	Within Groups	7244.900	16	452.806		
	Total	7329.237	19			

jantan_2th

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05
		1
1	5	159.4000
2	5	161.6000
3	5	163.3000
4	5	165.0000
Sig.		.761

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

jantan_1.5th

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05
		1
2	5	155.5000
1	5	163.4000
3	5	167.5000
4	5	168.9000
Sig.		.515

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Betina_2th

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05
		1
1	5	158.1000
3	5	163.0000
2	5	163.4000
4	5	164.4000
Sig.		.695

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Betina_1.5th

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05
		1
1	5	152.1000
2	5	154.4000
3	5	155.9000
4	5	157.7000
Sig.		.707

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa O.o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 05 November 1993, merupakan anak lima dari tujuh bersaudara dari pasangan H. Abakar dengan Timalah. Penulis memulai belajar pada tahun 2001-2006 di SDN Impres Kala.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Donggo dan pada tahun 2010-2012 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Donggo. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi swasta SPMB, dan diterima di Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R