

**HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DENGAN ANGKA
KEJADIAN BBLR DI RSUD SYEKH YUSUF
TAHUN 2015**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat meraih Ahli MadyaKebidanan Jurusan
kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

OLEH :

ST.RAHMAH
70400112076

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, April 2016

Penyusun

ST. RAHMAH
NIM : 70400112076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : St. Rahmah
Nim : 70400112076
Judul : Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR
dengan Angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes

Nip : 19851030 200912 1 002

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR dengan Angka Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015", yang disusun oleh **St. Rahmah**, Nim: 70400112076, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 15 April 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 April 2016 M
7 Rajab 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: dr Raully Rahmadani, M.Kes	(.....)
Pembimbing	: dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
M A K A S S A R

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta isinya, semoga rahmat, hidayah, tercurahkan bagi kita semua sehingga segala aktivitas bernilai ibadah disisi Allah SWT. Kepada baginda Rasulullah SAW. Kita hanturkan salam dan taslim semoga tercurahkan yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi kita semua terutama penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Hubungan faktor-Faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan Angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015”**. Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pabbeta dan ibunda Aisyah yang sangat luar biasa membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan baik, mampu menampung segala keluhan, dan juga kepada saudara/saudariku, dan begitu pula kepada pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, doa, dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun, semoga keikhlasannya dibalas oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Mussafir Babbari, M.Si, selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya. Yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin menjadi kampus yang berperadaban.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.sc, selaku dekan fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh Staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama masa masa pendidikan.
3. Ibu Hj. Sitti Saleha, S. Si.T, SKM. M. Keb, selaku ketua prodi kebidanan yang telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu.
4. Bapak dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes. selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
5. Ibu dr. Hj. Syatirah, Sp.A, M.Kes, selaku penguji I yang telah banyak memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
6. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

8. Ibu Dra. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS, kepala RSUD Syekh Yusuf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh staf RSUD Syekh Yusuf yang telah meluangkan waktunya.
9. Kepada para sahabat Asrah, Inha, Ceceng, Ani Ardhar, Jumra, Dian yang setia mendampingi saya dalam keadaan apapun dan memberi semangat kepada saya selama ini.
10. Kepada seluruh teman-teman Prodi Kebidanan Angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan saran yang membangun dalam terselesainya karya tulis ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah



SWT. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin.

Makassar, April 2016


Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Bagi Institusi.....	7
2. Bagi Peneliti.....	8
3. Bagi Tempat Peneliti.....	8
4. Bagi Masyarakat.....	8
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).....	9
1. Pengertian BBLR.....	9
2. Faktor Risiko BBLR.....	10
3. Klasifikasi BBLR.....	14
4. Patofisiologi BBLR.....	17
5. Masalah Jangka Pendek Yang Terjadi Pada BBLR.....	18

6. Masalah Jangka Panjang Pada BBLR.....	29
7. Makanan Bayi BBLR.....	31
8. Penatalaksanaan Pada Bayi BBLR.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kejadian Bayi berat Lahir Rendah((BBLR).....	38
C. Kerangka Konsep	
1. Kerangka Konsep.....	42
2. Defenisi operasional.....	43
3. Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Jenis Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Metode Pengambilan Data.....	48
E. Pengolahan Data.....	48
F. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Distribusi frekuensi kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.....	47
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan umur ibu di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.....	47
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan paritas di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.....	48
Tabel 4.4	Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan jarak kehamilan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.....	48
Tabel 4.5	Hubungan umur dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.....	49
Tabel 4.6	Hubungan paritas dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.....	49



.....
49Tabel 4.7

.....
Hubungan jarak kehamilan dengan angka kejadian BBLR di
RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.....
55.....

ABSTRAK

Nama : St. Rahmah

Nim : 70400112076

Judul : Hubungan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) dengan Angka Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2.500 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015. Penelitian ini menggunakan *survey analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 sebanyak 2125 ibu yang melahirkan dengan besar sampel 95 ibu yang melahirkan yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Dari statistik uji Chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu (p 0,973) , paritas (p 0,961) dan jarak kehamilan (p 0,383) dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.

Kata kunci : BBLR, Umur, paritas, Jarak kehamilan

ABSTRACT

Name : St. Rahmah

Nim : 70400112076

Title : Relationship Factors that Influence the Incident of Low Birth Weight (LBW) with the Incident of Low Birth Weight at the Syekh Yusuf Regional Hospital in 2015

Low Birth Weight (LBW) is newborn weighting less than 2500 gram. This study aims to relationship factors that influence the incident of low birth weight with the incident of low birth weight at the Syekh Yusuf Regional Hospital in 2015 . This study uses the *Analytical survey* with approach *cross sectional*. The study population was all mother who gave birth in public RSUD at the Syekh Yusuf Regional Hospital in 2014 were 2125 mother gave birth with a large sample of 95 studies of maternal taken by *purposive sampling*. Data analysis was performed univariate and bivariate. From *chi-square* test statistic showed no correlation between maternal age ($P 0,973$), parity ($P 0,961$), distance pregnancy ($P 0,383$) with incident Low Birth Weight (LBW) at the Syekh Yusuf Regional Hospital in 2015.

Keywords : Low Birth Weight Babies (LBW), Age, parity, Distance Pregnancy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. Paling sedikit 17 juta bayi BBLR setiap tahunnya. Masalah BBLR merupakan masalah utama di Negara berkembang termasuk Indonesia. BBLR merupakan penyebab terjadinya peningkatan angka mortalitas (kematian) dan morbiditas (kesakitan) pada bayi (Yulifah,dkk, 2011).

Pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental sejak awal kehidupan dimasa bayi sangat penting dalam tahap tumbuh kembangnya hingga mencapai tahap tumbuh kembangnya. Secara internasional, BBLR masih dipandang sebagai masalah kesehatan yang cukup menonjol karena mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk mengalami kematian pada masa neonatal sebesar 40 kali di dibandingkan dengan bayi lahir dengan berat normal (Mecorwick, 2007) (Rahmawati, 2010).

Anak merupakan Anugerah yang diberikan oleh Allah, meskipun di lahirkan dalam keadaan yang beratnya kurang dari normalnya. Karena Allah menciptakan manusia tersebut dalam bentuk yang sebaik-baiknya meskipun

ada kekurangan. Sebagaimana dalam Q.S Al Mu'minun /12 :16 Allah berfirman tentang penciptaan manusia :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. (QS.Al-Mu'minun:12-16).

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa Allah telah menyuruh manusia jika masih ragu dengan hari kebangkitan maka kita disuruh menerangkan asal-usul manusia. Asal kita adalah dari tanah mulai dari Nabi Adam diciptakan sampai generasi terakhir. Kemudian dari setetes air mani dan berangsur-angsur dalam pertumbuhan 40 hari dan menjadi segumpal daging. Setelah sampai sekitar 120 hari, akan ditiupkan roh dan sudah jelaslah bentuknya supaya jelas bagi kamu bagaimana proses kejadian itu. Lalu Allah menetapkannya dalam Rahim sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada janji yang di tentukan

sekitar 9 bula 10 hari, Allah mengeluarkan kamu dari Rahim sebagai bayi yang belum tahu apa-apa. Dan diantara kita ada yang diwafatkan di waktu muda dan ada pula yang diketahuinya dulu (Amirullah, 2001).

Bayi BBLR siap atau tidak siap harus menghadapi gejolak adaptasi dari kehidupan intra-uterine kehidupan ekstra-uterin. Banyak masalah yang terjadi pada proses adaptasi, hal ini disebabkan oleh immaturitas sistem organ anatomi maupun fisiologik. Mengingat banyaknya masalah yang terjadi pada bayi BBLR oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang lebih spesifik berkaitan dengan BBLR bagi petugas kesehatan, terutama bidan dan perawat (Maryunani, 2013).

Berdasarkan data dari *The Fifty Sixth Session of Regional Committee World Health Organization (WHO) for South-East Asia*, padatahun 2003, kematian bayi terjadi pada usia neonatus dengan penyebab infeksi 33%, asfiksia/ trauma 28 %, bayi berat lahir rendah 24%, kelainan bawaan 10%, dan lain-lain 5%. Resiko kematian bayi berat lahir rendah 4 kali lebih besar dibandingkan bayi lahir dengan berat badan lebih dari 2.500 gram (Yulifah, 2011).

Angka kejadian BBLR di setiap Negara maju berbeda, misalnya di Eropa berkisar antara 5-11%, Amerika Serikat berkisar antara 11,9% dan di Australia kejadiannya berkisar antara 7% (Krisnadi, 2009).

Sampai saat ini BBLR masih merupakan masalah kesehatan terkait dengan morbiditas dan mortalitas perinatal, insiden BBLR di Dunia adalah 15%, di mana 80% terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Selain morbiditas perinatal,

BBLR merupakan salah satu penyumbang terbesar angka kematian bayi (AKB), Menurut survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003, 57 % AKB terjadi pada umur dibawah satu bulan yang disebabkan oleh gangguan perinatal dan BBLR dimana 30,3% AKB di sebabkan oleh BBLR dan prematuritas (Ketut, dkk, 2013).

Prevalensi BBLR diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran di dunia dengan batasan 3,3% - 38% dan lebih sering terjadi di Negara-negara berkembang atau sosial – ekonomi rendah. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian bayi berat lahir rendah didapatkan di Negara berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi di banding pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2.500 gram. BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan mortalitas , morbiditas dan disabilitas neonates, bayi dan anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya dimasa depan.

Menurut *The World Health Report*, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan angka kematian bayi tertinggi yaitu berkisar 20 per 1000 kelahiran hidup yang berarti setiap hari ada 246 bayi meninggal dan setiap tahun ada 89.770 bayi baru lahir meninggal. Di dibandingkan dengan Negara tetangga, Philipina hanya 18 per 1000, Srilanka 11 per 1000, dan Singapura 1 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian perinatal adalah prematuritas dan bayi berat lahir rendah 29%, asfiksia 27%, tetanus neonatorum 10% dan masalah pemberian ASI 10%. Kelangsungan hidup bayi baru lahir sangat ditentukan oleh kondisinya pada saat dalam kandungan, saat

proses persalinan dan periode kritis pada dimasa awal kehidupannya. Oleh karena itu diharapkan angka kematian bayi baru lahir dapat ditekan sampai 15 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 (<http://www.WordPress.com>, diakses tanggal 08 Juni 2010).

Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9% - 30%, hasil studi di 7 daerah multi center diperoleh angka berat badan lahir rendah dengan rentang 2,1% - 17,2 %. Secara nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, BBLR yang ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat 2010 yakni maksimal 7% (Pantiawati, 2010).

Di Sulawesi selatan berdasarkan profil kesehatan tahun 2008, angka kematian bayi mencapai 4,39 per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab terbanyak karena pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran premature dan BBLR (Rahmawati, dkk. 2010).

Data yang diperoleh berdasarkan pemantauan awal kejadian kelahiran BBLR di RSUD Syekh Yusuf yaitu pada tahun 2012 angka kejadian BBLR jumlahnya 121 orang dari 2200 bayi yang dilahirkan, pada tahun 2013 jumlahnya 150 orang dari 2019 bayi yang dilahirkan, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya 182 orang dari 2121 bayi yang dilahirkan. Disini dapat kita lihat peningkatan angka kejadian BBLR yang sangat signifikan setiap tahunnya.

Usaha menurunkan insiden BBLR terus dilakukan melalui pengawasan antenatal (PAN), kelas ibu hamil, penanganan partus prematuritas iminen dan

berbagai kondisi medis yang berkaitan dengan risiko BBLR. Akan tetapi mengetahui faktor risiko merupakan upaya utama terkait dengan dengan prevensi primer (Ketut, dkk, 2013).

Penyebab utama tingginya angka kematian bayi adalah BBLR. Faktor yang mempengaruhi BBLR yaitu umur ibu, paritas dan jarak kelahiran. Kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 20 tahun atau diatas 35 tahun memiliki kecenderungan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang adekuat untuk pertumbuhan janin yang akan berdampak terhadap bayi berat lahir rendah. Umur ibu kurang dari 20 tahun pada saat hamil beresiko terjadinya BBLR 1,5-2 kali lebih besar di bandingkan ibu hamil yang berumur 20-35 tahun. Persalinan lebih dari tiga kali beresiko terjadinya komplikasi seperti perdarahan dan infeksi sehingga ada kecenderungan bayi lahir dengan kondisi BBLR. Jarak kehamilan yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya, sehingga beresiko terganggunya system reproduksi yang akan berpengaruh terhadap berat badan lahir (Trihardiani, dkk, 2011).

Alasan mengambil penelitian di RSUD Syekh yusuf karena seperti yang kita lihat jumlahnya setiap tahun sangat mengalami peningkatan yang sangat signifikan, berarti mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan BBLR. Asumsi yang paling penting berarti bahwa mengkaji beberapa factor yang mempengaruhi kelahiran BBLR akan menjadi informasi penting untuk menjadi dasar bagi semua pihak dalam memecahkan berbagai permasalahan BBLR

tersebut, karena itulah menjadi permasalahan yang paling mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang “hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015 “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas maka di rumuskan masalah :

”Bagaimana hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan umur ibu dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf
- b. Untuk mengetahui hubungan paritas dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf
- c. Untuk mengetahui hubungan jarak kehamilan dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Sebagai sumber bacaan dan referensi bagi perpustakaan di instansi pendidikan mengenai BBLR.

2. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu (teori) yang selama ini di peroleh di bangku kuliah dan untuk menambah wawasan mengenai BBLR.

3. Bagi tempat peneliti

Agar dapat menjadi masukan dan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam bidang KIA, sehingga kejadian BBLR dapat diantisipasi sedini mungkin.

4. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi dan bacaan bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan kejadian BBLR.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

1. Pengertian BBLR

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Dahulu bayi baru lahir yang berat badan lahir kurang atau sama dengan 2500 gram disebut prematur. Untuk mendapat keseragaman pada kongres *European Perinatal Medicine*¹¹ di London, telah disusun definisi sebagai berikut :

- a. *Preterm infant* (prematur) atau bayi kurang bulan :bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu (259) hari.
- b. *Term infant* atau bayi cukup bulan: bayi dengan masa kehamilan mulai 37 minggu sampai dengan 42 minggu (259-293) hari.
- c. *Post term* atau bayi lebih bulan: bayi dengan masa kehamilan mulai 42 minggu atau lebih (249 hari atau lebih).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa semua bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau sama dengan 2.500 gram disebut low birth weight infant (bayi berat lahir rendah/ BBLR), karena morbiditas dan mortalitas neonatus tidak hanya bergantung pada berat badannya tetapi juga pada tingkat kematangan (maturitas) bayi tersebut (Pantiawati, 2010).

Berkaitan dengan penanganan dan harapan hidupnya, BBLR dibedakan dalam :

1. Bayi berat lahir rendah (BBLR), berat lahir 1500-2500 gram
 2. Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR), berat lahir <1500 gram
 3. Bayi berat lahir ekstrem rendah (BBLER), berat lahir <1000 gram
- (Karwati, 2011).

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna diantara ciptaan Allah SWT. yang lain. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus selalu mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

Pada ayat ini pula dijelaskan dalam Q.S Al Infithar / 82:7-8

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu (QS Al Infithar 7-8).

Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta serta keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi (M. Quraish Shihab, 2002).

2. Faktor Risiko BBLR

Mengenai faktor risiko/ penyebab BBLR pada bagian ini diuraikan beberapa kelompok penyebab BBLR sebagai berikut :

a. Faktor ibu

1. Penyakit

- a. Toksemia gravidarum (keracunan kehamilan) ialah segala penyakit kehamilan dengan tanda-tanda hipertensi, edema dan proteinurin sampai pada tahap terparah yaitu kejang yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Dan merupakan penyebab kematian terbesar pada ibu hamil (Arief, dkk, 2009).

b. Perdarahan antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam semasa kehamilan dimana umur kehamilan telah melebihi 28 minggu atau berat janin lebih dari 1000 gram (Manuaba, 2010). Sedangkan menurut Winjosastro (2007), perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam yang timbul pada masa kehamilan kedua kira-kira 3% dari semua kehamilan. Jadi dapat disimpulkan perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada akhir usia kehamilan.

c. Trauma fisik dan psikologis

Trauma adalah cedera fisik atau emosional. secara medis, "trauma" memiliki makna yang berbeda dan mengacu pada pengalaman

emosional yang menyakitkan, menyedihkan, atau mengejutkan, yang sering menghasilkan efek mental dan fisik berkelanjutan.

d. Nefritis akut

Nefritis adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman umumnya bakteri streptococcus. Akibat nefritis ini seseorang akan menderita uremia atau edema. Sedangkan nefritis kronis yang diderita oleh orang tua ditandai dengan tekanan darah tinggi dan pengerasan pembuluh darah ginjal.

e. Diabetes mellitus

Diabetes mellitus adalah kelainan metabolik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin.

2. Usia ibu

a. Usia <16 tahun

Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya (Ubaydillah, 2000).

b. Usia > 35 tahun

Kesulitan untuk hamil adalah hambatan terbesar bagi perempuan berusia 35 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan oleh menurunnya

kualitas sel telur perlahan ketika seorang perempuan memasuki usia 30 tahun, dan diikuti dengan jarang terjadi pembuahan meskipun siklus menstruasi.

c. Multigravida yang jarak kelahirannya terlalu dekat

3. Keadaan sosial

a. Golongan social ekonomi rendah

b. Perkawinan yang tidak sah

4. Sebab lain

a. Ibu yang perokok

Kebiasaan merokok yang tidak dapat dihentikan dan ekstrim telah banyak memakan korban baik perokok aktif maupun perokok aktif maupun perokok pasif. Kebiasaan ini akan lebih berakibat buruk bila terjadi pada ibu yang sedang menyusui karena akan mengganggu kesehatan ibu dan anak.

b. Ibu peminum alkohol

Hasil penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan kecacatan pada bayi. Meski begitu, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan apakah mengonsumsi sedikit minuman keras juga berdampak sama pada janin.

c. Ibu pecandu narkotik

Kehamilan merupakan satu proses luar biasa, dimana ibu bertanggung jawab untuk melindungi si calon bayi dari segala bentuk ancaman seperti

narkotik. Penyebab banyaknya pemakai tersebut antara lain kurangnya pengetahuan calon ibu akan dampak pemakaian narkoba tersebut yang juga berakibat fatal terhadap janin serta kemudahan untuk mendapatkannya (Arif, dkk, 2009).

b. Faktor janin

1. Hidramnion

Hidramnion adalah suatu kondisi dimana terdapat keadaan dimana jumlah air ketuban melebihi dari batas normal.

2. kehamilan ganda

kehamilan ganda merupakan dimana terdapat dua atau lebih embrio atau janin sekaligus, kehamilan ganda terjadi apabila dua atau lebih ovum dilepaskan dan dibuahi atau bila satu ovum yang dibuahi membelah secara dini hingga membentuk dua embrio yang sama pada stadium massa sel dalam atau lebih awal (Taufan, 2012).

3. Kelainan kromosom

Kelainan kromosom adalah untaian material genetik yang terdapat didalam setiap sel makhluk hidup.

c. Faktor lingkungan

Yang dapat berpengaruh antara lain tempat tinggal didaratan tinggi, radiasi, sosio-ekonomi dan paparan zat- zat racun (Arief, dkk,2009).

3. Klasifikasi BBLR

Berdasarkan defenisi tersebut di atas, bayi berat lahir rendah (BBLR) dapat di kelompokkan menjadi prematuritas dan dismaturitas.

a) Prematur murni

1. Pengertian prematur murni

Adalah bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan atau disebut neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan.

Menurut WHO, bayi prematur adalah bayi lahir hidup sebelum usia kehamilan minggu ke 37 (di hitung dari hari pertama haid terakhir). Bayi prematur atau bayi preterm adalah bayi yang berumur kehamilan 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan. Sebagian besar bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram adalah bayi prematur (Pantiawati, 2010).

2. Tanda bayi prematuritas murni

- a. Berat badan kurang dari 2.500 gram, PB 45 cm, lingkaran kepala kurang dari 33 cm, lingkaran dada kurang dari 30 cm.
- b. Masa gestasi kurang dari 37 minggu
- c. Kulit tipis dan transparan, tampak mengkilat dan licin
- d. Kepala lebih besar dari badan
- e. Lanugo banyak terutama pada dahi, pelipis, telinga dan lengan.
- f. Ubun-ubun dan sutura lebar

- g. Rambut tipis, halus
- h. Tulang rawan dan daun telinga immatur
- i. Puting susu belum terbentuk dengan baik
- j. Pembuluh darah kulit banyak terlihat, peristaltic usus dapat terlihat.
- k. Genitalia belum sempurna, labia minora belum tertutup oleh labia mayora (pada wanita), testis belum turun (pada laki-laki)
- l. Bayi masih posisi fetal
- m. Pergerakan kurang dan lemah
- n. Otot masih hipotonik
- o. Banyak tidur, tangis lemah, pernafasan belum teratur dan sering mengalami serangan apnoe
- p. Refleks tonic neck lemah
- q. Refleks menghisap dan menelan belum sempurna (Arief, dkk, 2009).

b) Dismaturitas **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

1. Pengertian dismaturitas

Adalah bayi dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk usia kehamilannya, yaitu berat badan dibawah persentil 10 pada kurva pertumbuhan intra uterin, biasa disebut dengan bayi kecil untuk masa kehamilan (pantiawati, 2010). Berdasarkan umur kehamilan atau masa gestasi yang ditetapkan, maka bayi BBLR digolongkan dalam tiga kelompok :

- a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) yaitu berat lahir 1500-2500 gram.

- b. Bayi berat lahir sangat rendah yaitu bayi berat lahir <1500 gram
- c. Bayi berat sangat rendah yaitu bayi yang berat lahirnya <1000 gram (Saifuddin, 2009).

2. Tanda dan gejala bayi dismaturitas

- a. Kulit pucat, meconium kering keriput, tipis
- b. Vernix aseosa tipis/ tidak ada
- c. Jaringan lemak di bawah kulit tipis
- d. Bayi tampak gesit, aktif dan kuat
- e. Tali pusat berwarna kuning kehijauan (Arief, dkk, 2009).

4. Patofisiologi BBLR

Temperatur dalam kandungan 37°C sehingga bayi lahir dalam ruangan suhu temperatur ruangan $28-32^{\circ}\text{C}$. Perubahan temperatur ini perlu diperhitungkan pada BBLR karena belum bisa mempertahankan suhu normal yang disebabkan :

- a. Tipis pusat pengaturan suhu badan masih dalam perkembangan
- b. Intake cairan dan kalori kurang dari kebutuhan
- c. Cadangan energi sangat kurang
- d. Luas permukaan tubuh relatif luas sehingga risiko kehilangan panas lebih besar
- e. Jaringan lemak subkutan lebih tipis sehingga kehilangan panas lebih besar
- f. BBLR sering terjadi penurunan berat badan di sebabkan: malas minum dan pencernaan masih lemah

g. BBLR rentan infeksi sehingga terjadi sindrom gawat nafas, hipotermi, hipoglikemia, hipokalsemia, dan hiperbilirubin (Sudarti, 2013).

5. Masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR

Pada bayi BBLR banyak sekali risiko terjadi permasalahan pada sistem tubuh, oleh karena kondisi tubuh yang tidak stabil. Kematian perinatal pada bayi BBLR adalah 8 kali lebih besar dari bayi normal. Prognosis akan lebih buruk bila berat badan semakin rendah, kematian sering disebabkan karena komplikasi neonatal seperti asfiksia, aspirasi, pneumonia, perdarahan intra kranial, hipoglikemia. Bila hidup akan dijumpai kerusakan saraf, gangguan bicara, tingkat kecerdasan rendah. Prognosis ini juga tergantung dari keadaan sosial ekonomi, pendidikan orang tua dan perawatan pada saat hamil, persalinan dan postnatal. Pengaturan suhu lingkungan, resusitasi, makanan, pencegahan infeksi, mengatasi pernapasan, asfiksia, hiperbilirubinemia, hipoglikemia, dan lain-lain.

Di bawah ini adalah risiko permasalahan yang sering terjadi pada bayi BBBLR dan memerlukan perawatan khusus. Pada bayi prematur dengan BBLR, ada beberapa risiko permasalahan yang mungkin timbul :

a. Gangguan metabolik

1. Hipotermia

Terjadi karena hanya sedikitnya lemak tubuh dan sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang. Adapun ciri-ciri bayi BBLR yang mengalami hipotermia adalah sebagai berikut :

- a. Suhu tubuh $< 32^{\circ} \text{C}$
- b. Mengantuk dan sukar dibangunkan
- c. Menangis sangat lemah
- d. Seluruh tubuh dingin
- e. Pernafasan lambat
- f. Pernafasan tidak teratur
- g. Bunyi jantung lambat
- h. Mengeras kaku (sklerema)
- i. Tidak mau menetek, sehingga berisiko dehidrasi.

2. Hipoglikemia

Gula darah berfungsi sebagai makanan otak dan membawa oksigen ke otak. Jika asupan glukosa ini kurang, akibatnya sel-sel syaraf di otak mati dan mempengaruhi kecerdasan bayi kelak. BBLR membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir dan minum sangat sering (setiap 2 jam) pada minggu pertama.

3. Hiperglikemia

Hiperglikemia sering merupakan masalah pada bayi yang sangat amat prematur yang mendapat cairan glukosa berlebihan secara intravena tetapi mungkin juga terjadi pada bayi BBLR lainnya.

4. Masalah pemberian ASI

Masalah pemberian ASI pada BBLR terjadi karena ukuran tubuh bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil dan tidak dapat mengisap. Bayi dengan BBLR sering mendapatkan ASI dengan bantuan, membutuhkan pemberian ASI dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi sering. Bayi BBLR dengan kehamilan kurang dari 35 minggu dan berat lahir kurang dari 2000 gram umumnya bisa langsung menetek.

b. Gangguan imunitas

1. Gangguan imunologik

Daya tahan tubuh terhadap infeksi berkurang karena rendahnya kadar Ig G, maupun gamma globulin. Bayi prematur relative belum sanggup membentuk antibodi dan daya fagositosis serta reaksi terhadap infeksi belum baik. Karena sistem kekebalan tubuh bayi BBLR belum matang. Bayi juga dapat terkena infeksi saat di jalan lahir atau tertular infeksi ibu melalui plasenta. Keluarga dan tenaga kesehatan yang merawat bayi BBLR harus melakukan tindakan pencegahan infeksi antara lain dengan mencuci tangan dengan baik.

2. Kejang saat dilahirkan

Biasanya bayi akan dipantau 1 kali 24 jam untuk dicari penyebabnya. Misal apakah karena infeksi sebelum lahir (prenatal), perdarahan intrakrania, atau karena vitamin B6 yang dikonsumsi ibu. Selain itu bayi akan dijaga jalan nafasnya agar tetap dalam kondisi bebas.

3. Ikterus (kadar bilirubin yang tinggi)

Ikterus adalah menjadi kuningnya warna kulit, selaput lender dan berbagai jaringan oleh zat warna empedu. Ikterus neonatal adalah suatu gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir. Bayi BBLR menjadi kuning lebih awal dan lebih lama daripada bayi yang cukup berat badannya.

c. Gangguan pernapasan

1. Sindroma gangguan pernapasan

Sindroma gangguan pernapasan pada bayi BBLR adalah perkembangan imatur pada sistem pernapasan atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan pada paru-paru. Secara garis besar, penyebab sesak napas pada neonatus dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: kelainan medik HMD, sindroma aspirasi meconium, pneumonia atau kasus bedah choana atresia, fistula trachea oesophagus, empiema lobaris kongenital. Gangguan napas yang sering terjadi pada bayi BBLR kurang bulan (masa gestasi yang pendek) adalah penyakit membrane hialin, dimana angka kematian ini menurun dengan meningkatnya umur

kehamilan. Membrane hialin ini jarang terjadi pada bayi besar yang lahir pada waktunya kecuali bayi yang lahir dengan bedah sesar dan bayi dari ibu penderita diabetes mellitus. Sedangkan gangguan napas yang sering terjadi pada bayi BBLR dapat mengalami gangguan pernapasan oleh karena bayi menelan air ketuban sehingga masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengganggu pernapasannya. Ini tidak hanya dialami bayi BBLR saja tetapi juga bayi cukup bulan. Khusus bayi prematur umumnya gangguan pernapasannya berkaitan dengan organ paru-paru yang belum matang. Bayi BBLR yang mengalami gangguan nafas harus segera dirujuk ke fasilitas rujukan yang lebih tinggi.

2. Asfiksia

Bayi BBLR bisa kurang, cukup atau lebih bulan, semuanya berdampak pada proses adaptasi pernapasan waktu lahir sehingga mengalami asfiksia lahir. Bayi BBLR membutuhkan kecepatan dan keterampilan resusitasi.

3. *Apneu periodic* (henti napas)

Kerap terjadi pada bayi BBLR karena prematuritas. Organ paru-paru dan susunan saraf pusat yang belum sempurna mengakibatkan kadang-kadang bayi berhenti bernapas. Hal ini tentu memerlukan pemantauan dengan seksama.

4. Paru belum berkembang

Sehingga menyebabkan bayi seak napas (asfiksia). Pada bayi BBLR baik kurang, cukup atau lebih bulan, semuanya berdampak pada proses adaptasi pernapasan waktu lahir sehingga mengalami asfiksia lahir. Bayi BBLR membutuhkan kecepatan dan keterampilan resusitasi.

5. *Retinopathy of prematurity (ROP)*

Penyakit ini ditemukan pada bayi prematur dimana disebabkan oleh gangguan oksigen yang berlebihan. Pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi maka akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah retina. kemudian setelah bayi bernapas dengan udara biasa lagi, pembuluh darah ini akan mengalami vasodilatasi yang selanjutnya akan diikuti dengan proliferasi kapiler-kapiler baru secara tidak teratur. Namun keadaan kelainan ini biasanya terjadi secara beraturan. Kelainan ini biasanya terlihat pada bayi yang berat badannya kurang dari 2 kg dan telah mendapat oksigen dengan konsentrasi tinggi (lebih dari 40 %). Stadium akut ini dapat terlihat pada umur 3-6 minggu dalam bentuk dilatasi arteri dan vena retina. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan kapiler baru secara tidak teratur pada ujung vena. Kumpulan pembuluh darah baru ini tampak sebagai perdarahan. Akhirnya sebagai kapiler bari ini tumbuh ke arah korpus vitreum dan lensa. Selanjutnya akan terjadi edema pada retina dan retina dapat terlepas dari dasarnya dan keadaan ini merupakan keadaan yang ireversibel. Pada stadium akhir akan terdapat masa retrolental yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaan ini

dapat terjadi bilateral dengan mikroftalmus, kamar depan yang menyempit, pupil mengecil dan tidak teratur serta visus menghilang. Selain itu dapat pula disertai retardasi mental dan cerebral palsy. Pengobatan pada stadium ini dapat dicoba dengan memberikan ACTH.

d. Gangguan sistem peredaran darah

1. Masalah perdarahan

Perdarahan pada neonatus mungkin dapat disebabkan karena kekurangan faktor pembekuan darah dan faktor fungsi pembekuan darah abnormal atau menurun. Sebagai tindakan pencegahan terhadap perdarahan otak dan saluran cerna pada bayi BBLR, dapat diberikan injeksi vitamin K. Vitamin K ini penting untuk mempertahankan mekanisme pembekuan darah normal. Pada bayi baru lahir, karena ususnya masih steril, maka bayi belum mampu membentuk vitamin K nya sendiri untuk beberapa hari pertama. Begitu juga pada bayi yang memperoleh ASI secara eksklusif juga berisiko mengalami kekurangan vitamin K. Vitamin K yang diberikan adalah vitamin K1 dimana berfungsi untuk meningkatkan pembentukan prothrombin. Pemberian biasanya secara parenteral, 0,5-1 mg IM dengan dosis satu kali segera setelah lahir (sebelum 24 jam), injeksi ini dilakukan di paha kiri. Pemberian vitamin ini bias juga secara oral dengan ketentuan 2 mg apabila bayi BBLR maka dosis yang dianjurkan adalah 1 mg dengan cara pemberian yang sama yaitu hari pertama dan ke empat setelah lahir.

2. Anemia

Anemia fisiologik pada bayi BBLR disebabkan oleh supresi eritropoesis pasca lahir, persediaan besi janin yang sedikit, serta bertambah besarnya volume darah sebagai akibat pertumbuhan yang relative lebih cepat. Oleh karena itu, anemia pada bayi BBLR terjadi lebih dini. Kehilangan darah pada janin atau neonatus akan memperberat anemianya. Persediaan zat besi pada neoatus termasuk bayi dengan BBLR biasanya mencukupi sampai berat badannya menjadi 2 kali berat lahir. Pemberian tambahan zat besi pada bayi dengan risiko terhadap defisiensi vitamin E (umumnya bayi dengan masa gestasi kurang dari 34 minggu) akan memperberat hemolisis dan mengurangi absorbs vitamin E. oleh karena itu, vitamin E diberikan terlebih dahulupada saat bayi mencapai berat badan dua kali lipat dari berat lahir, kemudian dimulai pemberian zat besi sebanyak 2 mg/kg/24jam.

3. Kejang

Suatu kondisi apabila ditemukan adanya tremor yng disertai adanya penurunan kesadaran, terjadi gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, atau anggota gerak lain, atau terjadi mulut mencucu, terjadi kekakuan seluruh tubuh tanpa adanya rangsangan.

e. Gangguan cairan dan elektrolit

1. Gangguan eliminasi

Kerja ginjal masih belum matang. Kemampuan mengatur pembuangan sisa metabolisme dan air masih belum sempurna. Ginjal yang imatur baik secara anatomis maupun fungsinya. produksi urine yang sedikit, urea clearance yang rendah, tidak sanggup mengurangi kelebihan air tubuh dan elektrolit dari badan dengan akibat mudah terjadi edema dan asidosis metabolik.

2. Distensi abdomen

Yaitu kelainan yang berkaitan dengan usus bayi. Distensi abdomen akibat dari motilitas usus berkurang, volume lambung berkurang, sehingga waktu pengosongan lambung bertambah, daya untuk mencernakan dan mengabsorpsi lemak, laktosa, vitamin yang larut dalam lemak dan beberapa mineral tertentu berkurang. Kerja dari sfingter kardioesofagus yang belum sempurna memudahkan terjadinya regurgitasi isi lambung ke esophagus dan mudah terjadi aspirasi.

3. Gangguan pencernaan

Saluran pencernaan pada bayi BBLR belum berfungsi sempurna sehingga penyerapan makanan dengan lemah atau kurang baik. Aktifitas otot pencernaan masih belum sempurna, sehingga pengosongan lambung berkurang. Bayi BBLR mudah kembung, hal ini disebabkan oleh karena stenosis anorektal, atresia ileum, peritonitis meconium, dan mega colon. Evakuasi meconium lebih dari 24 jam pertama dapat dicurigai kelainan bedah. Bayi prematur yang mendapat makanan cukup

akan buang air besar dengan konsistensi semisolid sebanyak 1-6 kali sehari. Jika jumlahnya bertambah banyak dan berbentuk air, harus dicari penyebabnya dan diawasi. Seharusnya bayi yang prematur tidak boleh muntah. Bayi yang baru selesai minum tampaknya tenang. Namun beberapa saat sebelum minum bayi akan melakukan gerakan tertentu yang menandakan dia lapar.

4. Gangguan elektrolit

Cairan yang diperlukan tergantung dari masa gestasi, keadaan lingkungan dan penyakit bayi. Diduga kehilangan cairan melalui tinja dari janin yang tidak mendapat makanan melalui mulut, sangat sedikit. Kebutuhan akan cairan sesuai dengan kehilangan cairan insensibel, cairan yang di keluarkan ginjal, dan pengeluaran cairan yang disebabkan keadaan lainnya. Kehilangan cairan insensible berhubung tidak langsung dengan masa gestasi. Bayi prematur sangat imatur berat lahir kurang dari 1000 gram mendapat makanan melalui mulut, sangat sedikit. Kebutuhan akan cairan sesuai dengan kehilangan cairan insensible berhubung tidak langsung engan masa gestasi. Bayi prematur yang sangat imatur memerlukan sebanyak 2-3 ml/kgBB/jam yang sebagian disebabkan oleh kulit tipis, kekurangan jaringan subkutan, dan oleh luasnya permukaan tubuh. Kehilangan air insensible meningkat di tempat udara panas, selama terapi sinar, dan pada kenaikan suhu tubuh. Kehilangan air tersebut dapat berkurang bila bayi di beri pakaian,

incubator sebelah dalam ditutupi pleksiglas, bernapas dengan udara lembab, atau pada bayi yang mendekati cukup bulan. Bayi prematur yang besar (2000-2500 gram) akan kehilangan air insensible ini sebanyak 0,6-0,7 ml/kgBB/jam bila dirawat dalam inkubator.

Pemberian cairan juga diperlukan agar zat yang larut dalam air kemih seperti urea, elektrolit dan fosfat dapat dikeluarkan. Jumlahnya berbeda-beda menurut makanan yang diberikan, tingkat anabolik dan katabolic nutrisinya. Formula yang pekat, alimentasi yang seluruhnya melalui pembuluh darah akan memerlukan air yang lebih banyak agar hasil katabolisme dapat dikeluarkan melalui air kemih. Beban zat yang terlarut dalam ginjal berkisar 7,5-30 mOsm/kg. Bayi baru lahir, terutama BBLSR, kurang mampu memekatkan air kemih, oleh sebab itu perlu ditambah cairan agar bayi dapat mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuhnya.

Jumlah cairan yang dianjurkan untuk neonatus yang memerlukan susu botol atau cairan melalui pembuluh darah adalah 60-70ml/kgBB pada hari pertama, dinaikkan menjadi 100-120 ml/kgBB pada hari ke 2-3, pada hari ke 4-5 mencapai 150 ml/kgBB dan selanjutnya dapat mencapai 160-180 ml/kgBB/hari. Volume cairan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap bayi. Yang perlu dipantau pada bayi premtatur adalah berat badan yang harus ditimbang setiap hari, pengeluaran air kemih dan berat jenisnya serta kadar nitrogen urea

serum dengan elektrolit. Dengan pemantauan ini dapat diketahui secara dini kelainan hidrasi. Pemeriksaan tersebut diperlukan oleh karena pengamatan klinis dan pemeriksaan fisik saja susah untuk menentukan derajat hidrasi prematur. Kehilangan cairan yang meningkat seperti pada glikosuria, polyuria pada nekrosis tubular akut dan diare akan menyebabkan bayi menjadi dehidrasi karena ginjal tidak sanggup menahan air dan elektrolit yang keluar. Sebaliknya jumlah cairan yang berlebihan memudahkan terjadinya edema, gagal jantung kongestif dan duktus arteriosus paten (Proverawati, 2010).

6. Masalah jangka panjang pada BBLR

a. Masalah Psikis

Masalah jangka panjang yang mungkin timbul pada bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Gangguan perkembangan dan pertumbuhan

Pada bayi BBLR, pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat berkaitan dengan maturitas otak.

2. Gangguan bicara dan komunikasi

Penelitian longitudinal menunjukkan perbedaan kecepatan bicara yang menarik antara BBLR dan berat lahir normal (BLN). Pada bayi BBLR kemampuan bicaranya akan terlambat dibandingkan BLN sampai usia 6 tahun.

3. Gangguan belajar/ masalah pendidikan

Sulit menilai untuk Negara berkembang karena factor kemiskinan juga berperan pada kinerja sekolah. Suatu penelitian di Negara maju menunjukkan bahaya lebih banyak anak BBLR dimasukkan ke sekolah khusus.

b. Masalah fisik

1. Penyakit paru kronis

Keadaan ini dapat disebabkan karena infeksi, kebiasaan ibu merokok selama kehamilan, dan radiasi udara di lingkungan.

2. Gangguan penglihatan dan pendengaran

Sering dikeluhkan gangguan penglihatan meskipun telah diberikan oksigen terapi terkendali. Biasanya gangguan penglihatan ini menyerang bayi BBLR dengan BB < 1500 gram dan masa gestasi < 30 minggu. Bayi biasa mengalami kebutaan.

3. Kelainan bawaan

Kelainan bawaan adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Cacat bawaan lebih sering di temukan pada bayi BBLR daripada bayi lahir hidup lainnya. Sekitar 3-4 % bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Angka kejadian cacat bawaan meninggi pada bayi dengan pertumbuhan intrauterine yang terlambat. Banyak bayi yang lahir dengan kelainan bawaan ternyata memiliki

orang tua yang kondisinya tidak memiliki gangguan kesehatan bahkan tidak memiliki faktor risiko. Malahan, ada wanita hamil yang rajin mengikuti semua nasihat dokternya kemungkinan dapat melahirkan bayi yang memiliki kelainan bawaan. Penyebab terjadinya kasus kelainan bawaan 60% tidak diketahui, sedangkan sisanya disebabkan oleh lingkungan genetik atau kombinasi dari kedua faktor tersebut (Proverawati, dkk. 2010).

7. Makanan bayi BBLR

a. Air susu ibu (ASI)

ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, begitupun bagi bayi dengan BBLR, bayi-bayi kecil biasanya belum mampu mengisap dengan baik karena itu pemberian minumannya berupa ASI atau susu formula khusus untuk BBLR. Bila ASI ibu belum keluar dilakukan melalui pipa lambung dan diberikan secara bertahap sampai jumlah kebutuhannya terpenuhi. Yang perlu diperhatikan tentang aktivitas menyusui pada kasus-kasus bayi yang lahir prematur ataupun yang memiliki berat badan yang rendah adalah kondisi si bayi tersebut, apakah harus dipisahkan terlebih dahulu oleh ibunya atau tidak (Proverawati, dkk.2010).

Bayi kecil, prematur atau dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai masalah menyusui karena reflex mengisapnya masih relatif lemah. Oleh karenanya bayi kecil justru harus cepat dan lebih sering dilatih menyusu berikan sesering mungkin walaupun waktu

menyusunya pendek. Untuk merangsang mengisap sentuhlah langit-langit bayi dengan jari ibu jari yang bersih. Bila bayi dirawat di RS, harus sering dijenguk, dilihat, disentuh dengan kasih sayang dan bila mungkin disusui langsung. Bila belum bias menyusui, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa, yang kemudian diberikan dengan sendok atau cangkir (wulandari, dkk, 2008).

b. Makanan Pertama

Prinsip utama pemberian makanan pada bayi prematur adalah sedikit demi sedikit, secara perlahan dan hati-hati. Pemberian makanan ini berupa glukosa, ASI akan mengurangi risiko hipoglikemia, dehidrasi dan hiperbilirubinemia. Bayi dengan sindrom gawat napas atau penyakit berat lainnya harus mendapat kalori dan pemberian makanan, elektrolit dan cairan melalui pembuluh darah karena pada keadaan demikian makanan melalui mulut memudahkan terjadinya aspirasi. Bayi yang daya isapnya kuat dan tanpa sakit berat dapat dicoba minum melalui mulut. Umumnya bayi dengan BB kurang dari 1500 gram dan kebanyakan juga yang lebih besar memerlukan minum pertama dengan pipa lambung karena belum adanya koordinasi antara gerakan mengisap dan menelan.

c. Pemberian minuman bagi BBLR

Pemberian minum bagi bayi berat lahir rendah (BBLR) menurut berat badan lahir dan keadaan bayi adalah sebagai berikut :

1. Berat lahir 1750-2500 gram

a. Bayi sehat

Biarkan bayi menyusu pada ibu semau bayi. Ingat bahwa bayi kecil lebih mudah merasa letih dan malas minum, anjurkan bayi menyusu lebih sering (contoh: setiap 2 jam) bila perlu. Pantau pemberian minum dan kenaikan berat badan untuk menilai efektifitas menyusui. Apabila bayi kurang dapat mengisap, tambahkan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternative cara pemberian minum.

b. Bayi sakit

Apabila bayi dapat minum per oral dan tidak memerlukan cairan intravena, berikan minum seperti pada bayi sehat. Apabila bayi memerlukan cairan intravena :

1. Berikan cairan intravena hanya selama 24 jam pertama
2. Mulai berikan minum per oral pada hari ke-2 atau segera setelah bayi stabil. Anjurkan pemberian ASI apabila ibu ada dan bayi menunjukkan tanda-tanda siap untuk menyusu.

2. Berat lahir 1250-1499 gram

a. Bayi sehat

1. Beri minum 8 kali dalam waktu 24 jam (contoh: setiap 3 jam) .

Apabila bayi telah mendapatkan minum 160 ml /kgBB per hari tetapi masih tampak lapar, beri tambahan ASI setiapkali minum.

2. lanjutkan pemberian minum menggunakan cangkir/ sendok

3 . apabila bayi telah mendapatkan minum baik menggunakan cangkir, sendok, coba untuk menyusui langsung.

b. Bayi sakit

- a. Beri cairan intravena hanya selama 24 jam pertama
- b. Beri ASI peras melalui pipa lambung mulai hari ke-2 dan kurangi jumlah cairan intravena secara perlahan.
- c. Beri minum 8 kali dalam 24 jam (setiap 3 jam). Apabila bayi telah mendapatkan minum 160 ml/ kgBB per hari tetapi masih tampak lapar, beri tambahan ASI setiap kali minum.
- d. Lanjutkan pemberian minum menggunakan cangkir/ sendok.
- e. Apabila bayi telah mendapatkan minum baik menggunakan cangkir/ sendok, coba untuk menyusui langsung (Proverawati, dkk, 2010).

7. Penatalaksanaan umum pada bayi BBLR

a. Mempertahankan suhu dengan ketat

BBLR mudah mengalami hipotermia, oleh sebab itu suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan ketat (karwati, dkk, 2011). Bayi dengan berat badan lahir rendah, dirawat didalam inkubator. Inkubator yang modern dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan kelembaban agar bayi dapat mempertahankan suhu tubuhnya yang normal, alat oksigen yang dapat diatur, serta kelengkapan lain untuk mengurangi kontaminasi bila incubator di bersihkan. Kemampuan bayi BBLR dan bayi sakit untuk

hidup lebih besar bila mereka dirawat pada atau mendekati suhu lingkungan yang netral. Suhu ini ditetapkan dengan mengatur suhu permukaan yang terpapar radiasi, kelembaban relatif, dan aliran udara sehingga produksi panas (yang diukur dengan konsumsi oksigen) sedikit mungkin dan suhu tubuh bayi dapat dipertahankan dalam batas normal. Suhu incubator yang optimum diperlukan agar panas yang hilang dan konsumsi oksigen terjadi minimal sehingga bayi telanjang pun dapat mempertahankan suhu tubuhnya 36,5-37 derajat celsius. Tingginya suhu lingkungan ini tergantung dari besar dan kematangan bayi. Dalam keadaan tertentu bayi yang sangat prematur tidak hanya memerlukan incubator untuk mengatur suhu tubuhnya tetapi juga memerlukan pleksiglas penahan panas atau topi maupun pakaian.

Prosedur perawatan dapat dilakukan melalui “jendela” atau “lengan baju”. Sebelum memasukkan bayi ke dalam inkubator. Inkubator terlebih dahulu dihangatkan, sampai sekitar 29,4 derajat celsius, untuk bayi dengan berat 1,7 kg dan 32,2 derajat celsius untuk bayi yang lebih kecil. Bayi dirawat dalam keadaan telanjang, hal ini memungkinkan pernapasan yang adekuat, bayi dapat bergerak tanpa dibatasi pakaian, observasi terhadap pernapasan lebih mudah.

b. Pengaturan dan pengawasan asupan cairan

Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi dalam hal ini adalah menentukan pilihan susu, cara pemberian dan jadwal pemberian yang sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR.

ASI (air susu ibu) merupakan pilihan pertama jika bayi mampu mengisap. ASI merupakan makanan yang paling utama, sehingga ASI adalah pilihan yang harus di dahulukan untuk diberikan. ASI juga dapat dikeluarkan dan diberikan pada bayi yang tidak cukup mengisap. Bila faktor mengisapnya kurang maka ASI dapat diperas dan diminumkan dengan sendok perlahan-lahan atau dengan memasang sonde kelambung.

Pada bayi BBLR yang lebih kecil, kurang giat dan mengisap dan sianosis ketika minum melalui botol atau menetek pada ibunya, makanan di berikan melalui *Naso Gastric Tube* (NGT). Jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan berat badan bayi BBLR. Pemberian makanan interval tiap jam dilakukan pada bayi dengan berat badan lebih rendah.

c. Pencegahan infeksi

Infeksi adalah masuknya bibit penyakit atau kuman kedalam tubuh, khususnya mikroba. Bayi BBLR sangat mudah mendapat infeksi. Infeksi ini disebabkan oleh infeksi nosocomial. Rentan terhadap infeksi ini disebabkan oleh kadar immunoglobulin serum pada bayi BBLR masih rendah, aktivitas bakterisidal neutrofil, efek sitotoksik

limfosit juga masih rendah dan fungsi imun belum berpengalaman. Infeksi lokal bayi cepat menjalar menjadi infeksi umum. Tetapi diagnosis dini dapat ditegakkan jika cukup waspada terhadap perubahan (kelainan) tingkah laku bayi sering merupakan tanda infeksi umum. Perubahan tersebut antara lain: malas menetek, gelisah, suhu tubuh meningkat, frekuensi pernapasan meningkat, muntah, diare dan berat badan mendadak turun.

Fungsi perawatan disini adalah memberi perlindungan terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, bayi BBLR tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. Digunakan masker dan baju khusus dalam penanganan bayi, perawat luka tali pusat, perawatan mata, hidung, kulit, tindakan aseptis dan antiseptik alat-alat yang digunakan, isolasi pasien, jumlah pasien dibatasi, rasio perawat pasien ideal, mengatur kunjungan, menghindari perawatan yang terlalu lama, mencegah timbulnya asfiksia dan pemberian antibiotik yang tepat. Bayi prematur mudah sekali terken infeksi, karena daya tahan tubuh yang masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan pembentukan antibody belum sempurna. Oleh karena itu, upaya preventiv dapat dilakukan sejak pengawasan antenatal sehingga tidak terjadi persalinan prematuritas/ BBLR.

d. Penimbangan berat badan

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat.

e. Pemberian oksigen

Ekspansi paru yang buruk merupakan masalah serius bagi bayi preterm BBLR, akibat tidak adanya alveoli dan surfaktan.

f. Pengawasan jalan napas

Terhambatnya jalan napas dapat menimbulkan asfiksia, hipoksia, dan akhirnya kematian. Selain itu BBLR tidak dapat beradaptasi dengan asfiksia yang terjadi selama proses kelahiran sehingga dapat lahir dengan asfiksia perinatal. Dalam kondisi seperti ini diperlukan pembersihan jalan napas segera setelah lahir (aspirasi lendir), dibaringkan pada posisi miring, merangsang pernapasan dengan menepuk atau menjentik tumit (Proverawati, dkk, 2010).

B. Tinjauan Umum tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

1. Umur ibu

Pada dasarnya umur ibu menunjukkan tentang lamanya seseorang hidup, beberapa literatur disebutkan kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya BBLR. Umur ibu pada saat kehamilan merupakan salah satu faktor penyebab BBLR, yang mana dibawah umur 20

tahun disebabkan Karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, keadaan tersebut akan menyulitkan bila ditambah dengan tekanan psikolog, sosial, ekonomi sehingga memudahkan terjadinya persalinan dengan bayi berat lahir rendah (BBLR). Sedangkan masa kehamilan yang dihadapi oleh wanita hamil yang berusia diatas 35 tahun adalah persalinan prematur karena terjadi perubahan pembuluh darah yang mempengaruhi aliran darah ke uterus sehingga mempengaruhi pertumbuhan janin, dengan kata lain gangguan pertumbuhan ini dapat menyebabkan lahirnya BBLR(Manuaba, 2010). Berdasarkan hasil dari penelitian mayoritas umur ibu yang melahirkan di puskesmas ganda antara 20-35 tahun yang diman merupakan masa reproduksi sehat dan rata-rata mempunyai status gizi baik (66,7%) (kartika, 2010).

2. Paritas ibu

Menurut Varney H (2001), dalam buku saku bidan (tahun 2002) paritas adalah jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kehidupan. Pengaruh paritas yang tinggi akan memberikan risiko terhadap janin di mana nantinya akan diperoleh anak yang tidak sehat. Kelahiran yang pertama, kedua, dan ketiga yang paling aman bagi wanita, tetapi kelahiran yang keempat insiden kematian dan komplikasi kelahiran lainnya meningkat dan terus meningkat dengan meningkatnya paritas. Hal ini dapat diterangkan bahwa setiap kehamilan yang disusul dengan persalinan akan menyebabkan kelainan-kelainan pada uterus. Dalam hal ini kehamilan yang berulang-ulang menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah di dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin

akan berkurang dibandingkan pada kehamilan sebelumnya, keadaan ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin kelak dan akan melahirkan bayi dengan BBLR(Winkjosastro, 2006). Hasil analisis univariat berdasarkan penelitian Budiman bahwa rata-rata paritas adalah 2 kali. Hasil analisis bivariat variabel paritas bermakna karena $p\ value = 0,042$ dan nilai r sebesar $- 0,101$. Begitupun dalam hasil analisis multivariat variabel paritas berhubungan dengan berat badan lahir dapat dilihat dari $p\ value 0,024$ dan nilai koefisien $B = 54,7$ (Budiman, 2010). Umumnya kejadian BBLR dan kematian perinatal meningkat seiring dengan meningkatnya paritas ibu, terutama paritas lebih dari 4. Paritas yang terlalu tinggi akan menyebabkan terganggunya uterus terutama dalam hal fungsi pembuluh darah. Kehamilan yang berulang-ulang akan mempengaruhi nutrisi ke janin pada kehamilan selanjutnya, selain itu dapat menyebabkan atonia uteri. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang selanjutnya akan melahirkan bayi dengan BBLR (Winjosastro, 2008).


3. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan adalah rentang waktu antara umur anak yang terakhir dengan kehamilan sebelumnya. Jarak kehamilan kurang dari dua tahun dapat menimbulkan pertumbuhan janin kurang baik, persalinan lama dan perdarahan saat persalinan, karena keadaan rahim belum pulih dengan baik. Ibu yang melahirkan anak dengan jarak yang sangat berdekatan atau di bawah dua tahun akan mengalami peningkatan risiko terhadap terjadinya perdarahan pada trimester-trimester termasuk pada plasenta previa, anemia dan ketuban pecah

dini serta dapat melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Winkjosastro, 2008). Berdasarkan hasil penelitian dari Siswoyo dari 68 responden sebagian besar yaitu 58 orang (85,3%) masuk dalam kategori resiko rendah (jarak kehamilan >2 tahun atau belum pernah melahirkan) dan masih ada 10 orang (14,7%) termasuk dalam kategori resiko tinggi (jarak kehamilan <2 tahun) (Siswoyo, 2010).

C. Kerangka Konsep

1. Kerangka konsep



2. Defenisi operasional

a. Umur Ibu

Umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu lamanya dihitung berdasarkan tanggal lahir ibu sampai pada waktu melahirkan anaknya yang terakhir dinyatakan dalam tahun dan tercatat dalam buku catatan dan pelaporan RSUD Syekh Yusuf dengan kriteria:

- a. Resiko tinggi: bila umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
- b. Resiko rendah: bila umur ibu hamil antara 20 sampai 35 tahun

b. Paritas ibu

seorang ibu yang Paritas dalam penelitian ini adalah frekuensi bayi yang dialami dinyatakan dalam satuan hitung sebagaimana tercatat dalam buku pencatatan dan pelaporan RSUD Syekh Yusuf yang dibagi dalam:

- a. Resiko tinggi: apabila jumlah/ frekuensi persalinan ibu 4
- b. Resiko rendah: apabila jumlah/ frekuensi persalinan ibu 1-3

c. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan adalah rentang waktu antara umur anak yang terakhir dengan kehamilan yang sebelumnya:

- a. Resiko tinggi: apabila jarak kehamilan ≤ 2 tahun
- b. Resiko rendah: apabila jarak kehamilan > 2 tahun

D. Hipotesis penelitian

1. Hipotesis nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR
- b. Tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR
- c. Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR

2. Hipotesis alternative (H_a)

- a. Ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR
- b. Ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR
- c. Ada hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan *Cross Sectional* yaitu rancangan penelitian menekankan waktu pengukuran dan observasi dari tiap variabel hanya satu kali saja pada saat bersamaan (sekali waktu). Pada penelitian ini peneliti ingin mencari hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015 .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang direncanakan untuk dilakukan suatu yaitu d RSUD Syekh Yusuf, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015.

2. Waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan pada 11 Januari sampai 11 Februari tahun 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Subjek berupa Semua benda yang memiliki sifat atau ciri, adalah subjek yang biasa diteliti (Machfoedz, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi yang

lahir dari bulan Januari sampai Desember tahun 2014 di RSUD Syekh Yusuf yaitu berjumlah 2125 orang..

2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sedangkan sampling adalah proses penyeleksian porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2011). Sampel dalam penelitian ini adalah 95 bayi dengan kasus yaitu BBLR sebanyak 46 dan kontrol yaitu tidak BBLR sebanyak 49 yang diperoleh menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

keterangan:

n = besaran sampel

N= besaran sampel

d = tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan (Nursalam, 2011).

diketahui :

N= 2125

d = 0,1 → d² = 0,01

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

$$n = \frac{z}{1+z} \quad (0,0)$$

$$n = \frac{z}{z, z}$$

$$n = 95,5 \rightarrow 95$$

3. Teknik pengambilan sampel

Tehnik pengambilan sampel merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2011). Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun kriterianya sebagai berikut :

a. Kriteria inklusi

1. Bayi dengan berat badan lahir 1500 - 4000 gram
2. Data rekam medik yang lengkap
3. Bayi yang lahir pada bulan Januari – Desember tahun 2014

b. Kriteria Eksklusi

1. Bayi dengan berat badan lahir <1500 gram
2. Data rekam medik yang tidak lengkap
3. BBLR dengan penyakit penyulit

D. Metode pengambilan data

Data yang diambil dari data dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari medical record di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 dengan cara melakukan

pengisian pada daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan variabel yang diteliti atau menggunakan pengambilan data sekunder.

E. Pengolahan Data

a. Editing

Memeriksa data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

b. Coding

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data memberikan kode untuk masing-masing kelas terhadap data yang diperoleh dan sumber data yang telah diperiksa.

c. Tabulating

Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlahkan, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisa.

F. Analisis data

1. Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran masing-masing variable independen dan dependen dalam bentuk distribusi frekuensi.

2. Analisis bivariat

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistic dengan *ujichi-square* atau ², menggunakan komputerisasi melalui program *SPSS* versi 16 dengan penilaian :

- a. Jika nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

G. Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan dalam bentuk narasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai tanggal 11 Februari 2016 di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan jumlah sampel 95 bayi dengan kasus yaitu BBLR sebanyak 46 dan kontrol yaitu tidak BBLR sebanyak 49 dari bayi yang di peroleh setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk berbagai variabel independent dan variabel dependent. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik 2014 yang diperoleh dari buku register bayi, yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa bulan Januari – Desember 2014. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara manual menggunakan *SPSS versi 16* dan di analisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan naskah sebagai berikut :

1. Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi dan presentase dari variabel independen dan dependen dalam bentuk distribusi frekuensi

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2015

Kelahiran	Frekuensi	Persentase
BBLR	46	48,4 %
Normal	49	51,6 %
Jumlah	95	100 %

Sumber : Data Sekunder (rekam medik RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh bahwa ibu yang melahirkan bayi dengan kejadian BBLR 46 orang (48,4%), dan tidak mengalami kejadian BBLR 49 orang (51,6%) di RSUD syekh yusuf tahun 2015.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Umur Ibu
Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Umur ibu	Frekuensi	Persentase
Risiko tinggi <20 dan > 35 tahun	13	28,2%
Risiko rendah 20-35 tahun	33	71,8%
Jumlah	46	100 %

Sumber : Data Sekunder (rekam medik RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa frekuensi BBLR lebih banyak terjadi pada ibu dengan umur risiko rendah (20-35 tahun) yaitu 33 (71,8%) dari pada ibu dengan umur risiko tinggi (<20 dan >35 tahun) yaitu 13 (28,2%).

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Paritas
Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Paritas	frekuensi	Persentase
Risiko tinggi >3 kali	12	26 %
Risiko rendah 1-3	34	74 %
Jumlah	46	100 %

Sumber : Data Sekunder (rekam medik RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa frekuensi BBLR lebih banyak terjadi pada ibu dengan paritas risiko rendah (1-3 kali) yaitu 34 (74%) dari pada ibu dengan paritas risiko tinggi (>3 kali) yaitu 12 (26%).

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Jarak Kehamilan
Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Jarak kehamilan	frekuensi	Persentase
Risiko tinggi < 2 tahun	13	28,2 %
Risiko rendah >2 tahun	33	71,8 %
Jumlah	46	100 %

Sumber : Data Sekunder (rekam medik RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa frekuensi BBLR lebih banyak terjadi pada ibu dengan jarak kehamilan risiko rendah (>2 tahun)

yaitu 33 (71,8%) dari pada ibu dengan jarak kehamilan risiko tinggi <2 tahun) yaitu 13 (28,2%).

2. Analisis Bivariat

Analisis hubungan BBLR dengan Umur Ibu, Paritas dan Jarak Kehamilan. Hubungan masing-masing variabel tercantum dalam tabel-tabel sebagai berikut ini : Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik dengan uji *chi-square* atau χ^2 menggunakan komputerisasi melalui program *SPSS versi 16*.

a. Hubungan umur ibu dengan kejadian BBLR

Tabel 4.5
Hubungan umur ibu Dengan Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015

Variabel	Berat badan bayi		Total	()	
	BBLR	Tidak BBLR			
Umur ibu	Risiko tinggi	13 (48,1%)	14 (51,9%)	27 (100%)	0,973
	Risiko rendah	33 (48,5%)	35 (51,5%)	68 (100%)	
Total		46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.5 diatas menunjukkan dari 27 ibu yang umur risiko tinggi, terdapat lebih banyak yang tidak mengalami kejadian BBLR, yaitu 14 orang (51,9%) dibandingkan dengan yang mengalami kejadian BBLR, yaitu 13 orang (48,1%). Sedangkan dari 68 ibu dengan umur risiko rendah terdapat

lebih banyak yang melahirkan bayi yang tidak BBLR yaitu 35 orang (51,5%) dibandingkan dengan yang melahirkan bayi BBLR yaitu 33 orang (48,5%).

Analisis *Chi-square* diperoleh *p value* $(0,973) > (0,05)$, yang berarti tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

b. Hubungan paritas dengan kejadian BBLR

Tabel 4.6
Hubungan paritas Dengan Kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015

Variabel		Berat badan bayi		Total	()
		BBLR	Tidak BBLR		
paritas	Risiko tinggi	12 (48%)	13 (52%)	25 (100%)	0,961
	Risiko rendah	34 (48,6%)	36 (51,4%)	70 (100%)	
Total		46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.6 diatas menunjukkan dari 25 ibu yang paritas risiko tinggi, terdapat lebih banyak yang tidak mengalami kejadian BBLR, yaitu 13 orang (52%) dibandingkan dengan yang mengalami kejadian BBLR, yaitu 12 orang (48%). Sedangkan dari 70 ibu dengan umur risiko rendah terdapat lebih banyak yang melahirkan bayi yang tidak BBLR yaitu 36 orang (51,4%) dibandingkan dengan yang melahirkan bayi BBLR yaitu 34 orang (48,6%).

Analisis *Chi-square* diperoleh p value $(0,961) > (0,05)$, yang berarti tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

c. Hubungan jarak kehamilan dengan kejadian BBLR

Tabel 4.7
Hubungan jarak kehamilan Dengan Kejadian BBLR
di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015

Variabel		Berat badan bayi		Total	()
		BBLR	Tidak BBLR		
paritas	Risiko tinggi	13 (48,1%)	14 (51,9%)	27 (100%)	0,258
	Risiko rendah	33 (48,6%)	35 (51,4%)	68 (100%)	
Total		46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.7 diatas menunjukkan dari 27 ibu yang umur risiko tinggi, terdapat lebih banyak yang tidak mengalami kejadian BBLR, yaitu 14 orang (51,9%) dibandingkan dengan yang mengalami kejadian BBLR, yaitu 13 orang (48,1%). Sedangkan dari 68 ibu dengan umur risiko rendah terdapat lebih banyak yang melahirkan bayi yang tidak BBLR yaitu 35 orang (51,4%) dibandingkan dengan yang melahirkan bayi BBLR yaitu 33 orang (48,6%).

Analisis *Chi-square* diperoleh p value $(0,258) > (0,05)$, yang berarti tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

B. Pembahasan

1. Hubungan umur dengan kejadian BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,973$). Hal ini disebabkan karena mungkin distribusi sampel yang tidak merata karena disini tidak hanya mengambil sampel yang BBLR tetapi juga mengambil sampel yang tidak BBLR (Normal), selain itu mengingat bahwa kejadian peristiwa kesehatan termasuk yang berkaitan dengan kebidanan merupakan faktor dengan multi kausal, yang bisa saja terjadi karena adanya faktor lain yang lebih dominan terhadap kejadian BBLR.

Hasil penelitian ini kurang sejalan dengan teori bahwa umur dalam kategori risiko tinggi seorang wanita baik secara fisik maupun mental telah siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga upaya untuk pemeliharaan kehamilannya akan lebih baik serta kemungkinan adanya kecenderungan risiko terhadap bayi yang dilahirkan dapat dikurangi (Setyowati, 2007).

Penelitian ini sejalan dalam penelitian Lestari (2015) dapat dilihat bahwa ada 50 (27,0%) bayi dengan BBLR yang dilahirkan dari ibu dengan umur berisiko, ada 7 (3,8%) bayi dengan BBLSR yang dilahirkan dari ibu dengan umur berisiko, dan ada 2 (1,1%) bayi dengan BBLASR yang dilahirkan dari ibu dengan umur berisiko. Hasil uji rank spearman didapatkan

nilai $p = 0,216$ $\alpha = 0,05$ maka $p > \alpha$, sehingga H_0 di terima dan H_a di tolak, artinya tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian BBLR di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

Penyulit pada kehamilan usia muda lebih tinggi dibandingkan dengan “kurun waktu reproduksi sehat” antara umur 20-30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila di tambah dengan tekanan (stress) psikologis, sosial, ekonomi sehingga memudahkan terjadi keguguran, persalinan prematur, berat bayi lahir rendah, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, keracunan kehamilan, kematian ibu yang tinggi. Bertambahnya usia pada wanita sangat berpengaruh terhadap jumlah sel telur yang belum dikeluarkan dari ovarium. Selain jumlah sel telur yang tinggal sedikit, faktor usia (di atas 35 tahun) juga berpengaruh terhadap kemampuan rahim untuk menerima bakal janin atau embrio. Dalam hal ini, kemampuan Rahim untuk menerima janin menurun. Faktor penuaan juga akan menyebabkan embrio yang dihasilkan wanita di atas 35 tahun terkadang mengalami kesulitan untuk melekat di lapisan endometrium, hal ini dapat meningkatkan risiko abortus. Berat bayi lahir rendah juga berkorelasi dengan usia ibu. Ibu-ibu yang terlalu muda seringkali secara emosional dan fisik belum matang, selain pendidikan pada umumnya rendah, ibu yang masih

muda masih tergantung pada orang lain sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan janin. Kelahiran bayi BBLR lebih tinggi pada ibu-ibu muda berusia kurang dari 20 tahun. Remaja sering kali melahirkan bayi dengan berat lebih rendah, hal ini terjadi karena mereka belum matur dan mereka belum memiliki sistem transfer plasenta seefisien wanita dewasa. Pada ibu yang tua meskipun mereka telah berpengalaman, tetapi kondisi badannya serta kesehatannya sudah mulai menurun sehingga dapat mempengaruhi pada intra uterin dan dapat menyebabkan kelahiran BBLR. Faktor usia ibu bukanlah faktor utama kelahiran BBLR, tetapi kelahiran BBLR nampak meningkat (Lestari, 2015).

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Trihardiani (2011) bahwa analisis bivariat antara umur ibu dengan berat badan lahir menunjukkan hubungan yang tidak bermakna ($p=0,119$).

Berdasarkan penelitian Sulistyorini (2014) Hasil uji statistic menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara usia ibu saat hamil dengan BBLR ($p= 0,292$) dimana (p) lebih dari ($=0,05$). Umur ibu pada saat hamil mempengaruhi kondisi kehamilan ibu karena selain berhubungan dengan kematangan organ reproduksi juga berhubungan dengan kondisi psikologis terutama kesiapan dalam menerima kehamilan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Setyowati (2007) bahwa umur Ibu sangat berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Kehamilan di usia < 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat menyebabkan kejadian BBLR

karena kehamilan di usia < 20 tahun secara biologis belum optimal secara mental sehingga mudah mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan janin selama kehamilannya. Sedangkan pada usia > 35 tahun merupakan usia dimana ibu mengalami kemunduran atau penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang menimpa di usia > 35 tahun sehingga risiko terjadinya BBLR cukup tinggi (Turede, 2012).

Berdasarkan penelitian Juaria (2014) Hasil uji Chi-Square adalah ada hubungan antara umur dengan kejadian BBLR. Hal ini sesuai dengan teori bahwa umur kehamilan yang relatif muda (<20 tahun) dapat menyebabkan komplikasi kehamilan baik pada ibu maupun janin karena belum matangnya alat reproduksi sehingga mengakibatkan kelahiran prematur, BBLR dan cacat bawaan. Sedangkan pada usia >35 tahun, otot-otot dasar panggul tidak elastis lagi sehingga mudah terjadi komplikasi baik saat hamil maupun persalinan seperti pre-eklamsi, hipertensi, diabetes mellitus, anemia yang juga dapat mengakibatkan kelahiran prematur atau BBLR.

Selain berusia kurang dari 20 tahun berisiko tinggi, usia lebih 35 tahun juga usia berisiko tinggi disebabkan karena adanya perubahan biologis yang dikaitkan dengan penyakit degenerative. Proses dalam tubuhnya sudah mengalami kemunduran maka hal ini akan mempengaruhi keadaan Rahim, peredaran darahnya sudah mengalami pengapuran sehingga mempengaruhi sirkulasi makanan ke janin. Keadaan ini menyebabkan gangguan pertumbuhan

janin, yang kelak akan melahirkan janin dengan keadaan BBLR (Saifuddin, 2002).

Seorang bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 1 tahun, namun tidak ada batasan pasti. Pada masa ini manusia sangat lucu dan menggemaskan tetapi juga rentan terhadap kematian. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram.

Allah Swt. Telah menjelaskan segala sesuatu mengenai perintah ataupun peringatan untuk manusia dalam Al-Qur'an dan Hadits yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu. Sesungguhnya jika semua hal yang di kerjakan dengan selalu berpedoman pada Al-qur'an, insya Allah akan mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Salah satu peringatan Allah swt. Dalam QS. An-nahl /16 : 78



 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ

 السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS.An-nahl:78).

Masa tua dan kemaian di penghujung umur, dan menyebutkan bahwa dzat yang menciptakanmu akan menjadikan kamu meninggal dunia. Manusia

ketika berumur panjang akan terus melemah dari masa ke masa bahkan sampai ketahap melupakan hal-hal yang pernah di ketahui atau menjadi pikun. Terdapat pelajaran yang dapat diambil bahwa kematian dan kehidupan ada ditangan Allah swt. Dan umur panjang bukan berarti mempunyai nilai hidup (M.Quraish Shihab, 2002).

Kehamilan pada usia muda merupakan faktor risiko hal ini disebabkan belum matangnya organ reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan janin yang memudahkan terjadinya BBLR sedangkan pada umur diatas 35 tahun meskipun mereka telah berpengalaman, tetapi kondisi badannya serta kesehatannya sudah mulai menurun sehingga dapat mempengaruhi janin intrauterin dan dapat menyebabkan kelahiran BBLR, dimana angka kejadian tertinggi BBLR adalah pada wanita yang berusia dibawah 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, angka kejadian terendah pada usia 20-35 tahun (Lestari, 2015).

2. Hubungan paritas dengan kejadian BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,961$). Hal ini di sebabkan karena ibu yang paritas >3 biasanya lebih berpengalaman dalam perawatan bayi, dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik secara fisik maupun mental, selain itu dikarenakan pada ibu yang memiliki jumlah paritas yang tinggi tidak semuanya memiliki faktor risiko pemberat lainnya, contohnya seperti anemia

dan defisiensi nutrisi (Amiruddin, 2009). Setiap ibu hamil memerlukan tambahan kalori dan nutrisi karena selama kehamilannya mereka harus memasok energi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizi berada dalam kondisi yang baik, sejak sebelum dan selama hamil.

Berdasarkan penelitian Sulistyorini (2014) Hasil uji statistic dengan Chi- Square tests menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan BBLR ($p=1,000$) dimana (p) lebih dari ($=0,05$). Kepercayaan popular yang ada dikalangan masyarakat, bahwa persalinan akan semakin mudah dan baik dengan semakin banyaknya pengalaman melahirkan. Penelitian lain menambahkan bahwa status paritas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kejadian BBLR dan bayi lahir mati, hal tersebut terjadi karena semakin tinggi status paritasnya maka kemampuan rahim untuk menyediakan nutrisi bagi kehamilan selanjutnyasemakin menurun sehingga penyaluran nutrisi antara ibu dan janin terganggu yang akhirnya dapat mengakibatkan BBLR.

Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian Lestari (2015) dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Paritas tidak aman yaitu paritas 1 dan >3 , paritas 1 masih memiliki pengetahuan yang kurang dan belum memiliki pengalaman tentang kehamilan sehingga dapat berpengaruh dalam kehamilannya. Kesiapan dalam menghadapi kehamilan baik secara fisik maupun mental cenderung masih kurang sehingga dapat berpengaruh pada

pola pemeliharaan kesehatan janin yang dikandungnya. Paritas > 3 jauh lebih berpengalaman dalam perawatan bayi, dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan baik secara fisik maupun mental lebih baik dibandingkan ibu dengan paritas 1. Ibu yang pernah hamil dan melahirkan anak lebih dari tiga kali, maka kemungkinan akan banyak di temui keadaan kesehatan ibu akan terganggu seperti anemia yang dapat menyebabkan kelahiran BBLR, disini juga akan terjadi kekendoran pada dinding rahim yang dapat menyebabkan robekan pada dinding rahim. Risiko paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan risiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan (Lestari, 2015).

Berdasarkan penelitian Rahmawati (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu primipara yang melahirkan BBLR lebih tinggi sebanyak 65 orang (89%) dibandingkan ibu grande multipara yang berarti melahirkan BBLR sebanyak 21 orang (78%). Hasil uji statistik Kolmogrov-Smirnov dengan hasil Value > 0,05 (0,576) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian BBLR. Hal ini disebabkan adanya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya BBLR.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Trihardiani (2011) Hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang bermakna antara paritas dengan berat badan lahir ($p=0,043$). Kepercayaan populer yang ada

dikalangan masyarakat, bahwa persalinan akan semakin mudah dan baik dengan semakin banyaknya pengalaman melahirkan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa persalinan kedua dan ketiga adalah persalinan yang paling aman. Hal ini dikarenakan risiko komplikasi yang serius, seperti perdarahan dan infeksi meningkat secara bermakna mulai dari persalinan yang keempat dan seterusnya, sehingga ada kecenderungan bayi lahir dengan kondisi BBLR bahkan terjadinya kematian ibu dan bayi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa berat badan lahir bayi meningkat seiring peningkatan status paritas dan mencapai berat badan maksimal pada paritas ketiga, kemudian pada paritas berikutnya rata-rata berat badan bayi akan menurun. Penelitian lain menambahkan bahwa status paritas yang tinggi dapat meningkatkan risiko kejadian BBLR dan bayi lahir mati. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi status paritasnya maka kemampuan rahim untuk menyediakan nutrisi bagi kehamilan selanjutnya semakin menurun sehingga penyaluran nutrisi antara ibu dan janin terganggu yang akhirnya dapat mengakibatkan BBLR.

Berdasarkan hasil penelitian Handayani (2008) diketahui bahwa ada hubungan antara paritas dengan berat badan lahir rendah dengan ditunjukkan nilai $p < 0,05$ dengan $OR = 3,6$. Paritas ibu berhubungan dengan berat badan bayi lahir rendah, dimana paritas Primipara mempunyai risiko sebesar 3,6 untuk melahirkan bayi dengan BBLR. Berdasar hasil penelitian, ibu dengan paritas primipara sebanyak 68,2% responden melahirkan BBLR. Mayoritas

paritas ibu bersalin adalah multipara. Menurut Saifuddin (2002) jumlah anak yang banyak memerlukan persiapan baik secara mental maupun material. Kehamilan yang termasuk kategori "4 terlalu" diantaranya adalah terlalu sering hamil dan mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa jarak kelahiran dan banyaknya anak akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anaknya. Risiko BBLR dan kematian ibu ataupun anak akan meningkat apabila jarak kelahiran terlalu dekat. Hal ini dikarenakan fisik ibu dan rahim masih kurang cukup istirahat. Ibu yang sering hamil, lebih-lebih dengan jarak yang pendek akan menyebabkan ibu terlalu payah akibat dari hamil, melahirkan, menyusui, merawat anaknya terus menerus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara umur dan paritas ibu bersalin dengan kejadian BBLR. Sehingga dapat dicari solusi guna mencegah terjadinya berat badan lahir rendah yaitu dengan salah satu cara petugas kesehatan memberi pengetahuan atau penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sehingga ibu hamil mau memeriksakan kehamilannya secara teratur ke petugas kesehatan. Dengan pemeriksaan kehamilan secara teratur dapat mencegah terjadinya komplikasi atau timbulnya penyulit bagi ibu maupun janin antara lain anemia, abortus, partus prematurus, inersia uteri, BBLR, perdarahan pasca persalinan (Juaria, 2014).

Ibu dengan > 3 berisiko melahirkan BBLR, pada primipara terkait dengan belum siapnya fungsi organ dalam menjaga kehamilan dan menerima kehadiran janin, keterampilan ibu untuk melaksanakan perawatan diri dan bayinya serta faktor psikologis ibu yang masih belum stabil (Rochyati,2011), sedangkan ibu yang pernah melahirkan anak empat kali atau lebih karena paritas yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terganggunya uterus terutama dalam hal fungsi pembuluh darah. Kehamilan yang berulang-ulang akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah uterus, hal ini akan mempengaruhi nutrisi ke janin pada kehamilan selanjutnya sehingga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang selanjutnya akan melahirkan bayi dengan BBLR (Wiknjosastro, 2009).

3. Hubungan jarak kehamilan dengan BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,383$). Hal ini disebabkan karena waktu penelitian yang cukup sempit sehingga kurangnya waktu untuk mencari kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian, selain itu karena adanya faktor risiko lain diluar jarak kehamilan yang menyebabkan kelahiran BBLR. Faktor risiko lain yang mempengaruhi kelahiran BBLR menurut Monita (2016) yaitu perilaku ibu dalam hal merokok, komposisi diet, penambahan berat badan selama kehamilan, aktivitas seksual, status marital, dan kondisi sosial ekonomi

Berdasarkan penelitian Monita (2016) hasil uji statistik dapat dilihat bahwa nilai $p = 0,932$ dimana $p > 0,05$ artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara jarak kelahiran ibu hamil dengan kejadian BBLR. Jarak ideal antar kelahiran adalah lebih dari 2 tahun, dengan demikian memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki persediannya dan organ – organ reproduksi untuk siap mengandung lagi. Sistem reproduksi yang terganggu akan menghambat perkembangan pertumbuhan dan perkembangan janin. Jarak kelahiran < 2 tahun dapat berisiko kematian janin saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi ataupun anak yang bertubuh kecil. Ibu hamil yang jarak kelahirannya < 2 tahun, kesehatan fisik dan kondisi rahimnya butuh istirahat yang cukup. Ada kemungkinan juga ibu masih harus menyusui dan memberikan perhatian pada anak yang dilahirkan sebelumnya, sehingga kondisi ibu yang lemah ini akan berdampak pada kesehatan janin dan berat badan lahirnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyorini (2014) uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jarak kehamilan dengan BBLR ($p=0,102$). Jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Ibu hamil dalam kondisi tubuh kurang sehat inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi yang dilahirkan serta risiko terganggunya sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang terganggu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya

sehingga berpengaruh terhadap berat badan akhir. Ibu hamil yang jarak kelahirannya kurang dari 2 tahun, kesehatan fisik dan rahimnya masih butuh istirahat yang cukup. Ada kemungkinan juga ibu masih harus menyusui dan memberikan perhatian pada anak yang dilahirkan sebelumnya sehingga kondisi ibu yang lemah ini akan berdampak pada kesehatan janin dan berat badan lahirnya.

Secara teori dikemukakan bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat yaitu kurang dari dua tahun akan dapat memicu kejadian BBLR. Sebaliknya jarak kehamilan yang baik adalah lebih dari atau sama dengan dua tahun. Hasil analisis data yang menunjukkan adanya hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR disebabkan karena banyak Ibu Multipara (Ibu yang melahirkan lebih dari satu kali) yang rata-rata memiliki jarak kehamilan yang dekat dan juga ada yang jauh.

Berdasarkan penelitian Oktofusi (2013) hasil uji chi-square antara jarak kehamilan dengan BBLR menunjukkan p value $0,862 > 0,05$ artinya bahwa jarak kehamilan tidak berpengaruh terhadap lahirnya BBLR di Puskesmas banguntapan 1 Bantul tahun 2013. Jarak kehamilan penting dijaga untuk menjaga kondisi tubuh ibu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tubuhnya sendiri dan kebutuhan kesehatan janin yang di kandunginya.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Turede (2012) Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 85 bayi yang terlahir dari Ibu yang kehamilannya tidak beresiko dan terdapat 95 bayi yang dilahirkan dari Ibu

yang kehamilannya beresiko. Value yang didapatkan dari hasil analisis ini yaitu 0.000. Dari hasil analisis data ini terdapat hubungan yang erat antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR. Secara teori dikemukakan bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat yaitu kurang dari dua tahun akan dapat memicu kejadian BBLR. Sebaliknya jarak kehamilan yang baik adalah lebih dari atau sama dengan dua tahun. Hasil analisis data yang menunjukkan adanya hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR disebabkan karena banyak Ibu Multipara (Ibu yang melahirkan lebih dari satu kali) yang rata-rata memiliki jarak kehamilan yang dekat dan juga ada yang jauh.

Berdasarkan jurnal penelitian Suryati (2013) Hasil uji statistik menyatakan ada hubungan yang bermakna antara jarak kehamilan dengan kejadian BBLR ($p = 0,005$, $p = <0.05$) dengan nilai OR = 4,314.

Penelitian Elizawarda (2003) Pengaturan jarak kelahiran atau jarak kehamilan yang baik minimal dua tahun menjadi penting untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus menghabiskan cadangan zat besinya .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang berjudul Hubungan Faktor – faktor yang mempengaruhi BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015, yang telah di lakukan *uji chi square* di ketahui bahwa :

1. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p < 0,973$).
2. Tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p < 0,961$).
3. Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,383$).

B. SARAN

1. Bagi Pihak Rumah Sakit

Diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan tentang faktor-faktor risiko pada ibu hamil saat pemeriksaan ANC.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat lebih melengkapi referensi seperti buku-buku, sumber, majala kesehatan, jurnal serta bahan-bahan yang menunjang penulisan Karya Tulis Ilmiah ini guna meningkatkan mutu pendidikan menyarankan agar

mahasiswa sebelum menentukan judul sebaiknya menentukan masalah yang layak dan relevan untuk diteliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar lebih mengembangkan dan lebih menyempurnakan penelitian ini dan menggunakan variabel-variabel lain dengan metode yang berbeda yang berhubungan dengan kejadian BBLR.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemah. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2007.
- Amirullah. Al-Qur'an dan hadits. Jakarta : Departemen Agama RI, 2001.
- Amiruddin, A. Hubungan Antara Umur dan Paritas Ibu dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang Tahun 2005.
- Anonim, Angka Kematian pada ibu menurun (<http://www.Wordpress.com> di akses tanggal 8 juni 2010).
- Arief, dkk. Neonatus dan Asuhan Keperawatan Anak. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Budiman, Buku Ajar Penelitian Kesehatan Jilid Ke-1. Cimahi : LPPM Stikes A. Yani, 2010.
- Desi, Andrian Ezy Z. Hubungan umur dan paritas ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di RSUD Dr. Ahmad Mochtar kota Bukittinggi tahun 2014.
- Elizawerd. Studi kasus kelola faktor risiko untuk pencegahan BBLR di RSUD DR. Pirngadi Kota Medan tahun 2003.
- <http://jurnal.unimus.ac.id>. Puspitaningtyas, nawang, dkk. Gambaran sikap tenaga kesehatan dan penatalaksanaan metode kangguru pada bayi berat lahir rendah diruang perinatologi RSUD dr. Soeprato cepu tahun, 2011.
- Handayani. KTI. Padangsidimpuan: Akademi Kebidanan Sentral. 2008
- Joeharno. Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian BBLR Di Kelurahan Kesepuluh Kota Cirebon. Semarang, 2008.
- Juaria, Henny. Hubungan antara umur dengan paritas ibu bersalin dengan kejadian BBLR. Surabaya: akbid Griya Husada, 2014.
- Kartika. Faktor ibu yang berhubungan dengan berat badan lahir di puskesmas garuda, 2010.

- Karwati, dkk. Asuhan Kebidanan V (Kebidanan Komunitas). Jakarta: CV.Trans Medika, 2011.
- Lestari, Rena Diah, dkk. Hubungan umur, paritas dan preeklamsi dengan kejadian BBLR di RSUD DR.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2015.
- Maryuni, Anik.Buku Asuhan Bayi Dengan Berat Badan lahir Rendah. Jakarta: CV.Trans Info Medika, 2013.
- Machfoedz, Ircham. Metodologi penelitian Bidang kesehatan, Keperawatan, kebidanan, Kedokteran. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Maulana . Cara Cerdas Menghadapi Kehamilan dan Mengasuh Bayi. Jogjakarta : Arruzz Media Group, 2010.
- Monita, Faradilla, dkk. Hubungan Usia, Jarak kelahiran dan Kadar Hemoglobin Ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Arifin Achmad Profinsi Riau, 2016.
- Nursalam, dkk, Metodologi penelitian kesehatan, Jakarta:CV trans medika, 2011.
- Notoatmodjo, soekidjo.Metodologi penelitian kesehatan dan ilmu kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Oktufusi, Nici. Faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR di Puskesmas Banguntapan 1 Bantul Yogyakarta tahun 2012.
- Pantiawati, ika.Bayi Dengan BBLR. Yogyakarta: Muha Medika, 2010.
- Prawihardjo, sarwono. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- Prawihardjo, sarwono.Buku Panduan Praktis pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal.Jakarta, 2010.
- Proverawati, atikah, dkk. BBLR Berat Badan Lahir Rendah.Yogyakarta: Nuha medika, 2010.
- Proverawati, atikah, dkk.Nutrisi janin & IbuHamil Cara Membuat Otak Janin cerdas. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Rahmawati, Ita, dkk. Hubungan paritas dengan kejadian BBLR di RSUD R.A Kartini Jepara, 2013.<http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/view//11>. Diakses tanggal 10 November 2013.

- Rahmawati, ros, dkk. Pengaruh faktor maternal terhadap kejadian bayi berat lahir rendah di rumah sakit umum daerah Ajjatpangge Watan Soppeng kabupaten Soppeng tahun 2010, jurnal media kebidanan poltekkes Makassar Nomor 2 edisi 2 /Juli-Desember, 2010.
- Rochayati, dkk. Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. EGC, 2011
- Saifuddin, A.B. Panduan praktek pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan bina pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002.
- Senewe, felly, dkk. Kesehatan anak dan bayi baru lahir di kota Bekasi, jurnal Ekologi kesehatan vol.5 no.1, april, 2006.
- Setyowati. Prinsip-Prinsip Dasar Praktik Kebidanan. Dunia Cerdas : Jakarta, 2007
- Shihab, M. Quraish. Tafsir AL Misbah: pesan, kesan dan keserasian AL-Qur'an. Lentera hati: Jakarta, 2002.
- Siswoyo, shinta, dkk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di perkotaan kabupaten Banjarnegara, politeknik Banjarnegara, 2010.
- Srianingsih, dkk. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Nutrisi Terhadap Status Gizinya di Wilayah Kerja di Puskesmas Kalibaryu Banyuwangi, 2013.
- Sudarti, dkk. Asuhan Neonatus Risiko Tinggi dan Kegawatan. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Suryati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin tahun 2013.
- Sulistyorini, dewi, dkk. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di puskesmas perkotaan kabupaten banjarnegara, 2014.
- Syamsu, fatmawati. Pengaruh perawatan metode kanguru terhadap fungsi fisiologis Bayi premature dan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi, jurnal Keperawatan soedirman (the Soedirman Journal Of Nursing), volume 8, nomor 3, nopember, 2013.
- Trihardiani, Ismi. Faktor risiko kejadian berat badan lahir rendah di Wilayah kerja Puskesmas Singkawang Timur dan Utara Kota Singkawang, 2011.

- Turede, Rahyaniti. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RS^{ITD} Prof. DR. H. Aloei Saboe kota Gorontalo Tahun 2012.
- Winkjosastro, H., Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- Wulandari, diah, dkk. Asuhan Kebidanan Nifas. Jogjakarta: Mitra Cendikia, 2009.
- Yulianti, dewi, dkk. Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan. Jakarta: EGC, 2011.
- Yulifah, rita, dkk. Asuhan Kebidanan Komunitas. Jakarta: Salemba medika, 2009.
- Zurizah, Yuhemi, dkk. Hubungan antara umur dan pendidikan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD DR. Mohammad Hosein Palembang tahun 2010.



FREQUENCIES VARIABLES=Umur Paritas Jarakkehamilan kejadianBBLR

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes


Output Created		25-Mar-2016 13:28:43
Comments		
Input	Data	C:\Users\Atom\Desktop\rahma fix.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	95
Missing Handling	Value Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax	<pre> FREQUENCIES VARIABLES=Umur Paritas Jarakkehamilan kejadianBBLR /ORDER=ANALYSIS. </pre>		
Resources	Processor Time	00:00:00.000	
	Elapsed Time	00:00:00.000	

[DataSet1] C:\Users\Atom\Desktop\rahma fix.sav

Statistics

		Umur	Paritas	Jarakkehamilan	kejadianBBLR
N	Valid	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0



Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20->35	27	28.4	28.4	28.4
	20-35	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Paritas


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>3	25	26.3	26.3	26.3
	1-3	70	73.7	73.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Jarakkehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2	66	69.5	69.5	69.5
	>2	29	30.5	30.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

skejadianBBLR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1500-2499	46	48.4	48.4	48.4
	2500-5000	49	51.6	51.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	



ABS
 LES=Umur Paritas Jarakkehamilan BY kejadianBBLR
 MAT=AVALUE TABLES
 TISTICS=CHISQ
 LS=COUNT
 NT ROUND CELL.

stabs

Notes	
Created	27-Mar-2016 13:20:58
nts	
Data	C:\Users\Atom\Desktop\KTI IMMYA\rahma fix.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	95
Value Handling	
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
	CROSSTABS /TABLES=Umur Paritas Jarakkehamilan BY kejadianBBLR /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT /COUNT ROUND CELL.
ces	
Processor Time	00:00:00.016
Elapsed Time	00:00:00.016
Dimensions Requested	2
Cells Available	174762

et1] C:\Users\Atom\Desktop\KTI IMMYA\rahma fix.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kejadianBBLR	95	100.0%	0	.0%	95	100.0%
* kejadianBBLR	95	100.0%	0	.0%	95	100.0%
hamilan *	95	100.0%	0	.0%	95	100.0%
BBLR						

hamilan * kejadianBBLR

Crosstab

		kejadianBBLR		Total
		1500-2499	2500-4000	
hamilan	<2	30	36	66
	>2	16	13	29
		46	49	95

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Chi-Square	.762 ^a	1	.383		
Continuity Correction ^b	.422	1	.516		
Fisher's Exact Ratio	.762	1	.383		
Exact Test				.504	.258
Nominal-by-Linear Association	.754	1	.385		
Valid Cases ^b	95				

0 cases (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.04.

Continuity Correction computed only for a 2x2 table

ns * kejadianBBLR

Crosstab

	kejadianBBLR		Total
	1500-2499	2500-4000	
	>3	12	
1-3	34	36	70
	46	49	95

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Chi-Square	.002 ^a	1	.961		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test	.002	1	.961		
Linear-by-Linear Association	.002	1	.961	1.000	.573
N of Valid Cases ^b	95				

0.0% of the cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.11.

Continuity Correction is computed only for a 2x2 table

ns * kejadianBBLR

Crosstab

	kejadianBBLR		Total
	1500-2499	2500-4000	
	<20->35	13	
20-35	33	35	68
	46	49	95

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Chi-Square	.001 ^a	1	.973		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test	.001	1	.973		
Linear-by-Linear Association	.001	1	.973	1.000	.577
N of Valid Cases ^b	95				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.07.

b. Computed only for a 2x2 table



MASTER TABEL PENELITIAN
HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BBLR DENGAN
ANGKA KEJADIAN BBLR DI RSUD SYEKH YUSUF TAHUN 2015

NAMA	UMUR		PARITAS		JARAK KEHAMILAN		KEJADIAN BBLR	
	X(TAHUN)	KODE	X	KODE	X(TAHUN)	KODE	X	KODE
NY"N"	18	1	1	2	0	1	2500	2
NY"S"	26	2	1	2	0	1	3200	2
NY"N"	20	2	1	2	0	1	2600	2
NY"K"	17	1	1	2	0	1	2150	1
NY"S"	30	2	1	2	0	1	2100	1
NY"R"	36	1	4	1	3	2	1800	1
NY"N"	20	2	1	2	0	1	2600	2
NY"N"	20	2	1	2	0	1	3000	2
NY"l"	31	2	2	2	1	1	2800	2
NY"L"	36	1	2	2	3	2	3600	2
NY"N"	35	2	4	1	4	2	3400	2
NY"S"	30	2	4	1	1	1	2700	2
NY"N"	30	2	1	2	0	1	2900	2
NY"R"	20	2	1	2	0	1	3700	2
NY"H"	25	2	1	2	0	1	2700	2
NY"R"	24	2	2	2	3	2	3500	2
NY"P"	36	1	5	1	3	2	2500	2
NY"N"	19	1	1	2	0	1	3800	2
NY"S"	30	2	2	2	3	2	2700	2
NY"R"	32	2	1	2	0	1	3000	2
NY"H"	22	2	1	2	0	1	2000	1
NY"N"	27	2	1	2	0	1	3500	2
NY"H"	36	1	4	1	3	2	2500	2
NY"S"	24	2	1	2	0	1	2700	2
NY"H"	24	2	3	2	1	1	3000	2
NY"H"	21	2	1	2	0	1	1500	1
NY"F"	30	2	1	2	0	1	1900	1
NY"S"	37	1	4	1	3	2	3600	2
NY"S"	36	1	4	1	5	2	1800	1

NY"S"	21	2	1	2	0	1	1800	1
NY"D"	24	2	1	2	0	1	1600	1
NY"M"	28	2	2	2	1	1	2000	1
NY"N"	37	1	5	1	3	2	3000	1
NY"A"	22	2	1	2	0	1	3500	2
NY"H"	29	2	3	2	1	1	2400	1
NY"S"	21	2	1	2	0	1	2000	1
NY"P"	38	1	4	1	1	1	2600	2
NY"D"	22	2	1	2	0	1	2200	1
NY"M"	40	1	4	1	3	2	3000	2
NY"D"	36	1	2	2	4	2	3700	2
NY"F"	23	2	1	2	0	1	1500	1
NY"H"	22	2	1	2	0	1	1600	1
NY"A"	23	2	1	2	0	1	2000	1
NY"S"	36	1	3	2	3	2	2600	2
NY"R"	26	2	1	2	0	1	2500	2
NY"S"	23	2	2	2	1	1	3000	2
NY"S"	28	2	1	2	0	1	2700	2
NY"H"	34	2	1	2	0	1	2800	2
NY"S"	36	1	2	2	3	2	2000	1
NY"M"	29	2	4	1	1	1	2300	1
NY"H"	29	2	4	1	1	1	3400	2
NY"S"	30	2	1	2	0	1	2600	2
NY"M"	32	2	4	1	4	2	2500	2
NY"N"	36	1	5	1	0	1	2500	2
NY"H"	37	1	2	2	1	1	2300	1
NY"N"	21	2	3	2	2	1	1800	1
NY"S"	33	2	2	2	4	2	2700	2
NY"S"	35	2	4	1	3	2	2300	1
NY"S"	17	1	4	1	1	1	2400	1
NY"H"	23	2	2	2	3	2	1900	1
NY"S"	25	2	1	2	0	1	3500	2
NY"A"	26	2	1	2	0	1	2000	1
NY"R"	27	2	2	2	1	1	4000	2
NY"H"	32	2	1	2	0	1	2700	2
NY"R"	23	2	4	1	1	1	2900	2

NY"N"	21	2	1	2	0	1	3000	2
NY"H"	22	2	2	2	3	2	2300	1
NY"K"	24	2	1	2	0	1	2400	1
NY"M"	19	1	1	2	0	1	1800	1
NY"I"	25	2	1	2	0	1	1800	1
NY"R"	30	2	2	2	5	2	2300	1
NY"R"	18	1	4	1	3	2	2300	1
NY"W"	18	1	1	2	0	1	3700	2
NY"N"	37	1	5	1	3	2	2600	2
NY"N"	19	1	1	2	0	1	2400	1
NY"F"	23	2	1	2	0	1	1500	1
NY"H"	35	2	4	1	1	1	1600	1
NY"N"	34	2	4	1	6	2	2400	1
NY"J"	21	2	1	2	0	1	3000	2
NY"K"	35	2	5	1	3	2	2000	1
NY"A"	23	2	1	2	0	1	2700	2
NY"I"	22	2	2	2	1	1	3900	2
NY"D"	19	1	1	1	0	1	3000	2
NY"L"	30	2	2	2	1	1	2500	2
NY"R"	25	2	2	2	1	1	2010	1
NY"H"	18	1	1	2	0	1	2300	1
NY"S"	26	2	2	2	3	2	1800	1
NY"B"	17	1	2	1	1	1	1900	1
NY"C"	29	2	2	2	3	2	2000	1
NY"D"	29	2	3	2	4	2	2400	1
NY"I"	28	2	2	2	1	1	2600	2
NY"M"	18	1	1	2	0	1	1500	1
NY"N"	20	2	2	1	1	1	1600	1
NY"R"	22	2	2	2	3	2	2300	1
NY"P"	25	2	2	2	3	2	2001	1

**HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR)
DENGAN ANGKA KEJADIAN BBLR
DI RSUD SYEKH YUSUF
TAHUN 2015**

ABSTRAK

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2.500 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015. Penelitian ini menggunakan *survey analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 sebanyak 2125 ibu yang melahirkan dengan besar sampel 95 ibu yang melahirkan yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Dari statistik uji Chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu (p 0,973) , paritas (p 0,961) dan jarak kehamilan (p 0,383) dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015.

Kata kunci : BBLR, Umur, paritas, Jarak kehamilan

PENDAHULUAN

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. Paling sedikit 17 juta bayi BBLR setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari *The Fifty Sixth Session of Regional Committee World Health Organization (WHO) for South-East Asia*, padatahun 2003 ,kematian bayi terjadi pada usia neonatus dengan penyebab infeksi 33%, asfiksia/ trauma 28

%, bayi berat lahir rendah 24%, kelainan bawaan 10%, dan lain-lain 5%. Risiko kematian bayi berat lahir rendah 4 kali lebih besar di dibandingkan bayi lahir dengan berat badan lebih dari 2.500 gram (Yulifah, 2011).

Angka kejadian BBLR di setiap Negara maju berbeda, misalnya di Eropa berkisar antara 5-11%, Amerika Serikat berkisar antara 11,9% dan di Australia kejadiannya berkisar antara 7% (Krisnadi, 2009).

Di Sulawesi selatan berdasarkan profil kesehatan tahun 2008, angka kematian bayi mencapai 4,39 per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab terbanyak karena pertumbuhan janin yang lambat , kekurangan gizi pada janin, kelahiran premature dan BBLR (Rahmawati, dkk. 2010).

Data yang diperoleh berdasarkan pemantauan awal kejadian kelahiran BBLR di RSUD Syekh Yusuf yaitu pada tahun 2012 angka kejadian BBLR jumlahnya 121 orang dari 2200 bayi yang dilahirkan, pada tahun 2013 jumlahnya 150 orang dari 2019 bayi yang dilahirkan , sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya 182 orang dari 2121 bayi yang dilahirkan. Disini dapat kita lihat peningkatan angka kejadian BBLR yang sangat signifikan setiap tahunnya

Asumsi yang paling penting berarti bahwa mengkaji beberapa factor yang mempengaruhi kelahiran BBLR akan menjadi informasi penting untuk menjadi dasar bagi semua pihak dalam memecahkan berbagai permasalahan BBLR tersebut, karena itulah menjadi permasalahan yang paling mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang “hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR dengan angka kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2015 “.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi sebanyak 2125, Sampel dalam penelitian ini adalah 95 bayi dengan kasus yaitu BBLR sebanyak 46 dan kontrol yaitu tidak BBLR sebanyak 49.

HASIL PENELITIAN

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Kelahiran	Frekuensi	Presentase
BBLR	46	48,4 %
Normal	49	51,6 %
Jumlah	95	100 %

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Umur Ibu Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Umur ibu	Frekuensi	Persentase
Risiko tinggi <20 dan > 35 tahun	13	28,2%
Risiko rendah 20-35 tahun	33	71,8%
Jumlah	46	100 %

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Paritas Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Paritas	frekuensi	Persentase
Risiko tinggi >3 kali	12	26 %
Risiko rendah 1-3	34	74 %
Jumlah	46	100 %

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kejadian BBLR berdasarkan Jarak Kehamilan Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2015

Jarak kehamilan	frekuensi	Persentase
Risiko tinggi < 2 tahun	13	28,2 %
Risiko rendah >2 tahun	33	71,8 %
Jumlah	46	100 %

a. Hubungan umur ibu dengan kejadian BBLR

Variabel	Berat badan bayi		Total	()
	BBLR	Tidak BBLR		
Umur ibu	Risiko tinggi	13 (48,1%)	14 (51,9%)	27 (100%)
	Risiko rendah	33 (48,5%)	35 (51,5%)	68 (100%)
Total	46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	0,973

Analisis *Chi-square* diperoleh *p value* $(0,973) > (0,05)$, yang berarti tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

b. Hubungan paritas dengan kejadian

BBLR

Variabel		Berat badan bayi		Total	()
		BBLR	Tidak BBLR		
paritas	Risiko tinggi	12 (48%)	13 (52%)	25 (100%)	0,961
	Risiko rendah	34 (48,6%)	36 (51,4%)	70 (100%)	
Total		46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	

Analisis *Chi-square* diperoleh *p value* (0,961) > (0,05), yang berarti tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

C. Hubungan jarak kehamilan dengan kejadian BBLR

Variabel		Berat badan bayi		Total	()
		BBLR	Tidak BBLR		
paritas	Risiko tinggi	13 (48,1%)	14 (51,9%)	27 (100%)	0,258
	Risiko rendah	33 (48,6%)	35 (51,4%)	68 (100%)	
Total		46 (48,4%)	49 (51,6%)	95 (100%)	

Analisis *Chi-square* diperoleh *p value* (0,258) > (0,05), yang berarti tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

PEMBAHASAN

1. Hubungan umur dengan kejadian BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan (*p* > 0,973). Hal ini disebabkan karena mungkin distribusi sampel yang tidak merata karena disini tidak hanya mengambil sampel yang BBLR tetapi juga mengambil sampel yang tidak BBLR (Normal), selain itu mengingat bahwa kejadian peristiwa kesehatan termasuk yang berkaitan dengan kebidanan merupakan faktor dengan multi kausal, yang bisa saja terjadi karena adanya faktor lain yang lebih dominan terhadap kejadian BBLR. Allah Swt. Telah menjelaskan segala sesuatu mengenai perintah ataupun peringatan untuk manusia dalam Al-Qur'an dan Hadits yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu. Sesungguhnya jika semua hal yang dikerjakan dengan selalu berpedoman pada Al-qur'an, insya Allah akan mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Salah satu peringatan Allah swt. Dalam QS. An-nahl /16 : 78

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS.An-nahl:78).

2. Hubungan paritas dengan kejadian BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,961$). Hal ini disebabkan karena ibu yang paritas >3 biasanya lebih berpengalaman dalam perawatan bayi, dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik secara fisik maupun mental, selain itu dikarenakan pada ibu yang memiliki jumlah paritas yang tinggi tidak semuanya memiliki faktor risiko pemberat lainnya, contohnya seperti anemia dan defisiensi nutrisi (Amiruddin, 2009).

3. Hubungan jarak kehamilan dengan BBLR

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,383$). Hal ini disebabkan karena waktu penelitian yang cukup sempit sehingga kurangnya waktu untuk mencari kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian, selain itu karena adanya faktor risiko lain diluar jarak kehamilan yang menyebabkan kelahiran BBLR. Faktor risiko lain yang mempengaruhi kelahiran BBLR menurut Monita (2016) yaitu perilaku ibu dalam hal merokok, komposisi diet, penambahan berat badan selama kehamilan, aktivitas seksual, status marital, dan kondisi sosial ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

1. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p < 0,973$).
2. Tidak ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p < 0,961$).
3. Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan ($p > 0,383$).

Saran

1. Bagi Pihak Rumah Sakit
Diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan tentang faktor-faktor risiko pada ibu hamil saat pemeriksaan ANC.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan dapat lebih melengkapi referensi seperti buku-buku, sumber, majala kesehatan, jurnal serta bahan-bahan yang menunjang penulisan Karya Tulis Ilmiah ini guna meningkatkan mutu pendidikan menyarankan agar mahasiswa sebelum menentukan judul sebaiknya menentukan masalah yang layak dan relevan untuk diteliti.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Agar lebih mengembangkan dan lebih menyempurnakan penelitian ini dan menggunakan variabel-variabel lain dengan metode yang berbeda yang berhubungan dengan kejadian BBLR.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2007.

- Amirullah. Al-Qur'an dan hadits. Jakarta : Departmen Agama RI, 2001.
- Amiruddin, A. Hubungan Antara Umur dan Paritas Ibu dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang Tahun 2005.
- Anonim, Angka Kematian pada ibu menurun
(<http://www.Wordpress.com> di akses tanggal 8 juni 2010.
- Arief, dkk. Neonatus dan Asuhan Keperawatan Anak. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Budiman, Buku Ajar Penelitian Kesehatan Jilid 1. Cimahi : LPPM Stikes A. Yani, 2010.
- Desi, Andrian Ezy Z. Hubungan umur dan paritas ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di RSUD Dr. Ahmad Mochtar kota Bukittinggi tahun 2014.
- Elizawerd. Studi kasus kelola faktor risiko untuk pencegahan BBLR di RSUD DR. Pirngadi Kota Medan tahun 2003.
<http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Puspitaningtyas, nawang, dkk. Gambaran sikap tenaga kesehatan dan penatalaksanaan metode kangguru pada bayi berat lahir rendah diruang perinatologi RSUD dr. Soeprapto cepu tahun, 2011.
- Handayani. KTI. Padangsidempuan: Akademi Kebidanan Sentral. 2008
- Joeharno. Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian BBLR Di Kelurahan Kesepuluh Kota Cirebon. Semarang, 2008.
- Juaria, Henny. Hubungan antara umur dengan paritas ibu bersalin dengan kejadian BBLR. Surabaya: akbid Griya Husada, 2014.
- Kartika. Faktor ibu yang berhubungan dengan berat badan lahir di puskesmas garuda, 2010.
- Karwati, dkk. Asuhan Kebidanan V (Kebidanan Komunitas). Jakarta: CV. Trans Medika, 2011.
- Lestari, Rena Diah, dkk. Hubungan umur, paritas dan preeklamsi dengan kejadian BBLR di RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2015.
- Maryuni, Anik. Buku Asuhan Bayi Dengan Berat Badan lahir Rendah. Jakarta: CV. Trans Info Medika, 2013.
- Machfoedz, Ircham. Metodologi penelitian Bidang kesehatan, Keperawatan, kebidanan, Kedokteran. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Maulana . Cara Cerdas Menghadapi Kehamilan dan Mengasuh Bayi. Jogjakarta : Ar-ruzz Media Group, 2010.
- Monita, Faradilla, dkk. Hubungan Usia, Jarak kelahiran dan Kadar Hemoglobin Ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Arifin Achmad Profinsi Riau, 2016.
- Nursalam, dkk, Metodologi penelitian kesehatan, Jakarta: CV trans medika, 2011.

- Notoatmodjo, soekidjo. Metodologi penelitian kesehatan dan ilmu kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Oktufusi, Nici. Faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR di Puskesmas Banguntapan 1 Bantul Yogyakarta tahun 2012.
- Pantiawati, Ika. Bayi Dengan BBLR. Yogyakarta: Muha Medika, 2010.
- Prawihardjo, sarwono. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- Prawihardjo, sarwono. Buku Panduan Praktis pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta, 2010.
- Proverawati, atikah, dkk. BBLR Berat Badan Lahir Rendah. Yogyakarta: Nuha medika, 2010.
- Proverawati, atikah, dkk. Nutrisi janin & Ibu Hamil Cara Membuat Otak Janin cerdas. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Rahmawati, Ita, dkk. Hubungan paritas dengan kejadian BBLR di RSUD R.A Kartini Jepara, 2013. <http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/view//11>. Diakses tanggal 10 November 2013.
- Rahmawati, ros, dkk. Pengaruh faktor maternal terhadap kejadian bayi berat lahir rendah di rumah sakit umum daerah Ajjatpangge Watan Soppeng kabupaten Soppeng tahun 2010, jurnal media kebidanan poltekkes Makassar Nomor 2 edisi 2 /Juli-Desember, 2010.
- Rochayati, dkk. Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. EGC, 2011
- Saifuddin, A.B. Panduan praktek pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan bina pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002.
- Senewe, felly, dkk. Kesehatan anak dan bayi baru lahir di kota Bekasi, jurnal Ekologi kesehatan vol.5 no.1, april, 2006.
- Setyowati. Prinsip-Prinsip Dasar Praktik Kebidanan. Dunia Cerdas : Jakarta, 2007
- Shihab, M. Quraish. Tafsir AL Misbah: pesan, kesan dan keserasian AL-Qur'an. Lentera hati: Jakarta, 2002.
- Siswoyo, shinta, dkk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di perkotaan kabupaten Banjarnegara, politeknik Banjarnegara, 2010.
- Srianingsih, dkk. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Nutrisi Terhadap Status Gizinya di Wilayah Kerja di Puskesmas Kalibar Banyuwangi, 2013.
- Sudarti, dkk. Asuhan Neonatus Risiko Tinggi dan Kegawatan. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Suryati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin tahun 2013.
- Sulistiyorini, dewi, dkk. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR di puskesmas perkotaan kabupaten banjarnegara, 2014.

Syamsu, fatmawati. Pengaruh perawatan metode kanguru terhadap fungsi fisiologis Bayi premature dan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi, jurnal Keperawatan soedirman (the Soedirman Journal Of Nursing), volume 8, nomor 3, nopember, 2013.

Trihardiani, Ismi. Faktor risiko kejadian berat badan lahir rendah di Wilayah kerja Puskesmas Singkawang Timur dan Utara Kota Singkawang, 2011.

Turede, Rahyaniti. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RSUD

Prof.DR.H.Aloei Saboe kota Gorontalo Tahun 2012.

Winkjosastro, H., Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.

Wulandari, diah, dkk. Asuhan Kebidanan Nifas. Jogjakarta: Mitra Cendikia, 2009.

Yulianti, dewi, dkk. Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan. Jakarta: EGC, 2011.

Yulifah, rita, dkk. Asuhan Kebidanan Komunitas. Jakarta: Salemba medika, 2009.

Zurizah, Yuhemi, dkk. Hubungan antara umur dan pendidikan ibu dengan kejadian

BBLR di RSUD DR.Mohammad Hosein Palembang tahun 2010





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 07 Januari 2016

Nomor : 00118 /P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Bupati Gowa

di-

Sungguminasa

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FIK/PP.00.9/08/2016 tanggal 06 Januari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : St. Rahmah
Nomor Pokok : 70400112076
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BBLR DENGAN ANGKA KEJADIAN BBLR DI RSUD SYEKH YUSUF TAHUN 2015"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Januari s/d 11 Februari 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., M.S

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19610513 199002 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA RI,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (Fax. 864923) Samata-Gowa
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN

Nama : ST. Rahmah
NIM : 70400112076
Jurusan : Kebidanan
Judul KTI : HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEJADIAN BBLR DENGAN ANGKA KEJADIAN BBLR DI RSUD
SYEKH YUSUF TAHUN 2015.

Samata-Gowa, Desember 2015

1. Pembimbing :

(dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes)

2. Penguji I :

(dr. Hj. Syatirah, Sp.A., M.Kes)

3. Penguji II :

(Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si)

Mengetahui,
Ketua Prodi

(Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 07 Januari 2016

K e p a d a

Nomor : 070/ 23 /BKB.P/2016
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf
Kab. Gowa

di-
T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor : 00118/P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **St. Rahmah**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sinjai, 22 Desember 1994**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Manuruki 2**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis dan Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul : **"HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BBLR DENGAN ANGKA KEJADIAN BBLR DI RSUD SYEKH YUSUF TAHUN 2015"**

Selama : 11 Januari s/d 11 Februari 2016
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Ses., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa
3. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan IIN Alauddin Makassar;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :08/Diklat.RSUD-SY/ II /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : St. Rahma
N i m : 70400112076
Institusi : UIN alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di *Ruang Rekam Medik Dan Perinatologi* RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul * *Hubungan Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kejadian BBLR Dengan Angka Kejadian BBLR Di RSUD. Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2015* * pada Tanggal 11 Januari 2016 S/d 11 Februari 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sungguminasa, 22 Februari 2016

An. Ketua Diklat

Koordinator bagian Penelitian



Dra. Hl. Ramlah Rauf, Esc. MMRS
Nip. 19630710 198703 2 019