

**ANALISIS PENGGUNAAN INSULIN PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS
TIPE 2 DI RUMAH SAKIT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh


EVIE KARMILA SYAHRIR

701 001 05 044

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 3 Maret 2010

Penyusun

Evie Karmila Syahrir
NIM: 701 001 050 44

KATA PENGANTAR

Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Ibu Gemy Nastity Handayani. S,Si.,M,Si.,Apt, selaku pembimbing pertama dan Ibu Haeria.S.Si selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada kepada :

1. Bapak Prof Dr. Azhar Arsyad, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak dr.H.M. Furqaan Naiem.M.Sc.Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya.
4. Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
5. Bapak Pimpinan Rekam Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

6. Kepada teman seperjuangan Halogen'05 yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang dalam suka dan duka mengarungi kehidupan kampus, menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan mengukir kenangan. Terimakasih atas kebersamaan, motivasi dan kerjasamanya.

Semoga budi baik yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari ada banyak hal yang membuat skripsi ini mungkin masih belum memuaskan antusiasme semua pihak, oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan agar skripsi ini dapat lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dibidang Farmasi serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 3 Maret 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penulis
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Diabetes Mellitus</i>	5
B. <i>Jenis Diabetes Mellitus</i>	11
C. <i>Komplikasi Diabetes Mellitus</i>	15
D. <i>Penatalaksanaan Terapi Diabetes Mellitus</i>	17
E. <i>Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel</i>	29

BAB III. METODE PENELITIAN.....	
A. <i>Jenis Penelitian</i>	33
B. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	33
C. <i>Populasi dan Sampel</i>	33
D. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	33
E. <i>Analisis Data</i>	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. <i>Hasil Penelitian</i>	35
B. <i>Pembahasan</i>	39
BAB V. PENUTUP	
A. <i>Kesimpulan</i>	47
B. <i>Implikasi Penelitian</i>	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Hal
1. Perhitungan	50
2. Master Tabel.....	56
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	64
4. Surat Izin Meneliti.....	65
5. Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	66



ABSTRAK

Nama penyusun : Evi Karmila Syahrir
Nim : 70100105044
Judul Skripsi : “Analisis Penggunaan Insulin pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar”

Telah dilakukan penelitian tentang penggunaan insulin pada penderita Diabetes mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terdapat 3 pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2 yaitu insulin, insulin campuran, dan insulin kombinasi metformin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persentase pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin, keefektifan pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah, pada penderita diabetes tipe 2. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan data sekunder pada bagian rekam medik dari penderita diabetes tipe 2 yang dirawat inap selama tahun 2008, meliputi umur, jenis kelamin, kadar glukosa awal diagnosa, penggunaan insulin dan kadar glukosa darah akhir rawat inap. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa.

Dari hasil penelitian, menunjukkan persentase pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi insulin cukup besar yaitu 64,8 % dari jumlah populasi yang ada dan hanya pola penggunaan insulin campuran dan insulin kombinasi metformin yang sudah efektif dalam mencapai sasaran kadar glukosa darah yang diharapkan yaitu masing-masing sebesar 75,7 % dan 65,1%.

Kata Kunci : Diabetes Mellitus tipe 2, Kadar Glukosa Darah, Insulin

ABSTRACT

Name : Evi Karmila Syahrir
Nim : 70100105044
Tittle of Thesis : “ Analysis The Patient use of Insuline With Type 2 Diabetes Mellitus in General Hospital of Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar

Research about insuline usage for Diabetes Mellitus type 2 patient in Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar has conduct. There 3 pattern which used in this study; Insuline, Insuline Mixture, Insulin-metformin Combination. The purposes of this study were to know about determine the percentage of insulin usage for diabetes mellitus type 2, and effectiveness of insulin usage to lowering glucose level with insulin for type 2 of patients. This research method is descriptive where using secondary data in the medical record of the 2nd type diabetics including age, gender, and glucose level late hospitalization.

The result showed that, diabetes mellitus type 2 of patients medicated with Insulin were 64,8 % of 287 population. Only insulin mixture and insuline metformin combination, showed effectiveness medication to lowering glucose levels with 75,7 % and 65,1 %.

Keyword : Diabetes mellitus type 2, glucose levels, Insuline

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut survei yang dilakukan WHO, Indonesia menempati urutan ke-4 dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat. Pada tahun 2000 yang lalu saja, terdapat sekitar 5,6 juta penduduk di Indonesia yang mengidap diabetes. Namun, pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia akan meningkat tajam menjadi 21,3 juta orang, dimana baru 50% yang sadar mengidapnya dan diantara mereka baru sekitar 30 % yang datang berobat teratur (Soegondo 2007).

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu sindrom yang ditandai dengan hiperglikemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, protein serta lemak, yang diakibatkan oleh defisiensi sekresi insulin atau kerja dari insulin itu sendiri. Berdasarkan hasil studi epidemiologi yang terbaru tanpa memandang gender, ras, dan usia, Indonesia telah memasuki epidemi diabetes mellitus tipe 2.

Prevalensi Diabetes mellitus tipe 2 dari tahun ketahun makin meningkat yaitu sekitar 90-95 %, yang ternyata didahului oleh berbagai faktor resiko penyakit kardiovaskuler seperti kegemukan, hipertensi, dislipidemia yang pada dasarnya diawali oleh adanya resistensi insulin. Dalam perjalanan penyakitnya diabetes dapat menimbulkan komplikasi, baik komplikasi kronik maupun akut yang dapat membahayakan nyawa (Setiawan, 2008).

Untuk mencegah berbagai komplikasi tersebut, penderita diabetes membutuhkan pengelolaan yang tepat. Pilar pengelolaan diabetes sendiri terdiri dari perencanaan makan, latihan jasmani dan intervensi farmakologis. Pengelolaan diabetes di mulai dengan pengaturan makan dan latihan jasmani selama beberapa waktu (2-4 minggu). Apabila kadar glukosa darah belum mencapai sasaran, dilakukan intervensi farmakologis dengan obat hipoglikemik oral atau suntikan insulin.

Insulin merupakan agen hipoglikemik tertua dan suspensi yang paling alami. Insulin adalah obat yang paling efektif untuk terapi diabetes tipe 2, dengan asumsi bahwa pasien dalam perawatannya dapat menggunakan dosis besar yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan normoglikemi. Pola penggunaan insulin dapat diberikan secara sendiri atau bersama-sama dengan obat hipoglikemik oral untuk mencapai penurunan kadar glukosa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan diabetes mellitus dengan terapi insulin dapat menurunkan kadar glukosa darah secara normal (Pratiwi 2007). Dalam studi lain disebutkan bahwa pola penggunaan insulin seperti kombinasi insulin dan obat hipoglikemik oral (OHO) tertentu dapat menurunkan kadar glukosa darah secara optimal.

Meskipun diketahui bahwa insulin merupakan zat berkhasiat hipoglikemik yang paling berpotensi dan terpercaya, namun penggunaan insulin dalam mencapai target kontrol gula darah yang ideal masih sangat rendah, terutama pada pengelolaan diabetes tipe 2. Berbagai faktor di antaranya adalah penderita

diabetes takut pada suntikan (cara pemberian), takut akan efek samping terutama hipoglikemia antara lain karena jenis dan lama kerja insulin yang diberikan. Insulin hanya digunakan untuk penderita diabetes tipe 1, namun dewasa ini yang menjadi masalah adalah penggunaan insulin lebih banyak diberikan pada penderita diabetes tipe 2.

Berdasarkan hasil observasi awal di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, pada tahun 2008 terdapat 287 kasus diabetes mellitus tipe 2 yang sebagian besar menggunakan pengobatan dengan terapi insulin dan ditemukan 3 pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu insulin monoterapi (kerja pendek), insulin campuran dan insulin kombinasi metformin. Oleh karena itu telah dilakukan penelitian di Rumah Sakit tersebut dengan maksud mendata pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi insulin, dan keefektifan pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapakah persentase pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan terapi insulin di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo selama tahun 2008?
2. Apakah pola penggunaan insulin yang diberikan sudah efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persentase pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi insulin, dan keefektifan dari pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo selama tahun 2008.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melihat sediaan insulin yang sering digunakan dalam menurunkan kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah sakit.
- b. Sebagai referensi dalam bidang ilmu kefarmasian, khususnya diabetes mellitus tipe 2 dan penggunaan insulin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Diabetes Melitus*

1. Defenisi

Diabetes mellitus (DM) berasal dari kata Latin *diabetes* "penerusan" dan *mellitus*, "rasa manis" yang umum dikenal sebagai kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia. Jadi, Diabetes Melitus adalah penyakit dimana seseorang mengeluarkan sejumlah besar urin yang terasa manis. Menurut WHO (World Health Organization) Diabetes Mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (Muchid 2005,7),

Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesa lemak. Akibatnya , glukosa bertumpuk di dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan (glukosiuria) (Tan Hoan dan Rahardja 2002,693).

Hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar glukosa darah yang tinggi dari pada kadar puasa normal 80-90 mg/dl darah atau rentang non-puasa sekitar 140-160 mg/100 ml darah. Penyakit ini berhubungan dengan suatu kekurangan insulin absolut atau relatif. Suatu kekurangan insulin absolut terjadi jika pankreas tidak berfungsi lagi untuk mensekresi insulin. Suatu kekurangan insulin relatif terjadi jika produksi insulin tidak sesuai dengan kebutuhannya (Mutschler 1991,341).

Pada diabetes tipe 2, yang dianggap sebagai pencetus utama adalah factor obesitas (gemuk yang berlebihan). Salah satu aspek yang paling menonjol adalah pola makan yang salah dan tingginya konsumsi makanan “gaya barat”.

Sebagai seorang muslim, seharusnya menghadirkan niat yang benar pada makanannya. Janganlah makan dengan niat hanya untuk melaksanakan kebiasaan sehari-hari yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan hidup, atau hanya merasakan kelezatan berbagai jenis makanan, akan tetapi hendaklah ia menyantap makanan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, menjaga kehidupan dan kesehatannya. Dengan demikian makan menjadi sebuah ibadah yang dapat menghasilkan pahala. Ajaran Islam juga memperhatikan tentang norma-norma makan, waktu makan, dan etika makan, sebab terbukti bahwa seseorang terkena penyakit karena tidak memperhatikan makan yang baik, atau karena terlalu banyak tidur serta tidak bergerak setelah makan.

Mengatur pola makan dan minum dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. AlQuran berpesan agar manusia memperhatikan makanannya seperti ditegaskan dalam ayat Al Quran Surah 'Abasa (80): 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menekankan dua sifat, yang halal dan thayyib, diantaranya disebutkan dalam Firman Allah Swt, AlQuran Surah al-Maidah(5):8).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Apabila berbicara tentang makanan yang dimakan, selalu menekankan salah satu dari dua sifat yaitu halal (boleh) dan thayyib (baik). Makanan yang halal dan thayyib adalah makanan yang baik dan bergizi yang sesuai dengan syar'i. Makanan yang thayyib ini bisa dilihat dari segi kebersihan, rasa dan cara menyajikannya (Shihab 1994, 287). Allah menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah makanan yang baik-baik (al-Thayyibat), dan diharamkan

adalah yang kotor (al-khabaits), seperti yang dijelaskan dalam AlQuran Surah al-A'raaf(7):157

وَحُلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Terjemahnya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor).

Menurut syariat Islam, kehalalan suatu jenis makanan atau minuman ditentukan oleh empat hal yaitu, dari segi zat, sifat, cara perolehan dan akibat yang ditimbulkan jika mengkomsumsinya.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf (7):31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa fungsi makan dan minum adalah agar kita dapat mempertahankan hidup dengan baik sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu ketika mengisi perut dianjurkan untuk memperhatikan aturan-aturan agama dan kesehatan yaitu diperkirakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas. Sedangkan berlebih-lebihan dalam makanan yang dimaksud adalah mengomsumsi makanan dalam jumlah yang melampaui kebutuhan tubuh (Syauqi 1996, 59-60).

Anjuran tidak berlebihan, *wala tusrifu* ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Hal-hal yang dilakukan berlebihan akan mengundang mudharat. Perut, menurut Nabi adalah ”rumah” segala penyakit dan menjaga pola makan adalah permulaan pengobatan. Banyak pakar medis mengakui kebenaran pernyataan Nabi ini, mereka sepakat mengatakan bahwa perut (lambung) merupakan pangkal kesehatan dan sekaligus sebagai sumber penyakit (Zuhroni dan Nur Riani 2003,63). Dalam al-Qur’an disebutkan : Q.S Surat As-Syu’ara(26): 30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia, disebabkan karena kesalahan manusia itu sendiri yang jauh dari aturan-aturan Allah SWT .

2. Gejala Umum Penderita Diabetes

Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai isyarat kemungkinan diabetes. Gejala yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (sering haus), dan polifagia (Muchid 2005,20).

Diabetes umumnya ditandai dengan peningkatan gula darah yang disebabkan defisiensi insulin relatif atau absolut. Disamping naiknya kadar gula

darah gejala kencing manis bercirikan adanya gula dalam kemih (glycosuria) yang diekskresikan mengikat banyak air. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dehidrasi dan hilangnya elektrolit. Karena adanya dehidrasi, maka badan berusaha mengatasinya dengan banyak minum atau polidipsia (Ganiswarna 2005,471).

Polifagia atau peningkatan rasa lapar akibat keadaan pascaabsorptif timbul karena perangsangan nafsu makan di hipotalamus karena pemakaian glukosa sebagai katabolisme protein di otot dan ketidakmampuan sebagian besar sel untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Penderita DM Tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya mengalami hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf (Corwin 1996, 546).

3. Kriteria Penilaian kadar glukosa darah menurut ADA (1997) dan WHO (1994)

a. GDP (Gula Darah Puasa)

Normal : 90-110 mg/dl

Terganggu: 110-125 mg/dl

DM : \geq 126 mg/dl

b. GDS (Gula Darah Sewaktu)

Normal : 110-140 mg/dl

Terganggu : 141-199

DM : \geq 200 mg/dl

Hipoglikemia : $<$ 110 mg/dl

B. Jenis Diabetes Mellitus (DM)

American Diabetes Association (ADA) merevisi klasifikasi dan terminology diabetes mellitus. Istilah sebelumnya *Insulin Dependent Diabetes Melitus* (IDDM) dan *Non Insulin Dependent Diabetes mellitus* (NIDDM) telah diganti dengan tata nama masing-masing menjadi diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2.

Diabetes tipe I meliputi kasus yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pancreas dan diabetes tipe 2 yang terdiri dari gabungan kerusakan sekresi dan kerja insulin yang terdapat dalam rentang mulai dari resistensi insulin dominant dengan defisiensi insulin secara relative sampai dengan kerusakan sekresi yang dominant dengan resistensi insulin.

1. Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes mellitus tipe I adalah penyakit hiperglikemia akibat ketiadaan absolut insulin. Penyakit ini biasa disebut *Insulin Dependent Diabetes mellitus* (IDDM). Diabetes tipe I merupakan bentuk diabetes parah yang berhubungan dengan terjadinya ketosis apabila tidak diobati.

Diabetes tipe I tersebut sangat lazim terjadi pada anak remaja tetapi kadang-kadang juga terjadi pada orang dewasa, khususnya non-obesitas dan mereka berusia lanjut ketika hiperglikemia tampak pertama kali. Keadaan tersebut merupakan suatu gangguan katabolisme yang disebabkan karena hampir tidak terdapat insulin dalam sirkulasi, glukagon plasma meningkat dan sel-sel beta pancreas gagal merespons semua stimulus insulinogenik. Oleh

karena itu diperlukan pemberian insulin eksogen untuk memperbaiki katabolisme, mencegah ketosis, dan menurunkan peningkatan kadar glukosa darah.

a. Penyebab diabetes tipe I

Diduga timbul akibat dekstruksi otoimun sel-sel beta pulau Langerhans yang dicetuskan oleh lingkungan. Serangan otoimun dapat timbul setelah infeksi virus misalnya gondongan (Mumps), rubella atau oleh bahan kimia yang bersifat toksik dan antibody yang dirilis dari imunosit yang disensitisasi. Suatu kerusakan genetic yang mendasari yang berhubungan dengan replikasi atau fungsi sel beta pancreas dapat menyebabkan predisposisi terjadinya kegagalan sel beta setelah infeksi virus (Katzung 1994, 671-672).

Kecenderungan Genetik untuk Diabetes Mellitus tipe I tampaknya terdapat pengaruh genetic untuk timbulnya diabetes mellitus tipe I. Orang-orang tertentu mungkin memiliki “gen diabetogenik” yang berarti suatu profil genetic yang menyebabkan mereka rentan mengidap diabetes mellitus tipe I atau mungkin penyakit otoimun lainnya (Corwin 1997, 543).

b. Karakteristik Diabetes tipe I

Pengidap diabetes tipe I memperlihatkan penanganan glukosa yang normal sebelum penyakit muncul. Dengan munculnya penyakit diabetes mellitus tipe I. Pankreas tidak atau sedikit mengeluarkan insulin. Kadar glukosa darah meningkat karena tanpa insulin glukosa tidak dapat masuk sel. Pada saat yang sama hati mulai melakukan glukoneogenesis menggunakan

substrat yang tersedia berupa asam amino, asam lemak, dan glikogen. Substrat-substrat ini mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam sirkulasi karena efek katabolic glukagon tidak dilawan oleh insulin. Hal ini menyebabkan sel-sel mengalami kelaparan walaupun kadar glukosa darah sangat tinggi. Hanya sel darah otak dan sel darah merah yang tidak kekurangan glukosa karena keduanya tidak memerlukan insulin untuk memasukkan glukosa.

2. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit hiperglikemia akibat insentisitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pancreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai *non-insulin dependent diabetes mellitus* (NIDDM). Diabetes mellitus tipe 2 biasanya timbul pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun, dan pengidapnya lebih banyak wanita.

a. Penyebab diabetes mellitus tipe 2

Tampaknya berkaitan dengan kegemukan, selain itu pengaruh genetic, yang menentukan kemungkinan seseorang mengidap penyakit ini, cukup kuat. Diperkirakan bahwa terdapat suatu sifat genetik yang belum teridentifikasi yang menyebabkan pankreas mengeluarkan insulin yang berbeda atau menyebabkan reseptor insulin atau perantara kedua tidak dapat berespons secara adekuat terhadap insulin. Individu tertentu yang menderita diabetes tipe 2 pada usia muda dan memiliki berat normal atau kurus

tampaknya mengidap diabetes yang lebih erat kaitannya dengan suatu sifat yang diwariskan (Corwin 1997,545).

b. Karakteristik Diabetes Tipe 2

Individu yang mengidap diabetes tipe 2 tetap menghasilkan insulin. Namun sering kali terjadi kelambatan dalam sekresi setelah makan dan berkurangnya jumlah total insulin yang dikeluarkan. Hal ini cenderung semakin parah seiring dengan bertambahnya usia pasien. Sel-sel tubuh terutama sel otot dan adipose memperlihatkan resistensi terhadap insulin yang terdapat dalam darah. Pembawa glukosa tidak secara adekuat dirangsang dan kadar glukosa darah meningkat. Karena masih terdapat insulin, maka individu dengan diabetes tipe 2 jarang hanya mengandalkan asam-asam lemak untuk menghasilkan energi dan tidak rentan terhadap ketosis. Umumnya diabetes jenis ini diberikan obat hipoglikemik oral (OHO) dan suntikan insulin untuk kasus tertentu (Corwin 1997,546).

3. Diabetes Tipe Lain

Menurut American Diabetes Association (ADA) selain diabetes tipe 1 dan tipe 2, terdapat juga diabetes jenis lain yaitu diabetes gestasional, diabetes karena cacat genetik fungsi sel beta, cacat genetik kerja insulin yaitu sindrom resistensi insulin berat, gangguan toleransi glukosa (IGT) dan diabetes karena gangguan glukosa puasa (IFG) (Price dan Lorraine 2005,126). Diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak mengidap diabetes. Pengobatan biasanya berupa pemberian insulin disertai diet (jika kadar

glukosa darah plasma > 6 mmol/L). Toleransi glukosa kembali normal setelah persalinan walaupun 60 % berkembang menjadi diabetes dalam waktu 16 tahun, (Rubeinstein, David Wayne dan John 2007, 190).

Penyebab diabetes gestasional dianggap berkaitan erat dengan peningkatan hormon pertumbuhan yang terus menerus tinggi selama kehamilan. Hormon pertumbuhan dan estrogen merangsang pengeluaran insulin dan dapat menyebabkan gambaran sekresi berlebihan insulin seperti diabetes tipe 2 yang akhirnya menyebabkan penurunan responsivitas sel. Diabetes gestasional dapat menimbulkan efek negatif pada kehamilan dengan meningkatkan resiko lahir mati, dan bayi bertubuh besar yang dapat menimbulkan masalah dalam persalinan (Corwin 1997, 546-547).

C. Komplikasi Diabetes Melitus

Komplikasi dari penyakit DM dapat dibedakan menjadi komplikasi yang bersifat akut dan menahun atau kronis. Komplikasi akut yaitu komplikasi yang memerlukan tindakan dan pertolongan yang cepat. Komplikasi yang bersifat menahun atau kronis timbul setelah penderita mengidap diabetes selama 5-10 tahun atau lebih.

1. Komplikasi Akut

Komplikasi yang sering terjadi adalah reaksi hipoglikemia atau koma diabetik. Reaksi hipoglikemia adalah gejala yang timbul akibat tubuh kekurangan glukosa dengan tanda-tanda rasa lapar, gemetar, dan keringat dingin.

2. Komplikasi Kronis

Komplikasi kronis atau komplikasi yang bersifat menahun pada umumnya terjadi pada penderita yang telah mengidap diabetes selama 5-10 tahun. Komplikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu komplikasi mikrovaskuler dan komplikasi makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler merupakan komplikasi khas dari DM lebih disebabkan hiperglikemia yang tidak terkontrol. Komplikasi makrovaskuler lebih disebabkan karena kelainan lipid darah. Komplikasi mikrovaskuler retinopati diabetik, nefropati diabetik dan neuropati diabetika. Komplikasi makrovaskuler adalah komplikasi yang mengenai pembuluh darah arteri yang lebih besar sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Akibatnya yaitu penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke dan gangren pada kaki.

Penderita DM lebih mudah menderita penyakit jantung koroner (penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner yaitu pembuluh darah yang mensuplai makanan bagi otot jantung). Jika pembuluh darah ini menyempit, otot jantung akan kekurangan oksigen dari makanan, sehingga otot jantung menjadi lemah atau sebagian otot jantung mati. Keadaan ini disebut infark jantung atau infark miokard akut. Dibandingkan dengan ginjal orang normal, penderita DM mempunyai kecenderungan 17 kali lebih mudah mengalami gangguan fungsi ginjal. Hal ini disebabkan oleh faktor infeksi yang sering timbul pada penderita DM dan adanya faktor penyempitan pembuluh darah kapiler yang disebut mikroangiopati diabetik di

dalam ginjal. Manifestasi komplikasi mikroangiopati diabetik pada ginjal disebut nefropati diabetik. Kadar glukosa darah yang tinggi pada penderita DM akan merusak saraf penderita terlebih lagi apabila prosesnya berlangsung lama. Kelainan saraf akibat DM disebut neuropati diabetik.

D. Penatalaksanaan Terapi Pada Penyakit DM

1. Insulin

Insulin berasal dari bahasa Latin *insula*, "pulau", karena diproduksi di Pulau-pulau Langerhans di pankreas adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Insulin merupakan suatu protein berukuran kecil dengan berat molekul 5808 pada manusia. Insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam pengendalian metabolisme. Insulin yang disekresikan oleh sel-sel β pankreas akan langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena porta, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang sudah sangat dikenal adalah membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel (Katzung 1994,674).

Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat, dan sebaliknya sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi energi sebagaimana seharusnya. Disamping fungsinya membantu transport glukosa masuk ke dalam sel, insulin mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap metabolisme, baik metabolisme karbohidrat dan lipid, maupun metabolisme protein dan mineral. Insulin akan meningkatkan

lipogenesis, menekan lipolisis, serta meningkatkan transport asam amino masuk ke dalam sel (Muchid 2005, 29). Insulin mempunyai peran dalam modulasi transkripsi, sintesis DNA dan replikasi sel. Itu sebabnya, gangguan fungsi insulin dapat menyebabkan pengaruh negative dan komplikasi yang sangat luas pada berbagai organ dan jaringan tubuh.

a. Prinsip Terapi Insulin

Terapi insulin merupakan satu keharusan bagi penderita DM Tipe 1 maupun tipe 2. Pada DM Tipe I, sel-sel β Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga tidak lagi dapat memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, maka penderita DM Tipe I harus mendapat insulin eksogen untuk membantu agar metabolisme karbohidrat di dalam tubuhnya dapat berjalan normal. Walaupun sebagian besar penderita DM Tipe 2 tidak memerlukan terapi insulin, namun hampir 30% ternyata memerlukan terapi insulin disamping terapi hipoglikemik oral.

Indikasi Terapi Insulin yaitu :

- a) Semua penderita DM Tipe 1 memerlukan insulin eksogen karena produksi insulin endogen oleh sel-sel β kelenjar pankreas tidak ada atau hampir tidak ada.
- b) Penderita DM Tipe 2 tertentu kemungkinan juga membutuhkan terapi insulin apabila terapi lain yang diberikan tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah

- c) Keadaan stres berat, seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan infark miokard akut atau stroke.
- d) Diabetes Gestasional dan penderita DM yang hamil membutuhkan terapi insulin, apabila diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah.
- e) Insulin seringkali diperlukan pada pengobatan ketoasidosis diabetik. hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik.
- f) Penderita DM yang mendapat nutrisi parenteral atau yang memerlukan suplemen tinggi kalori untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, secara bertahap memerlukan insulin eksogen untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal selama periode resistensi insulin atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan insulin.
- g) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat dan Kontra indikasi atau alergi terhadap OHO (Muchid 2005,30).

b. Penggolongan Sediaan Insulin

Untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan insulin yang tersedia, yang terutama berbeda dalam hal mula kerja (onset) dan masa kerjanya (duration).

Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin)
- b. Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting)
- c. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat
- d. Insulin masa kerja panjang (Long-acting insulin)

Keterangan dan contoh sediaan untuk masing-masing kelompok disajikan dalam tabel.

Tabel 1: Penggolongan Sediaan Insulin Berdasarkan Mula dan Masa Kerja

Jenis Sediaan Insulin	Mula Kerja (Jam)	Puncak (Jam)	Masa Kerja (Jam)
Masa kerja singkat (Short-acting/Insulin), disebut juga insulin regular	0,5	1-4	6-8
Masa kerja sedang	1-2	6-12	18-24
Masa Kerja sedang, mula kerja cepat	0,5	4-15	18-24
Masa kerja panjang	4-6	14-20	24-36

Respon individual terhadap terapi insulin cukup beragam, oleh sebab itu jenis sediaan insulin mana yang diberikan kepada seorang penderita dan berapa frekuensi penyuntikannya ditentukan secara individual, bahkan sering kali memerlukan penyesuaian dosis terlebih dahulu. Beberapa penderita usia lanjut memerlukan sejumlah insulin yang sama setiap harinya. Beberapa penderita mengalami resistensi terhadap insulin. Insulin tidak sepenuhnya sama dengan insulin yang dihasilkan oleh tubuh, karena itu tubuh bisa membentuk antibodi terhadap insulin pengganti. Antibodi ini mempengaruhi aktivitas insulin sehingga penderita dengan resistensi terhadap insulin harus meningkatkan dosisnya (Wahyuni 2008). Waktu paruh insulin pada orang normal sekitar 5-6 menit, tetapi memanjang pada penderita diabetes yang membentuk antibodi terhadap insulin. Gangguan fungsi ginjal yang berat akan mempengaruhi kadar insulin di dalam darah.

Beberapa sediaan insulin yang beredar di Indonesia seperti yang tersaji dalam table 2 di bawah ini

Tabel 2: Beberapa sediaan insulin yang beredar di Indonesia

Nama Sediaan	Golongan (Jam)	Mula Kerja (Jam)	Puncak	Masa Kerja (Jam)	Sediaan
Actrapid HM	Masa kerja Singkat	0,5	1-3	8	40 UI/ml
Actrapid HM Penfill	Masa kerja Singkat	0,5	2-4	6-8	100 UI/ml
Insulatard HM	Masa Kerja sedang, Mula kerja cepat	0,5	4-12	24	40 UI/ml
Insulatard HM Penfill	Masa Kerja sedang, Mula kerja cepat	0,5	4-12	24	100 UI/ml
Monotard HM	Masa Kerja sedang, Mula kerja cepat	2,5	7-15	24	40 UI/ml dan 100 UI/ml
Protamin Zinc Sulfat	Kerja Lama	4-6	14-20	24-36	
Humulin 20/80	Sediaan Campuran	0,5	1,5-8	14-16	40 UI/ml
Humulin 30/70	Sediaan Campuran	0,5	1-8	14-15	100 UI/ml
Humulin 40/60	Sediaan Campuran	0,5	1-8	14-15	40 UI/ml
Mixtard 30/70 Penfill	Sediaan campuran				100 UI/ml

Ket : Untuk tujuan terapi, dosis insulin dinyatakan dalam unit internasional (UI). Satu UI merupakan jumlah yang diperlukan untuk menurunkan kadar gula darah kelinci sebanyak 45 mg%. Sediaan homogen *human insulin* mengandung 25-30 U/mg (Muchid 2005,31-33)

c. Sistem Pemberian Insulin

Model standar insulin adalah suntikan subkutan dengan menggunakan jarum dan alat suntik (*syringe*) konvensional yang sekali pakai. Selama 3 dekade terakhir, telah banyak upaya yang dilakukan dalam eksplorasi cara pemberian yang lain.

- a) Alat Suntik Berukuran Pena yang Portabel : Untuk memudahkan pemberian suntikan insulin secara injeksi subkutan multiple, khususnya selama terapi insulin yang intensif, telah dikembangkan alat suntik berukuran pena yang portable. Alat suntik tersebut mengandung cartridge insulin manusia U100 yang dapat diganti dan jarum yang dapat ditarik kembali. Pena insulin yang hanya sekali pakai juga tersedia untuk formulasi tertentu. Alat tersebut tersedia untuk insulin regular, insulin NPH dan insulin pra-campuran dengan NPH 70%. Alat tersebut diterima dengan baik oleh pasien karena tidak perlu membawa alat suntik dan botol insulin ke tempat kerja dan ketika dalam perjalanan.
- b) Alat Infus Insulin Subkutan yang Kontinu (Pompa Insulin) : Alat infuse insulin subkutan yang dapat secara kontinu memasukkan insulin yang merupakan metode pemberian insulin “lengkung terbuka (open loop)” eksternal. Alat tersebut memiliki pompa yang deprogram secara manual yang dapat menyediakan pengganti insulin basal dan insulin bolus secara individual berdasarkan hasil pantauan glukosa darah diri sendiri. Pada keadaan normal, latar belakang kecepatan basal 24 jam relatif konstan dari hari ke hari, meskipun perubahan kecepatan yang bersifat sementara dapat dilakukan untuk menyelesaikan perubahan dalam jangka pendek menurut keperluan. Salah satu contoh adalah untuk menurunkan kecepatan pemberian basal untuk beberapa jam karena terjadi kepekaan insulin yang meningkat sehubungan dengan aktifitas yang meningkat atau yang berlangsung lama. Sebaliknya, jumlah bolus seringkali bervariasi dan digunakan untuk memperbaiki kadar glukosa darah

yang tinggi dan untuk mendapatkan kebutuhan insulin pada jam makan berdasarkan kandungan karbohidrat makanan serta aktifitas yang dilakukan. Pompa tersebut-yang memiliki suatu cadangan (reservoir) insulin, chip program, papan kunci, dan layar display-dalam ukuran kira-kira sebesar penyeranta (pager). Pompa tersebut biasanya diletakkan pada ikat pinggang atau didalam kantong, dan insulin diinfus melalui selang plastik tipis yang dihubungkan pada set infus yang dipasang subkutan.

- c) Insulin Inhalasi : Sedang dilakukan penelitian klinis untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi formulasi insulin bubuk dan aerosol yang diberikan dengan dihirup/inhalasi. Insulin dengan mudah diabsorpsi ke dalam aliran darah melalui dinding alveolar, tetapi tantangannya adalah menciptakan partikel yang cukup kecil untuk dapat melewati cabang bronchial tanpa terjebak dan masih dapat memasuki alveoli dalam jumlah yang cukup untuk mendapatkan efek klinis. Insulin yang diberikan dengan cara hirupan seyogyanya memiliki mula kerja yang cepat dan masa kerja yang relatif singkat. Insulin hirup tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan insulin pada waktu makan atau untuk memperbaiki kadar glukosa yang tinggi tetapi tidak dapat memberikan pencakupan insulin latar belakang ataupun basal (Katzung 1994,687).

2. Obat Hipoglikemik Oral

Secara umum DM dapat diatasi dengan obat –obat antidibetes yang secara medis disebut obat hipoglikemik oral (OHO). OHO tidak boleh sembarangan dikonsumsi karena dikhawatirkan penderita menjadi

hipoglikemia. Pasien yang mungkin berespon terhadap obat hipoglikemik oral adalah mereka yang diabetesnya berkembang kurang dari 5 tahun. Pasien yang sudah lama menderita diabetes mungkin memerlukan suatu kombinasi obat hipoglikemik dan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah menjadi normal.

Obat –obat hipoglikemik oral dibagi atas 5 golongan :

a. Golongan Sulfonilurea

Sulfonilurea menstimulasi sel-sel beta pulau langerhans, sehingga sekresi insulin ditingkatkan. Selain itu kepekaan sel-sel beta bagi kadar glukosa darah juga diperbesar melalui pengaruhnya atas protein transpor glukosa. Obat ini hanya efektif pada penderita diabetes Tipe 2 yang tidak begitu berat, yang sel-sel betanya masih bekerja cukup baik. Ada indikasi bahwa obat-obat ini juga memperbaiki kepekaan organ tujuan bagi insulin dan menurunkan absorpsi insulin oleh hati. Mekanisme kerja obat golongan sulfonilurea adalah menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa.

b. Golongan biguanide

Biguanide tidak merangsang sekresi insulin dan menurunkan kadar glukosa darah sampai normal (euglikemi) dan tidak pernah menyebabkan hipoglikemia. Efek samping yang terjadi adalah muntah, kadang-kadang diare, oleh karena itu lebih baik diberikan kepada pasien yang gemuk, sebab

tidak merangsang sekresi insulin. Metformin adalah satu-satunya golongan biguanide yang tersedia, bekerja menghambat glukoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Obat ini hanya efektif bila terdapat insulin endogen. Kelebihan dari golongan biguanide adalah tidak menaikkan berat badan, dapat menurunkan kadar insulin plasma dan tidak menimbulkan masalah hipoglikemia.

c. Golongan penghambat alfa glukosidase

Obat ini merupakan obat oral yang biasanya dengan dosis 150-600 mg/hari yang menghambat lafa glukosidase, suatu enzim pada lapisan sel usus yang mempengaruhi digesti sukrosa dan karbohidrat kompleks. Obat ini bila terdapat resistensi insulin gerak badan secara teratur (olahraga) dapat menguranginya. Hasilnya, insulin dapat dipergunakan secara baik oleh tubuh dan dosisnya pada umumnya dapat diturunkan.

d. Thiazolidinedione

Obat ini bekerja pada otot, lemak dan liver untuk menghambat pelepasan gula dari jaringan penyimpanan sumber gula darah tersebut. Golongan obat thizolidinedione dapat digunakan bersama sulfonilurea, insulin dan metformin untuk menurunkan kadar glukosa darah.

e. Meglitinida

Bekerja pada pankreas seperti kelompok sulfonilurea, tetapi dengan cara kerja yang berbeda. obat ini memiliki kerja yang sangat cepat,

konsentrasi dan efek puncak dalam waktu 1 jam. Digunakan untuk mengontrol perjalanan glukosa pasca-prandial. Digunakan hati-hati pada pasien gangguan hati jantung (Tjay dan Rahardja 2002, 716).

Obat anti diabetes oral bisa dikombinasikan satu dengan kelompok yang lain, atau kadang perlu dikombinasikan dengan insulin. Tujuan kombinasi ini adalah agar efek obat lebih optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah. Apabila dua obat kombinasi masih belum berhasil baik, dokter bahkan boleh meresepkan tiga jenis obat sekaligus, karena cara kerjanya bisa bersama saling menguntungkan untuk menurunkan kadar glukosa darah.

3. Keefektifan Penggunaan Suatu Obat

Salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pengobatan atau terapi adalah penggunaan obat sesuai yang diharapkan (keefektifan dari obat yang diberikan). Penggunaan obat yang efektif merupakan penggunaan obat dimana pasien dapat menerima terapi atau obat yang diberikan yang sesuai dengan kebutuhan kliniknya, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individual masing-masing, selama periode waktu yang memadai dan memberi biaya terendah bagi pasien dan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan obat yang tidak sesuai dapat menyebabkan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pasien akibat atau diduga akibat terapi obat sehingga kenyataan atau potensial mengganggu keberhasilan yang diharapkan. Keefektifan suatu obat dapat dinyatakan berhasil jika

penggunaan obat yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan (Yuni 2001, 32). Keefektifan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya (Hartina 2004, 24).

4. Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap.

Sesuai dengan kemampuan tenaga dan fasilitas yang berbeda-beda maka kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah rumah sakit berbeda pula. Namun demikian kegiatan pokok Rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan penyakit yang menular
- b. Pengumpulan dan analisa data epidemiologis wilayah kota atau kabupaten
- c. Perencanaan sektor kesehatan kota atau kabupaten
- d. Pengaturan dan perizinan
- e. Kesehatan lingkungan
- f. Kesehatan kerja dan kesehatan industri

Pelayanan Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi dalam menghadapi persaingan global. Dalam hal rujukan medik, rumah sakit juga diandalkan untuk memberikan pengayoman medik (pusat rujukan) untuk pusat-pusat yang ada diwilayah kerjanya.

5. Rekam Medik

Rekam Medik merupakan komponen paling penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen rumah sakit. Rekam medik harus mampu menyajikan informasi lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di rumah sakit, baik di masa lalu, masa kini, maupun perkiraan di masa datang tentang apa yang akan terjadi.

Kegunaan Rekam Medik adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Merencanakan
- c. Bukti tertulis
- d. Data yang berguna
- e. Data didalam perhitungan
- f. Kepentingan hukum
- g. Dokumentasi (Siregar dan Lia 2004, 27)

E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penemuan insulin lebih dari 80 tahun yang lalu merupakan salah satu penemuan terbesar dalam dunia kedokteran pada abad ke-20. Saat ini, penggunaan insulin mengalami kemajuan yang pesat. Beberapa kemajuan itu antara lain dalam hal jumlah penggunaan insulin, perbaikan mutu insulin dan pola penggunaan insulin yang diberikan dalam penurunan kadar glukosa darah pada pasien hiperglikemia.

Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit progresif dengan karakteristik penurunan fungsi sel beta pankreas. Seiring meningkatnya angka kejadian DMT2, terutama pada orang berusia relatif muda dan kemungkinan usia hidup masih panjang, maka semakin banyak pasien DMT2 dengan defisiensi insulin maka pada kasus-kasus tersebut, akan dibutuhkan insulin dalam penatalaksanaannya.

Dalam penelitian ini cakupan permasalahan dibatasi pada pasien diabetes tipe 2 rawat inap yang memiliki catatan medik yaitu mencakup umur, jenis kelamin, sediaan insulin yang diberikan, kadar glukosa darah awal diagnosa, dan kadar glukosa darah akhir (yang tercantum pada akhir rawat inap pasien) yang hasil pemeriksaannya tercatat lengkap pada status pasien pada bagian Rekam Medik di Rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo selama tahun 2008.

1. Diabetes melitus tipe 2

Adalah diagnosis seperti yang tercantum pada buku status pasien rawat inap di Rumah sakit Dr. wahidin Sudirohusodo Makassar selama tahun 2008.

2. Jenis kelamin

Adalah identitas subjek berdasarkan organ reproduksinya. Tujuan pengukuran ini adalah melihat distribusi identitas pasien yang paling banyak mengidap diabetes tipe 2 dan mendapat terapi insulin.

Kriteria objektif:

1. Laki-laki
2. Perempuan

3. Umur

Adalah lamanya hidup seseorang sejak dilahirkan sampai sekarang yang dinyatakan dalam satuan tahun. Umur saat diagnosa diabetes adalah umur saat pertama kali didiagnosa diabetes melitus yang tercatat pada buku status pasien. Tujuan pengukuran ini adalah melihat distribusi umur pasien yang terkena penyakit diabetes dan mendapat terapi insulin.

Kriteria objektif

1. 30-40 tahun
2. 41 -50 tahun
3. > 50 tahun

4. Pola penggunaan insulin

Dalam penelitian ini, pola penggunaan insulin yang dimaksud adalah adanya pemakaian insulin secara tunggal, insulin campuran (kombinasi insulin manusia seperti 70 % isofane dan 30 % reguler) atau kombinasi insulin dengan obat hipoglikemik oral.

5. Kadar Glukosa Darah

a. Kadar Glukosa Darah Awal

Adalah kadar gula darah penderita diabetes tipe 2 yang diukur saat pasien masuk rumah sakit dan dinyatakan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium. Kadar glukosa darah yang diukur adalah kadar Glukosa Darah Sewaktu, yang tercantum pada buku status pasien. Gejala klasik DM jika gula darah sewaktu (GDS) ≥ 200 mg/dl.

b. Kadar Glukosa Darah Akhir

Adalah pemeriksaan kadar glukosa darah penderita diabetes tipe 2 pada akhir rawat inap yang tercantum pada buku status pasien (rekam medik). Tujuan pengukuran ini yaitu untuk melihat keefektifan dari pola penggunaan insulin yang diberikan (insulin, insulin campuran dan insulin kombinasi metformin (OHO)), dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2, selama rawat inap.

Keefektifan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Dalam penelitian ini, efektifitas terapi yang diukur adalah persentase penurunan kadar glukosa darah sewaktu. Penggunaan suatu obat dikatakan efektif jika $\geq 50\%$ jumlah pasien dapat mencapai sasaran indikasi yang diharapkan. Sasaran yang diharapkan untuk penderita diabetes tipe 2 yaitu kadar glukosa darah sewaktu dengan

kisaran normal yaitu 110-140 mg/dl Pengukuran dilakukan dengan melihat kadar glukosa darah sewaktu (GDS) pada akhir rawat inap pasien (Yuni 2001, 32).

Kriteria objektif :

1. Normal (normoglikemik) : jika kadar glukosa darah sewaktu yaitu berkisar 110-140 mg/dl
2. Buruk (hiperglikemik) : jika kadar glukosa darah sewaktu berkisar ≥ 200 mg/dl.
3. Terganggu : Jika kadar glukosa darah berkisar antara 141-199 mg/dl
4. Rendah (Hipoglikemia) : Jika Kadar Glukosa darah < 110 mg/dl
6. Komplikasi penyakit yaitu penyulit yang menyertai penyakit diabetes ,seperti yang tercantum pada status pasien diabetes tipe 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan melakukan pengambilan data dari rekam medik pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi insulin.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di rumah sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar khususnya dibagian rekam medik, pada bulan Oktober - Nopember 2009.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien diabetes tipe 2 yang berobat di Rumah sakit Dr.wahidin Sudirohusodo Makassar pada tahun 2008.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pasien diabetes tipe 2 yang memiliki rekam medik dan menggunakan pengobatan terapi insulin pada tahun 2008.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi yaitu data sekunder diperoleh dari rekam medik berdasarkan objek penelitian pada

pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo selama tahun 2008.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan dan dianalisis dengan rumus persentase berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan Oktober-November 2009 dan dari 287 kasus diabetes mellitus tipe 2 ditemukan sampel sebanyak 186 kasus yaitu pasien diabetes rawat inap yang menggunakan terapi insulin. Pola penggunaan insulin yang diberikan yaitu insulin kerja pendek (monoterapi), insulin campuran dan insulin kombinasi metformin (OHO). Berdasarkan data sekunder yang didapatkan pada rekam medik di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar maka dilakukan pengolahan data dalam bentuk tabel disertai penjelasan.

1. Jenis kelamin

Tabel 1. Distribusi Penderita Diabetes Melitus Tipe Berdasarkan Jenis kelamin di Rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama Tahun 2008

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	81	43,5
Perempuan	105	56,5
Jumlah	186	100%

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel di atas, penderita DMT2 yang menggunakan insulin berdasarkan jenis kelamin yaitu tertinggi perempuan sebanyak 105 orang (56,5%) dan laki-laki 81 orang (43,5%).

2. Umur

Tabel 2. Distribusi Penderita Diabetes mellitus tipe 2 Berdasarkan Umur, di Rumah Sakit Dr. wahidin Sudirohusodo Makassar selama Tahun 2008.

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
30- 40	19	10,2
41- 50	55	29,6
>50	112	60,2
Jumlah	186	100%

Sumber : Data Sekunder

Ditinjau dari segi umur pasien, yang menggunakan insulin maka data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah tertinggi yaitu 112 kasus (60,2 %) terletak pada kelompok umur diatas 50 tahun, yang terendah pada kelompok umur 30-40 tahun yaitu 19 kasus (10,2 %) dan untuk kelompok 41-50 tahun sebanyak 55 kasus (29,6%).

3. Kadar Glukosa Darah Awal Diagnosa

Tabel 3. Distribusi Penderita Diabetes Tipe 2 Berdasarkan Kadar Glukosa Darah Awal diagnosa di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Selama Tahun 2008.

mg/dl	Frekuensi	Persentase (%)
200- 300	131	70,4
301-400	47	25,2
>400	8	4,4

Sumber : Data Sekunder

Data pada tabel 3, memperlihatkan frekuensi terbanyak yaitu (70,4 %) pasien dengan kisaran kadar glukosa darah awal diagnosa 200-300 mg/dl, 47 (25,2%) pasien dengan kadar glukosa 301-400 mg/dl dan 8 (4,4%) pasien dengan kadar glukosa darah diatas 400 mg/dl.

4. Pola penggunaan Insulin

Tabel 4. Distribusi Penggunaan insulin oleh Penderita DMT2 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Selama Tahun 2008

Pola penggunaan Insulin	Frekuensi	Persentase (%)
Insulin (Kerja Pendek)	63	33,9
Insulin + Metformin	37	19,9
Insulin Campuran	86	46,2
Jumlah	186	100 %

Sumber : Data Sekunder

Data pada tabel 4 memperlihatkan bahwa penggunaan insulin yang banyak diberikan yaitu insulin campuran sebesar 46,2% (82 pasien) insulin kerja pendek sebesar 33,9% dan terendah pada penggunaan insulin kombinasi metformin sebesar 19,9%

5. Kadar Glukosa Darah Akhir

Tabel 5a. Distribusi Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 yang menggunakan terapi Insulin (Insulin short Acting, Insulin campuran dan Kombinasi Insulin Metformin) Berdasarkan Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Akhir di RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2008

Pola Penggunaan Insulin	Baik (Normoglikemik)		Buruk (Hiperglikemik)	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Insulin (kerja pendek)	16	25,4	35	55,6
Insulin + Metformin	28	75,7	6	16,2
Insulin Campuran	56	65,1	12	13,9

Sumber : Data Sekunder

Tabel 5a, memperlihatkan jumlah pasien DMT2 yang memiliki kadar glukosa normoglikemik (baik) setelah pemberian insulin kerja pendek yaitu 16 (25,4%) pasien, untuk insulin campuran sebanyak 65,1 % dan untuk insulin kombinasi metformin sebanyak 75,7%.

Tabel 5b. Distribusi Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 yang menggunakan terapi Insulin (Insulin short Acting, Insulin campuran dan Kombinasi Insulin Metformin) Berdasarkan Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Akhir di RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2008

Pola Penggunaan Insulin	Rendah (Hipoglikemia)		Terganggu	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Insulin (kerja pendek)	-	-	12	19,0
Insulin + Metformin	3	12,8	7	8,1
Insulin Campuran	11	8,0	-	-

Sumber : Data Sekunder

Data tabel 5b, memperlihatkan jumlah pasien diabetes yang mengalami hipoglikemia yaitu 11 pasien pada penggunaan insulin campuran dan 3 pasien pada penggunaan insulin kombinasi metformin..

6. Komplikasi Penyakit

Tabel 6. Distribusi penderita DMT 2 berdasarkan Komplikasi penyakit di RS.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008.

Komplikasi	Frekuensi	Persentase (%)
Ketoasidosis	13	6,98
Gangren/ Ulkus Diabetik	63	33,9
Hipertensi	92	49,5
TB. Paru	10	5,4
Neuropati	8	4,3

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 7 diatas, hipertensi merupakan komplikasi yang terbanyak ditemukan pada pasien diabetes tipe 2 yaitu sebanyak 92 kasus (49,5%), gangren (33,9%) ketoasidosis (6,98%), neuropati (4,3%) dan TB paru (5,4%).

B. Pembahasan

Telah dilakukan penelitian tentang Analisis Penggunaan Insulin pada Penderita Diabetes Tipe 2 di Rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dimana dalam penelitian ini yang diteliti adalah jumlah pasien Diabetes tipe 2 yang mendapat terapi insulin mencakup umur , jenis kelamin, kadar glukosa darah

awal diagnosa, pola penggunaan insulin yang diberikan untuk mencapai kadar glukosa darah yang normal, dan kadar glukosa darah akhir yang pemeriksaannya tercantum pada buku status pasien (rekam medik). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sampel yaitu jumlah penderita diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi insulin sebanyak 186 kasus (64,8 %). Terdapat 3 pola penggunaan insulin yang diberikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu penggunaan insulin kerja pendek (monoterapi), insulin campuran (bensi 30% soluble insulin & 70% isophane (NPH) insulin) dan insulin kombinasi dengan metformin (OHO).

1. Jenis Kelamin

Data pada tabel 2 menunjukkan dari 186 pasien diabetes melitus tipe 2 yang menggunakan terapi insulin terdapat 81 laki- laki (43,5%) dan 105 perempuan (56,5%). Lebih banyak perempuan yang mengidap diabetes tipe 2 di banding laki- laki. Hal ini disebabkan karena perempuan yang mengidap diabetes cenderung yang mengalami obesitas (kegemukan), tumpukan lemak banyak dan kurang melakukan gerak badan atau aktivitas fisik. Sesuai dengan hasil studi dari Nelson R.G dan Everhart J.E di Amerika, bahwa tidak ada bukti bahwa pengaruh jenis kelamin sebagai suatu resiko untuk menderita diabetes melitus tipe 2 (Hartina 2004,39).

2. Umur

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa diantara 186 kasus pasien diabetes melitus tipe 2, angka tertinggi didapatkan pada kelompok umur di atas

50 tahun yaitu sebanyak 112 kasus (60,2%) diikuti dengan penderita dengan kelompok umur 41-50 sebanyak 55 kasus (29,6 %) dan yang terendah pada kelompok umur 30-40 tahun yaitu 19 kasus (10,2%). Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan adanya kecenderungan jumlah kasus diabetes tipe 2 yang meningkat dengan meningkatnya umur.

Tingginya angka penderita diabetes mellitus tipe 2 pada usia 40 tahun keatas disebabkan karena diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang bersifat progresif. Faktor umur dianggap penting terhadap kejadian diabetes tipe 2, hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor yaitu salah satunya umur tua (proses degeneratif). Hal ini sesuai yang di Firmankan Allah Swt dalam AlQuran:

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). (Q.S. Yasin(36):68)

Maksud "dikembalikan pada kejadiannya" pada ayat diatas adalah kembali menjadi lemah dan kurang akal. Dari ayat diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa, semakin bertambah umur seseorang maka fungsi organ tubuhnya pun akan menjadi lemah, akibatnya cenderung terserang berbagai macam penyakit (Zahruni dan Nur Riani 2003,66). Menurut salah satu studi di Amerika, diperkirakan dengan meningkatnya umur seseorang, maka produksi insulin dalam tubuh pun berkurang, sehingga perlu diberikan insulin luar

(eksogen). Pemberian insulin eksogen ini diupayakan semaksimal mungkin menyerupai produksi insulin alamiah pada orang sehat dengan tujuan mengontrol kadar glukosa darah agar tetap pada kisaran normal yaitu kadar glukosa darah puasa 90-110 mg/dl atau kadar glukosa darah sewaktu 110-140 mg/dl (Yuni 2001, 44).

3. Kadar Glukosa Darah Awal Diagnosa

Dari hasil penelitian, menunjukkan jumlah penderita diabetes tipe 2 dengan kadar glukosa awal diagnosa, lebih banyak dengan kisaran 200-300 mg/dl yaitu 131 pasien (70,4%), 47 pasien (25,2%) dengan kisaran 300-400 mg/dl dan 8 pasien (4,4 %) dengan kadar glukosa di atas 400 mg/dl. Tingginya kadar glukosa darah pasien yang terdiagnosa diabetes tipe 2 disebabkan oleh pola diet dan gaya hidup pasien yaitu tidak memperhatikan makanan, kurang melakukan aktivitas fisik (olahraga), sehingga kurang terjadi pembakaran glukosa di dalam tubuhnya, maka akibatnya glukosa disimpan menjadi cadangan glukosa dan timbunan lemak, dengan sendirinya memerlukan banyak hormon insulin untuk mengelolanya.

Kebutuhan yang berlebihan akan memacu sel beta pancreas untuk menghasilkan insulin sebagai kompensasi tubuh. Ketika tubuh tidak membuat cukup insulin maka akan ada perbedaan dalam tingkat glukosa dalam darah yang akhirnya menyebabkan diabetes dan hiperglikemia.

4. Kadar Glukosa Darah Akhir

Berdasarkan hasil penelitian dari kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus tipe 2 yaitu dengan melihat kadar glukosa darah akhir rawat inap pasien yang tercantum pada buku status pasien, didapatkan jumlah pasien yang mengalami penurunan kadar glukosa darah secara normal untuk pemakaian insulin kerja singkat yaitu sebesar 25,4% (dari 63 pasien). Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang diperoleh (Tabel 5a), dimana jumlah penderita diabetes tipe 2 yang diberikan insulin kerja pendek ternyata lebih banyak yang belum mencapai sasaran kadar glukosa darah yang diharapkan.

Penggunaan insulin kerja pendek ini dimaksudkan untuk menurunkan kadar glukosa darah setelah makan serta dengan fungsi membantu mengubah glukosa atau karbohidrat menjadi sumber energi dan mensintesa lemak sehingga glukosa tidak bertumpuk di dalam darah. Dari 63 pasien diabetes tipe 2 yang diberikan insulin kerja pendek (monoterapi) terdapat 35 kasus (55,6%) yang masih memiliki kadar glukosa darah yang buruk (hiperglikemia) yaitu diatas 200 mg/dl, dan 12 pasien (19,0 %) dengan kadar glukosa darah yang terganggu. Sedangkan untuk penggunaan insulin kombinasi metformin, ditemukan jumlah pasien yang mencapai sasaran kadar glukosa darah normal yaitu, sebesar 75,7% (28 pasien), 6 pasien (16,2 %) dengan kadar glukosa darah yang buruk, dan 11 pasien (12, 8%) yang mengalami hipoglikemia.

Keuntungan menggunakan metformin adalah dapat mengurangi peningkatan berat badan yang sering ditemukan pada pasien yang mendapat

terapi insulin. Penggunaan insulin kombinasi dengan metformin dapat memberikan efek yang saling menguntungkan bagi pasien yang memiliki kadar glukosa darah yang tinggi serta pasien dengan over obesitas (Hartina 2004, 46).

Dari 86 jumlah penderita yang diberikan insulin campuran. Insulin campuran ini mengandung bensi 30% soluble insulin & 70% isophane (NPH) insulin. Dari data penggunann insulin ditemukan jumlah pasien yang mencapai sasaran kadar glukosa darah normal pada akhir rawat inap yaitu sebesar 65,1% (56 pasien). Terdapat 12 pasien (13,9%) yang masih memiliki kadar glukosa darah yang buruk serta terdapat 3 pasien yang memiliki kadar glukosa darah yang rendah (hipoglikemia).

Dari ketiga pola penggunaan insulin yang diberikan, terdapat sejumlah pasien yang masih memiliki kadar glukosa darah yang buruk (hiperglikemia), seperti pada pemakaian insulin kerja pendek. Selain itu, terjadi efek samping yaitu hipoglikemia pada beberapa pasien yang diberikan insulin campuran dan insulin kombinasi metformin. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan medikasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan yaitu penggunaan obat yang kurang rasional.

Salah satu pola pengobatan yang kurang rasional adalah penggunaan suntikan yang berlebihan dimana seharusnya pengobatan secara oral (diminum), dapat digunakan. Dalam hubungan itu, maka yang perlu dievaluasi untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2 yaitu kerasionalan dari insulin yang diberikan. Penggunaan insulin yang diberikan secara terus-menerus dapat

menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan yaitu hipoglikemia. Efek samping lain yang timbul dengan penggunaan insulin yang berkelanjutan adalah dapat menyebabkan reaksi imun yang menimbulkan alergi insulin atau resistensi insulin yang dapat berakibat fatal bagi pasien.

Dari hasil data yang diperoleh, masih terdapat sejumlah pasien yang masih memiliki kadar glukosa darah yang buruk, hal ini dapat terjadi akibat dosis yang diberikan tidak sesuai dan keadaan yang tidak dijangkau peneliti yaitu adanya pengaruh kombinasi insulin dengan obat-obat lain yang diberikan (obat hipertensi, TB.Paru dan obat lainnya) yang menyebabkan interaksi obat, sehingga keefektifan dari insulin yang diberikan berkurang.

Adapun komplikasi penyerta dari penderita diabetes tipe 2 yaitu terbanyak gangren 63 kasus (33,9%), hipertensi 92 kasus (49,5%), ketoasidosis (6,98%), TB. Paru (5,3%) dan neuropati diabetikum (4,3%). Lebih banyak penderita yang mengalami hipertensi sebagai akibat dari komplikasi.

Penelitian yang dilakukan Clarke di Amerika melaporkan bahwa 73 % dari penderita diabetes mempunyai tekanan darah yang tinggi. Ini karena hiperglikemia pada diabetes melitus mengakibatkan deposit kolesterol pada intima pembuluh darah yang menyebabkan atherosklerosis dan kemudian mengakibatkan tekanan darah tinggi (Syamsuddin 2006, 49). Komplikasi diabetes mellitus dapat terjadi melalui berbagai cara yakni akibat adanya kelainan metabolisme pada diabetes disebabkan karena insulin tubuh tidak

bekerja dengan baik. Kondisi ini membawa terjadinya hiperglikemia yang diikuti berbagai kejadian lain sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang tidak diharapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persentase penderita diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan terapi insulin di Rumah sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar selama tahun 2008 cukup besar, yaitu 64,8 % dari 287 jumlah seluruh penderita diabetes tipe 2.
2. Dari ketiga pola penggunaan insulin yang diberikan hanya penggunaan insulin campuran dan insulin kombinasi metformin yang sudah efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus tipe 2.

B. Implikasi Penelitian

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang kerasionalan penggunaan obat pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Quranul Karim. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung, 2008
- Budiarto,Eko. *Biostatistik: Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta Buku Kedokteran EGC, 2001.
- Corwin,Elizabeth J. *Buku saku patofisiologi*.Departemen kesehatan Republik Indonesia. Buku Kedokteran EGC.Jakarta, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQuranul Karim : AlQur'an dan Terjemahannya*. Syamil Cipta Media : Jakarta, 2001.
- Ganiswarna, S.G. *Famakologi dan Terapi*, Edisi IV. Jakarta :Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,2005.
- Hartina. *Pola penggunaan obat pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar*. Skripsi Farmasi Unhas,tidak diterbitkan, 2004.
- Katzung,B.G. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Edisi Kedelapan.Jakarta. Salemba Medika, 2000.
- Muchid,Abdul, et al.,eds. *Pharmaceutical Care Untuk Diabetes Mellitus*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005.[http://125.160.76.194/bidang/yanmed/farmasi/pharmaceutical/DM.pdf\(23 Agustus 2010\)](http://125.160.76.194/bidang/yanmed/farmasi/pharmaceutical/DM.pdf(23%20Agustus%202010))
- Mutschler,E. *Dinamika Obat Buku Ajar Farmakologi dan Toksikologi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Mathilda,.W dan Anna,R. Penerbit ITB Bandung, 1991.
- Pratiwi,Harni. *Survei Penggunaan Insulin di Rumah Sakit*.
<http://www.survei.go.id/index.pdf?penggunaaninsulin=net> (diakses 27 sept.2009)
- Price ,Sylvia A.,dan Lorraine Wilson. *Patofisiologi: Konsep Proses-Proses Penyakit*. Edisi Keenam Vol 2.Terjemahan oleh Brahm U, dan Huriawati Hartanto. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 2005.
- Rahman, Afzalur. *AlQuran: Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta. Rineka Cipta,1992.

- Rubeinstein,D,David Wayne dan John. *Lecture Notes: Kedokteran Klinis*.Edisi Keenam. Diterjemahkan oleh Annisa,R. Surabaya. Erlangga, 2007.
- Setiawan,Adi,dr.*Penderita Diabetes Terus Alami Kenaikan*.JurnalNetDepkominfo.(November13) [Web.dev.defkominfo.go.id/.../2008/.../penderita-diabetes-terus-alami-kenaikan-/](http://web.dev.defkominfo.go.id/.../2008/.../penderita-diabetes-terus-alami-kenaikan-/). (akses 23 Sept 2009)
- Siregar J.P,Charles dan Lia A. *Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC.2004
- Soegondo,S. *Jumlah Penderita Diabetes Indonesia Rangking ke 4 Dunia*. Artikel Kesehatan edisi 05 september 2005. <http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=1183&itemid=2>.(Diakses 20 Agustus2009
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan AL-Quran: Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung. Mizan, 1994.
- Syamsuddin, Kamal. *Karakteristik Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Kuala Lumpur Malaysia*. Skripsi Kedokteran Unhas, tidak diterbitkan,2004.
- Syauqi, al Fanjari Ahmad. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Bumi Aksara,1996.
- Tan Hoan Tjay dan Rahardja,Kirana. *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*,Edisi V. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo.2002
- Yuni, Lina Wulan. *Tinjauan Penggunaan Insulin pada Pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*. Skripsi Unhas, tidak diterbitkan, 2001.
- Wahyuni,T,2008. Diabetes Mellitus Pemberian Insulin Yang Tepat. <http://www.suara-karya-online.com/news.html?id=197709>.Diakses 21 agustus 2009
- Wardhana Sucipto,Krishna. *Jenis,Kerja dan Pemakaian Insulin*. Sub bagian Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran.<http://Wardhana.wordpress.com/2008/06/23/jenis-kerja-dan-pemakaian-insulin/>(akses 29 sept 2009)
- Zahruni, dan Nur Riani. *Islam untuk Disiplin Ilmu: Kesehatan dan Kedokteran 2*. Fiqh Kontemporer. Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Jakarta, 2003.

Lampiran :Perhitungan

1. Umur

Tabel 1a.: Distribusi penderita DMT2 yang menggunakan insulin kerja pendek berdasarkan umur, di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

Umur (Tahun)	Frekuensi
30-40	7
41-50	38
> 50	18

Tabel 1b: Distribusi penderita DMT2 yang menggunakan insulin Campuran berdasarkan umur, di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun2008

Umur (Tahun)	Frekuensi
30-40	4
41-50	9
> 50	73

Tabel 1c: Distribusi penderita DMT2 yang menggunakan kombinasi Insulin Metformin berdasarkan umur, di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

Umur (Tahun)	Frekuensi
30-40	8
41-50	8
> 50	21

2. Kadar glukosa darah awal diagnosa

Tabel 2a: Distribusi penggunaan insulin kerja pendek berdasarkan kadar glukosa darah awal diagnosa pada penderita DMT2 di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

mg/dl	Frekuensi
200-300	39
301-400	24
> 400	-

Tabel 2b: Distribusi penggunaan insulin campuran berdasarkan kadar glukosa darah awal diagnosa pada penderita DMT2 di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

mg/dl	Frekuensi
200-300	5
301-400	73
> 400	8

Tabel 2c: Distribusi penggunaan insulin kombinasi metformin berdasarkan kadar glukosa darah awal diagnosa pada penderita DMT2 di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

mg/dl	Frekuensi
200-300	3
301-400	34
> 400	-

Lampiran 3 :
Perhitungan jumlah pasien yang mencapai sasaran kadar glukosa darah normal yaitu;

1. Insulin short acting:

$$\text{Normoglikemik} = \frac{\text{jumlah penderita dengan kadar glukosa darah normal} \times 100\%}{\text{Jumlah pemakai insulin short acting}}$$

$$= \frac{16 \times 100\%}{63}$$

$$= 25,4 \%$$

$$\text{Buruk (Hiperglikemik)} = \frac{\text{Jumlah penderita dengan kadar glukosa darah buruk} \times 100\%}{\text{Jumlah pemakai insulin short acting}}$$

$$= \frac{35 \times 100\%}{63}$$

$$= 55,6 \%$$

$$\text{Terganggu} = \frac{\text{jumlah pasien dengan kadar glukosa darah terganggu} \times 100\%}{\text{Jumlah pemakai insulin short acting}}$$

$$= \frac{12 \times 100\%}{63}$$

$$= 19,0 \%$$

2. Insulin kombinasi Metformin

$$\text{Normoglikemik} = \frac{\text{jumlah penderita dengan kadar glukosa darah normal} \times 100\%}{\text{Jumlah pemakai insulin + metformin}}$$

$$= \frac{28 \times 100\%}{37}$$

$$= 75,7 \%$$

$$\text{Buruk (Hiperglikemik)} = \frac{\text{Jumlah penderita dengan kadar glukosa darah buruk}}{100\%}$$

Jumlah pemakai insulin + metformin

$$= \frac{6 \times 100\%}{37}$$

$$= 16,2 \%$$

$$\text{Rendah (hipoglikemia)} = \frac{\text{jumlah pasien dengan kadar glukosa darah terganggu}}{x 100\%}$$

Jumlah pemakai insulin + metformin

$$= \frac{3 \times 100\%}{37}$$

$$= 8,0 \%$$

3. Insulin campuran

$$\text{Normoglikemik} = \frac{\text{jumlah penderita dengan kadar glukosa darah normal}}{100\%}$$

Jumlah pemakai insulin campuran

$$= \frac{56 \times 100\%}{86}$$

$$= 65,1 \%$$

$$\text{Buruk (Hiperglikemik)} = \frac{\text{Jumlah penderita dengan kadar glukosa darah buruk}}{100\%}$$

Jumlah pemakai insulin campuran

$$= \frac{12 \times 100\%}{86}$$

$$= 13,9 \%$$

$$\text{Terganggu} = \frac{\text{jumlah pasien dengan kadar glukosa darah terganggu}}{100\%}$$

Jumlah pemakai insulin campuran

$$= \frac{7 \times 100\%}{86}$$

$$= 8,1 \%$$

$$\text{Rendah (hipoglikemia)} = \frac{\text{jumlah pasien dengan kadar glukosa darah terganggu}}{x 100\%}$$

Jumlah pemakai insulin campuran

$$= \frac{11 \times 100\%}{86}$$

$$= 12,8 \%$$

4. Sediaan Insulin

Sediaan insulin yang diberikan pada penderita DMT2 di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2008

Merk Insulin	Sediaan Insulin
Actrapid Novolet	Kerja pendek
Actrapid HM	Kerja Pendek
Humulin	Campuran
Mixtard Hm Penfill	Campuran



MASTER TABEL

No. Reg.	JK	Umur	Penggunaan	GDS, GDP, GDPP saat diagnosa	GDS, GDP, GDPP Akhir Rawat inap	Diagnosa	Lama Rawat inap
293613	P	45	Insulin + metformin	GDS: 239 GDP: 201 GDPP: -	GDS: 210 GDP: 146 GDPP: -	+DMT2 + obesitas +hipertensi +Neuropati D	12 Hari
305228	P	49	Insulin + metformin	GDS: 230 GDP: - GDPP: -	GDS: 200 GDP: - GDPP: -	+DMT2 + obeistas +hipertensi +Neuropati D	6 Hari
314407	L	60	Insulin campuran	GDS : 301 GDP :- GDPP:	GDS: 210 GDP: 119 GDPP: -	+DMT2 + Gangrens + OB + TB. Paru +_ Hipertensi	6 Hari
316555	P	62	Insulin campuran	GDS : 457 GDP :217 GDPP:	GDS: 200 GDP: 101 GDPP: -	+DMT2 + Ulkus + OB + Hipertensi	13 Hari
317149	P	71	Insulin campuran	GDS : 274 GDPP: 281 GDP :-	GDS : 198 GDPP: 181 GDP : 189	+DMT2 + Ulkus + +Hipertensi + ketosidosis	20 Hari
317805	P	60	Insulin campuran	GDS : 225 GDP :- GDPP:	GDS: 198 GDP: - GDPP: -	+DMT2 + Gangrens + Hipertensi	10 Hari
318253	L	46	Insulin campuran (Humulin)	GDS :235 GDP :- GDPP:-	GDS :190 GDP :- GDPP:-	+DMT2 + Gangrens + Hipertensi	2 minggu
301650	P	58	Insulin + metformin	GDS :297 GDP :148 GDPP:-	GDS :252 GDP :- GDPP:-	+DMT2 + Gangrens + Hipertensi	2 hari
319164	L	59	Insulin short acting	GDS :445 GDP :- GDPP:220	GDS :180 GDP :- GDPP:148	+DMT2 + TB. Paru + Hiper + Gangrens	> 1 bulan
320223	P	58	Insulin short acting	GDS :284 GDP :- GDPP:-	GDS :260 GDP :- GDPP:-	+DMT2 + Hipertensi	8 Hari
321251	P	63	Insulin short acting	GDS :163 GDP :- GDPP:-	GDS :141 GDP :120 GDPP:-	+DMT2	1 minggu
001819	L	68	Insulin short acting	GDS :201 GDP :- GDPP:-	GDS :185 GDP :- GDPP:-	+DMT2	5 Hari
322958	L	48	Insulin + metformin	GDS :440 GDP :262	GDS :180 GDP :140	+DMT2 + Hipertensi + Gangrens	18 Hari

324346	P	62	Insulin + metformin	GDPP:442 GDS :216 GDP :138 GDPP:-	GDPP:185 GDS :172 GDP :120 GDPP:176	+DMT2 + Hipertensi + Gangrens	4 Hari
324849	P	63	Insulin + metformin	GDS :225 GDP :135 GDPP:237	GDS :140 GDP :120 GDPP:151	+DMT2 + Gangrens	4 Hari
325700	P	51	Insulin short acting	GDS :272 GDP :150 GDPP:281	GDS :140 GDP :120 GDPP:-	+DMT2 + Gangrens + Obesitas	6 Hari
326502	L	39	Insulin short acting	GDS :260 GDP :120 GDPP:268	GDS :138 GDP :122 GDPP:168	+DMT2	5 Hari
327307	L	43	Insulin short acting	GDS :301 GDP :210 GDPP:-	GDS :126 GDP :109 GDPP:-	+DMT2 + Hipertensi	11 Hari
328008	L	37	Insulin short acting	GDS :224 GDP :141 GDPP:-	GDS :215 GDP :127 GDPP:-	+DMT2 + non obe.	21 Hari
328126	L	49	Insulin + metformin	GDS :260 GDP :180 GDPP:-	GDS :180 GDP :112 GDPP:-	+DMT2 + Asma	16 hari
321375	P	40	Insulin campuran	GDS :220 GDP :137 GDPP:215	GDS :200 GDP :104 GDPP:168	+DMT2 + Obes.	5 hr
301498	P	58	Insulin campuran	GDS :391 GDP :- GDPP:-	GDS :189 GDP :120 GDPP:-	+DMT2 + Obes. + Hiper + Gangrens + Jantung	18 Hari
301498	P	58	Insulin campuran	GDS :391 GDP :- GDPP:-	GDS :189 GDP :120 GDPP:-	+DMT2 + Obes. + Hiper + Gangrens + Jantung	18 Hari
308357	P	59	Insulin campuran	GDS :280 GDP :210 GDPP:-	GDS :162 GDP :115 GDPP:172	+DMT2 + Obes.	4 Hari
345882	P	48	Insulin campuran	GDS :230 GDP :181 GDPP:-	GDS :192 GDP :158 GDPP:-	+DMT2 + Ulkus	2 Hari
346293	P	51	Insulin campuran	GDS :225 GDP :- GDPP:-	GDS :210 GDP :108 GDPP:-	+DMT2 + Hiper	4 Hari
336392	L	45	Insulin campuran	GDS :250 GDP :142 GDPP:-	GDS :198 GDP :121 GDPP:-	+DMT2 + Ulkus	5 Hari
337168	L	39	Insulin + metformin	GDS :315 GDP :160 GDPP:-	GDS :210 GDP :121 GDPP:-	+DMT2 + Ulkus	5 Hari

346339	L	38	Insulin + metformin	GDS :210 GDP :150 GDPP:-	GDS :190 GDP :112	+DMT2 + Gangreng + Hiper + Non Obes.	6 Hari
337433	P	48	Insulin short acting	GDS :215 GDP :168 GDPP:-	GDS :198 GDP :126	+DMT2 + Obes.	2 Hari
337313	P	58	Insulin short acting	GDS :160 GDP :-	GDS :162 GDP :132	+DMT2	3 Hari
337854	P	40	Insulin short acting	GDPP:168 GDS :287 GDP :- GDPP:-	GDPP:141 GDS :231 GDP :210 GDPP:208	+DMT2	10 Hari
337966	P	54	Insulin campuran	GDS :294 GDP :- GDPP:315	GDS :220 GDP :120	+DMT2 + Gangreng	8 Hari
338751	P	42	Insulin campuran	GDS :250 GDP :- GDPP:-	GDS :180 GDP :120	+DMT2 + Hiper +Gangreng	7 Hari
330672	P	63	Insulin short acting	GDS :221 GDP :141 GDPP:-	GDS :160 GDP :121	+DMT2 + TB Paru +Gangreng	7 Hari
348776	P	72	Insulin short acting	GDS :216 GDP :- GDPP:-	GDS :127 GDP :121 GDPP:141	+DMT2 + TB Paru +Gangreng	6 Hari
351218	P	60	Insulin campuran	GDS :262 GDP :181	GDS :120 GDP :-	+DMT2 + Hiper +Obes.	13 hr
351488	P	65	Insulin campuran	GDS :310 -	GDS :112 -	+DMT2 + Hiper +Obes.	2 Minggu
352726	P	68	Insulin campuran	GDS :243 GDP :140	GDS :98 GDP :89	+DMT2 + Hiper +Obes.	5 Hari
146007	P	49	Insulin campuran	GDS :215	GDS :100	+DMT2 + Gangreng +Obes.	5 hr
353551	L	51	Insulin short acting	GDS :210	GDS :90	+DMT2 + Gangreng +Obes.	23 Hari
350219	L	58	Insulin Campuran	GDS :210	GDS :120	+DMT2 + Obes.	1 Minggu
354485	P	47	Insulin Campuran	GDS :281	GDS :122	+DMT2 + Obes.	1 Minggu
292083	P	62	Insulin + Metformin	GDS :265	GDS :112	+DMT2 + Obes.	-
344448	L	38	Insulin + Metformin	GDS :265 GDP :210	GDS :100 -	+DMT2	4 Hari
354848	L	58	Insulin campuran	GDS :281 GDP :180	GDS :261 GDP :98	+DMT2	8 Hari
038988	L	48	Insulin campuran	GDS :320 GDP :210	GDS :210 GDP :80	+DMT2	11 hr
353734	P	40	Insulin short acting	GDS :328 GDP :280	GDS :140 GDP :89	+DMT2 + ketoasidosis	24 Hari
357891	L	48	Insulin + metformin	GDS:240	GDS:130	+DMT2 + Obes.	16 hr

341187	L	41	Insulin + metformin	GDS:239	GDS:140	+DMT2 + Obes.+ hiper	4
321141	L	48	Insulin + metformin	GDS:230	GDS:98	+DMT2 + hiper	8
349043	L	52	Insulin + metformin	GDS:301	GDS:112	+DMT2 + hiper	22 Hari
248334	P	48	Insulin + metformin	GDP :- GDS:275 GDP :110	GDP :98 GDS:101 GDP :98	+DMT2 + hiper	1 minggu
349380	P	60	Insulin + metformin	GDS:225	GDS:112	+DMT2 + gangreng	24 Hari
349500	P	68	Insulin + metformin	GDS:281	GDS:100	+DMT2 + gangreng	9 hr
246440	P	53	Insulin + metformin	GDP :- GDS:235 GDP :110	GDP :- GDS:230 GDP :92	+DMT2 + gangreng	7 hr
349779	P	61	Insulin + metformin	GDS:297	GDS:132	+DMT2 + TB Paru	16 Hari
350263	L	58	Insulin + metformin	GDP :- GDS:457	GDP :98 GDS:125	+DMT2 + Ketoasidosis	8 hr
350427	L	59	Insulin + metformin	GDP :- GDS:220	GDP :102 GDS:109	+DMT2 + gangreng	1 minggu
350467	L	48	Insulin + metformin	GDS:284	GDS:260	+DMT2 + hiper	3 hari
350937	P	62	Insulin + metformin	GDS:102 GDS:301	GDS:112 GDS:96	+DMT2 + gangreng	13 hari
351110	L	60	Insulin + metformin	GDS:242	GDS:128	+DMT2 + gangreng	4 Hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

349766	P	45	Insulin + metformin	GDS:286	GDS:100	+DMT2 + Hipertensi	20 Hari
346243	P	49	Insulin campuran	GDP; 123 GDS:210	GDS:123	+Gangrens +DMT2 + Obes.	10 Hari
349380	P	55	Insulin campuran	GDS:220 GDS:218	GDS:120	DMT2 +non.obesitas	2 minggu
206433	L	60	Insulin campuran	GDS:218	GDS:110	DMT2 +non.obesitas	2 hari
342186	L	62	Insulin campuran	GDS:225	GDS:120	DMT2 +non.obesitas	10
350422	L	60	Insulin campuran	GDS:201	GDS: 132	+DMT2 + Obes.	13
350937	L	71	Insulin + metformin	GDS:236	GDS; 112	DMT2 +non.obesitas	11 hr

352210	L	56	Insulin short acting	GDS:215	GDS:198	+DMT2 + Obes.	-
353111	L	60	Insulin short acting	GDS:239	GDS:116	+DMT2 + Obes.	8 hr
146080	L	46	Insulin + metformin	GDS:245	GDS:132	+DMT2 + Hipertensi	1 minggu
353874	P	58	Insulin + metformin	GDS:282	GDS:225	+DMT2 + Hipertensi	5 Hari
340427	L	56	Insulin + metformin	GDS:256	GDS:213	DMT2	12 hr
353529	L	59	Insulin + metformin	GDS:212	GDS:189	+DMT2 + Hipertensi	18 Hari
327639	P	65	Insulin short acting	GDS:220	GDS:176	+DMT2 + Hipertensi	4 Hari
248334	P	58	Insulin short acting	GDS:320	GDS:150	DMT2 + Ulkus	8 hr
372218	L	63	Insulin + metformin	GDS:182	GDS:112	+DMT2 + Hipertensi	4 Hari
351209	P	68	Insulin short acting	GDS:320	GDS:155	DMT2 + Ketoasidosis	6 hr
350982	P	66	Insulin short acting	GDS:298	GDS:192	DMT2	19 hr
353551	P	48	Insulin short acting	GDS:225	GDS:182	+DMT2 + Hipertensi	5 Hari
350263	P	49	Insulin short acting	GDS:286	GDS:145	+DMT2 + Hipertensi + Gangrens	5 HR
346098	L	50	Insulin short acting	GDS:188	GDS:128	DMT2+ + Gangrens	11 Hari
352678	L	65	Insulin short acting	GDS:275	GDS:172	+DMT2 + Hipertensi + Gangrens	21 Hari
356788	P	54	Insulin short acting	GDS:325	GDS:128	+DMT2 + Hipertensi	16 hari
357103	P	60	Insulin short acting	GDS:210	GDS:110	+ Gangrens	
357290	P	59	Insulin short acting	GDS:320	GDS:160	DMT2 + Ketoasidosis	21
354900	P	48	Insulin short acting	GDS:280	GDS:146	+DMT2 + Hipertensi	18 hr
383988	L	71	Insulin short acting	GDS:208	GDS:133	+DMT2 + Hipertensi	5 hr
357891	L	63	Insulin short acting	GDS:320	GDS:152	+DMT2 + Hipertensi DMT2 + Ketoasidosis	18 Hari
155692	L	54	Insulin short acting	GDS:245	GDS:162		10 hr
271447	P	42	Insulin short acting	GDS:216	GDS:148	+DMT2 + Hipertensi	5 hr

281438	P	52	Insulin short acting	GDS:221	GDS:120	+DMT2 + Hipertensi	2 HAri
344098	P	48	Insulin short acting	GDS:230	GDS:110	+DMT2 + Hipertensi	3 hr
361127	P	55	Insulin short acting	GDS:215	GDS:120	+DMT2 + Hipertensi + Gangrens	5 hr
361232	P	64	Insulin short acting	GDS:216	GDS:148	DMT2 +non.obesitas	5 HAri
328794	P	53	Insulin short acting	GDS:244	GDS:210	+DMT2 + Hipertensi	-
246573	P	58	Insulin short acting	GDS:272	GDS:198	+DMT2 + Obes.	4 hr
363398	P	71	Insulin short acting	GDS:210	GDS:116	+DMT2 + Hipertensi	6 HAri
203818	P	46	Insulin short acting	GDS:243	GDS:132	+DMT2 + Hipertensi	6 hr
364321	P	52	Insulin short acting	GDS:200	GDS:225	+DMT2 + Gangrens	15 hr
236510	P	58	Insulin short acting	GDS:220	GDS:213	+DMT2 + Hipertensi	3 HAri
246110	P	53	Insulin short acting	GDS:286	GDS:200	+DMT2 + Hipertensi	10 hr
364332	L	49	Insulin short acting	GDS:224	GDS:210	DMT2+ + Gangrens	13 hr
362004	L	61	Insulin short acting	GDS:282	GDS:256	DMT2+ + Gangrens	8 HAri
363390	P	57	Insulin short acting	GDS:324	GDS:124	DMT2 + Ketoasidosis	7 HAri
361164	L	50	Insulin campuran	GDS:301	GDS:255	DMT2+ + Gangrens	17 hr
364478	L	45	Insulin campuran	GDS:235	GDS:186	+DMT2 + Hipertensi	7 HAri
358822	L	42	Insulin campuran	GDS:248	GDS:142	+DMT2 + Obes.	6 HAri
390986	P	49	Insulin campuran	GDS:242	GDS:135	+DMT2 + Hipertensi	19 hari
360627	P	60	Insulin short acting	GDS: 245 GDP;132	GDS:138	DMT2 + Ulkus	15
251073	L	53	Insulin short acting	GDS:244	GDS:120	DMT2+	5 Hari
155996	P	74	Insulin short acting	GDS:272	GDS:215	+ Gangrens DMT2+	2 Minggu -
352009	L	66	Insulin campuran	GDS:210	GDS:189	DMT2+ + Gangrens	23 Hari
357344	P	42	Insulin campuran	GDS:243	GDS:87	DMT2 + Ulkus	-

355603	L	48	Insulin campuran	GDS:200	GDS:173	+DMT2 + Hipertensi	5
350982	P	49	Insulin short acting	GDS:220	GDS:110	DMT 2 + Gangrens	4 Hari
323533	L	41	Insulin short acting	GDS:286	GDS:116	+DMT2 + Obes. DMT 2	8 Hari
364628	L	60	Insulin short acting	GDS:224	GDS:147		-
365290	P	64	Insulin short acting	GDS:282	GDS:186	+DMT2 + Gangrens	24 Hari
365407	P	66	Insulin short acting	GDS:324	GDS:158	+DMT2 + Gangrens	> 1 bulan 4
317178	P	82	Insulin short acting	GDS:301	GDS:127	+DMT2 + Hipertensi	8
292644	P	53	Insulin campuran	GDS:235	GDS:112	+DMT2 + Gangrens	1 minggu
365431	P	48	Insulin campuran	GDS:248	GDS:140	+DMT2 + Gangrens	22 hari
366968	P	59	Insulin campuran	GDS:242	GDS:130	+DMT2 + Hipertensi	24 Hari
367579	L	63	Insulin campuran	GDS: 245 GDP;132	GDS:123	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	16 Hari
321800	L	47	Insulin campuran	GDS:263	GDS:286	+DMT2 + Hipertensi	1 Minggu
333321	L	67	Insulin campuran	GDS:227	GDS:96	+DMT2 + Hipertensi	1 Minggu
368682	P	63	Insulin campuran	GDS:294	GDS:162	+DMT2 + Hipertensi	5 hari
368586	L	62	Insulin campuran	GDS:321	GDS:170	+DMT2 + Gangrens	11 hari
223158	L	44	Insulin campuran	GDS:324	GDS:148	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	22 hr
369777	P	50	Insulin campuran	GDS:320	GDS:188	+ Hipertensi	13 Hr
299443	P	39	Insulin campuran	GDS:239	GDS:116	+DMT2 + Gangrens	5 hr
370045	P	55	Insulin + metformin	GDS:318	GDS:126	+DMT2 + Gangrens	> 1 minggu
299356	P	45	Insulin + metformin	GDS:285	GDS:286	+DMT2 + Hipertensi	5hr
248334	P	67	Insulin + metformin	GDS:290	GDS:286	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	8 hr
371635	P	44	Insulin + metformin	GDS:227	GDS:125 GDP; 98		9 hr
371844	L	60	Insulin + metformin	GDS:216	GDS:286	+DMT2 + Hipertensi	8 hr

324567	P	58	Insulin campuran	GDS:239	GDS:160	+DMT2 + Hipertensi	11 hr
371876	P	54	Insulin campuran	GDS:328	GDS:203	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	18 hr
372149	P	60	Insulin short acting	GDS:242	GDS:172	DMT2 + Ulkus	13 hr
372210	P	54	Insulin short acting	GDS:328	GDS:170	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	16 hr
373098	P	40	Insulin short acting	GDS:300	GDS:188	DMT2 + Ketoasidosis	11 hr
37639	L	60	Insulin campuran	GDS:290	GDS; 123	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	1 minggu
372345	L	58	Insulin campuran	GDS:282	GDS;100	DMT 2	8 hr
372213	P	45	Insulin campuran	GDS:198	GDS;120	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	6 hr
372326	L	56	Insulin campuran	GDS:179	GDS; 115	+DMT2 + Hipertensi	-
370342	P	45	Insulin campuran	GDS:342	GDS; 132	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	14 hari
376213	P	45	Insulin campuran	GDS:220	GDS; 138	+DMT2 + Hipertensi	4 hr
327654	L	55	Insulin campuran	GDS:218	GDS: 122	+DMT2 + Hipertensi	5 hr
372133	L	64	Insulin campuran	GDS:242	GDS; 112	DMT2 + TB. Paru	6 HAri
373243	P	50	Insulin campuran	GDS:188	GDS:45	+DMT2 + Hipertensi	19 hari
378654	L	50	Insulin campuran	GDS:328	GDS; 142	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	8 hr
372213	L	50	Insulin campuran	GDS:318	GDS;130	DMT2 + TB. Paru	8 hr
387213	L	50	Insulin campuran	GDS:244	GDS; 182	+DMT2 + Hipertensi	5 hr
372879	P	40	Insulin campuran	GDS:286	GDS; 97	+DMT2 + non obe	6 HAri
382133	P	53	Insulin campuran	GDS:325	GDS;118	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	19 hari
373421	P	46	Insulin campuran	GDS:210	GDS; 108	DMT2 + TB. Paru	5 hr
372234	P	67	Insulin campuran	GDS:234	GDS:188	DMT2 + TB. Paru	6 hr
345627	L	64	Insulin campuran	GDS:228	GDS:286	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	2 Minggu
324590	L	42	Insulin campuran	GDS:220	GDS; 135	+DMT2 + Hipertensi	6 hr
356210	P	40	Insulin campuran	GDS:200	GDS;120	+DMT2 + non obe	4 hr

342987	P	81	Insulin campuran	GDS:322	GDS:122	+DMT2 + Gangrens	13 hr
324510	L	65	Insulin campuran	GDS:350	GDS:89	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	12 hr
324700	L	66	Insulin campuran	GDS:294	GDS:118	DMT2 + TB. Paru	15 hr
320900	L	42	Insulin campuran	GDS:229	GDS:120	+DMT2 + Gangrens	5 hr
356098	L	50	Insulin campuran	GDS:373	GDS:286	+Neuropati D +DMT2 + obeistas	5 hr
372451	P	48	Insulin campuran	GDS:386	GDS:324	DMT2 + Ketoasidosis GANGRENG	13 hr
367109	P	48	Insulin campuran	GDS:227	GDS:286	+DMT2 + non obe	8 hr
234509	P	48	Insulin campuran	GDS:220	GDS:188	+DMT2 + Gangrens	-5 hr
372098	P	66	Insulin campuran	GDS:326	GDS:120	DMT2 + TB Paru	18 hr
321109	P	74	Insulin campuran	GDS:215	GDS:90	DMT2 + TB Paru	9 hr
376510	P	58	Insulin campuran	GDS:240	GDS:132	+DMT2 + Hipertensi	6 hr
234510	P	39	Insulin campuran	GDS:321	GDS:139	DMT2 + Ketoasidosis	11 hr
234080	P	55	Insulin campuran	GDS:218	GDS:135	+DMT2 + Hipertensi	1 minggu
365210	P	53	Insulin campuran	GDS:200	GDS:128	DMT 2	-
356200	P	49	Insulin campuran	GDS:382	GDS:120	DMT2 + Ketoasidosis	16 hr
372907	L	48	Insulin campuran	GDS:245	GDS:115	DMT2 + TB Paru	8 hr
370865	L	55	Insulin campuran	GDS:220	GDS:89	DMT 2	10 hr
367653	P	38	Insulin campuran	GDS:376	GDS:129	DMT2 + Ulkus	21 hr
360999	P	49	Insulin campuran	GDS:342	GDS:140	+DMT2 + Gangrens	8 hr
324109	L	45	Insulin campuran	GDS:244	GDS:87	+DMT2 + Gangrens	5 hr
320987	L	61	Insulin campuran	GDS:266	GDS:98	DMT2 + TB Paru	9 hr
362134	L	49	Insulin campuran	GDS:236	GDS:138	DMT2 + Ulkus	8 hr
342509	L	43	Insulin campuran	GDS:310	GDS:120	+DMT2 + Gangrens	13 hr
363213	L	60	Insulin campuran	GDS:216	GDS:113	DMT2 + TB Paru	4 hr

342422	L	58	Insulin campuran	GDS:298	GDS:134	DMT2 + Ketoasidosis	6 hr
340077	L	45	Insulin campuran	GDS:320	GDS: 132	+DMT2 + Gangrens	15 hr
370054	P	56	Insulin campuran	GDS:360	GDS: 142	DMT2 + TB Paru	11 hr
373420	L	39	Insulin campuran	GDS:234	GDS: 125	DMT2 + TB Paru	5 hr

Keterangan :

GDS : Gula darah sewaktu

GDPP : Gula darah post prandial

GDP : Gula darah puasa

Obes : Obesitas

