

**DIAGNOSA KEBUNTINGAN DINI DALAM MENDUKUNG TINGKAT
KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN SAPI BALI
DI KECAMATAN MANGGELEWA
KABUPATEN DOMPU**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:
IDFAR
60700113032

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idfar

NIM : 60700113032

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul : **Diagnosa kebuntingan dini dalam mendukung tingkat keberhasilan inseminasi buatan sapi bali di kecamatan manggelewa kabupaten dompu.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya Skripsi yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan tidak asli atau plagiasi maka skripsi ini siap untuk dibatalkan dan saya dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Agustus 2017

Idfar

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Saudara **Idfar**, NIM: **60700113032** Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul: **“Diagnosa Kebuntingan Dini terhadap tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan Sapi di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”**, Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar *Munaqasyah*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Makassar, 2017

Pembimbing I



Dr. Andi Suarda, M.Si
Nip: 19750909009121001


Pembimbing II



Irmawati, S. Pt. M.P
Nip:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Ir. Ir. Muh. Basr Palv, M.Si
Nip: 195907121943031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Diagnosa Kebuntingan Dini dalam Mendukung Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan sapi Bali di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.” yang disusun oleh **IDFAR, NIM: 60700113032**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2017**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan.

Samata, Agustus 2017
Dzulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Astaty, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr.Ir.Muh.Basir Paly, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Irmawaty, S.Pt., M.P	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr/H. Arifuddin, M.Ag
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayahnya hingga penulis dapat merampung penyusunan Skripsi yang berjudul **“Diagnosa Kebuntingan Dini dalam Mendukung Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan sapi Bali di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.”** yang di ajukan sebagai salah syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Peternakan (S. Pt) pada Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad swt, serta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penunih menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan Skripsi ini.

Selama ppenyusunan Skripsi, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk , bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak maka dapat teratasi. Untuk itu, perkenangkanlah penulis menghathurkan ucapan terima kasih yang istimewa Ayahanda **Idris M. Saleh** dan Ibunda **Ma’ani** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan seperti ini.

Terselesainya Skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan doerongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala

kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Musafir Pababbari, M. Si.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddi Ahmad, M. Ag.** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
3. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Pally, M. Si.** Selaku ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
4. **Bapak Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si.** Selaku **Wakil Dekan III** dan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak membantu serta mengarahkan dalam penyusunan Proposal hingga terselesainya Skripsi ini.
5. **Ibu Irmawati, S.Pt., M. Si.** Selaku dosen sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membantu serta mengarahkan dalam penyusunan Proposal hingga terselesainya Skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Pally, M. Si.** Selaku ketua jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi dan Sekaligus menjadi Penguji I dan **Bapak Dr. M. Thahir Maloko, MHI** selaku **Wakil Dekan II** Fakultas Sains dan Teknologi dan sekaligus Penguji II yang telah banyak memberikan banyak saran maupun kritikan yang baik demi kesempurnaan penulisan dan penyusun Skripsi ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen** Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terimakasih atas bimbingan

maupun didikan ilmu serta moral yang dapat kami contohi selama berada dalam bangku perkuliahan.

8. **Bapak Lestyoadi. S. Pt.** Selaku Kepala UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Manggelewa yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Instansi yang di Pimpin. Serta **Bapak Jakariah** selaku Inseminator sekaligus Pembimbing Lapangan dalam melakukan Penelitian. Bimbingan dan didikannya sangat terasa tercemar dalam diri dengan menunjukkan keahliannya dalam menhadapi berbagai kasus khusus Bidang Peternmakan.
9. Rekan-rekan seperjuangan **Angkatan 2013** Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang selalu saling memberikan dukungan semangat dalam segala urusan perkuliahan.

Semoga semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Skripsi di atas mendapat imbalan dan rahmat dari Allah SWT.

Aamiin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Makassar, September 2017

Idfar

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Persetujuan	iii
Pengesahan Kelulusan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan Penelitian	3
1.4.Kegunaan Penelitian.....	4
1.5.Penelitian terdahulu.....	5
1.6.Defininsi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Gambaran Umum Sapi Bali	8
2.2 Fisiologi Sapi Bali Betina	9
2.2.1. Sistem Reproduksi Betina.....	10
2.2.2. Siklus Birahi.....	15
2.2.3. Lama Birahi.....	17
2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Birahi	19
2.2.5. Inseminasi Buatan Pada Sapi	20
2.3. Pemeriksaan Kebuntingan	25
2.3.1. Indikasi Luar	26
2.3.2. Indikasi Dalam	29
2.4. Masa Kebuntingan pada Sapi	39

BAB III. Metode Penelitian.....	47
3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	47
3.2. Populasi dan Sampel.....	47
3.3. Metode Penelitian	48
3.4. Teknik Pengolahan Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2. Karakteristik Responden.....	56
4.2.1. Umur Responden.....	56
4.2.2. Tingkat Pendidikan	57
4.2.3. Pengalaman Berternak	59
4.2.4. Pekerjaan Utama	60
4.3. Kecepatan Deteksi Birahi.....	61
4.3. Ketepatan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB).....	63
4.4.1. Berdasarkan Body Condition Score (BCS).....	71
4.4.2. Umur Kebuntingan Berdasarkan Pemeriksaan Klinis.....	72
4.4.3. Keberhasil IB	74
BAB V KESIMPULAN	76
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	77
Daftar Pustaka	
Lampiran	



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Siklus Estrus pada Sapi	17
Tabel 2.2 Lama Periode Siklus Birahi pada Ternak Sapi	19
Tabel 2.3 Ukuran dan Sifus Fetus Sapi selama Kebuntingan	33
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Umur	56
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Berternak.....	58
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama.....	59
Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Hasil IB	61
Tabel 4.6 Tingkat Pemahaman Kecepatan Pelaporan waktu IB	63
Tabel 4.7 Pengamatan Birahi pada Ternak Sapi	64
Tabel 4.8 Pedoman Praktisi Waktu IB yang Tepat	65
Tabel 4.9 Pengalaman dan Pengetahuan Inseminator.....	69
Tabel 4.10 Proporsi Ternak Bunting Berdasarkan BCS	70
Tabel 4.11 Proporsi Ternak tidak Bunting Berdasarkan BCS	70
Tabel 4.12 Umur Kebuntingan 50-70 hari Berdasarkan Pemeriksaan Klinis.....	71
Tabel 4.13 Umur Kebuntingan 30-50 hari Berdasarkan Pemeriksaan Klinis.....	72
Tabel 4.14 Ternak Tidak Bunting Berdasarkan Pemeriksaan Klinis Dengan Palpasi Rektal Di UPTD Kecamatan Manggelewa.....	73
Tabel 4.15 Ternak Bunting Berdasarkan Pemeriksaan Klinis Dengan Palpasi Rektal Di UPTD Kecamatan Manggelewa.....	73

ABSTRAK

Nama : Idfar
Nim : 60700113032
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Diagnosa Kebuntingan Dini dalam Mendukung Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan sapi Bali di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.**

Tujuan dari Penelitian ini adalah Mengetahui Ketepatan Mendiagnosa Kebuntingan dini pada ternak Sapi Bali dan Mengetahui Kecepatan peternak memberikan informasi untuk di lakukan IB ternak Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Adapun Metode yang digunakan yaitu Palpasi Rektal yang di dasari oleh: Bentuk, Ukuran, Penyelipan dan Desiran pada organ-organ yang teraba. Parameter lain yang ukur antara lain: Proporsi ternak berdasarkan *Body Condition Score* (BCS), Proporsi ternak bunting dan tidak bunting dan Proporsi umur Kebuntingan. Data diolah secara Deskriptif dan Inferensial, Sehingga dapat di simpulkan bahwa Umur Kebuntingan antara 30-50 hari, Keberhasilan mencapai 80-95 % dan Umur Kebuntingan 50-70 hari, Keberhasilan mencapai 90-97 %. Ternak Ternak Bunting berdasarkan *Body Condition Score* (BCS) bunting: Skor 3 = 11,3 %, Skor 4 = 77,5 % dan Skor 5 = 11,3 % Sedangkan tingkat pemahaman kecepatan pelaporan waktu IB antara 9-10 jam mencapai 83 %.

Kata Kunci: Kecepatan, Ketepatan, Kebuntingan dan Palpasi Rektal.

ABSTRACT

Name : Idfar

Nim : 60700113032

Major : Animal Science

Title : **Diagnosis of early pregnancy in supporting the success rate of artificial insemination of Bali cows in manggelewa district dompu district.**

The purpose of this study is to know the accuracy of Diagnose Early Pregnancy in Bali Cattle and Knowing Speed breeders provide information to do IB cattle livestock Bali in District Manggelewa Dompu. The method used is the rectal Palpation that is based on: Shape, Size, Delivery and desiran on the palpable organs. Other parameters that measured include: Proportion of livestock based on *Body Condition Score* (BCS), Proportion of pregnant and non pregnant cattle and Proportion of pregnancy age. The data is processed descriptively and inferential, so it can be concluded that the pregnancy age between 30-50 days, the success reaches 80-95% and the age of pregnancy 50-70 days, success reach 90-97%. Livestock Breeding Breeding based on *Body Condition Score* (BCS) pregnant: Score 3 = 11.3%, Score 4 = 77.5% and Score 5 = 11.3% While the understanding level of IB reporting time between 9-10 hours reached 83%.

Keywords: Speed, Accuracy, Gestation and Palpation Rectal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sapi Sali (*Bos sondaicus*) sebagai plasma nutfah ternak potong Indonesia merupakan jenis sapi yang paling populer dipelihara oleh kalangan peternak, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan ekstrim wilayah tropis serta jarak melahirkan yang relatif pendek dimana periode kelahiran terjadi sepanjang tahun diketahui sebagai pertimbangan utama yang menyebabkan ternak Sapi Bali banyak dipelihara oleh masyarakat. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan Sapi Bali untuk dapat melahirkan sepanjang tahun ditandai dengan aktivitas ovarium dan perkawinan kembali kurang dari dua bulan sesudah melahirkan, relative sulit untuk dicapai peternak (Talib dkk, 2001).

Deteksi kebuntingan dini pada ternak sangat penting bagi sebuah manajemen reproduksi sebagaimana ditinjau dari segi ekonomi. Mengetahui bahwa ternaknya bunting atau tidak mempunyai nilai ekonomis yang perlu dipertimbangkan sebagai hal penting bagi manajemen reproduksi yang harus diterapkan. Pemilihan metode tergantung pada spesies, umur kebuntingan, biaya, ketepatan dan kecepatan diagnosa. Pemeriksaan kebuntingan adalah salah satu cara dengan menggunakan metode khusus untuk menentukan keadaan hewan bunting atau tidak.

Palpasi rektal adalah metode diagnosa kebuntingan yang dapat dilakukan dengan tepat pada ternak besar seperti kuda, kerbau dan sapi. Dalam hal ini yang ingin dilakukan adalah palpasi rektal pada umur kebuntingan dini karena metode ini adalah salah satu dari beberapa metode yang sering dilakukan dan tanpa memakan biaya dan tenaga yang cukup lama, tetapi yang sering dilakukan adalah palpasi pada umur kebuntingan tua. Keterampilan untuk menentukan kebuntingan secara dini sangat perlu untuk dimiliki, dalam hal ini semakin cepat kita mengetahui ternak itu bunting atau tidak bunting maka semakin baik. Mengingat hal ini waktu yang menjadi tolak ukur dalam manajemen pemeliharaan ternak yang hanya akan mendatangkan kerugian bagi para peternak, maka salah satu alternatifnya melakukan deteksi kebuntingan dini, dengan diketahuinya status kebuntingan dalam waktu yang lebih cepat dan akurat, peternak dapat mengambil tindakan lanjutan, misal menyesuaikan pakan apabila induk bunting atau menjual ternaknya apabila tidak bunting akibat infertilitas, sehingga peternak tidak akan mengalami kerugian yang besar akibat biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pada sapi yang di inseminasi.

Keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB), manusia memiliki peran sentral dalam kegiatan pelayanan IB. Faktor manusia, sarana dan kondisi lapangan merupakan faktor yang sangat dominan. Berkaitan dengan manusia sebagai pengelola ternak, motivasi seseorang untuk mengikuti program atau aktivitas-aktivitas baru banyak dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi. Faktor sosial ekonomi antara lain usia, pendidikan, pengalaman, pekerjaan pokok dan jumlah kepemilikan sapi kesemuanya akan berpengaruh terhadap manajemen

pemeliharaannya yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan. Ketepatan deteksi birahi dan pelaporan yang tepat waktu dari peternak kepada inseminator serta kerja inseminator dari sikap, sarana dan kondisi lapangan yang mendukung akan sangat menentukan keberhasilan IB.

Kecamatan Manggelewa adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat potensial untuk di kembangkannya berbagai macam ternak seperti Sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba. Daya dukung lahan yang luas menjadikan daerah ini memiliki potensi untuk di jadikan lahan pengembalaan bagi para peternak Sapi, tetapi sebagian besar ternak yang ada di Kecamatan Manggelewa adalah ternak sapi lokal atau sapi bali dan sebagian besar sistim pemeliharaan yang dilakukan adalah semi intensif, pada beberapa tahun akhir-akhir ini dengan adanya penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada sapi para peternak mengubah cara pandang dalam sistim pemeliharaan dari semi intensif ke Intensif untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dari sebelumnya. Melihat realitas di lapangan para peternak memelihara ternaknya yang sudah di lakukan IB masih standarisasi pemahamannya mengenai kapan waktu dan secepat mungkin untuk melaporkan dalam periksaan kebuntingan pada ternak Sapi yang dipelihara, yang terkadang tidak semua ternak sapi yang IB positif bunting, dalam hal ini harus dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan dini. Mengingat realitas yang tercantum pada latar belakang di atas, penelitian ini di buat untuk melakukan **“Diagnosa Kebuntingan Dini dalam Mendukung Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan sapi Bali di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil perumusan masalah:

- a. Bagaimana Ketepatan Mendiagnosa Kebuntingan Dini pada Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa?
- b. Bagaimana Kecepatan Peternak Memberikan informasi Untuk dilakukan Inseminasi Buatan (IB) ternak Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Ketepatan Mendiagnosa Kebuntingan Dini pada ternak Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa.
- b. Untuk Mengetahui Kecepatan Peternak Memberikan informasi Untuk dilakukan Inseminasi Buatan (IB) ternak Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan, khususnya tentang pentingnya dilakukan diagnosa kebuntingan dini dan pentingnya melaporkan secara cepat untuk dilakukannya pemeriksaan kebuntingan pada ternak Sapi Bali.

1.5 Penelitian terdahulu

- a. Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Sapi Potong Di Tinjau Dari Angka Konsepsi Dan Service Per Conception (2008). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum bahwa kabupaten Kebumen ditinjau dari kondisi

daerah, penduduk dan keadaan ternak cukup mendukung perkembangan sapi potong melalui program IB.

- b. Evaluasi Inseminasi Buatan (Ib) Di Kecamatan bunga Raya Kabupaten Siak (2011). Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan IB di Kecamatan Bunga Raya sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari angka S/C pada tahun 2008, 1.23 dan pada tahun 2009, 1.03, dengan persentase kebuntingan pada tahun 2008, adalah 89.76% dan pada tahun 2009, 98.71%.
- c. Peningkatan produktivitas sapi Bali melalui inseminasi buatan dengan sperma sexing di Techno Park Banyumulek, Nusa Tenggara Barat (2017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi inseminasi buatan dengan sperma sexing dapat meningkatkan produktivitas ternak dengan meningkatkan efisiensi reproduksi dalam usaha pembibitan ternak yang dijalankan.

1.5 Definisi Operasional

- a. *Inseminasi Buatan (IB)*: Merupakan salah satu teknik menghasilkan sapi unggul serta memperbaiki mutu genetik dimana semen dari seekor ternak jantan dapat dipergunakan untuk menginseminasi sampai beberapa ekor ternak betina (Wodzicka, 1991). Inseminasi buatan (IB) adalah Pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran betina dengan menggunakan alat-alat tertentu dengan bantuan manusia (Toelihere, 1993).
- b. *Diagnosa Kebuntingan* adalah suatu kegiatan yang melibatkan seorang ahli dalam menentukan dan memperkirakan suatu perubahan fisik baik dari luar maupun dari dalam uterus seekor ternak betina (Franson, 1992).

- c. *Indikasi Luar* adalah suatu kegiatan dalam mengamati perubahan fisik ternak betina yang hanya melihat dari luar.
- d. *Indikasi Dalam* adalah suatu kegiatan dalam mengamati perubahan fisik ternak betina yang hanya melihat dari dalam.
- e. *Kebuntingan Dini* adalah keadaan dimana anak sedang berkembang dalam didalam uterus seekor betina dalam jangka waktu 10 hari sampai 30 hari (Franson, 1992).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Sapi Bali

Sapi Bali (*Bibos sondaicus*) yang ada saat ini diduga berasal dari hasil domestikasi Banteng liar (*Bibos banteng*). Proses domestikasi sapi Bali itu terjadi 3.500 SM di Indonesia atau Indochina. Banteng liar saat ini biasa ditemukan di Jawa bagian Barat dan bagian Timur, di Pulau Kalimantan, serta ditemukan juga di Malaysia. Tempat dimulainya domestikasi sapi Bali yaitu terjadi di Jawa, menduga asal mula sapi Bali adalah dari Pulau Bali mengingat tempat ini merupakan pusat distribusi sapi Bali di Indonesia. Gen asli sapi Bali berasal dari Pulau Bali yang kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara, dengan kata lain bahwa pusat gen sapi Bali adalah di Pulau Bali, di samping pusat gen sapi zebu di India (Hardjosubroto dan Astuti, 1993).

Sapi Bali merupakan plasma nutfah dan sebagai ternak potong andalan yang dapat memasok kebutuhan akan daging sekitar 27% dari total populasi sapi potong Indonesia. Sebagai ternak potong, pertumbuhan sapi Bali tergantung pada kualitas nutrien yang terkandung pada tiap bahan pakan yang dimakan. Pada umumnya, kebutuhan akan nutrien dari ternak sapi adalah energi berkisar 60 – 70% total digestible nutrien (TDN), protein kasar 12%, dan lemak 3 – 5%. Pemanfaatan hijauan bernilai hayati tinggi sebagai sumber pakan belum bisa mendukung kebutuhan sapi Bali akan nutrien. Hal ini disebabkan karena hijauan

bernilai hayati tinggi dan ketersediaannya terbatas pada musim kemarau (Sastradipradja, 1990)

Sapi Bali mempunyai ciri-ciri fisik yang seragam, dan hanya mengalami perubahan kecil dibandingkan dengan leluhur liarnya (Banteng). Warna sapi betina dan anak atau muda biasanya coklat muda dengan garis hitam tipis terdapat di sepanjang tengah punggung. Warna sapi Bali jantan adalah coklat ketika muda tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikastrasi akan tetap berwarna coklat. Pada kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha (pantat), bagian bawah (perut), keempat kaki bawah (*whitestocking*) sampai di atas kuku, bagian dalam telinga, dan pada pinggiran bibir atas (Hardjosubroto 1993).

Peternak menyukai sapi Bali mengingat beberapa keunggulan karakteristiknya antara lain : mempunyai fertilitas tinggi, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik, cepat beradaptasi apabila dihadapkan dengan lingkungan baru, cepat berkembang biak, bereaksi positif terhadap perlakuan pemberian pakan, kandungan lemak karkas rendah, keempukan daging tidak kalah dengan daging impor. Fertilitas sapi Bali berkisar 83 - 86 persen, lebih tinggi dibandingkan sapi Eropa yang 60 persen. Karakteristik reproduktif antara lain : periode kebuntingan 280-294 hari, rata-rata persentase kebuntingan 86,56 persen, tingkat kematian kelahiran anak sapi hanya 3,65 persen, persentase kelahiran 83,4 persen, dan interval penyapihan antara 15,48-16,28 bulan (Wirdahayati, 1995).

2.2 Fisiologi Sapi Bali Betina

Ternak sapi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu *Bos indicus* (zebu sapi berponok), *Bos taurus* yaitu bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi potong dan perah di Eropa, *Bos sondaicus* (*Bos bibos*), yang dikenal dengan nama sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa dan sapi lokal (Sugeng, 2000). Sapi Bali merupakan keturunan dari sapi liar yang disebut Banteng (*Bos sondaicus*) yang telah mengalami proses penjinakan (domestikasi) bertahun-tahun lamanya (Sugeng, 2000). Keunggulan sapi Bali adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga sering disebut ternak perintis. Sapi Bali memiliki potensi genetik plasma ternak lokal yang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan ternak impor. Keunggulan tersebut antara lain, keunggulan dalam memanfaatkan hijauan pakan yang berserat tinggi, daya adaptasi iklim tropis dan fertilitas tinggi (83%) serta persentase karkas (56%) dan kualitas karkas yang baik.

2.2.1 Sistem Reproduksi Betina

Hewan betina mempunyai tugas memproduksi sel kelamin yang sangat penting untuk mengawali kehidupan turunan yang baru dan menyediakan tempat beserta lingkungannya untuk perkembangan individu baru, dimulai dari waktu pembuahan ovum dan memeliharanya selama awal kehidupannya. Tugas ini dilaksanakan oleh organ reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan ova (sel telur) dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari *oviduk*, *uterus*, *serviks*, *vagina*, dan *vulva*. Fungsi organ-organ reproduksi

sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Alat-alat kelamin dalam digantung oleh *ligamentum*. *Ligamentum* ini terdiri dari *mesovarium* (penggantung ovarium), *mesosalpink* (penggantung oviduk), dan *mesometrium* (penggantung uterus) (Marawali, 2001).

a. Ovarium

Berbeda dengan testis, ovarium tertinggal di dalam ovum abdominalis. Ovarium mempunyai dwi fungsi, sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur (oval) dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina (*estrogen* dan *progesteron*). Pada sapi dan domba, ovarium berbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena ada *fossa ovulatorus* yakni suatu lekukan pada pinggir ovarium. Pada sapi, ovarium bervariasi dalam ukuran panjang, lebar, dan tebal. Umumnya ovarium kanan lebih besar daripada ovarium kiri, karena secara fisiologik lebih aktif.

Folikel-folikel pada ovarium mencapai kematangan melalui tingkatan perkembangan yaitu folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier (folikel yang sedang tumbuh), dan folikel *de Graaf* (folikel matang). Folikel primer terdiri dari satu bakal sel telur yang pada fase ini disebut *oogonium* dan *stroma korteks* sewaktu kelompok sel-sel folikuler. Yang memperbanyak diri membentuk suatu lapisan multi seluler sekeliling vitellus. Pada stadium ini terbentuk suatu membran antara *oogonium* dan sel-sel folikuler, disebut *zona pellucida* (Marawali, 2001).

Folikel tersier timbul sewaktu sel-sel pada lapisan folikuler memisahkan diri untuk membentuk lapisan dan satu rongga (antrum), ke arah *oogonium* akan

menonjol. Antrum dibatasi oleh banyak lapisan sel folikuler yang dikenal secara umum sebagai membran *granulose* dan di isi oleh suatu cairan jernih *Liquor folliculi* yang kaya akan protein dan estrogen. Folikel *de Graaf* adalah folikel matang yang menonjol melalui korteks ke permukaan ovarium seperti suatu lepuh. Pertumbuhannya meliputi dua lapis sel *stroma korteks* yang mengelilingi sel-sel folikuler. Lapisan sel-sel tersebut mem

bentuk *theca folliculi* yang dapat dibagi atas *theca interna* yang *vascular* dan *theca externa* yang *fibrous* (Marawali, 2001).

b. Oviduk

Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil berliku-liku dan terasa keras seperti kawat terutama pada pangkalnya. Pada sapi dan kuda, panjang oviduk mencapai 20-30 cm dengan diameter 1,5-3 mm. Oviduk tergantung pada *mesosalpink*. Oviduk terdiri atas *infundibulum* dengan *fimbriae*, *ampula* dan *isthmus*.

Ujung oviduk dekat ovarium membentang menganga membentuk suatu struktur berupa corong (*infundibulum*). Muara *infundibulum* (*ostium abdominale*) dikelilingi oleh penonjolan-penonjolan ireguler pada tepi ujung oviduk (*fimbriae*). Pada saat ovulasi, pembuluh-pembuluh darah pada *fimbriae* penuh berisi darah yang mengakibatkan pembesaran dan penegangan *fimbriae*. Penegangan ini diiringi oleh kontraksi otot-otot menyebabkan *ostium* tuba fallopi mendekati permukaan ovarium untuk menerima ovum matang yang akan dilepaskan. Bagian ampula dari tuba fallopi merupakan setengah dari panjang tuba dan bersambung dengan daerah tuba yang sempit yaitu *isthmus*. Pada saat ovulasi, ovum disapu ke

dalam ujung oviduk yang *berfimbrial*. Kapasitas sperma, fertilisasi, dan pembelahan embrio terjadi di dalam tuba fallopi. Cairan *luminal* tuba fallopi merupakan lingkungan yang baik untuk terjadinya fertilisasi dan permulaan perkembangan embrional. Fungsi oviduk: menerima sel telur yang diovolasikan oleh ovarium, sebagai transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, sebagai tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa (*fertilisasi*). tempat terjadinya kapasitas *spermatozoa*, tempat memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas *spermatozoa*, transport yang telah dibuahi (*zigot*) menuju uterus (Colville, 2008).

c. Uterus

Uterus terdiri dari kornua, korpus, dan serviks. Proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antara spesies. Uterus babi tergolong *bicornis* dengan kornua yang sangat panjang tetapi korpusnya sangat pendek. Uterus sapi, domba dan kuda kedua kornua dan korpus uteri yang cukup panjang (paling besar pada kuda). Dari segi fisiologik, hanya dua lapisan uterus yang dikenal yaitu endometrium dan miometrium. Endometrium adalah suatu struktur *glanduler* yang terdiri dari lapisan epitel yang membatasi rongga uterus, lapisan *glanduler*, dan jaringan ikat. Miometrium merupakan bagian muskuler dinding uterus yang terdiri dari dua lapis otot polos, selapis dalam otot sirkuler, dan selapis luar otot *longitudinal* yang tipis (Marawali, 2001).

Permukaan dalam uterus ruminansia mengandung penonjolan-penonjolan seperti cendawan dan tidak berkelenjar, disebut *caruncula*. Uterus sapi memiliki 70-120 *caruncula* yang berdiameter 10 cm dan terlihat seperti spon karena banyak

lubang-lubang kecil (*crypta*) yang menerima *villi chorionok placentalis*. *Villi-villi chorion* hanya berkembang pada daerah tertentu pada selubung fetus (*cotyledon*) yang memasuki *caruncula*. *Cotyledon* dan *caruncula* bersama-sama disebut *placentoma*. Udan babi tidak mempunyai *caruncula*. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk perkembangbiakan ternak. Pada waktu perkawinan, kontraksi uterus mempermudah terusnya kudu pengangkutan sperma ke tuba fallopi. Sebelum implantasi, uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat *suspensi* bagi *blastocyt*, sesudah implantasi uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus (Frandsen (1996)).

Fungsi lain uterus adalah adanya hubungan kerja secara timbal balik dengan ovarium. Adanya korpus luteum akan merangsang uterus menghasilkan $PGF_{2\alpha}$ yang berfungsi untuk regresi korpus luteum secara normal. Stimulasi uterus selama fase permulaan siklus birahi mempercepat regresi korpus luteum dan menyebabkan estrus.

d. Serviks

Serviks adalah suatu struktur berupa *sphincter* yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang rapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Pada ruminansia penonjolan-penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang disebut cincin-cincin *annuler*. Cincin-cincin ini sangat nyata pada sapi (biasanya 4 buah) yang dapat menutup rapat serviks. Pada babi, cincin-cincin tersebut tersusun dalam bentuk sekrup pembuka botol yang disesuaikan dengan perputaran spiralis ujung penis babi jantan. Pada kuda, rongganya lurus

dengan lipatan memanjang berbentuk seperti corong sehingga mudah dilatasi secara manual.

Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya *canalis servicalis* sehingga mencegah masuknya materi *infeksius* ke dalam uterus serta mencegah fetus keluar. Sesaat sebelum partus, penyumbat serviks mencair dan serviks mengalami dilatasi sehingga terbuka dan memungkinkan fetus beserta selaputnya dapat keluarnya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat estrus, serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan *mucus* yang keluar melalui vagina. Pada saat hewan bunting, serviks menghasilkan sejumlah besar *mucus* tebal yang dapat menutup atau menyumbat.

e. Vagina

Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis, dorsal dari vesica urinaria, dan berfungsi sebagai alat *kopulatoris* (tempat deposisi semen dan menerima penis), serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Legokan yang dibentuk oleh penonjolan serviks ke dalam vagina disebut *fornix*. *Himen* adalah suatu konstiksi sirkuler antara vagina dan vulva. *Himen* dapat menetap dalam berbagai derajat pada semua spesies dari suatu pita sentral tipis dan vertikal sampai suatu struktur yang sama sekali tidak tembus (*himen imperforata*). Vagina mempunyai panjang yang bervariasi sapi mempunyai panjang 25,0-30,0 cm, domba 7,5-10,0 cm, kuda 20,0 -35,0 cm dan 7,5-11,5 cm. Pada vagina sapi dan domba masih ditemukan

sisa-sisa saluran *Wolfi* sedangkan pada kuda dan babi jarang ditemukan sisa-sisa saluran *Wolfi*.

f. Alat Kelamin Luar

Alat kelamin luar terbagi atas vestibulum dan vulva. Vulva terdiri dari labia majora, labia minor, commisura dorsalis dan ventralis, sertaklitoris. Pertemuan antara vagina dan vestibulum ditandai oleh muara uretra eksterna (*orificium urethrae externa*). Pada sapi dan babi terdapat kantong buntu disebut *diverticulum suburethrae* yang terletak pada bagian bawah dari permuaraan uretra. Selama proses partus berlangsung, vestibulum berfungsi untuk tumpuan pertautan bagi seluruh saluran kelamin yang berkontraksi sewaktu mengeluarkan fetus (Frandsen (1996).

2.2.2 Siklus Berahi

Siklus berahi pada setiap hewan berbeda antara satu sama lain tergantung dari bangsa, umur, dan spesies. Siklus berahi pada sapi berkisar antara 18-22 hari (Partodiharjo, 1992). Interval antara timbulnya satu periode berahi ke permulaan periode berikutnya disebut sebagai suatu siklus berahi. Siklus berahi pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase atau periode yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus (Hafez, 2000; Marawali, dkk., 2001; Sonjaya, 2005). Berdasarkan perubahan-perubahan dalam ovaria siklus estrus dapat dibedakan pula menjadi 2 fase, yaitu *fase folikel*, meliputi proestrus, estrus serta awal metestrus, dan *fase luteal*, meliputi akhir metestrus dan diestrus.

Fase 1. Proestrus (prestanding events). Fase ini hanya berlangsung 1-2 hari. Betina berperilaku seksual seperti jantan, berusaha menaiki teman-temannya

(homoseksualitas), menjadi gelisah, agresif, dan mungkin akan menanduk, melenguh, mulai mengeluarkan lendir bening dari vulva, serta vulva mulai membengkak.

Fase 2. Estrus (Standing Heat). Pada fase ini hewan betinadiam bila dinaiki oleh temannya atau *standing position*. Tetapi juga perlu diperhatikan hal lain seperti seringkali melenguh, gelisah, mencoba untuk menaiki teman-temannya. Sapi betina menjadi lebih jinak dari biasanya. Vulva bengkak, keluar lendir vulva jernih, mukosa terlihat lebih merah dan hangat apabila diraba.

Fase 3. Metestrus (Pasca Berahi). Periode ini berlangsung selama 3-4 hari setelah berahi, sedikit darah mungkin keluar dari vulva induk atau dara beberapa jam setelah *standing heat* berakhir. Biasanya 85% dari periode berahi pada sapi dara dan 50% pada sapi induk berakhir dengan keluarnya darah dari vulva (untuk cek silang saat mengawinkan inseminasi harus sudah dilakukan 12-24 jam sebelum keluarnya darah). Keadaan ini disebut *perdarahan metestrus (metestrual bleeding)*, ditandai dengan keluarnya darah segar bercampur lendir dari vulva dalam jumlah sedikit beberapa hari setelah berahi. Perdarahan ini biasanya akan berhenti sendiri setelah beberapa saat. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua siklus berahi pada sapi berakhir dengan keluarnya darah. Keluarnya darah tidak selalu berarti ovulasi telah terjadi dan tidak selalu menunjukkan bahwa bila diinseminasi ternak akan bunting atau tidak. Keluarnya darah hanya akan menunjukkan bahwa ternak telah melewati siklus berahi.

Fase 4. Diestrus. Berlangsung selama 12-18 hari setelah periode *metestrus* sampai periode *proestrus* berikutnya dan alat reproduksi praktis "tidak aktif"

selama periode ini karena dibawah pengaruh hormon progesteron dari korpus luteum.

2.2.2 Lama Birahi

Hewan betina pada umumnya memiliki waktu tertentu dimana ia mau dan bersedia menerima penjangtan untuk aktivitas kopulasi. Waktu tersebut dikenal sebagai masa birahi (estrus). Estrus datang secara klinis atau periodik, berlangsung selama waktu tertentu tergantung pada jenis hewannya. Interval antara timbulnya satu periode birahi ke permulaan periode berikutnya dikenal sebagai satu siklus birahi.

Dalam suatu riwayat: Telah menceritakan kepada kami *Abu 'Awanah* dari *Simak* dari *Musa bin Thalhah* Radhiyallahu'anhu dari *Bapaknya* dia berkata: Saya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya: 'Apa yang dilakukan orang-orang itu?' Para sahabat menjawab; 'Mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah.' Maka Rasulullah pun bersabda: 'Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya.' Thalhah berkata; 'Kemudian mereka diberitahukan tentang sabda rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh

karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena, aku tidak pernah mendustakan Allah (Shahih Muslim 2361).

Dengan hadis atas dapat kita analogikan bahwa tanaman kurma betina (kepala putik) yang tidak ditaburi serbuk sari dari kurma jantan pada saat mekar maka tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan bahkan tidak dapat berbuah dan itulah yang menyebabkan kurma yang di ceritakan dalam hadis di atas tidak berbuah. Waktu di lakukan penaburan serbuk sari hanya bisa dilakukan pada saat pemekaran kepala putik dari kurma betina. Begitu pula pada ternak sapi yang ingin kita mengembangkan dengan teknologi Inseminasi buatan. Dimana hanyan ada masa dimana ternak sapi berkeinginan untuk kawini yaitu masa estrus. Selama siklus ekstras dapat di temukan berbagai perubahan di dalam tubuh dan organ reproduksinya. Perubahan yang di maksud meliputi perubahan ovarium, rahim (ketebalan endometrium), dan tingkat hormone reproduktif di dalam tubuh dan organ reproduksinya.

Estrus didefinisikan sebagai periode waktu ketika betina resepsif terhadap jantan dan akan membiarkan untuk dikawini. Menurut Frandson (1996), fase estrus ditandai dengan sapi yang berusaha dinaiki oleh sapi pejantan, keluarnya cairan bening dari vulva dan peningkatan sirkulasi sehingga tampak merah. Rendahnya efisiensi reproduksi diduga karena deteksi estrus yang kurang optimal yang disebabkan oleh lama berahi yang pendek, bahkan deteksi estrus yang sulit ditemukan.

Tabel 2.1. Siklus Estrus Pada Sapi

Karakteristik	Keterangan
Pubertas	12 (8 – 18 bulan)
Proestrus	3-4 hari
Metestrus	2 hari
Diestrus	15 hari Sampai musim kawin
Anestrus	16 (6 – 20 jam)
Lama estrus	21 (14 – 24 hari)
Panjang siklus estrus	12 (2 – 26 jam)
Saat ovulasi	35 (16 – 90 hari)

Sumber : Mc Donald (1969)

Lama estrus pada sapi sekitar 12-24 jam (Putro, 2008). Estrus pada sapi biasanya berlangsung selama 12-18 jam. Variasi terlihat antar individu selama siklus estrus, pada sapi-sapi di lingkungan panas mempunyai periode estrus yang lebih pendek sekitar 10-12 jam. Selama atau segera setelah periode ini, terjadilah ovulasi. Ini terjadi dengan penurunan tingkat FSH dalam darah dan kenaikan tingkat LH. Sesaat sebelum ovulasi, folikel membesar dan turgid serta ovum yang ada di situ mengalami pemasakan. Estrus berakhir kira-kira pada saat pecahnya folikel ovari atau terjadinya ovulasi (Frandsen, 1996).

Lamanya berahi bervariasi pada tiap-tiap hewan dan antara individu dalam satu spesies. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh variasi-variasi sewaktu estrus, terutama pada sapi dengan periode berahinya yang terpendek diantara semua ternak mamalia. Berhentinya estrus sesudah perkawinan merupakan indikasi yang baik bahwa kebuntingan telah terjadi. Akan tetapi dapat juga terjadi pada 3 sampai 5% sapi-sapi yang bunting selama 3 bulan pertama masa kebuntingan walaupun dapat terjadi dalam bulan-bulan yang lebih tua. (Achyadi, 2009).

Lama siklus berahi pada sapi dikontrol oleh sekresi progesteron dan CL. Konsentrasi progesteron akan meningkat setelah ovulasi dan mencapai konsentrasi maksimum pada hari ke 8-11 dalam siklus berahi. Tingginya konsentrasi progesteron akan menghambat sekresi GnRH. Pada ternak yang tidak bunting, dimana prostaglandin F_2 disokong oksitosin yang disekresikan endometrium uterus, CL akan regresi dan konsentrasi progesteron menurun sampai 0,5 ng/ml dalam waktu 24 jam. Selama siklus berahi, CL merupakan struktur yang penting dalam hal ukuran dan lama terjadinya. Munculnya dan hilangnya CL bertanggung jawab terhadap fenomena siklus berahi yang sedang berlangsung (Sonjaya, 2005). Gejala birahi yang umumnya terlihat yaitu keluarnya lendir, perubahan kondisi vulva (merah, bengkak dan basah) gelisah dan nafsu makan menurun menaiki dan dinaiki oleh sesama sapi betina. Tidak semua ternak yang birahi dapat memperlihatkan semua gejala birahi dengan intensitas atau tingkatan yang sama.

Tabel 2.2. Lama Periode Siklus Berahi pada Ternak

Ternak	Proestrus (hari)	Estrus (hari)	Meteestrus (hari)	Diestrus (hari)
Sapi	3	12 – 24 jam	3 – 5	13
Kuda	3	4 – 7	3 – 5	6 – 10
Babi	3	2 – 4	3 – 4	9 – 13
Domba	2	1 - 2	3 – 5	7 – 10

Sumber : Marawali dkk. (2001)

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Birahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi antara lain pakannutrisi yang terkandung di dalam ransum berpengaruh pada organ-organ

reproduksi dan fungsi kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Manajemen atau tatalaksana sangatlah berpengaruh terhadap ternak sapi terhadap penyakit dan suhu udara dan musim sangat berpengaruh terhadap sifat reproduksi.

2.2.4.1 Kekurangan Nutrisi

Faktor nutrisi merupakan faktor yang lebih kritis, dalam arti baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung terhadap fenomena estrus dibanding faktor lainnya. Jadi, nutrisi yang cukup dapat mendorong proses biologis untuk mencapai potensi berahi, mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak nyaman dan meminimalkan pengaruh-pengaruh dari teknik manajemen yang kurang baik. Nutrisi yang kurang baik tidak hanya akan mengurangi potensi genetiknya, tetapi juga memperbesar pengaruh negatif dari lingkungan. Disamping itu, faktor nutrisi lebih siap dimanipulasi untuk menjamin luaran produk yang positif dibanding faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius terhadap interaksi antara nutrisi dan siklus estrus terutama di daerah tropika, yang disebabkan beberapa hal antara lain: ketidakcukupan nutrisi dalam arti secara kuantitatif yaitu konsumsi pakan dan kualitatif yaitu ketidakseimbangan zat-zat nutrisi. Kegagalan memahami dengan baik interaksi ini untuk mengurangi dampak negatif dan memperbesar dampak positif akan berpengaruh buruk terhadap efisiensi estrus pada ternak. kelompok sapi betina tidak pernah dikeluarkan pada kandang terbuka, tidak mengenal baik tingkah laku berahi, kekurangan energi sapi banyak kekurangan zat nutrisi akibat produksi susu tinggi atau kekurangan pakan dan konsumsi bahan kering rendah (Achyadi, 2009).

2.2.4.2 Keadaan Corpus Luteum

Kegagalan memperlihatkan gejala berahi biasanya disebabkan karena sapi dengan corpus luteumnya yang fungsional dimana sapi bunting, corpus luteum yang persisten adanya kematian embrio dini, berahi lemah (sub estrus), berahi tenang (*silent estrus*) dan berahi yang tidak terobservasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sonjaya (2005) bahwa penyebab terlambatnya siklus berahi kembali setelah beranak adalah infeksi primer, trauma partus retentio secundinarum, ketidakseimbangan nutrisi, kurang gerak, stress laktasi, predisposisi keturunan, dan thyroid insufisiensi.

2.2.5 Inseminasi Buatan (IB) pada sapi

Inseminasi buatan (IB) atau disebut juga dengankawin suntik merupakan suatu terobosan yang boleh dikatakan baru dalam membantu peternak untuk meningkatkan hasil produksi. Sekarang IB diIndonesia boleh dikatakan sudah mulai memasyarakat, khususnya pada sapi. Karena sudah banyak masyarakat yang tahu dan melakukan IB pada ternak mereka.

2.2.5.1 Sejarah Perkembangan Inseminasi Buatan

Sejarah Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan (IB) pada hewan peliharaan telah lama dilakukan sejak berabad-abad yang lampau. Seorang pangeran arab yang sedang berperang pada abad ke-14 dan dalam keadaan tersebut kuda tunggangannya sedang mengalami birahi. Kemudian dengan akal cerdikya, sang pangeran dengan menggunakan suatu tamponkapas, sang pangeran mencuri semen dalam vagina seekor kuda musuhnya yang barusaja dikawinkan dengan pejantan yang dikenal cepat larinya. Tampon tersebutkemudian dimasukkan ke

dalam vagina kuda betinanya sendiri yang sedang birahi. Alhasil ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan lahirlah kuda baru yang dikenal tampan dan cepat larinya. Inilah kisa awal tentang IB, dan setelah itu tidak lagi ditemukan catatan mengenai pelaksanaan IB atau penelitian ke arah penggunaan teknik tersebut (Toelihere, 1993).

Inseminasi Buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun limapuluhan oleh Prof. B. Seit dari Denmark di Fakultas Kedokteran Hewan Bogordan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) didirikanlah beberapa stasiun IB di beberapa daerah di Jawa Tengah (Ungaran dan Mirit/Kedu Selatan), Jawa Timur (Pakong dan Grati), Jawa Barat (Cikole/Sukabumi) dan Bali (Baturati). Juga FKH dan LPP Bogor, difungsikan sebagai stasiun IB untuk melayani daerah Bogor dan sekitarnya, Aktivitas dan pelayanan IB waktu itu bersifat hilang, timbul sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (Toelihere, 1993).

2.2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Inseminasi Buatan (IB)

a. Peternak

Dilihat dari faktor manusia, kegagalan reproduksi terletak pada kesalahan dalam tata laksana yaitu seringnya peternak mengganti pejantan jika seekor betina tidak langsung menjadi bunting pada perkawinan pertama atau kedua, yang lebih parah lagi bila perkawinan dilakukan secara IB kurang berhasil maka diganti dengan perkawinan secara alami. Tindakan ini dapat mengakibatkan kekacauan pada pencatatan dan mudahnya penularan bibit penyakit khususnya penyakit reproduksi pada ternak sapi (Toelihere, 1993).

Untuk mengetahui efisiensi reproduksi maksimal pada kelompok sapi, setiap ekor sapi harus berkembang biak menurut frekuensi sesuai dengan ukuran ekonomid sapi ini harus dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama selamahirupnya supaya sapi tersebut dapat menutup biaya untuk membesarkan anaknya sampai mencapai umur dapat berkembang biak, sehingga diharapkan peternak dapat menentukan dan memilih ternak yang cocok untuk dipelihara (Djanuar, 1986).

Menurut Toelihere (1993) ditinjau dari faktor manusia, kegagalan reproduksi ternak pada kesalahan tatalaksana yang dapat dibagi atas : 1) Kegagalan pendeteksian birahi dan kegagalan melaporkan dan mengawinkan sapi betina pada saat yang tepat. 2) Terlalu singkatnya pengawinan setelah partus. 3) Kegagalan melakukan pemeriksaan sebelum sapi disingkirkan karena alasan majir. 4) Kegagalan mengenal adanya pejantan mandul di suatu peternakan. 5) buruknya kualitas pakan yang diberikan.

b. Manajemen Pemeliharaan

Pemeliharaan sapi dapat dilakukan secara ekstensif, semi intensif dan intensif. Pemeliharaan secara ekstensif adalah dengan membiarkan sapi dilepas pada padang penggembalaan selama 24 jam sedangkan secara intensif pada siang hari dilepas pada padang penggembalaan dan pada malam hari dikandangkan. Pemeliharaan intensif adalah pemeliharaan sapi di mana seluruh aktivitas ternak dilakukan dikandang dan kebutuhan pakan ternak disediakan seluruhnya oleh peternak (Sugeng, 2002).

Secarasingkat manajemen peternakan dapat dibagi atas tiga proses yaitu (1) pemilihan bibit, pakan, pencegahan penyakit (2) proses produksi dan (3) proses hasil dan penanganannya, ketiga proses ini harus berjalan lancar dan seimbang. Apabila salah satunya terhambat maka seluruh aliran produksi akan terganggu (Rasyaf, 1996).

Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas maka dibutuhkan pemilihan induk yang berkualitas pula yang dapat dilakukan dengan menilai bentuk eksterior nya, silsilah berdasarkan silsilah, seleksi berdasarkan penilaian dalam pameran dan penilaian berdasarkan catatan produksi yang dihasilkan (Sumoprastowo, 2003).

c. Pakan

Pakan merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan dan pembangkit tenaga. Pada umumnya sapi membutuhkan makanan berupa hijauan dan pakan tambahan 1-2% dari berat badan. Bahan pakan tambahan ini dapat berupa dedak halus (bekatul), bungkil kelapa, gaplek dan ampas tahu (Tabrani, 2004). Selanjutnya Bandini (2003) mengatakan bahwa setiap hari sapi memerlukan pakan hijauan sebanyak 10 % dari berat badannya dan diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan sore.

Murtidjo, (2000), menjelaskan bahwa pemberian pakan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, dengan pengembalaan (Pasture fattening), kreman atau Dry Lot Fattening dan kombinasi cara pertama dan kedua. Berfungsinya alat reproduksi ternak sapi betina bibit secara sempurna tidak lepas dari proses-proses biokimia dari sebagian besar alat tubuh. Hal ini menunjukkan sapi bunting

memerlukan nutrisi makanan yang baik dan seimbang dengan kebutuhannya. Ovulasi, estrus, kebuntingan, dan kelahiran, semuanya akan tergantung pada fungsi yang sempurna berbagai hormon dan alat-alat tubuh. Setiap abnormalitas dalam anatomi reproduksi mengakibatkan fertilitas menurun atau bahkan menimbulkan kemandulan. Defisiensi makanan untuk sapi sedang bunting menyebabkan embrio yang sedang tumbuh dan berkembang bisa merusak kondisinya dan menyebabkan kematian fetus di dalam uterus atau kelahiran anak sapi yang lemah atau cacat.

d. Kesuburan Ternak

Produktivitas ternak betina bibit dapat dinilai dari jumlah anak yang dihasilkan per tahun atau per satuan waktu. Jarak dari kelahiran sampai terjadinya kebuntingan selanjutnya merupakan faktor yang sangat menentukan dari segi ekonomis. Pemulihan fertilitas induk menyangkut kondisi saluran reproduksi induk setelah melahirkan melalui fase penghambatan aktivitas pembiakan selama anetrus dan involusi uterus selesai. Pemulihan kesuburan ternak setelah melahirkan ditandai oleh kembalinya siklus birahi, mau dikawini pejantan dan dilanjutkan terjadi kebuntingan. Apabila aktivitas siklus birahi terjadi, involusi uterus tidak lagi menjadi faktor pembatas fertilitas, tetapi angka konsepsi akan rendah bila induk dikawinkan dalam dua bulan pertama setelah melahirkan. Makin panjang jarak kawin kembalisetelah beranak, angka konsepsi yang diperoleh akan semakin tinggi (Hunter,1981).

Waktu yang optimal untuk melaksanakan IB adalah pada saat uterus sudah kembali normal, sebaiknya uterus bebas dari penyakit yang menular, dan telah

mengalami beberapa kali birahi setelah beranak baru setelah di IB. Hal ini agar alat reproduksi mencapai involusi yang sempurna sebelum mencapai sapi itu menjadi bunting lagi, sapi sesudah beranak memerlukan waktu 26 hari untuk beristirahat supaya alat reproduksi kembali normal ke bentuk semula, Namun demikian dianjurkan supaya sapi itu diberi waktu lebih lama untuk menjadikan uterus normal kembali sehingga fertilitasnya menjadi optimal (Hunter,1981).

2.3. Pemeriksaan Kebuntingan

Suatu pemeriksaan kebuntingan secara tepat dan dini sangat penting bagi program pemuliaan ternak. Kesanggupan untuk menentukan kebuntingan secara tepat dan perlu dini miliki oleh setiap dokter hewan lapangan atau petugas pemeriksaan kebuntingan. Kesanggupan tersebut merupakan dasar manajemen yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan kemajiran pada ternak. Pengembangan keterampilan ini memerlukan banyak latihan dan praktek. Selain kesanggupan menentukan kebuntingan, perlu pula menentukan umur kebuntingan dan ramalan waktu kelahiran dengan ketetapan beberapa sampai satu atau dua minggu tergantung pada tingkat kebuntingan. Kebuntingan harus dapat di bedakan dari kondisi-kondisi lain seperti pyometra, memmifacio foetus, mucometra, maceratio foetus, tumor dan metritis.

Kebuntingan pada sapi dan kerbau dapat di diagnosa melalui palpasi rektal atau penentuan kadar progesterone di dalam serum darah. Darah dapat diambil 21 sampai 24 hari setelah inseminasi atau perkawinandan dikirim ke laboratorium endokrinologi untuk ditentukan kadar progesterone memakai teknik radioimmunoassay (RIA). Kadar progesterone yang lebih tinggi dari 2 mg per ml

dapat menandakan adanya kebuntingan. Penentuan kadar progesterone didalam darah memakai teknik RIA maupun palpasi per-rektal terhadap Corpus Luteum (CL) memberi ketepatan diagnosa 90 persen dalam periode 21 sampai 24 hari sesudah inseminasi atau perkawinan (ball, 1997).

Palpasi per-rektal terhadap uterus dan isinya merupakan cara yang paling praktis dan cepat untuk menentukan kebuntingan pada sapi dan kerbau di lapangan. Orientasi anatomic dan pemeriksaan kebuntingan per-rektal. Diagnose dengan memakai metoda ini dapat di lakukan paling cepat 35 hari sesudah inseminasi. Ketepatan di atas 95 persen dapat di peroleh sesudah 60 hari umur kebuntingan.

2.3.1 Indikasi Luar

Pada umumnya peternak menganggap bahwa perkawinan alam atau Inseminasi Buatan (IB) sudah merupakan suatu pertanda akan terjadinya kebuntingan. Berhentinya gejala-gejala birahi menandakan adanya kebuntingan. Akan tetapi tidak berarti seratus persen akan terjadi kebuntingan. Peternak mungkin lalai memperhatikan birahi atau gejalanya mungkin tidak nampak walaupun tidak terjadi kebuntingan. Kematian embrional dini atau abortus dapat pula terjadi. Kira-kira 15 persen atau lebih sapi yang tidak diamati birahinya sesudah perkawinan alam atau IB biasanya tidak bunting pada pemeriksaan 60 hari sesudah servis (Roberts, 1999). Perubahan-perubahan patologik dapat terjadi di dalam uterus, seperti myometra atau di dalam ovaria, seperti sista, yang menyebabkan kegagalan birahi. Beberapa sapi betina memperlihatkan tanda-tanda birahi selama kebuntingan.

Pendarahan metestrus “menstruasi” atau pengeluaran darah dan mucus 24 sampai 48 jam sesudah perkawinan, dinyatakan oleh beberapa orang sebagai indikasi tidak terjadinya konsepsi. Laporan-laporan menyatakan bahwa kira 50 sampai 60 persen sapi induk dan 70 sampai 80 persen sapi dara memperlihatkan sedikit perdarahan melalui vulva sesudah birahi. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara perdarahan dan konsepsi (Timberger, 1998).

Pada kebuntingan tua, abdomen cenderung untuk membesar tetapi tanda ini tidak merupakan indikasi yang dapat di percaya tentang kebuntingan. Kelenjar susu pada sapi dara berkembang dan membesar pada umur kebuntingan 4 sampai 5 bulan. Pada sapi tua yang sudah sering beranak pembesaran dan oedema kelenjar susu sering tidak jelas antara 1 sampai 4 minggu menjelang akhir kebuntingan hewan betina bertambah tenang, lamban dan berhati-hati dalam pergerakannya sesuai dengan pertambahan umur kebuntingan, terutama pada minggu terakhir dan ada kecenderungan pertambahan berat badan. Ligament pelvis mulai mengendur, dan pada hewan yang kurus terlihat pelebaran yang jelas pada pangkal ekor. Oedema dan relaksasi vulva terlihat pada beberapa minggu terakhir kebuntingan.

Pada umumnya gerakan fetus dapat dipantulkan atau pergerakannya dapat diobservasi dari luar pada dinding perut sesudah kebuntingan berumur 6 bulan. Kadang-kadang pada hewan yang kurus dan fetus yang terletak di tepi dinding abdomen, hal ini dapat diamati pada kebuntingan 5 bulan. Sebaliknya pada hewan yang gemuk, fenomena ini tidak dapat di lihat sampai umur kebuntingan sampai umur kebuntingan 8 sampai 9 bulan. Tergantung pada ukuran fetus, kondisi induk dan ukuran serta isi abdomen, fetus dapat diraba pada 5 persen pada sapi perah

yang umur kebuntinga 5 bulan, 10 sampai 50 persen pada kebuntingan 6 bulan, 70 sampai 80 persen pada umur kebuntingan 7 bulan, 80 sampai 90 persen pada kebuntingan 8 bulan dan di atas 90 persen pada kebuntingan 9 bulan (Roberst, 1999).

Denyutan jantung fetus dapat diauskultasi pada daerah legok lapar kanan dari 6 sampai 7 bulan akhir masa kebuntingan. Namun demikian auskultasi sulit dilaksanakan karena dinding abdomen dan viscera yang tebal dan lokasi yang tenang sulit ditemukan. Dibandingkan dengan cara lain, teknik ini tidak praktis pada sapi karena kemungkinan banyak terjadi kesalahan.

2.3.2 Indikasi Dalam

Palpasi per-rektal terhadap uterus, ovariah dan pembuluh darah uterus adalah cara diagnosa kebuntingan yang paling praktis dan akurat pada sapi dan kerbau. Sebelum palpasi rektal, perlu dipelajari sejarah perkawinan ternak yang bersangkutan, termasuk tanggal melahirkan terakhir, tanggal dan jumlah perkawinan atau inseminasi dan informasi setiap kondisi patologi dan penyakit yang pernah di alami atau terjadi pada saluran kelamin ternak tersebut. Catatan perkawinan dan reproduksi yang lengkap sangat bermanfaat untuk menentukan kebuntingan secara cepat dan tepat. Sayangnya sekali tidak semua peternakan memiliki catatan semacam ini.

Apabila sekelompok ternak akan diperiksa, sebaiknya ada seorang yang mencatat hasil pemeriksaan. Pemeriksaan harus mengenakan pakai pelindung yang sesuai berupa sepatu boot karet, pakai lapangan berlengan pendek dan sarung tangan plastik. Sarung tangan karet atau plastic penting untuk melindungi tangan

dan lengan pemeriksa dari kegatalan, infeksi, kotoran dan bau, dan melindungi rectum sapi terhadap iritasi karena bulu tangan dan kuku pemeriksa. Kuku harus di potong tumpul, rata dan licin dan tidak boleh memakai cicin. Banyak pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri, supaya tangan kanan dapat dipakai untuk menulis atau memanipulasi alat-alat. Sapi yang diperiksa harus ditempatkan di dalam kandang jepit untuk mencegah bahaya bagi pemeriksa terhadap tendangan, pergerakan kedepan dan kesamping oleh ternak yang di periksa. Sapi yang jarang menendang bila sedang diperiksa secara rektal, tetapi sapi perah atau sapi potong yang terkejut dapat menendang kebelakang dan dapat mencederai pemeriksa. Suatu palang harus ditempelkan dibagian belakang kandang jepit atau dibelakang sapi, di atas legokan kaki belakangnya. Pemakaian kekang hidung atau pengangkatan ekor hewan secara ketat ke atas dan kedepan dapat mencegah sapi menendang.

Tangan harus dilicinkan dengan sabun atau bair sabun yang tidak mengiritasi. Tangan dimasukan ke rectum dalam bentuk kerucut dan di teruskan sampai melampui organ atau struktur yang akan di palpasi. Sesudah tangan masuk, kembalikan kembalikan sebagian rektumkebelakang sebagai lipatan pada tangan dan menyebabkan peningkatan relaksasi rectum. Pada umumnya sebagian besar faeses perlu disingkirkan dari rectum sebelum pemeriksaan dilakukan. Hal dapat dilakukan dengan mengeruk faeses dari rectum dengan memakai tangan atau dengan menstimulir kontraksi peristaltic dan defekasi dengan mengurut dinding rectum tepat di anterior anus dan dengan membiarkan udara masukmasuk ke rectum dan mengembangkannya. Punggung sapi tidak boleh ditekan karena

dapat menyebabkan pemasukan udara. Semua pemeriksaan rektal harus dilakukan dengan hati-hati, halus, sabar dan mencegah terjadinya trauma pada mukosa atau perobekan pada dinding rectum. Apabila terjadi perusakan pada dinding mukosa maka pemeriksaan harus dihentikan.

Adanya darah bebas atau gumpalan darah segar yang cukup banyak dan tidak tercampur dengan feases, sangat mungkin menunjukkan adanya ruptur. Apabila terjadi ruptur pemeriksaan harus dihentikan dan ternak diberi pengobatan dengan antibiotik dan atropine. Suatu pemeriksaan secara rutin dan teratur terhadap saluran kelamin betina harus dikembangkan dan diikuti pada setiap pemeriksaan supaya tidak ada bagian saluran kelamin yang terlewat. Pada pemeriksaan rektal, tangan dimasukkan kedalam inlet pelvis atau tepian kranial pelvis bertulang dan dengan telapak tangan yang membuka kebawah, kembali ke sisi lain dan keatas. Apabila tidak ada struktur yang teraba, uterus berada pada rongga pelvis (Toelihere, 1993)..

Biasanya serviks atau uterus teraba di tepi pelvis pada hewan tua. Serviks yang keras dan ketat dilokalisasi pada lantai pelvis atau di kranialnya. Corpus, cornua uteri dan *ligamentum intercornualis* pada *biforcatio uteri* dapat dipalpasi pada hewan yang tidak bunting atau pada kebuntingan muda. Ovaria dapat teraba di lateral dan agak kranial dari serviks. Sewaktu kebuntingan berkembang, ovaria tertarik kedepan, terutama ovaria yang berhubungan dengan cornua bunting dan tidak terjangkau lagi pada kebuntingan 4 sampai 6 bulan. Uterus dapat terletak lateral didalam rongga pelvis bila di tahan dan disana oleh kantungair seni yang penuh atau oleh ligamentum lata yang pendek. Uterus tidak bunting dan normal

pada sapi dara dan pada api yang sudah beranak masing-masing mempunyai diameter 1,25 sampai 2 cm dan 2,5 sampai 6,5 cm dan panjang 15 sampai 20 cm dan 20 sampai 30 cm. uterus biasanya lunak, dapat diketuk dan dikendur dengan sedikit ketegangan pada permulaan kebuntingan. uterus yang benar-benar lemas dan atonik terdapat pada anestrus sejati dan sistia ovaria yang kronik. Sewaktu birahi atau bila dirangsang uterus menegang dan berereksi. Pada akhir estrus dan permulaan proestrus, satu sampai dua hari sesudah ovulasi, uterus berdinding tebal dan oedematous. Sering kali 20, 40 atau 60 hari sesudah konsepsi, uterus dapat menjadi sangat berereksi dan tegang bersamaan dengan aktivitas folikuler pada ovarium, walaupun terdapat suatu korpus luteum normal (Toelihere, 1993).

Untuk memperjelas diagnose, dapat dilakukan retraksi manual terhadap uterus yang tidak bunting atau yang bunting satu sampai dua bulan ke dalam rongga pelvis dari rongga abdomen. Cara ini terdiri dari penarikan serviks ke kaudal dan penarikan diteruskan ke ligamentum interconualis pada bifurcatio uteri.

Toelihere, (1993) menjelaskan bahwa indikasi-indikasi yang pasti tentang adanya kebuntingan pada ternak sapi dan kerbau sebagaimana ditentukan melalui pemeriksaan rektal adalah:

- a. Palpasi cornua uteri yang berisi cairan placenta mulai dari ke 30 sampai ke 90 periode kebuntingan.
- b. Palpasi secara halus dan penuh dengan hati-hati terhadap kantong amnion pada umur kebuntingan muda, 35 sampai 50 hari

- c. Selip selaput foetal, allantochorion, pada penjepitan secara luwes terhadap uterus diantara ibu jari dan jari terluhuk pada kebuntingan muda, 40 sampai 90 hari.
- d. Perabaan dan pemantulan kembali foetus di dalam uterus yang membesar yang berisi selaput foetus dan cairan placenta.
- e. Perabaan placentoma
- f. Palpasi arteri uterine media yang membesar, berdinding tipis dan berdesir (fremitus).

Tanda-tanda yang kurang pasti tetapi ikut menentukan diagnose kebuntingan adalah asimetri cornua uteri yang teraba melalui bifocatio cornua uteri terutama pada kebuntingan muda, pembesaran ukuran uterus dan penipisan serta pengembangan dindingnya, lokasi uterus didalam rongga abdomen, lokasi, ukuran dan persistensi corpus luteum dan perubahan-perubahan vaginal.

Tabel 2.3. Ukuran dan Sifat Foetus dan Uterus Sapi selama Kebuntingan.

Umur kentingangn Bulan/hari	Diameter cornua bunting (cm)	Jumlah cairan foetus (m)	Panjang fetus (cm)	Berat fetus (g)	Diameter placentoma (cm)
1/ 30 hari	2 – 4	30-60	0,1 – 1	0,3- 4,5	-
40 hari	3 – 6	75-100	1,75-25	1- 1,5	-
50 hari	5– 7	90-200	3,5-5,5	3- 6	-
2/60 hari	6 – 9	200-450	6- 8 (sebesar menci)	8-40	
70 hari	7 – 10	350-650	7-10	25-100	0,5-0,75
80 hari	9 -12	500-800	8-13	120-400	0,5-1,0
3/90 hari	10 -13	750-1400	13-17 (sebesar tikus)	200-400	1,0-1,5 (seukuran uang logam Rp. 25)
4/120 hari	12,5-18	2-3,5 l	22-32 (sebesar kucing kecil)	1-2 kg	1,5-2,5 (seukuran uang logam Rp. 50)
5/ 150 hari	18-23	4-5l	30-45 (sebesar kucing besar)	3-4 kg	2,5- 4 (seukuran uang logam Rp. 100)
6/180 hari	-	4-7,5l	40-60	5-10 kg	4-5
7/210 hari	-	6,3-10 l	55-75	8-18 kg	5-7,5
8/240 hari	-	8-12 l	60-85	15-25 kg	6-9
9/270 hari	-	12-20 l	20-50	70-100	8-12

Sumber: Toelihere (1985)

2.3.2.1 Ukuran Kantong Amnion

Ukuran kantong amnion berbeda-beda sesuai dengan umur kebuntingan seperti terlihat pada Tabel di atas kantong amnion berbentuk bulat sampai kira-

kira hari ke 40. Sesudah hari ke 40 bentuknya menjadi oval atau lonjong. Palpasi kantong amnion pada cornua uteri yang bebas pada hari ke 30 sampai hari ke 45 sangat menentukan diagnosa karena sifatnya yang bulat dan tegang, seperti kulit ayam yang berkulit lunak (Wisnicky dan Casida, 1980). Kadang-kadang pada kebuntingan 35 sampai 41 hari hanya teraba selaput chorionic tetapi kantong amnion tidak terpalpasi. Palpasi kantong amnion hanya mungkin antara 30 sampai 65 hari mas kebuntingan (Ball, 1997). Serbelum hari ke 30 kantong amnion sangat kecil dan sesudah hari ke 60 kantong amnion terlalu besar dan lunak untuk di palpasi.

Apabila pada jangka waktu tersebut di atas kantong amnion tidak teraba, kemungkinan besar embrio telah mati dan sedang bermaserasi. Pemeriksaan kebuntingan atau dokter hewan yang berpengalaman, terampil dan halus dapat mendiagnosa kematian embrional pada kebuntingan 30 sampai 40 hari dengan jalan palpasi kantong amnion. Kematian embrional dini ditemukan pada 3,9 persen sapi bunting yang diperiksa pada awal kebuntingan (Studer, 1996). Embrio yang mati diresorpsi oleh tubuh. Palpasi kantong amnion harus dilakukan secara halus dan hati-hati untuk mencegah pecahnya atau mencegah penekanan langsung terhadap embrio atau organ-organnya. Jari-jari dan ibu jari secara halus meraba cornua uteri bunting, dan jari-jari tersebut digerakan ke belakang dan kedepan sehingga kantong amnion dapat teraba. Bila pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan secara halus dan terampil, sebaiknya di tiadakan saja.

2.3.2.2 Selip Membran Fetus

Selip membran fetus adalah cara lain yang membantu diagnosa kebuntingan dini pada sapi yang dapat dilakukan dengan baik pada kebuntingan 35 sampai 90 hari, walaupun foetus dapat selip pada setiap umur kebuntingan, teknik ini telah diuraikan oleh Finscher dan dikutip oleh Roberst (1999), terdiri dari penjepitan cornua bunting secara hati-hati dan merasakan selaput foetus, allantochorion, menyelip di antara ibu jari dan jari-jari lainnya sebelum dinding uterus lepas dari antara jari-jari. Pada awal kebuntingan, membrane foetus terlampaui tipis dan mungkin sulit di palpasi. Teknik ini dapat pula dilakukan dengan menggenggam seluruh cornua uteri dan membiarkannya menyelip di antara jari-jari sehingga pita tenunan ikat dan pembuluh darah allantois pada karvatura minor uterus, yang tiga sampai empat kali lebih tebal dari pada selaput chorionallantois, dapat di palpasi. Penjepitan uterus secara berlebihan terutama terhadap selaput amnion, harus dihindarkan untuk mencegah kerusakan embrio atau foetus. Teknik ini bermanfaat bagi dokter hewan yang melakukan diagnosa diferensial untuk membedakan kebuntingan dari penyakit-penyakit uterus yang ditandai oleh penggumpalan cairan yang memperbesar uterus, seperti *pyometra* dan *atrau mucometra*.

2.3.2.3 Lokasi Uterus Bunting

Pada sapi dara, uterus biasanya terletak didalam rongga pelvis sampai kebuntingan 3 sampai 4 bulan. Pada pluripara atau hewan yang sering beranak, karena uterus pada keadaan tidak bunting terletak pada atau melampaui tepi pelvis, maka konsepsi atau semenjak kebuntingan 2 sampai 3 bulan. Pada semua induk

sapi, uterus terletak pada lantai rongga perut sesudah bulan ke 4 periode kebuntingan. Pada uterus yang menggantung kedalam rongga abdomen, cairan allantois cenderung untuk gravitasi ke apeks, bagian bawah atau ujung uterus yang sering tidak terjangkau oleh pemeriksa, kecuali uterus ditarik kedalam rongga pelvis. Pada sapi dara atau induk muda yang bunting dua sampai 3 bulan, uterus terletak didalam rongga pelvis dan koruna yang mengandung foetus menunjukkan suatu penonjolan dorsal karena lokasinya. Pada bulan ke 5 dan ke 6 uterus tertarik kedepan dan ke bawah dalam rongga perut sehingga dalam beberapa kasus hanya serviks dan arteri uterine media yang dapat di raba melalui rektum. Pada kebuntingan 6 sampai 7 bulan foetus menjadi cukup besar sehingga dapat di raba kembali pada palpasi rektal.

Pada kebuntingan 8 sampai 9 bulan foetus dapat tertang ke kauda sehingga dapat hidung dan kakinya tertumpu rongga pelvis. Sewaktu uterus turun ke depan kedalam rongga perut selama kebuntingan, mesomentrium merentang dan menebal dan ovaria ikut tertarik ke ventral dan ke karnial. Ovaria dapat di palpasi sampai bulan ke empat kebuntingan dan kadang-kadang selama bulan ke lima. Selama bulan tersebut terakhiovarium pada sisi uterus yang berisi foetus umumnya tertarik jauh kedepan dan tidak terjangkau oleh tangan di dalam rectum,. Berhubung umur kebuntingan pada ternak kerbau lebih lama satu bulan dari pada umur kebuntingan sapi, maka perbedaan waktu itu perlu di pertimbangkan dalam penentuan umur kebuntingan pada palpasi rektal, khususnya dalam hal lokasi uterus bunting.

2.3.2.4 Perabaan Foetus

Palpasi foetus sebelum 60 sampai 70 hari mas kebuntingan adalah tidak mungkin, karena kantung amnion tegang dan mengembang sedangkan foetus masih sangat kecil. Menurut perkiraan Roberst (1999) kemungkinan perabaan foetus adalah 95 persen pada kebuntingan 3 sampai 4 bulan, 40 sampai 70 persen pada 5 sampai 6 bulan, 80 persen pada 7 bulan dan 95 persen pada 8 sampai 9 bulan. Lebih besar dan lebih dalam rongga abdomen induk dan lebih panjang mesenterium, lebih sulit untuk meraba foetus per rectum selama pertengahan masa kebuntingan. Jadi pada sapi dara foetus dapat di raba selama seluruh periode kebuntingan. Apabila foetus tidak teraba, maka diagnose kebuntingan didasarkan pada posisi uterus, besar dan aktivitas arteri uteri media, perabaan placenta dan membrane foetus. Sesudah bulan ke enam pergerakan foetus dapat distimulir dengan menekan terancak, menggenggam dan menarik kaki foetus, menekan bola mata atau menggenggam hidung foetus baik melalui dinding rectum maupun melalui dinding vagina. Cara tersebut terakhir hanya dapat di lakukan pada bulan terakhir kebuntingan.

2.3.2.5 Palpasi placentoma

Walaupun placentoma terbentuk pada 60 sampai 70 hari masa kebuntingan yang jarang dapat di palpasi sebagai suatu struktur yang pasti sampai umur hari. Pada waktu placentoma dapat teraba pada kornua bunting sebagai daerah-daerah yang lonjong dan menebal. Placentoma bertambah besar sesuai dengan perkembangan foetus. Pada umumnya placentoma dibagian tengah cornua bunting dan yang mendekat dengan pertautan arteri uterine media adalah lebih besar dari

pada placentoma di dekat serviks, di apeks cornua atau dicornua yang tidak bunting. Jadi placetoma yang terbesar mulai dari kebuntingan bulan ke 5 sampai kelahiran biasanya berada di luar jangkauan tangan pemeriksa.

2.3.2.6 Perkembangan Arteria Uteina Media

Perkembangan arteria uterine media erat berhubungan dengan perkembangan foetus dan umur kebuntingan. Sewaktu \kebuntingan melanjut, suplai darah ke uterus bertambah. Arteri yang mensuplai jumlah terbesar darah ke uterus arteria uterine media. Palpasi perubahan yang terjadi pada ukuran arteri ini dan palpasinya mempunyai nilai diagnostik. Arteri uterine media timbul dari arteri iliaca interna dekat pada asalnya di aorta. Pada hewan yang tidak bunting ia berbelok ke kaudal pada ligamentum lata melampaui bagian dorsal batang ilium dalam logam pelvis, kemudian kebawah dan kedepan diatas tepian pelvis untuk memasuki permukaan konkaf cornua uteridekat pertengahannya. Sewaktu kebuntingan berkembang, ia dapat dilokalisasi 5 sampai 10 cm kranial batang ilium. Arteri ini jangan di kacaukan dengan arteri iliaca interna yang di pertautkan erat oleh fascia pada badan illium. Arteri uterine media terletak pada ligamentum lata yang dapat berpindah-pindah pada jarak 10 sampai 15 cm pada hewan dara suatu perubahan ukuranarteri ini pada cornua bunting dapat di raba paling cepat 60 sampai 75 hari kebuntingan pada diameternya mencapai 0,15 sampai 0,3 cm (Roberts, 1999).

Pada hewan yang lebih tua perubahan ukuran arteri uterine media pada cornua bunting dapat teraba 90 hari sesudah konsepsi, pada diameter arteri mencapai 0,3 sampai 0,45 cm. Arteri uterine media pada cornua yang tidak

bunting juga membesar, tetapi perubahannya tidak nyata pada cornua bunting. Dengan perubahan ukuran arteri, dinding menipis sehingga bukannya denyutan, melainkan desiran atau *fremitus* yang di raba, hal ini pertama kali di rasa pada kebuntingan 80 sampai 180 hari, tetapi jangka waktu ini dapat bervariasi. Pada kebuntingan bulan keempat sampai kelima fremitus selalu teraba. Apabila fremitus dapat berhenti, sehingga hanya terasa pulsasi biasa. Bila pulsasi ringan pada kebuntingan lanjut, arteri tersebut

2.4 Masa Kebuntingan pada Sapi

Kebuntingan didefinisikan sebagai suatu periode fisiologis pasca perkawinan ternak betina yang menghasilkan konsepsi yang diikuti proses perkembangan embrio kemudian fetus hingga terjadinya proses partus (Hafez, 2000), sedangkan menurut Illawati (2009) kebuntingan merupakan suatu proses dimana bakal anak sedang berkembang di dalam uterus seekor hewan betina. Kebuntingan sapi berlangsung sejak konsepsi (fertilisasi) sampai terjadinya kelahiran anak (partus) secara normal (Soebandi, 1987).

Periode kebuntingan sapi dibagi atas tiga tahap, masing-masing tahap berlangsung selama tiga bulan (trimester). Trimester pertama dijadikan acuan untuk deteksi kebuntingan dini sedangkan trimester ke-dua dan ke-tiga dijadikan sebagai dasar untuk deteksi kebuntingan lanjutan. Trimester pertama kebuntingan dijadikan sebagai acuan dalam diagnosis kebuntingan dini disebabkan karena pada usia kebuntingan tersebut asimetri kornua uteri masih jelas teraba dan bifurkasio uteri masih dapat dirasakan sehingga lebih mudah mendiagnosa ada tidaknya kebuntingan. Pada usia kebuntingan diatas 3 bulan kornua yang bunting

sudah semakin besar sehingga asimetri kornua uteri tidak terasa lagi, karena kornua uteri yang ada fetusnya sudah menutup kornua satunya. Pada awal kebuntingan uterus induk sapi muda berada pada rongga panggul (*pelvic cavity*) dan tepat di depan tepian panggul (*pelvic brim*) untuk induk sapi yang telah *pluriparous*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Mukminun/23: 13-14.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدْنَيْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (Kementrian Agama, 2012).

Dalam ayat ini Allah menyampaikan dengan kehendak keilahiannya bertemulah zat tampang dari laki-laki yang rupanya sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Menurut para ahli membagi pertumbuhan embrio menjadi empat tahap, tahap pertama adalah saat sel telur baru saja dibuahi yaitu nutfah. Sperma yang keluar dari satu kail ejakulasi berjumlah jutaan ekor. Akan tetapi dari jumlah yang sebanyak itu hanya satu yang dapat membuahkan. Untuk itu melakukan perjalanan panjang dan membahayakan. Para ahli mengibaratkan tantangan yang dihadapi sperma dalam perjalanan ini ibarat perjalanan manusia menuju bulan.

Setelah pembuahan berlangsung terjadilah perubahan yang sangat cepat pada indung telur. Dengan segera, indung telur menghasilkan membran yang mencegah sperma lain untuk ikut melakukan pembuahan dan dalam hal ini sudah sangat jelas di gambarkan oleh Allah SWT dalam alquran surah Al-mukminun ayat 13 di atas. Kata nutfah yang sedikit air atau setetes air, jelas mendeskripsikan air yang sedikit yang dipancarkan laki-laki saat bersenggama.

Tahap kedua Al-qur'an mendeskripsikannya sebagai 'Alaqah yang mempunyai beberapa arti seperti bentukan seperti lintah, benda yang tersambung, atau segumpal darah. Alaqah merupakan bentuk praembrionik yang terjadi setelah pencampuran sperma dan ovarium. Moore dan Azzaria (1982) mengemukakan penjelasan yang cukup bagus, Alaqah dalam bahasa arab berarti lintah, suatu suspense atau segumpal darah. 'Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik ini di gugurkan maka ia akan tampak seperti segumpal darah.

Transformasi dari Nutfah menjadi 'alaqah berlangsung sekitar 10 hari, di akhiri terbentuknya zigot yang menempel pada dinding rahim dengan plasenta primitive yang dinamakan *Umbilical cord*. Tentang keamanan janin dalam rahim para ahli mengemukakan adanya tiga lapis membran dan ini sudah di gambarkan oleh Allah dalam alquran (Az-Zumar/36:6) sebagai '**tiga kegelapan**' yang dapat mengamankan jani selama berada dalam rahim. Beberapa penelitian kemudian menafsirkan *tiga kegelapan* tersebut dengan tiga lapis amniontik yang mengelilingi rahim, dinding rahim, dan dinding abdomen: yaitu dinding

membrane *amnion* yang mengandung cair, lapisan membrane *chorion* dan lapisan membrane *decidua*. Tahap ketiga yaitu mudgah atau tulang belulang.

Dalam hal ini sudah digambarkan oleh Allah swt dalam Qs. Al- Hajj/22:5.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan (Kementerian Agama, 2012).

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa Dia (Allah) mejadikan dari *nutfah* yakni setetes mani, *kemudian* setetes mani itu setelah bertemu dengan indung telur berubah menjadi *alaqah* yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim, *kemudian* ‘alaqah itu mengalami proses dalam rahim sehingga menjadi *mudghah* yakni sesuatu yang berupa sekerat daging kecil sebesar apa yang dapat dikunyah, ada *mudghah* yang *sempurna kejadiannya* sehingga dapat berproses sampai lahir sempurna dan ada juga yang *tidak sempurna kejadiannya*, yang sempurna kejadiannya untuk berlanjut proses penyempurnaan bentuk sesuai apa yang allah kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan untuk dilahirkannya sembilan bulan lebih.

Dalam hadis Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang jujur dan terpercaya bersabda kepada para sahabatnya. “*Sesungguhnya penciptaan kalian*

dikumpulkan dalam rahim ibu, selama empat puluh hari berupa nutfah (sperma), lalu menjadi alaqah (segumpal darah) selama itu pula, lalu menjadi mudlghah (segumpal daging) selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 (empat) perkara yang telah ditentukan, yaitu: rizky, ajal, amal dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, Dzat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta (dari siku ke ujung jari), namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga maka ia pun masuk surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Toelihere, (1993) menjelaskan bahwa periode kebuntingan pada ternak sapi dapat dibagi kasar dalam tiga bagian, berdasarkan ukuran individu dan perkembangan jaringan maupun organnya. Ketiga periode itu adalah periode Ovum, periode embrio, periode foetus.

1. Periode Ovum atau *blastula*, dalam Al-Quran disebut Nutfah (Al Hajj/22:5) berlangsung 10 sampai 12 hari, sejak waktu pembuahan yang biasanya terjadi beberapa jam setelah ovulasi sampai pembentukan membran zigot di dalam uterus. Selama periode ovum, pembelahan atau *cleavage* ovum yang dibuahi berlangsung di daerah pertemuan *ampulla isthmus* di tuba fallopi sampai

mencapai stadium morulla yang ditandai oleh masa sel luar dan dalam yang berjumlah 16 sampai 32 sel.

2. Periode embrio dan organogenesis, berlangsung dari 12 sampai 45 hari masa kebuntingan. Selama periode ini tenunan, organ dan sistem utama tubuh terbentuk dan terjadi perubahan-perubahan dalam bentuk tubuh sehingga pada akhir periode ini spesies embrio tersebut dapat dikenal. Sejak hari keempat belas trophosblas memanjang dapat berkembang ke kornea yang satu lagi (Greenstein dan Foley, 1958). Amnion terbentuk sempurna dan menutup pada hari ke 20 masa kebuntingan, jantung berkembang dan mulai berdenyut pada hari ke 22, dan pada hari ke 25 masa kebuntingan saluran neurin tertutup dan terdapat 25 somit, allantois berkembang baik, pucuk-pucuk kaki depan terbentuk dan mata serta otak sudah berkembang pesat.

Pertautan selaput-selaput fetus adalah suatu proses gradual yang dimulai dengan pembentukan villi pertama pada hari ke 30 masa kebuntingan dan berkembang menjadi suatu pertautan primitif *chorioallantois* pada endometrium di daerah karunkuler kira-kira 33 sampai 36 hari periode kebuntingan (Greenstein dan Foley, 1958). Pada ternak istilah pertautan lebih tepat dari pada istilah implantasi atau nidasi. Implantasi menunjukkan proses pada manusia dan ruminansia dimana zigot menembus dan membenamkan diri ke dalam endometrium.

3. Periode fetus dan pertumbuhan fetus, berlangsung dari hari ke 45 masa kebuntingan. Selama periode ini terjadi perubahan-perubahan kecil dalam diferensiasi organ, tenunan dan sistem tubuh bersamaan dengan pertumbuhan

dan pematangan individu antenatal. Selama periode ini karunkuler dan kotiledon berkembang dan membesar untuk mensuplai makanan bagi fetus.

Maka atas dasar inilah yang menjadikan rujukan dalam hal dilakukannya mendiagnosa kebuntingan dini pada sapi di awal-awal kebuntingan, karena tidak semua sapi dikawinkan secara alami maupun kawin buatan langsung bunting, maka untuk mengurangi resiko tersebut langkah yang di ambil adalah palpasi. Konsep ini akan mengarah kepada peningkatan secara bertahap ukuran, desiran, serta karakteristik yang terdapat pada organ reproduksi. Pada sebagian besar spesies ternak, organ reproduksi biasanya terletak di dasar panggul tepat di bawah rektum selama awal kebuntingan dan di dalam rongga perut selama akhir kebuntingan. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum hingga tercapai perabaan terhadap uterus dan ovarium sehingga dapat diketahui kondisi organ, kelainan, serta siklus reproduksi yang terjadi pada seekor ternak.

Seiring bertambahnya umur kebuntingan, uterus mengalami perubahan secara kontinyu baik dari segi ukuran, letak, maupun morfologi, sehingga dimungkinkan suatu kaidah dalam memprediksi umur kebuntingan melalui temuan temuan fisik organ reproduksi. Sejumlah pendekatan telah dikembangkan dan dievaluasi dalam pemeriksaan kebuntingan ternak sapi hingga metode diagnosis kebuntingan dapat diklasifikasikan menjadi dua (langsung dan tidak langsung) atau tiga kategori (visual, klinis, dan tes laboratorium). Untuk metode klinis, sejauh ini palpasi rektal telah digunakan lebih dari 95% peternak modern di belahan dunia dari waktu ke waktu (Rodning *et al.*, 2012). Bila dilakukan dengan benar, metode tersebut aman untuk induk sapi dan fetusnya. Meskipun demikian,

terlepas dari metode yang digunakan untuk mendeteksi status kebuntingan, sebagian kecil (sekitar 5%) dari sapi yang didiagnosis bunting sebelum 60 hari kebuntingan akan mengalami kematian embrio dini, dimana hal ini bukan merupakan efek dari pemeriksaan kebuntingan itu sendiri melainkan keguguran yang terjadi secara alami.

2.5 Palpasi sebagai Metode Pemeriksaan Kebuntingan Sapi

Palpasi rektal merupakan metode yang tertua dan paling luas digunakan sebagai diagnosis awal kebuntingan ternak sapi (Cowie, 1948). Pada spesies hewan domestikasi berukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda dan unta, palpasi rektal sekalipun dengan beberapa keterbatasan, merupakan metode diagnosis kebuntingan yang paling mudah, murah dan tercepat dengan sedikit atau bahkan nihil peluang membahayakan hewan dan fetus bila dilakukan dengan hati-hati. Palpasi rektal dianggap menjadi metode diagnosis kebuntingan sapi yang akurat untuk operator berpengalaman, sebagian kecil studi menunjukkan bahwa palpasi rektal dapat meningkatkan risiko kematian embrio iatrogenik pada sapi perah, namun lebih banyak peneliti dengan hasil penelitian berbeda tidak sependapat dengan pendapat tersebut (Purohit, 2010). Menurut Romano *and* Magee (2001), prosedur dengan palpasi rektal tersebut tidak memberikan informasi tentang viabilitas embrio/fetus selama tahap-tahap awal kebuntingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2017 di Kecamatan Manggelewa Kabupaten dompu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah semua ternak yang ada di kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sebanyak 3210 ekor induk dewasa. Berhubung jumlah populasi yang cukup banyak yaitu: 3210 ternak betina dewasa dilakukan pengambilan sampel untuk menentukan besar ukurannya sampel maka dilakukan menggunakan statistik deskriptif berdasarkan rumus Slovin menurut Sugiyono (2006), sebagai berikut:

Dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n: Besar populasi

N: Besar sampel

e: persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin/diinginkan.

Besar sampel untuk $N= 3210$ yaitu:

$$n = \frac{3210}{1+3210 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3210}{32}$$

$$n = 100$$

Jadi perkiraan besar sampel minimal dalam penelitian ini yaitu 100 sampel. Selanjutnya sampel ditentukan dengan cara purposive.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Pemeriksaan Klinis

Ternak di periksa secara klinis dengan metode Palpasi Rektal. Diagnosa Palpasi Rektal di dasari pada bentuk, Ukuran, penyelipan, ballotement dan desiran (fremitus) pada organ yang teraba.

3.3.2 Tabulasi Data

Data yang di periksa dari hasil pemeriksaan klinis di Kecamatan Manggelewa selanjutnya di sajikan kriteria pengamatan sesuai dengan parameter penelitian. Adapun Parameter yang di ukur:

- a. Proporsi ternak berdasarkan Skor BCS
- b. Proporsi ternak bunting dan tidak bunting
- c. Proporsi umur Kebuntingan

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan metode statistik Deskriptif dan Inferensial. Metode Statistik Deskriptif disajikan berupa data %, nilai max, nilai min, proporsi, rerata dan simpasium baku dari parameter yang di ukur. Sedangkan metode Statistik Inferensial menggunakan metode perbandingan rata-rata uji

BNT, (Susantiyana, 1996) untuk masing-masing perbedaan rerata parameter Status Kebuntingan dengan memperoleh BCS seluruh ternak di lokasi penelitian dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} = \frac{f}{\sum f} \text{ dimana } 0 \leq p \leq 1$$

$$y = \mu + T_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

P : Proporsi

n : Jumlah sampel


f : Frekuensi sampel

Y_{ij} : Nilai pengamatan ke- j yang memperoleh perlakuan ke- i

μ : Rerata umum (nilai populasi)

T_i : Pengaruh perlakuan ke- i


ϵ_{ij} : Pengaruh Galat ke- j yang memperoleh perlakuan ke- i



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, Kabupaten Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan. Kabupaten Dompu yang beribukota di Dompu terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, pajo dan Kecamatan manggelewa dengan jumlah Desa/kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa difinitif, 4 Desa Persiapan.

Batas wilayah Administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : laut flores dan kabupaten Bima

Sebelah Timur : Kabupaten Bima

Sebelah selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

4.1.2 Kemiringan Tanah (Lereng)

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebagian wilayah Kabupaten Dompu terdiri dari daerah yang bergelombang sampai berbukit dan sebagian merupakan daerah datar sampai landai. Menurut data yang ada setelah diklarifikasi dapat diketahui bahwa :

Lereng 0 – 25 % (datar) seluas 42.950 ha atau 18,48 %

Lereng 2-15 % (landai) seluas 73,349 ha atau 31,55 %

Lereng 15 -40 % (begelombang sampai dengan berbukit) seluas 87,911 ha atau 37,82 %

Lereng diatas 40 % (terjal) seluas 28,250 ha atau 12,15 % masing0masing dari luas wilayah

4.1.3 Ketinggian

Ketinggian tempat dari permukaan air laut merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam menilai fisik suatu wilayah/daerah terutama yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya tanah. Bersumber pada perhitungan peta ketinggian Kabupaten Dompu skla 1 : 100.000, diperoleh data ketinggian sebagai berikut :

Ketinggian 0 -100 m dpl seluas 7.705 ha (31,28 %)

Ketinggian 100 – 500 m dpl seluas 107,815 ha (46,38 %)

Ketinggian 500 – 1.000 m dpl seluas 34,150 ha (14, 69 %)

Ketinggian diatas 1.000 m dpl seluas 17.790 ha (7,65 %)

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Dompu terbesar berada pada ketinggian 100-500 m dpl, menyebar pada masing-masing Kecamatan.

4.1.4 Iklim

Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis dengan musim hujan rata-rata bulan Oktober sampai april setiap tahun, mempunyai tipe iklim D, E dan F (menurut ferguson dan smith) Pada musim kemarau suhu udara relatif rendah (20 derajat celsius – 30 derajat selsius) pada siang hari dan dibawah 20 derajat celsius pada malam hari. Bersumber pada data curah hujan dari Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Dompu selama tahun 1984 s/d 1992 dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata pertahun sebanyak 1.038,73 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 77 hari.

4.1.5 Tanah Air

Air sebagai sumber penghidupan utama bagi mahluk hidup, termasuk manusia cukup tersedia di Kabupaten Dompu, Persediaan air dimaksud cukup ,untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan pengairan bagi daerah pertanian. Di kabupaten Dompu terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi. Pada musim hujan sering terjadi banjir yang kadang-kadang merusak tanaman pertanian ataupun pemukiman penduduk.

Selanjutnya disamping 19 buah sungai besar tersebut masih ada beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun, sebagai sumber penghidupan masyarakat.

4.1.4 Kondisi Geografi Kecamatan Manggelewa

Kecamatan Manggelewa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Dompu yang terletak di bagian barat, dan secara geografis terletak antara 118 07' – 118 23' BujurTimur dan 8 25' – 9 43' Lintang Selatan dan memiliki luas 176,49 km². Kecamatan Manggelewa berbatasan dengan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima disebelah Utara; sebelah Selatan dengan Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa; Kecamatan Kempo di sebelah Barat dan Kecamatan Woja di sebelah Timur. Topografi Sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 2 sampai 250 meter Wilayah Kecamatan Manggelewa di atas permukaan laut dan merupakan daerah yang potensial untuk tanaman padi dan palawija. Jarak Jarak ibukota kecamatan dengan desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Manggelewa sangat bervariasi berkisar dari 1 sampai dengan 30 km. Desa terdekat dengan Soritu adalah desa Tekasire. Desa yang paling jauh dari ibukota Kecamatan adalah Desa Kwangko yaitu berjarak 30 km.

Kecamatan Manggelewa sebagai salah satu wilayah teritorial kecamatan terpenting yang terdapat di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat Kecamatan Manggelewa saat ini memiliki track record sebagai Lumbung Jagung dan Lumbung Ternak Terbesar Di NTB di samping perkembangan kewilayahan maupun kependudukan yang semakin meningkat dan maju di mata masyarakat NTB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dari

segi kewilayahan, Manggelewa awalnya merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kempo pada tanggal 29 Desember 2002. Nama Manggelewa itu sendiri di abadikan melalui proses analisa sejarah yang mendalam oleh para tokoh pencetus terbentuknya Kecamatan Definitif Manggelewa.

4.1.5 Kemajuan Ekonomi di Bidang Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Untuk itu, dibutuhkan pasokan benih yang unggul guna dan inovatif menopang sector tersebut. Luas tanah sawah di kecamatan Manggelewa pada tahun 2014 mencapai 2.676,8 Ha, luas ini lebih sedikit dibandingkan dengan luas tanah kering yang mencapai 4.609,9 Ha. Pada tahun 2016 tanah sawah terluas terdapat di desa Lanci jaya dengan luas sebesar 424 Ha, sedangkan luas tanah kering terdapat di Desa Suka Damai dengan luas mencapai 1.048 Ha, luas tanam padi Sawah di Kecamatan Manggelewa Tahun 2016 sebesar 2.460 tetapi karena pengaruh perubahan iklim global produksinya relatif agak menurun di dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk luas tanam padi ladang mengalami penurunan setiap tahunnya disebabkan oleh peralihan komoditi yang ditanam yakni jagung hibrida. Komoditi unggulan di Kecamatan Manggelewa adalah jagung karena disamping merupakan program Pemerintah Kabupaten atau lebih dikenal dengan istilah PIJAR, juga disebabkan oleh letak geografis yang sangat baik untuk tanaman jagung, penjualan hasil produksipun tidaklah sulit karena sudah ada 5 perusahaan yang siap membeli jagung para petani.

4.1.6 Kemajuan Peternakan di Kecamatan Manggelewa

Populasi sapi di Kecamatan Manggelewa berdasarkan sensus tahun 2014 adalah 9233 ekor sapi dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 9661 ekor. Bangsa sapi yang dipelihara peternak adalah : PO, Simental, Onggol, Brahman, Angus, Madura dan Bali (Dinas Peternakan Kabupaten Dompu). Dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan di Kecamatan Manggelew menggunakan semen beku yang berasal dari pejantan unggul dari Inseminasi Buatan Lembang dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) dalam bentuk mini straw yaitu semen Simental (straw putih), Brahman (straw biru tua) dan FH (straw abu – abu). Makanan utama dari sapi - sapi yang dipelihara di Kecamatan Lambu adalah rumput lapangan, jerami jagung, jerami kacang, lantoro yang ada di sekitar rumah, rumput dipegunungan, rumput yang berasal dari areal sawah yang tidak ditanami. Rumput unggul seperti rumput gajah dan setaria sudah dikenal peternak akan tetapi belum di Budidayakan secara maksimal dimana peternak hanya menanam rumput ini pada pematang-pematang sawah kecuali peternak yang sudah melaksanakan budidaya ternak secara intensif yang menanam rumput dengan skala penanaman yang hitungan hektar. Pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh peternak bersifat ekstensif, semi intensif dan intensif.

4.1.7 Keterampilan Team Inseminator dan PKB Kecamatan Manggelewa

Inseminator yang bertugas di Kecamatan Manggelewa telah mengikuti Latihan di Inseminasi Buatan Lembang dengan bantuan dana dari Dinas Peternakan Kabupaten Dompu. Pos Inseminasi Buatan di Kecamatan Manggelewa memiliki 1 orang tenaga Inseminator handal. Sistem pelayanan

Inseminasi Buatan di Kecamatan Manggelewa adalah system pasif, dimana pelayanan Inseminasi Buatan dilakukan setelah peternak melaporkan bahwa ternaknya birahi kepada inseminator. Pelayanan inseminasi dari pos Inseminasi Buatan ke kandang ternak ditempuh oleh inseminator dengan menggunakan sepeda motor.

4.1.8 Penyimpanan Semen Beku dan Thawing

Penyimpanan semen beku pada pos Inseminasi Buatan di Kecamatan Manggelewa dilakukan dengan menggunakan container berukuran 34XT berkapasitas 2400 straw yang berisi N₂ cair dengan suhu -196°C, cara penyimpanan semen beku yang dilakukan sudah dapat dikatakan baik, sehingga fertilitas semen yang disimpan tetap tinggi. *Thawing* semen beku dilakukan dilapangan dengan menggunakan air sumur atau air kran selama 10-20 detik. Hal ini sesuai dengan pendapat Taurin dkk (2000) bahwa, untuk daerah Indonesia thawing semen beku sebaiknya dilakukan dengan air kran dan semen beku yang di cairkan harus segera di inseminasikan dalam waktu kurang dari 5 menit.

4.2 Karakteristi Responden/Peternak

Karakteristik Peternak mengurikan atau memberikan gambaran mengenai identitas peternak dalam penelitian ini. Adapun karakteristik peternak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Umur Responden

Dalam usaha kegiatan peternakan, factor umur mempengaruhi keberhasilan usaha. Pada usia produktif, peterna diharapkan mampu mencapai puncak produktivitas untuk mengembangkan pontensi yang di milikinya dalam

berusaha. Hal ini di sebabkan untuk bekerja diperlukan kondisi tubuh yang sehat. Tingkat umur produktif yaitu antara 15- 64 sedangkan umur yang tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Lebih jelasnya karakteristik responden berdasarkan tingkatan umur dapat dilihat pada Tabel 1.dibawah ini.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur.

No	Umur peternak	Jumlah (orang)	Presentase %
1	20-40	33	33
2	41-60	47	47
3	61-80	20	20
4	Jumlah	100	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Dalam tabel 1. di atas menunjukkan bahwa presentase umur peternak adalah 33 %, pada kisaran umur 20-40 tahun dengan jumlah responden 33 peternak, sedangkan 47 %, pada kisaran umur 41-60 tahun dengan jumlah responden 47 peternak dan 20 %, pada kisaran 61-80 tahun dengan jumlah responden 20 peternak. Dari umur peternak tersebut dapat dikategorikan masih produktif sehingga sapat dinyatakan bahwa peternak yang menjalani usaha ternak dengan Teknologi Inseminasi buatan (IB) adalah masih sangat potensial dalam mengelola dalam usahanya.

4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang di transfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, poelatihan, dan atau penelitian (Hardiyanti, 2014).

Kemampuan seseorang dalam mengelola suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektual dan dalam hal ini adalah tingkat pendidikan seseorang serta di dukung oleh pengalaman dalam menjani suatu usaha. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentu juga akan memiliki kemampuan dalam mengembangkan suatu inovasi baru dalam hidupnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2. dibawah ini.

Tabel 4. 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Variabel	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Tidak tamat SD	44	44
2	SD	15	15
3	SMP	13	13
4	SMA	21	21
5	Perguruan tinggi	5	5
6	Jumlah	100	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 2. diatas bahwa tingkat pendidikan responden terdiri dari 100 peternak yaitu: Tidak tamat SD berjumlah 44 peternak, Tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 15 orang, Tingkat Sekolah Pertama (SMP) berjumlah 13 orang, Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 21 orang dan Tingkat Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 5 orang. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah tingkat pendidikan peternak di kecamatan Manggelewa yaitu banyak yang tidak tama Sekolah dasar.

4.2.3 Pengalaman Beternak Responden

Pengalaman dalam usaha ternak dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usaha ternak, dengan pengalaman yang cukup lama peternak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap usaha ternak yang dijalankannya. Sebagian besar peternak memiliki pengalaman dalam usahaternak sapi potong cukup lama, karena mata pencaharian beternak adalah usaha turun temurun. Dengan demikian, secara teknis para peternak ini sudah sangat mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terdapat masalah mengenai penyakit yang ditimbulkan dalam usahaternak sapi potong. Karakteristik responden peternak sapi potong berdasarkan pengalaman beternaknya dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Peternak.

No	Pengalaman beternak (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase %
1	1-5	12	12
2	6-10	32	32
3	11-20	50	50
4	21-30	6	6
5	Jumlah	100	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa lama pengalaman usaha Peternak dalam 100 responden Kecamatan Manggelewa yaitu 12 %, dengan kurun waktu antara 1-5 tahun berjumlah 12 peternak, 32 % dengan kurun waktu 6- 10 tahun berjumlah 32 peternak, 50 % dengan kurun waktu 11-20 tahun berjumlah 50 peternak, 6 % dengan kurun waktu 21-30 tahun berjumlah 6 peternak. Dalam

hal ini menunjukkan bahwa pengalaman para peternak di Kecamatan Manggelewa memiliki pengalaman cukup baik dimana presentase paling tertinggi adalah 50 % dengan rata-rata 11-20 tahun menekuni usaha dalam beternak.

4.2.4 Pekerjaan Utama Responden

Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan waktu terbanyak mereka. Responden pada umumnya selain bekerja sebagai beternak sapi, juga melakukan pekerjaan lain seperti bertani. Berdasarkan waktu yang digunakan oleh responden, maka pekerjaan utama responden dapat dilihat pada tabel 4.dibawah ini.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Pekerjaan Utama Responden.

No	Pekerjaan Utama	Jumlah	Presentase %
1	Petani	86	86
2	Pengusaha	3	3
3	PNS	4	4
4	Beternak	6	6
5	Wiraswasta	1	1
6	Jumlah	100	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan utama responden yaitu bertani memiliki presentase tertinggi yaitu 86 % dari 100 responden, Pengusaha 3 %, PNS 4 %, Beternak 6 % dan wiraswasta 1 %. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan dan hanya sebagian kecil saja yang menjadikan peternakan sebagai

usaha utama oleh warga di Kecamatan Manggelewa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari para peternak akan keuntungan yang bisa diperoleh dalam usaha peternakan sapi dengan mengembangkan Teknologi Inseminasi Buatan (IB). sehingga dapat di asumsikan bahwa peternakan sapi di Kecamatan Manggelewa khusus dalam mengembangkan penerapan Teknologi IB masih dan harus di tingkatkan lagi.

4.2.5 Tingkat Kepuasan Keberhasilan IB Berdasarkan Kepuasan peternak

Teknologi pada zaman sekarang telah mampu mengatasi masalah perekonomian khususnya dalam bidang peternakan dengan menghasilkan bibit-bibit unggul (bagi hewan yang dapat menguntungkan manusia), khususnya dalam bidang bioteknologi. Hal tersebut dapat dilakukannya dengan melalui inseminasi buatan. Dalam mengembangkan usaha ternak hasil IB dapat meningkatkan taraf ekonomi para petani secara drastis karena cepat dan tepat. Pengembangan IB juga tidak terlepas dari daya dukung lahan pengembangan dan potensi pakan yang memadai dalam mendorong kebutuhan utama seekor ternak, dalam hal ini yaitu nutrisi, protein maupun lainnya berupa obat-obatan seperti vitamin dan mineral. Selain peran para peternak yang tidak kalah penting adalah pemerintah setempat dalam memberikan dukungan semangat untuk pengembangan usaha para peternak dalam memelihara ternaknya. Dengan ini Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para peternak untuk mengembangkan usaha peternakan sapi melalui teknologi IB dan dalam hal ini dapat kita lihat tingkat kepuasan peternak di Kecamatan Manggelewa pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Tingkat kepuasan peternak tentang IB.

No	Tingkat kepuasan IB	Jumlah (orang)	Presentase %
1	70 %	0	0
2	80 %	19	19
3	90 %	81	81
4	Jumlah	100	100

	Yang melakukan PKB	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Inseminator	100	100
2	Dokter Hewan	0	0

No	Metode PKB	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Palpasi Rektal	100	100
2	USG	0	0

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017).

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para peternak dengan hasil teknologi IB di Kecamatan Manggelewa yaitu: tingkat keberhasilan IB yang di alami selama melakukan pengembangan usaha dengan teknologi ini menunjukkan presentase tertinggi adalah 81 % dari 100 responden memberikan penilaian 90 % atau dapat di katakana kepuasan tertinggi bagi para peternak. Sedangkan yang memberikan penilaian sedang dengan skor 80 % hanya 19 responden, ini menggambarkan bahwa para peternak yang di Kecamatan Manggelewa memiliki kepuasan yang sangat baik dan walaupun harus ditingkatkan lagi.

4.3 Kecepatan Deteksi Birahi pada Sapi Bali

Deteksi birahi yang tepat adalah kunci utama keberhasilan IB, selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan dalam mengamati birahi akan berdampak besar pada keberhasilan pada IB, sebab keterlambatan pelayanan IB akan berakibat pada kerugian waktu yang cukup lama sehingga para peternak mengalami kerugian baik segi tenaga, waktu maupun material. Dalam hal ini interval antara mulainya estrus ke estrus berikutnya yang merupakan suatu proses yang distimulasi hormon. Siklus estrus pada sapi rata-rata 21 hari (18-21 hari) dengan lama estrus 15 jam (Sturman. 2000), dan ovulasi terjadi 10-11 jam setelah estrus berakhir (Hafez, 2000). Pengetahuan dasar tentang siklus estrus ini penting diketahui oleh peternak sehingga deteksi birahi dapat dilakukan dengan benar dan tepat dalam pelaksanaannya. Performans reproduksi dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain manajemen, kesehatan, nutrisi, lingkungan dan faktor-faktor biologi yang dimiliki oleh ternak tersebut. Kegagalan kebuntingan setelah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) juga akan berakibat pada terbuangnya waktu percuma, selain kerugian materil dan immateriil karena terbuangnya semen cair dan alat pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) serta terbuangnya biaya transportasi baik untuk melaporkan dan memberikan pelayanan dari pos Inseminasi Buatan (IB) ke tempat sapi birahi berada.

Dalam hal ini pemahaman para Peternak di Kecamatan Manggelewa dapat di lihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Tingkat Pemahaman Mengenai Kecepatan Pelaporan Waktu IB.

Pertanyaan	Jawaban	Persentase
Pengamatan Birahi	a. Sangat Sering	100%
	b. Jarang	0%
Tanda-tanda birahi	Gelisah,vulvah bengkak,hangat,memerah, menunggangi kerabatnya	100%
Waktu lapor IB	a. 5 -7 jam kemudian	0%
	b. 7-8 jam	0%
	c. 9-10	83%
	d. 11-12 jam	17%
	e. 24 jam	0%
Sistem pemeliharaan	Intensif	100%
Jenis pakan	a. Rumput lapangan, jerami jagung,lamntoro,turi,gamal	1%
	b. Rumput lapangan, jerami jagung,lamntoro,turi,gamal,jerami kacang	38%
	c. Rumput gajah, lamntoro, jerami kacang, daun gamal, turi, setaria. Jerami jagung	61%
Pemberian makan	Sesuaikan dengan kondisi	100%
Pemberian air minum	Sering	100%
Obat tambahan	a. Tidak ada	22%
	b. Vitamin B12 dan mineral	78%

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017).

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat menunjukkan bahwa pengetahuan para peternak di Kecamatan Manggelewa mengenai manajemen pemeliharaan dan sistim control efisiensi terhadap ternak yang hendak di IB/maupun setelah IB sangat baik. Di mana pemahaman peternak mengenai efisiensi deteksi birahi di lakukan secara terus menerus atau dalam 24 jam, menunjukkan presentase yang cukup tinggi yaitu 100 dan hal di dukung oleh pendapatnya Williamson, (1972) mengenai pengamatan birahi pada ternak sapi yang muat dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.7. Pengamatan birahi pada ternak sapi

Mertode deteksi	Persen/tepat
▪ Obsvasis terus menerus 24 jam	98-100 %
▪ Observasi 3 x sehari	81- 91 %
▪ Observasi 3 xsehari	81-90 %
▪ Observasi hanya pada waktu memerah sehari-hari/untuk sapi perah	56 %
▪ Observasi dengan penjantanan yang diberi tanda merah	98 – 100 %

(Sumber: dikutip dari Williamson 1972).

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dengan mengamati yang secara terus menerus akan memberikan dampak yang positif dalam menunjang peningkatan keberhasilan IB dilakukan hendaknya secara kontinu atau terus menerus agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan waktu yang tepat pada melaporkan atau menginformasikan ke petugas untuk dilakukan IB pada ternak yang di miliki. Para peternak juga hendaknya memiliki pemahaman mengenai tanda-tanda birahi pada sapi yang dimiliki seperti Intensitas- Intensitas birahi.

Intensitas Birahi merupakan tinngkatan berahi yang meliputi waktu mulainya berahi dengan memperlihatkan gejala berahi sebagai bentuk respon. Adapun respon berahi yaitu gejala-gejala berahi yang muncul pada ternak : (1) vulva merah, (2) vulva bengkak, (3) berlendir, (4) menaiki temannya (Marawali dkk., 2001).

Waktu yang tepat untuk mengawinkan sapi betina adalah ketika sapi tersebut birahi. Birahi adalah suatu keadaan dimana sapi betina mau menerima pejantan untuk melakukan perkawinan, tidak seperti primata tingkat tinggi seperti manusia sapi betina hanya mau menerima pejantan untuk perkawinan hanya ketika birahi saja. Sedangkan untuk pejantan yang normal akan siap melakukan perkawinan kapan saja jika ada betina/induk yang birahi. Secara teoritis waktu-waktu IB yang baik harus dilakukan dengan tepat. Dalam hal ini untuk mengetahui kapan waktu yang tepat dilakukan IB perhatikan tabel 8 di bawah.

Tabel 4.8. Pedoman Praktisi Waktu Inseminasi Buatan Yang Tepat

No	Waktu Deteksi	Waktu tepat IB	Terlambat IB
1	Awal pagi (09.00)	Sore hari pada hari yang sama	Hari berikutnya
2	Pagi (\leq 09.00 tengah hari)	Sore hari pada hari yang sama atau pagi hari berikutnya	\geq 10.00 hari berikutnya
3	Sore hari (\geq 12.00)	Pagi hari berikutnya	\geq 14.00hari berikut

(Sumber: Buku saku Semen Beku dan Inseminasi Buatan BBIB Singosari, 2014).

Secara praktek pula dapat dilakukan dengan cermat dan tepat bahwa waktu untuk dilakukan IB dapat di lihat dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 4.9. Pedoman Praktisi Waktu Inseminasi Buatan Yang Tepat

No	Secara Teoritis Waktu Inseminasi Buatan Pada Sapi Betina
1	Inseminasi dalam 5-7 jam sejak muncul birahi adalah terlalu awal (CR rendah)
2	Inseminasi dalam 5-9 jam sejak muncul birahi adalah baik (CR cukup baik)
3	Inseminasi dalam 9-24 jam sejak muncul birahi adalah terbaik (CR=80%)
4	Inseminasi dalam 24-28 jam sejak muncul birahi adalah baik (CR cukup baik)
5	Inseminasi diatas jam ke 28 sejak muncul birahi adalah terlambat(CR rendah)

(Sumber: Buku saku Semen Beku dan Inseminasi Buatan BBIB Singosari, 2014).

Hal paling utama yang penting untuk diperhatikan adalah ransum makanan dan perawatan kesehatannya. Sapi yang bunting harus mendapatkan ransum makanan yang baik, dalam arti kuantitas dan kualitasnya harus tepat. Sapi yang bunting memang memerlukan makanan yang lebih banyak dibanding biasanya untuk memenuhi kecukupan energi, tapi jangan sampai berlebihan. Sapi yang diberi makan berlebihan akan menyebabkan kegemukkan dan biasanya akan mengalami kesulitan saat melahirkan atau disebut Distokia. Tapi jika jumlah pakan kurang, maka akan mengalami banyak permasalahan juga saat menjelang kelahiran. Selain makanan, sapi yang sedang bunting juga perlu dipisahkan dari sapi lainnya dengan cara ditempatkan pada kandang individual. Bisa juga melakukan pelatihan dengan mengajak sapi berjalan-jalan atau digembalakan, sekitar 2 jam per harinya. Perhatian terhadap ransum makanan bisa dilakukan setelah usia kehamilan sapi sudah lebih dari 2 bulan atau sedang dalam hamil

muda. Sebab sapi harus mempersiapkan diri untuk pembentukan jaringan-jaringan baru, seperti: janin, membran janin, pembesaran uterus atau rahim dan perkembangan kelenjar susu. Harus tersedia protein yang cukup pada ransum makanan yang akan diberikan. Karena kekurangan protein dapat menyebabkan turunnya ketahanan tubuh terhadap penyakit dan kematian pada pedet yang akan dilahirkan. Dibutuhkan 7-10% protein, kalsium sekitar 0,5% dan phosphor 0,2%. Saat memasuki usia 7 bulan atau 2 bulan sebelum melahirkan, sapi biasanya butuh asupan makanan yang lebih besar lagi guna meningkatkan bobot lahir pedet. Nutrisi yang dibutuhkan pun sudah berbeda dan lebih banyak lagi, seperti: protein yang dibutuhkan sekitar 12-12,5%, kalsium sekitar 0,7% dan phosphor sekitar 0,3%. Jadi perlu ada perbaikan pakan, yaitu dengan memberikan hijauan berupa rumput, jerami dan sejenisnya secara tak terbatas. Serta ditambah pakan penguat dengan kandungan protein 12% atau kira-kira sekitar 1,5-2% dari bobot sang induk. Bobot pedet saat lahir juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pedet selanjutnya, bobot lahir pedet yang tinggi akan mengurangi angka kematian pedet dan meningkatkan produksi susu induk sehingga pedet bisa mendapatkan asupan susu yang cukup.

Mineral dan vitamin juga sangat dibutuhkan bagi sapi yang bunting tua, bagus untuk perkembangan janin. Serta dapat mengurangi permasalahan kesehatan, mencegah terjadinya retensio placenta, meningkatkan sistem imun sehingga ternak sapi bisa melawan gangguan penyakit, seperti mastitis baik sebelum maupun sesudah melahirkan.

4.4 Ketepatan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB).

Pada pemeriksaan rektal , tangan dimasukan kedalam inlet pelvis atau tepian kranial pelvis bertulang dan dengan telapak tangan yang membuka kebawah, kembali ke sisi lain dan keatas. Apabila tidak ada struktur yang teraba, uterus berada pada rongga pelvis. Biasanya servix atau uterus terba di tepi pelvis pada hewan tua. Serviks yang keras dan kett dilokalisir pada lantai pelvis atau di kranialnya. Corpus, cornua uteri dan *ligamentum intercornualis* pada *biforcatio uteri* dapat dipalpasi pada hewan yang tidak bunting atau pada kebuntingan muda. Ovaria dapat teraba di lateral dan agak kranial dari serviks. Sewaktu kebuntingan berkembang, ovaria tertarik kedepan, terutama ovaria yang berhubungan dengan cornua bunting dan tidak terjangkau lagi pada kebuntingan 4sampai 6 bulan. Uterus dapat terletak lateral didalam rongga pelvis bila di tahan dan disana oleh kantungair seni yang penuh atau oleh ligamentum lata yang pendek. Uterus tidak bunting dan normal pada sapi dara dan pada api ynga sudah beranak masing-masing mempunyai diameter 1,25 sampai 2 cm dan 2,5 sampai 6,5 cm dan panjang 15 sampai 20 cm dan 20 sampai 30 cm, uterus biasanya lunak, dapat diketuk dan dikendur dengan sedikit ketegangan pada permulaan kebuntingan.uterus yang benar-bener lemas dan atonik terdapat pada anestrus sejati dan sista ovaria yang kronik.

Sewaktu birahi atau bila dirangsang uterus menegang dan berereksi. Pada akhir estrus dan permulaan proestrus, satu sampai dua hari sesudah ovulasi, uterus berdinding tebal dan oedematous. Sering kali 20, 40 atau 60 hari sesudah konsepsi, uterus dapat menjadi sangat berereksi dan tegang bersamaan dengan

aktivitas folikuler pada ovarium, walaupun terdapat suatu korpus luteum normal (Toilihene, 1993).

Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa Inseminator yang ada di Kecamatan Manggelewa termasuk dalam kategori Inseminator Teladan. Hal ini dapat diketahui dari pengalamannya Inseminator di Kecamatan Manggelewa yang disajikan dalam bentuk tabel 9 di bawah ini.

Tabel 4.16. Pengalaman dan Pengetahuan Inseminator

Pengalaman	Keterangan
Tingkat Pendidikan	SMA
Pekerjaan	PNS
Penghargaan	INSEMINATOR TELADAN /PIAGAM PRESIDEN
Kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan	Sangat Sering
Menangani kelahiran ternak dan penyapihan anak, status penyakit yang pernah diderita, pencegahan dan pengobatan penyakit dan catatan lainnya	Sangat Sering
Melaksanakan inseminasi buatan (IB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sejak tahun 1994 ▪ Jumlah Sapi yang di IB = 101 Ekor/ Hari ▪ Jumlah Kerbau yang di IB: 20 Ekor/Hari
Indikator Dalam yang amati	corcua uteri Asimestris, besar dan panjang pada corpus uteri, arteri uterine media.
Indikator luar apa yang saudara amati:	tingkah laku santai, bulu mengkilat, ambing membesar, perut membesar dll.

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

4.4.1 Skor Kondisi Tubuh (BCS)

Telah dilakukan skoring terhadap 100 ekor ternak sapi Bali betina di Kecamatan Manggelewa. Seluruh ternak bunting yang telah diskoring memenuhi kriteria ketiga (Tidak kurus dan tidak gemuk) sekitar 11,3%, kriteria keempat sebesar 55%, dan kriteria kelima sebesar 11,3 %. Proporsi terbesar berada pada BCS 4 sebanyak 55 ekor dengan nilai proporsi sebesar 0,77(77,5%).

Tabel 4.10. Proporsi Ternak Bunting Berdasarkan Bcs (Body Condition Score)

BCS	<i>F</i>	<i>P</i>	%
3	8	0,11	11,3
4	55	0,77	77,5
5	8	0,11	11,3
Σ	71	0,99	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017).

Adapun untuk seluruh ternak tidak bunting yang telah diskoring memenuhi kriteria ketiga (Tidak kurus dan tidak gemuk) sekitar 41,4%, kriteria keempat sebesar 20,7%, dan kriteria kelima sebesar 37,9 %. Proporsi terbesar berada pada BCS 3 sebanyak 12 ekor dengan nilai proporsi sebesar 0,41(41,4%).

Tabel 4. 11. Proporsi Ternak Tidak Bunting Berdasarkan BCS (Body Condition Score)

BCS	<i>F</i>	<i>P</i>	%
3	12	0,41	41,4
4	6	0,21	20,7
5	11	0,37	37,9
Σ	29	0,99	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Berdasarkan beberapa penelitian dan literatur menyatakan bahwa BCS < 2,5 dari skala 1-5 merupakan representasi dari kekurangan nutrisi, yang salah satu manifestasinya adalah penurunan fungsi dan efisiensi reproduksi (Said, 2012).

4.4.2 Umur Kebuntingan Berdasarkan Pemeriksaan Klinis

Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dari 100 sapi yang menjadi sampel dalam penelitian ini diketahui bahwa umur kebuntingan antara 50 -70 hari terdiri dari 50 – 55 hari sebanyak 8 ekor sapi, 56 -60 hari sebanyak 11 sapi, 61 – 65 hari sebanyak 2 ekor sapi, dan yang terakhir 66 – 70 ekor sapi sebanyak 10 ekor sapi. Jadi total umur kebuntingan pada umur kebuntingan 50- 70 hari sebanyak 31 ekor sapi dan proporsi umur kebuntingan terbanyak adalah antara 56 – 60 hari. Selain itu pada umur kebuntingan ini juga diketahui bahwa persentase keberhasilan IB yang telah dilakukan berkisar pada angka 90 – 97%. Berikut adalah tabel umur kebuntingan 50 – 70 hari berdasarkan pemeriksaan klinis.

Tabel 4.12. Umur kebuntingan 50 – 70 Hari Berdasarkan Pemeriksaan Klinis.

Umur Kebuntingan/ Hari	<i>f</i>	%	Persentase Keberhasilan IB
50 -55	8	25,8	90% – 97%
56 - 60	11	35,5	
61 – 65	2	6,4	
66 – 70	10	32,3	
Σ	31	100	

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Adapun umur kebuntingan antara 30 -50 hari terdiri dari 30 – 35 hari sebanyak 4 ekor sapi, 36 - 40 hari sebanyak 10 sapi, 41 – 45 hari sebanyak 14 ekor sapi, dan yang terakhir 46 – 50 ekor sapi sebanyak 12 ekor sapi. Jadi total umur kebuntingan pada umur kebuntingan 30- 50 hari sebanyak 40 ekor sapi dan

proporsi umur kebuntingan terbanyak adalah antara 41 – 45 hari. Berikut adalah tabel umur kebuntingan 50 – 70 hari berdasarkan pemeriksaan klinis. Selain itu pada umur kebuntingan ini juga diketahui bahwa persentase keberhasilan IB yang telah dilakukan berkisar pada angka 80 – 85%.

Tabel 4.13. Umur kebuntingan 30– 50 Hari Berdasarkan Pemeriksaan Klinis.

Umur Kebuntingan/Hari	F	%	Persentase Keberhasilan IB
30 – 35	4	10	80% – 85%
36 – 40	10	25	
41 – 45	14	35	
46 – 50	12	30	
Σ	40	100	

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dengan palpasi rektal di UPTD kecamatan manggelewa, dari 100 sapi yang menjadi sampel dalam penelitian ini diketahui bahwa umur kebuntingan sapi tidak bunting berada pada interval 30 – 60 hari sebanyak 20 ekor sapi, 61 – 80 hari sebanyak 8 ekor sapi, dan 81 – 100 hari sebanyak 1 ekor sapi. Jadi total umur kebuntingan pada sapi tidak bunting dengan umur kebuntingan 30 -100 hari sebanyak 29 ekor sapi dan proporsi umur kebuntingan terbanyak adalah antara 30 – 60 hari.

Berikut adalah tabel umur kebuntingan ternak tidak bunting berdasarkan pemeriksaan klinis.

Tabel 4.14. Ternak Tidak Bunting Berdasarkan Pemeriksaan Klinis Dengan Palpasi Rektal Di UPTD Kecamatan Manggelewa.

Umur Kebuntingan/Hari	F	%
30 – 60	20	69
61 – 80	8	28
81 – 100	1	3
Σ	29	100

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017)

4.4.3 Keberhasilan IB

Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dari 100 sampel dapat diketahui perbandingan antara jumlah sapi yang bunting dengan umur kebuntingan antara 50 – 70 hari sebanyak 31 ekor sapi, dan umur kebuntingan antara 30 -40 hari sebanyak 40 ekor sapi sehingga total sapi yang bunting dari 100 sapi sebanyak 71 ekor sapi. Sedangkan sapi yang tidak dengan umur kebuntingan antara 30 – 100 hari sebanyak 29 ekor sapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi yang bunting setelah dilakukan IB lebih besar yang tidak bunting.

Tabel 4.15. Perbandingan Ternak Bunting dan Ternak Tidak Bunting Berdasarkan Pemeriksaan Klinis dengan Palpasi Rektal Di UPTD Kecamatan Manggelewa.

Kebuntingan	Jumlah	Persentase	Keberhasilan
Umur Antara 50-70 Hari	31	31%	90-97 %
Umur Antara 30- 40 Hari	40	40%	80-85 %
Umur Kebuntingan tapi Tidak Bunting	29	29%	-

(Sumber: Data Primer setelah diolah, 2017).

Menurut (Toilihere, 1993) keberhasilan dan kegagalan IB dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya; peternak, petugas dan ternak sapi betina. Menurut Kusdiantoro,dkk (2000) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB yaitu; kualitas semen, kualitas *oocyt*, waktu IB, kompetensi inseminator, penanganan dan deposisi semen saat IB.

Mengingat petugas IB atau inseminator mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan IB (Kusdiantoro, 2000). Inseminator harus mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan tingkah laku seksual, perubahan temperatur tubuh, dapat menentukan perubahan pada saluran reproduksi betina terutama vulva, vagina dan cervix sapi betina dari setiap fase siklus estrus serta keterampilan melaksanakan IB (Toilihere, 1993). Pengetahuan dan keterampilan inseminator tersebut dapat digunakan untuk menentukan waktu IB yang tepat. Ketepatan waktu IB merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan fertilisasi (Arthur *et al.*, 2001).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa

1. Ketepatan mendiagnosa kebuntingan dini pada Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa tergolong baik dan dapat di lakukan pada usia 30-50 hari kebuntingan dengan tingkat keberhasilan 80-85 %. Hal ini juga dapat dilihat dari pemeriksaan klinis dengan palpasi rektal menunjukkan bahwa 100% responden mengatakan bahwa sapi sering tidak kembali estrus setelah IB.
2. Kecepatan peternak memberikan informasi untuk di lakukan IB pada Sapi Bali di Kecamatan Manggelewa tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari total waktu lapor IB menunjukkan persentase sebesar 83% dari 100 responden melapor dalam waktu 9-10 jam kemudian.
3. Keberhasilan pelaksanaan IB di Kecamatan Manggelewa sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari total kebuntingan sapi bunting dari 100 sampel sebanyak 71 ekor sapi. Selain itu tingkat keberhasilan IB yang di alami selama melakukan pengembangan usaha dengan teknologi ini menunjukkan presentase tertinggi adalah 81 % dari 100 responden memberikan penilaian 90 % atau dapat di katakan kepuasan tertinggi bagi para peternak.

5.2 Saran

1. Penambahan tenaga trampil dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan mengingat terus bertambahnya jumlah ternak dari tahun – tahun.
2. Perlu dilakukan perbaikan sistem manajemen reproduksi termasuk deteksi estrus, diagnosa kebuntingan dan kelahiran menggunakan teknik medik reproduksi.
3. Disarankan kepada dinas terkait untuk mempertahankan angka kebuntingan hasil IB dengan melakukan pencatatan yang lebih baik dan melakukan control terhadap hasil kebuntingan serta menambah tenaga inseminator untuk memenuhi kebutuhan lapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Achyadi, K. R., 2009. *Deteksi Berahi pada Ternak Sapi*. Tesis MS Pascasarjana IPB. Bogor.
- Arthur, G.H., "Fisiologi Reproduksi dan Pengembangan Inseminasi Buatan pada ternak Sapi bali". Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Affandhy, L. W.C. Pratiwi, dan D. Ratnawati. 2007. *Petunjuk Teknis Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi Potong*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Pasurua.
- Ball, E.J. Carrol., 1997 "Induction of Fetal Death in Cattle by Manual Rupture of the Amniotic Vesicle" J.A.V.M.A.
- Colville, T. 2008a. *Chapter 17 Reproductive System*. In: T. Colville and J.M. Bassert, 2008. *Clinical Anatomy & Physiology For Veterinary Technicians*, Second Edition, Mosby.
- Cowie, T.A. 1948. *Pregnancy Diagnosis Tests: A review*. Commonwealth Agricultural Bureaux Joint Publication.
- Djunuar, R. 1986. "Desain sistem budi daya sapi potong berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan". Disertasi, Sekolah Pasca-sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Frandsen, R.D. 1996, *Anatomi dan Fisiologi Ternak*, Edisi ke-7, diterjemahkan oleh Srigandono, B dan Praseno, K, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hafez E.S.E. and Hafez, B. 2000. *Reproduction In Farm Animal*. 7th edition . Leafebiger. Philadelphia.
- Hardjosubroto, J. dan J.M. Astuti. 1993. *Buku Pintar Peternakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hunter, R. H. F. 1981. *Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik*. Universitas Usaya. Bandung.
- Illawati, R.W. 2009. *Efektivitas Penggunaan Berbagai Volume Asam Sulfat Pekat (H₂SO₄) untuk Menguji Kandungan Estrogen dalam Urine Sapi Brahman Cross Bunting*. Skripsi. Sekolah Tinggi Peternakan. Sijunjung.
- Kariyasa. 2005. *Manajemen Sapi Potong*. Universitas Sumatra Utara. Sumatra Utara.

- Kusdiantoro M, Purwantara B, Djuwita I. 2000. *Evaluasi Fisiologi Semen dan Variasi Genetik Sapi Bali dalam Rangka Seleksi Pejantan Bibit Guna Menunjang Program Inseminasi Buatan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Marawali,A. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Reproduksi Ternak*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur. Jakarta
- Murtidjo, B.A.2000. *Berternak sapi potong*. Kanisius.Yogyakarta.
- Mc Donald, L.E., 1969, *Veterinary Endocrinology and Reproduction*,Lea & Febringer,Philadelphia.
- Purohit, G. 2010. *Methods of Pregnancy Diagnosis in Domestic Animals: TheCurrent Status*. Webmedcentral.
- Putro, P.P. 2008. *Dampak Crossbreeding terhadap Reproduksi Induk Turunannya: Hasil Studi Klinis*. Lokakarya Lustrum VIII Fak. Peternakan UGM, 8 Agustus 2009.
- Rasyaf, M. 1996. *Memasarkan Hasil Peternakan*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rodning, S, W. Prevatt, R. Carson, J. Elmore, and M. Elmore. 2012. *Annual Beef Cow Pregnancy Examination. Animal Sciences Series Timely Information: Agriculture & Natural Resources*. Alabama Cooperative Extension Systemand Auburn University.
- Romano, J.E. 2013. *Early Pregnancy Diagnosis by Palpation per Rectum on Embryo/Fetus Mortality in Dairy Cattle. Veterinary Population Medicine College of Veterinary Medicine University of Minnesota*.
- Roberst, S.J.,1999.*Veterinary Obstetrichand genital Disiases (Theriogenology)*, (Ed) 2 (Ann Arbor-Mich.: Edwar Bross.Inc).
- Said S., B. Tappa, M. Gunawan, C. Arman. 2012. *Canception Rates of Bali Cattle After Oestrus Synchronization with PGF2 α and Artificial Insemination using Frozen-Thawed Sexed Semen. Proceedings International Conference on Biotechnology*. Bogor.
- Sastradipradja, D. 1990. *Potensi Internal Sapi Bali Sebagai Salah Satu Sumber Plasma Nutfah Untuk Menunjang Pembangunan Peternakan sapi Potong dan Ternak Kerja Secara Nasional*. Proc.Seminar Nasional Sapi Bali. Universitas Udayana. Denpasar.
- Soebandi, P. 1987. *Ilmu Reproduksi Hewan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

- Sonjaya, H. 2005. *Materi Mata Kuliah Ilmu Reproduksi Ternak*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sturman. H ., E . A . B . Oltenacu . and R. H . Foote . 2000. *Importance of Inseminating Only Cows in Estrus* . Theriogenology.
- Sugeng, Y.B. 1992. *Sapi Potong*. Swadaya. Jakarta.
- Sumoprastowo. 2003. *Penggemukan Sapi dan Kerbau*. Bhrata. Jakarta.
- Tabrany. H. 2004. *Pengaruh proses pelayuan terhadap keempukan daging* Herman tabrany@yahoo.co.id.
- Studer, E.,1996 "Early Pregnancy Diagnosis and Fetal Deat", vet. Med.
- Talib, C. A. Bamualim dan A. Pohan. 2001. *Pengaruh Perbaikan Pakan pada Pola Sekresi Hormon Progesteron Induk Sapi Bali Bibit dalam Periode Post Partus. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Bogor 17-18 September 2001. Puslitbang Peternakan, Bogor.
- Toelihere, M. R. 1993. *Inseminasi Buatan pada ternak*. Angkasa Bandung. GW Salisbury- N.I.Vandermark Diterjemahkan oleh .Prof.Drh.R.Djanuar.1995. *Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada ternak*.
- Trimberger, G.W.,1998. "Menstuatio Frekuensi and It Relation to conception in Dairy cattle, ",*J, Dairy Sci*.
- Wicnicky, W., J.L Casida, 1980. " A Manual Methopd Far The Diagnosis of Pregnancy In Cattle",*J.A.V.M.A*.
- Williamson, 1972,. "Animal Sciences Series Timely Information: Agriculture & Natural Resources. Alabama Cooperative Extension Systemand Auburn University.
- Wirdahayati, R.B. dan A. Bamualim. 1995. *Parameterfenotipik dan genetik sifat produksi dan reproduksisapi Bali pada Proyek Pembibitan dan Pengembangansapi Bali (P3Bali) di Bali*. Thesis Fakultas PascaSarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

LAMPIRAN 1 Kuisisioner Penelitian

a. Daftar Pertanyaan (Kuisisioner) Penelitian untuk Ineminator

1. Nama Responden :
2. U m u r : Tahun.
3. Alamat :
 - a. Tidak Tamat SD b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi.
5. Pekerjaan Utama :
6. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan mengenai Inseminator dan PKB?
 - a. Tempat pelatihan:
 - b. Tahun Pelatihan:
 - c. Penghargaan :
7. Apakah saudara melaksanakan pencatatan (recoording) mengenai inseminasi buatan?
8. Apakah saudara sering Melakukan Pemeriksaan kebuntingan?
9. Apakah saudara sering menangani kelahiran ternak dan penyapihan anak, status penyakit yang pernah diderita, pencegahan dan pengobatan penyakit dan catatan lainnya?
Sebutkan.....
10. Apakah saudara pernah melaksanakan inseminasi buatan (IB) pada ternak?
 1. a. kambing b. sapi c. kerbau
 2. Sejak tahun:
 3. a. jumlah kambing yg di IB:
 - b. Jumlah sapi yang IB/bulan:
 - c. jumlah kerbau yang di IB:
11. Apakah saudara sering melakukan pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada ternak
 - a. kambing b. sapi c. kerbau d. (a. b. c)
12. Ternak yang paling sering saudara melakukan PKB:
 - a. kambing b. sapi c. kerbau d. (a. b. c)
13. Dengan cara apa saudara melakukan PKB?
 - a. Palpasi Rektal b. USG
14. Apakah saudara sering melakukan PKB dengan teknik Palpasi Rektal?
 - a. Sejak tahu:
 - b. Jumlah ternak yang di PKB:
15. Apakah saudara pernah melaksanakan PKB dini?
 - a. sering b. sangat sering
16. Berapa Umur Kebuntingan yang saudara amati yang dapat dikatakan PKB dini
 - a. 20 hari b. 30-60 hari c. 70-80 hari
17. Indikator apa saja yang saudara gunakan dalam melakukan PKB dini?
 - a. Indikator Luar b. Indikator Dalam c. Indikator Luar/dalam
18. Pada Indikator luar apa yang saudara amati:
19. Pada Indikator Dalam apa yang saudara amati:

b. Daftar pertanyaan (Kuisisioner) Penelitian untuk Peternak

1. Nama Responden:
2. Umur:
3. Alamat:suka damai
4. Tingkat Pendidikan:
 - a. Tidak tamat SD b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan utama: a. Petani b. peternak c. pengusaha d. Wiraswasta e. P
6. Jenis Usaha yang di jalani: a. berternak b. dagang
7. Tahun mulai berternak/pengalaman:
8. Berapa ternak yang dimiliki/pelihara?
 - a. Jumlah sapi betina yang dipelihara: ekor
 - b. Jumlah sapi dara yang dipelihara: ekor
9. Kapan ternak sapi pertama kali di IB: tahun
10. Berapa sering dilakukan IB pada yang di miliki setelah mengetahui program IB: a. Sering b. sangat sering
11. Dalam satu waktu berapa kali di IB baru berhasil:
 - a. IB 1 b. IB 2 c. IB 3 d. Gk pernah berhasil
12. Apa kendala sebelum dan sesudah di IB/ kawin suntik? Penjelasan pengalaman.
 - a. Sebelum:
 - b. Sesudah: -
13. Berapa persen tingkat keberhasilan IB/kawin suntik?
 - a. 70 % b. 80 % c. 90 %
14. Kapan di IB/kawinkan kembali setelah sapi beranak setelah melahirkan
 - a. 1 bulan b, 2 bulan c. 3 bulan d. 4 bulan
15. Siapa yang melakukan PKB: a. Inseminator b. Dokter hewan
16. Dengan cara apa menginformasikan ke Petugas untuk dilakukan PKB
 - a. Telepon genggam b. menggunakan kendaraan

17. Berapa selang waktu antara pasca dilaksanakannya IB sampai dilakukan PKB:
- a. 1 bulan b. 2 bulan c. 2,5 bulan d. 3 bulan
18. Dengan metode apa dilakukannya PKB oleh petugas:
- a. Palpasi rektal b. UsG
19. Berapa sering ternak betina yang tidak kembali estrus setelah pasca IB dilakukan: a. sering b. jarang c. tidak pernah
20. Berapa sering ternak betina yang kembali estrus setelah pasca IB dilakukan:
- a. pernah b. jarang c. tidak pernah

KECEPATAN:

1. Berapa sering pengamatan birahi pada ternak dilakukan:
- a. Sangat sering b. Jarang
2. Bagaimana tanda-tanda birahi pada ternak:
3. Kapan dilaporkan kepetugas untuk dilakukan IB jika diketahui tanda-tanda birahi pada ternak:
- a. 5 -7 jam kemudian b. 7-8 jam c. 9-10 c. 11-12 jam d. 24 jam
4. Bagaimana sistim pemeliharaan/penanganan yang dilakukan:
- a. Intensif/dikandangan b. Di gembalakan/tanpa dikandangan
5. Jenis pakan apa yang diberikan pada ternak yang sudah di IB:
6. Berapa sering diberikan makanan dalam sehari: sesuaikan dng kondisi induk
7. Berapa sering diberikan air minum dalam sehari: sering.
8. Apakah pernah diberikan obat-obat perangsang nafsu makan dan jenis lainnya pada ternak:

LAMPIRAN 2
Hasil Analisis Penelitian

A. Identitas Responden

Variabel	Jumlah (orang)	Persentase%
Umur Peternak		
a. 20 -40 tahun	33	33
b. 41 – 60 tahun	47	47
c. 61 – 80 tahun	20	20
Pengalaman Beternak		
1-5 tahun	12	12
6-10 tahun	32	32
11-20 tahun	50	50
21-30 tahun	6	6
Pendidikan Peternak		
Tidak Tamat SD	44	44
SD	15	15
SMP	13	13
SMA	21	21
PT	5	5
Pekerjaan Peternak		
Petani	86	86
Pengusaha	3	3
PNS	4	4
Peternak	6	6
Wiraswasta	1	1
Mulai Beternak		
1990 -1993	5	5
1994 – 1997	1	1
1998 – 2001	40	40
2002 – 2005	8	8
2006 – 2009	21	21
2010 – 2013	19	19
2014 – 2017	6	6
Pertama IB		
2000-2002	8	8
2003- 2005	4	4
2006 – 2008	10	10
2009 – 2011	28	28
2012-2014	31	31
2015 – 2017	19	19

Berapa Kali IB		
Satu Kali	1	1
Sering	68	68
Sangat Sering	31	31
IB Berhasil dalam Satu Waktu		
IB1	17	17
IB2	83	83
Tingkat Keberhasilan IB		
70%	0	0
80%	19	19
90%	81	81
Waktu di IB Kembali		
1 bulan	0	0
2 bulan	40	40
2,5 bulan	0	0
3 bulan	60	60
Yang melakukan PKB		
Inseminator	100	100
Dokter	0	0
Metode PKB		
Palpasi rektal	100	100
USG	0	0
Tidak Kembali Estrus Setelah pasca IB		
IB	100	100
Sering	0	0
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Kembali Estrus Setelah pasca IB		
Sering	0	0
Jarang	100	100
Tidak pernah	0	0

B. Kecepatan


Pertanyaan	Jawaban	Persentase
Pengamatan Birahi	c. Sangat Sering d. Jarang	100% 0%
Tanda-tanda birahi	Gelisah,vulvah bengkak,hangat,memerah, menunggangi kerabatnya	100%
Waktu lapor IB	f. 5 -7 jam kemudian g. 7-8 jam h. 9-10 i. 11-12 jam j. 24 jam	0% 0% 83% 17% 0%
Sistem pemeliharaan	Intensif	100%
Jenis pakan	d. Rumput lapangan, jerami jagung,lamntoro,turi,gamal e. Rumput lapangan, jerami jagung,lamntoro,turi,gamal,jerami kacang f. Rumput gajah, lamntoro, jerami kacang, daun gamal, turi, setaria. Jerami jagung	1% 38% 61%
Pemberian makan	Sesuaikan dengan kondisi	100%
Pemberian air minum	Sering	100%
Obat tambahan	c. Tidak ada d.Vitamin B12 dan mineral	22% 78%

C. BCS (Body Condition Score)

Tabel 1. Proporsi Ternak Bunting Berdasarkan Bcs (Body Condition Score)


BCSBUNTING

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	11,3	11,3	11,3
4	55	77,5	77,5	88,7
5	8	11,3	11,3	100,0
Total	71	100,0	100,0	



Tabel 2. Proporsi Ternak Tidak Bunting Berdasarkan Bcs (Body Condition Score)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	12	41,4	41,4	41,4
4	6	20,7	20,7	62,1
5	11	37,9	37,9	100,0
Total	29	100,0	100,0	



KET:

Skor 1 = Sangat kurus/krempeng dan terlihat tulang

Skor 2 = Tidak terlalu kurus


Skor 3 = Tidak kurus dan tidak gemuk

Skor 4 = Gemuk


Skor 5 = Sangat Gemuk

D. Proporsi Umur Kebuntingan Berdasarkan Pemeriksaan Klinis


1. Umur Antara 50-70 Hari (Presentase keberhasilan IB = 90-97 %)



2. Umur Kebuntingan 30 - 50 Hari Presentase keberhasilan IB= 80-85 %



E. Proporsi Ternak Tidak Bunting Berdasarkan Pemeriksaan Klinis Dengan Palpasi Rektal di UPTD Kecamatan Manggelewa.



F. Tingkat Keberhasilan IB

Kebuntingan	Jumlah	Persentase	Persentase keberhasilan
Umur Antara 50-70 Hari	31	31%	90-97 %
Umur Antara 30- 40 Hari	40	40%	80-85 %
Umur Kebuntingan tapi Tidak Bunting	29	29%	-

G. Pengalaman dan Pengetahuan Inseminator

Pengalaman	Keterangan
Tingkat Pendidikan	SMA
Pekerjaan	PNS
Penghargaan	INSEMINATOR TELADAN /PIAGAM PRESIDEN
Kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan	Sangat Sering
Menangani kelahiran ternak dan penyapihan anak, status penyakit yang pernah diderita, pencegahan dan pengobatan penyakit dan catatan lainnya	Sangat Sering
Melaksanakan inseminasi buatan (IB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sejak tahun 1994 ▪ Jumlah Sapi yang di IB = 101 Ekor/ Hari ▪ Jumlah Kerbau yang di IB: 20 Ekor/Hari

LAMPIRAN 3 Dokumentasi Penelitian

1. Pemeriksaan Kebuntingan Pada Umur 40 hari.



2. Pemeriksaan Kebuntingan pada Umur 45 hari dan Body Condition Score (BCS)



3. Pemeriksaan Kebuntingan pada Umur 46 hari **tidak Bunting** dan Body Condition Score (BCS) 5.



4. Pemeriksaan Kebuntingan pada Umur 54 hari **Bunting** dan Body Condition Score (BCS) 4.



5. Pemeriksaan Kebuntingan pada Umur 40 hari **Bunting** dan Body Condition Score (BCS) 4.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI




6. Pemeriksaan Kebuntingan pada Umur 36 hari **Bunting** dan Body Condition Score (BCS) 3.



7. Hasil IB





M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Nama : Idfar

TTL : Bima, 01 Februari 1995

Alamat : Anamina, Kec. Manggelewa Kab. Dompu

Jenjang Pendidikan: Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SDN 17 Anamina, Kec. Manggelewa Kab. Dompu pada tahun 2000-2006. Pada tahun 2007 peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 Kec. Manggelewa dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kec. Manggelewa Kab. Dompu dan tamat pada tahun 2013. Pada awal tahun 2013 pula peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Sains dan Teknologi pada Jurusan Ilmu Peternakan. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2017.

