

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL AKAR *PARANG ROMANG*
(*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) TERHADAP PENURUNAN
KOLESTEROL PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi (S.Farm.) pada Jurusan Farmasi Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh
ANDI TENRI PARAMITHA
NIM.70100113034

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL AKAR *PARANG ROMANG*
(*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) TERHADAP PENURUNAN
KOLESTEROL PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi (S.Farm.) pada Jurusan Farmasi Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI TENRI PARAMITHA

NIM. 70100113034

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Tenri Paramitha
NIM : 70100113034
Tempat Tanggal Lahir : Mare-Bone, 5 Januari 1996
Jurusan : Farmasi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar *Parang Romang*
(*Boehmeria virgata (Forst.) Guill*) Terhadap Penurunan
Kolesterol Pada Mencit (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun,



Andi Tenri Paramitha

NIM. 70100113034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar *Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill)* Terhadap Penurunan Kolesterol Pada Mencit (*Mus musculus*)” yang disusun oleh **Andi Tenri Paramitha**, NIM : 70100113034, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Supardin, M.HI	(.....)

Dekan

Dekan, **Andi Army Nurdin, M.Sc**
NIP. 195304031983121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul saw, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. Andi Jamaluddin dan Ibunda Andi Saidah. A, S.Pd yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Demikian pula penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing pertama terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
8. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

9. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Supardin, M.HI selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Dosen-dosen Jurusan Farmasi dan seluruh staf baik yang berada di luar maupun dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Saudariku tersayang, Andi Tenri Padah dan Andi Tenri Mifta Khaira yang tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis sejak rencana penelitian hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang, bantuan dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
14. Sahabatku tercinta (Lia, Widya, Fitri, Ayu, Dewi, Kiki) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta bantuan sejak rencana penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman Farbion angkatan 2013 yang sangat luar biasa, terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini.

16. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun



Andi Tenri Paramitha

NIM : 70100113034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi operasional.....	4
D. Kajian pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Uraian Sampel.....	8
B. Uraian Hewan Coba.....	9
C. Pengantar Fitokimia.....	12
D. Pengantar Farmakologi.....	14

E. Uraian Obat	31
F. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat	32
BAB III Metodologi Penelitian	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
1..Jenis Penelitian.....	38
2..Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel Penelitian	38
D. Instrumen Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Implikasi Penelitian.....	52
KEPUSTAKAAN	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tanaman <i>Parang romang</i>	69
Gambar 2	Akar <i>Parang romang</i> (<i>Boehmeria virgata</i> (Forst.) Guill	69
Gambar 4	Proses Pengambilan Darah Mencit	70
Gambar 5	Pengukuran Kolesterol Mencit	70
Gambar 6	Alat Pengukur Kolesterol	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja	57
Lampiran 2	Perhitungan Dosis	59
Lampiran 3	% Penurunan Kolesterol.....	62
Lampiran 4	Analisis Data	64
Lampiran 5	Gambar.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Lipoprotein dan Kandungan Lipid	20
Tabel 2	Kadar Kolesterol beberapa bahan pangan	22
Tabel 3	Kadar Koletserol Total	23
Tabel 4	Pedoman Terapi Hiperlipidemia	27
Tabel 5	Hasil Ekstraksi Akar <i>Parang romang</i>	43
Tabel 6	Perubahan Kadar Kolesterol Mencit Jantan Yang Diberi Perlakuan Akar <i>Parang romang</i> Dibandingkan Kontrol	43
Tabel 7	Hasil pengukuran kolesterol mencit (<i>Mus musculus</i>).....	64
Tabel 8	Analisis Statistik Aktivitas Penurunan Kolesterol Ekstrak Akar <i>Parang romang</i>	65
Tabel 9	Analisis variasi aktivitas penurunan kolesterol ekstrak akar <i>parang romang</i>	67
Tabel 10	Analisis Uji Duncan	68

ABSTRAK

Nama : Andi Tenri Paramitha
NIM : 70100113034
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus musculus*)

Telah dilakukan penelitian Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus musculus*) Jantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol akar *parang romang* dalam menurunkan kadar kolesterol dengan konsentrasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Seluruh mencit dibuat hiperkolesterolemia dengan memberi kuning telur yang dicampur dengan pakan mencit. Setelah kadar kolesterol mencit diukur, pada kelompok I, II, III diberi ekstrak akar *parang romang* dengan dosis berturut-turut 3,5 mg/20 g BB, 7 mg/20 g BB dan 14 mg/20 g BB, kelompok IV diberi Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif dan kelompok V diberi Simvastatin sebagai kontrol positif. Pemberian dilakukan peroral dengan volume pemberian 1 ml.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dapat menurunkan kadar kolesterol dan dosis 14 mg/20 g BB menunjukkan aktivitas terbaik dalam penurunan kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

Kata Kunci: Akar *Boehmeria virgata* (Forst.) Guill, Kolesterol, Mencit (*Mus musculus*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Andi Tenri Paramitha
NIM : 70100113034
Title : Ethanol Extract Activity Test of *Parang Romang* Root
(*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) on Reducing Cholesterol Levels
of Mice (*Mus Musculus*)

A study conducted entitled Ethanol Extract Activity of *Parang romang* Root (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) on Reducing Cholesterol Levels of Mice (*Mus Musculus*) male. The objectives of this study is to know the activity of ethanol extract of *Boehmeria virgata* (Forst.) Guill root in decreasing cholesterol level in certain concentration.

The objects of this study was 15 mices which were devided into 5 treatment group. All mices get hypercholesterolemic by giving them egg yolk mixed with mice feed. After measuring cholesterol level of mice, Group I, II, III are given *Boehmeria virgata* (Forst.) Guill root extract at dose`of 3,5 mg/20 g BW, 7 mg/20 g Bw and 14 mg/20 g BW, Group IV was given Na-CMC 1% as negative control and Group V was given Simvastatin as positive control. Treatment was given orally at volume of 1 ml.

The result of the study showed that ethanol extract of *Boehmeria virgata* (Forst.) Guill root can reduce cholesterol level and at dose of 14 mg/20 g BW showed the best activity in cholesterol reduction in mice (*Mus musculus*)

Keywords: *Boehmeria virgata* (Forst) Guill root, cholesterol, mice (*Mus musculus*).

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Hiperkolesterolemia merupakan penyebab utama gangguan kardiovaskuler, seperti arterosklerosis dan penyakit jantung koroner (Kemenkes RI, 2011: 2). Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyebab nomor satu kematian akibat penyakit tidak menular di dunia. PJK menyebabkan 74.000 kematian setiap tahun, yang berarti 200 orang setiap hari meninggal akibat penyakit ini. (Mozaffarian et al, 2016: 3). Di Indonesia sendiri prevalensi PJK tahun 2013 sebesar 0,5% yaitu sekitar 883.447 orang. Manusia dengan kadar kolesterol yang abnormal tiga kali lebih mudah mendapat serangan jantung dibanding yang memiliki kadar kolesterol normal (Kemenkes RI, 2014: 5)

Penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan dengan diet, olahraga maupun dengan menggunakan obat-obatan hipolipidemia. Penggunaan obat-obat tradisional yang berasal dari alam sangat banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Selain murah dan mudah didapatkan juga memiliki efek samping yang kecil sehingga relatif aman jika dibandingkan obat-obat sintesis (Dachriyanus et al, 2007: 1).

Allah swt. menumbuhkan di bumi beraneka ragam tanaman untuk kebutuhan makhluk hidup. Hal ini seiring dengan firman Allah swt.. QS As-Syu'araa 26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama RI, 2014: 367)

Ayat ini membuktikan keniscayaan keesaan Allah swt., karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab,2009: 187)

Kaum musyrikin enggan percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi, berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat (Shihab, 2009: 187).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. menciptakan tumbuhan untuk kepentingan manusia. Tetapi, manusia tidak dibenarkan hanya menikmati apa yang diciptakan Allah swt. kepada mereka begitu saja, tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ciptaan-Nya dan mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan di muka bumi yang bermanfaat untuk manusia karena sesungguhnya Allah swt. menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki manfaat.

Salah satu tanaman obat yang mulai banyak diteliti saat ini adalah tumbuhan dari genus *Boehmeria*. Genus *Boehmeria* merupakan kelompok genus yang memiliki anggota yang cukup besar. Jumlah spesies yang ada dalam genus ini mencapai 65 spesies (Chen *et al*, 2003: 210). Adanya jumlah spesies yang cukup besar memungkinkan kemiripan yang tinggi antar karakter yang ada terutama morfologi,

anatomi dan habitusnya. Dari hubungan yang erat tersebut dimungkinkan adanya persamaan zat kandungan (konstituen). Namun begitu, antara tumbuhan satu dengan lainnya tidak akan memiliki kandungan kimia yang semuanya persis sama, pasti terdapat salah satu atau beberapa zat kimia yang khas untuk masing-masing tumbuhan tersebut (Hariyani, 2013: 2).

Tumbuhan *parang romang* merupakan tumbuhan yang termasuk dalam suku Urticaceae dan merupakan anggota dari genus *Boehmeria*. Tumbuhan ini tumbuh di daerah-daerah pegunungan seperti Sinjai, Gowa, Malino, Maros, dan Enrekang.

Penelitian melaporkan bahwa akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mengandung golongan alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid, serta memiliki toksisitas terhadap larva udang *Artemia salina* L. dengan $LC_{50} = 13,095$ $\mu\text{g/ml}$ (Rusdi, 2014: 2). Penelitian lain menyebutkan bahwa akar rami (*Boehmeria nivea*) menunjukkan efek antihiperlipidemik dengan kandungan kimia yakni isoflavan dan lignin yang berfungsi menurunkan kadar lemak dalam darah (Rahmawati. *et al*, 2016: 7).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji efek ekstrak akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) apakah dengan hubungan kekerabatan yang erat dengan *Boehmeria nivea* dapat memiliki kandungan kimia yang akan memberikan efek yang sama (antihiperlipidemik).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki aktivitas sebagai penurun kadar kolesterol darah pada mencit ?
2. Berapakah dosis ekstrak akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang lebih berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah pada mencit ?

3. Bagaimana pandangan Islam tentang tumbuh- tumbuhan yang dijadikan sebagai obat ?

C. Defenisi Operasional

1. Defensi Operasional

a. Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas senyawa terhadap indikasi terapi yang diinginkan.

b. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia/ zat aktif yang ada pada simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai

c. Ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) adalah sediaan kental, pekat yang didapatkan dari proses menarik senyawa kimia/ zat aktif yang ada pada simplisia akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dengan menggunakan pelarut yang sesuai.

d. Kolesterol adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun apabila kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka bisa mengakibatkan penyakit, termasuk penyakit jantung koroner dan stroke.

e. LDL (lipoprotein densitas rendah) adalah lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar pada manusia yang berfungsi mengangkut sebagian besar kolesterol darah dari hati ke jaringan dan disebut sebagai kolesterol jahat

f. HDL (lipoprotein densitas tinggi) adalah lipoprotein yang apabila kadarnya tinggi dalam darah maka resiko penyakit jantung menurun dan disebut sebagai kolestrol baik

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah uji aktifitas penurun kolesterol.

D. Kajian pustaka

Menurut Ika Rahmawati Sutejo, Hazmi Dwinanda Nurqistan, Imama Rasyada, Ni Nyoman Yuniasih, Annafira Yuniar, Rakhmat Ramadhani dalam penelitiannya yang berjudul Kandungan fitoestrogen ekstrak etanolik akar rami (*boehmeria nivea*) menurunkan kadar kolesterol tikus yang diovariectomi (2016), diperoleh bahwa ekstrak etanolik akar *Boehmeria nivea* dengan dosis 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB, dan 500 mg/kgBB dapat meningkatkan berat uterus, menurunkan kadar kolesterol darah tikus yang diovariectomi dan diinduksi diet aterogenik.

Menurut Shruti Sancheti, Sandesh Sancheti, Mayur Bafna, Hae-Ran Kim, Young-Han You, Sung-Yum Seo dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluation of antidiabetic, antihyperlipidemic and antioxidant effects of Boehmeria nivea root extract in streptozotocin-induced diabetic rats* (2011), diperoleh bahwa ekstrak pada 500 mg / kg dosis menghasilkan pengurangan glukosa darah puasa, kolesterol total, trigliserida, urea darah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap anggota genus yang sama dengan *Boehmeria nivea* yakni *Boehmeria virgata* untuk menentukan efek dalam menurunkan kadar kolesterol.

Berdasarkan penelitian Wardihan, Muhammad Rusdi, Gemini Alam, Lukman dan Marianti A. Manggau (2013), diketahui bahwa efek sitotoksik daun *Boehmeria virgata* dapat memberikan harapan harapan menjanjikan untuk proyek-proyek baru di kimia, farmakologi dan toksikologi meskipun ditemukan non selektif dalam HeLa, Widr dan baris sel T47D. Menurut Lukman M, *et* (2015), diketahui bahwa suatu

senyawa aktif yang diisolasi dari *B. Virgata* yakni BVI03 dapat dibuat formula dalam bentuk *Nanoencapsulated BioadhesiveVagina Gel* (NBVG) yang diperuntukan untuk membuktikan efek anti-proliferasi pada sel HeLa. Dari beberapa penelitian yang membuktikan efek farmakologi dari daun *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill Leaves) , maka peneliti mencoba melakukan penelitian yang berfokus kepada akar *parang romang* untuk mengetahui efek farmakologi yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian Muhammad Rusdi (2014), diketahui bahwa akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mengandung golongan alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid.

Berdasarkan skripsi Ulfah Fitriasari (2015) yang berjudul uji efektifitas ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit, diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol 0,33mg/g BB mencit merupakan dosis paling efektif dalam menurunkan kadar kolesterol darah pada mencit.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya aktivitas ekstrak akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) sebagai penurun kadar kolesterol darah pada mencit
2. Untuk mengetahui dosis ekstrak akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) terhadap penurunan kadar kolesterol darah pada mencit.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang tumbuh- tumbuhan yang dijadikan sebagai obat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang memiliki potensi

tinggi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan baku obat dalam upaya meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Tanaman (Waluyo, 2005: 6)

Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub Kelas	: Monochlamydeae
Bangsa	: Urticales
Suku	: Urticaceae
Marga	: <i>Boehmeria</i>
Jenis	: <i>Boehmeria virgata</i> (Forst.) Guill

2. Morfologi

Daun berbentuk menyerupai jantung (*cordatus*) dan bagian sisinya bergerigi halus (*serratus*), panjang 10-20 cm dan lebar 5-15 cm. Daun berwarna hijau muda hingga tua, berkilap pada bagian atasnya dan berwarna putih keperak-perakan dan berbulu halus pada bagian punggungnya. Bunganya tergolong majemuk dengan biji sangat kecil. Bunga pada beberapa varietas berwarna putih kehijau-hijauan di samping ada yang berwarna hijau kekuning-kuningan dan berubah menjadi coklat jika sudah tua. Bunganya terikat mengelompok di sela-sela daun pada bagian bawah buku-buku batang (Brands, 2007: 5).

3. Kandungan Kimia

Akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) mengandung golongan alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid (Rusdi, 2014: 2)

4. Kegunaan

Boehmeria virgata (Forst.) Guill selektif sebagai antikanker dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen antikanker (Lukman et al, 2014: 4). Daun *parang romang* mempunyai efek antiproliferasi terhadap sel Hela melalui aktivasi caspase 3 dan protein p53 (Manggau, 2013). Akar *parang romang* memiliki potensi toksisitas akut (Rusdi, 2014: 2).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Mencit (Pribadi, 2008)

Kerajaan	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Sub Kelas	: Theria
Intra Kelas	: Eutheria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Deskripsi

Mencit (*Mus musculus*) berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara, namun saat ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa subspecies dari mencit dan

mereka dikelompokkan sesuai dengan karakteristik khusus seperti tengkorak, gigi, badan dan kebiasaan alami (Vanderlip, 2001: 9)

3. Anatomi

a. Mata: mencit memiliki mata berwarna gelap atau merah, tergantung pada genetik mereka. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan sensitif terhadap cahaya yang terang. Mereka terutama mengandalkan indera pendengaran, penciuman dan sentuhan.

b. Telinga: mencit memiliki pendengaran yang tajam dan mengandalkan indera pendengarannya untuk mendeteksi bahaya dan dalam mendengar panggilan dari mencit lain. Kemampuan mendengar mencit belum berkembang sampai berusia 11 hari. Mencit dapat mendengar dan berkomunikasi dalam rentang ultrasonik. Mereka bisa mendengar suara dari 80 Hz sampai 100 kHz dan paling sensitif pada 15 kHz sampai 20 kHz dan 50 kHz. Kemampuan mendengar pada mencit bervariasi dengan usia mereka dan genetik.

c. Hidung: meskipun mencit memiliki hidung yang kecil, indera penciuman mereka sangat tajam dan memainkan peran penting dalam kehidupan social mereka. Bau dan aroma adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh mencit untuk mengintai wilayah dan mengenali koloni mencit lainnya.

d. Tubuh: mencit kecil dan lincah. Mereka mampu masuk pada rongga yang kecil dalam upaya untuk menghindari bahaya atau bersembunyi.

e. Kaki: kaki mencit mungkin kecil, tetapi mereka dapat melompat, berlari cepat, dan memanjat dengan mudah

f. Ekor: mencit memiliki ekor yang panjang dan kuat untuk ukuran mereka. Ekornya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Namun, mencit dapat dipegang dibagian tengah ekornya tanpa menyebabkan ketidaknyamanan jika mereka ditangani dengan

lembut. Ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan, serta sarana penting melepaskan panas tubuh. Jika ekornya terluka dan terpisah dari tubuh, bagian yang hilang dari ekor tidak akan tumbuh kembali (Vanderlip, 2001: 9-10)

4. Data Biologi

- a. Jumlah kromosom: 40 (20 pasangan kromosom)
- b. Penyakit alami: kanker, tumor
- c. Suhu tubuh: 37,5 °C
- d. Denyut jantung: 310-840 denyut per menit, 570 denyut permenit saat istirahat
- e. Tingkat pernafasan: 150- 180 napas permenit
- f. Tingkat metabolisme: mencit memiliki tingkat metabolisme yang tinggi karena cepatnya laju peredaran darah, pernafasan, dan fungsi metabolisme mereka harus bekerja setiap menit karena luas permukaan tubuh yang besar. Tingkat metabolisme dari mencit yang beratnya 1 ons (28 g) adalah 13 kali dari 1000 pound (445 kg) kuda per gram dari jaringan tubuh
- g. Konsumsi makanan: sekitar ½ ons per 3-4 ons berat badan, atau 1/6 ons makanan per mmencit per hari (15 g per 100 g berat badan, atau 6-7 g makanan per mencit perhari)
- h. Konsumsi air: ½ ons per 3-4 ons berat badan, atau 1/6 -1/3 ons per mencit
- i. Ekskresi urin: 1/60-1/30 ons per mencit per hari (1/2-1 ml per mencit per hari)
- j. Kepekaan terhadap perubahan suhu: toleransi rendah terhadap panas, akan mati pada 98,6 °F (37 °C). Jika perubahan suhu terjadi secara tiba-tiba, mencit bias mati pada 78 °F (25,5 °C). Mencit tidak mengeluarkan air liur untuk

mendinginkan. Mencit memerlukan beberapa minggu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dingin.

k. Penglihatan: Mencit albino dan berwarna memiliki penglihatan yang sangat lemah dan sensitif terhadap cahaya (Vanderlip, 2001: 11)

l. Kadar normal kolesterol mencit yaitu 40-150 mg/dL. Jika kadar kolesterol berada di bawah 40-150 mg/dL disebut hipokolesterolemia. Begitupun sebaliknya, jika berada di atas 40-150 mg/dL disebut dengan hiperkolesterolemia (Erni, 2014: 95).

C. Pengantar Fitokimia

1. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Peran ekstraksi dalam analisis fitokimia sangat penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstraksi, termasuk fraksinasi dan pemurnian. Ada beberapa istilah yang banyak digunakan dalam ekstraksi, antara lain ekstraktan (yakni, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi), rafinat (yakni, larutan senyawa atau bahan yang akan diekstraksi), dan linarut (yakni, senyawa atau zat yang diinginkan terlarut dalam rafinat). Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi (Hanani, 2015: 10).

Ekstrak adalah sediaan cair, kental atau kering yang merupakan hasil proses ekstraksi atau penyarian suatu matriks atau simplisia menurut cara yang sesuai. Ekstrak cair diperoleh dari ekstraksi yang masih mengandung sebagian besar cairan penyari. Ekstrak kental akan didapat apabila sebagian besar cairan penyari sudah

diuapkan, sedangkan ekstrak kering akan diperoleh jika sudah tidak mengandung cairan penyari (Hanani, 2015: 13).

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih, 2008: 24).

Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar serta larut dalam air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dibandingkan air. Selain itu, kapang dan mikroba sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Etanol juga memiliki beberapa keuntungan lain yaitu tidak beracun, netral, absorpsi baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan (Dirjen POM, 1995). Penggunaan etanol sebagai cairan pengestraksi biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran etanol dan air. Etanol yang paling baik untuk menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol 70% (Voight, 1995: 969).

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah menarik atau memisahkan senyawa dari campurannya atau simplisia. Ada berbagai cara ekstraksi yang telah diketahui. Masing- masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode dilakukan dengan memerhatikan antara lain sifat senyawa, pelarut yang digunakan, dan alat tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Alkohol merupakan salah satu pelarut yang paling banyak dipakai untuk menyari secara total. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, infusa, dekok, destilasi (Hanani, 2015: 11).

3. Maserasi

Maserasi adalah cara ekstraksi simplisia dengan merendam dalam pelarut pada suhu kamar sehingga kerusakan atau degradasi metabolit dapat diminimalisasi. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar dan di dalam sel sehingga diperlukan penggantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015: 11).

D. Pengantar Farmakologi

1. Lemak

a. Pengertian Lemak

Lemak adalah senyawa biomolekul yang tidak larut, sehingga terikat pada plasma sebagai mekanisme transport dalam serum. Lipid dapat diekstraksi dengan pelarut organik, seperti eter, benzene, kloroform, dan tetraklorometana. Lipid penting karena memiliki nilai energi yang tinggi, bahan isolasi dan pelindung yang terdapat

pada jaringan-jaringan subkutan dan mengelilingi organ-organ tertentu misalnya: jaringan syaraf. Trigliserol terutama digunakan dalam tubuh untuk menyediakan energi bagi berbagai proses metabolisme, fungsi lipid ini mempunyai peranan yang hampir sama dengan karbohidrat. Beberapa lipid, khususnya kolesterol, fosfolipid, dan derivat-derivatnya digunakan diseluruh tubuh untuk menyediakan fungsi intrasel lain (Erinda, 2009: 17)

Lipid plasma yang utama yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma. Agar lipid plasma dapat diangkut dalam sirkulasi, maka susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi yaitu dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air (Ganiswarna, 2009: 374)

b. Jalur Pengangkutan Lemak dalam Darah

Adapun jalur pengangkutan lemak dalam darah yaitu:

1) Jalur Eksogen

Kolesterol dan *Free fatty acid* yang masuk ke dalam tubuh lewat asupan akan diserap di intestinal mikrovili dimana mereka akan diubah menjadi kolesterol ester dan trigliserida. Kedua zat ini kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron dan disekresi ke dalam sistem limfatik dan memasuki sirkulasi sistemik. Trigliserida mengalami hidrolisis di kapiler jaringan lemak dan otot menjadi asam lemak bebas (mono dan digliserida) dan kilomikron remnant, sehingga ukuran kilomikron menjadi berkurang dan karenanya ditransfer menjadi HDL.

Kilomikron remnant akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati akan diubah menjadi asam empedu, yang akan dikeluarkan ke dalam usus, membantu proses penyerapan dari makanan. Sebagian lagi dari kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian organ hati akan

mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Kilomikron yang tersisa (yang lemaknya telah diambil) pada akhirnya dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG-CoA reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah (Fatmawati, 2008: 273).

2) Jalur Endogen

Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian membentuk trigliserida, trigliserida ini dibawa melalui aliran darah dalam bentuk VLDL yang kemudian disirkulasi ke jaringan lemak dan otot. VLDL kemudian akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. IDL kemudian berubah menjadi LDL yang kaya akan kolesterol melalui serangkaian proses. LDL ini bertugas menghantarkan kolesterol ke dalam tubuh. Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan ke dalam darah, dimana pertama-tama akan berikatan dengan HDL. HDL bertugas membuang kelebihan kolesterol dari dalam tubuh (Fatmawati, 2008: 273).

2. Lipoprotein

Lipoprotein adalah senyawa lemak dibuat larut dalam plasma dengan apoprotein. Pada saat ini dikenal sembilan jenis apoprotein yang diberi nama secara alfabetis yaitu Apo A, Apo B, Apo C, dan Apo E (Sudoyo, 2006: 437).

Lipoprotein dapat dibedakan menjadi:

a. Kilomikron

Kilomikron merupakan lipoprotein dengan berat molekul terbesar dan mengandung Apo-B48. Kandungannya sebagian besar trigliserida (80-95%) untuk dibawa ke jaringan lemak dan otot rangka. Kilomikron juga mengandung kolesterol

(2-7%) untuk di bawa ke hati. Setelah 8-10 jam sejak makan terakhir, kilomikron tidak ditemukan lagi dalam plasma. Adanya kilomikron pada saat puasa dianggap abnormal (Dalimartha, 2008: 8)

Kilomikron adalah bentuk awal lipoprotein, partikel ini diproduksi oleh sel usus halus yang berasal dari lemak dan protein yang dimakan. Kilomikron membawa trigliserida dari makanan ke jaringan lemak dan otot rangka, dan juga ke hati (Tjay dan Rahardja, 2007: 218).

b. Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL, *Very Low Density Lipoprotein*)

VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*), dibentuk dari asam lemak bebas di hati dengan kandungan Apo-B100. VLDL mengandung 55-80% trigliserida dan 5-15% kolesterol (Dalimartha, 2008: 8).

VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*) yang disekresi oleh hati menyediakan suatu sarana untuk mengeksport trigliserida ke jaringan perifer. VLDL mengandung Apo-C dari HDL plasma. Trigliserida VLDL dihidrolisis oleh lipase lipoprotein yang menghasilkan asam lemak bebas untuk disimpan di dalam jaringan adipose dan untuk oksidasi dalam jaringan seperti otot jantung dan otot rangka. Hasil dari depleksi trigliserida menghasilkan sisa yang disebut lipoprotein berdensitas menengah (IDL). Beberapa partikel IDL mengalami endositosis secara langsung oleh hati, IDL yang selebihnya dikonversi menjadi LDL dengan menghilangkan trigliserida lebih lanjut yang diperantarai oleh lipase hati. Proses tersebut dapat menjelaskan tentang fenomena klinis "pergeseran beta (beta shift)", peningkatan LDL (lipoprotein beta) dalam serum ketika kondisi hipertrigliseridamik menurun. Peningkatan kadar LDL dalam plasma dapat disebabkan dari peningkatan sekresi precursor VLDL, dan juga dari penurunan katabolisme LDL (Katzung, 2002: 462)

c. Lipoprotein densitas sedang (IDL, *Intermediate Density Lipoprotein*)

IDL ini kurang mengandung trigliserida (30%), lebih banyak kolesterol (20%) dan relatif lebih banyak mengandung apoprotein B dan E. IDL adalah zat perantara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL, tidak terdapat dalam kadar yang besar kecuali bila terjadi hambatan konversi lebih lanjut. Bila terdapat dalam jumlah banyak IDL akan terlihat sebagai kekeruhan pada plasma yang didinginkan meskipun ultra sentrifugasi perlu dilakukan untuk memastikan adanya IDL (Tanu, 2012: 376).

d. Lipoprotein densitas rendah (LDL, *Low Density Lipoprotein*)

LDL merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar (40-50%) untuk disebarkan ke seluruh endotel jaringan perifer dan pembuluh nadi (Dalimartha, 2008: 9).

Suatu jalur utama katabolisme LDL dalam hepatosit dan dalam sebagian besar sel-sel bernukleus lainnya melibatkan endositosis yang diperantarai reseptor berafinitas tinggi. Ester kolesterol dari inti LDL kemudian dihidrolisis, yang menghasilkan kolesterol bebas untuk sintesis membran sel. Sel-sel juga mendapatkan kolesterol dari sintesis *de novo* melalui suatu jalur yang melibatkan pembentukan *mevalonic acid* oleh reduktase HMG-coA. Produksi enzim tersebut dan reseptor LDL diatur pada tingkat transkripsional oleh kandungan kolesterol dalam sel. Biasanya, sekitar setengah dari eliminasi LDL dari plasma disebabkan oleh endositosis LDL ke dalam hepatosit. Bahkan lebih banyak lagi kolesterol yang dikirim ke hati dari VLDL sisa dan kilomikron. Sehingga hati memainkan peran utama dalam pengolahan kolesterol tubuh. Tidak seperti sel lainnya, hepatosit mampu mengeliminasi kolesterol dari tubuh melalui sekresi kolesterol dalam empedu dan dengan

mengonversi kolesterol menjadi asam empedu yang juga disekresi dalam empedu (Katzung, 2002: 462)

e. Lipoprotein Lp (a)

Lipoprotein Lp (a) dibentuk dari suatu gugus yang menyerupai LDL dan protein Lp (a) sangat homolog dengan plasminogen tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk diaktifkan oleh activator plasminogen jaringan. Keadaan seperti tersebut di depan dapat terjadi pada sejumlah isoform dengan berat molekul yang berbeda. Kadar protein dalam serum manusia bervariasi nol hingga melebihi 200 mg/dL dan diduga sebagian besar ditentukan oleh factor genetik. Kompleks lipoprotein Lp (a) dapat ditemukan di dalam plak arterosklerosis dan diduga berperan pula pada terjadinya penyakit coroner melalui hambatan trombolisis (Katzung, 2002: 462)

f. Lipoprotein densitas tinggi (HDL, *High Density Lipoprotein*)

HDL merupakan lipoprotein yang mengandung Apo AI dan Apo II dengan kandungan trigliserida (5-10%) dan kolesterol (15-25%). HDL mempunyai efek antiteratogenik kuat sehingga disebut juga kolesterol bebas yang terdapat dalam endotel jaringan perifer termasuk pembuluh darah, ke reseptor HDL di hati untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus kecil untuk menerima lemak dan dibuang berupa tinja. Dengan demikian, penimbunan kolesterol di perifer berkurang (Dalimartha, 2008: 9)

Sebagian besar lipid di dalam HDL berasal dari permukaan satu lapis kilomikron dan VLDL selama lipolisis. HDL juga mendapatkan kolesterol dari jaringan perifer dari suatu jalur yang melindungi homeostatis kolesterol sel. Pada proses tersebut, kolesterol bebas dipindahkan dari sitosol ke membran sel oleh suatu transporter, ABC1. Kolesterol bebas tersebut kemudian dibutuhkan oleh suatu

partikel kecil yang disebut HDL prabeta-1. Kolesterol bebas tersebut kemudian diesterifikasi oleh lesitin: *cholesterol acyltransferase* (LCAT), yang menyebabkan pembentukan spesies HDL yang lebih besar. Ester kolesterol ditransfer ke VLDL, IDL, LDL dan kilomikron sisa dengan bantuan protein transfer kolestril (CETP). Jadi, sebagian besar ester kolestril yang ditransfer pada akhirnya dibawa ke hati melalui endositosis lipoprotein-lipoprotein akseptor. HDL dapat pula membawa ester kolestril langsung ke hati melalui suatu reseptor pengait/ docking (reseptor scavenger, SR-BI) yang tidak melakukan endositosis terhadap lipoprotein (Katzung, 2002: 462).

Kadar HDL kira-kira sama pada pria dan wanita sampai pubertas, kemudian menurun pada pria sampai 20% lebih rendah daripada kadar pada wanita. Kadar HDL menurun pada kegemukan, perokok, pasien diabetes melitus, yang tidak terkontrol dan pada pemakaian kombinasi estrogen dan progestin. Pada individu dengan nilai lipid yang normal, kadar HDL relatif menetap sesudah dewasa (kira-kira 45 mg/dl pada pria dan 54 mg/dl pada wanita). HDL merupakan lipoprotein protektif yang menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Efek protektifnya digunakan karena mengangkut kolesterol dari perifer untuk dimetabolisme di hati dan menghambat modifikasi oksidatif LDL melalui peroksidase, suatu protein antioksidan yang berasosiasi dengan HDL (Tanu, 2012: 376)

Tabel 1. Jenis Lipoprotein dan kandungan lipid (Arsana, 2015: 312)

Jenis Lipoprotein	Kandungan Lipid (%)		
	Trigliserida	Kolesterol	Fosfolipid
Kilomikron	80-95	2-7	3-9
VLDL	55-80	5-15	10-20
IDL	20-50	20-40	15-25
LDL	5-15	40-50	20-25
HDL	5-10	15-25	20-30

3. Kolestrol

a. Pengertian Kolesterol

Kolesterol secara etimologi berasal dari bahasa *yunani* yang terbagi menjadi kata *chole* yang artinya empedu dan *stereos* berarti padat. Jadi, kolesterol adalah zat alamiah dengan sifat fisik serupa lemak tapi berumus steroida, seperti banyak senyawa alamiah lainnya (Tjay dan Rahardja, 2007: 569)

Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Kolesterol merupakan sterol utama dalam tubuh manusia, kolesterol merupakan komponen struktural membran sel dan lipoprotein plasma, dan juga merupakan bahan awal pembentukan asam empedu serta hormon steroid (Kumalasari, 2005: 98).

Kolesterol mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh, pertama merupakan prekursor atau bahan pembentuk berbagai jenis hormon steroid antara lain hormon estrogen, progesterone, dan androgen. Kolesterol juga merupakan pro-vitamin D (ergosterol) yang terdapat di jaringan bawah kulit. Sinar matahari terutama sinar ultraviolet membantu mengubah pro-vitamin D itu menjadi vitamin D. Fungsi berikutnya adalah sebagai bahan pembentuk asam empedu dan garam empedu (Tirtawinata, 2006: 9).

Kolesterol hanya terdapat di dalam makanan asal hewan. Sumber kolesterol adalah hati, ginjal, dan kuning telur. Selain itu, daging, susu, keju serta udang dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit sekali mengandung kolesterol (Almatsier, 2001: 73-74)

Tabel 2. Kadar kolesterol beberapa bahan pangan (mg/100 gram)

Bahan Makanan	Kolesterol	Bahan Makanan	Kolesterol
Kuning telur	2630	Daging kambing	98
Ginjal, direbus	804	Daging sapi, direbus	94
Telur utuh	504	Daging ayam, direbus	79
Hati, direbus	274	Lemak hewan	95
Mentega	250	Susu bubuk penuh	709
Udang, direbus	150	Susu cair penuh	14
Keju (cheddar)	111	Margarine	0

Sumber: Wilson, E.D, K.H. Fisher dan P.A. Garcia, *Principles of Nutrient*. 1979

Di dalam tubuh manusia dan hewan, jumlah kolesterol di dalam sel diatur oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam (Utariningsih, 2007: 37):

1. Faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau yang terikat dalam lipoprotein di luar sel, persediaan asam lemak bebas, dan adanya hormon tertentu.
2. Faktor dalam sel, seperti kegiatan enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol dan yang berperan dalam katabolisme kolesterol, jumlah ketersediaan terpenoid kolesterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis kolesterol, jumlah hasil metabolisme kolesterol, adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau derivatnya ke luar sel dari sel dengan mekanisme pengangkutan aktif melalui membrane sel, dan pengaruh viskositas membran. Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat mengakibatkan berbagai kelainan yang bersifat patologis.

b. Biosintesis Kolestrol

Biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: (a) Sintesis mevalonat dari asetil-CoA. (b) Unit isoprenoid dibentuk dari mevalonat melalui pelepasan CO₂. (c) Enam unit isoprenoid mengadakan kondensasi untuk membentuk

senyawa antara skualen. (d) Skualen mengalami siklisasi untuk menghasilkan senyawa steroid induk, yaitu lanosterol. (e) Kolesterol dibentuk dari lanosterol setelah melewati beberapa tahap lebih lanjut, termasuk pelepasan tiga gugus metil (Murray, 2009: 174).

c. Total kadar kolesterol

Tidak ada garis batas yang absolut mengenai angka dan ambang batas kolesterol dan lemak dalam darah. Namun, dari hasil penelitian yang intensif dan dalam jangka waktu yang cukup lama dan meliputi sejumlah besar populasi atau yang lebih dikenal dengan “longitudinal study”, para peneliti ilmu kedokteran telah meletakkan pedoman besaran angka-angka yang sebaiknya digunakan sebagai ambang batas kadar kolesterol dalam darah. Penelitian ini juga menunjukkan identifikasi dampak- dampak yang mungkin timbul bila angka-angka atau ambang batas tersebut terlampaui. National Cholesterol Education Program Adult Panel III (NCEP-ATP III) (Murray, 2009: 174).

Tabel 3. Kadar kolesterol total (Sudoyo, 2006: 1928)

Kategori	Kadar (mg/dL)
< 200	Optimal
200-239	Dinginkan
≥240	Tinggi

4. Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi dimana meningkatnya konsentrasi kolesterol dalam darah yang melebihi nilai normal. Kolesterol telah terbukti mengganggu dan mengubah struktur pembuluh darah yang mengakibatkan gangguan fungsi endotel yang menyebabkan lesi, plak, oklusi, dan emboli. Selain itu juga kolesterol diduga bertanggung jawab atas peningkatan stress oksidatif (Stapleton *et al.*, 2010: 23).

Hiperkolesterolemia dapat terjadi karena gaya hidup (*life style*) yang tidak sehat, mulai dari pola makan yang tidak seimbang sampai kurangnya aktivitas olahraga. Pola makan tidak seimbang meliputi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat, konsumsi makanan yang rendah serat, serta kebiasaan merokok dan juga minum alkohol. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh dapat disebabkan oleh sintesis kolesterol dan penyerapan kolesterol yang tinggi dan juga karena konsumsi makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat.. Penurunan kolesterol darah ke nilai normal dapat dilakukan dengan dua cara dengan mengurangi konsumsi lemak atau kolesterol yang berasal dari bahan makanan serta menghambat penyerapan kolesterol atau menghambat sintesis kolesterol endogen dengan penggunaan obat (Hernawati, 2013: 2).

Kolesterol yang berada dalam zat makanan yang kita makan akan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang berakibat hiperkolesterolemia (Soeharto, 2004: 56). Salah satu penyakit tersering yang disebabkan oleh meningkatnya kadar kolesterol dalam darah adalah aterosklerosis (Guyton, 2008: 25).

Hiperkolesterolemia dapat berkembang menjadi arterosklerosis pada pembuluh arteri, berupa penyempitan pembuluh darah, terutama di jantung, otak, ginjal, dan mata. Pada otak, aterosklerosis menyebabkan stroke, sedangkan pada jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Hiperkolesterolemia dapat terjadi karena bobot badan, usia, kurang olahraga, stress emosional, gangguan metabolisme, kelainan genetik, serta diet tinggi kolesterol dan asam lemak jenuh. Hiperkolesterolemia juga dapat terjadi pada wanita yang kekurangan hormon estrogen (Hardiningsih, 2006: 1)

5. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah suatu keadaan patologis akibat kenaikan metabolisme lemak darah yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol darah (hiperkolesterolemia), trigliserida (hipertrigliseridemia) atau kombinasi keduanya (Wardiah, 2009: 14).

Kadar lipid berlebih akan menyebabkan kerusakan sel endotel pembuluh darah. Lipoprotein yang memiliki apo β -100 (VLDL, IDL, LDL) bila terdapat dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan deposisi kolesterol dan ester kolesterol pada jaringanik dinding pembuluh arteri (Erinda, 2009: 22).

Data dari *American Heart Association* tahun 2014 mmemperlihatkan prevalensi dari berat badan berlebih dan obesitas pada populasi di Amerika adalah 154,7 juta orang yang berarti 68,2% dari populasi di Amerika Serikat yang berusia lebih dari 20 tahun. Populasi dengan kadar kolesterol ≥ 240 mg/dl diperkirakan 31,9 juta orang dari populasi. Dislipidemia merupakan faktor resiko primer untuk PJK dan mungkin berperan sebelum faktor resiko utama lainnya muncul. Data epidemiologi menunjukkan bahwa hiperkolesterolemia merupakan faktor resiko untuk stroke iskemia (Arsana, 2015: 5)

Jenis-jenis dislipidemia yang dapat terjadi (Arsana, 2015: 6):

a. Dislipidemia primer

Dislipidemia primer adalah dislipideia akibat kelainan genetik. Pasien dislipidemia sedang disebabkan oleh hiperkolesterolemia poligenik dan dislipidemia kombinasi familial. Dislipideia berat umumnya karena hiperkolesterolemia familial, dislipidemia remnant, dan hipertrigliseridemia primer.

Dislipidemia primer dibagi dalam 2 kelompok besar: (a) Hiperlipoproteinemia monogenik karena kelainan gen tunggal yang diturunkan. Sifat penurunan ini mengikuti hukum Mendel; (b) Hiperlipoproteinemia poligenik/multifaktorial. Kadar kolesterol pada kelompok ini ditentukan oleh gabungan faktor-faktor genetik dengan faktor lingkungan. Diet lemak jenuh dan kolesterol mempengaruhi kadar kolesterol pada pasien-pasien ini.

Jenis poligenik yang banyak ditemukan daripada monogenik, tetapi jenis monogenik mempunyai kadar kolesterol yang lebih tinggi. Individu dengan hiperlipoproteinemia primer juga mungkin menderita hiperlipidemia sekunder yang menimbulkan perubahan gambaran lipidnya. Hiperlipoproteinemia sekunder berhubungan dengan diabetes melitus yang tidak terkontrol, minum alkohol, hipotiroidisme, penyakit obstruksi hati, sindrom nefrotik, uremia, penyakit penimbunan glikogen atau disproteinemia (mieloma multipel, makroglobulinemia, lupus aritematosus). Keberhasilan pengobatan penyakit dasar biasanya memperbaiki hiperlipoproteinemia. Hiperlipoproteinemia sekunder juga dapat disebabkan oleh pemberian kortikosteroid, estrigen, androgen, diuretik atau penghambat adrenoreseptor beta (Tanu, 2012: 377).

b. Dislipidemia sekunder

Pengertian sekunder adalah dislipidemia yang terjadi akibat suatu penyakit lain misalnya hipotiroidise, sindroma nefrotik, diabetes mellitus, dan sindroma metabolik. Pengelolaan penyakit primer akan memperbaiki dislipidemia yang ada. Dalam hal ini pengobatan penyakit primer yang diutamakan. Akan tetapi pada pasien diabetes mellitus pemakaian obat hipolipidemik sangat dianjurkan, sebab resiko koroner pasien tersebut sangat tinggi. Pasien diabetes melitus dianggap mempunyai

resiko yang sama (ekivalen) dengan pasien penyakit jantung koroner. Pankreatitis akut merupakan manifestasi umum hipertrigliseridemia yang berat.

Adapun penyebab dislipidemia sekunder adalah:

- 1) Diabetes mellitus
- 2) Hipotiroidisme
- 3) penyakit hati obstruktif
- 4) Sindroma nefrotik, dan
- 5) Obat-obat yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan kolesterol HDL (progestin, steroid anabolik, kortikosteroid, beta-blocker).

Dalam pengelolaan dislipidemia, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengendalikan kadar lipid dan factor-faktor metabolik lainnya seperti hipertensi, diabetes dan obesitas. Selain itu faktor-faktor resiko penyakit kardiovaskular lainnya seperti merokok juga harus dikendalikan. Pengelolaan dislipidemia meliputi pencegahan primer yang ditujukan untuk mencegah timbulnya komplikasi penyakit-penyakit kardiovaskular pada pasien dislipidemia seperti penyakit jantung koroner, stroke dan penyakit aterosklerosis vaskular lainnya dan pencegahan sekunder yang ditujukan untuk mencegah komplikasi kardiovaskular lanjutan pada semua pasien yang telah menderita penyakit aterosklerosis dan kardiovaskular yang jelas (Arsana, 2015:15)

Tabel 4. Pedoman Terapi Hiperlipidemia (Tanu, 2012: 379)

Jenis lipoprotein	Kadar yang ingin dicapai (mg/dl)	Kadar batas hingga tinggi (mg/dl)	Kadar tinggi (mg/dl)
Kolesterol total	< 200	200-239	>240
LDL	<130	130-159	>160
HDL			
Pria	>40	>60	
Wanita	>50		
Trigliserida	<150	150-199	>200

Pengelolaan pasien dislipidemia terdiri dari terapi non farmakologi dan farmakologi. Terapi non farmakologi meliputi perubahan gaya hidup, termasuk aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, penurunan berat badan, dan penghentian merokok. Sedangkan terapi farmakologis dengan memberikan obat antilipid (Arsana, 2015: 15)

Pengobatan dislipidemia didasarkan karena adanya hubungan hiperlipidemia dengan aterosklerosis (koroner dan perifer), pankreatitis akut dan tendinitis serta xantoma (kosmetik). Pengobatan hiperkolesterolemia terutama ditujukan bagi pasien dengan riwayat aterosklerosis prematur dalam keluarga dan dengan adanya faktor risiko lain seperti diabetes melitus, hipertensi, dan merokok (Tanu, 2012: 380)

6. Arteriosklerosis

Aterosklerosis adalah kombinasi 2 kata dari bahasa Yunani yaitu *athere*: pudding dan *sclerosis*: pengerasan, dimana dinding arteri menjadi penuh dengan timbunan yang lembut dan lembek yang akhirnya mengeras sehingga arteri menjadi kaku dan sempit (Wardiah, 2009: 15).

Aterosklerosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri. Dikenal 3 bentuk arteriosklerosis yaitu aterosklerosis, arteriosclerosis Monckeberg dan arteriosclerosis. Aterosklerosis adalah bentuk arteriosclerosis yang paling umum ditemukan, ditandai dengan terdapatnya aterom pada bagian intima arteri yang berisi kolesterol, zat lipid lipofag. Pembuluh darah yang terkena adalah arteri besar dan sedang yaitu pembuluh darah serebral, vertebral, coroner, renal, aorta, dan pembuluh di tungkai. Faktor resiko yang merupakan predisposisi untuk timbulnya penyakit coroner adalah hiperlipidemia, hipertensi, kebiasaan merokok, DM, kurang gerak, keturunan dan stress (Ganiswara, 2009: 373).

Insiden penyakit koroner lebih rendah di negara yang sedang berkembang dibanding dengan negara yang sudah maju dan hal ini dihubungkan antara lain dengan diet lemak yang jauh lebih tinggi di negara yang sudah maju. Komplikasi terpenting dari arterosklerosis adalah penyakit jantung koroner, gangguan pembuluh darah serebral dan gangguan pembuluh darah perifer. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian utama di negara yang telah maju dan semakin sering ditemukan di negara yang telah maju dan semakin sering ditemukan di negara kita. Faktor resiko yang merupakan predisposisi untuk timbulnya penyakit koroner adalah hiperlipidemia, hipertensi, kebiasaan merokok, diabetes melitus, kurang gerak, keturunan, dan stress. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa penyakit jantung koroner merupakan penyakit multifaktorial dan pemberian pengobatannya harus dilakukan bersamaan dengan tindakan untuk mengatasi faktor risiko lainnya (Tanu, 2012: 373).

Ada 4 langkah penting menuju Arterosklerosis (Wardiah, 2009: 15):

a. Dinding arteri melemah

Naiknya kadar kolesterol menyebabkan sel-sel endotel di dalam dinding arteri menjadi lebih lengket

b. Respon radang

Merespon sinyal dari sel-sel endothelial, makrofag menyerang LDL yang menyerbu

c. Terbentuknya plak

Seiring LDL menuju dinding arteri, makin banyak makrofag yang merespon dan dinding arteri makin menjadi meradang. Dalam upaya untuk menahan proses ini sel-sel otot memproduksi tutup (cap) berserat di atas bagian yang meradang

d. Plak pecah dan gumpalan darah terbentuk

Timbunan plak yang dipenuhi oleh sel-sel radang (terutama makrofag dan limfosit T) dan juga kolesterol. Makin banyak sel-sel radang dan juga kolesterol serta makin tipis tutupnya makin tidak stabil plaknya. Sel-sel T memperlambat produksi materi berserat yang memperkuat tutup (seperti kolagen) dan makrofag memproduksi enzim yang menguraikan kolagen. Serangan bermata dua ini merusak tutup sehingga akhirnya pecah. Akibatnya kolesterol dan sel-sel di dalam plak berkontak dengan darah mengalir, hal ini menyebabkan sel-sel darah yang disebut trombosit membentuk gumpalan. Gumpalan yang dihasilkan dapat menghambat aliran darah, mengurangi pasokan darah dan oksigen ke jantung yang bias menyebabkan serangan jantung.

7. Penyebab Kolesterol Tinggi

Adapun penyebab kolesterol tinggi yaitu (Sudewo, 2004: 64)

- a. Terlalu banyak mengonsumsi lemak binatang seperti daging, jeroan, telur, udang, kepiting, sumsum tulang, cumi, kulit ayam, dan kikil.
- b. Semua lemak yang menempel di daging sebelum dimasak.
- c. Kelebihan berat badan dan jarang berolahraga
- d. Gaya hidup yang tidak seimbang dan pola makan yang tidak teratur.
- e. Faktor keturunan atau riwayat keluarga yang menderita kadar kolesterol tinggi dan penyakit hipertensi.

Bila individu dengan hiperlipidemia dipacu oleh beberapa penyakit lain seperti diabetes melitus, pecandu alkohol atau hipotiroidisme maka penyakit tersebut perlu diobati. Individu tersebut dianjurkan menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pembentukan arterosklerosis, yaitu menghentikan rokok, mengobati

hipertensi, olahraga cukup dan pengawasan kadar gula darah pada pasien diabetes (Tanu, 2012: 380).

E. Uraian Obat

Simvastatin merupakan senyawa antilipemik, inhibitor HMG-CoA (hydroxymethylglutaryl-CoA) reduktase. Berdaya menurunkan sintesa kolesterol endogen dalam hati dan dengan demikian terjadi penurunan kolesterol total dengan kuat, LDL (dg 30-40%), TG, dan VLDL lebih ringan, sedangkan HDL dinaikkan. Statin juga berkhasiat antitrombotis, anti-aritmia dan anti radang dengan jalan menghambat sitokin-sitokin tertentu (Tan H. Tjay & K.Rahardja: 2009: 67).

Simvastatin bekerja dengan mengurangi pembentukan kolesterol di liver dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim HMG-CoA (hydroxymethylglutaryl-CoA) reduktase. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat meningkatnya pengeluaran LDL-C dari darah dan penurunan konsentrasi dari LDL-C dan lipoprotein apo- β lainnya terasuk trigliserida (Arsana, 2015: 20).

Simvastatin merupakan serbuk kristal warna putih, nonhigroskopis. Praktis tidak larut dalam air dan sangat larut dalam kloroform, metanol dan etanol. Indikasi simvastatin yaitu untuk hiperkolesteromia primer, heterozygous familial hiperkolesterolemia, homozygous familial hiperkolesterolemia, atau tipe hiperkolesteromia campuran pada pasien yang tidak menunjukkan respon yang adekuat terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai. Dosis dan cara pemakaiannya yaitu hiperkolesteromia primer, hyperlipidemia kombinasi, 10- 20 mg sehari pada malam hari, interval disesuaikan paling sedikit 4 minggu; kisaran dosis lazim 10-80 mg sekali sehari pada malam hari. Homozygous familial hiperkolesterolemia, 40 mg

sehari pada malam hari atau 80 mg sehari terbagi dalam 3 dosis (dengan dosis terbesar pada malam hari). Pencegahan kardiovaskuler, dosis awal 20-40 mg sekali sehari pada malam hari, interval disesuaikan paling sedikit 4 minggu; maksimal 80 mg sekali sehari pada malam hari. Catatan: maksimal 10 mg sehari jika digunakan bersama ciclosporin, fibrat atau penurun lipid nicotinic acid. Maksimal 20 mg sehari jika digunakan bersama amiodaron atau verapamil. Maksimal 40 mg sehari dengan diltiazem. Kontraindikasi yaitu pada pasien dengan penyakit hati yang aktif (tes fungsi hati abnormal yang persisten), pada kehamilan dan menyusui, porphyria. Farmakokinetika obat ini yakni mempunyai bioavailabilitas relatif rendah, terutama disebabkan first pass metabolisme, inhibitor reduktase merupakan senyawa aktif kecuali lovastatin dan simvastatin (Lim, 2009: 165).

Mekanisme kerja simvastatin yaitu bekerja dengan cara menghambat HMG-CoA reduktase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. Simvastatin akan menghambat HMG-CoA reduktase mengubah asetil-CoA menjadi asam mevalonat. Simvastatin jelas menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL plasma (Katzung, 2002: 55).

Simvastatin merupakan golongan obat statin yang saat merupakan hipolipidemik yang paling efektif dan aman. Obat ini terutama efektif untuk menurunkan kolesterol. Pada dosis tinggi, juga dapat menurunkan trigliserida yang disebabkan oleh peninggian VLDL (Tanu, 2012: 383).

F. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan banyaknya berbagai penyakit yang muncul di kalangan masyarakat.

Dan salah satu penyakit yang membumi saat ini adalah kolesterol yang disebabkan karena pola makan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai penyakit di kalangan masyarakat maka masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang khalik sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-‘Imran/3: 190-191 yang firmanya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Kementerian Agama RI, 2014: 75).

As- Suyuthi dalam kitabnya menyebutkan mengenai asbabun nuzul surah Ali-Imran ayat 190 dengan mengutip hadits riwayat Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, 'Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?' Orang-orang Yahudi itu menjawab, 'Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya.' Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, 'Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?' Mereka mmenjawab, 'Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati.' Lalu mereka mendatangi Nabi saw. Lalu mereka berkata kepada beliau, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk

mengubah bukit Shafa dan Marwah menjadi emas untuk kami.'Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah.

‘Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.’(as-Suyuti, 2008: 148-149).

Ditegaskan pada ayat ini dan ayat mendatang, dan salah satu bukti kebenaran adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda* kemahakuasaan Allah bagi *ulul albib*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni (Shihab, 2009: 370).

Dari ayat diatas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah swt. memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengkaji hasil ciptaan Allah yang terdapat di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian ini, dimana tujuannya adalah untuk menguji efektivitas tanaman dalam menanggulangi suatu penyakit yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisioal telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tanaman obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Rahim, 2007: 5).

Tumbuhan adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan penyakit, zat perusak dan membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri sehingga mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman, 2007: 5). Dan salah satu yang dapat menjadi acuan

adalah akar *parang romang* sebagai penurun kolesterol dimana mencit sebagai hewan percobaan. Senada dengan firman Allah swt. dalam QS. Thaha/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Kementrian Agama RI, 2014: 315).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah swt., *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, dan *mmenurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya*. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2009: 604-605)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan hamparan yang luas dengan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat terjadi dengan adanya izin Allah swt. Sebagaimana dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Imam Muslim) (Mahmud, 2007: 13-14).

Al-Nawawi dalam kitabnya *Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim* menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumhur ulama, al-Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran, dan bolehnya berobat. Menurut hujjah para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari ketentuan Allah swt. (Al-Nawawi, 1392: 191).

Al-‘Aini menjelaskan dalam kitab syarahnya bahwa Allah swt tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah menentukan obatnya, yang dimaksud dengan “menurunkan” pada hadits di atas ialah Allah menurunkan penyakit dan obat melalui malaikat secara langsung kepada makhluk sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa banyak orang yang berobat tapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan, maka dijawab bahwa itu karena mereka tidak mengetahui hakikat dari pengobatan itu. Hadits tersebut tidak menunjukkan penyakit secara keseluruhan karena dikecualikan penyakit tua dan mati, dan pada hadits tersebut terdapat penjelasan bolehnya melakukan pengobatan dan ilmu kedokteran (Al-‘Aini, 229).

Jadi, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt. pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt. menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya. Oleh

karena itu, penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah swt. dan apabila penelitian berhasil maka akan mempermudah penyembuhannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium yang menggunakan mencit sebagai hewan percobaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Maakassar.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Biologi untuk melaksanakan proses pengolahan sampel akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill.) sampai didapatkan ekstrak akar *parang romang*. Kemudian peneliti juga menggunakan Laboratorium Farmakologi Farmasi untuk mempersiapkan kandang, hewan coba, pakan serta melaksanakan proses perlakuan dan pengamatan.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendekati ke arah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu tanaman *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang ada di daerah Malino

2. Sampel

Sampel yang digunakan yaitu bagian akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang diambil di daerah Malino.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan antara lain alat pengukur kolestrol (Easy Touch[®] GCU), aluminium foil, batang pengaduk, cawan porselin, gelas kimia (pyrex[®]), gelas ukur 10 dan 100 ml (pyrex[®]), kanula, kandang mencit, lemari pengering, toples, rotary evaporator (Heidolph[®]), Spoit 1 ml (OneMed[®]), sendok tanduk, timbangan analitik (Kern[®]), dan timbangan hewan (Camry[®]).

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan antara lain aquadest, akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill), etanol 96%, hewan uji Mencit (*Mus musculus*), kapas, tissue, telur puyuh, Na-CMC, pakan mencit, dan tablet simvastatin 10 mg.

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan

1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill.) yang diambil di daerah Malino.

2. Pengolahan sampel

Sampel akar *parang romang* yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dikeringkan di lemari pengering. Kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk dan disimpan dalam wadah tertutup rapat.

3. Ekstraksi sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel akar *parang romang* yang telah kering sebanyak 950 g dimasukkan ke dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 8 liter hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etanol 96% yang baru. Proses ekstraksi tetap berlanjut sampai filtrat jernih. Filtrat yang diperoleh kemudian di rotavapor dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol 96% yang kental. Ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

4. Prosedur Uji Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit Jantan

a. Pembuatan suspensi Na-CMC 1%

Serbuk Na-CMC sebanyak 1 gram dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam 100 ml aquadest panas (suhu 70 °C) sambil diaduk dengan pengaduk elektrik hingga terbentuk larutan koloidal.

b. Pembuatan pakan kolesterol

Pakan kolesterol yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dari kuning telur puyuh. Telur puyuh yang telah direbus kemudian dipisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Kemudian kuning telurnya dilumatkan sampai menjadi bubuk dan di oven pada suhu 60 °C selama 24 jam. Lalu kuning telur dicampur homogen dengan pakan mencit.

c. Pembuatan suspensi ekstrak akar *parang romang*

Ditimbang ekstrak etanol akar *parang romang* dengan dosis 3,5 mg/20 g BB kemudian disuspensikan dengan Na-CMC 1% sampai 10 ml dalam labu tentukur,

lalu dikocok sampai homogen. Diulangi perlakuan di atas dengan menggunakan dosis 7 mg/20 g BB dan 14 mg/20 g BB

d. Pembuatan suspensi simvastatin

Suspensi simvastatin dibuat dengan menimbang 53,804 mg lalu ditambahkan larutan suspensi Na-CMC 1% sebanyak 100 ml dan diaduk hingga homogen.

e. Pemilihan dan penyiapan hewan coba

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang sehat dengan bobot badan rata-rata 20-30 gram, digunakan sebanyak 15 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, dimana tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor mencit jantan. Terlebih dahulu diadaptasikan selama 7 hari lalu dipuasakan selama 8 jam sebelum diukur kadar kolestrol awalnya.

f. Perlakuan hewan coba

Sebelum diberi perlakuan, semua hewan uji dipuasakan terlebih dahulu, kemudian diambil darah melalui ekor dan diukur kadar kolestrol darah awal. Kemudian hewan coba diberi pakan kolesterol selama 14 hari berturut-turut, kemudian diukur kenaikan kadar kolestrol, selanjutnya kelompok I, II, III (kelompok dosis ekstrak), kelompok IV (kontrol negatif yang diberi suspensi Na-CMC 1% b/v), kelompok V (kontrol positif yang diberi suspensi simvastatin), kemudian diukur penurunan kadar kolestrol.

- Kelompok 1 : Diberikan ekstrak etanol akar *parang romang* dengan dosis 3,5 mg/20 g BB mencit.
- Kelompok 2 : Diberikan ekstrak etanol akar *parang romang* dengan dosis 7 mg/20 g BB mencit.
- Kelompok 3 : Diberikan ekstrak etanol akar *parang romang* dengan dosis 14 mg/20 g BB mencit.

- Kelompok 4 : Diberikan Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif.
- Kelompok 5 : Diberikan sediaan pembanding yaitu suspensi Simvastatin sebagai kontrol positif.

g. Pengukuran kadar kolesterol darah

Terlebih dahulu alat pengukur kolestrol diaktifkan dengan menekan tombol alat tersebut dan dimasukkan chip ke dalam alat dengan tujuan untuk cek alat tersebut kemudian dimasukkan strip di alat. Darah mencit diambil dari pembuluh darah vena pada ekor mencit. Ekor mencit jantan diusapkan alkohol 70% dengan menggunakan kapas. Ekor mencit jantan dijulurkan dan dipotong sekitar 1 mm dari ujung ekor dengan gunting yang steril. Kemudian darah ditampung dalam strip kolestrol dan kadar kolestrol darah akan terukur secara otomatis dimana hasilnya ditampilkan pada monitor berupa angka. Ekor mencit jantan diusapkan alkohol agar darah tidak mengalir secara terus-menerus.

h. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan sistem statistik Analisis Varian dan dilanjutkan dengan uji Duncan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

Simplisia akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) sebanyak 950 gram diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% dan didapatkan bobot ekstrak sebesar 7,369 gram.

Tabel 5. Hasil Ekstraksi Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

Sampel	Berat Ekstrak	% Rendamen
Akar <i>parang romang</i> 950 gram	7,369 gram	0,77%

2. Hasil Penurunan Kolesterol Mencit Jantan Yang Diberi Ekstrak Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dan Kontrol

Penurunan kolesterol mencit dilakukan dengan memberikan ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dengan dosis 3,5 mg/20 g BB, 7 mg/20 g BB, 14 mg/20 g BB. Untuk kontrol negatif diberikan Na-CMC dan control positif diberikan simvastatin.

Tabel 6. Perubahan Kadar Kolesterol Mencit Jantan Yang Diberi Perlakuan

Dengan Ekstrak Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

Dibandingkan Dengan Kontrol

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran			Penurunan Kadar Setelah Perlakuan (mg/dL)	Presentase penurunan (%)
		K ₀	K ₁	K ₂		
Kelompok I Dosis 3,5 mg/20 g BB	1	130	203	167	36	17,73%
	2	149	243	191	52	21,39%
	3	128	196	165	31	15,81%

	Rata-rata	135,67	214	174,33	39,67	18,31%
Kelompok II Dosis 7 mg/20 g BB	1	131	219	185	34	15,52%
	2	147	234	187	47	20,08%
	3	117	207	167	40	19,32%
	Rata-rata	131,67	220	179,67	40,33	18,31%
Kelompok III Dosis 14 mg/20 g BB	1	114	218	157	61	27,98%
	2	104	189	110	79	41,79%
	3	106	201	157	44	21,89%
	Rata-rata	108	202,67	141,33	61,33	30,55%
Kelompok IV Kontrol (-)	1	123	235	224	11	4,68%
	2	106	197	171	26	13,19%
	3	114	218	217	1	0,45%
	Rata-rata	133	233,67	138	12,67	6,11%
Kelompok V Kontrol (+)	1	146	234	108	126	53,84%
	2	148	241	153	88	36,51%
	3	105	226	153	73	32,30%
	Rata-rata	114,33	216,67	204	95,67	40,88%

Keterangan :

K₀ : Kadar Kolesterol Awal

K₁ : Kadar Kolesterol Setelah Pemberian Kuning Telur

K₂ : Kadar Kolesterol Setelah Terapi

B. Pembahasan

Tujuan penelitian ini yakni mengetahui adanya aktivitas ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virrgata* (Forst.) Guill) sebagai penurun kolesterol pada mencit. Untuk melihat aktivitas ekstrak yang digunakan, maka dilihat perbandingan antara penurunan kolesterol setelah pemberian ekstrak dengan penurunan kolesterol setelah pemberian kontrol positif (obat) dan kontrol negatif (Na-CMC).

Pada penelitian ini, digunakan sampel akar *parang romang* (*Boehmeria virrgata* (Forst.) Guill). Sampel ini diambil di daerah Malino, Sulawesi Selatan. Akar

parang romang terlebih dahulu dicuci dengan air bersih dan mengalir. Pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di permukaan sampel. Setelah proses pencucian, sampel ditiriskan dan diiris tipis-tipis kemudian diangin-anginkan dan dikeringkan di dalam lemari pengering. Salah satu tujuan pengeringan yaitu untuk mengurangi kadar air dalam sampel, karena kadar air yang tinggi dapat membuat simplisia cepat rusak dan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada simplisia. Setelah itu dilakukan penggilingan sampel untuk memperluas permukaan simplisia sehingga cairan penyari dapat menarik komponen kimia dengan cepat.

Sampel yang telah kering selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan cara merendam sampel sebanyak 950 g dalam cairan penyari etanol 96%. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dengan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar . Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi dan dilakukan selama 3x24 jam. Filtrat yang dihasilkan dibebasetanolkan agar ekstrak menjadi pekat dan kental. Kemudian ekstrak ditimbang dan diperoleh bobot ekstrak sebesar 7,369 gram. Selanjutnya ekstrak kental disimpan dalam eksikator yang berisi silika gel yang telah aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Pada penelitian ini digunakan mencit jantan sebagai hewan coba karena memiliki kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina. Selain itu, mencit mudah untuk diperoleh, mudah ditangani dan lebih ekonomis. Mencit yang digunakan memiliki bobot rata-rata 20-30 gram yang dibagi dalam 5 kelompok dan terdapat 3 mencit dalam setiap

kelompok. Mencit yang akan digunakan terlebih dahulu diaklimatisasi selama 1 minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi laboratorium.

Dalam penelitian ini juga digunakan tablet Simvastatin sebagai pembanding karena obat ini sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL. Simvastatin termasuk dalam obat golongan statin yang merupakan terapi lini pertama yang sering digunakan pada terapi hiperlipidemia. Obat ini juga merupakan obat utama pada pencegahan primer dan sekunder dari penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Pembanding atau kontrol positif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar kolesterol darah pada hewan uji. Selain itu, simvastatin ini mudah dijangkau dan murah.

Sebelum diberikan perlakuan kepada hewan uji, terlebih dahulu masing-masing kelompok diberikan kuning telur untuk menaikkan kadar kolesterol hewan uji. Sebelum pemberian kuning telur, terlebih dahulu diukur kadar kolesterol mencit dengan alat pengukur kolesterol, untuk mengetahui kadar kolesterol hewan uji sebelum diberikan kuning telur. Pemberian kuning telur dipilih karena kuning telur memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibanding bahan hewani lainnya (Tubagus, 2015). Selain itu, kuning telur juga mudah diperoleh dan diolah. Dalam penelitian ini, kuning telur dicampur dengan pakan mencit yang diberikan secara terus-menerus. Suatu pakan yang mengandung kuning telur 2,02 gram sudah dapat menaikkan kadar kolesterol pada mencit (Erni, 2014). Konsumsi makan permencit pun terbilang tinggi yakni 6-7 gram/hari (Vanderlip, 2011). Oleh karena itu, diberikan pakan mencit dengan kandungan kuning telur melebihi 2,02 gram yang dapat menaikkan kadar kolesterol. Selain itu, kuning telur yang dicampur dengan pakan lebih mudah diberikan kepada mencit.

Pada pengujian aktivitas penurun kolesterol, untuk kelompok I, II, III diberikan ekstrak etanol akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dengan varian dosis untuk masing-masing kelompok perlakuan yaitu 3,5 mg/20 g BB, 7 mg/20 g BB dan 14 mg/20 g BB. Kelompok IV sebagai kontrol negatif diberikan suspensi Na-CMC 1% sesuai dengan berat badan mencit, dan kelompok V sebagai pembanding diberikan tablet simvastatin dengan dosis yang telah dikonversi dari dosis manusia ke dosis mencit.

Berdasarkan pengujian aktivitas ekstrak akar *parang romang* sebagai penurun kolesterol, pada tabel 6. Diperoleh hasil rata-rata penurunan untuk kelompok I dengan dosis 3,5 mg/20 g BB yaitu 39,67 (mg/dL), kelompok II dengan dosis 7 mg/20 g BB yaitu 40,33 (mg/dL), kelompok III dengan dosis 14 mg/20 g BB yaitu 61,33 (mg/dL), kelompok IV sebagai kontrol negatif (Na-CMC) yaitu 12,67 (mg/dL), dan untuk kelompok V sebagai kontrol positif (Simvastatin) yaitu 95,67 (mg/dL).

Pada tabel 6. Dari data yang diperoleh kemudian dihitung % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara kolesterol akhir setelah perlakuan dengan kolesterol setelah diinduksi kuning telur kemudian dibagi dengan kadar kolesterol setelah induksi kuning telur dan dikali dengan 100% berdasarkan data yang diperoleh. Untuk ekstrak etanol akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dengan dosis 3,5 mg/20 g BB diperoleh persentase 18,31%. Dari dosis 7 mg/20 g BB diperoleh persentase penurunan 18,31%. Dari dosis 14 mg/20 g BB diperoleh persentase penurunan 30,55%. Untuk kontrol negatif diperoleh persentase penurunan 6,11%. Untuk Simvastatin sebagai kontrol positif diperoleh persentase penurunan 40,88%. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang paling tinggi presentase penurunannya yaitu dosis 14 mg/20 g BB.

Pada tabel 9. Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan perhitungan Analisis varian dan didapatkan nilai F Hitung perlakuan (11, 007) > F tabel pada taraf kepercayaan 5% (3,84) dan 1% (7,01). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan dari masing-masing perlakuan. Dan nilai F Hitung Ulangan (2,036) < F tabel pada taraf kepercayaan 5% (4,46) dan 1% (8,65). Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari masing-masing ulangan. Dari hasil analisis statistika, juga diperoleh koefisien keseragaman (KK) sebesar 30,38% sehingga dengan nilai KK sebesar ini maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Sebab jika koefisien keseragaman > 10%, uji lanjutan yang sebaiknya digunakan adalah uji wilayah ganda Duncan.

Pada tabel 10. Dari uji lanjutan Duncan, didapatkan kelompok ekstrak akar *parang romang* 3,5 mg/20 g BB tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif Na-CMC. Kelompok ekstrak akar *parang romang* 7 mg/20 g BB juga tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif Na-CMC. Kelompok ekstrak akar *parang romang* 14 mg/20 g BB berbeda sangat nyata dengan kontrol negatif Na-CMC dan untuk kelompok kontrol positif Simvastatin berbeda sangat nyata dengan kontrol negatif Na-CMC. Kelompok ekstrak akar *parang romang* 3,5 mg/20 g BB tidak berbeda nyata dengan kelompok ekstrak akar *parang romang* 14 mg/20 g BB. Kelompok ekstrak akar *parang romang* 7 mg/20 g BB tidak berbeda nyata dengan kelompok ekstrak akar *parang romang* 14 mg/20 g BB.

Hasil pengujian tersebut memberikan informasi bahwa ekstrak etanol akar *parang romang* dapat menurunkan kadar kolesterol dan dosis ekstrak akar *parang romang* 14 mg/20 g BB menunjukkan aktivitas terbaik dalam penurunan kolesterol pada mencit.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan-Nya. Seperti pada hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai obat yaitu tanaman akar *parang romang* yang dapat dijadikan sebagai obat penurun kolesterol.

Penelitian ini seolah menjawab Firman Allah swt. dalam QS. Al-Qhashas/28:

57

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطْفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمْكِن لَهُمْ حَرَمًا
ءَامِنًا تَجِبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan mereka berkata : “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. “Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (Tanah Suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami ?. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2014: 552)

Ayat di atas menyatakan bahwa sebagian di antara kaum musyrikin itu ada yang mengatakan : “ Mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu dan ada juga diantara mereka yang berkata: “Jika kami mengikuti secara sungguh-sungguh petunjuk itu, yakni agama Islam, dengan mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan yang disembah leluhur kami serta bergabung bersamamu, wahai Nabi Muhammad, yang ajaranmu sangat berbeda dengan kepercayaan masyarakat Arab, niscaya kami akan diculik, yakni ditawan dan diusir oleh orang-orang Arab itu, dari negeri kami, yakni Mekkah. Harta dan kekuasaan kami akan dirampas. Bahkan, boleh jadi kami dibunuh karena

mayoritas masyarakat menentang ajaranmu, sedang kami adalah kaum lemah yang tidak mampu melawan mereka (Shihab. 2009: 628).

Mereka semua tahu wahai Nabi Muhammad saw. Bahwa Kami melindungimu bersama pengikut-pengikutmu walau engkau membawa ajaran yang berbeda dengan masyarakat Arab itu ? dan, disisi lain, bagaimana mereka berucap demikian padahal tidakkah Kami meneguhkan buat mereka dengan peneguhan yang demikian mantap, yaitu menjadikan wilayah tempat tinggal mereka sebagai Haram, yakni tanah suci mekkah yang aman dari penganiayaan dan pembunuhan, bahkan lebih dari itu, terus-menerus dan senantiasa sepanjang waktu dihimpun, yakni didatangkan, ke sana secara khusus buah-buahan dari segala sesuatu, yakni segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rezeki dari sisi Kami untuk semua yang tinggal disana kendati mereka kafir ? Jika demikian, bagaimana mungkin Allah mencabut rasa aman dari mereka dan menjadikan mereka terculik dan terbunuh apabila mereka beriman dan memeluk ajaran-Nya yang mereka sadari bahwa ajaran itu baik dan benar ? Sungguh, dalih mereka itu tidak logis dan apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Shihab.2009: 628-629).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi mahluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan.

Pengetahuan yang akan menuntut manusia untuk menemukan obat-obat yang tersedia di alam, seperti obat dari tanaman. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu

pengetahuan, maka tidak akan pernah tahu adanya obat yang berasal dari tanaman yang biasanya dihiraukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki aktivitas sebagai penurun kolesterol pada mencit (*Mus musculus*)
2. Ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) dosis 14 mg/20 g BB menunjukkan aktivitas terbaik dalam penurunan kolesterol pada mencit (*Mus musculus*)
3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin, termasuk akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang dapat digunakan sebagai obat penurun kolesterol.

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada ekstrak akar *parang romang* untuk mengetahui kandungan senyawa yang berperan dalam menurunkan kadar kolesterol.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pakan kolesterol tinggi yang berbeda.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an.

Almatsier. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama. 2001

Al-‘ Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain Badaruddin. *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th.

Arsana. *Panduan Pengelolaan Dislipidemia*. Jakarta: PB.PERKENI. 2015

Brands, S.J. *Systema Naturae 2000 The Taxonomicon Universal Taxonomic Services*. The Netherland: Acsyroed. 2007.

Chen et al. *Flora Of China. Boehmeria*. 2003

Dachriyanus. *Uji Efek A-Mangostin terhadap Kadar Kolesterol Total Mencit*. 2007. *Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi, Vol. 12, No.2*

Dalimartha. *36 Resep Tumbuhan Obat*. Depok. Penebar swadaya. 2008

Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Ed. IV*. Jakarta. Departemen kesehatan RI. 1995

Erinda. *Efek Minyak Atsiri Dari Baeang Putih Terhadap Kadar Albumin Plasma Pada Tikus Yang Diberi Diet Kuning Telur*. Skripsi. Semarang. 2009

Erni. *Pengaruh Pemberian Minyak Mandar Yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun Terhadap Kadar Kolesterol Mencit*. Jurnal Bionature Vol. 15 No. 2. Makassar: FMIPA UNM. 2014

Fatmawati. *Pengaruh Lama Pemberian Ekstrak Daun Sambiloto (Andrographis paniculata) Terhadap Kadar Kolesterol HDL dan Trigliserida Darah Tikus Diabetes*. Skripsi. Malang Fakultas Sains dan teknologi. 2008

Ganiswarna. *Farmakologi dan terapi Ed. 5*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI. 2009

Guyton, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC. 2008

Hanani. *Analisis Fitokimia*. Jakarta: EGC. 2015

Hardiningsih, *Pengaruh Pemberian Pakan Hiperkolesterolemia Terhadap Bobot Badan Tikus Putih Wistar* ISSN Vol. 7 No. 2. Bogor: LIPI. 2006

Hariyani. *Studi Variasi Anatomi Dan Kandungan Flavonoid Lima Spesies Anggota Genus Phyllanthus*. ISSN Vol.1, No.1, hal 1 – 14, September. Biosain Pascasarjana UNS. 2013

Hernawati. *Perbaikan Parameter Lipid Darah Mencit Hiperkolesterolemia dengan Suplemen Bekatul MKB* Vol. 45 No. 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2013

- Katzung. *Farmakologi Dasar Dan Klinik, Buku 2 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Medica. 2002
- Kumalasari. *Pengaruh Berbagai Dosis Filtrate Daun Putri Malu Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Tikus*. Skripsi. Malang: Pendidikan Biologi juran MIPA FKIP UMM. 2005
- Kemenkes RI. *Situasi Kesehatan Jantung*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014
- Kemenkes RI. *Diet Rendah Lemak dan Kolesterol*. Jakarta: Direktorat Bina Gizi. 2011
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Abyan. 2014
- Lim. *Farmakologi Kardiovaskuler*. Jakarta: PT. Sofmedia. 2009
- Lukman et al. *Cytotoxic effect of four Makassarese medicinal plants on human cervical cell lines and its selectivity*. Makassar. 2014
- Lukman et al. *Anti proliferation activity of Nanoencapsulated bioadhesive vaginal gel of isolated active Compound (BVI03) from Boehmeria virgata (Forst) guill leaves against human cancer cervix Hela cells*. Makassar. 2015
- Mahmud. *Mukjizat Kedokteran Nabi*. Jakarta: Qultummedia. 2007
- Manggau et al. *Effect of an Isolated Active Compound (BVI03) of Boehmeria virgata (Forst) Guill leaves on Anti-Proliferation in Human Cancer Cervix HeLa Cells through Activation of Caspase 3 and p53 Protein*. Makassar: UNHAS. 2013
- Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, A. S., et al. *Heart Disease and Stroke Statistic 2016 Update. Circulation, 2016;133:e38-e360*. 2016
- Murray. *Biokimia Harper. Ed. 27*. Jakarta: EGC. 2009
- Al- Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim al-Hajjaj*, Jus 14. Cet. II; Beirut: Dar Ihya al Turats al-'Arabi,1392
- Pribadi. *Penggunaan Mencit dan Tikus Sebagai Hewan Model Penelitian Nikotin*. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Peternakan Bogor. 2008
- Rahim. *Farmakognosi I*. Makassar: UINAM Press. 2007
- Rahman. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Bina Aksara. 2007


- Rahmawati et al. *Kandungan fitoestrogen ekstrak etanolik akar rami (Boehmeria nivea) menurunkan kadar kolesterol tikus yang diovariektomi*. Jember: FK Universitas Jember. 2016
- Rusdi. *Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Akar Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap Larva Udang Artemia salina Leach*. Makassar. 2014
- Sancheti et al. *Evaluation Of Antidiabetic, Antihyperlipidemic And Antioxidant Effects Of Boehmeria Nivea Root Extract In Streptozotocin-Induced Diabetic Rats*. Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy 21(1): 146-154, Jan./Feb. 2011
- Septiningsih. *Efek Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Etanol 70% Daun Papaya Dalam Sediaan Gel Pada Kulit Punggung Kelinci*. Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008
- Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati: 2009
- Soeharto. *Serangan Jantung dan Stroke, Hubungannya dengan Lemak dan Kolesterol*. Jakarta: PT. Gramedia. 2004
- Sudewo. *Tanaman Obat Populer Penggempur Aneka Penyakit*. Tangerang: Agromedia Pustaka. 2004
- Sudoyo. *Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta. FK Universitas Indonesia. 2006
- As-Suyuthi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004
- Stapleton. *Hypercholesterolemia and Microvaskular Dysfunction: Interventional Strategies*. Journal of Inflammation. 2010
- Tanu. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: FK UI. 2012
- Tirtawinata. *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Ilmu Gizi*. Jakarta: Balai penerbit FKUI. 2006
- Tjay Rahardja. *Obat- Obat Penting*. Jakarta: Gramedia: 2007
- Tubagus. *Kadar Kolesterol Plasma Tikus Wistar Pada Pemberian Ekstrak Etanol dan Heksan dari Daun Gedi Merah*. Manado: Unsrat. 2015
- Ulfah Fitriasari. *Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe Terhadap Penurunan Kadar Kolestrol Pada Mencit*. Skripsi. Makassar. UINAM. 2015
- Utariningsih. *Dekok Rambut Jagung Efektif Dalam Menurunkan Kolesterol Tikus Putih*. Malang: UMM. 2007


- Vanderlip, Sharon Lyn. *Mice: A Complete Pet Owner's Manual*. Barron's China: Educational Series Inc. 2011
- Voight. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1995
- Waluyo, E. *Hasil Identifikasi/Determinasi Tumbuhan*. Bogor: Pusat Penelitian. 2005.
- Wardiah. *Efek Bawang Putih Dan Cabe Jawa Terhadap Jumlah Limfosit Pada Tikus Yang Diberi Suplemen Kuning Telur*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 2009
- Wardihan et al. Selective Cytotoxicity Evaluation in Anticancer Drug Screening of *Boehmeria virgata* (Forst) Guill Leaves to Several Human Cell Lines: HeLa, WiDr, T47D and Vero. Makassar. 2013
- Wilson, E.D, K.H. Fisher dan P.A. Garcia. *Principles of Nutrient*. London: Othio University. 1979



Lampiran 1. Skema Kerja

A. Proses Ekstraksi Sampel



B. Perlakuan terhadap hewan coba

Lampiran 2. Perhitungan dosis

A. Konversi dosis simvastatin dari manusia ke mencit

1. Dosis lazim untuk manusia = 10 mg
2. Faktor konversi untuk mencit (20 g mencit) = 0,0026
3. Dosis untuk mencit 20 g = 10 mg x 0,0026 = 0,026 mg

B. Volume Pemberian Simvastatin

1. Volume pemberian = 1 ml untuk bobot 30 g BB mencit
(Volume dan BB maksimum)
2. Dosis untuk mencit 30 g = $\frac{30}{20} \times 0,026 \text{ mg} = 0,039 \text{ mg}$
3. Jumlah simvastatin yang dibuat untuk 100 ml = $0,039 \text{ mg} \times 100 \text{ ml} = 3,9 \text{ mg} \approx 4 \text{ mg}$

C. Perhitungan Simvastatin yang setara 4 mg

1. Berat rata-rata tablet = 134,51 mg
2. Berat yang ditimbang = $\frac{4 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 134,51 \text{ mg}$
= 53,804 mg
= 0,0538 g

Jadi, untuk mendapatkan simvastatin 4 mg, ditimbang bobot tablet sebanyak 53,804 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan Na-CMC

D. Perhitungan dosis dan konversi ekstrak akar *parang romang*

1. Dosis akar rami pada tikus = 125 mg/kg BB
= 125 mg/1000 g BB
= 25 mg/200 g BB
2. Factor konversi untuk mencit (20 g mencit) = 0,14
3. Dosis untuk mencit 20 g = 25 x 0,14
= 3,5 mg/20 g BB
4. Dosis untuk mencit 30 g = $\frac{30}{20}$ x 3,5 mg/20 g BB
= 5,25 mg/20 g BB

E. Pembuatan suspensi ekstrak akar *parang romang* 3,5 mg/20 g BB

$$\text{BB mencit} = 30 \text{ g}$$

$$\text{Dosis untuk 30 g} = \frac{30}{20} \times 3,5 \text{ mg/20 g BB}$$

$$= 5,25 \text{ mg/30 g BB}$$

$$\text{Volume maksimal pemakaian peroral BB 30} = 1 \text{ ml}$$

Jadi, 5,25 mg dalam 1 ml

Dibuat 10 ml = 10 x 5,25 mg = 52,5 mg ditimbang ekstrak etanol akar *parang romang*.

Ditimbang 52,5 mg ekstrak etanol akar *parang romang* dan disuspensikan dengan Na-CMC 1% dalam labu tentukur sampai 10 ml.

F. Perhitungan volume pemberian untuk ekstrak etanol akar *parang romang*

Diketahui:

$$\text{BB} = 20 \text{ g}$$

$$\text{BB} = 25 \text{ g}$$

$$\text{BB standar} = 30 \text{ g}$$

Volume pemberian maksimal mencit = 1 ml

- Volume pemberian mencit ke 1 (BB = 20 g)

$$= \frac{\text{BB mencit}}{\text{BB standar mencit}} \times \text{vol. pemberian mencit}$$

$$= \frac{20}{30} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 0,6 \text{ ml}$$

- Volume pemberian mencit ke 2 (BB = 25 g)

$$= \frac{\text{BB mencit}}{\text{BB standar mencit}} \times \text{vol. pemberian mencit}$$

$$= \frac{25}{30} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 0,83 \text{ ml}$$

- Volume pemberian mencit ke 3 (BB = 30 g)

$$= \frac{\text{BB mencit}}{\text{BB standar mencit}} \times \text{vol. pemberian mencit}$$

$$= \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ ml}$$

Lampiran 3. % penurunan kolesterol

Rumus :

$$\% \text{ penurunan} = \frac{\text{Penurunan kadar setelah perlakuan}}{\text{Kolesterol Setelah Induksi}} \times 100\%$$

Ekstrak 3,5 mg/20 g BB :

- Replikasi 1 : $\frac{36}{203} \times 100\% = 17,73\%$
- Replikasi 2 : $\frac{52}{243} \times 100\% = 21,39\%$
- Replikasi 3 : $\frac{31}{196} \times 100\% = 15,81\%$

Ekstrak 7 mg/20 g BB :

- Replikasi 1 : $\frac{34}{219} \times 100\% = 15,52\%$
- Replikasi 2 : $\frac{47}{234} \times 100\% = 20,08\%$
- Replikasi 3 : $\frac{40}{207} \times 100\% = 19,32\%$

Ekstrak 14 mg/20 g BB :

- Replikasi 1 : $\frac{61}{218} \times 100\% = 27,98\%$
- Replikasi 2 : $\frac{79}{189} \times 100\% = 41,79\%$
- Replikasi 3 : $\frac{44}{201} \times 100\% = 21,89\%$

Kontrol Negatif (Na-CMC) :

- Replikasi 1 : $\frac{11}{235} \times 100\% = 4,68\%$
- Replikasi 2 : $\frac{26}{197} \times 100\% = 13,19\%$
- Replikasi 3 : $\frac{1}{218} \times 100\% = 0,45\%$

Kontrol Positif (Simvastatin) :

- Replikasi 1 : $\frac{126}{234} \times 100\% = 53,84\%$
- Replikasi 2 : $\frac{88}{241} \times 100\% = 36,51\%$
- Replikasi 3 : $\frac{73}{226} \times 100\% = 32,30\%$



Lampiran 4. Analisis Data

Tabel 7. Hasil pengukuran kolesterol mencit (*Mus musculus*)

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran			Penurunan Kadar Setelah Perlakuan (mg/dL)	Presentase penurunan (%)
		K ₀	K ₁	K ₂		
Kelompok I Dosis 3,5 mg/20 g BB	1	130	203	167	36	17,73%
	2	149	243	191	52	21,39%
	3	128	196	165	31	15,81%
	Rata-rata	135,67	214	174,33	39,67	18,31%
Kelompok II Dosis 7 mg/20 g BB	1	131	219	185	34	15,52%
	2	147	234	187	47	20,08%
	3	117	207	167	40	19,32%
	Rata-rata	131,67	220	179,67	40,33	18,31%
Kelompok III Dosis 14 mg/20 g BB	1	114	218	157	61	27,98%
	2	104	189	110	79	41,79%
	3	106	201	157	44	21,89%
	Rata-rata	108	202,67	141,33	61,33	30,55%
Kelompok IV Kontrol (-)	1	123	235	224	11	4,68%
	2	106	197	171	26	13,19%
	3	114	218	217	1	0,45%
	Rata-rata	133	233,67	138	12,67	6,11%
Kelompok V Kontrol (+)	1	146	234	108	126	53,84%
	2	148	241	153	88	36,51%
	3	105	226	153	73	32,30%
	Rata-rata	114,33	216,67	204	95,67	40,88%

Keterangan :

K₀ : Kadar Kolesterol Awal

K₁ : Kadar Kolesterol Setelah Pemberian Kuning Telur

K₂ : Kadar Kolesterol Setelah Terapi

Tabel 8. Analisis statistik aktivitas penurunan kolesterol ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) terhadap mencit (*Mus musculus*)

Kelompok	Replikasi (%)			Total	Rata-rata
	1	2	3		
Ekstrak 3.5 mg/20 g BB	17.73	21.39	15.81	54.93	18.31
Ekstrak 7 mg/20 g BB	15.52	20.08	19.32	54.92	18.31
Ekstrak 14 mg/20 g BB	27.98	41.79	21.89	91.66	30.55
Na-CMC	4.68	13.19	0.45	18.32	6.11
Simvastatin	53.84	36.51	32.30	122.65	40.88
Total	119.75	132.96	89.77	342.48	
Rata-rata	23.95	26.59	17.95		22.83

Perhitungan Anava

a. Faktor Koreksi (FK)

$$= \frac{\sum Y_{ij}^2}{r \times t}$$

$$= \frac{(342,48)^2}{15}$$

$$= 7819,50$$

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT)

$$= \sum (Y_{ij})^2 - FK$$

$$= (17,73^2 + 21,39^2 + \dots + 32,30^2) - 7819,50$$

$$= 10518,69 - 7819,50$$

$$= 2699,19$$

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)

$$= \frac{\sum T_{ij}^2}{r} - FK$$

$$= \frac{(54,93)^2 + \dots + (122,65)^2}{3} - 7819,50$$

$$= 9937,89 - 7819,50$$

$$= 2118,39$$

d. Jumlah Kuadrat Ulangan

$$= \frac{\sum T_{ij}^2}{r} - FK$$

$$= \frac{(199,75)^2 + (132,96)^2 + (89,77)^2}{5} - 7819,50$$

$$\begin{aligned}
 &= 8015,414 - 7819,50 \\
 &= 195,914 \\
 \text{e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKU} \\
 &= 2699,19 - 2118,39 - 195,914 \\
 &= 384,886 \\
 \\
 \text{f. Derajat Bebas Total} &= r \times t - 1 \\
 &= (3 \times 5) - 1 \\
 &= 14 \\
 \\
 \text{g. Derajat Bebas Perlakuan} &= t - 1 \\
 &= 5 - 1 \\
 &= 4 \\
 \\
 \text{h. Derajat Bebas Ulangan} &= r - 1 \\
 &= 3 - 1 \\
 &= 2 \\
 \\
 \text{i. Derajat Bebas Galat} &= \text{Db Total} - \text{Db Perlakuan} - \text{Db Ulangan} \\
 &= 14 - 4 - 2 \\
 &= 8 \\
 \\
 \text{j. Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\
 &= \frac{2118,39}{4} \\
 &= 529,59 \\
 \\
 \text{k. Kuadrat Tengah Ulangan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Ulangan}}{\text{Derajat Bebas Ulangan}} \\
 &= \frac{195,914}{2} \\
 &= 97,957
 \end{aligned}$$

$$l. \text{ Kuadrat Tengah Galat} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{384,886}{8}$$

$$= 48,110$$

$$m. \text{ Koefisien Keseragaman (KK)} = \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{\text{rata-rata total}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{48,110}}{22,83} \times 100\%$$

$$= 30,38\%$$

$$n. \text{ F Hitung Perlakuan} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{529,59}{48,110}$$

$$= 11,007$$

$$o. \text{ F Hitung Ulangan} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Ulangan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{97,957}{48,110}$$

$$= 2,036$$

Tabel 9. Analisis variasi aktivitas penurunan kolesterol ekstrak akar *parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) terhadap mencit (*Mus musculus*)

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	2118,39	529,59	11,007**	3,84	7,01
Ulangan	2	195,914	97,957	2,036 ns	4,46	8,65
Galat	8	384,886	48,110			
Total	14	2699,19	675,657			

Keterangan :

** : Sangat signifikan (F hitung > F 1%)

* : Signifikan

Ns : Non signifikan

F hitung > F Tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1%, artinya ada perbedaan sangat nyata dengan yang lainnya (sangat signifikan)

Analisis Uji Duncan

a. Nilai $S\hat{y}$

$$S\hat{y} = \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

$$= \sqrt{\frac{48,110}{3}}$$

$$= 4,004$$

Tabel 10. Analisis Uji Duncan

Perlakuan	Rata-rata	Beda real pada jarak P			
		2	3	4	5
Na-CMC	6,11	-	-	-	-
Ekstrak 3,5 mg/20 g BB	18,31	12,2 ns	-	-	-
Ekstrak 7 mg/20 g BB	18,31	12,2 ns	-	-	-
Ekstrak 14 mg/20 g BB	30,55	24,44 **	12,24 ns	12,24 ns	-
Simvastatin	40,88	34,77 **	22,57 **	22,57 **	10,33
$P_{0,05} (P, 10)$		3,15	3,29	3,38	3,43
$P_{0,01} (P, 10)$		4,48	4,67	4,79	4,87
$Rp_{0,05} (P, 10) = (P \cdot S\hat{y})$		12,61	13,17	13,53	13,73
$Rp_{0,01} (P, 10)$		17,94	18,69	19,18	19,49


Ket : ** : sangat signifikan

* : signifikan

ns: non signifikan

Lampiran 5. Gambar

Gambar 1. Tanaman *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)



Gambar 2. Akar *Parang romang* (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)



Gambar 3. Proses Pengambilan Darah Mencit



Gambar 4. Proses Pengukuran Kolesterol Darah Mencit



Gambar . Alat Pengukur Kolesterol

BIOGRAFI PENULIS



Andi Tenri Paramitha adalah seorang mahasiswi asli Bone yang lahir di Mare-Bone, 5 Januari 1996. Teman – teman biasa memanggilnya Mitha. Ia lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Mitha adalah anak kedua dari pasangan Drs. Andi Jamaluddin dan Andi Saidah.A, S.Pd. Mitha adalah putri kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya bernama Andi Tenri Padah. Dan adiknya bernama Andi Tenri Mifta Khaira.

Pada umur 3 tahun, Mitha sudah memulai studinya di TK Mario Pulana. Kemudian, melanjutkan studinya di SD No.241 Kadai selama 6 tahun dan pada tahun 2007 – 2010 Mitha melanjutkan studinya di SMPN 1 Mare. Setelah lulus SMP, Mitha melanjutkan studinya di SMAN 1 Mare dan lulus pada tahun 2013. Setelah kelulusannya, Mitha mulai berfikir akan melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi Negeri dan dari beberapa jurusan yang dipilih Mitha, Farmasi adalah jurusan yang menjadikan Mitha sebagai seorang mahasiswi. Mahasiswi di kampus UIN Alauddin Makassar. Sekarang ini, Mitha sudah berada di semester 8 dimana langkahnya tinggal sedikit lagi untuk meraih gelar S.Farm nya.

ALAUDDIN
M A K A S S A R