

**UJI EFEK MINYAK KUDA (*Equus caballus*) TERHADAP PENYEMBUHAN
LUKA SAYATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi
pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

ISTIQAMAH
NIM. 70100112103

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**UJI EFEK MINYAK KUDA (*Equus caballus*) TERHADAP PENYEMBUHAN
LUKA SAYATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi
pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

ISTIQAMAH
NIM. 70100112103

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISTIQAMAH**
NIM : **70100112103**
Tempat/Tgl. Lahir : **Pangkep, 21 April 1994**
Jur/Prodi/Konsentrasi : **Farmasi**
Alamat : **Manuruki 2 lr.2b**
Judul : **Uji Efek Minyak Kuda (*Equus caballus*)
Terhadap Penyembuhan Luka Sayatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Maret 2017

Penyusun,

ISTIQAMAH
NIM. 70100112103

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Minyak Kuda (*Equus caballus*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayatan” yang disusun oleh Istiqamah, NIM: 70100112103, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 29 Maret 2017 M yang bertepatan 29 Rajab 1438 H dengan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 29 Maret 2017 M

29 Rajab 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc Apt	(.....)
Penguji I	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. H Dudung Abdullah, M.Ag.	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada-Nya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salam dan shalawat senantiasa kita haturkan pada junjungan nabi besar Muhammad saw., keluarga, dan sahabat beliau yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Semoga kita semua menjadi umatnya yang taat.

Skripsi dengan judul “*Uji Efek Minyak Kuda (Equus caballus) Terhadap Penyembuhan Luka Sayatan*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari betapa banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, motivasi, dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Mekka Zainuddin dan Ibunda Subaedah dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik

berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku kakanda St. Rahma S.Pd, kakanda Abd. Rahman S.Pd., M.Pd, kakanda Wahidatul Qubra S.Pd dan adinda Fatimah Azzahrah yang senantiasa memberikan restu, doa dan motivasinya.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Haeria, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc Apt. Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

8. Dr. H. Dudung Abdullah, M.Ag. Penguji Agama yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Surya Ningsi, S.Si, M.Si, Apt. Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan selama menempuh pendidikan S1 Farmasi.
10. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 Farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 (ISOHYDRIS) terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasi kalian terkhususnya kepada Yuschaidir Setiawan, S.Farm, Novi Pramudhita, Fauziah Nugrahwati, Miftah Ulfah Shaleh.
13. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang farmasi pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Samata-Gowa, Maret 2017
Penyusun,

ISTIQAMAH
NIM. 70100112103

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kegunaan penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Sampel	7
B. Anatomi Kulit	9
C. Luka	15
D. Lemak dan Minyak	26
E. Uraian Hewan Coba	28
F. Tinjauan Islam	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Instrumen Penelitian	34
E. Teknik Pengolahan Sampel.....	35
F. Pengujian Efek Penyembuhan Luka.....	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

KEPUSTAKAAN	47
-------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi Kelinci	28
2. Karakteristik Kelinci	29
3. Efek Penyembuhan Luka Sayat	39
4. Skema Kerja Pembuatan Minyak Kuda.....	48
5. Skema Pengujian Hewan Coba.....	49
6. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat	50
7. Persentase Perubahan Panjang Luka Sayat	51
8. Grafik Persentase Perubahan Panjang Luka Sayat.....	52
9. Efek Penyembuhan Luka Sayat	53
10. Perhitungan Rancangan Acak Lengkap	54
11. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
12. Anatomi kulit.....	9
13. Anatomi Lapisan Epidermis.....	10
14. Anatomi lapisan hypodermis.....	12
15. Penimbangan Lemak	57
16. Merefluks Sampel	57
17. Penguapan hasil Refluks	57
18. Pencukuran Bulu Kelinci	58
19. Penyayatan Luka	58
20. Pengukuran Luka	58
21. Pemberian Obat pada Luka Kelinci	58
22. Saat terbentuknya karopeng.....	59
23. Kontrol Sembuh Kelinci	59

ABSTRAK

Nama Penyusun : Istiqamah
NIM : 70100112103
Judul Skripsi : Uji Efek Minyak Kuda (*Equus caballus*) Terhadap
Penyembuhan Luka Sayatan

Telah dilakukan penelitian dengan uji efek minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Penelitian ini menggunakan sampel lemak kuda (*Equus caballus*) yang diekstraksi dengan menggunakan metode refluks. Uji efektivitas pada luka sayat dilakukan dengan menyayat punggung kelinci sepanjang 3 cm. Minyak kuda dibuat dengan 3 variasi konsentrasi yaitu minyak kuda murni, minyak kuda 10% dan 20%. Sedangkan untuk kontrol positif digunakan Bioplacenton dan kontrol negatif digunakan paraffin liquid. Pengamatan luka dilakukan setiap hari selama 18 hari dan dianalisis dengan statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak kuda memiliki efek terhadap penyembuhan luka. Berdasarkan Uji ANOVA minyak kuda menunjukkan hasil yang signifikan ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan hasil yang paling bagus ditunjukkan pada sampel minyak kuda murni.

Kata kunci: Lemak Kuda (*Equus caballus*), Minyak Kuda (*Equus caballus*), Efektivitas, Penyembuhan Luka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luka merupakan keadaan hilang atau terputusnya kontinuitas jaringan (Arif Mansjoer, 2000). Luka merupakan hal yang sering dialami oleh seseorang. Luka bisa terjadi ketika seseorang sedang melakukan kegiatan sehari – hari atau ketika sedang bermain. Luka tergores karena benda tajam atau terjatuh adalah luka yang paling sering dialami. Saat melakukan kegiatan sehari-hari, seseorang bisa mendapatkan luka. Luka yang sering didapatkan adalah yang mengenai jaringan kulit, misalnya ekskoriasi (lecet), ataupun skisum (luka iris). Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk menyembuhkan luka, misalnya dengan mencuci luka, hingga memberi obat antiseptik seperti *povidone iodine* atau yang lebih dikenal sebagai betadin.


Pelayanan kesehatan terutama yang menggunakan obat-obat sintesis menjadi sangat mahal serta dapat memberikan efek samping yang membahayakan dan menimbulkan alergi, sehingga masyarakat berusaha mencari solusi kembali pada tradisi nenek moyang dengan menggunakan obat-obat alami. Keuntungan penggunaan obat-obat alami adalah mengurangi efek alergi dan efek samping (Widowati, dkk. 2007).

Umumnya, masyarakat sebelum mengenal gel penutup luka dan cairan antiseptik dengan berbagai merek beredar dipasaran, secara tradisional sejumlah tanaman dan hewan telah digunakan untuk mencegah peradangan dan menyembuhkan luka. Salah satu yang digunakan oleh masyarakat khususnya didaerah Jeneponto adalah minyak kuda. Mereka mempercayai jika menggunakan minyak kuda maka dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Ini adalah sebuah bukti

akan keabsahan kekuasaan Allah swt dan tiada keraguan dalam sabdaNya yaitu seperti dalam Al-Quranul karim *tidak ada sesuatu yang diciptakan di semesta raya ini secara sia-sia* (QS. Ali Imran: 191).

Sebagai hamba dengan anugrah akal pikiran yang sempurna dari-Nya, sudah seharusnya kita untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru dari tabir-tabir yang sebelumnya tidak pernah diketahui agar bisa bermanfaat, dan mengembangkannya demi pemanfaatan positif terhadap ummat manusia. Sebagai kewajiban dari embanan yang sudah seharusnya oleh kaum pelajar. Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk hewan. Untuk pemanfaatan hewan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Dan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl/16:8



Terjemahannya :

Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Ayat ini menyebutkan salah satu hewan yang paling banyak dimiliki manusia dan paling banyak manfaatnya yaitu Allah menciptakan kuda, bagal (hewan yang lahir dari kuda dan keledai) dan keledai. Itu semua diciptakan Allah agar kamu menungganginya dan Allah menjadikannya sebagai perhiasan dimuka bumi ini. Siapa yang memandang kuda-kuda yang tangguh dan kuat atau hewan lain, maka

hatinya akan berdecak kagum karena keindahannya. Dan bukan hanya alat transportasi dan perhiasan tetapi Allah menciptakan aneka ciptaan-Nya apa yang kamu tidak mengetahuinya sekarang tetapi kelak akan kamu ketahui dan gunakan jika kamu mau berpikir dan Allah menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui (Hamka, 1983). Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menemukan manfaat dari minyak kuda yang sebelumnya belum diketahui dapat mengobati penyembuhan luka sayatan.

Daging kuda tersusun dari jaringan ikat, epitelial, jaringan-jaringan saraf, pembuluh darah dan lemak (Lukman *et al.*, 2007). Kandungan lemak sekitar 2.5 % (Forrest *et al.* 1975 dan Lawrie 1979 dalam Soeparno 2005). Komposisi lemak pada daging umumnya berbentuk trigliserida, sedikit fosfolipid, asam lemak bebas, dan sterol (Adnan, 1977). Fosfolipid mempunyai peranan penting sebagai karier asam lemak dalam darah dan memudahkan terjadinya transpor aktif molekul-molekul dan ion-ion melewati sel membran (Piliang dan Djojosoebagio, 1996).

Asam lemak utama yang terdapat dalam daging kuda adalah asam oleat, asam palmitat, asam linoleat, asam palmitoleat, asam α -linolenat dan asam arakidonat. Asam palmitat menyumbang sekitar 76.6% dari total asam lemak jenuh (SFA), asam oleat menyumbang 73.3% dan asam palmitoleat menyumbang 22.0% dari total asam lemak tak jenuh tunggal (MUFAs). Pada daging kuda juga tinggi akan kandungan PUFA yaitu dengan perbandingan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA): asam lemak jenuh (SFA) adalah 0.29 : 10.2 dari total asam lemak tak jenuh rantai ganda (PUFA) didominasi oleh asam linoleat menyumbang sebesar 64.4%, asam α -linolenat

menyumbang 26.3% dan asam arakidonat hanya menyumbang sekitar 6% (Badiani, *et al.* 1997).

Menurut Martin *et al.*, (1990), Komposisi asam lemak esensial berasal dari kelompok *poly unsaturated fatty acids* (PUFA) dan *highly unsaturated fatty acids* (HUFA) yang berperan penting pada proses metabolisme membran sel serta berperan sebagai prekursor eicosanoid untuk memenuhi fungsi fisiologis tubuh, pada proses metabolisme prostaglandin, tromboksan dan leukotrin. Asam lemak esensial, terutama arakidonat merupakan prekursor prostaglandin (PGF₂α) yang dapat mempengaruhi replikasi sel. Lemak yang berupa Asam Amino Esensial terutama Leucine (5,80%) berfungsi membantu penyembuhan tulang, jaringan otot dan kulit (terutama untuk mempercepat penyembuhan luka post - operative).

Berdasarkan uraian latar belakang serta data empiris dari masyarakat Jeneponto dalam penggunaan minyak lemak kuda sebagai obat penyembuh luka, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan membuktikan adanya efek minyak lemak kuda serta dosis yang efektif dalam mempercepat proses penyembuhan luka insisi pada kelinci.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efek pemberian minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap penyembuhan luka sayatan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)?
2. Berapa pemberian dosis efektif minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap penyembuhan luka sayatan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Luka sayat/insisi (*Incised wounds*), terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misalnya yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik)

biasanya tertutup oleh sutura seterah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (Brunner & Suddarth. 2001).

Penyembuhan luka adalah proses penggantian jaringan yang rusak atau mati oleh jaringan yang baru dan sehat. Penyembuhan luka merupakan proses dinamis yang mencakup inflamasi, angiogenesis, fibroplasia, epitelisasi, kontraksi luka dan remodeling. Proses yang kompleks ini dibagi menjadi tiga fase penyembuhan yang saling tumpang tindih (overlapping) yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi (Kumar, dkk., 2005).

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya dietil eter ($C_2H_5OC_2H_5$), kloroform ($CHCl_3$), benzena dan hidrokarbon lainnya, lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut (Muchtadi, dkk. 2010).

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai metode yang digunakan untuk ekstraksi lemak padat.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan Udi wijaya, dkk. *Uji aktivitas salep fase minyak ekstrak ikan toman (Channa micropeltes) terhadap luka sayat pada Tikus jantan galur wistar*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa fase minyak ekstrak ikan toman mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6. Penggunaan asam lemak omega-3 dan omega-6 secara bersamaan telah terbukti mampu menyembuhkan luka sayat pada kaki tikus yang telah diberi perlakuan diabetes kronis. Asam lemak omega-3 khususnya EPA telah terbukti dapat membantu

fibroblast dalam mensintesis kolagen. EPA berperan meningkatkan jumlah sitokin jenis IL-6 yang mana dengan meningkatnya IL-6 terjadi peningkatan produksi kolagen oleh fibroblast. Dengan meningkatnya jumlah kolagen maka proses penyembuhan luka juga akan berlangsung dengan cepat.

Tiara Dewi, dkk. 2015. *Analisis Kandungan Asam Lemak pada Sotong (Sepia Sp.) dengan Metode Kg-Sm*. Dalam penelitian ini proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode refluks dengan pelarut n-heksan, ekstrak cair kemudian dievaporasi menggunakan Rotary vaccum evaporator Buchi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodhiyah dan Sulistiyawati. 2013. *Pengaruh Ekstrak Minyak Biji Bunga Matahari (Helianthus annuus Terhadap Proses Awal Penyembuhan Luka* mengatakan bahwa kandungan asam linoleat mampu memacu proses penyembuhan luka serta merupakan mediator pro inflamatori kuat yang menyebabkan akumulasi dari leukosit dan makrofag sehingga membantu mempercepat fase inflamasi.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efek minyak kuda (*Equus caballus*) serta dosis yang efektif terhadap penyembuhan luka sayatan.
2. Mengetahui dosis yang efektif minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap penyembuhan luka sayatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan minyak kuda (*Equus caballus*) sebagai penyembuh luka.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diketahuidosis efektif minyak kuda (*Equus caballus*) sebagai obat penyembuh luka sayatan.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai minyak lemak kuda (*Equus caballus*) yang dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk penyembuhan luka sayatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Sampel

Uraian sampel meliputi deskripsi kuda dan sistematika hewan.

1. Deskripsi kuda

Kuda adalah mamalia ungulata (hewan yang berdiri pada kuku) yang berukuran paling besar di kelasnya. Kuda dari spesies *Equus caballus* yang dahulu merupakan bangsa dari jenis kuda liar, kini kuda sudah menjadi hewan yang didomestikasi dan secara ekonomi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia (Ronald *et al.* 1996).

Keadaan fisik kuda yang terdapat di Indonesia beranekaragam karena dipengaruhi oleh keadaan geografis wilayahnya. Kuda-kuda di Indonesia memiliki ukuran tubuh yang tidaklah terlalu besar yaitu bertinggi badan 1,13 m hingga 1,33 m, hal ini disebabkan karena Indonesia berada di daerah beriklim tropis. Dari ukuran tersebut maka kuda Indonesia termasuk kedalam jenis kuda poni. Jenis kuda lokal di Indonesia terdiri atas kuda Makassar, kuda Gorontalo dan Minahasa, kuda Sumba, kuda Sumbawa, kuda Bima, kuda Flores, kuda Savoe, kuda Roti, kuda Timor, kuda Sumatera, kuda Bali, dan kuda Lombok serta kuda Kuningan (Soehardjono, 1990).

Daging tersusun dari jaringan ikat, epitelial, jaringan saraf, pembuluh darah dan lemak. Jumlah jaringan ikat berbeda diantara otot, jaringan ikat berhubungan dengan kealotan daging. Otot skeletal merupakan sumber utama jaringan otot daging dengan komposisi terbanyak dalam karkas, yaitu 35-65% dari berat karkas atau 35-40% dari berat hewan hidup (Lukman *et al.*, 2007). Otot skeletal mengandung sekitar 75 % air dengan kisaran 68-80%, protein sekitar 19%, substansi-substansi non

protein yang larut 3.5% serta lemak sekitar 2.5% (Forrest *et al.*1975 dan Lawrie 1979 dalam Soeparno 2005).

Komposisi lemak pada daging umumnya berbentuk trigliserida, sedikit fosfolipid, asam lemak bebas, dan sterol. Lemak dalam daging tidak mempunyai rasa, tetapi kandungan lemak ini dapat mempengaruhi cita rasa daging (Adnan,1977).

Asam lemak pada daging kuda dari lipid intramuskular diekstrak dari otot paha kuda. Asam lemak tak jenuh tunggal didominasi dan diikuti asam lemak jenuh (SFA) dan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Asam lemak pada daging kuda itu unik karena daging kuda tinggi akan asam lemak tak jenuh rantai tunggal (Lee,*et al.* 2007).

Asam lemak utama yang terdapat dalam daging kuda adalah asam oleat, asam palmitat, asam linoleat, asam palmitoleat dan asam a-linolenat dan asam arakidonat. Asam palmitat menyumbang sekitar 76.6% dari total asam lemak jenuh (SFA), asam oleat menyumbang 73.3% dan asam palmitoleat menyumbang 22.0% dari total asam lemak tak jenuh tunggal. Pada daging kuda juga tinggi akan kandungan PUFA yaitu dengan perbandingan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) : asam lemak jenuh (SFA) adalah 0.29 : 10.2. dari total asam lemak tak jenuh rantai ganda (PUFA) didominasi oleh asam linoleat menyumbang sebesar 64.4%, asam a-linolenat menyumbang 26.3% dan asam arakidonat hanya menyumbang sekitar 6% (Badiani, *et al.* 1997).

2. Sistematik Hewan


Menurut Blakely dan Bade (1995) kuda memiliki klasifikasi sebagaiberikut:

Kingdom :*Animalia*

Filum :*Chordata*

Class : *Mammalia*
 Ordo : *Perissodactylater*
 Famili : *Equidae*
 Genus : *Equus*
 Spesies : *Equus caballus*

B. Kulit



Gambar 1. Anatomi kulit


Kulit adalah organ yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 2 m² dengan berat kira-kira 16% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitive, bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh (Tortora, 2009). Kulit mempunyai berbagai fungsi seperti sebagai pelindung, pengantar haba, penyerap, indera perasa, dan fungsi pergetahan. Warna kulit berbeda-beda, dari kulit yang berwarna terang, pirang dan hitam, warna merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi, serta warna kecoklatan pada genitalia orang dewasa. Demikian pula kulit bervariasi mengenai lembut, tipis dan tebalnya, kulit yang elastis dan inggar terdapat pada palpebra, bibir dan preputium, kulit yang tebal

dan tegang terdapat di telapak kaki dan tangan dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada muka, yang berambut kasar terdapat pada kepala (Djuanda, 2003).

Kulit terdiri dari tiga lapisan yang masing-masing terdiri dari berbagai jenis sel dan memiliki fungsi yang bermacam-macam. Ketiga lapisan tersebut adalah epidermis, dermis, dan subkutis (Wasiatmadja & Syarif, 2007).

1. Anatomi kulit

a) Epidermis



Gambar 2. Anatomi Lapisan Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar terutama terdiri dari epitel skuamosa bertingkat. Sel-sel yang menyusunnya secara berkesinambungan dibentuk oleh lapisan germinal dalam epitel silindris dan mendatar ketika didorong oleh sel-sel baru ke arah permukaan, tempat kulit terkikis oleh gesekan. Lapisan luar mengandung keratin, protein bertanduk, hanya sedikit darinya pada permukaan tubuh yang terpajan untuk terpakai dan terkikis, seperti pada permukaan dalam lengan, paha dan lebih banyak lagi pada permukaan ekstensor, lapisan ini terutama tebal pada kaki (Gibson, 2002). Lapisan ini terdiri atas:

1) Stratum corneum (lapisan tanduk)

Terdiri atas beberapa lapis sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, yaitu jenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar.

2) Stratum lucidum (lapisan jernih)

Berada tepat di bawah stratum corneum. Merupakan lapisan yang tipis, jernih. Lapisan ini tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki.

3) Stratum granulosum (lapisan berbutir-butir)

Tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengerut.

4) Stratum spinosum (lapisan malphigi)

Sel berbentuk kubus dan seperti berduri, intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein.

5) Stratum germinativum (lapisan basal)


Adalah lapisan terbawah epidermis. Di lapisan ini juga terdapat sel-sel melanosit yaitu sel yang membentuk pigmen melanin.

b) Dermis

Dermis adalah lapisan yang terdiri dari kolagen, jaringan fibrosa dan elastin. Lapisan superfisial menonjol ke dalam epidermis berupa sejumlah papilla kecil. Lapisan yang lebih dalam terletak pada jaringan subkutan.

Lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe dan syaraf (Gibson, 2002).

1) Lapisan endodermis



Gambar 3. Anatomi lapisan hipodermis

Lapisan subkutis kulit terletak dibawah dermis. Lapisan ini terdiri dari lemak dan jaringan ikat dan berfungsi sebagai peredam kejut dan insulator panas. Lapisan subkutis adalah tempat penyimpanan kalori. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan saluran getah bening (Wasiatmaja & Syarif,2007).

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adiposa, berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama bergantung pada lokasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm, di daerah kelopak mata dan penis sangat sedikit. Lapisan lemak ini juga merupakan

bantalan. Vaskularisasi di kulit diatur oleh 2 pleksus, yaitu pleksus yang terletak di bagian atas dermis (pleksus superficial) dan yang terletak di subkutis (pleksus profunda). Pleksus yang di dermis bagian atas mengadakan anastomosis di papil dermis, pleksus yang di subkutis dan di pars retikulare juga mengadakan anastomosis, di bagian ini pembuluh darah berukuran lebih besar. Bergandengan dengan pembuluh darah terdapat saluran getah bening (Djuanda, 2003).

2. Fisiologi Kulit

Walau dianggap sangat ringan, permukaan kulit seorang dewasa memiliki luas 2 meter persegi dan berat sampai 5 kg. Berat organ tubuh ini tidak jauh berbeda dari berat keseluruhan tulang seorang dewasa. Disamping berfungsi sebagai kantong besar yang membungkus dan membawa semua bagian tubuh, kulit juga berfungsi menghangatkan tubuh dalam cuaca dingin dan mendinginkannya dalam cuaca panas. Kulit juga berfungsi sebagai pabrik kimia dan pelaksana aneka ragam fungsi penting lainnya (Hutapea A, 2006).

a) Proteksi

Kulit merupakan barrier fisik antara jaringan dibawahnya dan lingkungan luar. Kulit memberikan perlindungan dari abrasi, dehidrasi, radiasi ultraviolet, dan invasi mikroorganisme (Gunstream, 2000). Sebagian besar mikroorganisme mengalami kesulitan untuk menembus kulit yang utuh tetapi dapat masuk melalui kulit yang luka dan lecet. Selain proteksi yang diberikan oleh lapisan tanduk, proteksi tambahan diberikan oleh keasaman keringat dan adanya asam lemak dalam sebum, yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Gibson, 2002).

b) Sensasi

Kulit terdiri dari ujung saraf dan reseptor yang dapat mendeteksi stimulus yang berhubungan dengan sentuhan, tekanan, temperatur dan nyeri (Gunstream, 2000). Sensasi raba, nyeri, perubahan suhu dan tekanan pada kulit dan jaringan subkutan, ditransmisikan melalui saraf sensorik menuju medula spinalis dan otak (Gibson, 2002).

c) Regulasi Suhu

Selama periode kelebihan produksi panas oleh tubuh, sekresi keringat dan evaporasi melalui permukaan tubuh membantu menurunkan temperatur tubuh (Gunstream, 2000).

d) Penyimpanan

Kulit bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan lemak, yang dapat ditarik berdasarkan kebutuhan (Gibson, 2002).

e) Ekskresi

Produksi keringat oleh kelenjar keringat menghilangkan sisa-sisa metabolisme dalam jumlah kecil seperti garam, air, dan senyawa organik (Gunstream, 2000).

f) Sintesis vitamin D

Pajanan terhadap radiasi ultraviolet dapat mengkonversi molekul precursor (7-dihidroksi kolesterol) dalam kulit menjadi vitamin D. Namun, hal tersebut tidak dapat menyediakan vitamin D secara keseluruhan bagi tubuh, sehingga pemberian vitamin D secara sistemik masih diperlukan (Gunstream, 2000; Wasiatmaja & Syarif, 2007).

C. Luka

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan (Sjamsuhidajat & Jong, 2004). Menurut Fletcher (2008) bahwa luka dibagi dalam jenis luka akut dan luka kronik. Luka akut merupakan kondisi rusaknya jaringan oleh trauma. Penyebabnya mungkin disengaja, seperti pada luka bedah, atau disebabkan karena kecelakaan, terkena benda tumpul, proyektil, panas, listrik, bahan kimia atau gesekan. Luka akut diharapkan mengalami penyembuhan melalui tahapan penyembuhan normal (Fletcher, 2008). Luka kronis merupakan kondisi kegagalan jaringan dalam menanggapi proses pengobatan yang diharapkan, sehingga melebihi jangka waktu penyembuhan normal (4 minggu) dan terjebak dalam fase inflamasi. Luka kronis dikaitkan dengan adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik termasuk obat-obatan, gizi buruk, penyakit penyerta (Fletcher, 2008).

Menurut Brunner & suddarth (2001) ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul :

- a. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ
- b. Respon stres simpatis
- c. Perdarahan dan pembekuan darah
- d. Kontaminasi bakteri
- e. Kematian sel

1. Penyebab terjadinya luka

Menurut Karakata & Bachsinar (1995) ada beberapa penyebab terjadinya luka pada kulit dan hal ini berpengaruh pada jenis luka, efek yang ditimbulkan maupun cara pengobatannya. Luka dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu:

- a. Trauma mekanis yang disebabkan karena tergesek, terpotong, terpukul, tertusuk, terbentur dan terjepit.
- b. Trauma listrik dengan penyebab cedera karena listrik dan petir.
- c. Trauma termis disebabkan oleh panas dan dingin.
- d. Trauma kimia disebabkan oleh zat kimia yang bersifat asam dan basa serta zat iritatif dan korosif lainnya.

2. Jenis – jenis luka

Luka sering digambarkan berdasarkan bagaimana cara mendapatkan luka itu dan menunjukkan derajat luka (Brunner & suddarth, 2001).

a. Berdasarkan tingkat kontaminasi

- 1) *Clean Wounds* (Luka bersih) yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup, jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup (misal: *Jackson – Pratt*). Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.
- 2) *Clean-contaminated Wounds* (Luka bersih terkontaminasi), merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.
- 3) *Contaminated Wounds* (Luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna; pada kategori ini juga

termasuk insisi akut, inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.

- 4) *Dirty or Infected Wounds* (Luka kotor atau infeksi), yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka.

b. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka

- 1) Stadium I : Luka Superfisial (*“Non-Blanching Erythema”*) : yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.
- 2) Stadium II : Luka *“Partial Thickness”* : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
- 3) Stadium III : Luka *“Full Thickness”* : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.
- 4) Stadium IV : Luka *“Full Thickness”* yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.

c. Berdasarkan waktu penyembuhan :

- 1) Luka akut (*Acute Wound*) yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati.
- 2) Luka kronis (*Chronic Wound*) yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor eksogen dan endogen.

3. Mekanisme terjadinya luka :

Menurut Brunner & suddarth (2001) mekanisme luka terbagi sebagai berikut:

- a) Luka insisi (*Incised wounds*), terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misalnya yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (*Ligasi*).
- b) Luka memar (*Contusion Wound*), terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak.
- c) Luka lecet (*Abraded Wound*), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.
- d) Luka tusuk (*Punctured Wound*), terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil.
- e) Luka gores (*Lacerated Wound*), terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat.
- f) Luka tembus (*Penetrating Wound*), yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar.
- g) Luka Bakar (*Combustio*)

4. Penyembuhan luka

Proses yang kemudian terjadi pada jaringan yang rusak adalah penyembuhan luka (Sjamsuhidajat & Jong, 2004).

a. Fase penyembuhan luka

Menurut Sjamsuhidajat & Jong (2004) fase penyembuhan luka terbagi dalam tiga fase, yaitu fase inflamasi, poliferasi dan penyudahan yang merupakan perupaan kembali jaringan (*remodelling*).

1) Fase inflamasi

Fase inflamasi berlangsung sejak terjadinya luka sampai kira-kira hari ke lima. Pembuluh darah yang terputus pada luka akan menyebabkan perdarahan dan tubuh akan berusaha menghentikannya dengan vasokonstriksi, pengerutan ujung pembuluh darah yang putus (*retraksi*), dan reaksi hemostasis. Hemostasis terjadi karena trombosit yang keluar dari pembuluh darah saling melengket dan bersama jala fibrin yang terbentuk, membekukan darah yang keluar dari pembuluh darah.

Sel mast dalam jaringan ikat menghasilkan serotonin dan histamin yang meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi eksudasi, disertai vasodilatasi setempat yang menyebabkan pembengkakan.

Aktifitas seluler yang terjadi adalah pergerakan leukosit menembus dinding pembuluh darah (*diapedesis*) menuju luka karena daya kemotaksis. Leukosit mengeluarkan enzim hidrolitik yang membantu mencerna bakteri dan kotoran luka. Limfosit dan monosit yang kemudian muncul ikut menghancurkan dan memakan kotoran luka dan bakteri (*fagositosis*). Fase ini disebut juga fase leban karena reaksi pembentukan kolagen baru sedikit dan luka hanya dipertautkan oleh fibrin yang amat lemah.

a) Fase poliferasi

Fase poliferasi atau juga disebut fase fibroplasia. Fase ini berlangsung pada dari akhir fase inflamasi sampai kira kira akhir minggu ketiga. Fibroblas berasal dari sel masenkim yang belum berdiferensiasi, menghasikan mokupolisakarida, asam aminoglisin, dan prolin yang merupakan bahan dasar kolagen serat yang akan mempertautkan tepi luka.

Pada fase poliferasi, serat-serat dibentuk dan dihancurkan kembali untuk penyesuaian diri dengan tegangan pada luka yang cenderung mengerut. Sifat ini, bersama dengan sifat kontraktif miofibroblast, menyebabkan tarikan pada tepi luka. Pada fase ini, kekuatan regangan luka mencapai 25% jaringan normal. Nantinya, dalam proses penyudahan, kekuatan serat kolagen bertambah karena ikatan intramolekul dan antar molekul.

Pada fase fibroplasia, luka dipenuhi sel radang, fibroblas, dan kolagen, membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan yang berbenjol halus yang disebut *granulasi*. Epitel tepi luka yang terdiri atas sel basal terlepas dari dasarnya dan berpindah mengisi permukaan luka. Tempatnya kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Proses migrasi hanya terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar. Proses ini baru berhenti setelah epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka. Dengan tertutupnya permukaan luka, proses fibroplasia dengan pembentukan

jaringan granulasi juga akan berhenti dan mulailah proses pematangan dalam fase penyudahan.

b) Fase penyudahan

Fase penyudahan terjadi proses pematangan yang terdiri atas penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan gaya grafitasi, dan akhirnya perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan dinyatakan berakhir jika semua tanda radang sudah tidak muncul. Udem dan sel radang diserap kembali, kolagen yang berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dengan regangan yang ada. Selama proses ini dihasilkan jaringan parut yang pucat, tipis, dan lemas, serta mudah digerakkan dari dasar. Pada akhir fase ini perupaan kulit mampu menahan regangan kira-kira 80% kemampuan kulit normal.

b. Klasifikasi penyembuhan luka

Menurut Sjamsuhidajat & Jong (2004) terbagi menjadi 2 klasifikasi penyembuhan luka.

- 1) Penyembuhan sekunder (*sanatio per secundam intentionem*), yaitu penyembuhan luka kulit tanpa pertolongan dari luar dan prosenya penyembuhan berjalan secara alamiah. Pada kondisi ini luka akan terisi oleh jaringan granulasi dan kemudian ditutup jaringan epitel. Proses ini biasanya membutuhkan waktu cukup lama dalam proses penyembuhan dan meninggalkan parut yang kurang baik terutama pada luka yang lebar.
- 2) Penyembuhan primer (*sanatio per primam intentionem*), yaitu penyembuhan luka yang terjadi bila luka segera diusahakan bertaut,

biasanya dengan bantuan jahitan. Pada kondisi ini parut yang terjadi biasanya lebih halus dan kecil.

5. Perawatan dan penatalaksanaan luka.

Dasar dari perawatan luka adalah proses pembersihan dan pembalutan (*dressing*). Luka mempunyai resiko sebagai tempat berkembang biak bakteri yang akhirnya akan membuat koloni, untuk itulah perawatan luka harus menggunakan teknik yang steril yang berguna untuk mencegah terjadinya penyebaran koloni bakteri terhadap pasien dengan luka maupun untuk mencegah terjadinya penyebaran bakteri kepada orang lain, terutama tenaga medis yang merawat luka tersebut (William & Wilkins, 2003).

Tujuan utama dari membersihkan luka adalah untuk mengangkat debris dan zat kontaminan dari luka tanpa merusak jaringan sehat yang baru terbentuk. Kuncinya adalah, selalu menjaga secara rutin dan benar-benar bersih sebelum membalut luka tersebut. Fungsi dari membalut luka antara lain untuk melindungi luka dari kontaminasi dan trauma, bisa mengurangi terjadinya bengkak ataupun perdarahan, mengaplikasikan proses pengobatan, menyerap *drinase* atau jaringan nekrotik yang lepas, melindungi kulit disekitar luka (William & Wilkins, 2003).

6. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka

Penyembuhan luka dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Berdasarkan penyebabnya gangguan yang mempengaruhi penyembuhan luka disebabkan oleh dalam tubuh sendiri (*endogen*) atau oleh penyebab luar tubuh (*eksogen*) (Sjamsuhidajat & Jong, 2004). Penyebab endogen adalah kuagolopati, gangguan sistem imun, hipoksia

lokal, gizi, malabsorpsi, gangguan metabolisme, neuropati, infeksi jamur, keganasan lokal, konsitusional, keadaan umum kurang baik. Penyebab eksogen adalah pasca radiasi (*penghambatan agiosintesis dan poliferasi*), immunosupresi, infeksi luka artifisial, jaringan mati, pendarahan kurang, infeksi berat.

Menurut Brunner & suddarth (2001) terdiri dari beberapa faktor penyembuhan luka :

1) Usia

Anak dan dewasa penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Orang tua lebih sering terkena penyakit kronis, penurunan fungsi hati dapat mengganggu sintesis dari faktor pembekuan darah.

2) Nutrisi

Penyembuhan menempatkan penambahan pemakaian pada tubuh. Penderita memerlukan diet kaya protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan A, dan mineral seperti Fe, Zn. Penderita kurang nutrisi memerlukan waktu untuk memperbaiki status nutrisi mereka setelah pembedahan jika mungkin. Pada penderita yang gemuk meningkatkan resiko infeksi luka dan penyembuhan lama karena supply darah jaringan adipose tidak adekuat.

3) Infeksi

Infeksi luka menghambat penyembuhan. Bakteri sumber penyebab infeksi.

4) Sirkulasi (*hipovolemia*) dan Oksigenasi

Sejumlah kondisi fisik dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Adanya sejumlah besar lemak subkutan dan jaringan lemak (yang memiliki

sedikit pembuluh darah). Pada orang-orang yang gemuk penyembuhan luka lambat karena jaringan lemak lebih sulit menyatu, lebih mudah infeksi, dan lama untuk sembuh. Aliran darah dapat terganggu pada orang dewasa dan pada orang yang menderita gangguan pembuluh darah perifer, hipertensi atau diabetes millitus. Oksigenasi jaringan menurun pada orang yang menderita anemia atau gangguan pernapasan kronik pada perokok. Kurangnya volume darah akan mengakibatkan vasokonstriksi dan menurunnya ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka.

5) Hematoma

Hematoma merupakan bekuan darah. Seringkali darah pada luka secara bertahap diabsorpsi oleh tubuh masuk kedalam sirkulasi. Tetapi jika terdapat bekuan yang besar hal tersebut memerlukan waktu untuk dapat diabsorpsi tubuh, sehingga menghambat proses penyembuhan luka.

6) Benda asing

Benda asing seperti pasir atau mikroorganisme akan menyebabkan terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut diangkat. Abses ini timbul dari serum, fibrin, jaringan sel mati dan leukosit yang membentuk suatu cairan yang kental yang disebut dengan nanah (*Pus*).

7) Iskemia

Iskemia merupakan suatu keadaan dimana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Hal ini dapat terjadi akibat dari balutan pada luka terlalu ketat. Dapat juga

terjadi akibat faktor internal yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri.

8) Diabetes

Hambatan terhadap sekresi insulin akan mengakibatkan peningkatan gula darah, nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibat hal tersebut juga akan terjadi penurunan protein-kalori tubuh.

9) Keadaan Luka

Keadaan khusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektifitas penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu.

10) Obat

Obat anti inflamasi (seperti *steroid dan aspirin*), heparin dan anti neoplasmik mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama dapat membuat seseorang rentan terhadap infeksi luka.

7. Komplikasi Penyembuhan Luka

a. Infeksi

Invasi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan atau setelah pembedahan. Gejala dari infeksi sering muncul dalam 2–7 hari setelah pembedahan. Gejalanya berupa infeksi termasuk adanya purulent, peningkatan drainase, nyeri, kemerahan dan bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan jumlah sel darah putih (Barriet, 2011).

b. Perdarahan

Perdarahan dapat menunjukkan suatu pelepasan jahitan, sulit membeku pada garis jahitan, infeksi, atau erosi dari pembuluh darah oleh benda

asing (*drain*). Hipovolemia mungkin tidak cepat ada tanda. Sehingga balutan dan luka di bawah balutan jika mungkin harus sering dilihat selama 48 jam pertama setelah pembedahan dan tiap 8 jam setelah itu. Jika perdarahan berlebihan terjadi, penambahan tekanan balutan luka steril mungkin diperlukan. Pemberian cairan dan intervensi pembedahan mungkin diperlukan (Baririet, 2011).

c. Dehiscence dan Eviscerasi

Dehiscence dan *eviscerasi* adalah komplikasi operasi yang paling serius. *Dehiscence* adalah terbukanya lapisan luka partial atau total. *Eviscerasi* adalah keluarnya pembuluh melalui daerah irisan. Sejumlah faktor meliputi, kegemukan, kurang nutrisi, multiple trauma, gagal untuk menyatu, batuk yang berlebihan, muntah, dan dehidrasi, mempertinggi resiko pasien mengalami *dehiscence* luka. *Dehiscence* luka dapat terjadi 4-5 hari setelah operasi sebelum kollagen meluas di daerah luka. Ketika *dehiscence* dan *eviscerasi* terjadi luka harus segera ditutup dengan balutan steril yang lebar, kompres dengan normal saline. Pasien disiapkan untuk segera dilakukan perbaikan pada daerah luka (Baririet, 2011).

D. Lemak dan Minyak

1. Deskripsi Lemak dan minyak

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya dietil eter ($C_2H_5C_2H_5$), Kloroform ($CHCl_3$), benzena dan hidrokarbon lainnya, lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut yang

disebutkan diatas karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut.

Lemak dan minyak merupakan senyawa antrigliserida atau triasgliserol, yang berarti “triester dari gliserol”. Jadi lemak dan minyak juga merupakan senyawa anester. Hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat ini juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Dalam pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak (umumnya ketiga asam lemak tersebut berbeda-beda), yang membentuk satu molekul trigliserida dan satu molekul air (Muchtadi, dkk. 2010).

Lemak terdiri dari asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Komposisi asam lemak esensial berasal dari kelompok *poly unsaturate fatt acids* (PUFA) dan *highl unsaturate fatty acids* (HUFA) yang berperan penting pada proses metabolisme membran sel (Bhagavan, 1992).

Menurut Martin *et al.*, (1990), kelompok HUFA atau PUFA berperan sebagai prekursor eicosanoid untuk memenuhi fungsi fisiologis tubuh, pada proses metabolisme prostaglandin, tromboksan dan leukotrin. Asam lemak esensial, terutama arakidonat, merupakan prekursor prostaglandin (PGF₂α) yang dapat mempengaruhi replikasi sel. Lemak yang berupa Asam Amino Esensial terutama Leucine (5,80%) berfungsi membantu penyembuhan tulang, jaringan otot dan kulit (terutama untuk mempercepat penyembuhan luka post - operative).

2. Perbedaan antara minyak dan lemak

Perbedaan antara lemak dan minyak antara lain,yaitu:

- a. Pada temperatur kamar lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair

- b. Gliserrida pada hewan berupa lemak (lemak hewani) dan gliserida pada tumbuhan berupa minyak (minyak nabati)
- c. Komponen minyak terdiri dari gliserrida yang memiliki banyak asam lemak tak jenuh sedangkan komponen lemak memiliki asam lemak jenuh.

E. Uraian Hewan Coba

Tabel 1. Klasifikasi Kelinci

Klasifikasi Kelinci	
Kingdom	Animalia
Filum	Chordata
Sub-filum	Vertebrata
Class	Mamalia
Sub-class	Theria
Bangsa	Lagomorpha
Suku	Oryctolagidae
Famili	Muridae
Genus	Oryctolagus
Spesies	Oryctolagus cuniculus L.

(Jasin, 1992)

Pada awalnya pertimbangan pemilihan hewan coba hanya berdasarkan avabilitas, harga, dan kemudahan dalam perawatan. Namun, seiring perkembangan zaman tipe metabolisme, farmakokinetik, dan perbandingan catatan atau sejarah avabilitas juga ikut dipertimbangkan (Sulastri, 2009)

Kelinci pada umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut, sehingga banyak dipakai sebagai salah satu hewan percobaan.

Tabel 2 Karakteristik Kelinci

Berat badan dewasa	2,0 - 5,0 kg
Berat lahir	30,0 – 100,0 g
Luas tubuh kelinci	Setiap 2,5 kg seluas 1.270,0 cm ²
Umur	5,0 – 6,0 tahun
Temperatur tubuh	38,0 -39,6° C
Konsumsi makanan	5 g/100 g /hari
Konsumsi air	5 - 10 ml/100 g/hari
Mulai kawin	Jantan, 6-10 bulan Betina, 5-9 bulan
Jumlah anak /lahir	4-10 ekor
Penyapihan	4-6 pekan
Pemeliharaan	1-11 tahun

F. Tinjauan Islam

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat (Masood, 2009).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah Swt

menghendaki agar pengobatan itu dipelajari sebagaimana dalam hadist dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda:


إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مِنْ عِلْمِهِ وَجَهْلَهُ مِنْ جَهْلِهِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah I tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13)

Hadits di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya.

Asy Syaafii adalah Zat yang mampu memberikan kesembuhan, baik kesembuhan penyakit hati maupun penyakit jasmani. Kesembuhan hati dari penyakit syubhat, keragu-raguan, hasad, serta penyakit-penyakit hati lainnya, dan juga kesembuhan jasmani dari penyakit-penyakit badan, salah satunya yakni penyakit luka. Tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan dari penyaki-penyakit tersebut selain Allah Ta'ala. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari-Nya. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Dia. Hal ini seperti dikatakan Nabi Ibrahim 'alaih salaam dalam Al Qur'an :




Terjemahannya:

“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku.”(Q.S. Asy Syu’ara / 26: 80).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski Allah swt yang menentukan hasilnya. Seperti di dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Sebagai hamba dengan anugrah akal pikiran yang sempurna dari-Nya, sudah seharusnya kita untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru dari tabir-tabir yang sebelumnya tidak pernah diketahui agar bisa bermanfaat, dan mengembangkannya demi pemanfaatan positif terhadap ummat manusia. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki manfaat, termasuk hewan. Untuk pemanfaatan hewan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Dan firman Allah swt dalam surah Al-Gaasyiah/88:17



Terjemahannya:


Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan?

Ayat diatas dijelaskan bahwa disini Allah swt mengkhususkan unta sebagai objek pengamatan, mengingat bahwa ia adalah hewan paling utama dan paling berguna dikalangan bangsa Arab ketika itu. Dan memang ia sesungguhnya adalah hewan yang mengagumkan. Demikian pula dalam hal kemampuannya mengangkut beban

yang berat ke tempat-tempat yang berjarak jauh. Memiliki watak sabar menghadapi beratnya perjalanan, haus dan lapar (Quraish, Shihab M. 2002).

Selain ayat diatas yang menyebut salah satu binatang yang paling banyak dimiliki oleh manusia sekaligus paling banyak manfaatnya, kini disebut lagi beberapa binatang lain sebagaimana disebutkan oleh Allah swt.

Dan firman Allah swt dalam surah An-Nahl/16:8



Terjemahannya :

Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Ayat ini menyebutkan salah satu hewan yang paling banyak dimiliki manusia dan paling banyak manfaatnya yaitu Allah menciptakan kuda, bagal (hewan yang lahir dari kuda dan keledai) dan keledai. Itu semua diciptakan Allah agar kamu menungganginya dan Allah menjadikannya sebagai perhiasan dimuka bumi ini. Siapa yang memandang kuda-kuda yang tangguh dan kuat atau hewan lain, maka hatinya akan berdecak kagum karena keindahannya. Dan bukan hanya alat transportasi dan perhiasan tetapi Allah menciptakan aneka ciptaanNya apa yang kamu tidak mengetahuinya sekarang tetapi kelak akan kamu ketahui dan gunakan jika kamu mau berpikir dan Allah menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui (Hamka, 224)

Ayat ini menyebutkan fungsi ketiga binatang tersebut dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutnya sebagai alat pengangkut sebagaimana halnya binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa ketiga hewan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengangkut. Ayat ini menguraikan nikmat-nikmat Allah yang dirasakan langsung manfaatnya. Selain dapat sebagai alat transportasi, hewan ini dapat dimanfaatkan kulit, daging hingga susunya (Astawan, 2005). Tidak hanya itu bagian dari lemak kuda juga dapat diolah menjadi minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai obat penyembuh luka sayat.

Keperawatan sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa itu belum ada dokter. Tokoh keperawatan muslimah pertama kali yaitu Rufaidah Binti Sa'ad lahir di Yahrib tinggal di Madinah. Rufaidah Binti Sa'ad dengan sukarela menjadi perawat tanpa imbalan dan tanpa membeda-bedakan status sosial. Dengan sepenuh hati dan kasih sayang Rufaidah binti Sa'ad mengobati para pahlawan yang terluka, bukan cuma para pahlawan tapi para musuh pun diobatinya dengan sepenuh kasih.

Bila ditilik kembali tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah bereksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu lainnya. Sekelompok orang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya.

Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaannya. Diiringi keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah-lah yang

menjadikan semua itu. Karena itu, pengobatan dalam rangka memelihara diri hukumnya wajib.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian eksperimental.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi pengambilan sampel di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan.
- b. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Farmakologi Farmasi UIN Alauddin Makassar..

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium. Penelitian dengan pendekatan eksperimental adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat.

C. Sampel

Sampel lemak kuda (*Equus caballus*)

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan yaitu gunting, mata pisau (sape steril), alat cukur (*gilette*), sarung tangan, cutton bud, masker, mangkok, gelas ukur (*pyrex*), corong, labu alas bulat, timbangan (*camry*), batang pengaduk, alat refluks (*Heidolph MR-sandard*).

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah lemak kuda yang diperoleh dari Jeneponto, alkohol 70 %, pelarut n-heksan, bioplacenton, Aqua Pro Injection (API), aquadest, paraffin liquid, kapas, perban.

E. Teknik Pengolahan Sampel

1. Pengambilan Sampel

Sampel lemak kuda (*Equus caballus*) diperoleh di Jeneponto. Sampel yang digunakan adalah bagian lemak yang terdapat pada otot paha.

F. Pengujian Efek Penyembuhan Luka

1. *Penyiapan hewan uji*

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci sebanyak 5 ekor dengan berat badan 2,5-3 kg. Sebelum perlakuan, kelinci diaklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 5 hari. Sehari sebelum pembuatan luka sayat, hewan uji dicukur bulunya didaerah punggung sampai licin. Pada saat dibuat luka, terlebih dahulu punggungnya dan sekitarnya dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya dibuat luka sayatan dengan ukuran panjang 3 cm dan kedalaman 2 mm pada bagian punggung kelinci menggunakan *surgical blade sterile* (pisau bedah). Dimana setiap kelinci dilukai dengan masing-masing 3 sayatan.

2. *Pembuatan Minyak Kuda*

Pembuatan minyak kuda dilakukan dengan menggunakan metode refluks. Dimana lemak yang diperoleh di potong dadu. Kemudian ditimbang sebanyak 200 gram sampel lemak kuda dan dimasukkan kedalam labu alas bulat pada alat refluks. Setelah lemak dimasukkan kedalam labu alas bulat

ditambahkan cairan penyari n-heksan sebanyak 500 ml. Kemudian alat refluks dirangkaikan dan mulai dilakukan penyarian dengan metode refluks terus-menerus sampai 3-4 jam. Hasil refluks disaring dan ditampung. Setelah itu ekstrak n-heksan yang diperoleh kemudian diuapkan hingga diperoleh minyak lemak kuda murni.

3. Pengujian Terhadap Hewan Uji

Efek terhadap penyembuhan luka dilakukan terhadap hewan coba kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yang sehat dengan berat badan 2,5-3 kg, peratama-tama yang dilakukan yaitu rambut kelinci dicukur bagian punggungnya dan dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian disayat dengan panjang 3 cm dan kedalaman kira-kira 2 mm dengan *surgical blade sterile* (pisau bedah). Kemudian luka yang mengalami pendarahan diberishkan dengan *Aqua Pro Injection* hingga tidak terjadi lagi pendarahan. Digunakan sebanyak 5 ekor kelinci yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok. Dimana setiap kelinci dilukai masing-masing 3 luka sayat pada bagian punggung. Selanjutnya sediaan dioleskan secara acak sesuai dengan ketentuan berikut:

- a) K1 : Diberi minyak kuda murni (Dosis I)
- b) KII : Diberi minyak kuda konsentrasi 10% v/v (Dosis II)
- c) KIII : Diberi minyak kuda konsentrasi 20% v/v (Dosis III)
- d) KIV : Diberi Bioplacenton (Kontrol positif)
- e) KV : Tanpa pemberian pengobatan (Kontrol negatif)

4. Pengukuran Efek Penyembuhan Luka.

Pengukuran efek penyembuhan luka dilakukan berdasarkan indikator penurunan panjang luka sayat yang diukur selama 18 hari. Luka sayat dikatakan sembuh apabila luka tertutup oleh jaringan baru.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat prospektif eksperimental sungguhan, memakai rancangan percobaan acak lengkap (RAL), karena sampel relatif sama (homogen) dari aspek umur dan berat badan. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Pada kelompok K1 dengan perlakuan minyak kuda (*Equus caballus*) murni, KII minyak kuda (*Equus caballus*) 10%, KIII dengan minyak kuda (*Equus caballus*) 20% dan KIV dengan perlakuan bioplacenton, KV dengan tanpa pemberian pengobatan.

Untuk mengetahui efektifitas minyak lemak kuda pada penyembuhan luka sayat kelinci maka data dianalisis dengan cara menggunakan analisis ANOVA.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Efek penyembuhan luka sayat ekstrak lemak kuda pada punggung kelinci dengan beberapa konsentrasi, dimana pengamatan dimulai saat pembuatan luka sayat dengan panjang luka awal 3 cm dengan kedalaman 2 mm. Untuk perlakuan minyak kuda murni replikasi 1 dan replikasi 2 terjadi penurunan panjang luka hingga hari ke 12 dan untuk replikasi 3 terjadi hingga hari ke 13. Untuk konsentrasi minyak kuda 10 % replikasi 1 terjadi penurunan panjang luka hingga hari ke 15, sedangkan untuk replikasi 2 dan 3 sampai pada hari ke 16. Untuk konsentrasi 20 % replikasi 1 terjadi penurunan panjang luka sayat hingga hari ke 15 dan replikasi 2 penurunan panjang luka sampai hari ke 14, sedangkan replikasi 3 sampai pada hari ke 16. Untuk kontrol positif replikasi 1 terjadi penurunan luka hingga hari ke 11, sedangkan untuk replikasi 2 dan replikasi 3 terjadi hingga hari ke 10. Untuk kontrol negatif replikasi 1 terjadi penurunan panjang luka hingga hari ke 17, sedangkan untuk replikasi 2 dan replikasi 3 sampai pada hari ke 18.

Efek penyembuhan luka sayat minyak kuda dengan beberapa konsentrasi yang dimulai pada saat pembuatan luka sayat hingga luka tertutup 100% disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Efek penyembuhan luka sayat

Persentase perubahan penurunan panjang luka sayat dapat dilihat pada tabel 5

Konsentrasi	Rata-rata hari ke-n
-------------	---------------------

	Luka tertutup 100%
Minyak kuda murni	12,3
Minyak kuda Konsentrasi 10%	15,6
Minyak kuda Konsentrasi 20%	15
Bioplacenton	10,3
Tanpa pengobatan	17,6

B. Pembahasan

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan (Sjamsuhidajat & Jong, 2004).

Ditinjau dari segi penyembuhannya, luka dibedakan menjadi dua yaitu luka iris dan luka bakar. Luka iris adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam. Luka ini memiliki sifat tepi-tepi luka licin, tidak terdapat hubungan antara jaringan dan tidak ada jaringan nekrosa (Robins, 2009). Luka sayat adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam, misalnya terjadi akibat pembedahan. Ciri-cirinya yaitu luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka (Berman, 2009).

Karakteristik luka sayat ada beberapa yaitu luka sejajar, tidak adanya memar berdekatan tepi kulit, tidak adanya bridging jaringan memanjang dari satu sisi ke sisi

lain dalam luka (Wyatt, 2011). Penyembuhan luka pada umumnya dapat terjadi secara otomatis melalui mekanisme auto imun pada tubuh.

Pada penelitian ini minyak lemak kuda (*Equus caballus*) digunakan sebagai penyembuh luka sayat yang ditujukan untuk kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Penggunaan minyak lemak kuda (*Equus caballus*) ini didukung dengan adanya kandungan asam lemak esensial berasal dari kelompok *poly unsaturated fatty acids* (PUFA) dan highly unsaturated fatty acids (HUFA) yang berperan penting pada proses metabolisme membran sel serta berperan sebagai prekursor eicosanoid untuk memenuhi fungsi fisiologis tubuh, pada proses metabolisme prostaglandin, tromboksan dan leukotrin. Asam lemak esensial, terutama arakidonat, merupakan prekursor prostaglandin (PGF₂α) yang dapat mempengaruhi replikasi sel. Lemak yang berupa Asam Amino Esensial terutama Leucine (5,80%) berfungsi membantu penyembuhan tulang, jaringan otot dan kulit (terutama untuk mempercepat penyembuhan luka post - operative).

Pada penelitian ini menggunakan sampel lemak kuda (*Equus caballus*), dimana lemak kuda ini diekstraksi menggunakan metode refluks dengan penyari n-heksan. Alasan digunakan n-heksan karena n-heksan merupakan pelarut yang paling mudah dalam mengangkat minyak yang terkandung dalam lemak dan mudah menguap, sehingga memudahkan dalam proses refluks. N-heksan juga bersifat nonpolar sehingga dapat melarutkan lemak karena memiliki polaritas yang sama. Pelarut ini memiliki titik didih antara 65–70.

Proses ekstraksi yang digunakan adalah metode refluks karena pada metode ini memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi dan pada proses pemanasan diduga dapat memperbaiki kelarutan ekstrak. Pada penelitian ini, sebanyak 200 gram

sampel lemak kuda dimasukkan dalam labu alas bulat kemudian ditambahkan cairan penyari n-heksan sebanyak 500 ml lalu dipasang labu alas bulat pada refluks yang telah dihubungkan dengan kondensor kemudian dipanaskan sampel selama 3-4 jam, terakhir disaring ekstrak yang diperoleh dengan kertas saring lalu didiamkan hingga pelarut n-heksan menguap. Langkah tersebut dilakukan secara berkesinambungan sampai semua sampel selesai direfluks.

Pengobatan luka sayat dengan menggunakan minyak kuda dilakukan secara topikal dengan frekuensi satu kali sehari hingga terjadi kesembuhan pada luka sayat. Terjadinya kesembuhan pada luka sayat ditandai dengan merapatnya kulit, kekeringan luka dan karopeng disekitar luka terlepas dengan sendirinya. Pada penelitian ini pengamatan dilakukan hingga luka tertutup sempurna.

Pada penelitian ini digunakan pelarut pengenceran paraffin liquid tanpa minyak kuda sebagai kontrol negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang memberikan efek penyembuhan luka sayat adalah minyak kuda (*Equus caballus*). Selain itu pada sediaan topikal paraffin liquid berfungsi mengatasi kerutan dan penuaan. Disamping itu, juga digunakan Bioplacenton[®] sebagai kontrol positif agar dapat mengetahui kesetaraan efektifitas minyak kuda dalam penentuan konsentrasi optimum.

Penggunaan Bioplacenton[®] pada perawatan luka sangat efektif karena mengandung bioplacenton ekstrak dan neomycin sulfate. Placenta ekstrak sebagai “biogenic stimulator” memegang peranan penting dalam mempercepat regenerasi sel dan penyembuhan luka. Sedangkan neomycin sulfate bekerja sebagai antibiotik yang mampu membunuh beragam jenis kuman dengan daya kerja yang tidak terganggu oleh nanah. Bioplacenton[®] juga aman digunakan dan mudah didapatkan.

Pengujian efek penyembuhan luka dilakukan pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Kelinci umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut, sehingga banyak dipakai sebagai salah satu hewan pengujian. Efisiensi penggunaan kelinci jantan dan betina dimaksudkan karena pada pengujian hanya sebatas sistem di luar hewan uji (topikal) sehingga pengamatan yang dilakukan tidak mengganggu sistem hormonal hewan yang berbeda menurut jenis kelaminnya.


Pengamatan dilakukan terhadap perbandingan persentase penyembuhan luka dari beberapa konsentrasi yang diberikan pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Dari hasil pengamatan diperoleh rata-rata persentase penyembuhan luka yaitu bahwa ketiga konsentrasi ini memberikan efek luka yang berbeda-beda. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyembuhan luka (luka tertutup) 100% terjadi pada hari ke-12, 12, dan 13. Untuk konsentrasi minyak kuda 10 % penutupan luka 100% terjadi pada hari ke-15, 16 dan 16. Dan untuk konsentrasi minyak kuda 20% penutupan luka 100% terjadi pada hari ke-15, 14 dan 16. Untuk kontrol positif Bioplacenton[®] terjadi pada hari ke-11, 10 dan 10. Sedangkan untuk kontrol negatif, penyembuhan luka terjadi pada hari ke-17, 18 dan 18. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga konsentrasi yang memberikan efek penyembuhan luka terbaik yakni pada pemberian minyak kuda murni.

Berdasarkan hasil penelitian untuk luka tertutup 100%, pada penggunaan masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan waktu penurunan panjang luka sayat yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari hasil analisis statistik Anova secara Rancangan Acak Lengkap (RAL) diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Ummat manusia sebagai khalifah dimuka bumi diperintahkan oleh Allah Swt untuk memperhatikan bumi dan seisinya serta memanfaatkannya dengan sebaik

mungkin. Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk hewan. Karenanya, manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam ciptaan Allah Swt termasuk hewan.

Seperti halnya pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa minyak dari lemak kuda dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka sayat. Pemanfaatan minyak kuda yang sebagaimana mestinya, salah satunya sebagai obat luka sayat adalah tidak lain merupakan bentuk kesyukuran terhadap apa yang telah diciptakan Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian minyak kuda (*Equus caballus*) memiliki pengaruh terhadap penyembuhan luka sayatan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)
2. Konsentrasi yang efektif pada pemberian minyak kuda (*Equus caballus*) terhadap penyembuhan luka sayatan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) ialah pada konsentrasi minyak kuda murni.

B. Saran

Disarankan agar dilakukan formulasi lebih lanjut yang benar-benar dapat menghasilkan sediaan yang jauh lebih baik dan lebih nyaman digunakan serta penguasaannya dapat diberikan pada penyembuhan luka sayat pada manusia.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Adnan, AS. *Tinjauan Umum Tentang Daging dan Masalahnya*. Bogor: Lembaga Penelitian Peternakan: 1977.

Astawan, M. 2005. *Proses UHT: Upaya Penyelamatan Gizi pada Susu*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Badiani, A., Nanni, N., Gatta, P. P., Tolomelli, B. & Manfredini, M. *Nutrient Profile of Horsemeat I*. 1997.

Barbul, A and Efron, D. (2010). Wound Healing in Schwartz principle of surgery 9th ed. New York.: Mc Graw Hill. p.

Baririet, B.D. 2011. *Konsep luka*. Basic Nursing Department UMM, Artikel. Diakses 07 april 2016, dari <http://s1keperawatan.umm.ac.id/files/file/konsep%20luka.pdf>

Berman, Audry.2009. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis Edisi Kelima*. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.

Bhagavan, N.V. 1992. *Medical Biochemistry*. Jones and Bartlet Publisher, London.

Blakely, J dan D. H. Bade, 1992. *Ilmu Peternakan*. Penerjemah B. Srigdanono. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Brunner & suddarth. (2001). *Buku ajar keperawatan medikal bedah edisi 8 vol 1*. Jakarta: EGC

Djuanda A, Hamzah M, Aisah S. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta. 2007.

Fletcher, J. (2008). Differences between acute and chronic wounds and the role of wound bed preparation. *Nursing Standard*. Diakses 07 Februari 2016, dari <http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/archive/article-differences-between-acute-andchronic-wounds-and-the-role-ofwound-bedpreparation>


Forrest, C.J.,E.D. Aberle, H.B.Hedrick, M.D. Judgedan R.A. Merkel. 1975. *Principles of Meat Science*. W. H. Freeman and Co., San Fransisco, USA.

- Gibson, John. 2002. *Anatomi dan Fisiologi Modern untuk Perawat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Gunstream, S.E. 2000. *Anatomy and Physiology with Integrated Study Guide 2nd Edition*. Mc Graw Hill Company. USA
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz 13-16*. PT. Pustaka Panjimas. Jakarta: 1983.
- Hutapea dan Albert M. *Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Jasin, Maskoeri. 1992. *Zoologi Invertebrata*. Surabaya : Sinar Wijaya.
- Karakata, Sumiardi dan Bob Bachsinar. 1995. *Bedah Minor*. Edisi 2. Jakarta: Hipokrates.
- Lee, C. et al. *Nutritional characteristics of horsemeat in comparison with those of beef and pork*. 2007.
- Lukman, DW, dkk. 2007. *Higiene Pangan*. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mansjoer, Arif, dkk. 2000. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi III*. Fakultas Kedokteran UI : Aescullapius.
- Martin, David W et al. 1992. *Biokimia (Harper's Review of Biochemistry)*. Jakarta : EGC Penerbit Buku Kedokteran.
- Masood, Ehsan. 2009. *Ilmuwan-ilmuwan Muslim: Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtadi, Tien R, dkk. 2010. *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*. Bogor: Alfabeta.
- Piliang, W.G dan S. Djojosoebagio. 1996. *Fisiologi Nutrisi. Edisi Kedua*. UI Press. Jakarta.
- Quraish, Shihab M. 2002. *Tafzir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.


- Ronald, J., D. V. M. Riegel, E. Susan, dan B. S. Hakola. 1996. *Illustrated Atlas of Clinical Equine Anatomy and Common Disorders of The Horse*. Equistar Publication, Ltd. Diakses 7 Februari 2016. <http://id.wikipedia.org/kuda>.
- Robins dan Cotwan. 2009. *Buku Saku Dasar Patologis Penyakit*. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.
- Sjamsuhidajat, R & Nim de jong. 2004. *Buku ajar ilmu bedah*. Jakarta: EGC
- Soehardjono. O. 1990. *Kuda*. Yayasan Pamulang Equistian Centre. Jakarta.
- Soeparno. 2005. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sulastri, I. 2009. Does Productivity Index of Boerawa Does and Etawa Grade Does Fed by Traditional and Rational Foodstuff. Proceedings of The 1st International Seminar on Animal Industry 2009. Faculty of Animal Science, Bogor Agricultural University.
- Syarif M. Wasitaatmadja. 2007. *Anatomi Kulit. Dalam: Adhi Djuanda, Mochtar Hamzah, Siti Aisah eds. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi kelima*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Tortora, G.J. dan Derrickson, B.H. *Principles of Anatomy and Physiology. Twelfth Edition*. Asia: Wiley. 2009.
- Widowati, C, dkk. 2007. *Motivasi Belajar dan Sumber-Sumber Informasi Tentang Kesehatan*. Jurnal Gizi Klinik Indonesia no. 2 vol.4. Diakses 12 Februari 2016. <<http://www.savepageaspdf.com/0ea6a39990594c9680f098ed8b16a4b9/hutasoi.pdf>>
- William & Wilkins, L. (2003). *Wound care made incredibly easy*. A walterskluwer company. London.
- Wyatt, Jhon. 2011. *Forensic Medicine*. New York: Oxford University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Pembuatan Minyak Kuda



Lampiran 2. Skema Kerja Pengujian Pada Hewan Coba




Lampiran 4. Persentase Perubahan Panjang Luka Sayat $\frac{n_0-n_1}{n_0} \times 100$

Tabel 5. Persentase Perubahan Panjang Luka sayat

Hari ke-	Minyak Lemak Kuda Murni			Konsentrasi 10%			Konsentrasi 20%			Bioplacenton			Tanpa Pengobatan		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6,6	3,3	6,6	10	6,6	3,3	13,3	10	6,6	6,6	10	6,6	0	0	3,3
3	13,3	13,3	10	10	13,3	6,6	13,3	16,6	10	16,6	13,3	16,6	3,3	6,6	10
4	23,3	26,6	13,3	16,6	20	10	20	20	13,3	26,6	26,6	40	10	10	10
5	23,3	33,3	20	23,3	30	20	30	30	20	33,3	36,6	50	10	13,3	16,6
6	33,3	36,6	33,3	30	33,3	23,3	36,6	33,3	26,6	46,6	50	53,3	16,6	20	20
7	43,3	43,3	40	36,6	40	33,3	43,3	40	26,6	60	63,3	73,3	20	20	30
8	53,3	50	43,3	40	50	36,3	43,3	50	23,3	70	70	80	26,6	30	33,3
9	66,6	63,3	56,6	50	50	40	56,6	53,3	43,3	76,6	86,6	90	33,3	36,6	43,3
10	76,6	76,6	66,6	60	56,6	46,6	63,3	63,3	46,6	90	100	100	40	40	43,3
11	83,3	90	80	66,6	60	53,3	70	73,3	56,6	100			43,3	43,3	50
12	100	100	93,3	76,6	66,6	63,3	76,6	80	63,3				50	53,3	56,6
13			100	83,3	73,3	73,3	83,3	90	73,3				60	63,3	60
14				86,6	76,6	83,3	93,3	100	83,3				73,3	70	66,6
15				100	90	90	100		90				83,3	73,3	70
16					100	100			100				93,3	83,3	76,6
17													100	86,6	90
18														100	100

Lampiran 5. Grafik Persentase Perubahan Panjang Luka sayat

Grafik 1. Persentase Perubahan Panjang Luka sayat



*Lampiran 6. Efek Penyembuhan Luka Sayat***Tabel 6.** Efek Penyembuhan Luka Sayat

Konsentrasi	Replikasi	Hari ke-n luka tertutup 100%
Minyak kuda murni	1	12
	2	12
	3	13
Minyak kuda konsentrasi 10%	1	15
	2	16
	3	16
Minyak kuda konsentrasi 20%	1	15
	2	14
	3	16
Bioplacenton®	1	11
	2	10
	3	10
Tanpa pengobatan	1	17
	2	18
	3	18

Lampiran 7. Perhitungan RAL**Tabel 7.** Perhitungan RAL

Perlakuan	Hari ke-n luka tertutup 100%			Jumlah	Rata-rata
	1	2	3		
Minyak kuda murni	12	12	13	37	12,3
Minyak kuda konsentrasi 10%	15	16	16	47	15,6
Minyak kuda konsentrasi 20%	15	14	16	45	15
Bioplacenton®	11	10	10	31	10,3
Tanpa pengobatan	17	18	18	53	17,6
Jumlah	69	70	74	213	70,8

Perhitungan Anova

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(213)^2}{15} = 3024,6$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (12)^2 + (12)^2 + (13)^2 + (15)^2 + (16)^2 + (16)^2 + (15)^2 + (14)^2 + \\ &\quad (16)^2 + (11)^2 + (10)^2 + (10)^2 + (17)^2 + (18)^2 + (18)^2 - \text{FK} \\ &= 3129 - 3024,6 \\ &= 104,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Perlakuan} &= \frac{(37)^2 + (47)^2 + (45)^2 + (31)^2 + (53)^2}{3} - \text{FK} \\ &= \frac{9373}{3} = 3024,6 \end{aligned}$$

$$= 3124,3 - 3024,6$$

$$= 99,7$$

$$\text{JK Galat} = \text{JK Total} - \text{JK perlakuan}$$

$$= 104,4 - 97,07$$

$$= 6,7$$

Derajat Bebas

$$\text{Db Total} = (r \times t) - 1$$

$$= (3 \times 5) - 1$$

$$= 14$$

$$\text{Db Perlakuan} = t - 1$$

$$= 5 - 1$$

$$= 4$$

$$\text{Db Galat} = \text{db Total} - \text{db Perlakuan}$$

$$= 14 - 4$$

$$= 10$$

Kuadrat Tengah

$$\text{KT Perlakuan} = \frac{\text{Jumlah kuadrat perlakuan}}{\text{Derajat bebas perlakuan}} = \frac{99,7}{4} = 24,925$$

$$\text{KT Galat} = \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat bebas galat}} = \frac{6,7}{10} = 0,67$$

F. Hitung

$$\text{F.Hitung} = \frac{\text{KT perlakuan}}{\text{KT galat}} = \frac{24,925}{0,67} = 37,2$$

Lampiran 8. Analisis ragam dengan nilai F Tabel**Tabel 8.** Analisis ragam dengan nilai F Tabel

Sumber keragaman	Jumlah Kuadrat	Derajat bebas	Kuadrat tengah	F-hitung	F-tabel	
					1 %	5%
Perlakuan	99,7	4	24,925	37,2**	3,84	5,99
Galat	6,7	10	0,67			
Total	104,4	14				

Perhitungan nilai LSD BNT 0,05 %

$$\text{LSD} = t(0,05) ; 10 \sqrt{2 \text{ KTG}/r}$$

$$= 1,812 \sqrt{1,34/3}$$

$$= 1,812 \times 0,014$$

$$= 0,025$$


$$\text{LSD} = t(0,01) ; 10 \sqrt{2 \text{ KTG}/r}$$

$$= 2,764 \sqrt{1,34/3}$$

$$= 2,764 \times 0,014$$

$$= 0,046$$

Lampiran 9. Gambar metode refluks



Gambar 4. Lemak ditimbang



Gambar 5. Sampel direfluks selama 3-4 jam



Gambar 6. Hasil refluks
diupkan

Lampiran 10. Gambar pengujian hewan coba




Gambar 7. Bulu kelinci dicukur



Gambar 8. Diberi luka sepanjang 3 cm



Gambar 9. Pengukuran luka



Gambar 10. Luka diberi obat

*Lampiran 10. Gambar Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) saat terbentuknya karopeng*



Lampiran 11. Gambar kontrol sembuh



RIWAYAT HIDUP



Istiqamah, lahir di Pangkep, 21 April 1994. Anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan suami isteri H. Mekka Zainuddin dan Subaedah. Pendidikan formal penulis dimulai dibangku sekolah Dasar di SDN 30 Sumpang Bitu mulai tahun 2000 sampai 2006. Kemudian pada tingkat SMP di SMPS Semen Tonasa pada tahun 2006 sampai dengan 2009.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat SMA di SMA Semen Tonasa pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama berhasil diterima sebagai mahasiswa jurusan Farmasi, fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.