

**KEMAMPUAN BAKTERI *Pseudomonas aeruginosa* DALAM MENURUNKAN  
KANDUNGAN TIMBAL (Pb) LIMBAH CAIR LABORATORIUM KIMIA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Kimia Jurusan Kimia  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:  
**AYU ASTUTI**  
NIM: 60500112016

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ayu Astuti  
NIM : 60500112016  
Tempat/ Tgl. Lahir : Padangloang/ 01 November 1994  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Perumahan Zarindah Permai Blok S. 6  
Judul : Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Timbal (Pb) Limbah Cair Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar.

Menyatakan yang sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti bahwa skripsi ini merupakan tiruan, duplikat, plagiat dan semacamnya atau bahkan dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal berdasarkan hukum yang berlaku.

Samata-Gowa, Agustus 2016

Penyusun

**Ayu Astuti**  
**NIM: 60500112016**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Timbal (Pb) Limbah Cair Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar,” yang disusun oleh Ayu Astuti, NIM : 60500112016, Mahasiswa Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa 16 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 16 Agustus 2016 M  
13 Dzulkaidah 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Iin Novianty, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Muh. Galib, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pelaksana	: Jusmulyadi, S.T.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag.  
Nip. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis haturkan dan persembahkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Timbal (Pb) Limbah Cair Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar”.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa dan bantuan moril maupun materi. Terkhusus penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga, Ayahanda (Muh. Jufri) dan Ibunda (Rosmina) atas segala bentuk dukungan, doa, dan bantuannya baik moril maupun materil serta untuk semua pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si. selaku sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan kritik serta saran yang sangat bernilai dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memotivasi dan memberikan kritik serta saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si., Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si. dan Bapak Prof. Dr. H. Muh. Galib, M.Ag. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Kimia, seluruh staf dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan tak ternilai.
9. Laboran Jurusan Kimia Kak Awaluddin Ip, S.Si., M.Si., Kak Ahmad Yani, S. Si., Kak Andi Nurahma, S.Si., Kak Nuraini, S.Si., terkhusus untuk Kak Fitria Azis, S.Si., S.Pd., dan Kak Ismawanti, S.Si. penulis ucapkan terima kasih atas motivasi, dukungan dan bantuannya.
10. Sahabatku dan juga rekan penelitian (Siti Fauziah) terima kasih atas segala motivasi, doa, bantuan dan juga yang senantiasa menemani dan berbagi ilmu dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuanganku Nurul Khaerah, Yuliana, Asriani, Riskayanti, Nurfadillah Yusuf, Rezky Nurfadillah Utami, Saiful Akbar sekaligus rekan seperjuangan angkatan 2012. Segenap senior angkatan 2011 dan junior angkatan 2013 dan 2014 serta semua pihak yang telah ikut membantu.
12. Segenap keluargaku Riska, Rifdha, Kak Afni, Inho, San, Daddy, Kak Dian, Kak Eka, Zul, Sahrul, Faldy, Arif dan Uta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.


13. Terima kasih buat Fahri Pman yang telah menemani, memberi motivasi, semangat, doa serta bantuan moril maupun materil dari awal penelitian hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah S.W.T penulis panjatkan doa semoga amal serta kebaikan mereka mendapat ridho-Nya, amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum wr.wb*



Samata-Gowa, Agustus 2016

Penulis,

**Ayu Astuti**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1-6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6-7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Limbah Laboratorium .....	8-11
B. Karakteristik Limbah Cair .....	11-14
C. Timbal dan Dampaknya bagi Kesehatan dan Lingkungan .....	14-18
D. Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	18-22

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat .....	23
B. Alat dan Bahan .....	23
C. Prosedur Kerja .....	24-26

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	27-31
B. Pembahasan .....	31-43

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44

DAFTAR PUSTAKA .....	45-47
----------------------	-------

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	48-62
-------------------------	-------

RIWAYAT HIDUP.....	xiv
--------------------	-----



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	30
Tabel 4.2 Perbandingan Kandungan Timbal Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	31




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	18
Gambar 4.1 Isolat Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	27
Gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	28
Gambar 4.3 Pengaruh pH Terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ...	35
Gambar 4.4 Pengaruh TSS terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ...	36
Gambar 4.5 Pengaruh BOD terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ...	37
Gambar 4.6 Pengaruh COD terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ...	38
Gambar 4.7 Degradasi Logam Timbal Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	40
Gambar 4.8 Mekanisme Biosorpsi Pb pada Dinding Sel Bakteri .....	41
Gambar 4.9 Struktur Kimia Metallothionein .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Skema Penelitian .....	48
LAMPIRAN 2. Skema Prosedur Kerja .....	49-53
LAMPIRAN 3. Analisis Data .....	54-57
LAMPIRAN 4. Nilai OD Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	58
LAMPIRAN 5. Dokumentasi Penelitian .....	59-62



## ABSTRACT

**Name** : Ayu Astuti  
**NIM** : 60500112016  
**Title of Essay** : **The Ability of Bacteria *Pseudomonas aeruginosa* in Lowering the Content of Lead ( Pb ) Liquid Waste Chemical Laboratory UIN Alauddin Makassar**

---

---

Every year lead ( Pb ) are used in lab and research activities in the Analytical Chemistry Laboratory UIN Alauddin Makassar. Alternatives to reduce waste that lead to the degradation process involving bacteria, one of the bacteria *Pseudomonas aeruginosa*. The purpose of this study to determine the optimum incubation time to reduce lead content by the bacteria *Pseudomonas aeruginosa*, know the characteristics of the effluent before and after the use of bacteria *Pseudomonas aeruginosa* and *Pseudomonas aeruginosa* determine the activity in lowering the lead content. Stages of the study include a preliminary test (measurement of lead content, pH, TSS, BOD and COD) in wastewater , the measurement of the growth curve of bacteria, waste and degradation test in the final test with the same parameters. The rate of degradation using the tool Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS).

Results of research for the old waste (L.A1) and new waste (L.A2) showed *Pseudomonas aeruginosa* has the optimum incubation time of 24 hours with fixed pH value , increased TSS , BOD and COD L.A1 increased , while the BOD and COD L.A2 decline. *Pseudomonas aeruginosa* is able to lower the lead content in the Analytical Chemistry Laboratory Wastes UIN Alauddin Makassar 99%.

**Keywords:** Liquid Waste, *Pseudomonas aeruginosa*, Timbale (Pb),

## ABSTRAK

**Nama : Ayu Astuti**

**Nim : 60500112016**

**Judul : Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Timbal (Pb) Limbah Cair Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar**

---

---

Setiap tahun timbal (Pb) digunakan pada aktivitas praktikum dan penelitian di laboratorium Kimia Analitik UIN Alauddin Makassar. Alternatif untuk mengurangi limbah timbal yaitu dengan proses degradasi melibatkan bakteri, salah satunya bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan waktu inkubasi optimum untuk menurunkan kandungan timbal oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, mengetahui karakteristik limbah cair sebelum dan setelah pemakaian bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan mengetahui aktivitas bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal. Tahapan penelitian ini meliputi uji pendahuluan (pengukuran kandungan timbal, pH, TSS, BOD dan COD) pada limbah, pengukuran kurva pertumbuhan bakteri, uji degradasi pada limbah dan uji akhir dengan parameter yang sama. Laju degradasi menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

Hasil penelitian untuk limbah lama (L.A1) dan limbah baru (L.A2) menunjukkan *Pseudomonas aeruginosa* mempunyai waktu inkubasi optimum 24 jam dengan nilai pH tetap, TSS meningkat, BOD dan COD L.A1 meningkat, sedangkan BOD dan COD L.A2 menurun. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mampu menurunkan kandungan timbal dalam limbah laboratorium Kimia Analitik UIN Alauddin Makassar sebesar 99%.

**Kata kunci :** Limbah Cair, *Pseudomonas aeruginosa*, Timbal (Pb)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Pertumbuhan penduduk dunia saat ini semakin cepat dan perkembangan industri yang semakin pesat menyebabkan semakin banyaknya bahan buangan yang bersifat racun atau toksik yang dibuang ke lingkungan begitu saja tanpa memikirkan dampaknya. Bahan-bahan buangan ini nantinya cepat atau lambat akan menjadi limbah dan akan mencemari lingkungan dalam jumlah yang sulit di kontrol secara baik dan tepat. Termasuk di Indonesia, sumber pencemar yang ada di lingkungan sangat beragam macam dan sumbernya, dapat berasal dari limbah rumah tangga, perusahaan-perusahaan, pertambangan, sekolah, universitas, industri dan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, sebagaimana limbah atau sisa suatu usaha dan kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3 merupakan sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun diakibatkan dari sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemarkan lingkungan hidup. Salah satu sumber yang dapat menghasilkan limbah yang sifatnya beracun dan toksik yaitu laboratorium.

Laboratorium banyak terdapat di industri, sekolah dan universitas serta di tempat-tempat lain. Laboratorium kimia digunakan dalam melakukan percobaan atau

eksperimen dengan menggunakan bahan kimia sebagai bahan utamanya, serta bahan kimia yang digunakan bermacam-macam dari yang sifatnya ramah lingkungan, sedikit berbahaya, hingga dapat menyebabkan dampak yang besar apabila tidak ditangani dengan baik. Laboratorium ini dapat dikatakan setiap hari beroperasi sehingga dari kegiatan di dalamnya akan menghasilkan limbah yang kemudian disebut sebagai air buangan tercemar secara fisik, biologis, kimia bahkan mungkin radioaktif (Yahya, 2012: 2), baik dalam bentuk padatan maupun cairan yang banyak ditemukan dalam air buangan atau limbah yang dihasilkan oleh laboratorium.

Limbah laboratorium yang tergolong bahan berbahaya dan beracun memerlukan penanganan secara khusus terutama yang berbentuk cairan yang dapat dengan mudah tersebar dimana-mana. Akan tetapi, dalam prakteknya limbah cair laboratorium hingga saat ini belum dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Limbah cair laboratorium sering dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan yang memadai. Anggapan bahwa praktek pembuangan limbah cair laboratorium tersebut terjadi di institusi pendidikan, penelitian dan pengembangan baik instansi pemerintah maupun swasta, maka kegiatan akademik dan penelitian semacam ini sangat berpotensi mencemari lingkungan mengingat kegiatan laboratorium umum berlangsung secara rutin dalam kurun waktu yang sangat lama (Suprihatin dan Nastiti, 2010: 45). Berbagai macam bahaya yang terdapat dalam buangan kimia cair yaitu bahan organik maupun bahan anorganik mulai dari alkohol dan sejenisnya bahkan logam-logam yang berbahaya dapat dihasilkan dari proses pengolahan bahan kimia termasuk limbah yang terdapat di laboratorium kimia UIN Alauddin Makassar.

Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar mempunyai 6 laboratorium yaitu laboratorium analitik, laboratorium organik, laboratorium kimia fisika, laboratorium biokimia, laboratorium anorganik dan laboratorium instrumen yang banyak mengandung zat-zat berbahaya yang bersumber dari hasil samping penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan di laboratorium baik bahan organik maupun bahan anorganik. Laboratorium Kimia Analitik UIN Alauddin Makassar, bahan anorganik seperti logam berat timbal banyak digunakan dalam kegiatan praktikum setiap tahunnya dan biasanya digunakan untuk penelitian mahasiswa. Hal ini menyebabkan bahan buangan logam berat timbal menjadi meningkat pada laboratorium tersebut.

Salah satu logam pencemar prioritas tinggi atau bahan hasil penggunaan di laboratorium yang sifatnya beracun dan berbahaya adalah logam berat timbal. Akumulasi timbal pada tubuh manusia akan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi kesehatan, diantaranya kerapuhan tulang, rusaknya kelenjar reproduksi, kerusakan otak, dan keracunan akut pada sistem saraf pusat. Beberapa metode kimia maupun biologi telah dicoba untuk menanggulangi logam berat yang terdapat di dalam limbah, diantaranya adsorpsi, pertukaran ion, dan pemisahan dengan membran (Permata, dkk, 2012: 1). Salah satu cara untuk mengurangi kadar logam berat khususnya logam timbal yang dapat mencemari lingkungan yaitu dengan menggunakan bakteri atau proses akumulasinya digunakan bakteri untuk menurunkan kadarnya (Junopia, 2015).

Bakteri terkenal dikalangan masyarakat sebagai makhluk hidup yang tidak mampu terlihat dengan kasat mata, namun banyak menimbulkan bahaya bahkan dapat mendatangkan penyakit menular. Disamping hal itu bakteri juga memiliki peran

penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-Nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.*

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini mengundang manusia untuk berpikir dan merenung tentang sekian banyak hal: pertama, tentang penciptaan langit dan bumi. Kedua, tentang pergantian malam dan siang. Ketiga, tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Keempat, tentang apa yang Allah SWT turunkan dari langit berupa air. Kelima, tentang berbagai binatang yang diciptakan Allah SWT (Shihab, Quraish).

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

*“Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan,”* dalam bermacam-macam bentuk, warna dan manfaat, kecil dan besar. Dan dia mengetahui semuanya itu dan memberikan risiko kepada-Nya tidak ada satupun dari hewan-hewan itu yang tidak terjangkau atau tersembunyi dari-Nya (Tafsir Ibnu Katsir, 2003: 315).

Binatang atau hewan yang dimaksud dalam tafsir ialah salah satunya termasuk mikroorganisme atau mikroba. Walaupun banyak mikroba yang menyebabkan kerugian kepada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan manusia, kegunaan mikroba untuk kelangsungan hidup di bumi sangat penting. Contoh sederhananya adalah tanpa adanya mikroba maka antibiotik tidak akan pernah ada. Tanpa adanya pula peran mikroba dalam proses pembuatan makanan, maka jenis makanan fermentasi tidak akan ada untuk di konsumsi, serta masih banyak yang lain dengan menggunakan bantuan mikroba.

Alternatif penanggulangan lingkungan tercemar biasa dikatakan dengan teknik bioremediasi atau suatu teknologi yang ramah lingkungan, efektif dan ekonomis dengan memanfaatkan aktivitas mikroba seperti bakteri. Melalui teknologi ini diharapkan dapat mereduksi limbah-limbah buangan yang ada dan mendapatkan produk samping dari aktivitas tersebut. Bioremediasi ini salah satu teknologi yang inovatif dalam pemanfaatan bakteri, mikroba atau enzim (Aliyanta, dkk, 2011: 431).

Bakteri jenis *Pseudomonas* memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar logam berat yaitu logam timbal dengan melalui proses penyerapan, yang memiliki flagel, memerlukan oksigen, berbentuk batang yang sifatnya gram negatif serta dapat bersifat patogen untuk tubuh. Berdasarkan penelitian Junopia (2015), hasil isolasi bakteri terhadap sampel yang diperoleh dari Danau Tempe Kab. Wajo Sulawesi Selatan memiliki kemampuan mendegradasi logam timbal dari 1 ppm menjadi 0,45 ppm merupakan jenis bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Menurut Khoiroh (2014), dalam penelitiannya bioremediasi logam berat timbal dalam lumpur lapindo menggunakan campuran bakteri (*Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa*), persen penurunan kadar logam berat

timbal tertinggi yaitu dengan persen penurunan sebesar 65% dari kadar awal logam sebesar 3,5 ppm menjadi 1,21 ppm. Genus *Pseudomonas* dapat membantu proses penghilangan logam berat dari tanah (Refdinal, dkk, 2014: 42). Bakteri ini juga mampu memberikan dampak negatif, namun dapat dimanfaatkan untuk lebih bermanfaat lagi dalam bidang sains serta untuk kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dilakukanlah penelitian yaitu mengenai kemampuan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal limbah Laboratorium Kimia Analitik UIN Alauddin Makassar.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa waktu inkubasi optimum untuk menurunkan kandungan timbal oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa*?
2. Bagaimana karakteristik limbah cair sebelum dan setelah pemakaian bakteri *Pseudomonas aeruginosa*?
3. Bagaimana aktivitas bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal limbah cair laboratorium kimia Analitik UIN alauddin Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan waktu inkubasi optimum untuk menurunkan kandungan timbal oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.
2. Mengetahui karakteristik limbah cair sebelum dan setelah pemakaian bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

3. Mengetahui aktivitas bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal limbah cair laboratorium kimia Analitik UIN Alauddin Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang manfaat penggunaan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal.
2. Menambah literatur kepada peneliti selanjutnya tentang penggunaan bakteri dalam menurunkan kandungan timbal.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Limbah Laboratorium***

Perkembangan industri dan ilmu pengetahuan di Indonesia semakin hari semakin mengalami peningkatan atau perkembangan, baik itu munculnya industri dan ilmu-ilmu yang lebih modern serta perluasan produksi dari industri yang telah ada. Meningkatnya industri dan ilmu pengetahuan yang bergerak dalam bidang sains terkhusus ilmu kimia akan menambah proses tercemarnya lingkungan dari limbah yang dihasilkan dari setiap prosesnya. Seperti halnya penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya akan menyebabkan lingkungan tercemar dan terjadi penimbunan limbah jika tidak adanya usaha untuk meminimalisirnya.

Alamiahnya lingkungan ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa-senyawa pencemar yang masuk ke dalamnya melalui proses biologis dan kimiawi. Namun, sering kali beban pencemaran di lingkungan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan proses degradasi zat pencemar tersebut secara alami. Akibatnya, zat pencemar akan terakumulasi sehingga dibutuhkan campur tangan manusia dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada bahkan mengembangkannya untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut (Aliyanta, dkk, 2011: 431).

Zat pencemar salah satunya dapat bersumber dari air buangan atau biasa dikatakan dengan istilah limbah. Limbah yang selama ini yang di jumpai sangat beragam macamnya, baik itu dihasilkan dari buangan rumah tangga, industri seperti pabrik, maupun limbah yang dihasilkan dalam proses praktikum atau analisis

di laboratorium yang bersumber dari sekolah hingga ke perguruan tinggi. Limbah yang dihasilkan pula sangat beragam, dari yang tingkatan bahayanya rendah hingga ke tingkat beresiko tinggi sehingga dapat mengancam kenyamanan hidup makhluk hidup atau berujung pada kematian.

Kenyamanan hidup dapat terancam dari berbagai ulah tangan-tangan manusia sendiri dalam hal melakukan kegiatan di muka bumi ini tanpa memperhatikan aspek kebaikan didalamnya atau bahkan tangan-tangan manusia sengaja berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, seperti halnya yang tercantum dalam surah Ar-rum ayat 41 tentang kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Sabri, 2013: 153-154).*

Ayat ini menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan yang dapat berarti bumi mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta dapat kekurangan manfaat. Dimana kerusakan tersebut disebabkan sendiri oleh tangan manusia serta dapat membuat ekosistem menjadi tidak seimbang (Sabri, 2013: 155-156). Darat dan laut menjadi arena atau tempat terjadinya kerusakan, misalnya terjadinya kemarau

panjang yang menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang yang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor ulah manusia, dan Ibn-Asyur mengemukakan bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia, tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam (Tafsir Al-Mishbah), seperti kegiatan yang dapat menyebabkan lingkungan tercemar atau pengolahan hasil samping atau limbah yang kurang penanganannya sehingga menghasilkan lingkungan tercemar.

Laboratorium merupakan tempat dimana dilakukan suatu kegiatan pengujian hingga analisis untuk memperoleh data hasil uji yang akurat dan valid. Data yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium baik pengujian secara kualitatif maupun secara kuantitatif merupakan data yang dapat ditelusuri, selanjutnya dapat juga digunakan sebagai proses hukum. Berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan di laboratorium, mulai dari persiapan contoh untuk pengujian sampel sampai dengan kegiatan analisis lanjutan. Beberapa pengujian umum yang dilakukan di laboratorium antara lain pengujian fisika, kimia dan mikrobiologi (Said, 2009: 38). Biasanya proses atau tahapan pengujian hingga analisis yang dilakukan di dalam laboratorium akan menghasilkan suatu bahan sampingan yang tidak dapat digunakan lagi atau disebut dengan limbah, baik itu padat maupun cairan.

Limbah cair laboratorium merupakan suatu sumber polutan atau sumber bahan pencemar yang berbahaya, misalnya limbah cair dari residu analisis parameter *chemical oxygen demand* (COD), analisis logam-logam berat hingga analisis bahan-bahan organik. Limbah cair laboratorium hingga saat ini belum mendapat perhatian yang memadai, mulai dari masyarakat hingga para ilmuwan. Dilihat dari

segi jumlahnya, limbah cair yang dihasilkan oleh suatu laboratorium umumnya memang relatif sedikit, akan tetapi limbah cair ini tercemar berat oleh berbagai jenis bahan kimia yang bersifat toksik. Dalam kurun waktu yang lama dapat berdampak nyata pada lingkungan apabila tidak dikelola secara memadai dengan baik dan benar (Suprihatin dan Nastiti, 2010: 44-45).

Praktek pembuangan limbah cair laboratorium ke lingkungan tanpa adanya pengolahan yang memadai disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum tersedianya teknik pengolahan yang efektif dengan biaya terjangkau. Beberapa laboratorium saat ini telah menerapkan praktek pengelolaan dengan cara memisahkan dan mengumpulkan limbah cair berbahaya dan beracun terpisah dari limbah cair yang tidak berbahaya. Akan tetapi, setelah terkumpul dalam jumlah banyak, masalah lainpun sering muncul berkaitan dengan cara pengolahan dalam pembuangan limbah tersebut. Alternatif untuk mengirim limbah tersebut ke tempat pengolahan limbah B3 sering menghadapi masalah mengenai prosedur dan biaya (Suprihatin dan Nastiti, 2010: 45).

## **B. Karakteristik Limbah Cair**

### **1. Dissolved Oxygen (DO)**

Oksigen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berasa. Biasanya terdapat bebas di alam sebagai suatu zat yang dibutuhkan untuk melanjutkan kelangsungan hidup suatu makhluk hidup, atau sering disebut dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan. Oksigen terdapat di alam bebas sehingga semua makhluk hidup yang membutuhkannya dapat memanfaatkannya secara langsung. Oksigen ini merupakan sumber hidup bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya.

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terdapat di perairan dalam bentuk molekul oksigen bukan dalam bentuk molekul hidrogenoksida, biasanya dinyatakan dalam mg/L (ppm). Oksigen larut dalam air dan tidak bereaksi dengan air secara kimiawi. Pada tekanan tertentu, kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi oleh suhu. Faktor lain yang mempengaruhi kelarutan oksigen adalah pergolakan dan luas permukaan air terbuka bagi atmosfer. Daya larut  $O_2$  dalam air limbah kurang dari 95% dibandingkan dengan daya larut dalam air tawar. Terbatasnya kelarutan oksigen dalam air menyebabkan kemampuan air untuk membersihkan dirinya juga terbatas, sehingga diperlukan pengolahan air limbah untuk mengurangi bahan-bahan penyebab pencemaran. Apabila kadar DO dalam air tinggi maka akan mengakibatkan instalasi menjadi berkarat, oleh karena itu diusahakan kadar oksigen terlarutnya 0 ppm (Permata, dkk, 2012: 19-20).

## **2. Biochemical Oxygen Demand (BOD)**

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan ukuran jumlah zat organik yang dapat dioksidasi oleh bakteri aerob atau jumlah oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi sejumlah zat organik dalam keadaan aerob. Nilai BOD akan semakin tinggi jika derajat pengotoran dalam limbah semakin besar. BOD merupakan indikator pencemaran yang penting untuk menentukan kekuatan atau daya cemar air limbah, sampah industri, atau air yang telah tercemar. BOD biasanya dihitung dalam 5 hari pada suhu  $20^{\circ}C$ . Nilai BOD yang tinggi dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut, tetapi syarat BOD air limbah yang diperbolehkan dalam suatu perairan di Indonesia adalah sebesar 30 ppm. Pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal ( $DO_0$ ) dari sampel. Segera setelah pengambilan sampel kemudian diukur kandungan oksigen terlarut

pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan pada suhu tetap yaitu 20°C (Yahya, 2012: 4).

Uji BOD mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah: (1) dalam uji BOD ikut terhitung pula oksigen yang dikonsumsi oleh bahan-bahan organik atau bahan-bahan tereduksi lainnya, (2) uji BOD membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu lima hari, (3) uji BOD yang dilakukan selama lima hari itu masih belum dapat menunjukkan nilai total BOD, melainkan  $\pm 68\%$  dari total BOD, (4) uji BOD tergantung dari adanya senyawa penghambat di dalam air tersebut. BOD hanya dapat menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan tersebut (yahya, 2012: 5).

### **3. Chemical Oxygen Demand (COD)**

Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) adalah jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologi maupun yang sukar didegradasi menjadi CO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O, dimana pengoksidasi K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> digunakan sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air (Muthawali, 2012: 3).

Banyak zat organik yang tidak mengalami penguraian biologis secara cepat berdasarkan pengujian BOD lima hari, tetapi senyawa-senyawa organik tersebut juga mampu menurunkan kualitas air. Bakteri dapat mengoksidasi zat organik menjadi

CO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O. Kalium dikromat dapat mengoksidasi lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan nilai COD yang lebih tinggi dari BOD untuk air yang sama. Di samping itu, bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Sembilan puluh enam persen hasil uji COD yang selama 10 menit, kira-kira akan setara dengan hasil uji BOD selama lima hari (Permata, dkk, 2012: 20).

#### **4. Total Suspended Solid (TSS)**

Zat padat tersuspensi atau TSS adalah semua zat padat atau partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati seperti partikel-partikel anorganik yaitu pasir, lumpur, dan tanah liat. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan (Doraja dan Kuswytasari, 2012: 44).

#### **C. Timbal dan Dampaknya bagi Kesehatan dan Lingkungan**

Beberapa tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan industri di negara berkembang dan sedang berkembang menunjukkan grafik perkembangan yang terus meningkat. Dampak pertumbuhan ini secara nyata tampak pada meningkatnya kandungan logam-logam berat di lingkungan baik di darat maupun perairan. Sumber utama kandungan logam berat di lingkungan berasal dari bidang pertanian maupun industri. Sifat logam berat yang sulit didegradasi menyebabkan bahaya logam berat semakin nyata dan sangat berbahaya. Misalnya masuknya logam-logam berat dalam rantai makanan menyebabkan terakumulasinya logam-logam tersebut pada makhluk hidup di tingkat yang lebih tinggi. Sifat logam berat yang tetap tinggal pada kurun

waktu yang lama dalam jaringan makhluk hidup akan dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh makhluk hidup (Ariono, 1996: 23).

Timbal termasuk dalam kelompok logam berat golongan IVA dalam Sistem Periodik Unsur kimia, mempunyai nomor atom 82 yang berbentuk padat pada suhu kamar, bertitik lebur  $327,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  dan memiliki berat jenis sebesar  $11,34\text{ gr/cm}^3$ . Timbal jarang ditemukan di alam dalam keadaan bebas melainkan dalam bentuk senyawa dengan molekul lain, misalnya dalam bentuk  $\text{PbBr}_2$  dan  $\text{PbCl}_2$ . Logam timbal banyak digunakan sebagai bahan pengemas, saluran air, alat-alat rumah tangga dan hiasan. Bentuk oksida timbal digunakan sebagai pigmen atau zat warna dalam industri kosmetik serta dalam industri keramik yang sebagian besar diantaranya digunakan dalam peralatan rumah tangga. Bentuk aerosol anorganik dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup serta dalam makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Logam timbal dalam jangka waktu yang panjang dapat terakumulasi dalam tubuh karena proses penguraiannya yang lambat dan berlangsung lama (Gusnita, 2012: 96).

Biasanya ditemukan dalam batu batuan, tanah, tumbuhan maupun hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang pada umumnya kurang larut dalam air. Apabila dalam bentuk persenyawaannya, biasanya hampir tidak larut dalam air, namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik misalnya dalam lipid. Waktu keberadaan timbal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus angin dan curah hujan. Timbal tidak mengalami penguapan namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel yang dapat bersumber dari asap kendaraan maupun zat campuran dalam bahan bakar minyak, karena timbal merupakan sebuah

unsur maka tidak mengalami degradasi atau penguraian dan tidak dapat dihancurkan dengan mudah (Tangio, 2013: 501).

Timbal dalam segala bentuknya dapat bersifat racun yang berbahaya bagi kesehatan tubuh makhluk hidup terutama manusia. Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam timbal dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam timbal tersebut kedalam tubuh. Masuknya timbal kedalam tubuh terabsorpsi sangat lambat, sehingga terjadi penumpukkan dan menjadi dasar timbulnya keracunan. Proses masuknya timbal kedalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu melalui makanan dan minuman, udara dengan melalui jalur pernapasan dan dapat melalui penetrasi pada selaput atau lapisan kulit (Jaya, dkk, 2013: 10).

Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki oleh logam akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme dalam tubuh akan terputus. Lebih lanjut lagi, logam berat ini akan bertindak sebagai mutagen, atau karsinogen bagi manusia. Masing-masing logam berat tersebut memiliki beberapa dampak negatif terhadap manusia jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama (Ika dan Irwan, 2012: 182).

Racun syaraf juga salah satu dampak dari logam timbal yang bersifat kumulatif, destruktif dan kontinu pada sistem haemofilik, kardiovaskuler dan ginjal. Anak yang telah menderita toksisitas timbal lebih cenderung menunjukkan gejala hiperaktif, mudah bosan, mudah terpengaruh, sulit berkonsentrasi terhadap lingkungannya termasuk pada pelajarannya, serta akan mengalami gangguan pada masa dewasanya nanti yaitu anak akan menjadi lamban dalam proses berfikir,

sehingga biasanya orang akan mengalami keracunan timbal bila ia mengonsumsi timbal sekitar 0,2 sampai 2 mg/hari (Gusnita, 2012: 96).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menetapkan sebuah nilai tunjuk untuk timbal di dalam darah, tapi memperkirakan untuk WHO pada tahun 2004 bahwa 20% dari semua anak-anak memiliki kandungan timbal dalam darah diatas 10  $\mu\text{g/dL}$  dan kebanyakan dari mereka tinggal di negara berkembang yang akan mengurangi perkembangan IQ, bersikap kurang peduli, rusak alat pendengaran dan lemah dalam proses pertumbuhannya, dalam darah jika lebih dari 50  $\mu\text{g/dL}$  bisa menyebabkan rusaknya ginjal dan anemia serta apabila konsentrasi timbal 100  $\mu\text{g/dL}$  dalam darah anak akan menyebabkan penyakit serius, koma, hingga terjadinya kematian (Suherni, 2010: 3-4).

Berdasar dari adanya resiko logam timbal pada manusia, maka harus diadakan suatu perbaikan terhadap sistem pengolahan limbah logam-logam tersebut. Salah satunya adalah proses pengolahan dengan menggunakan mikroba atau mikroorganisme. Saat ini pengolahan secara biologis untuk mengurangi kadar logam berat dalam air limbah merupakan salah satu alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan dibandingkan dengan proses kimia, yang umumnya pada akhir pengolahan limbah masih ditemukan permasalahan dalam penanganan pembuangan limbah logam yang telah diolah. Kapasitas penyerapan logam pada beberapa biomassa tersebut bahkan terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan penukar ion komersial. Berbagai jenis mikroba seperti ganggang, jamur dan bakteri dapat digunakan sebagai adsorben alternatif untuk penyerapan ion logam di dalam air limbah. Kemampuan mikroorganisme untuk menyerap logam (bioremoval) dari larutan telah dikenal selama beberapa dekade terakhir. Penyerapan ion logam tersebut

dapat terjadi secara aktif dengan sel hidup atau secara pasif terjadi pada permukaan sel mati (Siswati, dkk, 2012: 68).

#### **D. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri yang mampu menggunakan lebih dari 75 senyawa organik yang berbeda sebagai sumber karbon dan energi, mudah tumbuh pada berbagai media pembiakan karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana, Bakteri ini dapat beradaptasi dan berkembang di tanah, air sungai, air laut, limbah air dan sebagainya. Tumbuh dengan optimal pada suhu 37°C serta pada PH media antara 6,0 – 9,0 (Jawetz, 1996 dalam Litaay, 2013: 3).

Klasifikasi *Pseudomonas aeruginosa* (Bergeys, 1996 dalam Husna, 2007: 30):

Kingdom	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Proteobacteria
Ordo	: Pseudomonadales
Family	: Pseudomonadaceae
Genus	: <i>Pseudomonas</i>
Species	: <i>Pseudomonas aeruginosa</i>



**Gambar 2.1** *Pseudomonas aeruginosa*

Ciri-ciri bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah gram negatif berbentuk batang, bergerak aktif dengan flagella pada ujung sel, berukuran sekitar 0,12 µm, terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan, kadang membentuk rantai pendek, secara umum koloninya mempunyai permukaan yang rata berwarna hijau kebiruan, serta berbau seperti buah anggur, sedangkan ada pula yang beranggapan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* berbentuk batang lurus atau melengkung, non sporulasi, tidak berkapsul, bersifat aerobik obligat dan oksidase positif (Jawetz, 1996 dalam Husna, 2007: 30-31).

*Pseudomonas aeruginosa* ditemukan di dalam saluran usus penderita diare atau enteritis akut. Bakteri ini sering ditemukan pada penderita gastroenteritis, maka bakteri ini digolongkan ke dalam patogen enterik. Bakteri ini akan dikeluarkan secara terus menerus pada fesesnya sampai jangka waktu 6 hari setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri tersebut. *Pseudomonas aeruginosa* mempunyai sifat enteropatogenik dan bakteri ini dapat memproduksi dua macam enterotoksin yaitu bersifat tahan panas dan yang tidak tahan panas. Makanan yang mungkin terkontaminasi oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* misalnya salad, dan bahan pembuat salad seperti tomat, seledri, wortel, kubis, ketimun, bawang merah, selain itu bakteri ini juga ditemukan pada susu (Husna, 2007: 30-31).

Meningkatnya penyakit infeksi bersumber dari mikroorganisme yang disebabkan oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* antara lain adalah infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, peradangan pada kulit, bakterimia, infeksi saluran pencernaan dan infeksi luka bakar. *Pseudomonas aeruginosa* adalah bakteri patogen yang bersifat oportunistik dan penyebab infeksi di rumah sakit. Bakteri ini mengkontaminasi air, makanan dan peralatan-peralatan medis. Hal ini akan menjadi


jalur penularan dan penyebaran dari satu penderita ke penderita lainnya. Angka insidensi terhadap infeksi nosokomial yang disebabkan oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sekitar 10-15% (Kurniawati, dkk, 2012: 2). *Pseudomonas aeruginosa* merupakan salah satu penyebab gram negatif bakteriemia yang bisa berlanjut menjadi sepsis. Bakteri ini banyak menginfeksi penderita di rumah sakit dengan membentuk koloni pada pembuluh darah melalui proses adhesi atau pelekatan (Hidayati, 2010: 1).

Menurut Junopia (2015), bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mampu mengurangi kadar timbal dalam limbah buatan dalam penelitiannya. Bakteri ini digunakan sebagai bioakumulasi atau bakteri yang dapat berperan sebagai biosorben untuk mengikat logam timbal dengan hasil konsentrasi logam timbal 1 ppm berkurang menjadi 0,45 ppm. Bakteri ini pula dapat menurunkan kandungan fosfat dalam limbah cair rumah sakit (Litaay, 2013). Berdasarkan Khoiroh (2014), bioremediasi logam berat timbal dalam lumpur Lapindo menggunakan campuran bakteri *Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa*, hasilnya yaitu mampu menurunkan kandungan logam timbal sebesar 65% dengan kadar awal sebesar 3,5 ppm menjadi 1,21 ppm.

Bakteri dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan atau mengekstrak logam dari lingkungan (tanah, air, sedimen) yang terkontaminasi logam melalui mekanisme pengubahan sifat kimia dari struktur pembentuk senyawa sebagai bioakumulasi, biotransformasi dan bioremediasi. Melalui mekanisme tersebut bakteri dapat menurunkan atau menghilangkan sifat toksik dari bahan pencemar (Isa dan Yuliana, 2013: 15).

Proses pengikatan logam atau penyerapan logam oleh mikroorganisme atau bakteri yaitu dimana dinding sel jasad hidup baik prokariotik maupun eukariotik

tersusun atas beberapa polisakarida, salah satu polisakarida yang terkandung dalam dinding sel yaitu senyawa alginat, mempunyai sifat ion *exchange* dengan mekanisme sebagai berikut (Siswati, dkk, 2012: 69) :



Dinding sel bakteri adalah lokasi utama untuk senyawa kimia yang mampu menyerap logam berat secara pasif. Mikroba yang mampu tumbuh dalam media tercemar logam berat mempunyai kemampuan mengakumulasi logam berat dalam dinding selnya. Jenis bakteri gram negatif umumnya lebih toleran karena struktur dinding selnya yang kompleks dimana dapat mengikat sebagian besar ion logam termasuk timbal (Shim dalam Junopia, 2015: 47).

Bioremoval logam berat dilakukan oleh mikroorganisme dengan membentuk ikatan antara sel dan logam berat, baik secara adsorpsi maupun absorpsi atau kompleksasi sehingga ion logam tersebut dapat terikat pada permukaan sel atau terakumulasi di dalam sel. Selain proses bioremoval, mikroorganisme juga dapat melakukan proses reduksi logam berat sehingga terbentuk kompleks ion logam berat yang tidak toksik. Kemampuan bakteri dalam menurunkan konsentrasi logam berat di lingkungan tumbuhnya dapat disebabkan karena kemampuan bakteri dalam mengakumulasi logam berat tersebut. Bakteri memiliki permukaan sel yang bermuatan negatif karena terbentuk dari berbagai struktur anion sedangkan logam berat adalah ion bermuatan positif sehingga dapat terjadi ikatan antara permukaan sel bakteri dan ion logam berat. Bakteri juga dapat mengakumulasi logam berat di dalam

sel dengan membentuk ikatan antara logam berat dengan suatu protein dalam sel yang disebut metalotionein (Satya, 2012: 565-571).

Sifat bakteri dalam mengikat logam dapat dipengaruhi dari berbagai macam faktor, antara lain yaitu temperatur atau suhu, pH atau keasaman (basa atau netral) serta sifat yang mampu menarik logam berat yang akan berikatan dengan bakteri tertentu. Bioremediasi atau bioakumulasi adalah cara yang digunakan oleh mikroba untuk menangani limbah logam berat. Prinsipnya yaitu mengikat ion-ion logam pada struktur sel mikroba tersebut. Pengikatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu sistem transport aktif kation, ikatan permukaan, serta beberapa mekanisme lain yang belum diketahui (Ariono, 1994: 24).

Keberadaan bakteri di lingkungan umumnya dapat mempercepat proses degradasi zat pencemar menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bakteri mampu memecah senyawa kompleks yang berbahaya bagi lingkungan menjadi senyawa yang lebih sederhana yang ramah lingkungan. Selain membantu menurunkan toksisitas, keberadaan bakteri dalam limbah atau polutan logam dapat juga menyebabkan toksisitas terhadap lingkungan yaitu melalui proses *bioleaching*. Bagi kalangan industri yang menghasilkan limbah logam berat khususnya logam timbal, kehadiran bakteri ini sangat tidak dikehendaki karena dapat melepaskan atau melarutkan logam berat dalam sedimen limbah ke lingkungan perairan (Isa dan Yuliana, 2013: 18).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Mei 2016 di Laboratorium Biokimia, analisis Spektrofotometer UV-Vis di Laboratorium Instrumen Jurusan Sains Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Analisis Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), DO, COD dan BOD dilakukan di Laboratorium Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kimia (BBLK) Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), spektrofotometer UV-VIS, neraca analitik, autoklaf, laminar air flow, oven, shaker inkubator, sentrifuge, inkubator, lemari asam, pompa vakum, desikator, kompor listrik dan peralatan gelas.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alkohol 70%, aquadest ( $H_2O$ ), asam klorida (HCl) encer, asam nitrat ( $HNO_3$ ) p.a, kapas steril, kertas saring whatman no. 42, media NA, media NB, sampel air limbah laboratorium kimia analitik, timbal nitrat [ $Pb(NO_3)$ ] dan tisu.

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Pembuatan Media Padat**

Sebanyak 2,3 gram NA dilarutkan ke dalam 100 mL aquades di aduk sambil dipanaskan sampai larut sempurna. Di autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Hadioetomo, 1985 dalam Caesar, dkk, 2014: 45).

#### **2. Pembuatan Media Cair**

Sebanyak 0,8 gram NB dilarutkan ke dalam 100 mL aquadest di aduk sambil dipanaskan sampai larut sempurna. Di autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Hadioetomo, 1985 dalam Caesar, dkk, 2014: 45).

#### **3. Peremajaan Isolat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

Meremajakan isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada media padat yang telah dibuat, dengan cara menginokulasikan isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada cawan petri, diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam (Khoiroh, 2014: 3).

#### **4. Penentuan Waktu Inkubasi Optimum**

Media cair dibuat sebanyak 150 mL yang ditambahkan dengan 20 mg/L Pb(NO<sub>3</sub>) kemudian disterilisasi dalam autoclaf (Satya, 2012: 567). Setelah sterilisasi selesai, media cair ini ditambahkan beberapa ose isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* lalu dishaker pada kecepatan 150 rpm dengan suhu 37°C. Melakukan pengambilan sampel pada selang waktu 6 jam. Mengukur OD menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 610 nm (Ciccyliana dan Refdinal, 2012: 2).

## 5. Pemeriksaan Karakteristik Limbah Cair

### a. Derajat keasaman (pH)

Pengukuran pH limbah cair dilakukan dengan menggunakan kertas pH universal yaitu dengan mencelupkan kertas pH pada limbah dan mencocokkannya pada trayek pH.

### b. Pemeriksaan TSS

TSS (*Total Suspended Solid*) ditentukan dengan metode Gravimetri. Sebanyak 100 mL aquades disaring dengan kertas Whatman nomor 42, kemudian kertas saring tersebut dipanaskan di dalam oven dengan suhu 105°C selama 1 jam dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit, lalu ditimbang berat awalnya. Diambil 100 mL sampel limbah cair dengan menggunakan kertas saring yang telah diketahui beratnya, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 105°C selama 1 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator selama kurang lebih 15 menit, lalu ditimbang sampai berat akhirnya konstan (Alaerts, 1984 dalam Irmanto, dkk, 2012: 135-136).

### c. Pengukuran BOD

Pengukuran BOD pada limbah cair laboratorium dilakukan dengan metode winkler yang menggunakan titrasi iodometri (SNI 06-6989.72-2009).

### d. Pengukuran COD

Pengukuran COD menggunakan metode titrimetri dimana zat organik di dalam air dioksidasi dengan  $\text{KmnO}_4$  direduksi oleh asam oksalat berlebih. Kelebihan asam oksalat dititrasi kembali dengan  $\text{KmnO}_4$  (SNI 06-6989.22-2004).

## 6. Uji kadar Timbal dalam Limbah Laboratorium

### a. Uji Kualitatif

2 mL sampel air limbah ditambahkan 1 mL HCl encer dan diamati adanya endapan putih, lalu dipanaskan (Svehla, 1985: 207).

### b. Uji kuantitatif

100 mL sampel air limbah ditambahkan 5 mL HNO<sub>3</sub> p.a. lalu tambahkan batu didih. Dipanaskan hingga volumenya mencapai 15-20 mL. Dinginkan dan tambahkan aquadest 50 mL dan saring ke dalam labu ukur 100 mL impitkan dan homogenkan. Diukur pada spektrofotometer serapan atom (SNI 06-6989.8-2004).

## 7. Uji Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam mendegradasi Timbal (Pb) pada Limbah Laboratorium Kimia Analitik

Menimbang media NB sebanyak 0,8 gram dan melarutkan dalam 100 mL aquadest steril. Menambahkan sampel air limbah sebanyak 5 mL. Disterilisasi. Memasukkan isolat bakteri sebanyak 3 ose ke dalam media tersebut lalu dishaker dan diinkubasi selama 72 jam. Melakukan pengambilan sampel setiap 24 jam, selanjutnya sampel disentrifuge (12000 rpm, 30 menit) dan diambil supernatannya. 10 mL supernatan didestruksi dengan 1 mL asam nitrat (HNO<sub>3</sub>) pekat sampai jernih. Sampel disaring ke dalam labu takar 50 mL dan diukur pada spektrofotometer serapan atom (Chaterjee *et al*, dalam Junopia, 2015: 34).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Peremajaan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

Peremajaan isolat murni bakteri *Pseudomonas aeruginosa* yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Farmasi UIN Alauddin Makassar dilakukan dengan menggunakan media NA yang merupakan sumber nutrisi bagi bakteri. Media ini mengandung ekstrak beef, pepton, NaCl, air dan agar sebagai pematat.




**Gambar 4. 1** Isolat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Hasil dari peremajaan ini yaitu bakteri mampu tumbuh dengan baik pada media tersebut. Pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya koloni berwarna putih dan tumbuh mengikuti goresan yang diinokulasikan pada media padat. Selanjutnya hasil dari peremajaan ini akan diadaptasikan ke media cair untuk proses lanjutan.

## 2. Penentuan Waktu Inkubasi Optimum

Penentuan waktu inkubasi optimum dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Bakteri ditumbuhkan dalam media cair NB dengan penambahan timbal sebanyak 20 ppm. Media cair ini mengandung nutrisi sama dengan media NA yang digunakan untuk meremajakan bakteri. Media yang telah mengandung isolat bakteri dihomogenkan menggunakan shaker *waterbath* dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 37°C. Pengamatan ini dilakukan dengan mengukur OD menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan pengambilan sampel setiap selang waktu 6 jam.



**Gambar 4.2** Kurva Pertumbuhan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Kurva pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan beberapa fase yaitu fase adaptasi dimulai dari 0-6 jam, fase eksponensial terjadi pada 6-18 jam, fase stasioner terjadi pada 18-36 jam dan fase kematian terjadi pada 48 jam.

### 3. Uji Pendahuluan Logam Timbal pada Limbah Cair Laboratorium Kimia

#### a. Uji Kualitatif

Uji kualitatif bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya logam timbal dalam limbah laboratorium. Uji ini dilakukan dengan penambahan HCl encer ke dalam limbah dengan hasil positif membentuk endapan putih (Svehla, 1985: 207). Uji kualitatif dilakukan dengan menggunakan sampel limbah cair limbah laboratorium kimia analitik, laboratorium kimia organik, laboratorium kimia fisika, laboratorium biokimia, laboratorium kimia anorganik dan laboratorium kimia instrumen.

Hasil uji kualitatif pada setiap limbah cair laboratorium kimia yang diperoleh menunjukkan hasil negatif, yaitu setelah penambahan HCl tidak membentuk endapan putih. Hal ini dikarenakan dalam limbah tersebut mengandung logam timbal dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak mampu dideteksi hanya dengan uji kualitatif. Uji kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam limbah tersebut tidak mengandung logam timbal.

Uji kualitatif yang dilakukan memberikan hasil negatif, sehingga untuk mengetahui lebih jelasnya kadar atau konsentrasi logam timbal yang terdapat pada limbah, maka dilanjutkan dengan uji kuantitatif untuk mengetahui konsentrasi logam timbal dalam limbah cair laboratorium kimia.

#### b. Uji Kuantitatif

Uji kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kadar atau konsentrasi logam timbal dalam limbah cair laboratorium kimia. Uji kuantitatif ini dilakukan dengan melalui proses destruksi asam dengan penambahan asam kuat untuk merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga yang mampu terdeteksi dalam Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) adalah logam timbal.

Limbah kimia analitik yang digunakan ada 2 macam yaitu limbah lama (L.A1) dan limbah baru (L.A2). L.A1 merupakan limbah yang sudah lama ditampung yang menimbulkan bau yang sangat menyengat dan memiliki warna hitam kecoklatan dan sangat pekat karena mengandung banyak minyak dan bahan buangan lainnya seperti logam berat timbal yang memiliki konsentrasi sebesar 0,1765 mg/L, sedangkan L.A2 merupakan limbah yang masih baru ditampung, memiliki warna yang masih bening dan bau yang tidak menyengat serta memiliki konsentrasi timbal sebesar 0,1542 mg/L.

#### 4. Karakteristik Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Analisis limbah cair laboratorium dilakukan untuk mengetahui karakteristik limbah cair yang meliputi beberapa parameter yaitu pH, konsentrasi timbal, nilai TSS, DO, COD dan BOD. Hasil yang diperoleh sebelum dan setelah penambahan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Karakteristik Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

No.	Jenis Limbah Parameter Uji	L.A1		L.A2	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	pH	1	1	2	2
2.	Konsentrasi timbal (mg/L)	0,12	<0,01	0,08	<0,01
3.	TSS (mg/L)	7917	8059	60	145
4.	DO (mg/L)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
5.	BOD (mg/L)	7692,80	8240	6541,2	435,24
6.	COD (mg/L)	19230,50	20565,75	16345,93	1064,58

### 5. Uji Degradasi Logam Timbal oleh Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Analisis untuk mengetahui penurunan kandungan timbal dilakukan dengan menginokulasikan bakteri kedalam media steril yang berisi limbah yang kemudian dianalisis kadar timbalnya menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil konsentrasi timbal yang diperoleh sebelum dan setelah penambahan isolat bakteri adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2** Perbandingan Kandungan Timbal Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

No.	Jenis Limbah	Konsentrasi Timbal (mg/L)	
		Sebelum	Setelah
1.	L.A1	0.12	<0,01
2.	L.A2	0.08	<0,01

### B. Pembahasan

#### 1. Peremajaan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Peremajaan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* bertujuan untuk memperoleh stok bakteri yang ditumbuhkan dari media satu ke media yang lainnya. Isolat murni bakteri yang diremajakan diperoleh dari laboratorium Mikrobiologi Farmasi UIN Alauddin Makassar. Bakteri diremajakan dengan metode cawan gores yakni bakteri ditumbuhkan pada wadah cawan petri yang berisi media padat. Media merupakan kumpulan sumber nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh. Media padat yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah media NA yang merupakan media umum untuk pertumbuhan bakteri, dan juga bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri yang mudah tumbuh pada berbagai

media pembiakan karena kebutuhan nutrisinya yang sangat sederhana (Jawetz, 1996 dalam Husna, 2007: 31).

Media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus terlebih dahulu disterilisasi agar bakteri atau mikroorganisme yang terdapat dalam media dapat mati sehingga tidak akan menyebabkan kontaminan terhadap media. Sterilisasi media digunakan alat autoclaf dengan suhu 121°C selama 15 menit. Perpaduan suhu dan tekanan pada autoclaf akan memberikan kekuatan untuk mematikan sel-sel mikroba, dan waktu yang digunakan selama 15 menit berfungsi untuk memaksimalkan transfer panas pada objek yang disterilisasi dalam autoclaf.

Media yang telah steril ditambahkan bakteri dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 48 jam. Proses inkubasi bertujuan agar bakteri tumbuh pada suhu yang sesuai. Inkubasi dilakukan selama 48 jam karena bakteri umumnya telah tumbuh pada 24 hingga 48 jam. Berdasarkan pada gambar 4.1 bakteri yang tumbuh pada media tersebut berwarna putih, bentuk koloni bulat dan transparan serta mengikuti garis yang digoreskan (Jawets,1996). Hasil pengembangbiakan ini yang dilanjutkan untuk identifikasi selanjutnya.

## **2. Penentuan Waktu Inkubasi Optimum**

Penentuan waktu inkubasi optimum bertujuan untuk melihat proses pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam media yang mengandung timbal. Isolat bakteri diinokulasikan ke dalam media cair (media NB) sebagai sumber nutrisi bakteri yang kandungannya seperti media NA yang digunakan dalam mengembangbiakkan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Penambahan timbal ke dalam media cair bertujuan untuk melihat kemampuan bakteri untuk hidup pada media yang mengandung timbal. Media ini dikocok pada suhu 37°C dengan kecepatan 150 rpm

untuk menghomogenkan media dan membuat suasana media sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh bakteri. Pengukuran pertumbuhan bakteri dilakukan setiap selang waktu 6 jam. Metode pertumbuhan mikroba yang digunakan adalah metode kekeruhan atau turbidimetri yang diukur menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 610 nm. Menurut Refdinal, dkk (2014), prinsip metode ini adalah kerapatan optik atau kekeruhan suatu cairan/ kultur sebanding dengan massa sel. Semakin keruh suspensi bakteri maka semakin banyak jumlah bakteri yang tumbuh.

Kurva pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (gambar 4.2) bertujuan untuk mengetahui fase pertumbuhan bakteri pada media berisi timbal. Fase pertumbuhan bakteri diawali dengan fase adaptasi (fase lag) terjadi pada 0-6 jam yang mengakibatkan media mulai menjadi keruh. Menurut Refdinal, dkk (2014), pada fase lag bakteri mengalami proses adaptasi pada lingkungannya seperti suhu dan kondisi nutrisinya. Pada fase ini peningkatan jumlah sel bakteri berlangsung lambat sehingga belum mampu mengadakan pembiakan, tetapi metabolisme sel bakteri meningkat dan terjadi pembesaran ukuran sel bakteri. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada 0-6 jam memasuki fase adaptasi (Litaay, 2013).

Fase ke dua adalah fase eksponensial (fase log) terjadi pada 6-18 jam, pertumbuhan bakteri berlangsung sangat cepat yang ditandai dengan media pertumbuhan bakteri warnanya sangat keruh dan berbau. Menurut Khoiroh (2014), pada fase ini suatu jenis mikroba akan memperbanyak diri dengan cara membelah diri menjadi dua, kemudian masing-masing membelah menjadi dua lagi sehingga pada setiap generasi akan bertambah dua kali lipat. Pada fase ini bakteri mampu

berkembangbiak sangat cepat. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa fase eksponensial bakteri *Pseudomonas aeruginosa* terjadi pada waktu 8 jam sampai 14 jam (Khoiroh, 2014).

Fase ke tiga adalah fase stasioner, terjadi pada 18-36 jam. Pada fase ini kekeruhan pada media tidak berubah karena tidak mengalami penambahan sel bakteri lagi sehingga jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati karena cadangan makanan mulai menipis dan pada fase ini pula bakteri akan memproduksi metabolit sekunder sebagai pertahanan diri terhadap lingkungannya agar bisa bertahan hidup (Januarsyah, 2007 dalam Khoiriyah dan Puji, 2014: 55). Pada fase ini juga merupakan waktu inkubasi optimum yang dibutuhkan oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* untuk mengikat logam timbal yaitu pada waktu 24 jam yang ditandai dengan adanya penurunan konsentrasi timbal yang ada dalam limbah cair yang digunakan dan bakteri ini juga dapat menyusun bahan anorganik menjadi senyawa organik yang lebih kompleks.


Fase selanjutnya adalah fase kematian, terjadi pada waktu 48 jam. Fase ini merupakan fase yang membuat bakteri tidak mampu mempertahankan hidupnya lagi yang bisa disebabkan oleh persediaan dan cadangan nutrisi tumbuh telah habis sehingga bakteri tidak mampu lagi untuk hidup. Pada fase ini, aktivitas hidup bakteri *Pseudomonas aeruginosa* telah terhenti.

### **3. Karakteristik Limbah Cair Laboratorium Kimia Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

#### **a. Derajat Keasaman (pH)**

Derajat keasaman (pH) menunjukkan seberapa besar tingkat keasaman atau kebasaan dalam limbah. Pengukuran pH pada air limbah dilakukan dengan

menggunakan kertas pH universal. Kertas pH dicocokkan dengan range pH untuk mengetahui ukuran pH air limbah tersebut. Hasil pengukuran pH pada limbah sebelum dan setelah penambahan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.3** Pengaruh pH terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Nilai pH pada limbah sebelum penambahan bakteri yaitu L.A1 pH 1 dan L.A2 pH 2 dan setelah penambahan bakteri nilai pH ke dua limbah tersebut tetap sama yaitu L.A1 pH 1 dan L.A2 pH 2. Kedua limbah ini bersifat sangat asam. Keasaman ini disebabkan dari komposisi bahan kimia yang terdapat pada limbah mengandung sangat banyak asam-asam organik yang digunakan dalam kegiatan praktikum dan penelitian.

Nilai pH pada limbah L.A1 dan L.A2 tidak ada yang mengalami perubahan karena sebelum dan setelah adanya kontak dengan bakteri tidak ada penambahan bahan-bahan yang sifatnya sangat asam maupun basa, sehingga pH pada limbah tersebut nilainya tetap. Menurut Kerubun (2003: 5), nilai pH yang terlalu tinggi (> 8,5) akan menghambat aktivitas mikroorganisme sedangkan nilai pH di bawah 6,5 akan mengakibatkan pertumbuhan jamur dan terjadi persaingan dengan bakteri dalam metabolisme materi organik. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri *Pseudomonas*

*aeruginosa* tidak mampu menguraikan zat-zat organik yang terdapat dalam limbah karena limbah tersebut sifatnya sangat asam.

#### b. TSS (*Total Suspended Solid*)

TSS atau total padatan tersuspensi merupakan padatan yang menyebabkan kekeruhan pada air, tidak larut dan tidak dapat mengendap secara langsung. Nilai TSS limbah cair laboratorium sebelum dan setelah penambahan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah sebagai berikut:




**Gambar 4.4** Pengaruh TSS terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Nilai TSS pada limbah sebelum penambahan bakteri yaitu limbah L.A1 adalah sebesar 7917 mg/L dan limbah L.A2 sebesar 60 mg/L. Setelah adanya penambahan bakteri mengalami kenaikan yaitu L.A1 menjadi 8059 mg/L dan L.A2 menjadi 145 mg/L. Kenaikan nilai TSS pada ke dua limbah tersebut dikarenakan saat setelah kontak dengan bakteri terjadi penambahan suspensi yang tidak dapat larut, seperti media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri dan adanya pertambahan sel bakteri yang ditandai dengan terjadinya peningkatan kekeruhan pada media cair yang digunakan.

### c. BOD (*Biochemical Oxygen Demand*)

Nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air secara biologi. Semakin tingginya nilai BOD maka makin tinggi zat pencemar yang ada dalam limbah tersebut. Nilai BOD pada limbah cair sebelum dan setelah penambahan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.5** Pengaruh BOD terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Nilai BOD pada limbah sebelum penambahan bakteri yaitu L.A1 sebesar 7692,80 mg/L dan L.A2 sebesar 6541,2 mg/L. Setelah adanya penambahan bakteri nilai BOD L.A1 naik menjadi 8240 mg/L sedangkan L.A2 mengalami penurunan menjadi 435,24 mg/L. Kenaikan nilai BOD pada limbah L.A1 disebabkan kandungan yang terdapat dalam limbah tersebut sangat banyak mengandung senyawa organik yang tidak mampu diuraikan lagi oleh bakteri dikarenakan kondisi limbah tersebut disimpan sudah sangat lama.

Penurunan nilai BOD yang terjadi pada limbah L.A2 menunjukkan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mampu mengoksidasi senyawa organik yang terdapat

dalam limbah cair (Litaay, 2013). Hal ini terjadi karena proses dekomposisi bahan organik (substrat) yang terkandung dalam air limbah dapat berlangsung (Romayanto, 2006 dalam Doraja dan Kuswytasari, 2012: 46). Penurunan senyawa organik dalam air limbah menyebabkan nilai BOD semakin menurun, karena semakin rendah kandungan bahan organik dalam limbah cair, sehingga kebutuhan oksigen oleh mikroba untuk mendegradasi bahan organik juga akan semakin kecil. Makin kecil nilai BOD menunjukkan kualitas limbah cair semakin baik.

#### d. COD (*Chemical Oxygen Demand*)

COD atau sering juga disebut dengan jumlah total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi menjadi  $\text{CO}_2$  dan  $\text{H}_2\text{O}$ . Nilai COD pada limbah sebelum dan setelah penambahan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.6** Pengaruh COD terhadap Limbah Cair Laboratorium Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Nilai COD limbah L.A1 sebelum penambahan bakteri yaitu sebesar 19230,50 mg/L dan setelah penambahan bakteri naik menjadi 20565,75 mg/L. Menurut Doraja dan Kuswytasari (2012), kenaikan nilai COD pada limbah dikarenakan terjadinya peningkatan biomassa mikroorganisme yang disebabkan oleh pertumbuhan

mikroorganisme dalam limbah yang mengakibatkan adanya penambahan sel, sehingga bahan organik yang harus didegradasi pun akan bertambah dengan sendirinya karena nilai COD naik pada saat jumlah sel cenderung naik, sehingga senyawa organik yang akan didegradasi semakin besar.

Nilai COD pada limbah L.A2 sebelum penambahan bakteri adalah 16345,93 mg/L dan setelah penambahan bakteri turun menjadi 1064,58 mg/L. Penurunan nilai COD ini menunjukkan bahwa bakteri pendegradasi *Pseudomonas aeruginosa* mampu mendegradasi bahan organik dalam limbah. Nilai COD yang kecil menunjukkan kadar zat organik sedikit. Makin kecil nilai COD menunjukkan kualitas limbah cair hasil pengolahan semakin baik (Wignyanto, 2009 dalam Doraja dan Kuswytasari, 2012).

#### **4. Uji Degradasi Logam Timbal oleh Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

Uji degradasi logam timbal oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kadar logam timbal yang terdapat pada limbah cair laboratorium. Pengukuran kadar timbal digunakan alat instrumen Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Uji degradasi dilakukan dengan membuat media cair NB yang ditambahkan limbah sebagai sumber timbal. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* diinokulasikan ke dalam media tersebut dan dihomogenkan serta diinkubasi selama 72 jam. Pengukuran sampel dilakukan setiap 24 jam yang sebelumnya telah disentrifuge dengan kecepatan 12000 rpm selama 30 menit untuk memperoleh supernatan. Supernatan yang diperoleh didestruksi menggunakan asam nitrat p.a untuk memisahkan senyawa-senyawa kompleks, sehingga hanya logam timbal bebas yang akan tertinggal.



**Gambar 4.7** Degradasi Logam Timbal Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Hasil yang diperoleh dari kontak bakteri dengan media yang berisi timbal pada limbah L.A1 sebesar 0,12 mg/L menjadi <0,01 mg/L dan limbah L.A2 sebesar 0,08 mg/L menjadi <0,01 mg/L. Sehingga dikatakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mampu menurunkan kadar logam timbal yang terdapat dalam limbah L.A1 dan limbah L.A2 sebesar 99%.

Kemampuan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kadar logam timbal disebabkan karena bakteri memiliki permukaan yang bermuatan negatif yang terbentuk dari berbagai struktur anion sedangkan logam merupakan kation yang bermuatan positif sehingga dapat terjadi ikatan antara permukaan sel bakteri dengan ion logam berat, selain itu mikroorganisme dapat melakukan proses reduksi logam berat sehingga dapat membentuk kompleks ion logam berat yang tidak toksik (Junopia, 2015).

Pengikatan logam berat oleh bakteri dapat dipisahkan menjadi fase pengikatan dan transport aktif (Gadd, 1992 dalam Wulandari *et al*, 2005). Fase pengikatan tergantung pada metabolisme sel yaitu absorpsi melalui dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme

sel. Pada proses metabolisme, logam berat dapat terakumulasi pada membran sel (ekstraseluler) dan pada sitoplasma (intraseluler) (Arrizal, 2013: 165).

Akumulasi ekstraseluler dapat terjadi karena pengikatan ion-ion logam oleh polimer ekstraseluler atau polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan sel-sel mikroba dan komplikasi antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan sisi reaktif pada permukaan sel yang bermuatan negatif. Sedangkan akumulasi intraseluler dapat terjadi karena proses difusi yang tidak membutuhkan aktivitas mikroba secara langsung dimana gen-gen yang mengendalikan plasmid dalam proses metabolisme tersebut (Oktaviana, 1995 dalam Wulandari, 2005: 63).




**Gambar 4.8** Mekanisme Biosorpsi Pb pada Dinding Sel Bakteri

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram negatif yang umumnya bakteri jenis ini toleran terhadap logam berat karena dinding selnya yang kompleks sehingga ion logam dapat terikat pada dinding selnya dan bakteri yang resisten terhadap logam disebabkan kemampuan untuk mendetoksifikasi pengaruh logam berat dengan adanya protein seperti polifosfat di dalam sel yang mampu mengikat timbal. Sel bakteri sangat berlimpah sisi-sisi yang mengandung muatan negatif yang terletak pada dinding selnya, seperti karboksil ( $\text{COO}^-$ ) dan hidroksil ( $\text{OH}^-$ ), sehingga akan terjadi interaksi ion logam dengan muatan negatif. Mekanisme

biosorpsi logam berat secara alami mempunyai dua mekanisme yang terjadi secara bolak balik yaitu pertama-tama akan terjadi penukaran ion logam timbal yang berada disekitar permukaan sel dengan ion monovalen ataupun divalent (misalnya Na) dan yang terakhir yaitu pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan gugus fungsi yang terdapat dalam sel (Khoiroh, 2014).

Bakteri juga dapat mengakumulasi logam berat di dalam sel dengan membentuk ikatan antara logam berat dengan suatu protein dalam sel yang disebut metallothionein (Satya, 2012).




**Gambar 4.9** Struktur Kimia Metallothionein (Artanti, 2005 dalam Rakhmawati, 2006: 139)

Proses pengikatan diawali dengan pengikatan ion  $Pb^{2+}$  pada gugus sulfur (S) dari asam amino sistein pada dinding sel bakteri. Setelah protein reseptor mengenali adanya logam asing (non esensial), gen akan mengkode pembentukan metallothionein dalam sel. Protein metallothionein adalah protein tionein pengikat logam mengandung 30% asam amino sistein. Kandungan sistein yang tinggi menyebabkan protein tersebut memiliki daya afinitas yang kuat terhadap logam (Hildebrand *et al.*, 1994 dalam Rakhmawati, 2006: 139).

Ion  $Pb^{2+}$  akan ditransport melalui dinding sel dan akan berikatan dengan metallothionein di dalam sel dengan mekanisme transport pasif. Timbal akan berikatan dengan 2 atom S pada sistein dan logam berat ( $Pb^{2+}$ ) akan terdetoksifikasi dalam struktur metallothionein. Metallothionein yang telah berikatan dengan ion  $Pb^{2+}$

akan ditransport ke vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion-ion dan metabolit. Sel akan terus membentuk metallothienin selama masih ada ion  $Pb^{2+}$  dalam larutan yang terikat pada gugus S dari protein dinding sel. Pada saat tertentu sel akan mengalami kejenuhan dan berada pada fase kematian (Artanti, 2005 dalam Rakhmawati, 2006: 140).



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Waktu inkubasi optimum untuk menurunkan kandungan logam berat timbal oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa* adalah pada waktu 24 jam.
2. Karakteristik limbah cair laboratorium sebelum dan setelah pengontakan pada limbah L.A1 nilai TSS, BOD dan COD meningkat dengan nilai pH tetap. Sedangkan limbah L.A2 nilai pH tetap, nilai BOD dan COD menurun sedangkan nilai TSS meningkat.
3. Aktivitas bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kandungan timbal limbah cair laboratorium Kimia Analitik yaitu L.A1 dan L.A2 sebesar 99%.

#### **B. Saran**

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu perlu adanya penelitian tentang pemakaian bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kadar logam berat lainnya dalam limbah cair laboratorium kimia, seperti logam kadmium (Cd) dan merkuri (Hg).


## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyanta, Barokah, La Ode Sumarlin dan Ahmad Saepul Mujab. 2011. "Penggunaan Biokompos dalam Bioremediasi Lahan Tercemar Limbah Minyak Bumi". *Valensi*. Vol. 2, No. 3. H. 430-442.
- Ariono, David. 1996. "Bioremediasi Logam Berat di Lingkungan Perairan dengan Bantuan Mikroba". *Biota*. Vol. 1, No. 2. H. 23-27.
- Arrizal, Syafruddin, Fida Rachmadiarti dan Yuliani. 2013. "Identifikasi Rhizobakteri pada Semanggi (*Marsilea crenata* Presl.) yang Terpapar Logam Berat Timbal (Pb)". *Lentera Bio*. Vol. 2, No. 1. H. 165-169.
- Caesar, Rahma Yuanita, dkk. 2014. "Formulasi dan Aktivitas Antibakteri Lotion Minyak Atsiri Buah Adas (*Foeniculum vulgare* Mill)". *Media Farmasi*. Vol. 11, No. 1.
- Ciccyliona dan Refdinal Nawfa. 2012. "Pengaruh pH terhadap Produksi Biosurfaktan oleh Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* Lokal". *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. Vol. 1, No. 1. H. 1-6.
- Doraja, Maya Shovitri dan Kuswytasari. 2012. "Biodegradasi Limbah Domestik Dengan Menggunakan Inokulum Alami Dari Tangki Septik". *Jurnal Sains dan Seni*, Vol. 1, No. 1. H. 44-47.
- Gusnita, Dessy. 2012. "Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) di Udara dan Upaya Penghapusan Bensin Bertimbal". *Berita Dirgantara*. Vol. 13, No. 3. H. 95-101.
- Hidayati, Dwi Yuni Nur. 2010. "Identifikasi Molekul Adhesi Pili *Pseudomonas aeruginosa* pada *Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) Culture*". Vol. 1. No. 1. H. 1-55.
- Husna, Roudlotul. 2007. Pengaruh Pemberian Ekstrak Tumbuhan Meniran (*Phyllanthus niruri* L) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Malang.
- Ika, Tahril dan Irwan Said. 2012. "Analisis Logam Timbal (Pb) dan Besi (Fe) dalam Air Laut di Wilayah Pesisir Pelabuhan Ferry Taipa Kecamatan Palu Utara". *J. Akad. Kim.* Vol. 1, No. 4. H. 181-186.
- Irmanto, Suyata dan Zufahair. 2012. "Optimasi Penurunan COD, BOD, dan TSS Limbah Cair Industri Etanol (*Vinasse*) Psa Palimanan dengan Metode *Multi Soil Layering (Msl)*". *Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Unsoed*. H. 131-141.
- Isa, Ishak dan Yuliana Retnowati. 2013. "Pemanfaatan berbagai Jenis Bakteri dalam Proses Biobleaching Limbah Logam Berat". *Laporan Tahunan Penelitian Fundamental*.
- Jaya, Farida, Any Guntarti dan Zainul Kamal. 2013. "Penetapan Kadar Pb pada Shampoo Berbagai Merk dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom". *Pharmaciana*, Vol. 3, No. 2. H. 9-13.

- Junopia, Andi Citra. 2015. "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pendegradasi Logam Timbal (Pb) dari Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan".
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Kerubun, Ali Arsad, Makmur Selomo dan Ruslan. 2003. "Studi Kualitas Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Provinsi Maluku" *Teknik Kesehatan Lingkungan*. H. 1-9.
- Khoiriyah, Hanimatul dan Puji Ardiningsih. 2014. "Penentuan Waktu Inkubasi Optimum Terhadap Aktivitas Bakteriosin *Lactobacillus sp.* RED<sub>4</sub>". *JKK*. Vol. 3, No. 4. H. 52-56.
- Khoiroh, Zaimatul. 2014. "Bioremediasi Logam Berat Timbal (Pb) dalam Lumpur Lapindo menggunakan Campuran Bakteri (*Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa*)". Jurusan Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. H. 1-10.
- Kurniawati, Siti, Sri Murwani dan Djoko Winarso. 2012. "Perbandingan Potensi Antibakteri Ekstrak Air dengan Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* NN-1-PKH secara *In Vitro*". *Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya*. H. 1-6.
- Litaay, Gabriela Welma. 2013. "Kemampuan *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Fosfat Limbah Cair Rumah Sakit". H. 1-15.
- Muthawali, Dede Ibrahim. 2012. "Analisa COD dari Campuran Limbah Domestik dan Laboratorium di Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan". H. 1-13.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Permata, Dedy Citra, Refinel dan Admin Alif. 2012. "Proses Optimasi Adsorpsi Logam Pb oleh Limbah Cangkang Sotong (*Sepia recurvirosta*) dalam Larutan".
- Rakhmawati, Anna. 2006. "Biosorpsi Ion Logam Oleh *Aspergillus flavus*". *Seminar Nasional MIPA*. H. 132-145.
- Refdinal, Endah dan Meita. 2014. "Pengaruh pH dan Temperatur pada Pembentukan Biosurfaktan oleh Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*". *Prosiding Seminar Nasional Kimia ISBN*. H. 41-48.
- Sabri. 2013. *Tafsir Lingkungan Hidup dan Kesehatan*. Makassar: Alauddin Press.
- Said, Muhammad. 2009. "Pengolahan Air Limbah Laboratorium dengan menggunakan Kagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)". *Jurnal Penelitian Sains*. H. 38-43.
- Satya, Awalina. 2012. "Kemampuan Isolat Bakteri dari Sedimen Situ sebagai *Aquatic Bioremoval Agent* Ion Logam Timbal (Pb)". *Prosiding Seminar Nasional Limnologi VI*. H. 563-574.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.


- Siswati, Nana Dyah, Tenti Indrawati dan Meliya Rahmah. 2012. "Biosorpsi Logam Berat Plumbum (Pb) Menggunakan Biomassa *Phanerochaete Chrysosporium*". *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol.1, No. 2. H. 67-72.
- SNI 06-6989.22-2004. Air dan air limbah - Bagian 22: Cara uji nilai permanganat secara titrimetric.
- SNI 06-6989.72-2009. Air dan air limbah – Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan Oksigen Biokimia (*Biochemical Oxygen Demand/ BOD*).
- SNI 06-6989.8-2004. Air dan air limbah – Bagian 8: Cara uji timbal (Pb) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala.
- Suherni. 2010. "Keracunan Timbal di Indonesia". H. 1-19.
- Suprihatin dan Nastiti Siswi Indrasti. 2010. "Penyisihan Logam Berat dari Limbah Cair Laboratorium dengan Metode Presipitasi dan Adsorpsi". *Makara Sains*. VI. 14, No. 1. H. 44-50.
- Svehla, G. 1979. *Textbook Of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis*. Terj. L. Setiono dan Hadyana Pudjaatmaka. "Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro". Kalman Media Pusaka: Jakarta.
- Tangio, Julhim S. 2013. "Adsorpsi Logam Timbal (Pb) dengan menggunakan Biomassa Enceng Gondok (*Eichhorniacrassipes*)". *Jurnal Entropi*, Vol. 8, No. 3. H. 501-506.
- Wulandari, Sri, Nila Fitri Dewi dan Suwondo. 2005. "Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) pada Sedimen di Perairan Sungai Siak". *Jurnal Biogenesis*. Vol. 1, No. 2. H. 62-65.
- Yahya, M. 2012. "Identifikasi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Domestik di Permukiman Kumuh di Sekitar Kanal Kota Makassar". *Hasil Penelitian Fakultas Teknik*. Vol. 6. H. 1-6.
- Yulvizar, Cut. 2011. "Efektivitas Pengolahan Limbah Cair dalam menurunkan Kadar Fenol di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Biologi Edukasi*, VI. 3, No. 2. H. 9-15.

**LAMPIRAN I**  
**SKEMA PENELITIAN**




**LAMPIRAN 2**  
**SKEMA PROSEDUR KERJA**


**1. Pembuatan Media Padat**




**2. Pembuatan Media Cair**



**3. Peremajaan Isolat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***



#### 4. Penentuan Waktu Inkubasi Optimum



#### 5. Pemeriksaan Karakteristik Limbah Cair



##### a. Derajat Keasaman (pH)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

M A K A S S A R


**b. Pemeriksaan TSS****c. Pengukuran BOD****d. Pengukuran COD**

## 6. Uji Kadar Timbal dalam Limbah Laboratorium


### a. Uji Kualitatif



### b. Uji Kuantitatif



**7. Uji Kemampuan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam Menurunkan Kandungan Timbal Limbah Laboratorium Kimia Analitik**



**LAMPIRAN 3**  
**ANALISIS DATA**

**A. Pengukuran Nilai TSS (*Total Suspended Solid*)**

**1. Sebelum Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

**a. Limbah L.A1**

$$\text{TSS} = (b - a)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (52,2285 - 51,4368)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (0,7917)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = 7917 \text{ mg/L}$$

**b. Limbah L.A2**

$$\text{TSS} = (b - a)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (52,2313 - 52,2253)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (0,006)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = 60 \text{ mg/L}$$

## 2. Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

### a. Limbah L.A1

$$\text{TSS} = (b - a)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (50,7747 - 49,9688)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (0,8059)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = 8059 \text{ mg/L}$$

### b. Limbah L.A2

$$\text{TSS} = (b - a)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (52,2114 - 52,1969)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = (0,0145)g \frac{1000 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{TSS} = 145 \text{ mg/L}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## 3. Presentasi nilai TSS Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

### a. Limbah L.A1

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{8059-7917}{7917} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = 1,79\%$$

**b. Limbah L.A2**

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{145-60}{145} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = 58,62\%$$

**B. Pengukuran Nilai BOD Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri**

*Pseudomonas aeruginosa*

**1. Limbah L.A1**

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{8240-7692,80}{8240} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = 6,64\%$$

**2. Limbah L.A2**

$$\% \text{ penurunan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = \frac{6541,2-435,24}{6541,2} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = 93,34\%$$

**C. Pengukuran Nilai COD Sebelum dan Setelah Penambahan Bakteri**

*Pseudomonas aeruginosa*

**1. Limbah L.A1**

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{20565,75-19230,50}{20565,75} \times 100\%$$

$$\% \text{ kenaikan} = 6,49\%$$

## 2. Limbah L.A2

$$\% \text{ penurunan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = \frac{16345,93-1064,58}{16345,93} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = 93,48\%$$

### D. Uji Degradasi Logam Timbal oleh Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

#### 1. Limbah L.A1

$$\% \text{ penurunan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = \frac{0,12-0,0001}{0,12} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = 99,9\%$$

#### 2. Limbah L.A2

$$\% \text{ penurunan} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = \frac{0,08-0,0001}{0,08} \times 100\%$$

$$\% \text{ penurunan} = 99,9\%$$


#### LAMPIRAN 4

#### NILAI OD PADA PERTUMBUHAN BAKTERI *Pseudomonas aeruginosa*

Waktu (jam)	Optical Density
0	0,0689
6	0,7738
12	1,3156
18	1,3832
24	1,2407
30	1,1820
36	1,1577
48	0,5285

**LAMPIRAN 5**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**A. Peremajaan Bakteri *Pseudomonas aeruginosa***



**B. Uji Pendahuluan Limbah Cair Laboratorium**



### C. Pengukuran Karakteristik Limbah Cair Laboratorium

#### 1. pH



#### 2. COD dan BOD



3. TSS



#### D. Uji Degradasi Logam Timbal



## RIWAYAT HIDUP



**Ayu Astuti** lahir tanggal 1 November 1994 di Desa Padangloang, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba yang merupakan anak sulung dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Muh. Jufri dan Ibunda Rosmina. Memulai jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 294 Padangloang pada tahun 2000 dan menamatkan pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 5 Bulukumba dan tamat pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMA Negeri 1 Bulukumba dan menamatkan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tamat pada tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R