

**PEMURNIAN ENZIM SELULASE DARI ISOLAT KHAMIR JENIS
CANDIDA UTILIS MENGGUNAKAN FRAKSINASI
AMONIUM SULFAT**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains

Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh:
NURUL AZIZAH
NIM: 60500113062

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 60500113062
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 04 Mei 1994
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Tamanggapa Raya III Perumahan Taman Makassar Indah
Blok B 2/15 Makassar
Judul : Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida utilis* menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS
ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gowa, Agustus 2017

Penyusun



Nurul Azizah
NIM: 60500113062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida utilis* Menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat**” yang disusun oleh **Nurul Azizah, NIM : 60500113062** mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu 23 Agustus 2017 bertepatan 1 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 23 Agustus 2017

1 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Tasmin Tanggareng, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Maswati Baharuddin, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP : 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjat kehadiran Allah swt atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida utilis* menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat”**. Shalawat serta salam turunkan kepada sang leader sejati sang pemimpin seluruh ummat muslim baginda Rasulullah saw yang telah membawa ummatnya dari zaman kekafiran menuju zaman keislaman yang seperti kita rasakan masa sekarang ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, terutama untuk orang tua tercinta yaitu Ibunda Nurhayati dan Bapak Mansur M, Paman Ruslan Dg. Ronrong, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendoakan penulis beserta orang-orang yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta sejarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta sejarannya.
3. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia dan ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan bapak Sappewali, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan

keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku dosen penguji I, Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku dosen penguji II dan bapak Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, khususnya staf pengajar jurusan Kimia.
7. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terkhusus Kak Fitria Azis, S.Si., S.Pd.
8. Sahabat seperjuangan (Darmawansyah, Marlia Ilyas, Kasmawati, Nada Pertiwi, Asrianti, Nurhidayah, Herlina, Nur Afni, Miftahul Jannah, Moh. Ikhsanuddin, Chaerul Umam Adam, Fitriyani Najamuddin, Ika, Nabila, Hartini, Bulan, Sukarno HR, dan Syukrianto.
9. Seluruh teman Jurusan Kimia angkatan 2013.
10. Seluruh teman KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar.
11. Seluruh teman KKN Angk. 54 Desa Pantama Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

Semoga Allah swt menerima segala amal kebaikan kita sebagai amal jariah. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah oleh Allah swt. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabaraakatuh.*

Gowa, Agustus 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-20
A. Tinjauan Umum Khamir	7
B. <i>Candida utilis</i>	8
C. Enzim Selulase	10
D. Fraksinasi Amonium Sulfat	12
E. Metode <i>Dinitrosalisilic Acid</i> (DNS)	15
F. Metode Bradford	17
G. Spektrofotometer UV-Vis.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21-26
A. Waktu dan Tempat	21
B. Alat dan Bahan.....	21
C. Prosedur Penelitian.....	22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27-38
A. Hasil Penelitian	27
1. Pemurnian Enzim Selulase menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat	27
2. Hasil Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS.....	28
3. Hasil Kadar Protein dengan Metode Bradford.....	28
B. Pembahasan	29
1. Pemurnian Enzim Selulase menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat	29
2. Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS	31
3. Kadar Protein dengan Metode Bradford	35
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40-42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43-71
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Aktivitas Enzim Selulase dari Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%)	28
Tabel 4.2	Kadar Protein Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%)	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Instrumen Spektrofotometer UV-Visible	18
Gambar 4.1	Fraksi-fraksi Enzim Selulase Hasil Fraksinasi dengan Tingkat Kejuhan (0-100%).....	27
Gambar 4.2	Reaksi antara Pereaksi Asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) dan gula reduksi.....	33
Gambar 4.3	Aktivitas Enzim Selulase terhadap Tingkat Kejuhan Amonium Sulfat	34
Gambar 4.4	Kadar Protein Enzim Selulase terhadap Tingkat Kejuhan Amonium Sulfat	36
Gambar 4.5	Hubungan antara Aktivitas Enzim dan Kadar Protein	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Penelitian.....	43
Lampiran 2	Bagan Kerja Prosedur Penelitian.....	44
Lampiran 3	Skema Kerja Fraksinasi Enzim Selulase.....	48
Lampiran 4	Pembuatan Larutan Standar.....	49
Lampiran 5	Kurva Standar Pengukuran Konsentrasi Glukosa.....	52
Lampiran 6	Penentuan Aktivitas Enzim Selulase.....	55
Lampiran 7	Kurva Standar Pengukuran Konsentrasi <i>Bovine Serum Albumin</i>	57
Lampiran 8	Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase.....	60
Lampiran 9	Tabel Kejenuhan Amonium Sulfat.....	62
Lampiran 10	Jumlah Penambahan Amonium Sulfat.....	63
Lampiran 11	Dokumentasi Penelitian.....	64



ABSTRAK

Nama : Nurul Azizah

NIM : 60500113062

Judul : "Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida utilis* menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat"

Candida utilis merupakan jenis khamir selulolitik yang mampu memproduksi enzim selulase. Enzim selulase yang diproduksi dari mikroorganisme ini diperoleh sebagai enzim ekstrak kasar yang mengandung banyak protein lain sehingga perlu dilakukan pemurnian enzim. Penelitian ini bertujuan memurnikan ekstrak kasar enzim selulase dengan metode fraksinasi menggunakan garam amonium sulfat dengan variasi tingkat kejenuhan 0-100%. Hasil fraksinasi amonium sulfat selanjutnya dilakukan uji kuantitatif untuk menentukan aktivitas enzim dan kadar protein enzim selulase. Metode asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) digunakan untuk uji aktivitas enzim selulase yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada λ 540 nm dan metode bradford digunakan untuk uji kadar protein enzim selulase diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada λ 595 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aktivitas enzim selulase tertinggi berada pada fraksi 80% sebesar 0,2163 U/mL dan kadar protein enzim selulase tertinggi berada pada fraksi 40% sebesar 0,0723 mg/mL.

Kata kunci: *Candida utilis*, selulase, fraksinasi, aktivitas, protein

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Nurul Azizah

NIM : 60500113062

**Title : "Purification of Cellulase Enzyme from Isolate Yeast Type Candida
Utilis using Fractionation Ammonium Sulphate"**

Candida utilis is a type of cellulolytic yeast that capable of producing cellulase enzymes. Cellulase enzymes produced from these microorganisms are obtained as enzymes of crude extracts that contain many other proteins so enzymes are necessary to be purified. This research aimed to purify the crude extract of cellulase enzyme by fractionation method using ammonium sulfate salt with variation of 0-100% saturation level. The result of fractionation of ammonium sulphate is then carried out quantitative test to determine enzyme activity and cellulase enzyme protein level. The 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) method was used to test cellulase enzyme activity as measured by UV-Vis spectrophotometer at λ 540 nm and the Bradford method was used for the test of cellulase enzyme protein levels measured by a UV-Vis spectrophotometer at λ 595 nm. The results showed that the highest cellulase enzyme activity was in the 80% fraction of 0.2163 U/mL and the highest level of enzyme cellulase was at a fraction of 40% of 0.0723 mg/mL.

Keywords: *Candida utilis*, cellulase, fractionation, activity, protein

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam industri. Semakin pesatnya persaingan industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan waktu produksi yang cepat dan efisien serta produktivitas ekonomis, maka dilakukan suatu pengembangan salah satunya dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah, diantaranya yaitu mencakup mikroorganisme, hewan dan tumbuhan. Namun, mikroorganisme paling banyak digunakan karena pertumbuhannya cepat, dapat tumbuh pada substrat yang ekonomis, mudah ditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan serta mampu menghasilkan berbagai macam enzim penting. Salah satu mikroorganisme penghasil enzim yang dapat dimanfaatkan yaitu khamir. Di Indonesia memiliki lingkungan yang beriklim tropis sehingga cocok untuk pertumbuhan khamir.

Khamir merupakan kelompok mikroorganisme yang terdiri dari beberapa ribu spesies. Mikroorganisme ini banyak terdapat di tanah, udara, bersifat heterotrof dan mampu beradaptasi dengan beragam lingkungan. Khamir memiliki beberapa enzim penting seperti selulase, fosfatase, lipase, dan proteinase yang menyebabkan khamir memegang peranan penting dalam dekomposisi senyawa organik dan dapat digunakan untuk keperluan industri (Kanti, 2004). Namun pengamatan terhadap mikroba dari golongan khamir belum banyak diungkapkan. Khamir diketahui

sebagai salah satu mikroorganisme yang memiliki daya selulolitik (Kanti, dkk., 2003).

Khamir selulolitik mampu menghasilkan enzim selulase yang mempunyai peranan dalam siklus biogeokimia khususnya kemampuan dalam mendegradasi selulosa (Kanti, dkk., 2003). Selulosa dapat dikonversi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan produk multiguna lainnya dengan proses biologi yang aman dengan memanfaatkan enzim dalam proses reaksinya tanpa melibatkan penggunaan bahan kimia yang banyak sehingga biaya produktivitas ekonomis dan meminimalisir buangan limbah berbahaya. Penanggulangan limbah dapat dilakukan secara biologi yaitu dengan menguraikan selulosa tersebut menggunakan enzim selulase yang dapat diperoleh dari khamir selulolitik (Oktavia, dkk., 2014). Khamir selulolitik termasuk dalam kelompok fungi dimana mikroorganisme jenis ini dapat tumbuh dengan baik bila berada pada lingkungan yang lembab atau cukup akan jumlah air. Mikroorganisme ini adalah ciptaan Allah swt yang dapat memberi manfaat apabila tumbuh dengan baik yaitu jika terpenuhi salah satu kebutuhannya yaitu air. Sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah swt dalam QS. Al-Nur/24: 45 sebagai berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Kementrian Agama, 2002).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa di samping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya,

Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu Allah swt menjadikan hewan-hewan itu beraneka ragam jenis, potensi, dan fungsinya. Betapa penciptaan tersebut menunjukkan kekuasaan Allah sekaligus kehendak-Nya yang mutlak. Jika dipandang dari satu sisi bahan penciptaannya sama yaitu air, akan tetapi air dijadikannya dalam bentuk yang berbeda-beda lalu dengan perbedaan itu Dia menciptakan makhluk hidup yang memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda pula yang sungguh berbeda dengan substansi serta kadar air yang merupakan bahan kejadiannya (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahan penciptaan dan kebutuhan hidup setiap makhluk di muka bumi ini adalah air. Jika kebutuhan utamanya terpenuhi, maka makhluk hidup tersebut akan tumbuh dengan baik dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing serta memberikan manfaat. Peran air sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup termasuk mikroorganisme salah satunya khamir selulolitik. Khamir selulolitik bermanfaat bagi manusia bila dapat tumbuh dengan baik karena akan dapat menghasilkan enzim yang sangat berperan penting dalam keperluan industri yaitu enzim selulase. Salah satu golongan khamir selulolitik yang dapat menghasilkan enzim selulase yaitu jenis *Candida*.

Candida termasuk salah satu jenis khamir yang memiliki daya selulolitik. Jenis *Candida* yang memiliki daya selulolitik dan dapat menghasilkan enzim yaitu *Candida utilis*. *Candida* ini digolongkan khamir selulolitik karena kemampuannya untuk menghasilkan enzim selulase yang dapat menghidrolisis ikatan $\beta(1-4)$ -glikosidik pada selulosa (Idiawati, dkk., 2014). *Candida utilis* tergolong organisme anaerob fakultatif yaitu dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Organisme ini dapat tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan glukosa

(Environment and Climate Change, 2016). *Candida utilis* merupakan salah satu khamir yang dapat dimanfaatkan karena kemampuannya memproduksi enzim selulase.

Enzim selulase merupakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan di dalam sel kemudian dikeluarkan ke media tumbuhnya (Rahayu, 2014). Enzim selulase dihasilkan oleh mikroorganisme selulolitik yang dapat diproduksi dari suatu substrat berbahan lignoselulosa (Idiawati, dkk., 2014). Enzim selulase ini memiliki kemampuan untuk menghidrolisis ikatan β -1,4-glikosidik pada bahan yang mengandung selulosa. Enzim selulase dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu endo-1,4- β -D-glukanase, ekso-1,4- β -D-glukanase, dan β -D-glukosidase (Rahayu, 2014). Produksi enzim selulase umumnya menggunakan mikroorganisme seperti fungi atau bakteri yang telah diisolasi (Sonia dan Joni, 2015). Enzim selulase yang diisolasi dari organisme jenis *Candida utilis* terdiri atas berbagai macam jenis molekul protein enzim sehingga harus dilakukan pemurnian enzim selulase.

Pemurnian enzim selulase merupakan metode untuk pemisahan (pemurnian) enzim dari molekul-molekul protein lain dalam enzim selulase. Pemurnian selulase bertujuan untuk memperoleh enzim selulase dari suatu isolat *Candida utilis* yang lebih murni dari ekstrak kasar enzim selulasenya. Kemampuan enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa akan meningkat apabila dilakukan optimasi pemurnian aktivitas selulase (Sinatari, dkk., 2013). Pemurnian selulase dari suatu isolat dapat menggunakan proses fraksinasi.

Fraksinasi merupakan suatu proses pemisahan fraksi yang terkandung dalam suatu larutan atau suspensi yang memiliki karakteristik berbeda (Yuliasih, 2010). Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan atau memurnikan fraksi-fraksi molekul

protein yang terkandung dalam enzim selulase. Pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan fraksinasi protein menggunakan garam amonium sulfat. Fraksinasi protein dapat dilakukan dengan menggunakan garam amonium sulfat karena kestabilan protein di dalam amonium sulfat dapat bertahan lama. Fraksinasi dilakukan secara bertingkat untuk memperoleh larutan dengan tingkat kejenuhan yang berbeda agar didapatkan beberapa fraksi yang salah satunya memiliki aktivitas enzim paling tinggi (enzim yang paling murni). Fraksinasi amonium sulfat didasarkan pada pengaruh jumlah penambahan garam yang berbeda terhadap kelarutan protein sehingga dapat menghasilkan protein yang mengandung kadar garam yang tinggi (Sinatari, dkk., 2013).

Penelitian tentang pemurnian enzim menggunakan fraksinasi amonium sulfat telah banyak dilakukan salah satunya penelitian Sinatari, dkk. (2013) yang melakukan pemurnian selulase menggunakan fraksinasi amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan 0-100% diperoleh hasil yaitu aktivitas ekstrak kasar selulase sebesar 0,212 Unit/mg protein, sedangkan aktivitas selulase yang paling tinggi berada pada fraksi 2 (20-40% amonium sulfat) yaitu sebesar 0,749 U/mg protein.

Berdasarkan penelitian Mayasari (2016) melakukan fraksinasi amonium sulfat terhadap enzim amilase diperoleh hasil yaitu nilai aktivitas pada fraksi 60% sebesar 0,0214 U/mL dan kadar protein sebesar 0,0577 mg/mL. Pada penelitian ini bertujuan melakukan fraksinasi protein enzim selulase menggunakan garam amonium sulfat untuk menentukan aktivitas enzim selulase dan kadar protein dari enzim selulase yang dihasilkan oleh mikroorganismen khamir jenis *Candida utilis*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa aktivitas ekstrak kasar enzim dan enzim hasil fraksinasi dari pemurnian enzim selulase khamir jenis *Candida utilis*?
2. Berapa kadar protein ekstrak kasar enzim dan enzim hasil fraksinasi dari pemurnian enzim selulase khamir jenis *Candida utilis*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak kasar enzim dan enzim hasil fraksinasi dari pemurnian enzim selulase khamir jenis *Candida utilis*.
2. Untuk mengetahui kadar protein ekstrak kasar enzim dan enzim hasil fraksinasi dari pemurnian enzim selulase khamir jenis *Candida utilis*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada penulis tentang manfaat enzim selulase dari khamir selulolitik jenis *Candida utilis*.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan menambahkan literatur penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut kepada peneliti selanjutnya terhadap manfaat enzim selulase dari khamir selulolitik jenis *Candida utilis*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum khamir

Khamir merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam kelas fungi dan bersifat heterotrofik yaitu organisme yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya, apabila hidup dari benda organik mati yang terlarut, organisme ini disebut saprofit. Saprofit yaitu dapat menghancurkan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks, menguraikannya menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana, yang kemudian dikembalikan dalam tanah, dan selanjutnya meningkatkan kesuburannya. Khamir merupakan fungi uniseluler dan dapat bersifat dimorfistik, yaitu memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, bergantung kepada keadaan lingkungan yaitu fase hifa (membentuk miselium) dan fase khamir (membentuk sel tunggal). Khamir dapat sangat menguntungkan bagi manusia, dan sebaliknya organisme ini juga dapat merugikan bagi manusia apabila membusukkan kayu, tekstil, makanan dan bahan-bahan lain (Pelczar, 2008).

Khamir adalah mikroorganisme bersel tunggal (*uniseluler*) dengan ukuran antara 5 sampai 20 mikron. Biasanya berukuran 5 sampai 10 kali lebih besar dari bakteri. Khamir tidak mempunyai flagela atau organ lain untuk bergerak, dalam kultur yang sama, ukuran dan bentuk sel mungkin berbeda karena pengaruh umur sel dan kondisi lingkungan selama pertumbuhan. Beberapa khamir ditutupi oleh komponen ekstraseluler yang berlendir disebut kapsul yang terdiri dari polisakarida dan heteropolisakarida dan mungkin juga mengandung komponen yang bersifat hidrofobik. Dinding sel *yeast* pada sel-sel yang masih muda sangat tipis dan semakin

lama semakin tebal jika sel semakin tua. Dinding selnya terdiri dari glukukan, mannan, protein, kitin dan lipid (Putranto, 2010).

Khamir dikenal memiliki rentang ekologi yang cukup luas dan memiliki kemampuan untuk hidup pada daerah yang ekstrim serta umumnya banyak ditemukan pada lingkungan yang mengandung bahan organik tinggi (Jumiyati, dkk., 2012). Pertumbuhan khamir optimal pada pH 4,0-4,5. Khamir dapat tumbuh dengan baik pada suasana aerob namun untuk khamir fermentatif dapat tumbuh pada suasana anaerob. Kadar gula yang optimal untuk pertumbuhan khamir adalah 10%, tapi kadar gula yang optimal untuk permulaan fermentasi adalah sekitar 16% (Eka dan Amran, 2009).

Peran ekologi khamir selain dapat menentukan kecepatan dan arah proses degradasi senyawa organik di dalam tanah, khamir juga telah lama digunakan untuk proses industri seperti pada pembuatan minuman beralkohol, fermentasi tape, pembuatan makanan ternak, kosmetik, dan antibiotik. Selain itu, hasil penelitian yang dilaporkan oleh Lansane (1997) menunjukkan bahwa khamir di masa depan dapat dikembangkan sebagai “*renewable resources*”, beberapa jenis khamir mampu memproduksi alkohol dari berbagai jenis karbohidrat yang berbeda (Kanti, 2004).

B. *Candida utilis*

Candida sp. merupakan salah satu kelompok khamir yang paling besar yang meliputi hampir 1/3 dari seluruh jumlah khamir yang sudah dapat diidentifikasi. Kelompok ini banyak dilaporkan mempunyai penyebaran jenis yang cukup luas, meliputi ekosistem tanah, perairan, tumbuhan dan serangga. Beberapa diantaranya telah diteliti dan dikembangkan untuk keperluan industri pakan ternak, pengolahan limbah dan agen bioremediasi (Kanti, dkk., 2003).

Candida utilis tergolong *yeast* (khamir) mampu menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi dalam metabolisme antara lain glukoprotein seperti invertase, melibiase, fosfatase, selulase (glukanase, aril β -glukosidase), fosfolipase, dan protease (Sundari, 2003).

Menurut Environment and Climate Change (2016), identifikasi taksonomi dari *Candida utilis* adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Fungi</i>
Divisi	: <i>Ascomycota</i>
Subdivisi	: <i>Saccharomycotina</i>
Kelas	: <i>Saccharomycetes</i>
Ordo	: <i>Saccharomycetidae</i>
Famili	: <i>Saccharomycetales</i>
Genus	: <i>Candida</i>
Spesies	: <i>Utilis</i>

Sifat fisik dari *Candida utilis* yaitu memiliki bentuk sel yang bervariasi antara lain lonjong, bulat sampai silindris. Mikroorganisme ini dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan, pembentukan tunas, atau kombinasi keduanya serta dapat tumbuh pada suhu 25°C - 37°C (Fajarwati, 2002). Koloni *Candida utilis* pada media *Sabouraud Dextrose Agar* (SDA) bertekstur halus dan berwarna krim. Sedangkan pada media *Corn Meal Agar*, *Candida utilis* biasanya memproduksi rantai bercabang dari silinder blasto-konidia. Mampu memfermentasi glukosa, sukrosa, dan rafinosa, tapi tidak dapat memfermentasikan galaktosa, maltosa, dan laktosa serta mampu mengasimilasi nitrat (Bougnoux, dkk., 1993).

C. Enzim Selulase

Enzim dikenal untuk pertama kalinya sebagai protein oleh Sumner pada tahun 1926 yang telah berhasil mengisolasi urease dari ‘karat pedang’. Sejak tahun 1926 pengetahuan tentang enzim atau enzimologi berkembang dengan cepat (Poedjadi dan Titin, 1994). Enzim merupakan bagian dari protein yang mengkatalisir reaksi-reaksi kimia, enzim juga dapat diartikan sebagai protein katalisator yang memiliki spesifisitas terhadap reaksi yang dikatalisis dan molekul yang menjadi substratnya (Ompusunggu, dkk., 2014).

Enzim berfungsi sebagai katalisator, yaitu senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis (Supriyatna, 2015). Enzim yang berperan sebagai katalisator dalam proses degradasi selulosa yaitu enzim selulase.

Enzim selulase merupakan enzim ekstraseluler dimana enzim ini akan dilepaskan oleh sel mikroorganisme ke dalam media tumbuhnya, sebagai respon adanya substrat selulosa pada media tersebut. Enzim ekstraseluler memiliki beberapa kelebihan dibandingkan enzim intraseluler, diantaranya mampu menghidrolisis substrat-substrat berberat molekul tinggi, relatif stabil, dapat dihasilkan dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi serta lebih mudah dipanen (Kamila, 2003).

Enzim selulase pada umumnya dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti bioteknologi makanan, tekstil, pakan ternak, kertas, pertanian, serta dalam pengembangan penelitian (Sinatari, dkk., 2013). Pengaplikasian enzim selulase antara lain dapat digunakan untuk memperhalus bubur kertas pada industri kertas, menjaga warna kain agar tetap cemerlang pada industri tekstil, meningkatkan kualitas pada industri pangan, sebagai dekomposer bahan-bahan organik, meningkatkan nutrisi pakan ternak, berperan penting dalam biokonversi selulosa

menjadi berbagai komoditas senyawa kimia dan dapat mengurangi dampak negatif dari polusi limbah terhadap lingkungan (Rahayu, 2014).

Enzim selulase sangat penting karena enzim ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lingkungan dari limbah selulosa. Enzim selulase mampu menguraikan selulosa menjadi golongan yang lebih kecil yang kemudian dapat diuraikan lebih lanjut menjadi monomernya antara lain glukosa (Kasmiran dan Tarmizi, 2012).

Aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungannya seperti temperatur, keasaman (pH), konsentrasi substrat, konsentrasi enzim dan aktivator (Bahri, dkk., 2013). Enzim membutuhkan pH tertentu untuk menjalankan aktivitasnya. Enzim membutuhkan pH yang berbeda-beda. Ada enzim yang dapat bekerja optimal pada pH tinggi dan ada pula yang bekerja optimal pada pH yang rendah. Jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah enzim akan mengalami denaturasi dan ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim (Dewi, 2008).

Selulase adalah enzim yang dapat mengkatalisis terjadinya reaksi hidrolisis pada polimer organik, seperti selulosa menjadi komponen gula sederhana yang mencakup glukosa (Andhikawati, dkk., 2014). Pada enzim selulase kompleks terdapat tiga enzim utama yaitu endo- β -1,4-glukanase, ekso- β -1,4-glukanase, dan β -1,4-glukosidase atau selobiose (Oktavia, dkk., 2014). Proses degradasi selulosa menjadi glukosa melibatkan tiga enzim utama dalam enzim selulase kompleks yang bekerja secara sinergis (Hasanah dan Iwan, 2015).

Enzim endo- β -1,4-glukanase berfungsi memotong rantai glukosa yang panjang menjadi rantai yang lebih pendek secara acak, kemudian enzim ekso- β -1,4-glukanase berfungsi memotong setiap dua rantai glukosa (selobiose), dan enzim β -1,4-glukosidase berfungsi memotong selobiose menjadi molekul-molekul

glukosa yang lebih sederhana (Irawati, dkk., 2016). Konsentrasi gula pereduksi ditentukan berdasarkan kurva standar glukosa (Hasanah dan Iwan, 2015).

Aktifitas enzim menyatakan seberapa besar kemampuan enzim dalam menguraikan polisakarida menjadi produknya yaitu monosakarida (Astutik, dkk., 2013) atau jumlah pereduksi yang dilepaskan oleh kerja enzim per satuan waktu (Rahayu, dkk., 2014). Aktifitas ini dihitung dalam satuan International Unit (IU), berdasarkan jumlah mikromol glukosa yang dibebaskan per menit pada kondisi pengujian (Astutik, dkk., 2013).

D. *Fraksinasi Amonium Sulfat*

Pemurnian adalah proses penambahan senyawa yang dapat menggumpalkan dan memisahkan protein dari bahan lain sehingga didapatkan protein yang lebih murni (Mayasari, 2016). Pemurnian berarti membebaskan suatu bahan dari senyawa lain yang mengganggu dan tidak diinginkan atau sering disebut pengotor (Wardani dan Ahsanatur, 2012). Pemurnian protein (enzim) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain, kelarutan relatif protein karena pengaruh pH (pengendapan isoelektrik), polaritas (pengendapan dengan etanol atau aseton), atau fraksinasi dengan mengatur konsentrasi garam amonium sulfat (Su'i dan Suprihana, 2013).

Fraksinasi adalah proses pemisahan fraksi yang terkandung dalam suatu larutan atau suspensi yang memiliki karakteristik berbeda (Yuliasih, 2010). Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan atau memurnikan fraksi-fraksi molekul protein yang terkandung dalam enzim selulase. Pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan fraksinasi protein menggunakan garam amonium sulfat.

Pengendapan protein dengan penambahan garam ke dalam larutan enzim merupakan cara yang banyak dilakukan. Garam yang dapat digunakan berupa natrium klorida, natrium sulfat, atau ammonium sulfat. Namun, ammonium sulfat

lebih sering digunakan karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan garam-garam yang lain, yaitu mempunyai kelarutan yang tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas enzim, mempunyai kelarutan yang tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas enzim, mempunyai daya pengendapan yang efektif, mempunyai efek penstabil terhadap kebanyakan enzim, dapat digunakan pada berbagai pH dan harganya murah (Mayasari, 2016).

Pengendapan protein menggunakan prinsip *salting out*, yaitu mengendapnya protein (enzim) karena air berikatan dengan garam amonium sulfat. Molekul protein terdiri dari bagian asam amino hidrofobik dan bagian asam amino hidrofilik. Bagian asam amino hidrofilik dari protein berinteraksi dengan molekul air sehingga protein yang mengandung asam amino hidrofilik akan larut dalam air, sedangkan protein yang mengandung asam amino hidrofobik akan mengendap terlebih dahulu (Sinatari, dkk., 2013).

Penambahan garam amonium sulfat ke dalam larutan protein akan menarik molekul air dari sekitar permukaan molekul protein, akibatnya protein tidak lagi terlindungi molekul air, melainkan berkumpul dengan sesamanya dan kemudian mengendap (Telussa, 2013). Ketika konsentrasi garam amonium sulfat meningkat secara bertahap pada saat fraksinasi, beberapa molekul air akan tertarik oleh ion garam amonium sulfat, yang menurunkan jumlah molekul air yang tersedia untuk berinteraksi dengan asam amino hidrofilik dari protein, sehingga protein yang mengandung asam amino hidrofilik akan mengendap (Sinatari, dkk., 2013).

Ion garam yang ditambahkan akan mempengaruhi kelarutan protein. Penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Hal ini

dikarenakan adanya peningkatan muatan listrik disekitar protein yang akan menarik molekul-molekul air dari protein (Mayasari, 2016).

Interaksi hidrofobik sesama molekul protein pada suasana ionik tinggi akan menyebabkan pengendapan protein, yang disebut *salting out*. Protein yang hidrofobitasnya tinggi akan mengendap lebih dahulu, sedangkan protein yang memiliki sedikit residu non polar akan tetap larut meskipun pada konsentrasi garam yang lebih tinggi. Pada konsentrasi rendah, ion-ion ini akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini sehingga protein melarut, peristiwa ini disebut *salting in* (Mayasari, 2016). Pada proses fraksinasi ini bertujuan untuk mengeluarkan senyawa lain dari suatu bahan sehingga sesuatu tersebut memiliki kualitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk digunakan sebaik-baiknya sebagai karunia dari Allah SWT agar dapat disyukuri. Sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Fatir/35: 12 sebagai berikut:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak sama (antara) dua lautan yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur” (Kementrian Agama, 2002).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Mishbah menjelaskan bukti yang menunjukkan pengaturan Allah yang sangat teliti sekaligus membuktikan kuasa-Nya. Ayat di atas menyatakan: *Dan*, di antara bukti Kuasa Allah adalah penciptaan dua laut yakni sungai dan laut. *Tidak sama* antara dua laut itu,

yang ini, yakni sungai, tawar, segar, sangat sedap diminum dan yang ini, yakni laut, asin lagi pahit. Kendati keduanya berdampingan dan dari masing-masing laut dan sungai itu kamu dapat memakan daging yang segar dari binatang yang hidup di sana walau di air asin itu dan, di samping makanan tersebut, kamu juga dapat secara bersungguh-sungguh mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya seperti mutiara dan marjan, dan pada masing-masing laut dan sungai itu kamu dapat memakainya seperti mutiara dan marjan, dan pada masing-masing laut dan sungai kamu dapat senantiasa melihat kapal berlayar membelah lautan dengan cepat supaya kamu dengan kemudahan-kemudahan yang dianugerahkan Allah itu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur (Shihab, 2002).

Kata *tastakhrijun* terambil dari kata *ahkraja* yang berarti *mengeluarkan*. Penambahan huruf *sin* dan *ta* pada kata itu mengisyaratkan upaya sungguh-sungguh. Ini berarti untuk memperoleh perhiasan itu dibutuhkan upaya yang lebih (Shihab, 2002). Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperlukan suatu upaya atau proses untuk mendapatkan karunia Allah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh enzim selulase murni dengan aktivitas tinggi maka dilakukan proses pemurnian menggunakan metode fraksinasi ammonium sulfat pada ekstrak kasar enzim untuk mengeluarkan kandungan senyawa lain di dalamnya sehingga didapatkan enzim selulase murni dengan aktivitas tinggi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri.

E. Metode Asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS)

Metode kuantitatif dapat digunakan dalam uji aktivitas enzim selulase yaitu dengan mengamati kadar gula reduksi yang dihasilkan oleh hidrolisis enzim terhadap substrat. Metode yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah

menggunakan metode *dinitrosalicylic* (DNS) atau *Somogy-Nelson* (Irawati, 2016). Metode DNS dengan menggunakan pereaksi DNS untuk mengukur gula reduksi yang diproduksi oleh mikroba memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat diaplikasikan pada gula dengan kadar yang sangat kecil (Putri, 2016). Metode DNS dipilih pada penelitian ini karena merupakan metode yang praktis dan mudah dilakukan untuk pengukuran sampel (Hasanah dan Iwan, 2015). Sedangkan metode *Somogy-Nelson* memiliki kekurangan pada perlakuan analisis yang lama dan lebih rumit serta tingkat bahaya racunnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode DNS (Irawati, 2016).

DNS merupakan senyawa aromatis yang akan bereaksi dengan gula reduksi membentuk asam-3-amino-5-dinitrosalisilat yang merupakan suatu senyawa yang mampu menyerap dengan kuat radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nm (Putri, 2016). Pereaksi DNS dapat bekerja dengan adanya komponen pendukung yang membantu kerja DNS yaitu KNa-Tartarat, fenol, sodium bisulfit (Na_2SO_3), dan natrium hidroksida (NaOH) (Irawati, 2016).

Prinsip pengujian dengan metode *dinitrosalisilat* (DNS) adalah gugus aldehid pada rantai polisakarida dioksidasi menjadi gugus karboksil, disaat yang bersamaan, gugus aldehid gula akan mereduksi asam 3,5-dinitrosalisilat menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat. Reaksi tersebut akan berlangsung terus-menerus selama terdapat gula pereduksi dalam larutan yang diujikan (Hasanah dan Iwan, 2015). Adanya gula pereduksi pada sampel akan bereaksi dengan larutan DNS yang awalnya berwarna kuning menjadi warna jingga kemerahan (Irawati, 2016).

Kadar glukosa yang terbentuk ditentukan dengan menggunakan kurva standar glukosa (Sonia dan Joni, 2015). Aktivitas enzim selulase dinyatakan dalam satuan internasional yaitu U/mL. Satu unit merupakan jumlah enzim yang dibutuhkan untuk

memecah 1 μmol selulosa menjadi gula pereduksi per menit pada kondisi pengujian (Chasanah, dkk., 2013). Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan mengkonversi nilai absorbansi yang diperoleh dari konsentrasi glukosa standar, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus (Irawati, 2016)

$$AE = \frac{C}{\text{BM Produk} \times t} \times \frac{H}{E}$$

Keterangan:

- AE = Aktivitas enzim (Unit/mL)
 C = Konsentrasi glukosa
 BM = Berat molekul glukosa (180 g/mol)
 t = Waktu inkubasi (menit)
 H = Volume total enzim-substrat (mL)
 E = Volume enzim

F. *Metode Bradford*


Metode Bradford adalah metode pengukuran konsentrasi protein total yang menggunakan suatu zat pewarna *Coomassie Brilliant Blue* (CBB). Zat pewarna ini akan berikatan dengan protein yang terdapat pada larutan sampel dalam suasana asam (Purwanto, 2014) dan membentuk warna larutan yaitu warna kebiruan (Masri, 2014) sehingga absorbansi dari protein dapat diukur dengan menggunakan alat instrumen spektrofotometer pada panjang gelombang 465-595 nm (Purwanto, 2014). Kadar protein dalam sampel dapat diketahui dengan menggunakan data absorbansi kurva standar *Bovine Serum Albumin* (BSA).

Reagen *Coomassie Brilliant Blue* (CBB) akan bebas berwarna merah kecoklatan jika berada pada suasana basa. Hal ini dikarenakan *Coomassie Brilliant Blue* (CBB) mengandung residu asam amino dengan rantai samping aromatik (Tyrosine, Tryptophan dan Phenylalanine) atau bersifat basa (Arginine, Histidine dan Leucine) sehingga absorbansi diukur pada λ 465 nm. Namun, reagen CBB akan berwarna biru jika berada pada suasana asam (Yisluth, 2013).

G. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer ultra-violet dan sinar tampak dalam analisis kimia adalah untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode spektrofotometri ultra-violet dan sinar tampak berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah radiasi cahaya tampak, ultra-violet dan cahaya-cahaya lain yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan (Triyati, 1985). Metode ini memerlukan suatu proses pengompleksan sehingga dapat membentuk warna yang spesifik pada larutan agar terukur dalam spektrofotometer UV-Vis (Kurniawati dan Djarot, 2016).

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis yaitu sinar polikromatis dari sumber sinar melewati monokromator menghasilkan sinar monokromatis, kemudian sinar tersebut dilewatkan melalui kuvet yang berisi larutan sampel sehingga menghasilkan sinar yang ditransmisikan dan diterima oleh detektor untuk diubah menjadi energi listrik yang kekuatannya dapat diamati oleh alat pembaca (Jannah, 2014).



Gambar 2.1 Instrumen Spektrofotometer UV-Visible (Jannah: 2014)

Ada beberapa unsur terpenting dalam spektrofotometer yaitu, sumber lampu menggunakan lampu deuterium untuk daerah ultraviolet pada panjang gelombang dari 190-350 nm dan lampu halogen kuarsa atau lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel pada panjang gelombang antara 350-900 nm, kemudian

monokromator digunakan untuk memperoleh dan mengarahkan sinar monokromatis dari hasil penguraian dimana alat ini berupa prisma maupun grating, lalu kuvet digunakan sebagai wadah untuk menaruh cairan sampel yang akan dilewati berkas cahaya spektrofotometer, selanjutnya detektor berfungsi untuk memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang, adapun suatu amplifier (penguat) yang membuat energi listrik itu dapat dibaca oleh sistem pembacaan (Hasanuddin, 2015).

Pengukuran dari alat spektrofotometer UV-Vis berdasarkan hubungan antara berkas radiasi elektromagnetik yang diteruskan (ditransmisikan) atau yang diserap (diabsorpsi) dengan tebalnya cuplikan dan konsentrasi dari komponen penyerap. Untuk mengetahui konsentrasi sampel berdasarkan data serapan sampel (A), maka dibuat suatu kurva kalibrasi yang menyatakan hubungan antara berkas radiasi yang di absorpsi (A) dengan konsentrasi (C) zat standar yang telah diketahui. Perhitungannya menggunakan sistem persamaan linier dan berdasarkan pada hukum Lambert-Beers (Henry, dkk., 2002).

Menurut Triyati (1985), dalam analisis spektrofotometri ultra-violet dan sinar tampak harus diperhatikan hal-hal seperti, kestabilan warna sedapat mungkin warna yang dihasilkan stabil untuk beberapa lama. Reaksi warna yang spesifik, sebaiknya dipakai reaksi warna yang spesifik untuk unsur tertentu, sehingga adanya unsur-unsur lain tidak mengganggu dan pemisahan tidak perlu dilakukan. Sifat zat warna, kalau zat warna yang terbentuk berada dalam keadaan tertutup dan segera diperiksa karena penguapan akan menyebabkan pemekatan larutan. Sensitif, sensitif yaitu dengan perubahan konsentrasi yang kecil, akan menyebabkan pemekatan larutan. Larutan homogen, larutan yang homogen akan mengabsorpsi cahaya di setiap bagian sama.

Spektrofotometer ultra-violet dan sinar tampak dapat digunakan dalam analisis kimia untuk analisis kualitatif dan kuantitatif seperti pada penelitian ini digunakan untuk mengukur aktivitas enzim dan kadar protein suatu larutan enzim. Pengukuran aktivitas enzim dilakukan dengan menggunakan metode DNS untuk mengukur jumlah gula reduksi yang terbentuk dari hasil hidrolisis substrat terhadap enzim. Pada uji aktivitas ini menggunakan pereaksi asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) merupakan senyawa aromatis yang akan bereaksi dengan gula reduksi membentuk asam 3-amino-5-dinitrosalisilat yang merupakan suatu senyawa yang mampu menyerap dengan kuat radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nm (Putri, 2016).

Spektrofotometer dapat digunakan untuk mengukur absorbansi pada uji Bradford. Metode Bradford merupakan suatu uji dengan tujuan untuk mengukur konsentrasi protein total secara kolorimetri dalam suatu larutan. Pada uji Bradford melibatkan pewarna *Coomassie Brilliant Blue* (CBB) yang akan berikat dengan protein dalam suatu larutan. Warna yang dihasilkan dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 465-595 nm (cahaya tampak) (Anam, 2010).

Zat warna yang digunakan pada metode Bradford ini dapat dalam bentuk anion dan kation. Bentuk kation zat warna ini ialah dye *coomassie* yang berwarna merah dan hijau dengan nilai absorbansi maksimum berada pada panjang gelombang kisaran 470 nm hingga 650 nm. Bentuk anion zat warna ini ialah *coomassie* yang berwarna biru dengan nilai absorbansi maksimum berada pada panjang gelombang maksimum 595 nm. Penentuan kadar protein pada suatu larutan dilakukan dengan menentukan jumlah zat warna dalam bentuk anion (reagen *Coomassie Brilliant Blue*) yang diukur dengan panjang gelombang 595 nm (Kardani, 2013).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai Maret 2017 di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Riset Jurusan Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Genetika Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Alat dan bahan

1. Alat

Spektrofotometer UV-Vis Varian Curry 50, neraca analitik, *waterbath shaker incubator* Thermo Scientific, autoklaf Astell Scientific, lemari pendingin Sharp, *Centrifuge Refrigerated* Heraeus Biofuge Stratos, oven Memmert, *magnetic stirrer*, kompor listrik, pipet mikro, *microtube*, pipet volume, pipet skala, labu takar (10 mL, 100 mL), erlenmeyer (250 mL, 100 mL), gelas kimia (100 mL, 250 mL, 500 mL), cawan petri, corong, pembakar spiritus, kaca arloji, tabung reaksi, batang pengaduk, botol steril, ose bulat, pipet tetes, dan spatula.

2. Bahan

Amonium sulfat ((NH₄)₂SO₄), aquadest, asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS), asam fosfat (H₃PO₄) 85 %, *avicel*, *Bovine Serum Albumin* (BSA), *Carboxymethylcellulose* (CMC), *Comasie Brilliant Blue* (CBB) G-25, etanol (C₂H₅OH) 95 %, glukosa (C₆H₁₂O₆), isolat *Candida utilis*, *yeast extract*, alium hidrofosfat (K₂HPO₄), kalium natrium tartrat (K-Na tartrat), kalium nitrat (KNO₃), kalsium klorida (CaCl₂), kapas, kertas saring *whatman* no. 1, magnesium

sulfat heptahidrat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), natrium hidrofosfat dihidrat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), dan natrium hidroksida (NaOH).

C. Prosedur penelitian

1. Pembuatan Media

a. Pembuatan Media Inokulum

Menimbang masing-masing bahan yang digunakan dalam media inokulum terdiri dari K_2HPO_4 0,2 g, CaCl_2 0,008 g, MgSO_4 0,08 g, KNO_3 0,2 g, *yeast extract* 0,8 g, CMC 1 g. Melarutkan dengan aquades sebanyak 200 mL, memanaskan sambil mengaduk hingga larut, lalu memasukkan ke dalam erlenmeyer. Setelah itu menutup mulut erlenmeyer dengan kapas sumbat kemudian mensterilisasi pada suhu 121°C , tekanan 1 atm, selama 15 menit dalam *autoclave* (Yuniar, 2013). Mendinginkan hingga suhu ruang sebelum digunakan.

b. Pembuatan Media Produksi

Menimbang masing-masing bahan yang digunakan dalam media CMC *broth* terdiri dari 10 g CMC, 0,4 g MgSO_4 , 1,5 g KNO_3 , 1 g K_2HPO_4 , 0,04 g CaCl_2 , dan 4 g *yeast extract*, kemudian menambahkan aquades sebanyak 1000 mL. Setelah itu memanaskan media hingga mendidih sambil mengaduk hingga larut, memasukkan semua bahan ke dalam erlenmeyer. Menutup mulut erlenmeyer dengan kapas sumbat, kemudian mensterilisasi media ke dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Mendinginkan media hingga suhu ruang sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya.

2. Produksi enzim selulase dari isolat *Candida utilis*

a. Penyiapan Inokulum

Mengambil sebanyak 5 ose isolat khamir *Candida utilis* dari media agar PDA, memindahkan ke dalam media inokulum secara aseptis lalu menghomogenkan dan

menutup mulut erlenmeyer dengan sumbat kapas. Menginkubasi dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 37°C selama 24 jam dalam *Waterbath shaker incubator*.

b. Produksi Enzim Ekstrak Kasar

Memasukkan media inokulum sebanyak 150 mL ke dalam media produksi. Menghomogenkn lalu menutup dengan sumbat kapas. Setelah itu menginkubasi pada kecepatan 130 rpm pada suhu 37°C selama 5 hari dalam *waterbath shaker incubator*. Selanjutnya ekstrak kasar enzim selulase diperoleh dengan mensentrifugasi dingin kultur pada kecepatan 10000 rpm pada 4°C selama 10 menit (Putri, 2016), Setelah itu memisahkan cairan enzim (supernatan) yang dihasilkan dari endapan (residu) (Wahyuningtyas, dkk., 2013). Mengambil supernatan sebagai ekstrak kasar enzim selulase dan menyimpan dalam lemari pendingin agar dapat digunakan untuk tahap berikutnya.

3. Pemurnian Enzim Selulase

Pemurnian enzim selulase dilakukan dengan metode fraksinasi dengan menggunakan garam ammonium sulfat $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$ untuk memisahkan protein dalam beberapa fraksi. Mengambil ekstrak kasar enzim selulase yang telah diperoleh, kemudian menambahkan dengan amonium sulfat (0-10%) secara perlahan-lahan dan mengaduk menggunakan pengaduk magnetik dalam keadaan dingin hingga larut dan menyimpan selama semalam dalam lemari pendingin. Penambahan jumlah amonium sulfat berdasarkan pada tabel kejenuhan amonium sulfat (0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%, 70%-90%) dan (0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, dan 80-100%). Mensentrifus campuran (ekstrak kasar + garam) dengan kecepatan 12000 rpm selama 15 menit pada suhu 4°C, kemudian memisahkan supernatan dengan endapannya. Setelah itu, melarutkan endapan dengan buffer natrium fospat 0,05 M pH 7. Tahap ini menghasilkan endapan protein enzim selulase fraksi 1 (F1) (0-10%),

selanjutnya menambahkan garam amonium sulfat berdasarkan tabel tingkat kejenuhan 0-10% ke dalam filtrat yang diperoleh dan mensentrifus. Mengulang langkah tersebut sampai tingkat kejenuhan 0-100% (Sinatari, 2013). Selanjutnya melakukan uji aktivitas enzim selulase terhadap ekstrak kasar enzim dan fraksi-fraksi enzim dengan metode DNS dan mengukur kadar protein dengan metode Bradford.

4. Uji Aktivitas Enzim Selulase Metode Asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS)

Aktivitas enzim selulase diuji menggunakan metode DNS dan dinyatakan dalam satuan internasional unit (U/mL). Adanya gula pereduksi yang terbentuk mereduksi reagen DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat) membentuk senyawa yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm.

a. Pembuatan pereaksi DNS

Menimbang 1 g DNS (*3,5-dinitrosalisilic acid*), melarutkan ke dalam 20 mL larutan NaOH 2 N dan 50 mL aquadest, kemudian menambahkan 30 gram K-Na tartrat dan mengaduk dengan magnetik *stirrer* dan menambahkan aquadest hingga volume akhir 100 mL (Hasanah dan Iwan, 2015).

b. Pembuatan larutan standar glukosa

Memasukkan 1,5 mL larutan standar glukosa (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2) mg/mL masing-masing ke dalam tabung reaksi dan 1,5 mL aquadest. Selanjutnya menambahkan sebanyak 1,5 mL reagen DNS pada larutan standar glukosa tersebut dan menghomogenkan. Memanaskan semua tabung reaksi selama 5 menit dan mendinginkan (Hasanah dan Iwan, 2015). Setelah dingin, mengukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) 540 nm (Putri, 2016).

c. Uji aktivitas enzim selulase

Memipet 1,5 mL supernatan (enzim), memasukkan ke dalam 1,5 mL larutan Avicel 1%, dan menambahkan 1,5 mL buffer fosfat pH 7, kemudian mencampurkan lalu menginkubasi selama 30 menit pada suhu 30°C. Selanjutnya menambahkan 1,5 mL pereaksi DNS pada larutan dan mendidihkan selama 5 menit pada penangas air dengan suhu 100°C, setelah itu mendinginkan, kemudian mengukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) 540 nm (Putri, 2016). Kadar glukosa yang terbentuk ditentukan dengan menggunakan kurva standar glukosa (Sonia dan Joni, 2015). Aktivitas enzim selulase dinyatakan dalam satuan internasional yaitu U/mL. Satu unit merupakan jumlah enzim yang dibutuhkan untuk memecah 1 μ mol selulosa menjadi gula pereduksi per menit pada kondisi pengujian (Chasanah, dkk., 2013). Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan mengkonversi nilai absorbansi yang diperoleh dari konsentrasi glukosa standar, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus (Irawati, 2016).

$$AE = \frac{C}{BM \text{ Produk} \times t} \times \frac{H}{E}$$

Keterangan:

- AE = Aktivitas enzim (Unit/mL)
 C = Konsentrasi glukosa
 BM = Berat molekul glukosa (180 g/mol)
 t = Waktu inkubasi (menit)
 H = Volume total enzim-substrat (mL)
 E = Volume enzim

5. Penentuan Kadar Protein Metode Bradford

a. Pembuatan pereaksi Bradford

Menimbang *Comasie Brilliant Blue* (CBB) G-250 sebanyak 10 mg, melarutkan dalam 5 mL etanol (C₂H₅OH) 95 %, kemudian menambahkan 10 mL asam fosfat (H₃PO₄) 85 %, lalu mengencerkan dengan aquadest hingga volume 100

mL (Purwanto, 2014). Jika telah larut sempurna, selanjutnya menyaring larutan dengan menggunakan kertas saring *whatman* no. 1 sesaat sebelum digunakan (Oktavia, 2016).

b. Pembuatan larutan standar BSA

Memasukkan 0,2 mL larutan standar BSA (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1) mg/mL masing-masing ke dalam tabung reaksi dan menambahkan pereaksi Bradford sebanyak 4 mL, kemudian menginkubasi pada suhu ruang selama 5 menit. Membuat larutan blanko dengan mengambil 0,2 mL aquadest dan menambahkan sebanyak 4 mL pereaksi Bradford (Yuneta, dkk., 2010). Selanjutnya mengukur absorbansi larutan standar dan blanko menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) 595 nm (Oktavia, 2014).

c. Penentuan Kadar Protein

Mengambil cairan enzim selulase (supernatan) sebanyak 0,2 mL, kemudian menambahkan 4 mL pereaksi Bradford, lalu menginkubasi selama 5 menit. Selanjutnya mengukur serapan larutan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) 595 nm (Oktavia, 2014).


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemurnian Enzim Selulase menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat

Ekstrak kasar enzim selulase selanjutnya dimurnikan dengan metode fraksinasi menggunakan garam amonium sulfat. Fraksinasi protein bertujuan untuk memurnikan ekstrak kasar protein (enzim) dari molekul-molekul protein lain. Proses fraksinasi dilakukan dengan penambahan garam amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan yang bervariasi sehingga diperoleh fraksi-fraksi enzim dengan tingkat kejenuhan yang berbeda-beda.



Gambar 4.1 Fraksi-fraksi enzim selulase hasil fraksinasi dengan tingkat kejenuhan (0-100%)

Pada Gambar 4.1 menunjukkan fraksi-fraksi enzim hasil pemurnian enzim selulase menggunakan fraksinasi amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan yaitu (a) 0-10% dan 0-20%, (b) 10-30% dan 20-40%, (c) 30-50% dan 40-60%, (d) 50-70% dan 60-80%, (e) 70-90% dan 80-100%.

2. Hasil Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS

Enzim ekstrak kasar dan fraksi enzim dengan tingkat kejenuhan (0-100%) diukur aktivitasnya dengan metode asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS). Fraksi-fraksi enzim memiliki konsentrasi garam yang bervariasi sehingga memiliki tingkat kemurnian yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas enzimnya. Adapun aktivitas enzim selulase yang diperoleh dari hasil fraksinasi amonium sulfat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Aktivitas Enzim Selulase dari Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%)

Tingkat Kejenuhan (%)	Absorbansi	Konsentrasi Glukosa (mg/mL)	Unit Aktvitas (U/mL)
Ekstrak Kasar (tanpa fraksinasi)	0,3972	0,4208	0,0779
10%	0,5026	0,5111	0,0946
20%	0,6991	0,6793	0,1258
30%	0,6383	0,6272	0,1161
40%	0,4170	0,4378	0,0811
50%	0,5454	0,5477	0,1014
60%	0,5025	0,5110	0,0946
70%	0,9230	0,8709	0,1613
80%	1,2702	1,1681	0,2163
90%	1,1280	1,0464	0,1938
100%	0,9905	0,9287	0,1720

3. Hasil Kadar Protein dengan Metode Bradford

Fraksi-fraksi enzim yang telah diketahui aktivitasnya selanjutnya diukur kadar proteinnya menggunakan metode bradford. Pengukuran kadar protein ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kejenuhan amonium sulfat terhadap kadar proteinnya. Adapun kadar protein yang diperoleh dari hasil fraksinasi amonium sulfat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Kadar Protein Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%)

Tingkat Kejenuhan (%)	Absorbansi	Kadar Protein (mg/mL)
Ekstrak Kasar (tanpa fraksinasi)	0,0667	0,0592
10%	0,0723	0,0640
20%	0,0642	0,0571
30%	0,0619	0,0552
40%	0,0822	0,0723
50%	0,0730	0,0646
60%	0,0725	0,0641
70%	0,0216	0,0212
80%	0,0105	0,0119
90%	0,0125	0,0136
100%	0,0139	0,0147

B. Pembahasan

1. Pemurnian Enzim Selulase menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat

Untuk mendapatkan enzim selulase murni, terlebih dahulu dilakukan produksi enzim dari isolat *Candida utilis* sehingga diperoleh ekstrak kasar enzim selulase. Ekstrak kasar enzim yang telah diperoleh kemudian dilanjutkan pada tahap pemurnian untuk memperoleh enzim yang lebih murni dari enzim ekstrak kasarnya. Penelitian ini dilakukan fraksinasi untuk memurnikan enzim ekstrak kasar dengan menggunakan garam amonium sulfat. Tiap-tiap fraksi enzim selulase yang dihasilkan dari proses fraksinasi selanjutnya diukur aktivitas enzim selulasenya menggunakan metode DNS dan diukur juga kadar proteinnya menggunakan metode Bradford.

Proses pemurnian ekstrak kasar dilakukan dengan fraksinasi bertingkat garam amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan yang berbeda-beda yaitu (0-100%). Penggunaan variasi konsentrasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan amonium sulfat terhadap aktivitas enzim selulase dari *Candida utilis*. Amonium

sulfat yang ditambahkan ke dalam ekstrak kasar enzim selulase sesuai persen tingkat kejenuhan penambahan garam amonium sulfat.

Penambahan amonium sulfat dilakukan secara perlahan-lahan dan pengadukannya menggunakan magnetik stirer, hal ini bertujuan agar kontak antara enzim dan garam amonium sulfat dapat berlangsung dengan baik. Setelah itu campuran ekstrak kasar enzim dan garam amonium sulfat disimpan dalam lemari pendingin selama kurang lebih 12 jam, tujuannya agar interaksi molekul-molekul protein dengan garam amonium berlangsung sempurna sehingga protein mengendap dengan baik. Selanjutnya campuran ekstrak kasar dan garam disentrifugasi dingin dengan kecepatan 12000 rpm selama 15 menit pada suhu 4°C untuk memisahkan filtrat dan endapan. Dimana endapan sebagai fraksi enzim yang akan diuji aktivitas dan kadar proteinnya, kemudian filtratnya ditambahkan garam amonium sulfat untuk tingkat kejenuhan berikutnya. Proses diatas dilakukan hingga diperoleh fraksi-fraksi protein dengan persen tingkat kejenuhan 0-100%. Penambahan amonium sulfat berdasarkan tabel kejenuhan Scopes (1987) pada Lampiran 9 dan perhitungannya ditunjukkan pada Lampiran 10.

Fraksinasi protein bertujuan untuk pemisahan ekstrak kasar protein (enzim) dari molekul-molekul protein lain sehingga meningkatkan aktivitas enzim selulase tersebut. Prinsip dari pengendapan protein menggunakan prinsip *salting out*, yaitu mengendapnya protein (enzim) karena air berikatan dengan amonium sulfat. Menurut Bollag (1991) penambahan garam ke dalam larutan protein dapat menaikkan daya larut protein, peristiwa ini disebut "*salting in*". Kenaikan daya larut tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan koefisien aktivitas dari gugus ionik dan kenaikan tersebut akan mencapai tingkat maksimum yang selanjutnya terjadi penurunan daya larut protein, peristiwa ini disebut "*salting out*". Peristiwa tersebut

disebabkan oleh adanya kompetisi antara protein dan garam di dalam pengikatan air serta interaksi di antara sesama protein.

Molekul protein terdiri atas bagian asam amino hidrofobik dan bagian asam amino hidrofilik. Bagian asam amino hidrofilik dari protein berinteraksi dengan molekul air sehingga protein yang mengandung asam amino hidrofilik akan larut dalam air, sedangkan protein yang mengandung asam amino hidrofobik akan mengendap terlebih dahulu (Hasanah, 2014). Peningkatan konsentrasi garam secara bertahap akan menarik molekul-molekul air ke ion garam amonium sulfat, sehingga menurunkan jumlah molekul air untuk berinteraksi dengan asam amino hidrofilik dari protein, sehingga protein yang mengandung asam amino hidrofilik akan mengendap.

Penelitian ini menggunakan metode penggaraman dengan padatan garam amonium sulfat. Metode ini digunakan karena salah satu metode yang sederhana dan murah serta tidak merusak enzim. Penggunaan garam amonium sulfat juga memiliki beberapa keuntungan antara lain, tidak toksik, mudah larut, dan stabil terhadap enzim karena tidak mempengaruhi struktur proteinnya. Setelah tahapan pemurnian enzim selulase menggunakan metode fraksinasi garam amonium sulfat maka diperoleh fraksi-fraksi enzim selulase dengan berbagai tingkat kejenuhan ditunjukkan oleh Gambar 4.1 yang selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif untuk mengukur aktivitas enzim selulasenya.

2. Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS


Fraksi-fraksi enzim hasil fraksinasi dilanjutkan pada tahap analisis kuantitatif dengan melakukan pengukuran aktivitas enzim menggunakan metode asam dinitrosalisilat (DNS). Pengukuran aktivitas dilakukan dengan menambahkan supernatan (enzim) ke dalam larutan substrat *avicel* dan ditambahkan buffer fosfat

pH 7. Fungsi dari *avicel* sebagai substrat yang akan dihidrolisis oleh enzim menghasilkan gula pereduksi, sedangkan penambahan bufer fosfat sebagai bahan yang dapat mempertahankan pH larutan agar tidak mempengaruhi struktur dan aktivitas biologis enzim (enzim tidak terdenaturasi). Selanjutnya campuran larutan diinkubasi selama 15 menit pada suhu 30°C, kemudian ditambahkan pereaksi DNS lalu dididihkan selama 5 menit dan didinginkan. Setelah itu diukur aktivitas enzim selulase menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Tujuan dilakukan inkubasi pada suhu 30°C agar proses hidrolisis berlangsung baik dan suhu tersebut merupakan waktu optimum dari enzim untuk menghidrolisis substrat yang diperoleh dari penelitian Pertiwi (2017) yang melakukan karakterisasi enzim selulase yang dihasilkan khamir *Candida utilis*.

Penambahan DNS berfungsi sebagai senyawa bersifat oksidator yang dapat mereduksi gula pereduksi sekaligus sebagai senyawa kompleks berwarna orange kekuningan yang akan memberi warna pada larutan sehingga dapat diukur oleh spektrofotometer uv-vis. Perlakuan pemanasan setelah penambahan DNS bertujuan untuk menghentikan kerja enzim dalam menghidrolisis substrat.

Tujuan analisis dengan metode DNS dilakukan untuk mengetahui aktivitas enzim selulase berdasarkan kadar gula pereduksi yang terbentuk sebagai hasil hidrolisis substrat oleh enzim selulase. Metode DNS dipilih pada penelitian ini karena merupakan metode yang umum digunakan untuk pengukuran aktivitas enzim selulase dengan mengukur jumlah gula pereduksi yang terbentuk dan metode ini juga mudah dilakukan untuk mengukur sampel dalam jumlah banyak. Prinsip metode DNS ini adalah asam 3,5 dinitrosalisilat direduksi menjadi asam 3-amino-5-dinitrosalisilat. Gugus aldehid pada rantai polisakarida dioksidasi menjadi gugus karboksil, dan disaat yang bersamaan gugus aldehid gula akan mereduksi asam


dinitrosalisilat seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Reaksi akan berlangsung terus menerus selama terdapat gula pereduksi dalam larutan uji. Perubahan warna yang terjadi pada reagen DNS adalah dari warna kuning menjadi orange kemerahan (Hasanah, 2014).



Gambar 4.2 Reaksi antara pereaksi asam 3,5-dinitrosalisilat dan gula reduksi

Penentuan aktivitas enzim dilakukan dengan menentukan konsentrasi gula reduksi dengan cara membuat kurva standar glukosa. Larutan glukosa dipilih sebagai larutan untuk pembuatan kurva standar karena glukosa termasuk gula reduksi yang dihasilkan dari hidrolisis substrat oleh enzim selulase. Hasil analisis kurva standar memiliki persamaan linier $y = 1,1683x - 0,0945$ dengan nilai korelasi (R^2) sebesar 0,9944. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi glukosa pada sampel fraksi enzim.

Aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai 1 μmol gula reduksi yang dihasilkan oleh enzim dari proses hidrolisis substrat selulosa permenit (Sinaga, 2013). Aktivitas enzim dapat menggambarkan kemurnian suatu enzim. Makin tinggi aktivitasnya, maka enzim tersebut makin murni. Aktivitas ekstrak kasar enzim dan fraksi-fraksi enzim selulase dari *Candida utilis* hasil fraksinasi dapat dilihat pada Tabel 4.1.



Gambar 4.3 Aktivitas Enzim Selulase terhadap Tingkat Kejenuhan Amonium Sulfat

Pada Gambar 4.3 menunjukkan hasil dari pengujian aktivitas enzim diperoleh data pada variasi tingkat kejenuhan amonium sulfat (0-100%). Pada fraksi 10-20 % diperoleh endapan protein yang sangat sedikit dan memiliki kenaikan aktivitas kecil dari ekstrak kasarnya yang disebabkan interaksi antara enzim selulase dan garam amonium belum maksimal. Pada fraksi 30-60% endapan protein semakin bertambah yang menunjukkan terjadinya interaksi antara enzim selulase dan garam amonium semakin baik. Pada fraksi 70-80% diperoleh endapan protein yang lebih banyak dan terjadi peningkatan aktivitas yang tinggi dari ekstrak kasarnya yang menunjukkan terjadinya interaksi antara enzim selulase dan garam amonium semakin maksimal. Pada fraksi 90-100% diperoleh endapan protein yang sedikit dan mengalami penurunan aktivitas dari fraksi sebelumnya yang menunjukkan interaksi antara enzim selulase dan garam amonium berkurang. Peningkatan enzim tertinggi berada pada fraksi enzim dengan tingkat kejenuhan 80% sebesar 0,2163 U/mL. Aktivitas fraksi enzim 80% tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan larutan enzim ekstrak kasarnya dengan nilai aktivitas sebesar 0,0779 U/mL. Menurut Su'i dan Suprihana (2013) setiap protein akan mengendap pada konsentrasi garam yang berbeda-beda.


Protein yang bersifat hidrofobik akan mengendap pada konsentrasi garam yang rendah, sedangkan protein yang bersifat hidrofilik memerlukan konsentrasi garam yang tinggi untuk mengendapkannya. Hal ini juga terjadi pada enzim karena enzim tersusun atas protein.

Hasil penelitian Sinatari (2013) menyatakan bahwa pemurnian enzim selulase dari isolat KB kompos termofilik hasil fraksinasi amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan 0-100% memiliki aktivitas tertinggi pada fraksi enzim 40% sebesar 0,7492 U/mL. Penelitian Megasari (2009) yang melakukan pemurnian enzim lipase dari bakteri termofilik dengan metode fraksinasi menggunakan amonium sulfat 0-100% memiliki aktivitas enzim tertinggi pada fraksi 30%. Hal tersebut berarti enzim tersebut cenderung bersifat hidrofobik sehingga mengendap pada konsentrasi garam yang rendah. Sedangkan pada penelitian ini yang melakukan fraksinasi enzim selulase *Candida utilis* dengan tingkat kejenuhan amonium sulfat 0-100% menunjukkan aktivitas enzim paling tinggi pada fraksi 80%. Hal ini berarti, enzim selulase tersebut bersifat hidrofilik sehingga memerlukan konsentrasi amonium sulfat yang tertinggi untuk mengendapkannya. Setelah mengukur aktivitas enzim selulase setiap fraksi-fraksi enzim dan ekstrak kasar enzim kemudian dilanjutkan pada tahap analisis kuantitatif berikutnya yaitu mengukur kadar proteinnya.

3. Kadar Protein dengan Metode Bradford

Fraksi-fraksi enzim yang telah diukur aktivitas enzimnya kemudian diukur kadar proteinnya dengan metode Bradford. Analisis kadar protein dengan metode Bradford merupakan metode pengukuran konsentrasi protein total yang melibatkan pewarna Coomassie Brilliant Blue (CBB). Pengukuran kadar protein dilakukan dengan cara mengambil cairan enzim kemudian ditambahkan pereaksi Bradford. Setelah itu diinkubasi selama 5 menit, selanjutnya mengukur serapan larutan


menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 595 nm. Pereaksi bradford berfungsi sebagai zat warna yang akan berikatan dengan protein yang terdapat pada larutan sampel dalam suasana asam dan membentuk warna larutan yaitu warna kebiruan. Oleh karena itu, absorbansi protein dapat diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 465-595 nm. Kadar protein dalam fraksi-fraksi enzim dapat ditentukan dengan membuat kurva standar *Bovine Serum Albumin* (BSA).



Gambar 4.4 Kadar Protein Enzim Selulase terhadap Tingkat Kejenuhan Amonium Sulfat

Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa kadar protein berbeda-beda pada tiap fraksi. Perbedaan kadar protein tiap fraksi menunjukkan adanya perbedaan kelarutan protein dalam air. Protein yang kelarutannya kurang dalam air maka terlebih dahulu mengendap dibandingkan protein yang kelarutannya lebih tinggi dalam air. Kadar protein tertinggi pada enzim selulase hasil fraksinasi berada pada fraksi 40% dengan nilai sebesar 0,0723 mg/mL. Hal ini berarti enzim ekstrak kasar setelah melalui proses fraksinasi dengan konsentrasi garam yang tinggi tidak lagi terdapat protein-protein lain yang terendapkan melainkan hanya protein enzim selulase. Pada Gambar 4.4 menunjukkan nilai kadar protein berbeda-beda pada tiap tingkat

kejenuhan, hal ini karena terjadinya pengendapan jenis protein pada tingkat kejenuhan tertentu disebabkan dalam ekstrak kasar enzim selulase yang diproduksi mengandung lebih dari 1 jenis protein. Hal ini sesuai dengan penelitian Evi (2011) bahwa bila garam netral yang ditambahkan berkonsentrasi tinggi maka protein akan mengendap. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam amonium sulfat lebih menarik air maka jumlah air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang. Apabila ke dalam larutan protein ditambahkan larutan garam dengan konsentrasi tinggi, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga membentuk endapan. Dari data hasil pengujian aktivitas dan kadar protein dapat diketahui hubungan antara kedua pengujian berbanding terbalik dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Hubungan antara Aktvtas Enzim dan Kadar Protein

Pada Gambar 4.5 menunjukkan hubungan antara aktivitas enzim dan kadar protein memiliki hubungan yang berbanding terbalik, dapat dilihat bahwa pada nilai aktivitas ekstrak kasar enzim sebesar 0,0779 U/mL mengalami kenaikan aktivitas tertinggi pada fraksi 80% sebesar 0,2163 U/mL. Hal ini sesuai teori menurut

Hasanah (2014) bahwa larutan ekstrak kasar memiliki nilai aktivitas lebih rendah dari enzim hasil fraksinasi karena banyaknya pengaruh pengotor dalam ekstrak kasar enzim. Sedangkan pada grafik menunjukkan kadar protein pada ekstrak kasar sebesar 0,0592 mg/mL mengalami kenaikan kadar protein pada fraksi 40% sebesar 0,0723 mg/mL kemudian mengalami penurunan kadar protein terendah pada fraksi 80% sebesar 0,0119 mg/mL yang berbanding terbalik dengan nilai aktivitas tertingginya berada pada fraksi tersebut. Hal ini berarti bahwa pemberian amonium sulfat hingga tingkat kejenuhan 80%, makin tinggi tingkat kejenuhan amonium sulfat maka total proteinnya makin rendah. Semakin berkurangnya kadar protein dikarenakan larutan protein mengalami titik kejenuhan. Kadar protein yang rendah pada fraksi 80% tersebut juga terjadi karena pada ekstrak kasar mengandung banyak protein selain enzim selulase menyebabkan kadar proteinnya tinggi dan setelah melalui proses fraksinasi amonium sulfat maka protein lain dalam ekstrak kasar terendapkan pada fraksi tingkat kejenuhan tertentu sehingga protein enzim selulase terendapkan dengan baik pada fraksi tingkat kejenuhan 80%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak kasar enzim selulase dari isolat khamir *Candida utilis* memiliki aktivitas enzim selulase sebesar 0,0779 U/mL sedangkan enzim hasil fraksinasi amonium sulfat memiliki kenaikan aktivitas pada fraksi 80% dengan nilai aktivitas enzim selulase tertinggi yaitu sebesar 0,2163 U/mL.
2. Ekstrak kasar enzim selulase dari isolat khamir *Candida utilis* memiliki kadar protein sebesar 0,0592 mg/mL sedangkan enzim hasil fraksinasi amonium sulfat memiliki kadar protein tertinggi berada pada fraksi 40% yaitu sebesar 0,0723 mg/mL.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya dilakukan uji kualitatif pada enzim selulase yang diperoleh sebagai identifikasi awal untuk mengetahui keberadaan enzim selulase yang diproduksi dari isolat khamir *Candida utilis*.
2. Perlunya proses dialisis enzim selulase dari hasil fraksinasi amonium sulfat agar diperoleh enzim yang lebih murni dan aktivitasnya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al Qarim

Andhikawati, Aulia, dkk., "Isolasi Dan Penapisan Kapang Laut Endofit Penghasil Selulase". *J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 6, no. 1 FPIK-IPB, Bogor (2014): h. 219-227.

Anonim. *Final Screening Assessment for Candida utilis ATCC 9950*. Canada: Environment and Climate Change, 2016.

Astutik, Rahayu Puji, dkk., "Uji Aktifitas Enzim Selulase dan Xilanase Isolat kapang Tanah Wonorejo Surabaya". *J. Biologi* (2013): h. 1-13.

Bahri, Syaiful, dkk., "Karakterisasi Enzim Amilase dari Kecambah Biji Jagung Ketan (*Zea mays ceratina* L.)". *J. Natural Science* 1, no. 1 (2012): h. 132-143.

Bougnoux, Marie Elisabeth, dkk., "Resolutive *Candida utilis* Fungemia in a Nonneutropenic Patient". *J. Clinical Microbiology* 31, no. 6 (1993): h. 1644-1645.

Chasanah, Ekowati, dkk., "Karakterisasi Enzim Selulase PMP 0126Y dari Limbah Pengolahan Agar". *J. JPB Perikanan* 8, no. 2 (2013): 103-114.

Dewi, Iche Marina. "Isolasi Bakteri dan Uji Aktivitas Kitinase Termofilik Kasar dari Sumber Air Panas Tinggi Raja". *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Eka P, Agustinus dan Amran Halim. "Pembuatan Bioetanol dari Nira Siwalan Secara Fermentasi Fese Cair Menggunakan Fermipan". *J. Teknik Kimia* (2009): h. 1-5.

Fajarwati, Sri. "Produksi Protein Sel Tunggal *Candida utilis* pada Media Molase dengan Penambahan Glukosa dan Urea". *Skripsi*. Semarang: FMIPA Universitas Diponegoro, 2002.

Hasanah, Nur. "Seleksi dan Optimasi Pemurnian Enzim Selulase Mikrob dari Limbah Media Tanam Jamur Merang". *Skripsi*. Bogor: FMIPA IPB, 2014.

Hasanah, Nur dan Iwan Saskiawan. "Aktivitas Selulase Isolat Jamur dari Limbah Media Tanam Jamur Merang". *J. Prosedum Seminar Masyarakat Biodiv Indonesia* 1, no.5 (2015): h. 1110-1115.


Hasanuddin. "Analisa Kadar Likopen pada Tomat dengan Menggunakan Spektrofotometer Visible". *Skripsi*. Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Henry, Arthur, dkk., "Analisis Spektrofotometri UV-Vis pada Obat Influenza dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Persamaan Linier". *J. Proceedings, Komputer dan Sistem Intelijen* (2002): h. 1-11.

Idiawati, Nora, dkk., "Produksi Enzim Selulase oleh *Aspergillus niger* pada Ampas Sagu". *J. Natur Indonesia* 16, no. 1 (2014): h. 1-9.

- Irawati, Rosyida. "Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat Pada Enzim Selulase Kasar Yang Diproduksi Oleh *Bacillus Circulans*". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Jannah, Mujahidah Nida'ul. "Perbandingan Aktivitas Antioksidan dan Kadar Flavonoid Total pada Bonggol serta Daun Brokoli (*Brassica oleracea* L. cv. *groups Broccoli*)". *Skripsi*. Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, 2014.
- Jumiyati, dkk., "Isolasi dan Identifikasi Khamir Secara Morfologi Di Tanah Kebun Wisata Pendidikan Universitas Negeri Semarang". *J. Biosaintifika* 4, no. 1 (2012): h. 27-35.
- Kamila, Laili. "Pencirian Selulolitik Isolat Khamir *Rhodotorula* sp. dari Tanah Hutan Taman Nasional Gunung Halimun". *J. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan IPA, IPB* (2003).
- Kanti, Atit. "Identifikasi Jenis Khamir yang Diisolasi dari Tanah Gambut Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi". *J. Biosmart* 6, no. 1 (2004): h. 10-14.
- Kanti, Atit, dkk., "Aktivitas CMC-ase Khamir *Candida* sp. yang Diisolasi dari Tanah Kebun Biologi Wamena, Papua". *J. Berita Biologi* 6, no. 5 (2003): h. 655-660.
- Kurniawati, Suerni dan Djarot Sugiarso. "Perbandingan Kadar Fe (II) dalam Tablet Penambah Darah secara Spektrofotometri UV-Vis yang Dipreparasi Menggunakan Metode Destruksi Basah dan Destruksi Kering". *J. Sains dan Seni* 5, no. 1 (2016): h. 2337-3520.
- Kasmiran, Ariani dan Tarmizi. "Aktivitas Enzim Selulase dari Kapang Selulolitik pada Substrat Ampas Kelapa". *J. Lentera* 12, no. 1 (2012): h. 9-14.
- Masri, Mashuri. "Isolasi dan Pengukuran Aktivitas Enzim Bromelin dari Ekstrak Kasar Bonggol Nanas (*Ananas comosus*) pada Variasi Suhu dan pH". *J. Biogenesis* 2, no. 2 (2014): h. 119-125.
- Mayasari, "Pemurnian Enzim Amilase Kasar dari Bakteri Amilolitik Endogenous Bekatul Secara Parsial Menggunakan Ammonium Sulfat". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Oktavia, Yulia, dkk., "Karakterisasi dan Pemurnian Enzim Selulase Kapang Endofit dari Lamun (*Enhalus* sp.)". *J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 6, no. 1 (2014): h. 209-218.
- Ompusunggu, Henny Erina Saurmauli, dkk., "Kajian Biomedik Enzim Amilase dan Pemanfaatannya dalam Industri". *J. Biokimia* (2014): h. 1-17.
- Pelczar, Michael J dan E.C.S Chon. *Elements of Microbiology*, Terj. Ratna Sri Hadioetomo, Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Poedjiadi, Anna dan F.M. Titin Supriyanti. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Purwanto, Maria Goretti M. "Perbandingan Analisa Kadar Protein Terlarut dengan Berbagai Metode Spektroskopi UV-Visible". *J. Ilmiah Sain dan Teknologi* (2014): h. 64-70.


- Putranto, Wendry Setiyadi, dkk., "Isolasi *Yeasts* dari Daging dan Potensinya sebagai Agen Biopreservasi dan Pewarna Makanan". *J. Ilmu Ternak* 10, no. 1 (2010): h. 21-25.
- Putri, Syarafina. "Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Oleh *Lactobacillus Plantarum* Pada Variasi Suhu, pH Dan Konsentrasi Substrat". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Rahayu, Ariani Gusti. "Uji Aktivitas Selulolitik dari Tiga Isolat Bakteri *Bacillus* sp. Galur Lokal Riau". *J. JOM FMIPA* 1, no. 2 (2014): h. 319-327.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinaga, Masdalena, dkk., "Pemekatan Enzim Selulase *Penicillium* sp. LBKURCC20 dengan Pengendapan Amonium Sulfat 80% Jenuh". *J. FMIPA* (2014).
- Sinatari, H.M, dkk., "Pemurnian Selulase dari Isolat KB Kompos Termofilik Desa Bayat Klaten Menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat". *J. Chem Info* 1, no. 1 (2013): h. 130-140.
- Sonia, Nenu Maria Ovy dan Joni Kusnadi. "Isolasi dan Karakterisasi Parsial Enzim Selulase dari Isolat Bakteri OS-16 Asal Padang Pasir Tengger-Bromo". *J. Pangan dan Agroindustri* 3, no. 4 (2015): h. 11-19.
- Su'i, Moh dan Suprihana. "Fraksinasi Enzim Lipase dari Endosperm Kelapa dengan Metode *Salting Out*". *J. Agritech* 33, no 4 (2013): h. 377-383.
- Sundari. "Pengaruh Fermentasi dengan *Candida utilis* pada Bungkil Inti Kelapa Sawit Terhadap Komposisi Kimia dan Energi Metabolis untuk Ayam Kampung". *J. Buletin Peternakan* 27, no. 3 (2003): h. 109-116.
- Supriyatna, Ateng, dkk., "Aktivitas Enzim Amilase, Lipase dan Protease dari Larva *Hermetia illucens* yang Diberi Pakan Jerami Padi". *J. Biokimia* 5, no. 2 (2015): h. 18-32.
- Telussa, Ivonne, dkk., "Isolasi Bakteri Penghasil Enzim Lipase dari *Coco Butter Substitute* dan Karakterisasi Lipasenyanya". *J. Prosiding FMIPA Universitas Pattimura* (2013): h. 134-143.
- Triyati, Ety. "Spektrofotometer Ultra-Violet dan Sinar Tampak serta Aplikasinya dalam Oseanologi". *Oseana* 10, no. 1 (1985): h. 39-47.
- Wahyuningtyas, dkk., "Studi Pembuatan Enzim Selulase Dari Mikrofungi *Trichoderma Reesei* Dengan Substrat Jerami Padi Sebagai Katalis Hidrolisis Enzimatik Pada Produksi Bioetanol". *J. Bioproses Komeditas Tropis* 1, no 1 (2013): h. 21-25.
- Yuliasih, Indah, dkk., "Pengaruh Proses Fraksinasi Pati Sagu Terhadap Karakteristik Fraksi Amilosanya". *J. Teknik Industri Pertanian* 17, no. 1 (2010): h. 29-36.
- Yuneta, dkk., "Pengaruh Suhu pada Lipase dari Bakteri *Bacillus subtilis*". *J. Prosiding Kimia FMIPA* (2010): h. 1-5.
- Yuniar, Widya, "Skrining dan Identifikasi Kapang Selulolitik pada Proses Vermikomposting Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)" *Skripsi*. Jember: FMIPA (2013): h. 1-39.

Lampiran 1: Skema Penelitian


Lampiran 2: Bagan Kerja Prosedur Penelitian

A. Produksi Enzim Selulase

1. Penyiapan Inokulum




2. Produksi Enzim



B. Pemurnian Enzim Selulase Metode Fraksinasi Amonium Sulfat

Fraksinasi Amonium Sulfat $[(\text{NH}_2)_2\text{SO}_4]$



C. Uji Aktivitas Enzim Selulase

1. Pembuatan kurva standar glukosa konsentrasi (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2)

Larutan Standar Glukosa

- Dimasukkan 1,5 mL ke dalam tabung reaksi
- Ditambahkan 1,5 mL aquades
- Ditambahkan 1,5 mL pereaksi DNS
- Dihomogenkan
- Dipanaskan selama 5 menit
- Didinginkan
- Diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) maksimal 540 nm

Kurva Standar Glukosa

2. Uji aktivitas enzim selulase metode DNS (*3,5-dinitrosalisilic acid*)


Fraksi-fraksi Enzim dan ekstrak kasar enzim

- Dipipet masing-masing sebanyak 1,5 mL
- Ditambahkan 1,5 mL larutan substrat (*Avicel* 2%)
- Ditambahkan 1,5 mL buffer fosfat pH 7
- Dihomogenkan
- Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 30°C
- Ditambahkan 1 mL pereaksi DNS
- Dididihkan selama 5 menit pada penangas air kemudian didinginkan
- Diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang (λ) = 540 nm


Hasil

D. Penentuan Kadar Protein


1. Pembuatan kurva standar BSA konsentrasi (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1)



2. Penentuan kadar protein metode Bradford



Lampiran 3: Skema Kerja Fraksinasi Enzim Selulase dengan Amonium Sulfat



Lampiran 4: Pembuatan Larutan Standar Glukosa dan *Bovine Serum Albumin* (BSA)

4.1 Larutan Standar Glukosa

Standar glukosa dengan variasi konsentrasi (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2) mg/mL diencerkan dari larutan induk konsentrasi 2 mg/mL.

$$\frac{2 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} = \frac{20 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = \frac{50 \text{ mg}}{25 \text{ ml}} = \frac{0,05 \text{ g}}{25 \text{ ml}}$$

Larutan induk glukosa konsentrasi 2 mg/mL dibuat sebanyak 25 mL dan dibutuhkan 0,05 gram glukosa, dilarutkan dengan *water one* sebanyak 25 mL. Kemudian diencerkan ke konsentrasi (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2) sebanyak 5 mL. Pengenceran dibuat sesuai dengan perhitungan dibawah ini:

a. Konsentrasi 0,2 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \cdot M_1 &= V_2 \cdot M_2 \\ V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,2 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 0,5 \text{ mL larutan induk glukosa} + 4,5 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

b. Konsentrasi 0,4 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \cdot M_1 &= V_2 \cdot M_2 \\ V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,4 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 1 \text{ mL larutan induk glukosa} + 4 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 0,6 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \cdot M_1 &= V_2 \cdot M_2 \\ V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,6 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 1,5 \text{ mL larutan induk glukosa} + 3,5 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 0,8 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} = 5 \text{ mL} \cdot 0,8 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL larutan induk glukosa} + 3 \text{ mL water one}$$

e. Konsentrasi 1 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} = 5 \text{ mL} \cdot 1 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL larutan induk glukosa} + 2,5 \text{ mL water one}$$

f. Konsentrasi 1,2 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 2 \text{ mg/mL} = 5 \text{ mL} \cdot 1,2 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 3 \text{ mL larutan induk glukosa} + 2 \text{ mL water one}$$

4.2 Larutan Standar *Bovine Serum Albumin (BSA)*

Standar BSA dengan variasi konsentrasi (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1) mg/mL diencerkan dari larutan induk konsentrasi 1 mg/mL.

$$\frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} = \frac{10 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = \frac{0,01 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

Larutan induk BSA konsentrasi 1 mg/mL dibuat sebanyak 10 mL dan dibutuhkan 0,01 gram BSA, dilarutkan dengan *water one* sebanyak 10 mL. Kemudian diencerkan ke konsentrasi (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1) mg/mL sebanyak 3 mL. Pengenceran dibuat sesuai dengan perhitungan dibawah ini:

a. Konsentrasi 0,02 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 0,1 \text{ mg/mL} = 3 \text{ mL} \cdot 0,02 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 0,6 \text{ mL larutan induk BSA} + 2,4 \text{ mL water one}$$

b. Konsentrasi 0,04 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 0,1 \text{ mg/mL} = 3 \text{ mL} \cdot 0,04 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 1,2 \text{ mL larutan induk BSA} + 1,8 \text{ mL water one}$$

c. Konsentrasi 0,06 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 0,1 \text{ mg/mL} = 3 \text{ mL} \cdot 0,06 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 1,8 \text{ mL larutan induk BSA} + 1,2 \text{ mL water one}$$

d. Konsentrasi 0,08 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 0,1 \text{ mg/mL} = 3 \text{ mL} \cdot 0,08 \text{ mg/mL}$$


$$V_1 = 2,4 \text{ mL larutan induk BSA} + 0,6 \text{ mL water one}$$

e. Konsentrasi 0,1 mg/mL

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 0,1 \text{ mg/mL} = 3 \text{ mL} \cdot 0,1 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 3 \text{ mL larutan induk BSA}$$



Lampiran 5: Kurva Standar Pengukuran Konsentrasi Glukosa untuk Penentuan Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat)


1. Data kurva kalibrasi larutan standar glukosa pada $\lambda = 540 \text{ nm}$

No.	Konsentrasi	Absorbansi
1.	Blanko	0,0000
2.	0,2	0,0763
3.	0,4	0,3225
4.	0,6	0,6018
5.	0,8	0,8137
6.	1	1,0907
7.	1,2	1,3406

2. Data analisis kurva kalibrasi larutan standar glukosa

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	xy
1.	Blanko	0,0000	0	0,0000	0,0000
2.	0,2	0,0763	0,04	0,0058	0,0153
3.	0,4	0,3225	0,16	0,1040	0,1290
4.	0,6	0,6018	0,36	0,3622	0,3611
5.	0,8	0,8137	0,64	0,6621	0,6510
6.	1	1,0907	1	1,1896	1,0907
7	1,2	1,3406	1,44	1,7972	1,6087
N = 7	$\Sigma = 4,2$	$\Sigma = 4,2456$	$\Sigma = 3,8558$	$\Sigma = 3,64$	$\Sigma = 4,1209$
	$\Sigma = 0,6$	$\Sigma = 0,6065$			

3. Grafik kurva kalibrasi larutan standar glukosa



Analisis Data:

a. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$y = ax - b$$

$$a = \frac{n \times \sum xy - \sum x \times \sum y}{n \times \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{7 \times 3,8558 - 4,2 \times 4,2456}{7 \times 3,64 - (4,2)^2}$$

$$a = \frac{26,9906 - 17,8315}{25,48 - 17,64}$$

$$a = \frac{9,1591}{7,84}$$

$$a = 1,1682$$

$$b = y \text{ rata-rata} - ax \text{ rata-rata}$$

$$= 0,6065 - (1,1683 \times 0,6)$$

$$= 0,6065 - 0,7009$$

$$= -0,0944$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$y = 1,1682x - 0,0944$$

b. Nilai Regresi (R^2)

$$R^2 = \frac{n \times \sum xy - \sum x \times \sum y}{\sqrt{((n \times \sum x^2) - (\sum x)^2) ((n \times \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{7 \times 3,8558 - 4,2 \times 4,2456}{\sqrt{((7 \times 3,64) - (4,2)^2) - ((7 \times 4,1209) - (4,2456)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{26,9906 - 17,8315}{\sqrt{(25,48 - 17,64) (28,8463 - 18,0251)}}$$

$$R^2 = \frac{9,1591}{\sqrt{(7,84 \times 10,8212)}}$$

$$R^2 = \frac{9,1591}{\sqrt{84,8382}}$$

$$R^2 = \frac{9,1591}{9,2108}$$

$$R^2 = 0,9944$$

Lampiran 6: Penentuan Aktivitas Enzim Selulase dari *Candida utilis* Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%) dengan Metode DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat)

Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan menggunakan metode DNS berdasarkan jumlah gula reduksi yang terbentuk dari hasil hidrolisis substrat oleh enzim. Satu unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang menghasilkan 1 μ mol glukosa per menit (U/mL).

No.	Fraksi Enzim	Absorbansi	Konsentrasi Glukosa (mg/mL)	Unit Aktivitas (U/mL)
1.	Ekstrak kasar (tanpa fraksinasi)	0,3972	0,4208	0,0779
2.	10%	0,5026	0,5110	0,0946
3.	20%	0,6991	0,6793	0,1258
4.	30%	0,6383	0,6272	0,1161
5.	40%	0,4170	0,4378	0,0811
6.	50%	0,5454	0,5477	0,1014
7.	60%	0,5025	0,5110	0,0946
8.	70%	0,9230	0,8709	0,1613
9.	80%	1,2702	1,1681	0,2163
10.	90%	1,1280	1,0464	0,1938
11.	100%	0,9905	0,9287	0,17202

A. Konsentrasi Glukosa dalam Fraksi Enzim

Berikut contoh perhitungan untuk mendapatkan konsentrasi glukosa pada fraksi enzim:

- 1) Konsentrasi glukosa pada ekstrak kasar (tanpa fraksinasi)

$$y = ax - b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{0,3972 - 0,0944}{1,1682}$$

$$x = 0,4208 \text{ mg/mL}$$

2) Konsentrasi glukosa pada fraksi 10%

$$y = ax - b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{0,5026 - 0,0944}{1,1682}$$

$$x = 0,5110 \text{ mg/mL}$$

B. Aktivitas Enzim Selulase

Berikut contoh perhitungan untuk mendapatkan aktivitas enzim pada fraksi enzim:

$$\text{Aktivitas enzim (U/mL)} = \frac{C}{\text{Mr Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol}$$

1) Aktivitas enzim selulase pada ekstrak kasar (tanpa fraksinasi)

$$\begin{aligned} \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{\text{Mr Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{0,4208 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1,5 \text{ mL}} \times \frac{1,5 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{631,22 \text{ } \mu\text{mol}}{8100 \text{ mL.menit}} \\ &= 0,0779 \text{ } \mu\text{mol/mL.menit} \\ &= 0,0779 \text{ Unit/mL} \end{aligned}$$

2) Aktivitas enzim selulase pada fraksi 10%

$$\begin{aligned} \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{\text{Mr Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{0,5110 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1,5 \text{ mL}} \times \frac{1,5 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{766,56 \text{ } \mu\text{mol}}{8100 \text{ mL.menit}} \\ &= 0,09464 \text{ } \mu\text{mol/mL.menit} \\ &= 0,09464 \text{ Unit/MI} \end{aligned}$$

Lampiran 7: Kurva Standar Pengukuran Konsentrasi *Bovine Serum Albumin* (BSA) untuk Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase dengan Metode Bradford


4. Data kurva kalibrasi larutan standar BSA pada $\lambda = 595 \text{ nm}$

No.	Konsentrasi	Absorbansi
1.	Blanko	0,0000
2.	0,02	0,0177
3.	0,04	0,0407
4.	0,06	0,0682
5.	0,08	0,0909
6.	0,1	0,1167

5. Data analisis kurva kalibrasi larutan standar BSA

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	xy
1.	Blanko	0,0000	0	0,0000	0,0000
2.	0,02	0,0177	0,0004	0,0003	0,0003
3.	0,04	0,0407	0,0016	0,0016	0,0016
4.	0,06	0,0682	0,0036	0,0046	0,0040
5.	0,08	0,0909	0,0064	0,0082	0,0072
6.	0,1	0,1167	0,01	0,0136	0,0116
N = 6	$\Sigma = 0,3$	$\Sigma = 0,3342$	$\Sigma = 0,0250$	$\Sigma = 0,0220$	$\Sigma = 0,0285$
	$\Sigma = 0,05$	$\Sigma = 0,0557$			

6. Grafik kurva kalibrasi larutan standar BSA



Analisis Data:

c. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$y = ax - b$$

$$a = \frac{n \times \sum xy - \sum x \times \sum y}{n \times \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{6 \times 0,0250 - 0,3 \times 0,3342}{6 \times 0,0220 - (0,3)^2}$$

$$a = \frac{0,1500 - 0,1002}{0,132 - 0,09}$$

$$a = \frac{0,0498}{0,042}$$

$$a = 1,1866$$

$$\begin{aligned}
 b &= y \text{ rata-rata} - ax \text{ rata-rata} \\
 &= 0,0557 - (1,1866 \times 0,05) \\
 &= 0,0557 - 0,0593 \\
 &= -0,0036
 \end{aligned}$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$y = 1,1866x - 0,0036$$

d. Nilai Regresi (R^2)

$$\begin{aligned}
 R^2 &= \frac{n \times \sum xy - \sum x \times \sum y}{\sqrt{((n \times \sum x^2) - (\sum x)^2) ((n \times \sum y^2) - (\sum y)^2)}} \\
 R^2 &= \frac{6 \times 0,0250 - 0,3 \times 0,3342}{\sqrt{((6 \times 0,0220) - (0,3)^2) - ((6 \times 0,0285) - (0,3342)^2)}} \\
 R^2 &= \frac{0,15 - 0,1003}{\sqrt{(0,132 - 0,09) (0,171 - 0,1117)}} \\
 R^2 &= \frac{0,0497}{\sqrt{(0,042 \times 0,0593)}} \\
 R^2 &= \frac{0,0497}{\sqrt{0,0025}} \\
 R^2 &= \frac{0,0497}{0,05} \\
 R^2 &= 0,9940
 \end{aligned}$$

Lampiran 8: Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase dari *Candida utilis* Hasil Fraksinasi Amonium Sulfat Tingkat Kejenuhan (0-100%) dengan Metode Bradford

Kadar protein enzim selulase ditentukan dengan menggunakan metode Bradford berdasarkan pengikatan protein (enzim) dengan zat pewarna *Coomassie Brilliant Blue* (CBB) dan membentuk warna larutan yaitu warna kebiruan.

No.	Fraksi Enzim	Absorbansi	Kadar Protein (mg/mL)
1.	Ekstrak kasar (tanpa fraksinasi)	0,0667	0,0592
2.	10%	0,0723	0,0640
3.	20%	0,0642	0,0571
4.	30%	0,0619	0,0552
5.	40%	0,0822	0,0723
6.	50%	0,0730	0,0646
7.	60%	0,0725	0,0641
8.	70%	0,0216	0,0212
9.	80%	0,0105	0,0119
10.	90%	0,0125	0,0136
11.	100%	0,0139	0,0147

Kadar Protein dalam Fraksi Enzim

Berikut contoh perhitungan untuk mendapatkan kadar protein pada fraksi enzim:

- 1) Kadar protein pada ekstrak kasar (tanpa fraksinasi)

$$y = ax - b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{0,0667 - 0,0036}{1,1866}$$

$$x = 0,0592 \text{ mg/mL}$$

2) Kadar protein pada fraksi 10%

$$y = ax - b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{0,0723 - 0,0036}{1,1866}$$

$$x = 0,0640 \text{ mg/mL}$$



Lampiran 9: Tabel Kejenuhan Amonium Sulfat

Penambahan Kristal Amonium Sulfat dalam 1 Liter Larutan

Konsentrasi awal dari amonium sulfat (% Kejenuhan)	Konsentrasi akhir dari amonium sulfat (% Kejenuhan)																			
	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
0%	27	55	84	113	144	176	208	242	277	315	351	390	430	472	516	561	608	657	708	761
5%		27	56	85	115	146	179	212	246	286	319	357	397	439	481	526	572	621	671	723
10%			28	57	86	117	149	182	216	258	287	325	364	405	447	491	537	584	634	685
15%				28	58	88	119	151	185	217	255	292	331	371	413	456	501	548	596	647
20%					29	59	89	121	154	189	223	260	298	337	378	421	465	511	559	609
25%						29	60	91	123	158	191	227	265	304	344	386	429	475	522	571
30%							30	61	92	126	160	195	232	270	309	351	393	438	485	533
35%								30	62	94	128	163	199	236	275	316	358	402	447	495
40%									31	63	96	130	166	202	241	281	322	365	410	457
45%										31	64	97	132	169	206	245	286	329	373	419
50%											32	65	99	135	172	210	250	292	335	381
55%												33	66	101	138	175	215	256	298	343
60%													33	67	103	140	179	219	261	305
65%														34	69	105	143	183	224	266
70%															34	70	107	146	186	228
75%																35	72	110	149	190
80%																	36	73	112	152
85%																		37	75	114
90%																			37	76
95%																				38

Sumber: Protein Purification: Principles and Practice. 1982. R.K. Scopes. 282 Pages. Springer-Verlag, New York.

Lampiran 10: Jumlah Penambahan Amonium Sulfat dan Volume Ekstrak Kasar Enzim yang diperoleh pada Setiap Fraksi Tingkat Kejenuhan (0-100%)

No.	Fraksi	Bobot Amonium Sulfat (gram)	Volume Ekstrak Kasar
1.	0-10%	55	250
2.	10-30%	117	225
3.	30-50%	126	210
4.	50-70%	135	205
5.	70-90%	146	162
6.	0-20%	113	250
7.	20-40%	121	226
8.	40-60%	130	209
9.	60-80%	140	204
10.	80-100%	152	168

Penambahan Amonium Sulfat :

$$0-10\% = \frac{250 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 55 \text{ gram} = 13,75 \text{ gram}$$

$$10-30\% = \frac{225 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 117 \text{ gram} = 26,325 \text{ gram}$$

$$30-50\% = \frac{210 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 126 \text{ gram} = 26,46 \text{ gram}$$

$$50-70\% = \frac{205 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 135 \text{ gram} = 27,675 \text{ gram}$$

$$70-90\% = \frac{162 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 146 \text{ gram} = 23,652 \text{ gram}$$

$$0-20\% = \frac{250 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 113 \text{ gram} = 28,25 \text{ gram}$$

$$20-40\% = \frac{226 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 121 \text{ gram} = 27,346 \text{ gram}$$

$$40-60\% = \frac{209 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 130 \text{ gram} = 27,17 \text{ gram}$$

$$60-80\% = \frac{204 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 140 \text{ gram} = 28,56 \text{ gram}$$

$$80-100\% = \frac{168 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} \times 152 \text{ gram} = 25,536 \text{ gram}$$

Lampiran 11: Dokumentasi Penelitian Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida utilis* menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat

11.1 Sterilisasi alat




Alat-alat gelas



Sterilisasi dalam oven

11.2 Penyiapan Inokulum




Penimbangan media



Pemanasan



Sterilisasi Media



Media Inokulum



Media Inokulum + Isolat setelah diinkubasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

11.3 Produksi Enzim Selulase




Penimbangan media



Pemanasan



Sterilisasi Media



Media Produksi



Proses Inkubasi



Media Produksi + Media Inokulum setelah diinkubasi



Ekstrak Kasar Enzim Selulase

11.4 Fraksinasi Amonium Sulfat



Penimbangan Garam Amonium Sulfat




Penambahan Ekstrak Kasar Enzim




Pengadukan


Pemisahan Supernatan dan Filtrat




F1 (0-10%)




F1 (0-20%)




F2 (10-30%)




F2 (20-40%)



F3 (30-50%)



F3 (40-60%)




F4 (50-70%)



F4 (60-80%)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN




F5 (70-90%)

F5 (80-100%)



Fraksi-fraksi Enzim Selulase

11.5 Uji Aktivitas Enzim Selulase Metode DNS



Pereaksi DNS



Standar Glukosa




Ekstrak Kasar Enzim dan Fraksi Enzim + Pereaksi DNS



Pengukuran Spektrofotometer UV-Vis

11.6 Uji Kadar Protein Metode Bradford



Pereaksi CBB



Standar BSA



Ekstrak Kasar Enzim dan Fraksi Enzim + Pereaksi Bradford



Pengukuran Spektrofotometer UV-Vis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Nurul Azizah lahir di Makassar pada tanggal 04 Mei 1994. Nama panggilan Azizah atau Cicha adalah anak tunggal dari pasangan bapak Haris dan ibu Nurhayati. Beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.

Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN Unggulan Monginsidi I Makassar dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kartika Jaya Wirabuana VII-1 Makassar dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMKN-SMAK Makassar dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1, tepatnya di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah hampir 4 tahun dengan gelar mahasiswa, penulis pernah aktif pada sebuah organisasi yaitu UKM KSR-PMI Unit 107 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana Sains (S.Si) pada tanggal 24 Agustus 2017. ☺

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R