

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN HASIL FRAKSI ETIL ASETAT KULIT  
BATANG KEMIRI (*Aleurites moluccana* (L.)Willd.) DENGAN  
METODE DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil).**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUSFIRAH BURHAN**

**70100113090**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Musfirah Burhan  
NIM : 70100113090  
Tempat Tanggal Lahir : Bottopadang, 29 Mei 1995  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Jl. Tun Abd.Razak, Perum Bumi Aroepala Blok A/10  
Judul : Uji Aktivitas Antioksidan Hasil Fraksi Etil Asetat Kulit Batang  
Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)Willd.) dengan Metode  
DPPH (*2,2-difenil-1-pikrilhidrazil*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, Agustus 2017

Penyusun,



**Musfirah Burhan**  
NIM. 70100113090

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Hasil Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)” yang disusun oleh **Musfirah Burhan**, NIM: 70100113090, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 21 Agustus 2017 M**  
**28 Dzulqa’idah 1438 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Khaerani, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Darsul S Puyu, M.Ag.	(.....)

Dekan



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
**NIP. 19550203 198312 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.**

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Hasil Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)Willd.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)”. Ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Nursaidah yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk bentuk materi, nasehat, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, saudara-saudaraku, Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk

mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II,
4. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
5. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
6. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
7. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,

8. Ibu Khaerani, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini,
9. Bapak Dr. Darsul S Puyu, M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini,
10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
11. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian,
12. Teman-teman Far13ion angkatan 2013 yang sangat luar biasa, terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini serta kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun

**Musfirah Burhan**  
NIM : 70100113090

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACK .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian .....	4
1. Definisi operasional .....	4
2. Ruang lingkup penelitian .....	5
D. Kajian pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....	8
A. Uraian Tanaman .....	8
B. Radikal Bebas.....	10
C. Uraian Antioksidan.....	13
D. Metode Pengujian Antioksidan.....	15

E. Uraian Vitamin C .....	16
F. Uraian Ekstraksi .....	17
G. Uraian Spektrofotometer UV-VIS .....	20
H. Fraksinasi .....	25
I. Kromatografi Lapis Tipis .....	28
J. Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Kemiri Sebagai Obat	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	36
1..Jenis Penelitian .....	36
2..Lokasi Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Implikasi Penelitian.....	50
KEPUSTAKAAN .....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
BIODATA PENULIS .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rumus Struktur 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl.....	15
Gambar 2	Reaksi antara DPPH dengan Antiradikal Bebas.....	16
Gambar 3	Struktur Kimia Asam Askorbat.....	17
Gambar 4	Skema Kerja Spektrofotometer UV-VIS.....	25
Gambar 5	Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Fraksi Etil Asetat dengan % Penghambatan Terhadap DPPH.....	63
Gambar 6	Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Vitamin C dengan % Penghambatan Terhadap DPPH.....	63
Gambar 7	Tanaman Kemiri ( <i>Aleurites moluccana L. Willd</i> ).....	65
Gambar 8	Kulit Batang Kemiri.....	65
Gambar 9	Alat Spektrofotometri UV-VIS.....	66
Gambar 10	Absorbansi Panjang Gelombang Maksimum ( $\lambda_{maks}$ ).....	66
Gambar 11	Hasil Fraksinasi Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Kemiri ( <i>Aleurites moluccana L. Willd</i> ).....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penyiapan Sampel dan Ekstraksi Sampel Kulit Batang Kemiri ( <i>Aleurites moluccana L. Willd</i> ).....	53
Lampiran 2	Skema Fraksinasi Kromatografi Cair Vakum .....	54
Lampiran 3	Skema Penyiapan Larutan.....	55
Lampiran 4	Skema Pengukuran Absorbansi Perendaman Radikal Menggunakan Spektrofotometri .....	56
Lampiran 5	Tabel Hasil Pengukuran Data .....	58
Lampiran 6	Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Fraksi.....	59
Lampiran 7	Perhitungan Larutan DPPH 0,4 mM.....	61
Lampiran 8	Perhitungan % Penghambatan .....	62
Lampiran 9	Grafik .....	63
Lampiran 10	Perhitungan IC <sub>50</sub> .....	64
Lampiran 11	Gambar.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Spektrum Cahaya Tampak dan Warna-Warna Komplementer.....	21
Tabel 2	Hasil Perhitungan $IC_{50}$ dari Kulit Batang Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> (L.).....	42
Tabel 3	Hasil Perhitungan $IC_{50}$ Vitamin C.....	42
Tabel 4	Hasil Pengukuran Serapan Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> L. Willd). Terhadap DPPH.....	58
Tabel 5	Hasil Pengukuran Serapan Vitamin C Terhadap DPPH.....	58



## ABSTRAK

**Judul** : “Uji Aktivitas Antioksidan Hasil Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)Willd.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)”  
**Nama** : Musfirah Burhan  
**NIM** : 70100113090

---

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antioksidan Hasil Fraksi Etil Asetat Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui parameter nilai  $IC_{50}$  dalam hasil fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.). Metode yang digunakan adalah pengukuran jumlah DPPH yang tereduksi dari senyawa antioksidan secara spektrofotometri UV-VIS pada panjang gelombang 515,9 dengan menggunakan vitamin C sebagai pembanding. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 28,748 ppm sedangkan pada vitamin C yang diperoleh memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 4,541 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antiradikal bebas vitamin C lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)

**Kata kunci** :  $IC_{50}$ , Antioksdian, DPPH, Kulit Batang Kemiri

## ABSTRACT

**Title** :“Activity Test Free Antioxidant Ethyl Acetat Fraction of  
Hazelnut stem (*Aleurites moluccana* (L.) DPPH Method”  
**Author** : Musfirah Burhan  
**Student Reg. Number** : 70100113090

---

An investigation on the of antioxidant activity of ethyl acetat fraction of hazelnut stem (*Aleurites moluccana* (L.) by DPPH method. This study aimed to determine antioxidant activity through the parameters  $IC_{50}$  values in the ethyl acetat fraction of hazelnut stem (*Aleurites moluccana* (L.) The method used is a measurement of the amount of DPPH reduced of antioxidant compounds by UV-VIS spectrophotometry at a wavelength of 515,9 nm by using vitamin C as a comparison. The results showed that ethyl acetat fraction of hazelnut stem (*Aleurites moluccana* (L.) has a radical catcher activity with  $IC_{50}$  value of 28,748 ppm. While the vitamin C obtained has an  $IC_{50}$  value of 4,541 ppm. This result proves that free antiradical activity of vitamin C higher than ethyl acetat fraction of hazelnut stem (*Aleurites moluccana* (L.).

**Key word:**  $IC_{50}$ , Antioxidant, DPPH, Hazelnut stem



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Istilah antioksidan dan radikal bebas merupakan istilah yang cukup populer di kalangan ahli gizi dan tenaga kesehatan profesional lainnya. Dalam beberapa tahun ini, istilah tersebut semakin sering di gunakan dan mulai menyita perhatian publik, khususnya masyarakat yang memiliki kepedulian pada kesehatan dan gaya hidup. Beberapa penelitian juga mengungkapkan peran dari stress oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas dalam berbagai penyakit yang berbahaya, seperti penyakit kanker, penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, dan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit nomor satu di Asia Tenggara. Berdasarkan data WHO tahun 2008, angka kematian di Asia Tenggara sekitar 14,5 juta, sekitar 55% (7,9 juta) disebabkan oleh penyakit degeneratif. Angka kematian akibat penyakit ini diprediksi akan meningkat 21% pada tahun 2018 (WHO, 2011). Penelitian-penelitian tersebut juga menyampaikan bahwa antioksidan memiliki nilai terapeutik pada penyakit-penyakit tersebut (Barhe dan Tchouya, 2014).

Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Elektron tidak berpasangan tersebut menyebabkan radikal bebas sangat reaktif yang kemudian akan menangkap atau mengambil elektron dari senyawa lain seperti protein, lipid, karbohidrat, dan DNA untuk menetralkan diri. Radikal bebas dapat masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel-sel yang sehat dan menyebabkan sel-sel tersebut kehilangan fungsi dan strukturnya. Akumulasi dari

kerusakan tersebut berkontribusi terhadap beberapa penyakit dan menyebabkan kondisi yang biasa disebut sebagai penuaan dini (Liochev, 2013).

Efek negatif radikal bebas terhadap tubuh dapat dicegah dengan senyawa yang disebut antioksidan. Antioksidan memiliki kemampuan memberikan elektron, mengikat dan mengakhiri reaksi berantai radikal bebas (Halliwell, 2012). Antioksidan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetis. Antioksidan alami berasal dari hasil ekstraksi bahan alami yang berpotensi menangkap radikal bebas, sedangkan antioksidan sintetis diperoleh dari hasil sintesis secara kimia (Isfahlan, dkk.,2010). Namun, adanya kekhawatiran terhadap efek samping penggunaan antioksidan sintetis menyebabkan banyak penelitian tentang potensi antioksidan alami yang berasal dari tanaman (Saleh, Clark, dkk , 2010).

Salah satu tanaman dari alam yang berkhasiat sebagai obat adalah tanaman kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian. Tanaman kemiri ini merupakan tumbuhan tropis dari famili *Euphorbiaceae*. Menurut masyarakat di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu, Kelurahan Palattae tepatnya di Desa Bottopadang bahwa kulit batang kemiri sering digunakan untuk mengobati disentri, diare, demam, dan sariawan.

Dari hasil analisis kimia daun kemiri mengandung senyawa flavonoid, tannin, saponin, sterol, asam amino, karbohidrat, dan polifenol (Junaid Niazi, *et,al*, 2010). Sedangkan kulit batang kemiri menurut Gani, dkk (2001) mengandung senyawa tanin, flavonoid, saponin, dan polifenol. Yang berkhasiat sebagai antidiare, demam, sakit kepala selain itu selain itu digunakan sebagai antikanker, antiinflamasi, dan antipiretik. Adanya senyawa flavonoid yang terkandung pada kulit batang kemiri dan beberapa khasiat yang terkait, memungkinkan adanya efek antioksidan, sehingga perlu dilakukan

penelitian tentang uji aktivitas antioksidan hasil fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), serta membandingkan aktivitasnya dengan antioksidan alami yaitu vitamin C.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S.Al-Nahl/16: 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman; Zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir” (Kementrian Agama RI, 2013: 268).

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri nikmat Allah swt dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia yang maha kuasa itu lah yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu yaitu kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* Willd) yang berkhasiat sebagai antioksidan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) Memiliki aktivitas sebagai antioksidan?

2. Berapa nilai  $IC_{50}$  hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai penggunaan kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) sebagai tanaman obat?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

##### a. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut

##### b. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat

##### c. Fraksi

Merupakan suatu hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak yang dipisahkan melalui beberapa metode tertentu.

##### d. Etil asetat

Etil asetat merupakan senyawa organik dengan rumus  $CH_3CH_2OC(O)CH_3$  yang digunakan untuk mengesktraksi sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)

##### e. Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat laju oksida molekul lain atau menetralsir radikal bebas.

f. Radikal bebas

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh.

g. Efek antioksidan

Efek antioksidan adalah hasil atau konsentrasi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan dalam hal ini metode pengukuran aktivitas antioksidan yang ditentukan dengan  $IC_{50}$ .

h. Nilai  $IC_{50}$  (*Inhibitory Concentration 50*)

Nilai  $IC_{50}$  dapat didefinisikan sebagai adanya konsentrasi yang dapat menghambat aktivitas radikal, yaitu menghambat aktifitas radikal bebas sebanyak 50%. Nilai  $IC_{50}$  yang semakin kecil menunjukkan aktifitas antioksidan pada sampel yang diuji semakin besar.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antioksidan hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) dan penentuan  $IC_{50}$  dengan pembandingan vitamin C dengan metode DPPH.

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian Yuswantina dkk, *et.al* (2014) yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) Dengan Metode DPPH (*2,2-difenil-1-pikrilhidrazil*). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni. Aktivitas antioksidan diukur dengan melalui penangkapan radikal DPPH dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang serapan maksimal 514 nm. Konsentrasi ekstrak etanol daun kemiri (*Aleurites muluccana* (L.) Willd) adalah 200 ppm, 400 ppm dan 600 ppm. Sedangkan

konsentrasi vitamin C sebagai pembanding adalah 8 ppm, 12 ppm dan 16 ppm. Hasil penelitian menunjukkan nilai IC<sub>50</sub> untuk ekstrak etanol daun kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) adalah sebesar 643,98 ppm dan vitamin C sebesar 13,98 ppm. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) memiliki efek yang sangat rendah sebagai antioksidan, sedangkan vitamin C memiliki daya antioksidan yang sangat kuat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Windyaswari dkk, *et.al* (2015) yang berjudul kajian pendahuluan potensi anti kanker dengan uji toksisitas metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) terhadap ekstrak etanol dan fraksi-fraksi dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) Penelitian sebelumnya menunjukkan tanaman kemiri mengandung tanin, saponin, flavonoida dan polifenol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi anti kanker melalui pengujian toksisitas ekstrak etanol kulit batang kemiri *Aleurites moluccana* (L.) Willd. dengan metode BSLT menggunakan hewan uji larva udang *Artemia salina*. Pengukuran toksisitas dinyatakan dengan nilai IC<sub>50</sub>. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan teknik maserasi menggunakan pelarut etanol. Intensitas nilai IC<sub>50</sub> hasil pengujian BSLT dari fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, ekstrak etanol dan fraksi air berturut-turut adalah sangat toksik, sangat toksik, sangat toksik, dan toksik. Hasil Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan penampak bercak spesifik menunjukkan dugaan golongan flavonoid pada ekstrak etanol dan fraksi etil asetat pada kulit batang kemiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikhsan (2013) yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Herba Kemangi (*Ocimum americanum* Linn) dengan Metode DPPH (*2,2-difenil-1-pikrilhidrazil*) yang diekstraksi secara maserasi dengan kepolaran pelarut bertingkat yaitu pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol 70%.

Semua ekstrak diuji aktivitas antioksidannya dengan senyawa pembanding vitamin C, dengan metode DPPH. Dari hasil pengujian aktivitas antioksidan diketahui nilai IC<sub>50</sub> yaitu konsentrasi senyawa antioksidan yang dapat menyebabkan hilangnya 50% aktivitas radikal bebas DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC<sub>50</sub> ekstrak fase n-heksan, ekstrak fase etil asetat, ekstrak fase etanol, ekstrak etanol dan vitamin C secara berturut-turut yaitu 352,8444 ppm; 44,5145 ppm; 43,0946 ppm; 21,8989 ppm; dan 3,6251 ppm.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui aktivitas antioksidan hasil fraksi dalam kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)
- b. Mengetahui nilai IC<sub>50</sub> hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)
- c. Mengetahui pandangan Islam terhadap kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) sebagai tanaman obat?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang efek antioksidan dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) yang dapat bermanfaat menangkal radikal bebas, sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.).

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tumbuhan Kulit Batang Kemiri

##### 1. Klasifikasi (Tjitrosoepomo, 2010)

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Archichlamydae

Famili : Euphorbiaceae

Genus : Aleurites

Species : *Aleurites moluccana* (L.) Willd.

##### 2. Nama Daerah

Buwa kare, kembiri, kemili, kemiling, kereh, madang ijo, tanoan (Sumatera); kamere, kemiri, komere, midi, miri, muncang, pidekan (Jawa); keminting, kemiri (Kalimantan); berau, bontalo dudulaa, boyau, lana, saketa, wiau (Sulawesi); kemiri, kemwiri, kumiri, mi, nena, nyenga (Maluku); tenu (Nusa Tenggara); anoi (Papua) (Martawijaya, dkk. 1989).

##### 3. Morfologi

Kemiri tergolong pohon berukuran sedang dengan tajuk lebar yang dapat mencapai ketinggian hingga 20 m dan diameter setinggi dada hingga 90 cm. Pada tempat terbuka, jenis ini umumnya hanya dapat mencapai ketinggian pohon 10–15 m. Umumnya bentuk cabang pohon kemiri adalah berliku, tidak teratur, membentang

lebar dan menggantung pada cabang bagian samping. Pada lembah yang sempit, pohon kemiri biasanya memiliki sedikit percabangan dan tumbuh menjulang tinggi. Kulit batangnya berwarna abu-abu coklat dan bertekstur agak halus dengan garis-garis vertical yang indah. Daunnya mudah dikenali dari bentuknya yang khas, umumnya terdiri dari 3–5 helai daun dari pangkal, berselang-seling dan pinggir daun bergelombang. Panjang satu helai daun sekitar 10–20 cm dengan dua kelenjar di bagian perpotongan antara pangkal dan tangkai yang mengeluarkan getah manis. Daun pohon yang muda biasanya sederhana dan berbentuk seperti delta atau oval. Bagian atas permukaan daun yang masih muda berwarna putih mengilap seperti perak, yang kemudian akan berubah warna menjadi hijau tua seiring dengan bertambahnya umur pohon. Permukaan daun bagian bawah berbulu halus dan mengilap seperti karat (Martawijaya, dkk. 1989).

Bunga kemiri memiliki kelamin ganda, dimana bunga jantan dan betina berada pada pohon yang sama. Bunga kemiri berwarna putih kehijauan, harum dan tersusun dalam sejumlah gugusan sepanjang 10–15 cm, dimana terdapat banyak bunga jantan kecil mengelilingi bunga betina. Mahkota bunga berwarna putih dengan lima kelopak bunga berwarna putih kusam (krem), berbentuk lonjong dengan panjang 1,3 cm. Buah kemiri berwarna hijau sampai kecoklatan, berbentuk oval sampai bulat dengan panjang 5–6 cm dan lebar 5–7 cm. Satu buah kemiri umumnya berisi 2–3 biji, tetapi pada buah jantan kemungkinan hanya ditemukan satu biji. Biji kemiri dapat dimakan jika dipanggang terlebih dahulu. Kulit biji kemiri umumnya kasar, hitam, keras dan berbentuk bulat panjang sekitar 2,5–3,5 cm (Martawijaya, dkk. 1989).

#### **4. Kandungan Kimia**

Daun kemiri mengandung senyawa senyawa flavonoid, tanin, saponin, sterol, asam amino, karbohidrat, dan polifenol (Junaid Niazi, *et,al*, 2010). Kulit batang kemiri mengandung senyawa tanin, flavonoid, saponin, dan polifenol (Gani dkk, *et.al*, 2001). Batang kemiri mengandung selulosa, lignin, pentosan, dan abu (Muhlisah, 2009).

#### **5. Kegunaan**

Hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, pohon kemiri juga memiliki sifat beracun sehingga perlu kewaspadaan bila ingin menggunakan bagian-bagian pohon lainnya untuk tujuan pengobatan atau konsumsi (Damayanti, 2008).

Kulit batang kemiri dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional untuk sakit kepala, diare, tumor, asma, penyakit kulit, dan hypocholesterolema. Bahkan di negeri Jepang produk kulit ini digunakan untuk penyembuhan penyakit tumor dan kanker (Damayanti, 2008).

Biji kemiri digunakan untuk obat sembelit. Sedangkan menurut penelitian menunjukkan bahwa daun kemiri mengandung antioksidan sterol, flavonoid, dan triterpen yang berguna sebagai anti inflamasi dan antipiretik (obat penurun panas) (Damayanti, 2008).

#### **B. Radikal Bebas**

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut reaktif mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya. Senyawa

yang mudah teroksidasi secara umum adalah senyawa yang berikatan kovalen. Ikatan kovalen akan sangat berbahaya karena ikatan yang digunakan secara bersama-sama pada orbital terluarnya. Senyawa yang memiliki ikatan kovalen umumnya merupakan molekul-molekul besar (biomakromoleku), yaitu lipid, protein maupun DNA. Target utama radikal bebas adalah protein, asam lemak tak jenuh dan lipoprotein serta unsur DNA termasuk karbohidrat. Asam lemak tak jenuh merupakan molekul yang paling rentan terhadap serangan radikal bebas. Radikal bebas memiliki reaktivitas yang tinggi, yaitu sifatnya yang sangat menarik atau menyerang elektron disekelilingnya. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi radikal bebas. Senyawa radikal bebas didalam tubuh dapat merusak asam lemak tak jenuh ganda pada membran sel yang mengakibatkan dinding sel menjadi rapuh. Senyawa radikal bebas ini berpotensi merusak DNA sehingga mengacaukan sistem info genetika dan berlanjut pada pembentukan sel kanker. Jaringan lipid juga akan dirusak oleh senyawa radikal bebas sehingga terbentuk peroksida yang memicu munculnya penyakit degeneratif (Winarsi, 2013).

Reaksi oksidatif tidak hanya menyerang komponen lipid, melainkan juga komponen penyusun sel lainnya, seperti protein, lipoprotein, maupun DNA. Radikal bebas dapat merusak 3 senyawa penting yang berperan untuk mempertahankan integritas (Lampe, 2010).

- a. Asam lemak, terutama asam lemak tidak jenuh yang merupakan komponen penting fosfolipid penyusun membran sel.
- b. DNA, yang merupakan perangkat genetik sel.
- c. Protein, yang berperan sebagai enzim, reseptor, antibodi dan penyusun matriks serta sitoskeleton.

Mekanisme reaksi radikal bebas paling tepat dibayangkan sebagai suatu deret reaksi-reaksi bertahap, yaitu (Fessenden, 1992):

a. Inisiasi

Tahap inisiasi ialah pembentukan awal radikal-radikal bebas. Dalam klorinasi metana, tahap inisiasi adalah pemaksapisahan (*cleavage*) homolitik molekul  $\text{Cl}_2$  menjadi dua radikal bebas klor. Energi untuk reaksi ini diberikan oleh cahaya ultraviolet (UV) atau oleh pemanasan campuran ke temperatur yang sangat tinggi.

b. Propagasi

Setelah terbentuk, radikal bebas klor mengawali sederetan reaksi sehingga terbentuk radikal bebas baru. Secara kolektif, terbentuknya reaksi ini disebut tahap propagasi dari reaksi radikal bebas. Pada hakikatnya, pembentukan awal beberapa radikal bebas akan mengakibatkan perkembangbiakan radikal bebas baru dalam suatu reaksi pengabdian diri (*self perpetuating*) yang disebut reaksi rantai. Sebagai tahap propagasi pertama, radikal bebas klor yang reaktif merebut sebuah atom hydrogen dari molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Radikal bebas metil itu juga reaktif. Dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari dalam molekul  $\text{Cl}_2$ . Tahap ini menghasilkan salah satu dari produk keseluruhan klorometana. Produk ini juga menghasilkan ulang radikal bebas klor, yang nantinya dapat merebut atom hydrogen dari molekul metana lain dan memulai deret propagasi selanjutnya.

c. Terminasi

Daur propagasi terputus oleh reaksi-reaksi pengakhiran (*termination*). Reaksi apa saja yang memusnahkan radikal bebas atau mengubah radikal bebas menjadi radikal yang stabil dan tidak reaktif, dapat mangakhiri daur propagasi radikal bebas.

Klorinasi metana diakhiri terutama oleh bergabungnya radikal-radikal bebas, inilah pemusnahan radikal bebas. Senyawa apa saja yang mudah terurai menjadi radikal bebas dapat bertindak sebagai satu inisiator. Satu contoh ialah peroksida (ROOR), yang mudah membentuk radikal bebas karena energi disosiasi ikatan RO-RO hanyalah sekitar 35 kkal/mol, lebih rendah daripada kebanyakan ikatan.

### ***C. Uraian Antioksidan***

Antioksidan merupakan senyawa yang menangkap radikal bebas (Prakash, 2011). Antioksidan digunakan untuk menghambat autooksidasi. Fenol-fenol, senyawa dengan gugus OH yang terikat pada karbon cincin aromatik, merupakan antioksidan yang efektif, produk radikal bebas senyawa-senyawa ini terstabilkan secara resonansi dan karena itu tidak reaktif dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain. Vitamin E dan flavonoid adalah suatu antioksidan alamiah yang dijumpai dalam minyak-minyak nabati (Fessenden, 1992).

Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi elektron, tetapi dalam pengertian biologis lebih luas lagi, yaitu semua senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim-enzim dan protein-protein pengikat logam (Rohman, 2012).

Adapun penentuan persen peredaman aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus:

$$\% \text{peredaman} = \frac{\text{absorban DPPH} - \text{absorban sampel uji}}{\text{absorban DPPH}} \times 100\%$$

Berdasarkan sumbernya, antioksidan digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder dan antioksidan tersier:

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer adalah antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus reaksi berantai (*chain-breaking antioxidant*) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil. Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk awal (Sayuti, 2015).

b. Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, pengurai hidropoksida menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen (Sayuti, 2015).

c. Antioksidan tersier

Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam memperbaiki biomolekuler rusak akibat reaktivitas radikal bebas (Yuliani, 2010).

Berdasarkan jenisnya, antioksidan dapat di bedakan menjadi 4 golongan, yaitu:


1. Antioksidan enzimatik (SOD, glutathion peroksidase, katalase),
2. Antioksidan hidrofilik (asam askorbat, GSH, asam urat),

3. Antioksidan lipofilik (tokoferol, flavonoid, karotenoid),
4. Antioksidan pereduksi (glutation reduktase, dehidroaskorbat reduktase).

#### **D. Metode Pengujian Antioksidan**

Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu senyawa radikal nitrogen. DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa, misalnya senyawa fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Larutan DPPH yang berwarna ungu memberikan serapan absorban maksimum pada 517 nm. Larutan DPPH ini akan mengoksidasi senyawa dalam ekstrak tanaman. Proses ini ditandai dengan memudarnya warna larutan dari ungu menjadi kuning (Prakash, 2011).

Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu (Prakash, 2011).




*Gambar 1. Rumus Struktur 1,1-diphenyl-2-picrylehydrazyl*

Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas transfer hidrogen juga untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas. Pada

uji DPPH, penangkapan radikal diikuti dengan monitoring penurunan absorpsi yang terjadi karena reduksi oleh radikal (Prakash, 2011).

Adanya senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal akan mereduksi radikal DPPH menurut reaksi:



*Gambar 2. Reaksi antara DPPH dengan Antiradikal Bebas*


Akibatnya penambahan senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal bebas akan menurunkan konsentrasi DPPH. Adanya penurunan konsentrasi DPPH akan menyebabkan penurunan absorbansi dibandingkan dengan absorbansi bebas control yang tidak diberi dengan senyawa uji yang diduga mempunyai aktivitas antiradikal (Rohman, 2005).

### **E. Uraian Vitamin C**

Vitamin C adalah salah satu antioksidan sekunder yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Berbagai penelitian yang dilakukan vitamin C digunakan dalam beberapa tingkat konsentrasi untuk dapat mengetahui aktivitas antioksidan, yaitu kemampuan untuk dapat meredam radikal bebas dengan menggunakan metode DPPH (Sayuti, 2015).

Vitamin C sebagai sumber antioksidan memiliki manfaat bagi tubuh antara lain membantu menjaga pembuluh-pembuluh kapiler, meningkatkan penyerapan asupan zat besi, menghambat produksi nitrosamine, zat pemicu kanker dan

memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Senyawa yang digunakan sebagai pembanding (kontrol positif) dalam uji aktivitas penangkapan radikal hidroksil dalam penelitian ini adalah vitamin C (Cahyadi, 2008).



*Gambar 3: Struktur Kima Asam Askorbat*

Dalam keadaan murni, vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dengan rumus bangun  $C_6H_8O_6$ , dengan titik lebur  $190-192^{\circ}C$  (Depkes RI, 2014).

Asam askorbat dapat meningkatkan fungsi imun, dengan menstimulasi produksi interferon (protein yang melindungi sel dari serangan virus). Vitamin ini dapat menstimulasi kemotaksis dan respon proliferasi netrofil, serta melindungi sel dari serangan radikal bebas yang diproduksi oleh netrofil teroksidasi. Asam askorbat dinyatakan dapat memacu kerja sintesis factor humoral, terutama antibody IgG dan IgM. Vitamin C mampu mereduksi radikal superoksida, hidroksil, asam hipoklorida dan oksigen reaktif yang berasal dari netrofil dan monosit yang teraktifasi.

## **F. Uraian Ekstraksi**

### **1. Pengertian**

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah

dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih berupa zat kimia murni, dan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Depkes RI, 1979). Persyaratan simplisia nabati dan hewani diberlakukan pada simplisia yang diperdagangkan, tetapi pada simplisia yang digunakan untuk suatu pembuatan atau isolasi minyak atsiri, alkaloid, glikosida atau zat aktif lain, tidak harus memenuhi persyaratan (Depkes RI, 1995).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995).

## **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1986).

## **3. Jenis-Jenis Ekstraksi**

Ekstraksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panas dan cara dingin. Ekstraksi cara panas yaitu dengan metode destilasi uap air dan refluks, sedangkan ekstraksi cara dingin yaitu dengan metode maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Dirjen POM, 1986).

#### a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya.

#### b. Perkolasi

Perkolasi adalah proses pengekstrakan dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

#### c. Soxhletasi

Soxhletasi adalah proses penyarian simplisia secara berkesinambungan, dimana simplisia dimasukkan dalam klonsong yang telah dilapisi kertas saring, dan sampel dibasahi cairan penyari yang dipanaskan dan menguap ke kondensor melalui pipa samping kemudian turun untuk menyari simplisia dan masuk ke labu alas bulat melalui pipa sifon, proses ini berlangsung hingga penyarian sempurna yaitu 20-25 siklus.

#### d. Refluks

Refluks adalah metode penyarian dengan cara cairan penyari dipanaskan hingga mendidih, penyari akan menguap ke atas melalui serbuk simplisia, uap penyari pengembun karena didinginkan oleh pendingin balik (kondensor). Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap berulang hingga pelarut jenuh.

e. Destilasi uap air

Penarikan komponen kimia dimana bahan atau simplisia dicampur dengan air dan dipanaskan hingga mendidih. Uap yang timbul dibiarkan mengembun hingga minyak terpisah dari air. Metode ini dilakukan untuk menyari simplisia yang mengandung minyak menguap atau kandungan komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa alonga, campuran air dan minyak menguap akan masuk ke dalam corong pisah, dan akan memisah antara air dan minyak atsiri.

**G. Uraian Spektrofotometer UV-VIS**

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. (Khopkar, 2007).

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spectrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Spektrofotometri merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorpsi pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak. Dalam instrument ini suatu sinar cahaya terpecah sebagian cahaya diarahkan malalui sel transparan yang mengandung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu senyawa yang mengandung ikatan-ikatan

rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diabsorpsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorpsi, tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur senyawa. Absorpsi radiasi disebabkan oleh pengurangan energi cahaya radiasi ketika elektron dalam orbital dari rendah tereksitasi keorbital energi tinggi (Underwood, 2002).

Tabel 1. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer (Underwood, 2002).

Panjang gelombang (nm)	Warna	Warna komplementer
400-435	Violet	Kuning-hijau
435-480	Biru	Kuning
480-490	Hijau-biru	Orange
490-500	Biru-hijau	Merah
500-560	Hijau	Ungu
560-580	Kuning-hijau	Violet
580-595	Kuning	Biru
595-610	Orange	Hijau-biru
610-750	Merah	Biru-hijau

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun pembanding (Khopkar, 2007).

Berikut merupakan komponen spektrofotometer (Khopkar, 2008):

1. Sumber cahaya; sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi adalah lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu. Lampu hydrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV.

Lampu tungstein merupakan campuran dari filamen tungstein gas iodin (halogen), oleh sebab itu lampu tungstein-iodin pada spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah sinar tampak dengan rentang panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultraviolet khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator; digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis.

Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian.

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit), filter, prisma, kisi dan celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan

penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

#### b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang berupa campuran cahaya dengan berbagai panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan sesuai dengan warna filter optik yang dipakai.

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

#### c. Prisma dan Kisi

Prisma dan Kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Sel absorpsi; Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil maupun yang lebih besar tetap dapat digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, bentuk silinder juga dapat digunakan. Kuvet yang digunakan harus tertutup untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan serta seragam keseluruhannya.

4. Detektor; Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang.

5. Amplifier; Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur.


Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007). Kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam penggunaan spektrofotometer seringkali terjadi. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 2008):

a). Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko. Blanko adalah larutan yang berisi matrik selain komponen yang dianalisis.

b). Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan kuvet adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari bahan kuarsa memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dari bahan gelas. Kesalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan sampel.

c). Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang sangat rendah atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan konsentrasi, sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Kesalahan dalam

penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi dengan dilakukannya proses kalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan blanko, yaitu setting nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitansi = 100% (Tahir, 2008).



Gambar 4. Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis (Khopkar, 2007: 228).

#### H. Fraksinasi

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012).

Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penjerap mutu KLT 10-40  $\mu\text{m}$ ) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum.

Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. Cuplikan dilarutkan ke dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada lapisan penjerap dan dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi vakum cair menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann *et al.*, 1995).

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah besar (10-50 g). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum. Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan berlangsung lebih cepat. Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5-10 cm). Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel kangsung menerobos ke dinding kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam

kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, sehingga kromatografi vakum cair disebut juga kolom fraksinasi (Atun, 2014).

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorpsi. Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang sama dengan jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan gaya-gaya antarmolekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fase diam. Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fase gerak akan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fase diam sehingga terjadi interaksi berupa adsorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa fraksi-fraksi senyawa (eluat) yang ditampung pada bagian bawah kolom (Rubiyanto, 2016).

Beberapa jenis pelarut dan fase gerak untuk kromatografi kolom menurut deret Trappe. Deret ini menggambarkan kekuatan elusi pelarut-pelarut dengan kolom yang menggunakan padatan penyerap silika gel:

*Air murni < metanol < etanol < propanol < aseton < etil asetat < dietil  
eter < kloroform < metilen klorida < benzena < toluena < trikloro etilen < karbon  
tetraklorid < sikloheksana < heksana*

Urutan pelarut-pelarut diatas menunjukkan bahwa semakin turun kepolarannya maka semakin bertambah kekuatan pelarut tersebut untuk melulusi senyawa yang teradsorpsi oleh silika gel (Rubiyanto, 2016).

### ***I. Kromatografi Lapis Tipis***

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa diantara padatan penyerap (adsorbent, fase diam) yang dilapisi pada pelat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi). KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena relatif sederhana dan kecepatan analisisnya. Di dalam analisis dengan KLT, sampel dalam jumlah yang sangat kecil ditotolkan menggunakan pipa kapiler di atas permukaan pelat tipis fasa diam (adsorbent), kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen yang terdapat pada sampel (Atun, 2014).

Fase diam yang digunakan dalam KLT adalah bahan penyerap. Penyerap yang umum adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa, kiselgur, selulosa dan turunannya. Dua sifat yang penting dari penyerap adalah besar partikel dan homogenitasnya, karena adhesi terhadap penyokong sangat tergantung pada hal tersebut. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensinya dan resolusinya (Rohman, 2007).

Pemilihan fasa gerak yang tepat merupakan langkah yang sangat penting untuk keberhasilan analisis dengan KLT. Umumnya fasa gerak dalam KLT ditemukan dengan coba-coba dan jarang sekali yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Sifat-sifat pelarut pengembang juga merupakan faktor dominan

dalam penentuan mobilitas komponen-komponen campuran. Umumnya kemampuan suatu pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu adsorben berhubungan dengan polaritas pelarut (Atun, 2014).

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak berwarna. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak (Rohman, 2007):

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercak
2. Mengamati lempeng di bawah lampu UV 254 atau 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam
3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan
4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup
5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan sitometer, suatu instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar tampak.

Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai  $R_f$  (retention factor). Dua senyawa dikatakan identik jika mempunyai nilai  $R_f$  yang sama jika diukur pada kondisi KLT yang sama. Harga  $R_f$  ditentukan oleh jarak

rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat fase gerak dari titik awal. Penentuan harga  $R_f$  adalah sebagai berikut:

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk}}{\text{Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas}}$$

(Rohman, 2007).

### **J. Pandangan Islamt tentang Pemanfaatan Kemiri Sebagai Obat**

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut

Firman Allah swt dalam Q.S Thaahaa/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah yang menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama RI, 2013: 53).

Ayat di atas menyatakan bahwa *Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia dipentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya: *menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan*, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya : *Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan*

dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2009: 317).

Kulit Batang Kemiri adalah salah satu macam tanaman tropis yang sangat tergantung pada curah hujan yang dapat dimanfaatkan bagi umat manusia dalam pengobatan.

Demikian pula firman Allah dalam Q.S.Al-Nahl/16: 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman; Zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir” (Kementrian Agama RI, 2013: 268).

Ayat di atas adalah perincian argumentasi keEsaan Allah SWT. Ayat ini menguraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Tanaman dapat tumbuh hanya karena ditumbuhkan oleh Allah swt.

Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa *Dia* yang Maha

Kuasa itu *lah*, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. *Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian yang lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang padanya*, yakni di tempat tumbuhnya, *kamu mengembalakan ternak* kamu sehingga binatang itu dapat dimakan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu (Shihab, 2009: 542).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satu tanaman kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* Willd) dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan salah satu manfaatnya yaitu sebagai antioksidan.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radiyallahu anhu*, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً (رواه البخارى)

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (HR. al-Bukhari No. 5246).*

Allah swt. dalam segala kekuasaannya mampu menurunkan penyakit kepada hambaNya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Atas keadilan dari Allah swt. kepada makhlukNya pula, Allah swt. menurunkan obat sebagai penawar

dari penyakit tersebut melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan obat yang paling sempurna untuk berbagai macam penyakit. Penyakit tidak akan sanggup menanggung kalamullah (Al-Qur'an) bagi orang-orang yang yakin dan memahami kandungan Al-Qur'an sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ketauhidan, puji-pujian, kesempurnaan tawakkal, segala kekuasaannya, dan permasalahan yang akhirnya berpulang hanya kepada Allah swt. serta berisikan permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya kesembuhan dari penyakit. Dari uraian beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. dengan kekuasaannya menurunkan penyakit kepada makhlukNya, dan atas kekuasaannya pula Allah swt. yang menyembuhkan.

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa segala penyakit yang diturunkan Allah pasti ada obatnya. Segala penyakit yang diberikan Allah pasti akan ada penawarnya dan akan sembuh dengan seizin Allah swt. Yang dalam hal ini salah satu obatnya yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan seizin Allah swt maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.

Keterlibatan Tuhan dalam kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga terdapat dalam Q.S.Asyu'ara/ 26: 80 yaitu:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahannya:

*“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Kementrian Agama RI, 2013: 370).*

Dalam tafsir Al-Misbah, *“wa idza maridhtu”* dan apabila aku sakit mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa

sakit baik berat maupun ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah dan hal yang negatif atau buruk yang terjadi pada diri manusia hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2009: 258).

Kulit Batang Kemiri adalah salah satu ciptaan Allah swt. yang sangat bermanfaat bagi manusia salah satu manfaatnya adalah sebagai antioksidan dimana antioksidan dapat mencegah penyakit kanker, penyakit degeneratif.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”* (Kementrian Agama RI, 2013: 367).

Kata *ila* pada firman-Nya di awal ayat ini : *awalam yara ila al-aradh*, apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2010: 11).

Kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri

pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangan dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2010: 11-12). Salah satu tumbuhan itu adalah tanaman kemiri yang merupakan ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk mencegah penyakit.

Kata *karim*, antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2010: 12). Dimana kulit batang kemiri memiliki manfaat bagi kesehatan manusia salah satu manfaatnya adalah sebagai antioksidan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *eksperimen laboratory* secara kuantitatif dan kualitatif

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi, Laboratorium Kimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian dilaksanakan di laboratorium Biologi Farmasi untuk melaksanakan proses pengolahan sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) sampai didapatkan hasil ekstrak dan fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)). Kemudian peneliti juga menggunakan Laboratorium Analisis Kimia untuk melakukan preparasi sampel. Dan juga menggunakan Laboratorium Riset Kimia untuk melaksanakan uji antioksidan menggunakan metode DPPH .

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendekati kearah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode eksperimental. Seperti yang telah dijelaskan di atas, metode ini merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah tanaman kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) yang diperoleh dari Desa Bottonpadang Kec Kahu Kabupaten Bone.

#### **2. Sampel**

Sampel yang digunakan adalah kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)

### **D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data**

#### **1. Alat-alat yang digunakan**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah chamber, corong, Erlenmeyer (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas kimia (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas ukur (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), labu alas bulat (*Schott Duran*<sup>®</sup>), labu tentukur (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), lampu uv 254 dan 366 nm, mangkok, mikropipet (*Dragon OneMed*<sup>®</sup>), pipa kapiler, pipet tetes, pompa vakum (*Rocker 300*<sup>®</sup>), rotavapor (*IKA*<sup>®</sup> *RV 10 basic*), sendok tanduk, sendok besi, sinter glass (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), spektrofotometri UV-Vis (*Varian*<sup>®</sup>), timbangan analitik (*Kern ABT 220-5DM*<sup>®</sup>), timbangan ohaus (*MB-311*<sup>®</sup>), vial, vortex (*Heidolph*<sup>®</sup>), dan wadah maserasi.

#### **2. Bahan-bahan yang digunakan**

Aluminium foil, aquadest, asam askorbat (vitamin C), DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*), etanol, etil asetat, kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.), lempeng silika gel 60 F<sub>254</sub>, metanol, n-heksan.

## ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Penyiapan sampel**

#### **a. Pengambilan sampel**

Sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.), diperoleh di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil dari batang utama dikelupas sebelum mencapai jaringan kambiumnya.

#### **b. Pengolahan sampel**

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat dan ikut bersama aliran air. Diperluas ukuran permukaan sampel dengan cara perajangan kemudian sortasi kering sampel, kemudian dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, agar kandungan kimia pada sampel tidak rusak. Setelah melalui serangkaian proses diatas akan didapatkan simplisia yang siap digunakan.

#### **c. Ekstraksi sampel (maserasi bertingkat)**

Sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) yang telah dirajang ditimbang sebanyak 1 kg, dimaserasi menggunakan pelarut awal n-heksan selama 3x24 jam kemudian disaring. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator* sehingga menghasilkan ekstrak kental n-heksan. Residu hasil maserasi n-heksan dikeringkan, kemudian dimaserasi kembali dengan pelarut etil asetat, (perlakuan yang sama). Setelah itu dimaserasi dengan pelarut etanol 96%. Lalu ekstrak dikeringkan pada suhu ruang.

## 2. Uji Pendahuluan Aktivitas Antioksidan Secara KLT

Sebelum dilakukan uji aktivitas dengan metode peredaman radikal DPPH secara kuantitatif, dilakukan uji pendahuluan aktivitas antioksidan secara kualitatif, terhadap masing-masing ekstrak. Masing-masing 50 mg ekstrak dilarutkan dalam etanol p.a. Masing-masing ekstrak tersebut ditotolkan pada lempeng KLT yang telah dielusi dengan fase gerak n-heksan:etil (3:2), untuk menentukan bercak yang mempunyai aktivitas antioksidan digunakan pereaksi semprot larutan DPPH. Senyawa aktif penangkal radikal bebas akan menunjukkan bercak berwarna kuning pucat dengan latar belakang ungu.

## 3. Fraksinasi

Ekstrak etil asetat dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.) yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling besar ditimbang sebanyak 5 gram dan ditambahkan silika gel F<sub>254</sub> sebanyak 15 gram. Ekstrak yang telah ditimbang ditambahkan sedikit demi sedikit silika gel F<sub>254</sub> sehingga ekstrak mengering seperti serbuk. Dimasukkan silika gel F<sub>254</sub> ke dalam sinter glass dengan cara kering. Setelah mampat dimasukkan serbuk ekstrak dan dimampatkan dengan pompa vakum kemudian dielusi dengan eluen yang pertama kali digunakan. Cairan pengelusi dibuat dengan gradien kepolaran yang meningkat berdasarkan profil KLT. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian dilihat profil KLT-nya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna bercak yang sama digabung menjadi satu dan diuji aktivitas antioksidan.

#### 4. Penyiapan Larutan

##### a. Pembuatan larutan stok

Sebanyak 50 mg hasil fraksi yang diperoleh dilarutkan dengan 50 ml etanol p.a, sehingga kadarnya 1000 ppm sebagai larutan stok.

##### b. Pembuatan larutan uji vitamin C (kontrol)

Sebanyak 10 mg Vitamin C dilarutkan dengan 100 ml etanol p.a sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm sebagai larutan stok.

##### c. Penyiapan larutan DPPH

Ditimbang DPPH sebanyak 15,7 mg kemudian dilarutkan dengan 100 ml etanol p.a sehingga kadarnya 0,4 mM. Larutan dijaga pada suhu kamar, terlindung dari cahaya untuk segera digunakan.

#### 5. Analisis Kuantitatif

##### a. Penetapan panjang gelombang ( $\lambda$ ) maksimum DPPH

Larutan DPPH sebanyak 1 ml dipipet kedalam labu ukur kemudian dicukupkan volumenya sampai 5 ml, dihomogenkan kemudian dibiarkan selama 30 menit pada suhu 37°C, selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis hingga diperoleh panjang gelombang maksimum DPPH yaitu 515,9.

##### b. Pengukuran aktivitas antiradikal bebas blanko

Pengujian dilakukan dengan memipet 1 ml DPPH dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml, campuran dikocok dan disimpan dalam suhu ruangan selama 30 menit. Selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 515,9 nm. Semua pekerjaan dilakukan pada ruang yang terhindar dari cahaya.

c. Pengukuran daya antiradikal bebas hasil fraksi etil asetat kulit batang kemiri

Larutan stok masing-masing dipipet 50 $\mu$ l, 100 $\mu$ l, 200 $\mu$ l, 400 $\mu$ l dan 600 $\mu$ l, kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, dan 120 ppm. Campuran tersebut dikocok dengan menggunakan vortex dan inkubasi selama 30 menit pada suhu 37<sup>0</sup>C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 515,9 nm.

d. Pengukuran daya antiradikal bebas vitamin C

Larutan stok masing-masing dipipet 100 $\mu$ l, 200 $\mu$ l, 300 $\mu$ l, 400 $\mu$ l dan 500  $\mu$ l kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi vitamin C 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm dan 10 ppm. Campuran dikocok dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu 37<sup>0</sup>C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 515,9 nm.

## 6. Analisis Data

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan regresi linear dari data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. Besarnya persentase pengikatan radikal bebas dihitung dengan rumus:

$$\% \text{Penghambatan} = \frac{\text{absorbansi blanko} - \text{absorban sampel}}{\text{absorban blanko}} \times 100\%$$

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sampel kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) sebagai antioksidan dengan menggunakan metode DPPH diperoleh hasil:

Tabel 2. Hasil perhitungan IC<sub>50</sub> dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.))

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi sampel	% Penghambatan	Persamaan Garis Linear	IC <sub>50</sub> (ppm)
10	0,1133	25,50	$y = 1,4434x + 8,505$ $R^2 = 0,9769$	28,748 ppm
20	0,1011	33,53		
40	0,0494	67,52		
120	0,0493	67,68		

Tabel 3. Hasil perhitungan IC<sub>50</sub> vitamin C

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi sampel	% Penghambatan	Persamaan Garis Linear	IC <sub>50</sub> (ppm)
6	0,0522	55,68	$y = 4,3225x + 30,37$ $R^2 = 0,9846$	4,541 ppm
8	0,0514	66,20		
10	0,0511	72,97		

## **B. Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan pada uji aktivitas antioksidan terhadap kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) yang dilakukan dengan menggunakan metode DPPH karena metode ini memiliki beberapa keuntungan yaitu ujinya sederhana, mudah, cepat, dan memerlukan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat. Selain itu metode ini terbukti akurat dan praktis. Kemudian diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat, karena maserasi bertingkat lebih cepat diketahui pemisahan senyawanya, lebih mudah, efisien dan terjadi pemisahan senyawa antara non polar dan polar karena menggunakan beberapa jenis pelarut sesuai tingkat kepolarannya sehingga tidak melalui partisi.

Metode maserasi merupakan metode penyarian yang sederhana, mudah, dan tanpa melalui proses pemanasan, sehingga kemungkinan rusaknya komponen senyawa kimia dapat diminimalisir. Pemilihan metode maserasi dikarenakan terdapat kandungan kimia yang ada didalam kulit batang kemiri dan mudah rusak jika dilakukan secara pemanasan. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diperoleh. Sedangkan kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna.

Proses penyarian dilakukan dengan cara merendam sejumlah serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan terlarut dalam cairan penyari kemudian akan terdesak keluar sel dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif dengan cairan di luar sel. Peristiwa tersebut berlangsung terus menerus hingga terjadi keseimbangan antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

Setelah dimaserasi menggunakan tiga jenis pelarut yaitu n-heksan, etil asetat, dan etanol 96% selama 3x24 jam, sampel disaring kemudian dirotavapor, namun untuk menghilangkan pelarut maka metode yang digunakan yaitu vakum. Setelah di vakum ekstrak dikeringkan di dalam eksikator sehingga diperoleh ekstrak kering sebanyak n-heksan 10,74 g, etil asetat 8,933 g, dan etanol 30,28 g. Penyimpanan ekstrak juga dijaga dari paparan sinar matahari dimana ekstrak disimpan dimangkok yang dilapisi aluminium foil dan di simpan di dalam eksikator yang terhindar dari cahaya.

Ekstrak yang diperoleh masing-masing di uji KLT yaitu sampel ditotolkan pada lempeng kemudian dielus dengan fase gerak tertentu lalu diamati bercak dengan cara menyemprotkan larutan DPPH, senyawa aktif penangkal radikal bebas akan menunjukkan bercak warna kuning pucat berlatar ungu. Adapun ekstrak aktif yang diperoleh yaitu ekstrak etil asetat, kemudian ekstrak tersebut difraksinasi menggunakan KCV (kromatografi cair vakum) metode ini digunakan karena cepat dan mudah dalam proses pemisahan komponen kimia, metode ini dilakukan menggunakan fase diam silika gel 60 F<sub>254</sub>. Digunakan silika gel 60 F<sub>254</sub> agar sampel bila disinari dengan sinar UV dapat berfluoresensi atau berpendar dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin meningkat yaitu n-Heksan:etil asetat {(12:2), (8:2), (6:2), (3:2), (2:3), (2:6), (2:9), (2:12), (3:1), (1:1)}, etil asetat 60 ml, etil:metanol {(9:2), (6:2), (3:2)}, dan metanol 60 ml. Hasil fraksinasi tersebut, diamati penampakan nodanya dengan cara menotolkan pada lempeng KLT. Hal ini dilakukan dengan tujuan penggabungan fraksi-fraksi yang diperoleh berdasarkan kesamaan penampakan noda KLT yang terbentuk. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh 4 Fraksi gabungan yaitu Fraksi A (7, 8, 9, 10, 11 dan 12), Fraksi B (13, 14 dan 15), Fraksi C (1, 2 dan 3), Fraksi D (4, 5 dan 6). Selanjutnya semua fraksi yang telah

digabungkan kemudian dilakukan pengujian antioksidan dengan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 515,9 nm. Yang merupakan panjang gelombang maksimum untuk DPPH dimana senyawa DPPH adalah sebuah molekul yang mengandung senyawa radikal bebas yang tidak stabil dapat mengikat ion hidrogen sehingga digunakan untuk mengujian antioksidan. Selain itu metode DPPH merupakan metode yang dapat mengukur aktivitas antioksidan baik dalam pelarut polar maupun non polar, dan mengukur semua komponen antioksidan baik yang larut dalam lemak maupun dalam air. Beberapa metode lain terbatas mengukur komponen yang terlarut dalam pelarut yang digunakan dalam analisis, DPPH cara kerjanya cepat, mudah didapat, dan umumnya digunakan dalam penelitian antioksidan dibandingkan dengan metode yang lain. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil fraksi yaitu Fraksi A (7696,36 ppm), Fraksi B (28,748 ppm), Fraksi C (4912,64 ppm), Fraksi D (844 ppm).

Adanya antioksidan pada sampel mengakibatkan perubahan warna pada larutan DPPH dalam etanol p.a yang awalnya berwarna ungu menjadi kuning pucat. Perubahan itu terjadi karena DPPH mengalami reduksi sehingga menyebabkan elektron berpasangan. Dalam penelitian ini digunakan pembanding vitamin C karena vitamin C memiliki gugus pendonor elektron untuk menangkap radikal bebas, dan vitamin C juga sebagai penangkap radikal bebas yang utama untuk tubuh manusia, dan lebih ekonomis dan mudah didapat dibandingkan dengan control yang lain seperti vitamin E, troloks, dan betakaroten. Namun vitamin C memiliki cara kerja yang sama dengan vitamin E. Dan adapun perbedaan Vitamin E dan vitamin C yaitu vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam

mengatasi kerusakan oleh radikal bebas, vitamin C merupakan antioksidan kuat tetapi vitamin ini larut dalam air.

Blangko adalah larutan yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan sampel dan pembanding dan tidak mengandung analat. Tujuan pengukuran absorbansi blanko adalah mengetahui besarnya serapan oleh zat bukan analat. Dari hasil pengukuran blanko diperoleh absorbansi sebesar 0,1521.

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara membuat larutan stok DPPH dengan cara menimbang serbuk DPPH sebanyak 15,7 mg dan dilarutkan dengan etanol p.a 100 ml sehingga kadarnya 0,4 mM dan dibuat larutan stok dari hasil fraksi etil asetat dengan berbagai konsentrasi yaitu 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 120 ppm. Kemudian ditambahkan dengan larutan DPPH 1 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga 5 ml, setelah itu di inkubasi didalam inkubator selama 30 menit pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$  agar dapat bereaksi dengan larutan DPPH. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515,9 nm dan dilakukan replikasi tiga kali agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Kemudian dilakukan pengujian antioksidan vitamin C sebagai larutan control dimana dibuat larutan stok dengan berbagai konsentrasi yaitu 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Kemudian ditambahkan dengan larutan DPPH 1 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga 5 ml, setelah itu di inkubasi didalam inkubator selama 30 menit pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$  agar dapat bereaksi dengan larutan DPPH. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515,9 nm. Pengerjaan pun dilakukan dalam ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung agar larutan sampel dan DPPH tetap stabil dikarenakan cahaya matahari dapat menguraikan larutan dan mempengaruhi hasil pengukuran.

Berdasarkan tabel 2. Dari pengukuran tersebut diperoleh absorbansi rata-rata sebagai berikut 0,1133, 0,1011, 0,0494, 0,0493. Selanjutnya dilakukan perhitungan % penghambatan untuk mendapatkan kurva baku, adapun hasil yang diperoleh yaitu 25,50 %, 33,53 %, 67,52 %, 67,68 . Kemudian dihitung persamaan garis linear untuk mendapatkan nilai  $IC_{50}$ , karena parameter aktivitas antiradikal diukur dengan menghitung nilai  $IC_{50}$  yang diperoleh dengan persamaan regresi linear. Dari data terlihat pada fraksi kulit batang kemiri didapatkan nilai  $b = 8,505$ , sehingga dapat dikatakan untuk setiap  $x$  (konsentrasi sampel) bertambah, maka  $y$  (%inhibisi) bertambah atau meningkat sebesar 8,505. Aktivitas antioksidan diukur berdasarkan perendaman warna ungu dimana ketika larutan DPPH dicampur dengan bahan antiradikal maka akan terjadi reaksi penangkapan hidrogen yang berasal dari antiradikal DPPH.

Berdasarkan tabel 3. Dari pengukuran tersebut diperoleh absorbansi rata-rata sebagai berikut 0,0522, 0,0514, 0,0511. Selanjutnya dilakukan perhitungan % penghambatan untuk mendapatkan kurva baku, adapun hasil yang diperoleh yaitu 55,68 %, 66,20 %, 72,97 %. Kemudian dihitung persamaan garis linear untuk mendapatkan nilai  $IC_{50}$ . Dari data terlihat pada vitamin C didapatkan nilai  $b = 30,37$ , sehingga dapat dikatakan untuk setiap  $x$  (konsentrasi sampel) bertambah 1 ppm, maka  $y$  (%inhibisi) bertambah atau meningkat sebesar 30,37. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi persentase yang diperoleh, hal ini disebabkan pada sampel yang semakin banyak maka semakin tinggi kandungan antioksidannya sehingga berdampak juga pada tingkat penghambatan radikal bebas yang dilakukan oleh zat antioksidan tersebut.

Persamaan regresi linear nilai b yang positif, menunjukkan bahwa kurva nilai penghambatan antioksidan terjadi peningkatan. Koefisien b merupakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan perubahan rata-rata variabel y untuk setiap perubahan variabel x sebesar satu unit (Sudjana, 1996).

Berdasarkan persamaan linear yang didapatkan sehingga dapat ditentukan nilai  $IC_{50}$  hasil fraksi etil asetat sebesar 28,748 ppm.  $IC_{50}$  adalah bilangan yang menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat proses oksidasi sebesar 50%. Semakin kecil nilai  $IC_{50}$  berarti semakin tinggi nilai antioksidannya. Hasil menunjukkan bahwa fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Aktivitas antiradikal bebas yang diperoleh adalah 28,748 ppm, sedangkan pada vitamin C yang diperoleh memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 4,541 ppm. Menurut Cockell dan Knowland (1999) suatu senyawa dikatakan sebagai peredam radikal bebas atau antioksidan yang sangat kuat jika nilai  $IC_{50}$  kurang dari 50 ppm, kuat (50 ppm-100 ppm), sedang (100 ppm-150 ppm), dan lemah (150 ppm-200 ppm). Berdasarkan hasil yang diperoleh, fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat.

Dalam kutipan QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”* (Kementrian Agama RI, 2013).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat dipergunakan sebagai obat pada berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah dari Allah swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil penelitian tanaman kemiri berguna bagi kehidupan manusia. Seperti halnya Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk tentang cara mengobati diri beliau sendiri, keluarganya dan para sahabat yaitu menggunakan jenis obat yang tidak ada campuran kimia. Pengobatan Nabi menggunakan tiga jenis obat alamiah, obat ilahiyah dan kombinasi obat alamiah dan ilahiyah. Pengobatannya berdasarkan wahyu Allah tentang apa yang bermanfaat dan yang tidak berbahaya, misalnya melakukan pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Pemanfaatan tanam sebagai obat merupakan salah satu sarana untuk mengambil pelajaran dan memikirkan tentang kekuasaan Allah dan meneladani cara pengobatan Nabi. Jika tanaman kemiri ini memiliki khasiat yang baik. Maka bagi orang yang berfikir, dia akan mengingat Allah swt. melalui keagungan ciptaan Allah maka akan timbul rasa iman dan mengetahui kebesaran sang pencipta yang tiada terbatas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) memiliki potensi aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan metode DPPH.
2. Hasil fraksi kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar 28,748 ppm. Sedangkan vitamin C sebagai pembanding memiliki IC<sub>50</sub> sebesar 4,541 ppm.
3. Menurut Islam kemiri merupakan salah satu tanaman yang diciptakan Allah dan memiliki banyak manfaat salah satunya adalah sebagai antioksidan. Allah telah menciptakan berbagai macam tanaman-tanaman dan memiliki manfaat salah satu tanaman yang diciptakan Allah adalah kemiri, kemiri mempunyai banyak manfaat salah satu manfaatnya adalah sebagai antioksidan, antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat efek negatif radikal bebas sehingga kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) dapat mencegah terjadinya suatu penyakit.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Sebaiknya peneliti berikutnya melakukan penelitian mengenai isolasi senyawa antioksidan dari kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana* (L.)


## KEPUSTAKAAN


- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013.
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, 2014.
- Barhe, T.A. and Tchouya, G.R. Comparative Study of the Antioxidant Activity of the Total Polyphenol Extracted from *Hibiscus Sabdariffa* L, *Glycine max* L. Merr., Yellow Tea and Red Wine Through Reaction with DPPH Free Radical, *Arabian Journal of Chemistry*, 2014.
- Cahyadi, Wisnu., *Analisis dan Aspek Kesehatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Damayanti, Dewi. *Buku Pintar Tanaman Obat: 431 Jenis Tanaman Penggempur Penyakit*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Depkes RI, 2014.
- . *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Depkes RI, 1995.
- . *Materia Medika* Jilid 5 dan 6. Jakarta: Depkes RI, 1989.
- Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. *Kimia Organik* Jilid I Edisi Ketiga. Terjemahan dari *Organic Chemistry* oleh Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Halliwell, B. Free Radicals and Antioxidant: Updating a Personal View, *Nutrition Review*, 2012.
- Ikhsan, Nur. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Herba Kemangi (*Ocimum americanum* Linn) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Isfahlan, Ahmad, dkk. *Antioxidant and Antiradical Activities of Phenolic Extracts from Iranian Almond (Prunus amygdalus L.)*. Hulls and Shells: Turk j Biol, 2010.
- Junaid Niazi, Vikas Gupta, dkk, *et.al.* "Anti-Inflammatory and Antipyretic Activity Of Aleurites Muluccana Leaves". Departement of Pharmaceutical Science Govt. Polytechnic for Girls, Patiala, Punjab, 2010.
- Khopkar S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Terjemahan dari *Basic Concepts Of Analytical Chemistry* oleh Saptoraharjo. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Lampe, JW. *Health Effect of Vegetables and Friut: asseing mechanisms of action in Human Experimental studies*. American journal of Clinical Nutrition, Vol. 70, No.3, 2010.
- Liochev, S.I. Reactive Oxygen Species and the Free Radical Theory of Aging, *Free Radical Biology and Medicine*, 2013.
- Martawijaya, A., Kartasujana, I., Mandang, Y.I., Prawira, S.A. dan Kadir, K. *Atlas Kayu Indonesia Jilid II*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, 1989.

- Muhlisah, Fauziah. *Sayur dan Bumbu Dapur Berkhasiat Obat*. Jakarta: Penerbit Swadaya, 2009.
- Mutiasari, IR. *Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Aktif*, Journal. Jakarta: FMIPA-UI, 2012.
- Prakash, Aruna, Fred Rigelhof and Eugene Miller. *Antioksidant Activity*. Medallion Laboratories, 2011.
- Rohman, A., Sugeng, R. dan Diah, U. “*Antioxidant Activities, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Ethyl Acetate Extract of Mengkudu (Morinda citrifolia, L.) Fruit and Its Fractions*”. Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2005.
- Rohman, Abdul. *Daya Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kemuning (Murayya paniculata L.) Secara in-vitro*. Majalah Farmasi Indonesia, 16 vol.3: 136-140. 2012.
- Rohman, A, dan Gandjar. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rubiyanto, Dwiarto. *Teknik Dasar Kromatografi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Saleh, M.A., Clark, S, dkk. *Antioxidant and Free Radical Scavenging of Essential Oils*. Ethnicity & Disease, 2010.
- Sayuti, Kesuma, M.S. *Antioksidan Alami dan Sintetik*. Padang: Andalas University Press, 2015.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 3. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009.
- Tahir, M. Indariani dan M. Sitanggang. *165 Sansevieria Eksklusif*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2008.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Underwood, A. L. dan R. A. Day, JR. *Analisis Kimia Kuantitatif* Edisi Keenam. Terjemahan dari *Quantitative Analysis Chemistry* Sixth Edition oleh Is Sopyan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Winarsi, Hery. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Windyaswari, Ari, et.al. “Kajian Pendahuluan Potensi Anti Kanker dengan Uji Toksisitas Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) Terhadap Ekstrak Etanol dan Fraksi-Fraksi dari Kulit Batang Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd.)”. Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2015.
- Yuliani, Dewi. *Kajian Aktivitas Antioksidan Fraksi Etanol Jintan Hitam (Nigella sativa L.)*. Malang: Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN. 2010.
- Yuswantina, Richa, et.al. “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)”. Program Studi Farmasi STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, 2014.

## LAMPIRAN


**Lampiran 1.** Penyiapan Sampel dan ekstraksi sampel (maserasi bertingkat) kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd.*).




**Lampirn 2.** Skema Fraksinasi Kromatografi Cair Vakum

**Lampiran 3. Skema Penyiapan larutan**


## a. Pembuatan larutan stok



## b. Pembuatan larutan control (Vitamin C)




## c. Pembuatan larutan uji DPPH




**Lampiran 4.** Skema Pengukuran Absorbansi perendaman radikal menggunakan Spektrofotometri

a. Untuk Uji Ekstrak



## b. Untuk Uji Larutan Control



**Lampiran 5.** Tabel hasil pengukuran data

Tabel 4. Hasil pengukuran serapan fraksi etil asetat kulit batang kemiri (*Aleurites moluccana L. Willd*). terhadap DPPH

<b>Konsentrasi</b>	<b>Absorbansi</b>	<b>Rata-rata</b>
10	0,1133 0,1133 0,1133	0,1133
20	0,1009 0,1013 0,1013	0,1011
40	0,0497 0,0493 0,0494	0,0494
120	0,0494 0,0495 0,0492	0,0493

Table 5. Hasil pengukuran serapan vitamin C terhadap DPPH

<b>Konsentrasi</b>	<b>Absorbansi</b>	<b>Rata-rata</b>
6	0,0524 0,0536 0,0507	0,0522
8	0,0562 0,0500 0,0482	0,0514
10	0,0175 0,0530 0,0529	0,0511

### Lampiran 6. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Fraksi

a. Untuk Uji Fraksi

Dik: 50 mg = 10.000  $\mu$ l

50 ml

$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{50.000 \mu\text{l}}{50 \text{ ml}} = 1000 \text{ ppm}$$

Untuk 10 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ ppm.ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,05 \text{ ml} = 50 \mu\text{l}$$

Untuk 20 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 20 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{100 \text{ ppm.ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,1 \text{ ml} = 100 \mu\text{l}$$

Untuk 40 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 40 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{200 \text{ ppm.ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,2 \text{ ml} = 200 \mu\text{l}$$

Untuk 80 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 80 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{400 \text{ ppm.ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,4 \text{ ml} = 400 \mu\text{l}$$

Untuk 120 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 120 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{600 \text{ ppm.ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,6 \text{ ml} = 600 \mu\text{l}$$

b. Untuk Uji Control

Dik: 10 mg = 10.000  $\mu$ l

100 ml

$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{l}}{\text{ml}} = \frac{10.000 \mu\text{l}}{100 \text{ ml}} = 100 \text{ ppm}$$

Untuk 2 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 2 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{10 \text{ ppm.ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,1 \text{ ml} = 100 \mu\text{l}$$

Untuk 4 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 4 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{20 \text{ ppm.ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,2 \text{ ml} = 200 \mu\text{l}$$

Untuk 6 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 6 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{30 \text{ ppm.ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,3 \text{ ml} = 300 \mu\text{l}$$

Untuk 8 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 8 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{40 \text{ ppm.ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,4 \text{ ml} = 400 \mu\text{l}$$

Untuk 10 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ ppm.ml}}{100 \text{ ppm}} = 0,5 \text{ ml} = 500 \mu\text{l}$$

**Lampiran 7. Perhitungan Larutan DPPH 0,4 mM**

Dik:

$$\text{Larutan DPPH} = 0,4 \text{ mM} = 0,0004 \text{ mol/L}$$

$$\text{Mr} = 394,33 \text{ g/mol}$$

$$\text{Volume} = 100 \text{ ml}$$

$$\text{Massa} = \dots\dots \text{g?}$$

Penyel:

$$0,4 \text{ mM} = \frac{\text{massa}}{\text{Mr} \times v}$$

$$0,0004 \text{ mol/L} = \frac{\text{massa}}{394,33 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 0,1 \text{ L}}$$

$$\text{g} = 0,0004 \text{ mol/L} \times 394,33 \text{ g/mol} \times 0,1 \text{ L}$$

$$= 0,0157 \text{ g} = 15,7 \text{ mg}$$

**Lampiran 8.** Perhitungan % penghambatan

$$\% \text{ Penghambatan} = \frac{\text{Absorbansi DPPH} - \text{Absorbansi Sampel}}{\text{Absorbansi DPPH}} \times 100\%$$

**a.** Untuk sampel kulit batang kemiri

- Untuk konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,1133}{0,1521} \times 100 \% = 25,50 \%$$

- Untuk konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,1011}{0,1521} \times 100 \% = 33,53 \%$$

- Untuk konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,0494}{0,1521} \times 100 \% = 67,52 \%$$

- Untuk konsentrasi 120 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,0493}{0,0493} \times 100 \% = 67,68 \%$$

**b.** Untuk sampel vitamin C

- Untuk konsentrasi 6 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,0522}{0,1521} \times 100 \% = 55,68 \%$$


- Untuk konsentrasi 8 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,0514}{0,1521} \times 100 \% = 66,20 \%$$


- Untuk konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,1521 - 0,0411}{0,1521} \times 100 \% = 72,97 \%$$

### Lampiran 9. Grafik



Gambar 5. Grafik hubungan antara konsentrasi hasil fraksi etil asetat dengan % penghambatan terhadap DPPH



Gambar 6. Grafik hubungan antara konsentrasi vitamin C dengan % penghambatan terhadap DPPH

**Lampiran 10. Perhitungan IC<sub>50</sub>**

- a. Perhitungan IC<sub>50</sub> dari hasil fraksi etil asetat

$$y = 1,4434x + 8,505$$

$$50 - 8,505 = 1,4434$$

$$41,495 = 1,4434$$

$$x = \frac{41,495}{1,4434}$$

$$x = 28,748$$

$$\text{IC}_{50} = 28,748 \text{ ppm}$$

- b. Perhitungan IC<sub>50</sub> Vitamin C

$$y = 4,3225x + 30,37$$

$$50 - 30,37 = 4,3225$$

$$19,63 = 4,3225$$

$$x = \frac{19,63}{4,3225}$$

$$x = 4,541$$

$$\text{IC}_{50} = 4,541 \text{ ppm}$$

**Lampiran 11. Gambar**




Gambar 7. Tanaman kemiri (*Aleurites moluccana* L. Willd).



Gambar 8. Kulit batang kemiri




Gambar 9. Alat Spektrofotometri UV-VIS




Gambar 10. Absorbansi panjang gelombang maksimum ( $\lambda_{maks}$ )

ALAUDDIN  
MAKASSAR



a. Penampakan noda pada UV 254



b. Penampakan noda pada UV 366

Gambar 11. Hasil fraksinasi ekstrak etil asetat kulit batang kemiri  
(*Aleurites moluccana* L. Willd).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

### **BIODATA PENULIS**



MUSFIRAH BURHAN dilahirkan di Bottonpadang (Bone), 29 Mei 1995 merupakan anak ke empat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Burhanuddin dan Nursaidah. Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SD inpres 6/86 Bottonpadang pada tahun 2007. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMPN 4 Kahu pada tahun 2007-2010. Kemudian menamatkan pendidikan sekolah Menengah Atasnya di MAN 1 Makassar pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan hingga saat ini