

**UJI KONSENTRASI FORMULASI *Bacillus subtilis* BNt8 TERHADAP
PERTUMBUHAN BENIH JAGUNG
(*Zea mays* L.) SECARA *In Vitro***



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

IRMA FITRIANTI

NIM. 60300112025

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Fitrianti
NIM : 60300112025
Tempat/Tgl. Lahir : Pakkatto/21 Juni 1994
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Ling. Tattakang Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa
Judul : “Uji Konsentrasi Formulasi *Bacillus subtilis* BNt8 Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung (*Zea mays* L.) Secara *In vitro*”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2016
Penyusun

Irma Fitrianti
NIM: 60300112025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Konsentrasi Formulasi *Bacillus subtilis* BNt8 Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung (*Zea mays* L.)”, yang disusun oleh Irma Fitrianti, NIM: 60300112025, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, bertepatan dengan 28 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 November 2016 M

28 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Hafsan, S.Si., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy III	: Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. Amran Muis, M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan ke hadirat Allah swt yang Maha pemberi petunjuk, anugerah, dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Uji Konsentrasi Formulasi *Bacillus Subtilis* BNT8 Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung (*Zea Mays* L.) Secara *In vitro*”.

Allahumma Sholli 'ala Muhammad, penulis curahkan ke hadirat junjungan umat, pemberi syafa'at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda Sakir Dg Tompo dan Ibunda Nurhayati Dg Caya** atas segala do'a dan pengorbanannya

yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studiku dan selalu memberikanku motivasi dan dorongan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Rektor I, II, III, IV atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri S.Si, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Ibu Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Fatmawati Nur S.Si., M.Si., selaku mantan Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Amran Muis S.P., M.P., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurlailah Mappanganro S.P., M.P., selaku Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Isna Rasdiana Aziz, S.Si., M.Sc., Ibu Dr. Cut Mutiadin S.Si. M.Si. dan Bapak Rusydi Rasyid S.Ag. M.Ad selaku Penguji I, II dan III yang tak pernah lelah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
9. Seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
10. Seluruh Pegawai Laboratorium Hama dan Penyakit Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi penulis.
11. Kepada teman-teman angkatan 2012 “RANVIER” dan “CREW BANTA’S” yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kenangan tak terlupakan selama ini.
12. Sahabat seperjuangan Atirah, Ila, Nurul, Suba, Rasdiana dan Rahmi yang telah membantu dan menemani penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Kepada Adik Sukri dan Maslan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

14. Yang terspesial Alvhan, Hilman, Ayu dan Ammar yang telah meluangkan waktu membantu menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis memohon ridho dan maghfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah swt, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin...

Wassalamu 'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, November 2016

Penulis,

IRMA FITRIANTI

NIM: 60300112025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR ILUSTRASI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-09
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-30
A. Ayat dan Hadits yang Relevan.....	10
B. Tanaman Jagung	14
C. <i>Bacillus subtilis</i>	24
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Variabel Penelitian.....	31
D. Definisi Operasional Variabel.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	32
G. Prosedur Kerja.....	33
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37- 44
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	39

BAB V	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran (Implikasi Penelitian).....	46
KEPUSTAKAAN		47-49
LAMPIRAN-LAMPIRAN		50-70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Gambar Tanaman Jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	15
Gamba 2.2. Akar tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	16
Gambar 2.3. Batang tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	17
Gambar 2.4. Daun tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	18
Gambar 2.5. Kiri bunga jantan dan kanan bunga betina.....	19
Gambar 2.6. Gambar tongkol tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	20
Gambar 2.7. Bakteri <i>B. subtilis</i> pada perbesaran 100X.....	24
Gambar 2.8. <i>B. subtilis</i> Pada Media PDPA.....	29
Gambar 4.1. Rata-rata Panjang Akar tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	37
Gambar 4.1. Rata-rata Panjang Koleoptil tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.)	38
Gambar 4.3. Rata-rata Berat Segar tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.).....	39

ABSTRAK

Nama : Irma Fitrianti
NIM : 60300112025
Judul Skripsi : “Uji Konsentrasi Formulasi *Bacillus subtilis* BNt8 Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung (*Zea mays* L.) Secara *In vitro*”

Tanaman jagung (*Zea mays* L.) merupakan tanaman pangan yang kaya akan karbohidrat. Bakteri *Bacillus subtilis* merupakan bakteri berbentuk batang yang dikemas sebagai formulasi. Formulasi *B. subtilis* BNt8 merupakan biakan bakteri yang di peroleh dari Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman jagung. Kelebihan formulasi *B. subtilis* BNt8 adalah unsur hara yang dikandungnya lebih cepat tersedia dan mudah diserap oleh tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi formulasi *B. subtilis* BNt8 terhadap pertumbuhan benih jagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan 8 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga terdapat 24 unit percobaan yaitu 0,5 gr/ml air (P1), 0,75 gr/ml air (P2), 1 gr/ml air (P3), 1,25 gr/ml air (P4), 1,5 gr/ml air (P5), 1,75 gr/ml air (P6), 2 gr/ml air (P7) dan kontrol tanpa formulasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah formulasi *B. subtilis* BNt8 dengan berbagai konsentrasi perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar, panjang kecambah dan berat segar tanaman.

Kata kunci: *Bacillus subtilis* dan Jagung (*Zea mays* L.)

ABSTRACT

Name : Irma Firianti
SIN : 60300112025
Minithesis Title : "Concentration Test of *Bacillus subtilis* BNt8 Formulations the Growth of Corn Seeds"

Corn (*Zea mays* L.) is a crop that is rich in carbohydrates. *Bacillus subtilis* is a rods formed bacterial that are packed in to the formulation. *B. subtilis* BNt8 fomulation is collected from Bone South Sulawesi which can stimulate the growth of corn plants. Excess formulation of *B. subtilis* BNt8 are nutrients it contains more quickly available and easily absorbed by plants. This study aimed to determine the effeck of various concentrations of *B. subtilis* formulations in the growth of corn seeds. This study was quantitative study. The approach used in this study was a laboratory experiment. The treatments was arranged in completely randomized design (CRD) which was consists of 8 treatments and 3 replicates. The treatments were 0,5 g/ml of water (P1), 0,75 g/ml of water (P2), 1 g/ml of water (P3), 1,25 g/ml of water (P4), 1,5 g/ml of water (P5), 1,75 g/ml of water (P6), 2 g/ml of water (P7), and control without formulation. The results showed that there was no significant difference of the formulation againts root length, length of sprouts, and fresh weight of the plant.

Key words: *B. subtilis* and Corn (*Zea mays* L.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan mikroorganisme di bumi ini, salah satunya adalah bakteri. Sebagian bakteri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan, ada yang dapat dijadikan sebagai obat dan sebagai agen pengendali hayati (biopestisida) yang juga berfungsi sebagai PGPR salah satunya adalah bakteri *Bacillus subtilis* yang merupakan ciptaan Allah yang dapat dijadikan sebagai agen pengendali haya terhadap penyakit bagi tanaman jagung (*Zea mays* L.) yang di ciptaan Allah sebagai bahan makanan, baik oleh hewan maupun manusia. Agen hayati ini biasa disebut dengan biopestisida yang mampu merangsang pertumbuhan tanaman. Bakteri *B. subtilis* yang dipercaya dapat merangsang pertumbuhan akar, mengaktifkan hormon pertumbuhan tanaman sehingga tidak mudah terserang penyakit. Hal ini berhubungan dengan firman Allah dalam surah Al-Waqiah/56 : 63-66 yang berbunyi:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ حَسْبُ الزَّرْعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ
لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِمُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

”Pernakah kamu melihat benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?. Sekiranya Kami menghendakinya niscaya Kami hancurkan sampai lumat; niscaya kamu heran dan tercengang. (Sambil berkata). ”sungguh kami benar-benar menderita kerugian” (Kementerian Agama RI, 2012).

Allah berfirman: maka apakah kamu melihat dengan mata kepala atau hatimu, keadaan yang sungguh menakjubkan, terangkanlah kepadaku tahapan-tahapan dari benih

yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya setelah benih itu ditanam sehingga pada akhirnya berubah ataukah Kami para penumbuhnya? Kalau Kami kehendaki maka benar-benar Kami menjadikannya tanaman itu kering tidak berbuah dan hancur berkeping-keping sebelum sebelum kamu petik, akibat terserang panas atau terserang hama (Shihab, 2002).

Dalam proses penciptaan makhluk hidup di muka bumi hanya Allah yang sanggup melakukan semua itu. Kita menanam tumbuhan pada tanah (media) yang mengandung air dan unsur hara, saat tanaman itu tumbuh dengan subur ada campur tangan Allah swt, karena kekuatan kekuasaan-Nya segala yang tercipta di bumi (Shihab, 2002).

Jagung adalah tanaman yang penting untuk pangan dan pakan. Lebih dari 120 juta ha lahan kering pada berbagai area di dunia menjadi media utama pengusahannya. Menurut Siregar (2009), di Indonesia, selain pada lahan kering, jagung diusahakan pada lahan sawah setelah panen padi dengan produktivitas mencapai sekitar 7,0 t/ha. Di Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan, di beberapa tempat, jagung merupakan bahan makanan pokok utama pengganti beras atau sebagai campuran beras. Menurut Siregar (2009), dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya industri peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan jagung sebagai campuran pakan ternak (Purwono, 2005).

Menurut Purwono (2005) keuntungan bertanam jagung ternyata sangat besar. Selain biji sebagai hasil utama, batang jagung merupakan bahan pakan ternak yang

sangat potensial. Dengan demikian, dalam pengusahaan jagung selain mendapat biji atau tongkol jagung, masih ditambah lagi dengan brangkasannya yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari segi pengolahan, keuntungan bertanam jagung adalah kemudahan dalam budidaya. Tanaman jagung merupakan tanaman yang tidak hanya bahan pangan, jagung juga telah dikenal sebagai salah satu bahan pakan ternak dan industri.

Dalam kaitan penurunan produksi hasil jagung, organisme pengganggu tanaman (OPT) menjadi penyebab penting apabila menginfeksi tanaman pada fase vegetatif, semakin muda tanaman terinfeksi semakin besar peluang kehilangan hasil. Selanjutnya pada fase pascapanen, OPT yang perlu menjadi perhatian adalah jamur atau cendawan penyebab penyakit pada jagung. Baik sebagai pakan, maupun pangan mudah rusak akibat faktor eksternal dan internal, sehingga kurang bermanfaat, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia dan ternak yang mengonsumsinya (Pakki, 2006).

Untuk mengatasi penurunan kualitas produk-produk pertanian jagung, maka masalah mikotoksin pada bahan baku pangan dan pakan perlu mendapat perhatian. Kewaspadaan yang lebih awal diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam upaya peningkatan mutu produk jagung. Hal tersebut dapat diupayakan dengan mengkombinasikan pemahaman terhadap pengetahuan biologi, inang, sebaran, toksisitas, dan komponen pengendalian lainnya (Ginting, 1986).

Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih populer disebut *plant growth promoting rhizobacteria* (PGPR) merupakan kelompok bakteri

menguntungkan yang secara aktif mengkolonisasi rizosfir. PGPR berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen dan kesuburan lahan. Secaralangsung, PGPR merangsang pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan hormon pertumbuhan, vitamin dan berbagai asam organik serta meningkatkan asupan nutrisi bagi tanaman (Aryantha, 2004).

Keunggulan *B. subtilis* dibanding bakteri jenis lainnya adalah sifatnya yang mampu menekan berbagai jenis patogen tanaman, bersifat *plant growth promoting rhizobacter* (PGPR), dan mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. *B. subtilis* adalah isolat bakteri yang berasal dari rizosfer tanaman jagung. Bakteri ini telah teruji secara *in vitro* mampu menekan perkembangan patogen (Sulistiani 2009).

PGPR merupakan bakteri yang aktif mengkoloni akar tanaman dengan memiliki tiga peran utama bagi tanaman yaitu sebagai *biofertilizer*, *biostimulan* dan *bioprotektan*. PGPR dapat mempengaruhi tanaman secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan memfiksasi nitrogen, melarutkan fosfat, produksi siderofor dan hormon pertumbuhan secara tidak langsung yaitu dengan memperbaiki kondisi pertumbuhan tanaman (Zainudin, 2004).

Formulasi *B. subtilis* BNT8 merupakan isolat bakteri biakan *B. subtilis* yang diperoleh dari Kabupaten Bone Sulawesi - Selatan yang diproduksi dengan alat modern yang menghasilkan bakteri siap pakai dalam bentuk bubuk dan memudahkan kita untuk pemakaian. Wilayah kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang dimana kelembapan udaranya berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 26°C - 43°C. Pada periode April hingga September, angin timur tertiuap membawa

hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober hingga Maret angin barat tertiup saat musim kemarau di kabupaten Bone. Salah satu dampak pestisida kimiawi adalah adanya residu pestisida yang terdapat didalam tanah sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem mikroba didalam tanah. Hadirnya formulasi *B. subtilis* BNT8 dapat membantu keseimbangan ekosistem tanah karena terbuat dari bahan alami yang juga bersal dari tanah. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui konsentrasi yang efektif merangsang pertumbuhan tanaman jagung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemberian formulasi *B.subtilis* BNT8 terhadap pertumbuhan benih jagung (*Zea mays* L.) secara *in vitro*?
2. Pada konsentrasi berapa dari formulasi *B. subtilis* BNT8 yang dapat memacu pertumbuhan jagung (*Zea mays* L.) secara *in vitro*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui konsentrasi formulasi *B. subtilis* BNT8 yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays* L.) dengan penelitian secara *in vitro*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2016.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, keaslian, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan formulasi *B.subtilis* dengan konsentrasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan diaplikasikan pada tanaman jagung (*Zea mays* L.). Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Mila (2012), telah menguji efek fitohormon PGPR terhadap pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays* L.), diidentifikasi sebagai PGPR penghasil fitohormon yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Kemampuan PGPR dalam mensintesis fitohormon terutama IAA dan ACC deaminase, memfiksasi nitrogen, meningkatkan ketersediaan hara P dan hara lainnya serta siderofor merupakan indikator kemampuan PGPR untuk digunakan sebagai input dalam sistem pertanian yang berwawasan lingkungan. Inokulasi PGPR telah dilakukan pada benih tanaman jagung dan memperlihatkan potensi PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (*Zea mays* L.)
2. Ayu (2008), telah menguji bakteri antagonis *B. subtilis* dan *Pseudomonas fluorescens* untuk mengendalikan penyebab penyakit busuk Pangkal batang pada jagung (*Zea mays* L.). Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa aplikasi bakteri antagonis *B. subtilis* dan *P. fluorescens* baik secara tunggal maupun kombinasi berpengaruh positif terhadap masa inkubasi penyakit, yaitu dapat memperpanjang masa inkubasi dari perlakuan kontrol 27,11 hsi (hari setelah

inokulasi) menjadi 34,78 hsi. Hasil insidensi penyakit yang paling baik adalah aplikasi kombinasi *B. subtilis* dan *P. fluorescen* dengan volume 15 ml. Pada perlakuan kontrol insidensi penyakit dapat mencapai 69%, sedangkan pada perlakuan kombinasi bakteri insidensi penyakit hanya mencapai 31,3%.

3. Benny (2013), telah menguji dosis dan cara aplikasi biofungisida *Bacillus* sp. terhadap penyakit jamur akar putih (*Rigidoporus lignosus*) pada tanaman karet di pembibitan, serta mengetahui pengaruh penyakit jamur akar putih terhadap tinggi tunas *stump* karet. Hasil penelitian menunjukkan pada perlakuan dosis biofungisida intensitas serangan tertinggi terdapat pada P0 sebesar 88,54% dan terendah pada P3 sebesar 20,83%. Perlakuan cara aplikasi intensitas serangan A1 sebesar 35,94% dan A2 sebesar 54,69%. Interaksi dosis dan cara aplikasi terhadap intensitas tertinggi terdapat pada perlakuan P0A2 sebesar 89,59% dan terendah pada P3A1 sebesar 6,25%. Tinggi tunas tertinggi pada perlakuan dosis terdapat pada P3 sebesar 17,78 cm, terendah pada perlakuan P0 sebesar 3,52 cm. Tinggi tunas perlakuan cara aplikasi A1 sebesar 14,78 cm dan A2 sebesar 9,87 cm. Interaksi dosis dan cara aplikasi tinggi tunas tertinggi pada P3A1 sebesar 21,04 cm dan terendah pada P0A2 sebesar 3,00 cm.
4. Hanudin, dkk., (2010), telah menguji formulasi biopestisida berbahan aktif *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*, dan *Corynebacterium* sp. nonpatogenik untuk mengendalikan penyakit karat pada Krisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi bahan aktif setelah difermentasi selama 3 minggu selalu meningkat, populasi bahan aktif sebelum fermentasi sejumlah 10⁵ cfu/ml

meningkat menjadi 10_{6-7} cfu/ml. Dua bulan setelah fermentasi, populasi bahan aktif biopestisida masih tetap tinggi yaitu berkisar antara 10_{6-11} cfu/ml. Perlakuan ekstrak kascing + gula pasir + *B. subtilis* + *P. fluorescens* + *Corynebacterium* pada tingkat konsentrasi 0,3% merupakan perlakuan terbaik. Di samping dapat menekan intensitas serangan *P. horiana* (38,49%), formulasi biopestisida tersebut juga dapat menaikkan hasil panen bunga krisan layak jual sebanyak 14,58%.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian formulasi *B. subtilis* BNT8 terhadap pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays* L.) secara *in vitro*.
2. Untuk mengetahui konsentrasi formulasi *B. subtilis* BNT8 yang dapat memacu pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays* L.) secara *in vitro*.

F. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang PGPR yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman jagung dengan mengenal produk formulasi *B. subtilis*.
2. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Ayat yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf/7: 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۚ كَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (Kementerian Agama RI, 2012).

Dari penggalan ayat di atas terdapat kalimat “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah”. Hal ini menandakan bahwa tumbuhan yang subur berasal dari kualitas dan nutrisi tanah yang baik. Kemudian surat di atas dilanjut dengan “dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana”. Maksud dari ayat ini adalah tanah yang memiliki nutrisi yang buruk maka tumbuhan akan sukar tumbuh dan akan menghasilkan tanaman yang tidak subur. Dan surat di atas ditutup dengan “demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”. Dengan kalimat tersebut maka dapat dipahami sebagai isyarat Allah kepada ummat-Nya yang

berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang nutrisi yang baik untuk tanaman.

Ayat ini bermakna (dan tanah yang baik) tanah yang baik (tanaman-tanaman yang subur) tumbuh dengan baik (dengan seizing Tuhan-Nya) hal ini merupakan perumpamaan bagi orang mukmin yang mau mendengar petuah/nasehat, kemudian ia mengambil manfaat dari nasehat itu (dan tanah yang tidak subur) jelek tanahnya (tidak mengeluarkan) tanamannya (kecuali tumbuhan merana) sulit dan susah tumbuhnya. Hal ini merupakan perumpamaan bagi orang kafir, (demikianlah) seperti yang telah kami jelaskan (kami menjelaskan) menerangkan, (ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang bersyukur) terhadap Allah swt kemudian mereka mau beriman kepada-Nya (Shihab, 2002).

Dalam proses penciptaan makhluk hidup di bumi hanya Allah yang sanggup melakukan semua itu. Kita menanam tumbuhan pada tanah (media) yang mengandung air dan unsur hara, saat tanaman itu tumbuh dengan subur, maka ada campur tangan Allah swt. Siapakah yang mampu menumbuhkan tanaman tersebut selain Allah swt, karena atas kekuasaan-Nya segala yang terjadi dan tercipta di bumi (Shihab, 2002).

2. Surah Al-Mulk/67: 3-4

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۗ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

Terjemahnya:

”Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah” (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam ayat-ayat ini Allah menunjukkan bukti kebesaran dan kekuasaan-Nya bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Dia-lah raja yang berkuasa atas segala sesuatu, mengadakan, meniadakan menghidupkan dan mematikan. Dia-lah maha mulia, perkasa, menang dan maha pengampun. Dia pula yang menjadikan langit tujuh petak, tujuh susun tanpa ada celah pun, kekurangan atau kekeliruan dan pertentangan, kemudian Allah mempersilahkan Makhlu-Nya untuk memperhatikan semua kejadian untuk membuktikan betapa rapinya serta indahny, kemudian Allah telah menghias langit dunia dengan bintang-bintang bagaikan pelita yang menerangi, juga itu dijadikan alat untuk melempari setan yang berusaha mencuri percakapan dan pendengaran untuk menipu mempengaruhi manusia (Bahreisy, 1994).

3. Surah Al- Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2012).

Firman-Nya: Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu pahami sebagai petunjuk bahwa bahwa pada dasarnya segala yang

terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Karena itu pula lanjutan ayat itu menyatakan “lalu dijadikan-Nya” bahwa langit itu dijadikan-Nya dalam bentuk sebaik mungkin, tanpa sedikit aib atau kekurangan pun (Shihab, 2002).

Bagaimana kalian akan kafir, padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dunia, Dia yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar dan itu adalah bentuk keMahakuasaannya. Yang kuasa melakukan itu pasti bisa menghidupkan yang mati. Kata “Kemudian” dalam ayat ini bukan berarti selang masa, tetapi dalam arti peringkat yakni peringkat sesuatu yang disebut sesudahnya yaitu langit dan apa yang ditampungnya lebih agung, indah dan misterius dari pada bumi. Maka Allah menyempurnakan mereka menjadi tujuh langit dan menetapkan hukum-hukum yang mengatur perjalanan masing-masing. Serta menyiapkan sarana yang sesuai bagi yang berada di sana, apa atau apapun itu semua diciptakan-Nya dalam keadaan sempurna dan amat teliti (Shihab, 2002).

B. Tanaman Jagung

1. Klasifikasi dan Morfologi

Tanaman jagung termasuk dalam keluarga rumput-rumputan dengan spesies *Zea mays* L. Secara umum klasifikasi dan sistematika tanaman jagung sebagai berikut:

Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Classis : Monocotyledone
Ordo : Poales
Familia : Poaceae/ Gramineae
Genus : *Zea*
Spesies : *Zea mays* L. (Tjitrosoepomo, 2013).



Gambar 2.1. Tanaman jagung (*Zea mays* L.) (dokumentasi pribadi, 2016)

Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar, yaitu (a) akar seminal, (b) akar adventif, dan (c) akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar

seminal akan berhenti pada fase V3. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil, kemudian setelah takar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus keatas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Perkembangan akar jagung (kedalaman dan penyebarannya) bergantung pada varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap cekaman aluminium. Tanaman yang toleran aluminium, tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar (Rinaldi, 2009).



Gamba 2.2.Akar tanaman jagung (*Zea mays* L.) (Dokumentasi Pribadi, 2016).

Setelah perkecambahan, akar primer awal memulai pertumbuhan tanaman. Sekelompok akar sekunder berkembang pada buku-buku pangkal batang dan tumbuh menyamping. Akar yang tumbuh relatif dangkal ini merupakan akar adventif dengan percabangan yang amat lebat (Rubaztky et al., 1998).

Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu kulit (*epidermis*), jaringan pembuluh (*bundles vaskuler*), dan pusat batang (*pith*). Batang tanaman jagung silindris dan tidak berlubang seperti halnya batang tanaman padi. Batang tanaman jagung yang masih muda (hijau) rasanya manis karena cukup banyak mengandung zat gula. Rata-rata panjang (tinggi) tanaman jagung antara satu sampai tiga meter di atas permukaan tanah (Warisno, 1998).



Gambar 2.3. Batang tanaman jagung (*Zea mays* L.) (dokumentasi pribadi, 2016).

Daun jagung mulai terbuka sesudah koleoptil muncul di atas permukaan tanah. Setiap daun terdiri atas helaian daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. Jumlah daun sama dengan jumlah buku batang. Jumlah daun umumnya berkisar antara 10-18 helai, rata-rata munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3-4 hari setiap daun. Tanaman jagung di daerah tropis mempunyai jumlah daun relatif lebih banyak dibanding di daerah beriklim sedang (*temperate*). Daun jagung muncul dari buku-buku batang, sedangkan pelepah daun menyelubungi ruas batang untuk memperkuat batang. Panjang daun bervariasi antara 30-150 cm dan lebar daun 4-15 cm dengan ibu tulang daun yang sangat keras. Tepi helaian daun halus dan kadang-kadang berombak (Wakman, *et al.*, 2007).



Gambar 2.4. Daun tanaman jagung (*Zea mays* L.) (dokumentasi pribadi, 2016)

Jagung merupakan tanaman berumah satu *monoecious* dimana letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman. Jagung termasuk tanaman C4 yang mampu beradaptasi baik pada faktor-faktor pembatas pertumbuhan dan

hasil. Salah satu sifat tanaman jagung sebagai tanaman C4, antara lain daun mempunyai laju fotosintesis lebih tinggi dibandingkan tanaman C3, fotorespirasi rendah dan efisien dalam penggunaan air (Rinaldi, 2009).



Gambar 2.5. Kiri bunga jantan dan kanan bunga betina (dokumentasi pribadi, 2016)

Pada setiap tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Bunga betina ini biasanya disebut tongkol selalu dibungkus kelopak-kelopak yang jumlahnya sekitar 6-14 helai. Tangkai kepala putik merupakan rambut atau benang yang terjumbai di ujung tongkol sehingga kepala putiknya menggantung di luar tongkol. Bunga jantan yang

terdapat di ujung tanaman masak lebih dahulu daripada bunga betina. Jagung memiliki buah matang berbiji tunggal yang disebut *karyopsis*. Buah ini gepeng dengan permukaan atas cembung atau cekung dan dasar runcing. Buah ini terdiri endosperma yang melindungi embrio lapisan aleuron dan jaringan perikarp yang merupakan jaringan pembungkus (Warisno, 1998).



Gambar 2.6. Gambar tongkol tanaman jagung (*Zea mays* L.) (dokumentasi pribadi, 2016).

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut *kariopsis*, dinding ovari atau *perikarp* menyatu dengan kulit biji atau *testa*, membentuk dinding buah (Warisno, 1998).

Menurut Rinaldi (2009), biji jagung terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

- a) *Pericarp*, berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air;

- b) *Endosperm*, sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya;
- c) Embrio (lembaga), sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, *scutelum*, dan koleoptil

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Jagung

Menurut Hadi (2006), secara umum jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu:

- a) Fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama;
- b) Fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna sampai *tasseling* dan sebelum keluarnya bunga betina (*silking*), fase ini diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk;
- c) Fase reproduktif, yaitu fase pertumbuhan setelah *silking* sampai masak fisiologis.

Perbaikan sifat tanaman jagung dapat dilakukan melalui modifikasi genetik, baik dengan pemuliaan tanaman secara konvensional maupun dengan bioteknologi, khususnya melalui rekayasa genetik. Kadang kala, dalam perakitan varietas jagung tahan serangga hama, pemulia konvensional menghadapi kendala yang sulit dipecahkan, yaitu langkanya atau tidak adanya sumber gen ketahanan di dalam koleksi plasma nutfah jagung (Rinaldi, 2009).

Tanaman jagung umur 18 sampai 35 hari, bahwa perkembangan akar dan penyebarannya di tanah sangat cepat dan pemanjangan batang meningkat dengan cepat. Tanaman mulai menyerap unsur hara dalam jumlah banyak. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pola tumpangsari adalah waktu tanam, karena waktu tanam berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan vegetatif yang lebih cepat dan dominan menguasai ruang maka akan lebih mampu berkompetisi dalam memperebutkan air, unsur hara dan cahaya dibandingkan dengan pertumbuhan vegetatifnya yang lambat, akhirnya akan mempengaruhi produksi. Pertumbuhan vegetatif jagung yang lebih cepat dan dominan di atas tanah (Rinaldi, 2009).

3. Syarat Tumbuh

Secara umum tanaman jagung dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 0-1.300 m dari permukaan laut dan dapat hidup baik di daerah panas maupun dingin. Selama pertumbuhannya, tanaman jagung harus mendapatkan sinar matahari yang cukup karena sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, iklim diakhir bulan kering akan berpengaruh oleh kemampuan tanah menahan air sehingga air tersedia untuk kebutuhan tanaman dan evaporasi. Umumnya tanah di lahan kering berupa Ultisol atau Oksisol memiliki kemampuan menahan air rendah, sehingga cekaman kekeringan juga menjadi kendala. Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pertumbuhan tanaman jagung untuk terhindar dari serangan penyakit (Purwono, 2005).

Untuk pertumbuhan optimalnya jagung menghendaki penyinaran matahari yang penuh. Di tempat-tempat yang teduh pertumbuhan jagung akan merana dan

tidak mampu membentuk buah. Di Indonesia suhu semacam ini terdapat di daerah dengan ketinggian antara 0 - 600 m dpl dan curah hujan optimal yang dihendaki antara 85 - 100 mm per bulan merata sepanjang pertumbuhan tanaman (Wakman dan Burhanuddin, 2007).


Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman jagung adalah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerase dan drainasenya baik. Jagung dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah asalkan mendapatkan pengolahan yang baik. Tanah dengan tekstur lempung berdebu adalah yang terbaik untuk pertumbuhannya. Tanah-tanah dengan tekstur berat masih dapat ditanami jagung dengan hasil yang baik bila pengelolaan tanah dikerjakan secara optimal, sehingga aerase dan ketersediaan air di dalam tanah berada dalam kondisi baik. Kemasaman tanah (pH) yang baik untuk pertumbuhan tanaman jagung berkisar antara 5,6 – 7,5 (Rinaldi, 2009).

Jumlah radiasi surya yang diterima tanaman selama fase pertumbuhan merupakan faktor yang penting untuk penentuan jumlah biji. Intensitas cahaya merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman jagung oleh sebab itu tanaman jagung harus mendapatkan cahaya matahari langsung. Bila kekurangan cahaya batangnya akan kurus, lemah, dan tongkol kecil serta hasil yang didapatkan rendah (Wakman dan Burhanuddin, 2007).

B. Bacillus subtilis

1. Ciri-ciri Umum

Bacillus subtilis merupakan bakteri berbentuk batang (Gambar 2.7), tergolong bakteri gram positif, motil, menghasilkan spora yang biasanya resisten pada panas, bersifat aerob (beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif), katalase positif, dan oksidasi bervariasi. Tiap spesies berbeda dalam penggunaan gula, sebagian melakukan fermentasi dan sebagian tidak (Zainuddin, 2004).



Gambar 2.7. Bakteri *B. subtilis* pada perbesaran 100X (Kosim, 2009).

Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang banyak terdapat di alam yang mempunyai sifat ada yang merugikan, tetapi banyak juga yang menguntungkan karena mempunyai sifat antagonis. Sifat antagonis ini dapat dimanfaatkan dalam upaya pengendalian biologi karena dapat menghambat perkembangan patogen. Organisme yang bersifat antagonis terhadap patogen tumbuhan dikatakan ideal apabila organisme tersebut memenuhi kriteria, yaitu mampu hidup dan berkembang biak di rizosfer atau di dekat struktur istirahat patogen dan mampu membentuk

antibiotik berspektrum luas, namun tidak menghambat antagonis lain yang tidak menyebabkan kerusakan tanaman. Bakteri ini ditemukan di air, tanah, udara, dan residu tanaman yang telah membusuk. Jika *B. subtilis* dibalutkan pada biji atau benih tanaman maka bakteri tersebut akan berkembang pada sistem perakaran tanaman. Selanjutnya bakteri akan berkompetisi dan menekan cendawan tular tanah seperti *Rhizoctonia*, *Fusarium*, dan *Aspergillus*. Bakteri tersebut terus hidup pada sistem perakaran dan melindungi tanaman sepanjang musim tanam (EPA, 2003).

2. Manfaat dan Keunggulan

Beberapa genus bakteri terseleksi mampu menstimulasi pertumbuhan, baik tanaman legum maupun yang bukan legum pada skala lapangan. Bakteri tersebut terbukti memproduksi fitohormon, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen dan asam absisat. *B. subtilis* mampu memproduksi auksin dan *Indol Acetyl Acid* (IAA) secara *in vitro* yang berperan menstimulasi pertumbuhan tanaman. Serta dapat merangsang pertumbuhan akar jagung pada kondisi hidroponik (Aryantha, 2004).

Menurut Yazdani (2009), *B. subtilis* merupakan bakteri yang bersifat *plant growth promoting rhizobacter* (PGPR) secara umum, fungsi PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dibagi dalam tiga kategori yaitu :

- 1) Sebagai pemacu/perangsang pertumbuhan (*biostimulan*) dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh (fitohormon) seperti IAA, giberelin, sitokinin dan etilen dalam lingkungan akar
- 2) Sebagai penyedia hara (*biofertilizer*) dengan menambat N₂ dari udara secara asimbiosis dan melarutkan hara P yang terikat di dalam tanah

3) Sebagai pengendali patogen berasal dari tanah (*bioprotectans*) dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit anti patogen seperti *siderophore*, β -1,3-glukanase, kitinase, antibiotik dan sianida.

Dalam beberapa kasus, satu *train* PGPR dapat memiliki kemampuan lebih dari satu kategori fungsi, sehingga fungsi perangsang pertumbuhan dan penyedia hara (fungsi langsung) dan fungsi pengendali patogen (fungsi tidak langsung) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanaman yang perakarannya berkembang dengan baik akan efisien menyerap unsur hara sehingga tanaman tidak mudah terserang patogen (Mila, 2012).

Mekanisme PGPR dalam memacu atau meningkatkan pertumbuhan tanaman belum sepenuhnya dipahami. Hal ini terkait dengan kompleksitas peran PGPR bagi pertumbuhan tanaman dan beragamnya kondisi fisik, kimia dan biologi di lingkungan rizosfer. Namun diyakini bahwa proses pemacuan tumbuh tanaman dimulai dari keberhasilan PGPR dalam mengkolonisasi rizosfer (Yazdani, 2009).

Salah satu mikroorganisme yang banyak digunakan dalam formulasi pupuk organik cair adalah bakteri *Bacillus* sp. Formulasi *Bacillus* sp. diduga mampu merangsang pertumbuhan akar sehingga volume akar semakin meningkat. *B. subtilis* juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang dikenal juga sebagai pemacu pertumbuhan tanaman karena menghasilkan senyawa pendorong atau hormon pertumbuhan tanaman IAA. Hormon yang dihasilkan ini dapat memacu pertumbuhan akar lateral dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Volume akar sangat erat juga kaitannya dengan ketersediaan unsur hara N. Unsur N berperan dalam

mensintesa karbohidrat menjadi protein dan protoplasma (melalui mekanisme respirasi) yang berperan dalam pembentukan jaringan vegetatif tanaman. Unsur N yang diserap tanaman berperan dalam menunjang pertumbuhan vegetatif tanaman seperti akar (Sarief, 1985).

B. subtilis mampu mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga unsur hara lebih mudah untuk diserap oleh tanaman untuk kegiatan fotosintesis dalam menghasilkan fotosintat sebagai pertumbuhan tanaman sehingga berat kering tanaman semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *B. subtilis* dapat berperan dalam membantu penguraian bahan organik (Bustamam, 2006).


Sebagai PGPR, *B. subtilis* tidak hanya membantu dekomposisi bahan organik untuk ketersediaan unsur hara tanaman tetapi *B. subtilis* juga mampu melarutkan unsur fosfor agar lebih mudah terserap oleh tanaman sehingga kebutuhan unsur hara tanaman tercukupi sehingga berat kering tanaman bertambah. *Bacillus* sp. sebagai PGPR dapat berperan sebagai pelarut unsur fosfor agar lebih tersedia bagi tanaman. Ketersediaan unsur hara yang cukup akan meningkatkan kegiatan metabolisme tumbuhan yang berdampak pada peningkatan jumlah asimilat pada tanaman sehingga berat kering tanaman bertambah (Kumar, 2011).

3. Syarat Tumbuh dan Pengembangan

B. subtilis adalah salah satu bakteri yang bersifat termofilik fakultatif. Termofilik sebagai salah satu jenis bakteri dapat tumbuh pada suhu tinggi di atas suhu tumbuh rata-rata bakteri mesofil yaitu 45°C - 70°C . Oleh karena memiliki ciri

khas demikian, maka bakteri ini sebagian besar tumbuh dan hidup pada daerah bersuhu tinggi, seperti sumber air panas, kawah gunung berapi, dan tempat pengomposan. Keuntungan dari bakteri ini adalah memiliki protein yang dapat bekerja pada kondisi lingkungan dengan suhu tinggi dimana protein/ enzim lain dapat mengalami denaturasi (Kosim, 2009).


Mikroorganisme dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada suatu substrat yang disebut medium. Untuk mengembangbiakkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, ataupun yang lainnya diperlukan media. Media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan (nutrisi) yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad renik (mikroorganisme). Media dapat berbentuk padat, cair dan semi padat (*semi solid*). Didalam laboratorium mikrobiologi, kultur media sangat penting untuk isolasi, pengujian sifat-sifat fisik dan biokimia bakteri serta untuk diagnosa suatu penyakit (Purwati, 2014).



Gambar 2.8. *B. subtilis* pada media PDPA (dokumentasi pribadi, 2016)

Penelitian rumah kaca yang dilakukan Suratmini, dkk. (2002) menunjukkan bahwa penambahan mikroba tanah *B. subtilis* dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas produksi rumput *Panicum maximum*. Verifikasi di lapangan memberikan hasil serupa. Uji coba di rumah kaca dengan menggunakan tanaman jagung juga memberi hasil serupa, yaitu hasil meningkat sampai 20% dengan menambahkan mikroba tanah, walaupun takaran urea dikurangi 50% dari standar yang direkomendasikan. Di samping itu, mutu jagung yang dihasilkan lebih baik, kandungan protein jagung meningkat dari 7,8% menjadi 9,2%. Dengan kata lain, terjadi perbaikan ganda, yakni dalam kuantitas maupun kualitas (Sajimin, dkk., 2000).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2016 di Laboratorium Hama dan Penyakit Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Penelitian ini merupakan eksperimen murni (*true eksperimental*).

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat adalah pertumbuhan benih jagung (*Zea mays* L.) dan variabel bebas adalah formulasi *B. subtilis*.

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel, antara lain:

- 1) Formulasi *B. subtilis* adalah biakan bakteri *B. subtilis* yang diperoleh dari Kabupaten Bone telah dikemas dan diproduksi dalam kemasan siap pakai.
- 2) Pertumbuhan benih jagung adalah proses bertambahnya seluruh komponen sel dari tanaman jagung yang ditandai dengan bertambahnya ukuran panjang akar, panjang kecambah dan berat segar tanaman jagung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi (pengamatan), pengukuran langsung dan pencatatan hasil dilakukan dengan bantuan alat elektronik.

F. Instrumen Penelitian

a. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *laminar air flow* (LAF), tabung reaksi, *mortar*, *spatula*, cawan pentri, jarum inokulum, gelas kimia, labu erlenmeyer, vortex, *glass hockey rod*, neraca analitik, mikro pipet, mistar, isolasi pinset dan pembakar bunsen.

b. Bahan

Bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulasi *Bacillus subtilis* BNt8, benih jagung (*Zea mays*) varietas anoman, media *potato destros*

peptone agar (PDPA), alkohol, aquadest, plastik steril, plastik tahan panas, kertas buram, dan kertas parafilm.

G. Prosedur Kerja

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 8 perlakuan 3 kali ulangan hingga mencapai 24 unit percobaan, 1 unit percobaan menggunakan 10 biji jagung varietas Anoman. Adapun konsentrasi formulasi *B. subtilis* BNT8 yang akan diberi perlakuan adalah:

- 1) P1 :Uji Konsentrasi 0,5%
- 2) P2 :Uji Konsentrasi 0,75%
- 3) P3 :Uji Konsentrasi 1 %
- 4) P4 :Uji Konsentrasi 1,25 %
- 5) P5 :Uji Konsentrasi 1,5 %
- 6) P6 :Uji Konsentrasi 1,75 %
- 7) P7 :Uji Konsentrasi 2 %
- 8) K :Kontrol negatif.

a. Pemilihan benih jagung varietas Anoman

Pemilihan jagung varietas Anoman adalah tahap pertama yang dapat menentukan kualitas benih yang akan tumbuh. Pertama-tama benih dicuci dengan aquadest steril kemudian dikeringkan pada suhu ruangan pada LAF kemudian dilakukan *seed treatment* dengan formulasi *B. Subtilis*.

b. Uji efektifitas beberapa konsentrasi *Bacillus subtilis* terhadap benih jagung

Uji konsentrasi beberapa konsentrasi *B. subtilis* dilakukan dengan cara *Seed treatment* pada masing-masing benih jagung menggunakan kertas steril dengan cara mengocok secara rata pada benih, Kemudian biji yang telah diberikan perlakuan di pindahkan satu persatu dengan menggunakan pinset kedalam kertas buram yang telah diberi tanda dan dilapisi plastik tahan panas, masing masing percobaan 3 ulangan dan juga 3 kertas buram serta didalamnya terdapat 10 biji/1 ulangan kemudian digulung satu persatu dan tidak diberikan kontak langsung antara biji yang satu dengan yang yang lain. Dengan perlakuan antara lain: Perlakuan 1 (P1.1, P1.2, P1.3), Perlakuan 2 (P2.1, P2.2, P2.3), Perlakuan 3 (P3.1, P3.2, P3.3), Perlakuan 4 (P4.1, P4.2, P4.3), Perlakuan 5 (P5.1, P5.2, P5.3), Perlakuan 6 (P6.1, P6.2, P6.3), Perlakuan 7 (P7.1, P7.2, P7.3) dan Kontrol (K.1, K.2, K.3). Setelah semua terbungkus, bagian bawah dari kertas di beri isolasi agar tidak terjadi kontaminasi langsung. Setelah itu, disimpan dan ditumbuhkan di dalam kertas selama 7 hari.

c. *Parameter penelitian*

Parameter pengamatan dalam penelitian ini ialah:

1. Panjang akar diukur setelah 7 hari menggunakan mistar dengan memilih akar terpanjang dari setiap benih yang tumbuh.
2. Panjang koleoptil tanaman juga diukur satu persatu dengan menggunakan mistar.
3. Berat segar yang merupakan berat keseluruhan tanaman tanpa media juga diukur dengan menggunakan neraca analitik agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.

4. Jumlah koloni *B. subtilis* yang ditemukan di akar. Akar dari setiap perlakuan dengan formulasi *B. subtilis* diekstrak dengan mengambil 2 gr akar kemudian digerus dan ditambahkan air steril 6 ml. Hasil ekstraksi akar tersebut diencerkan hingga 10^{-3} kemudian divortex sebelum ditumbuhkan pada media PDPA, sebanyak 0,1 ml larutan yang diambil dengan menggunakan mikro pipet. Kemudian diletakkan pada media dalam cawan petri dengan menggunakan metode sebar lalu diratakan dengan *glass hockey rod* kemudian disimpan pada suhu ruangan selama 24 jam dengan menutup bagian cawan petri dengan kertas parafilm. Masing-masing perlakuan diulang tiga kali. Sehingga dalam satu perlakuan terdapat 6 cawan petri antara lain: Perlakuan 1 (P1.1. 10^{-2} , P1.2. 10^{-2} , P1.3. 10^{-2} dan P1.1. 10^{-3} , P1.2. 10^{-3} , P1.3. 10^{-3}), Perlakuan 2 (P2.1. 10^{-2} , P2.2. 10^{-2} , P2.3. 10^{-2} dan P2.1. 10^{-3} , P2.2. 10^{-3} , P2.3. 10^{-3}), Perlakuan 3 (P3.1. 10^{-2} , P3.2. 10^{-2} , P3.3. 10^{-2} dan P3.1. 10^{-3} , P3.2. 10^{-3} , P3.3. 10^{-3}), Perlakuan 4 (P4.1. 10^{-2} , P4.2. 10^{-2} , P4.3. 10^{-2} dan P4.1. 10^{-3} , P4.2. 10^{-3} , P4.3. 10^{-3}), Perlakuan 5 (P5.1. 10^{-2} , P5.2. 10^{-2} , P5.3. 10^{-2} dan P5.1. 10^{-3} , P5.2. 10^{-3} , P5.3. 10^{-3}), Perlakuan 6 (P6.1. 10^{-2} , P6.2. 10^{-2} , P6.3. 10^{-2} dan P6.1. 10^{-3} , P6.2. 10^{-3} , P6.3. 10^{-3}) Perlakuan 7 (P7.1. 10^{-2} , P7.2. 10^{-2} , P7.3. 10^{-2} dan P7.1. 10^{-3} , P7.2. 10^{-3} , P7.3. 10^{-3}) dan Kontrol (K.1. 10^{-2} , K.2. 10^{-2} , K.3. 10^{-2} dan K.1. 10^{-3} , K.2. 10^{-3} , K.3. 10^{-3}). Sehari setelah ditumbuhkan atau setelah 24 jam, dihitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

CFU/ ml = jumlah koloni x faktor pengenceran.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil penelitian disajikan dengan bentuk tabel atau grafik. Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel}$ 5%) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{tabel}$ 1%) maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan maka dilakukan uji lanjutan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).




BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Panjang Akar

Sidik ragam panjang akar tanaman jagung (*Zea mays* L.) umur 7 hari disajikan pada Tabel Lampiran 1b. Sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi *Bacillus subtilis* berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar tanaman jagung (*Zea mays* L.). Rata-rata panjang akar tanaman jagung (*Zea mays* L.) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 4.1. Rata-rata panjang akar tanaman jagung (*Zea mays* L.)

2. Panjang Koleoptil

Sidik ragam panjang koleoptil tanaman jagung (*Zea mays* L.) umur 7 hari disajikan pada Tabel Lampiran 2b. Sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi *B. subtilis* berpengaruh tidak nyata terhadap panjang koleoptil tanaman jagung (*Zea*


mays L.). Rata-rata panjang koleoptil tanaman jagung (*Zea mays* L.) dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Rata-rata panjang koleoptil tanaman jagung (*Zea mays* L.)

3. Berat Segar

Sidik ragam berat segar tanaman jagung (*Zea mays* L.) umur 7 hari disajikan pada Tabel Lampiran 3b. Sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi *B. subtilis* berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar tanaman jagung. Rata-rata berat segar tanaman jagung (*Zea mays* L.) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3. Rata-rata berat segar tanaman jagung (*Zea mays* L.).

B. Pembahasan

Pertumbuhan tanaman jagung (*Zea mays* L.) merupakan bertambahnya jumlah ukuran tanaman jagung ditandai dengan terbentuknya suatu organ pada tanaman yang mengalami perubahan antara lain terbentuknya daun dan batang yang diukur dengan panjang akar, panjang koleoptil dan berat segar segar. Setiap parameter ini di ukur setelah penanaman selama 7 hari (satu minggu). Pada penelitian ini tanaman jagung mengalami pertumbuhan karena pada tanaman jagung di media tanam mengalami perubahan berupa bertambahnya ukuran panjang akar, panjang koleoptil dan berat segar yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Menurut Agustina (2004), pertumbuhan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan bersifat meristematik. Contoh, pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Perkembangan adalah proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif (tidak dapat dihitung) dan *irreversible*. Contoh, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan (Purwono, 2005).

Pertumbuhan adalah pertambahan teratur semua komponen suatu organisme. Bila suatu perbenihan cair ditanami sel-sel mikroorganisme maka akan tumbuh sel hidup yang dapat dilihat dalam 6 fase pertumbuhan yaitu: fase penyesuaian, fase percepatan, fase eksponensial, fase perlambatan, fase nol dan fase kemunduran. Pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada termasuk pengaruh dari lingkungan luar (Pusdiknakes, 1989).

Bacillus subtilis adalah bakteri yang berbentuk batang, gram positif dan mempunyai spora, fakultatif anaerob dapat bergerak dengan flagella yang peritrika. Bakteri ini mampu hidup pada media tertentu seperti pada media PDPA (*Potato Destros Peptone Agar*) yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan *Bacillus* sp. Pertumbuhan bakteri diukur setelah 24 jam dengan menggunakan alat *coloni counter* dengan cara mengukur jumlah koloni yang terdapat pada media dengan menggunakan rumus *CFU count*.

Formulasi *B. subtilis* BNt8 merupakan bakteri biakan *B. subtilis* yang di peroleh dari Kabupaten Bone Sulawesi-selatan yang kemudian diolah dan diproduksi dengan alat modern yang menghasilkan bakteri yang siap pakai dalam bentuk bubuk sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan pengetahuan tentang manfaat bakteri dalam bentuk formulasi. Formulasi ini diketahui dapat merangsang pertumbuhan sel tanaman yang diberikan pada tanaman jagung dengan berbagai konsentrasi.

1. Panjang Akar

Hasil pengamatan panjang akar tanaman jagung merupakan indikator yang penting dalam penentuan kualitas benih. Setelah dilakukan analisis sidik ragam. Rata-rata panjang akar tanaman jagung menunjukkan bahwa konsentrasi *B. subtilis* berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan benih jagung, hal ini kemungkinan konsentrasi yang diberikan pada setiap formulasi tidak berbeda jauh. Rata-rata hasil pengamatan panjang akar tanaman jagung dapat dilihat pada gambar 4.1. berdasarkan gambar 4.1, terlihat bahwa pemberian formulasi *B. subtilis* dengan

konsentrasi 0,5 gr/ml air (P1) kemudian pada konsentrasi memiliki panjang akar yang paling tinggi yaitu sekitar 20,83 cm sedang formulasi dengan konsentrasi 0,75 gr/ml air (P2) sampai konsentrasi 1,75 gr/ml air (P6) mengalami penurunan panjang akar (dapat dilihat pada gambar 4.1). yaitu 20,14 sampai 18,62 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian formulasi *B. subtilis* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan panjang akar tanaman jagung. Hal ini diduga dipengaruhi karena faktor lingkungan dan faktor media pertumbuhan yang membatasi ruang gerak tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi (2000), bahwa faktor volume media tanam memungkinkan mempengaruhi terbatasnya unsur hara dan ruang gerak dari akar tanaman. Selain itu juga jarak antar tanaman mempengaruhi persaingan nutrisi antar tanaman. Pemakaian bibit per titik tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan karena secara langsung berhadapan dengan kompetisi antar tanaman dalam satu rumpun. Jumlah bibit per titik tanam yang lebih sedikit akan memberikan ruang pada tanaman untuk menyebar dan memperdalam perakaran. Hal ini dapat dilihat pada saat pengukuran panjang akar tanaman yang sulit karena akar saling melilit antara akar yang satu dengan yang lain. Ini menunjukkan terjadinya kompetisi pada tanaman jagung.

Pada tanaman kontrol ukuran panjang akar mencapai 19,33 cm. jika dibandingkan dengan tanaman yang diberi formulasi, tanaman kontrol memiliki panjang akar yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman dengan konsentrasi 0,5gr/ml air (P1), 0,75gr/ml air (P2), 1,25gr/ml air (P4), 1,5gr/ml air (P5), 2gr/ml air (P7). Hal ini menunjukkan tanaman yang diberi formulasi memiliki nutrisi yang

cukup untuk pertumbuhan. Sesuai dengan pendapat Soewito (1991) bahwa tanaman yang mengandung unsur N, P, dan K yang cukup kebutuhan unsur hara tanaman merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan kemampuan *B. subtilis* yang dapat mengikat unsur hara N, P, K dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman jagung. Didukung oleh pendapat Setyamidjaja (1986) bahwa fungsi N adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Bila kekurangan N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Unsur hara N juga berguna untuk pembentukan klorofil dan kloroplas pada daun yang nantinya berguna untuk proses fotosintesis.

Selain itu peningkatan dan pertambahan panjang akar pada tanaman yang diberikan formulasi disebabkan oleh penyerapan unsur nitrogen yang baik oleh akar tanaman jagung. Teori Agustina (2004), mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan tanaman diakibatkan oleh penyerapan unsur nitrogen yang lebih tinggi.

2. Panjang Koleoptil

Hasil analisis ragam panjang koleoptil tanaman jagung dengan formulasi *B. subtilis* menunjukkan berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan pertumbuhan panjang koleoptil. Dari tabel 4.2. terlihat bahwa pertambahan panjang koleoptil yang paling tinggi adalah tanaman dengan konsentrasi 2 gr/ml air (P7) yaitu mencapai 10 cm dan yang terendah adalah 0,75 gr/ml air (P2) yaitu 6 cm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemberian formulasi, maka akan semakin baik untuk pertumbuhan koleoptil tanaman jagung. Pada tanaman Kontrol memiliki panjang

koleoptil 9,21 cm (dapat dilihat pada gambar 4.2). Menurut Hadi (2000), kecambah normal adalah kecambah yang memperlihatkan potensi untuk berkembang lebih lanjut menjadi tanaman yang normal dalam kondisi yang optimum sedangkan kecambah abnormal adalah kecambah yang tidak memperlihatkan potensi untuk berkembang menjadi tanaman normal, jika ditumbuhkan pada media yang optimum.

3. Berat segar

Hasil analisis ragam berat segar tanaman jagung menunjukkan bahwa konsentrasi *B. subtilis* berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan benih jagung. Rata-rata hasil pengamatan berat segar tanaman jagung dapat dilihat pada gambar 4.3. berdasarkan gambar 4.3, terlihat bahwa pemberian formulasi *Bacillus* sp. dengan konsentrasi 0,5 gr/ml air (P1), 1 gr/ml air (P3), 1,25 gr/ml air (P4), 1,75 gr/ml air (P6), 2 gr/ml air (P7) per tanaman memiliki panjang akar yang lebih tinggi yaitu dari rata-rata 15 gr – 17 gr dibandingkan pada tanaman yang diberikan formulasi dengan konsentrasi 0,75 gr/ml air (P2) dan 1,5gr/ml air (P5) yang lebih rendah yaitu rata-rata 13 gr -14 gr. Sedangkan pada tanaman Kontrol menunjukkan berat segar yang paling rendah yaitu 11 gr. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian formulasi *B. subtilis* berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman jagung meskipun menunjukkan perubahan yang tidak signifikan Hal ini menunjukkan bahwa unsur hara pada tanaman jagung yang diberikan formulasi tercukupi. Menurut Soewito (1991), nitrogen merupakan nutrisi vital terpenting bagi tanaman. Senyawa nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat dan

enzim. Nitrogen juga dibutuhkan dalam jumlah yang besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman.

Media yang dipakai dalam penelitian ini adalah media kertas buram yang dapat menyerap air dengan baik sedangkan ukuran benih yang dipakai merupakan benih varietas Anoman yang berukuran kecil. Menurut Purbojati, (2006), bahwa optimalisasi media terutama kelembabannya, selain ditentukan oleh jenis kertas dan ketebalannya (jumlah lembar kertas/unit media), juga ditentukan oleh ukuran benih yang akan diuji. Ukuran benih merupakan faktor penting karena jumlah air yang diperlukan untuk pertumbuhan benih berukuran besar berbeda dengan benih berukuran kecil. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya perhatian terhadap media dan jenis kertas sehingga mampu menyetarakan pertumbuhan tanaman jagung secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Formulasi *Bacillus subtilis* BNt8 dengan berbagai konsentrasi perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar, panjang koleoptil dan berat segar tanaman jagung.
2. Pada konsentrasi 0,5 gr/ml air (P1) memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan panjang akar tanaman jagung. Pada konsentrasi 1,25gr/ml (P4) memberikan pengaruh terbaik pada pertumbuhan koleoptil tanaman jagung. Dan pada konsentrasi 2 gr/ml air (P7) memberikan pengaruh terbaik pada berat segar tanaman jagung.

B. Implikasi Penelitian (Saran)

Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Formulasi *B. subtilis* BNt8 dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan pupuk bagi tanaman.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang konsentrasi formulasi *B. subtilis* BNt8 agar dapat diketahui konsentrasi yang optimal dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi formulasi *B. subtilis* BNt8 pada pertumbuhan generatif sampai pada masa panen sehingga data yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya pengaruh yang paling valid.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh formulasi *B. subtilis* BNt8 terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada media yang baru contohnya pada kapas dan sekam.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh formulasi *B. subtilis* BNt8 terhadap pertumbuhan tanaman jagung dengan jenis kertas dan ukuran benih yang berbeda



KEPUSTAKAAN


- Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2012.
- Agustina L. *Dasar-dasar Nutrisi Tanaman*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Aryantha dan Pangesti. Potensi Isolat Bakteri Penghasil IAA dalam Peningkatan Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau pada Kondisi Hidroponik. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*. Vol. 9(2).P : 43-46, 2004.
- Benny, Lamuddin dan Syahrial. Uji Dosis dan Cara Aplikasi Biofungisida *Bacillus sp.* Terhadap Penyakit Jamur Akar Putih (*Rigidoporus lignosus*) Pada Tanaman Karet di Pembibitan. *Alumnus Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian USU, Medan*. ISSN No. 2337- 6597 1 20155, 2013.
- Djafaruddin. *Dasar-Dsar Pengendalian Penyakit Tanaman*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2000.
- EPA (U.S. Environmental Protection Agency). *Bacillus subtilis* GBO3 (129068).<http://www.epa.gov>, 2003.
- Ginting. Variasi kejadian dan kandungan aflatoksin pada jagung yang bersumber dari Tegal, Taiwan, dan Lampung pada pabrik makanan ternak di Bogor. *Penyakit Hewan* 18(31)79-81. 1986.
- Hadi, A. *Sistem Manajemen Mutu Laboratorimu*. PT Gramedia. Jakarta, 2000.
- Hanudin, W. Nuryani, E. Silvia, I Djatnika, dan B. Marwoto. Formulasi Biopestisida Berbahan Aktif *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*, dan *Corynebacterium sp.* Non patogenik untuk Mengendalikan Penyakit Karat pada Krisan. *Balai Penelitian Tanaman Hias, Jl. Raya Ciherang-Pacet, Cianjur 43253*. 2010.
- Heddy S. *Hormon Tumbuhan*. Jakarta. Rajawali, 1989.
- Herman, M. Tanaman hasil rekayasa genetic dan pengaturan keamanannya di Indonesia. *Jurnal Agrobio3* (1):8-26, 1999.
- Kumar. A., A. Prakash and B. N. Johri. *Bacillus* as PGPR in crop ecosystem, p 37–59 In Maheshwari DK, editor. (ed), *bacteria in agrobiolgy: crop ecosystems*, 1st ed. Springer, Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
- M. Nini. Efek Fitohormon PGPR Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea Mays*). *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah* Vol. 3 No. 2. 2012.

- Nuning A., dkk. *Morfologi Tanaman dan Fase Pertumbuhan Jagung*. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros, 2004.
- Kosim M., Surya R.P. Pengaruh Suhu Pada Protease Dari *Bacillus Subtilis*. Jurusan Kimia FMIPA ITS, Surabaya, 2009.
- Purbojati, L., Suwarno. Studi alternative substrat kertas untuk penguji anvabilitas benih dengan metode uji diatas kertas. *Bul. Agron.* 34(1):55-61, 2006.
- Purwati. Pemanfaatan Sumber Karbohidrat yang Berbeda (umbi suweg, umbitalas, dan umbi kimpul) Sebagai Substitusi Media NA Untuk Pertumbuhan Bakteri. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Purwono, Rudi. *Bertanaman jagung unggul*. Penebar Swadaya. Jakarta, 2005.
- Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. *Bakteriologi Umum*, Jakarta. 1989.
- Rinaldi, dkk. Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*) Yang Ditumpangsarikan Dengan Kedelai (*Glycine Max L.*). Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi Universitas Taman siswa, Padang. 2009.
- Sarief E. S. *Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian*. Pustaka Buana. Bandung, 1985.
- Sajimin, I P. Kompiang, Supriyati, dan Lugiyo. Pengaruh pemberian berbagai cara dan dosis *Bacillus sp.* terhadap produktivitas dan kualitas rumput *Panicum maximum*. hlm 359-365. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. 2000.
- Salim B., dan Said. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*. Victory Agencie, Kuala Lumpur. 1994.
- Setyamidjaja, *Pupuk dan Pemupukan*. Simplex, Jakarta. 1986.
- Shihab M Q, 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesandan Keserasial Al-Qu'an/ M. Quraish Shihab*. Lentera Hati, Jakarta.
- S. Megi. Pengaruh Beberapa Dosis Kompos Jerami Padi dan Pupuk Nitrogen Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis (*Zea mays saccharata Sturt.*). *Jurnal Agritek*, 2011.


- Siregar, G.S. Analisis Respon Penawaran Komoditas Jagung dalam Rangka Mencapai Swasembada Jagung di Indonesia. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 130 Hal. 2009
- Soewito, M. *Memfaatkan Lahan Bercocok tanam Wortel*. CV. TitikTerang. Jakarta, 1991.
- S.H. Sutjahjo. Seleksi *in vitro* untuk Ketegangan terhadap Aluminium pada Empat Genotip Jagung, Jurnal Akta Agrosia, Vol.9No. 1-2 61-66, 2006.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013.
- Yazdani, M.A. Bahmanyar, H. Pirdashtidan M.A. Esmaili. Effect of Phosphate Solubilization Microorganisms (PSM) and Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Yield and Yield Components of Corn (*Zea mays L.*) .Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol.3(7). P : 90-92, 2009.
- Zainudin, A.L. Abadi, L.Q. Aini. Pengaruh Pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria (*Bacillus Subtilis* Dan *Pseudomonas Fluorescens*) Terhadap Penyakit Bulai Pada tanaman Jagung (*Zea Mays L.*). Universitas Brawijaya, Malang, 2004.

Lampiran 1: Perlakuan dan Uji Konsentrasi


PERLAKUAN DAN UJI KONSENTRASI




PERLAKUAN DAN ULANGAN
PADA PENANAMAN JAGUNG DI KERTAS BURAM




PENGECERAN DAN PENANAMAN BAKTERI






Denah Percobaan (Lay Out)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3: Cara Kerja

CARA KERJA



Lampiran 4: Analisis Data

Adapun data hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

4. Tabel Panjang Akar

Tabel lampiran 1.a. Panjang akar tanaman jagung (*Zea mays* L.)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata
	1	2	3	
P1	21.83	21.65	19.01	20.83
P2	20.16	21.27	19.01	20.14
P3	18.36	16.69	22.72	19.25
P4	18.72	20.32	21.85	20.29
P5	20.54	16.3	22.17	19.67
P6	19.25	18.4	18.21	18.62
P7	20.74	20.62	20.62	20.66
K	20.79	19.19	18.02	19.33

Tabel lampiran 1.b. Hasil sidik ragam panjang akar

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	7	12.205	1.744	0.47 ^{tn}	0.83
Ulangan	2	3.679	1.840		
Galat	14	51.000	3.643		
Total	23	66.884			

Keterangan: tn= Tidak Nyata

5. Tabel Panjang Koleoptil

Tabel lampiran 2.a. Rata-rata panjang koleoptil tanaman jagung (*Zea mays* L.)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata
	1	2	3	
P1	9.55	4.58	9.03	7.72
P2	8.27	3.65	6.16	6.02
P3	6.2	6.37	8	6.85
P4	9.73	7.73	9.84	9.1
P5	9.35	4.95	8.19	7.49
P6	5.73	8.62	9.28	7.87
P7	10.78	10.19	9.71	10.22
K	7.37	8.9	11.37	9.21

Tabel lampiran 2.b. Sidik ragam panjang koleoptil

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	7	39.465	5.638	2.05 ^{tn}	0.11
Ulangan	2	18.340	9.170		
Galat	14	38.333	2.738		
Total	23	96.138			

Keterangan: tn= Tidak Nyata

6. Tabel Berat Segar

Tabel lampiran 3.a. Berat segar tanaman jagung (*Zea mays L.*)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata
	1	2	3	
P1	15.6	19.5	12	15.7
P2	12.7	10.3	15.4	12.8
P3	17.9	11.6	17.3	15.6
P4	22.3	13.6	14.4	16.76
P5	18.5	12.5	10.8	13.93
P6	15.8	14.5	19.5	16.6
P7	14.8	14.5	18.5	15.93
K	11.2	8.8	13.2	11.06

Tabel Lampiran 3.b. Sidik ragam berat segar

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	7	86.392	12.342	1.22 ^{tn}	0.35
Ulangan	2	35.231	17.615		
Galat	14	140.936	10.067		
Total	23	262.558			

Keterangan: tn= Tidak Nyata

7. Pembacaan Koloni

Tabel 2. Hasil Pembacaan koloni *Bacillus subtilis*

Perlakuan	Pengenceran	
	10^{-2}	10^{-3}
P1	29,66	7,33
P2	8,33	1
P3	1,66	1,33
P4	3,66	4
P5	9,66	5,66
P6	10,33	7,33
P7	7,33	4,67
K	0	0

Rumus CFU Count:

1. P1 10^{-2}

Jumlah Koloni = 29,66
Pengenceran = 10^{-2}

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{29,66}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{29,66}{1 \times 10^{-3}} = \frac{29,66}{10^{-3}} = 29,66 \times 10^3$$

2. P1 10^{-3}

Jumlah Koloni = 7,33
Pengenceran = 10^{-3}

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{7,33}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{7,33}{1 \times 10^{-4}} = \frac{7,33}{10^{-4}} = 7,33 \times 10^4$$

3. P2 10^{-2}

Jumlah Koloni = 8,33
Pengenceran = 10^{-2}

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{8,33}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{8,33}{1 \times 10^{-3}} = \frac{8,33}{10^{-3}} = 8,33 \times 10^3$$

4. P2 10^{-3}
 Jumlah Koloni = 1
 Pengenceran = 10^{-3}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{1}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{1}{1 \times 10^{-4}} = \frac{1}{10^{-4}} = 1 \times 10^4$$
5. P3 10^{-2}
 Jumlah Koloni = 1,66
 Pengenceran = 10^{-2}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{1,66}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{1,66}{1 \times 10^{-3}} = \frac{1,66}{10^{-3}} = 1,66 \times 10^3$$
6. P3 10^{-3}
 Jumlah Koloni = 1,33
 Pengenceran = 10^{-3}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{1,33}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{1,33}{1 \times 10^{-4}} = \frac{1,33}{10^{-4}} = 1,33 \times 10^4$$
7. P4 10^{-2}
 Jumlah Koloni = 3,66
 Pengenceran = 10^{-2}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{3,66}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{3,66}{1 \times 10^{-3}} = \frac{3,66}{10^{-3}} = 3,66 \times 10^3$$
8. P4 10^{-3}
 Jumlah Koloni = 4
 Pengenceran = 10^{-3}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{4}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{4}{1 \times 10^{-4}} = \frac{4}{10^{-4}} = 4 \times 10^4$$
9. P5 10^{-2}
 Jumlah Koloni = 9,66
 Pengenceran = 10^{-2}
- $$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{9,66}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{9,66}{1 \times 10^{-3}} = \frac{9,66}{10^{-3}} = 9,66 \times 10^3$$

10. P5 10^{-3}

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni} &= 5,66 \\ \text{Pengenceran} &= 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{5,66}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{5,66}{1 \times 10^{-4}} = \frac{5,66}{10^{-4}} = 5,66 \times 10^3$$

11. P6 10^{-2}

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni} &= 10,33 \\ \text{Pengenceran} &= 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{10,33}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{10,33}{1 \times 10^{-3}} = \frac{1033}{10^{-3}} = 10,33 \times 10^3$$

12. P6 10^{-3}

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni} &= 7,33 \\ \text{Pengenceran} &= 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{7,33}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{7,33}{1 \times 10^{-4}} = \frac{7,33}{10^{-4}} = 7,33 \times 10^4$$

13. P7 10^{-2}

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni} &= 7,33 \\ \text{Pengenceran} &= 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{7,33}{0,1 \times 10^{-2}} = \frac{7,33}{1 \times 10^{-3}} = \frac{7,33}{10^{-3}} = 7,33 \times 10^3$$

14. P7 10^{-3}

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni} &= 4,67 \\ \text{Pengenceran} &= 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{CFU Count}}{0,1 \times \text{Larutan}} = \frac{4,67}{0,1 \times 10^{-3}} = \frac{4,67}{1 \times 10^{-4}} = \frac{4,67}{10^{-4}} = 4,67 \times 10^4$$

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

A. Uji efektifitas beberapa konsentrasi *Bacillus subtilis* Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung

1. Pemilihan benih jagung (*Zea mays* L.)



2. Penimbangan formulasi *Bacillus* sp. BNT8



3. *Seed treatment* dengan formulasi *Bacillus sp.* BNt8



B. Penanaman jagung pada media kertas buram

1. Tahap penanaman





2. Pengukuran akar, kecambah, dan berat segar jagung (*Zea mays* L.) setelah 1 minggu



3. Penggerusan akar tanaman jagung (*Zea mays* L.)




4. Hasil ekstraksi akar tanaman jagung (*Zea mays* L.)



C. Pengenceran dan Penanaman Isolat

1. Pengenceran dan penyediaan media PDPA



2. Penanaman koloni






3. Koloni disimpan pada suhu ruangan selama 24 jam




D. Pembacaan Koloni



1. Hasil pembacaan koloni





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irma Fitrianti, lahir di Pakkatto, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, tanggal 27 Juni 1994.

Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Sakir Dg Tompo dan Nurhayati Dg Caya.

Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Inpres (SDI) Tattakang pada tahun 2000-2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pest. Putri Yatama pada tahun 2006-2009
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pest. Putri Yatama pada tahun 2009-2012.
4. Pada tahun 2012, penulis diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SPMB pada Program Strata 1 (S1) jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Selama masa kuliah penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar. Kemudian penulis juga PKL di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Lab. HUM-RC. Terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “Uji Konsentrasi Formulasi *Bacillus subtilis* Bnt8 Terhadap Pertumbuhan Benih Jagung (*Zea mays* L.) Secara *In vitro*”.