

**PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK SABUT KELAPA
(*Cocopeat*) PADA MEDIA ARANG SEKAM TERHADAP
PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI HIJAU
(*Brassica juncea* L.) SECARA HIDROPONIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RISNAWATI B
NIM. 60300112059

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnawati B
NIM : 60300112059
Tempat/Tgl. Lahir : Data/09 Januari 1993
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Dusun Data Desa Manjapai Kec. Bontonompo Kab. Gowa
Judul : Pengaruh Penambahan Serbuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) Pada Media Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) Secara Hidroponik.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 November 2016
Penyusun,

R ISNAWATI B
NIM: 60300112059

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Penambahan Serbuk Sabuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) pada Media Arang Sekam terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) Secara Hidroponik”, yang disusun oleh Risnawati B, NIM: 60300112059, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, bertepatan dengan 29 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 November 2016 M

29 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy III	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, atas rahmat dan hidayahnya. Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penambahan Serbuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) Pada Media Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) Secara Hidroponik”**.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki skripsi ini.

Skripsi ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Sebuah persembahan dan terima kasih yang khusus penulis persembahkan kepada Ayahanda **Burhanuddin** dan Ibunda **Rabasiah** yang telah mencurahkan

seluruh kasih sayangnya, berkorban, yang telah bekerja keras sepenuh hati membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah hingga mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Olehnya secara mendalam saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas lainnya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibunda Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Si selaku penasehat akademik dari semester 1-7 selanjutnya Hasyimuddin, S.Si., M.Si semester 8-9

5. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si sebagai penguji I dan Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc. selaku penguji II, Nurkhalis A. Gaffar S.Ag., M.Hum selaku penguji III terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku pembimbing I dan Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P., selaku pembimbing II terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
8. Bapak dan ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi..
9. Kepada saudaraku Ruslan dan yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
10. Saudara seperjuanganku Rini Andrianti, Ramlawati , serta teman-teman kelas B yang senantiasa memberikan semangat, saran dan bantuannya, serta setia menemani penulis dalam suka maupun duka, menghadirkan cerita warna warni dalam bingkai persaudaraan.

11. Teman-teman “**RANVIER**” (Biologi Angkatan 2012) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta menghadirkan cerita kurang lebih 4 tahun.
12. Adik-adik Mahasiswa jurusan Biologi 2013, 2014, 2015 dan 2016
13. Terima kasih kepada teman-teman KKN Angkatan ke-51 Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa yang memberikan banyak pelajaran dan kenangan selama KKN.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pada pembaca, sebagai bahan perbaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang dilimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Amin

Makassar, November 2016

Penulis


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ILUSTRASI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BABI PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-34
A. Ayat Al-Qur'an yang Relevan.....	10
B. Tanaman Sawi Hijau	12
C. Hidroponik	17
D. Media Tanam Hidroponik	28
E. Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman.....	31
F. Kerangka Fikir	33
G. Hipotesis	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35

	B. Pendekatan Penelitian	35
	C. Variabel Penelitian	35
	D. Defenisi Operasional Variabel	36
	E. Metode Pengumpulan Data	36
	F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	37
	G. Prosedur Kerja	37
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	40-56
	A. Hasil Penelitian	40
	B. Pembahasan	45
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Implikasi Penelitian (Saran)	57
	KEPUSTAKAAN	58-60
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61-76
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kandungan gizi setiap 100 g sawi	17
---	----



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Akar sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.)	13
Gambar 2.2. Batang sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.)	14
Gambar 2.3. Daun sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.)	14
Gambar 2.5. Arang sekam	30
Gambar 2.6. Serbuk sabuk kelapa (<i>Cocopeat</i>)	31
Gambar 4.1. Rata-rata pertambahan jumlah daun (helai) tanaman sawi hijau(<i>Brassica juncea</i> L.) ke III (4 MST- 3 MST)	41
Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan panjang daun (cm) tanaman sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.) ke III (4 MST- 3 MST)	42
Gambar 4.3. Rata-rata pertambahan lebar daun (cm) tanaman sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.) ke III (4 MST- 3 MST)	43
Gambar. 4.4. Rata-rata panjang akar (cm) tanaman sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.) umur 4 MST	44
Gambar. 4.5. Rata-rata bobot basah (gr) tanaman sawi hijau (<i>Brassica juncea</i> L.) umur 4 MST	45

ABSTRAK

Nama : Risnawati B
NIM : 60300112059
Judul Skripsi : “Pengaruh Penambahan Serbuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) Pada Media Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) Secara Hidroponik”

Sawi hijau merupakan jenis sayur yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Manfaat sawi hijau sebagai bahan makanan dan juga sebagai obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa (*Cocopeat*) terhadap media arang sekam terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) secara hidroponik. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan M0= Arang sekam (kontrol), M1= *Cocopeat* : Arang sekam (1:2), M2= *Cocopeat* : Arang sekam (2:1), M3= *Cocopeat* : Arang sekam (1:1). Hasil penelitian menunjukkan penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) baik pada jumlah daun, panjang daun, lebar daun, panjang akar dan bobot basah. Perlakuan M0= arang sekam (kontrol) dan M1= *cocopeat* : arang sekam (1:2) memberikan pertambahan jumlah daun (helai) tertinggi sedangkan pada perlakuan M3= *cocopeat* : arang sekam (1:1) memberikan pertambahan panjang daun (cm), pertambahan lebar daun (cm), panjang akar (cm) dan bobot basah (gr) tertinggi.

Kata Kunci: *Cocopeat*, Arang sekam, Hidroponik dan Sawi hijau (*Brassica juncea* L.).

ABSTRACT

Name : Risnawati B
NIM : 60300112059
Thesis Title : "Effect of Addition Coco Powder (Cocopeat) In Media Husk Charcoal Plant Growth Against Green Mustard (Brassica juncea L.) By Hydroponics "

Green cabbage is a type of vegetable that is favored by the people of Indonesia. Benefits of green cabbage as well as foodstuffs and medicines. This study aimed to determine the effect of coconut coir dust (*Cocopeat*) against rice husk to the growth of green mustard plant (*Brassica juncea L.*) hydroponically. This study uses a completely randomized design (CRD) with treatment M0 = Charcoal husk (control), M1 = *Cocopeat*: Charcoal husk (1: 2), M2 = *Cocopeat*: charcoal husk (2: 1), M3 = *Cocopeat*: charcoal husk (1: 1). The results showed Addition Coco powder (*cocopeat*) on rice husk no real effect on the growth of green mustard plant (*Brassica juncea L.*) in both the number of leaves, leaf length, leaf width, root length and wet weight, but the treatment M0 = charcoal husk (control) and M1 = *cocopeat*: husk (1: 2) to give the growing number of leaves (leaf) is the highest, while the treatment M3 = *cocopeat*: husk (1: 1) gives the length of leaves (cm), increase leaf width (cm), root length (cm) and wet weight (g) the highest.

Keywords: *Cocopeat*, Rice husk, Hidoponik and Mustard greens (*Brassica juncea L.*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan tanaman di seluruh dunia pasti memiliki berbagai macam manfaat misalnya pada tanaman sawi hijau yaitu dijadikan sebagai bahan makanan. Oleh karena itu Allah swt menciptakan sesuatu di bumi tidak ada yang sia-sia, pasti mempunyai manfaat bagi manusia.

Allah berfirman dalam QS Thaahaa/20:53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

”Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama RI, 2002).

Menurut Shihab (2008), ayat di atas menyatakan: Dia yakni Allah swt yang telah menjadikan bagi kamu hai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit

air yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka kami tumbuhkan dengannya yakni dengan perantara hujan itu berjenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk rasa, warna dan manfaatnya.

Dari ayat di atas Allah swt memperlihatkan kebesaran-Nya yakni Allah swt menciptakan bumi yang di dalamnya ada gunung-gunung sebagai jalan yang mudah ditempuh. Kemudian Allah menurunkan air hujan untuk menciptakan sungai-sungai dan danau kemudian Allah swt menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan, dimana diantara jenis-jenis tumbuhan yaitu sawi yang memiliki bentuk rasa warna dan manfaatnya salah satunya yakni sawi hijau yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Itulah salah satu bukti nyata bahwa Allah swt tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, pasti semua ada manfaatnya bagi manusia.

Sayuran merupakan komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi (Adiyoga, 1999).

Sawi hijau merupakan jenis sayur yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Konsumennya mulai dari golongan masyarakat kelas bawah hingga golongan masyarakat kelas atas. Sawi mengandung berbagai zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh, antara lain vitamin K, A, C, E, folat, mangan, dan serat pangan (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1999).

Kandungan gizi yang cukup tinggi, memungkinkan jenis sayuran ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Pembudidayaan berbagai tanaman sayuran, baik yang lokal maupun yang dari luar negeri memungkinkan dilakukan pada alam Indonesia. Hal tersebut ditinjau dari aspek klimatologis menyebabkan Indonesia sangat potensial dalam usaha bisnis sayur-sayuran. Tanaman sawi dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi (5-1.200 m) di atas permukaan laut (dpl). Dengan kata lain tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berudara panas maupun berudara dingin. Namun demikian tanaman sawi akan lebih baik pertumbuhannya jika dibudidayakan pada ketinggian 100 – 500 m dpl (Supriati, 2011).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2013), produksi sawi di Indonesia dari tahun 2008-2013 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat secara berturut-turut: 565.636 ton (2008), 562.838 ton (2009), 583.770 ton (2010), 580.969 ton (2011), 594.934 ton (2012) dan 635.728 ton (2013).

Kementerian Pertanian (KemTan) mengatakan, tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah, dan masih jauh di bawah rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sehingga diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan konsumsi produk hortikultura lokal. Dari data KemTan, tingkat konsumsi sayuran penduduk Indonesia tahun 2005 sebesar 35,30 kg/kapita/tahun, kemudian tahun 2006 sebesar 34,06 kg/kapita/tahun, dan tahun 2007 meningkat sebesar 40,90 kg/kapita/tahun (Herfianti, 2015).

Rendahnya tingkat konsumsi tersebut berkaitan dengan minimnya tingkat produksi pangan yang dialami oleh petani Indonesia. Salah satu solusi untuk meningkatkan produksi pangan seperti sayuran adalah bertanam secara hidroponik baik tanpa atau dengan *green house*. Dalam dua tahun terakhir pekebun hidroponik terbuka alias tanpa *green house* bermunculan. Keuntungan dari teknologi tersebut antara lain adalah dapat menghemat biaya investasi sekitar 38%, mampu menghasilkan sayuran yang dipersyaratkan pasar, pemberian nutrisi yang sesuai membuat tanaman sehat sehingga dapat bertahan dari serangan hama dan penyakit (Rahimah, 2012).

Hidroponik, dalam bahasa Inggris disebut *Hydroponic*, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Hydro* yang berarti air dan *Ponos* yang artinya daya atau kerja. Hidroponik juga dikenal sebagai "*Soilless culture*" atau budidaya tanaman tanpa tanah. Hidroponik memiliki pengertian secara bebas sebagai teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman (Setyoadji, 2015).

Hidroponik sebagai cara bertanam tanpa menggunakan media tanah dikelompokkan menjadi beberapa jenis. *Sistem wick* di dunia hidroponik biasa dikatakan sebagai sistem yang paling dasar. Oleh karena itu teknik ini sangat membantu pemula yang ingin mencoba bertanam hidroponik. Karena caranya yang sangat sederhana (Sani, 2015).

Dalam budidaya hidroponik hal yang perlu diperhatikan adalah larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber pasokan nutrisi bagi tanaman untuk mendapatkan makanan dalam budidaya hidroponik. Selain larutan nutrisi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu media tanam. Fungsi dari media tanam pada budidaya hidroponik adalah sebagai tempat tumbuh dan tempat penyimpanan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).

Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Media yang baik membuat unsur hara tetap tersedia, kelembaban terjamin dan drainase baik. Media yang digunakan harus dapat menyediakan air, zat hara dan oksigen serta tidak mengandung zat yang beracun bagi tanaman. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai media tanam dalam hidroponik antara lain *Cocopeat*, arang sekam, dan sebagainya. Bahan yang digunakan sebagai media tumbuh akan mempengaruhi sifat lingkungan media (Douglass, 1976).

Media tanam arang sekam merupakan media tanam yang ideal dalam hidroponik, hal ini dikarenakan sifat dari arang sekam yang porous dan mampu menyimpan air dengan baik. Disamping itu arang sekam merupakan media organik yang banyak mengandung kalium dan karbon yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Anjaliza, dkk., 2013).

Cocopeat adalah media tanam yang bersifat organik. Biasanya *cocopeat* terbuat dari serbuk sabut kelapa. Terkadang *cocopeat* ini juga dicampur dengan sekam bakar. Selain ramah lingkungan, *cocopeat* juga memiliki daya serap air yang tinggi (Sani, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) secara hidroponik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.) secara hidroponik?
2. Pada takaran berapa dari penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.) secara hidroponik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.) diperoleh dengan cara membibitkan benih tanaman sawi hijau kemudian tanaman dibudidayakan secara hidroponik sistem *wick* dengan memberikan perlakuan penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya masih perlu dikembangkan, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) dan arang sekam pada tanaman sawi hijau dengan menggunakan sistem hidroponik sistem sumbu (*wick*).

Irawan (2015), telah menguji Pemanfaatan *Cocopeat* dan Arang Sekam Padi Sebagai Media Tanam Bibit Cempaka Wasian (*Elmerrilia ovalis*). Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan bahan organik arang sekam padi sebagai komposit media *top soil* mampu memberikan respons yang lebih baik bagi pertumbuhan bibit cempaka wasian dibandingkan dengan penggunaan bahan organik *cocopeat*.

Gustia (2013), Pengaruh Penambahan Sekam Bakar Pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (*Brassica juncea* L.), menyimpulkan bahwa penambahan sekam bakar ke dalam media tanam tanah (2:2)

menunjukkan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, bobot basah, dan bobot konsumsi tertinggi.

Hasriani (2012), Kajian Serbuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) Sebagai Media Tanam (*Study of Cocopeat as Planting Media*). Menyimpulkan bahwa media serbuk sabut kelapa memiliki daya simpan air yang tinggi dibandingkan media tanah dan media campuran serbuk sabut kelapa + tanah. Serbuk sabut kelapa memiliki kadar air dan daya simpan air masing-masing 119 % dan 695,4 %. Tanaman sengon dan mahoni dengan perlakuan serbuk sabut kelapa lebih lama mengalami kekeringan (*Dry spell*). Sengon mengalami kekeringan pada hari ke-25 dan mahoni pada hari ke-55. Bobot isi kering media tanam serbuk sabut kelapa lebih rendah dibandingkan dua media lainnya, sehingga akan mempermudah pada saat transportasi dan pendistribusian ke lapangan. Semakin rendah bobot isi media tanam, maka semakin ringan dan praktis untuk dipindahkan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.) secara hidroponik.

2. Untuk mengetahui takaran penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.) secara hidroponik.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Fisiologi Tumbuhan dan Nutrisi Tumbuhan.
2. Bagi petani sawi hijau diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal penggunaan teknik budidaya hidroponik dengan menggunakan media tanam serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) dan arang sekam untuk peningkatan produksi tanaman.
3. Bagi masyarakat perkotaan diharapkan mampu memberikan keuntungan dari segi ekologis dan solusi dari sulitnya memperoleh lahan untuk menanam, sehingga masyarakat pun dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan gizi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat Yang Relevan

Allah swt berfirman dalam QS Al-An'aam/6 : 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُمْتَرًا كَبًّا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (Departemen Agama RI, 2002).

Bahreisy (2003), terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 3, bahwa ayat di atas menjelaskan tuntunan Allah swt untuk mencapai kesadaran tauhid dan iman.

Allah swt menyatakan: Dialah (Allah) yang menurunkan hujan, dan Dia pula yang

mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dia pula yang mewarnainya hijau dan lain-lainnya, lalu Dia pula yang menyusun butir-butir buahnya yang tersusun rapi. Juga Dia pula yang mengeluarkan mayang pohon kurma sehingga tersusun buahnya yang mudah dipetik, Dia pula yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dalam kebun anggur, zaitun dan delima dan lain-lainnya baik yang serupa bentuk, warna atau cita rasanya atau yang jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, warnanya, bentuknya atau rasanya. Kemudian Allah menyuruh manusia memperhatikan sungguh-sungguh buah sejak ia mulai berbuah hingga saat masak dan ketamnya untuk dirasakan nikmat, rahmat dan hikmat Tuhan yang menjadikan semua itu untuk kepentingan kami manusia.

Di dalam ayat: Allah swt menyebut semua itu ditumbuhkan di atas tanah dan disiram dengan satu macam air, tetapi kalau dengan kebesaran kekuasaan Allah swt, Allah swt menumbuhkan bermacam-macam warna, bentuk dan rasa, dan nyata bahwa semua ciptaan Allah swt itu tidak dapat ditiru oleh makhluk siapapun, manusia, jin, atau malaikat-Nya. Karena itu Allah swt menutup ayat ini dengan kalimat: Sesungguhnya dalam semua kejadian itu sebagai bukti yang nyata atas kebesaran kekuasaan Allah swt bagi kaum yang beriman dan percaya terhadap kebesaran kekuasaan serta bertuhan kepada Allah azza wajalla.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menurunkan air hujan dari langit kemudian Allah swt menumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan diantaranya sawi kemudian Allah swt mengeluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau salah satunya yaitu tanaman sawi hijau kemudian Allah swt mengeluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak diantara tanaman sawi hijau menghasilkan biji yang nantinya yang akan ditanam kembali. Dan begitu juga dengan tumbuhan lainnya yang disebutkan didalam ayat diatas yaitu pohon korma, anggur, zaitun dan delima kemudian Allah menyuruh manusia memperhatikannya saat berbuah sampai buahnya matang. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi orang-orang yang beriman.

B. *Tanaman Sawi Hijau*

1. *Morfologi Tanaman Sawi Hijau*

Tanaman sawi hijau berakar serabut yang tumbuh dan berkembang secara menyebar ke semua arah di sekitar permukaan media tanam, perakarannya sangat dangkal pada kedalaman sekitar 5 cm. Tanaman sawi hijau tidak memiliki akar tunggang. Perakaran tanaman sawi hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada media tanam yang gembur, subur, dan mudah menyerap air (Cahyono, 2003)



Gambar 2.1. Akar sawi hijau (*Brassica juncea* L.) (Dokumentasi Pribadi, 2016)

Batang tanaman sawi pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun (Rukmana, 1994).



Gambar 2.2. Batang sawi hijau (*Brassica juncea* L.) (Dokumentasi Pribadi, 2016)

Sawi berdaun lonjong, halus, tidak berbulu dan tidak berkrop. Pada umumnya pola pertumbuhan daunnya berserak (roset) hingga sukar membentuk krop (Sunarjono, 2004).



Gambar 2.3. Daun sawi hijau (*Brassica juncea* L.) (Dokumentasi Pribadi, (2016).

Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Stuktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga (*inflorescentia*) yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang banyak. Tiap kuntum bunga sawi terdiri atas empat helai daun kelopak, empat helai daun mahkota bunga berwarna kuning 15 cerah, empat helai benang sari dan satu buah putik yang berongga dua (Rukmana, 2002).

2. Taksonomi Tanaman Sawi Hijau

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013), sistematika tanaman sawi hijau adalah sebagai berikut :

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Dicotyledoneae
Ordo	: Rhoeadales (Brassicales)
Familia	: Cruciferae (Brassicaceae)

Genus : Brassica

Species : *Brassica juncea* L.

3. Syarat Tumbuh Tanaman Sawi Hijau

Syarat tumbuh hujan yang cukup sepanjang tahun dapat mendukung kelangsungan hidup tanaman karena ketersediaan air tanah yang mencukupi. Tanaman sawi hijau tergolong tanaman yang tahan terhadap curah hujan, sehingga penanaman pada musim hujan masih bisa memberikan hasil yang cukup baik. Curah hujan yang sesuai untuk pembudidayaan tanaman sawi hijau adalah 1000-1500 mm/tahun. Akan tetapi tanaman sawi tidak tahan terhadap air yang menggenang (Cahyono, 2003).

Tanaman sawi pada umumnya banyak ditanam di dataran rendah. Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas (tinggi) juga mudah berbunga dan menghasilkan biji secara alami pada kondisi iklim tropis Indonesia (Haryanto, dkk., 2002).

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi hijau yang optimal berkisar antara 80%-90%. Kelembaban udara yang tinggi lebih dari 90 persen berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman. Kelembaban yang tinggi tidak sesuai dengan yang dikehendaki tanaman, menyebabkan mulut daun (stomata) tertutup sehingga penyerapan gas karbondioksida (CO_2) terganggu. Dengan demikian kadar gas CO_2 tidak dapat masuk ke dalam daun, sehingga kadar gas CO_2 yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis tidak memadai.

Akhirnya proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik sehingga semua proses pertumbuhan pada tanaman menurun (Cahyono, 2003).

4. Kandungan Gizi dan Manfaat Tanaman Sawi Hijau

Sawi hijau adalah sekelompok tumbuhan dari marga *Brassica* yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran), baik segar maupun diolah. Sawi hijau mencakup beberapa spesies *Brassica* yang kadang-kadang mirip satu sama lain. Manfaat sawi hijau sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Penyembuh penyakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan (Sunardjono, 2011).

Sawi hijau sebagai bahan makanan sayuran mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap sehingga apabila dikonsumsi sangat baik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Kandungan gizi setiap 100 g bahan yang dapat dimakan pada sawi hijau adalah :

Tabel 2.1. Kandungan gizi setiap 100 g sawi (Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 1981).

No	Komposisi	Jumlah
1.	Kalori	22,00 k
2.	Protein	2,30 g
3.	Lemak	0,30 g
4.	Karbohidrat	4,00 g
5.	Serat	1,20 g
6.	Kalsium (Ca)	220,50 mg
7.	Fosfor (P)	38,40 mg
8.	Besi (Fe)	2,90 mg
9.	Vitamin A	969,00 SI

10.	Vitamin B1	0,09 mg
11.	Vitamin B2	0,10 mg
12.	Vitamin B3	0,70 mg
13.	Vitamin C	102,00 mg

Sawi hijau, sering kita temui dalam menu makan sehari-hari. Biasanya sawi diolah menjadi tumisan sayur atau pelengkap makan bakso. Sayuran sehat ini tentu punya banyak manfaat. Sawi hijau mengandung banyak antioksidan dan memiliki banyak vitamin. Bagi Anda yang tak suka makan sayur, tak perlu khawatir kehilangan semua manfaat sehat ini. Karena ternyata, sawi tak hanya bisa dimakan sebagai sayur, namun juga diramu menjadi minuman sehat yang menyegarkan (Zatnika, 2010).

C. Hidroponik

Menurut sebuah literatur, istilah hidroponik (*hydroponic*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930an oleh Dr. W. F Gericke dari California. Sedangkan dilihat dari asal katanya, *Hydropinic* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Hydro* yang berarti air dan *Phonos* yang berarti kerja. Jadi, bisa kita pahami dengan sederhana bahwa kata hidroponik berarti bekerja dengan air atau bercocok tanam dengan memanfaatkan kerja air (Sani, 2015).

Sebagai sebuah sistem yang kemudian digunakan oleh banyak orang, maka sistem hidroponik pun mengalami perkembangan. Baik perkembangan dari segi metode maupun bahan yang digunakan. Bahkan, seiring berjalannya waktu pengertian hidroponik turut serta berubah menjadi luas. Jika semula hanya diartikan

sebagai sistem cocok tanam dengan mengandalkan air, sekarang lebih familier dengan istilah *soilless culture* atau bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah (Sani, 2015).

Dalam hidroponik dikenal istilah ”*static solution culture*” sebagai sarana dan cara untuk menumbuhkan tanaman. *Static solution culture* merupakan cara tanam dengan media air yang tidak bergerak. Sistem ini mengutamakan pergerakan air di kedalaman. *Static solution culture* di negara kita lebih dikenal dengan istilah “Sistem sumbu” atau dalam bahasa Inggris “*Wick sistem*”. Untuk memudahkan, dalam pembahasan selanjutnya kita akan istilah “Sistem sumbu”. Sistem sumbu merupakan jenis paling sederhana dari semua jenis hidroponik. Pada *static solution culture*, tanaman diletakkan pada wadah berisi larutan nutrient, seperti botol air mineral, gelas, ember, toples, atau bak air (Setyoadji, 2015).

Menurut Sani (2015), hidroponik sebagai cara bertanam tanpa menggunakan media tanah dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Hidroponik sistem *wick*

Sistem *wick* di dunia hidroponik biasa dikatakan sebagai sistem yang paling dasar. Oleh karena itu teknik ini sangat membantu pemula yang ingin mencoba bertanam hidroponik. Karena caranya yang sederhana itulah, siapapun bisa melakukannya dengan mudah. Nama lain dari sistem *wick* adalah sistem sumbu karena dari teknik kerjanya menggunakan sumbu sebagai reservoir.



Gambar 2.4. Sistem sumbu (*wick*) (Anonim, 2015)

2. NFT (*Nutrient film technique*)

Hidroponik sistem NFT adalah salah satu sistem hidroponik yang paling terkenal dan banyak digunakan oleh petani ataupun pembudidayaan tanaman. Hidroponik sistem NFT merupakan salah satu sistem hidroponik dengan mempergunakan air sebagai medianya. Air yang sudah mengandung nutrisi itu nantinya harus merendam akar tanaman sedalam kurang lebih 3 mm. supaya air mengalir ke pipa-pipa, kita membutuhkan bantuan pompa listrik yang nonstop 24 jam sesuai waktu yang ditentukan dengan teknik inilah, reaksi tanaman terhadap perubahan formula pupuk dapat segera terlihat.

3. FHS (*Floating hydroponic system*) atau rakit apung

Sistem rakit apung (dalam beberapa sumber, juga mirip dengan metode *Statis* dan *Deep water culture*). Dalam dunia hidroponik, sama terkenal dengan sistem NFT. Cara penanamannya pun lebih mudah dan cocok dipraktikkan di daerah yang belum dialiri listrik. Hidroponik sistem rakit apung merupakan cara menanam tanaman yang diletakkan pada lubang *sterofoam* yang diapungkan di atas permukaan air yang telah dicampur dengan pupuk dan larutan nutrisi. Tidak perlu ada sirkulasi sehingga tidak membutuhkan pompa listrik.

4. Hidroponik substrat

Sistem hidroponik substrat merupakan metode budidaya tanaman dimana akar tanaman tumbuh pada media selain tanah. Sistem substrat ini merupakan cara bercocok tanam dengan memakai media yang dialiri larutan nutrisi sehingga tanaman memperoleh air, nutrisi, dan oksigen secara cukup.

5. *EBB and Flow* (Sistem pasang surut)

EBB and Flow merupakan salah satu sistem hidroponik yang dalam pemberian nutrisinya berjalan secara pasang surut. Untuk menggunakan sistem ini dibutuhkan *timer* pemberi nutrisi dalam rangkaiannya.

6. Sistem Aeroponik

Dari asal katanya, aeroponik terdiri dari dua kata yaitu *Aero* yang berarti udara dan *Phonic* yang berarti cara budidaya. Jadi kesimpulannya, sistem ini merupakan cara bercocok tanam di udara, di mana tanaman ditempatkan pada media

inert lalu akar tanamannya dibiarkan menggantung di udara tanpa media. Sedangkan kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan cara *spraying* ke akarnya hingga terbentuk kabut. Penyemprotan nutrisi dilakukan dengan peralatan *springkle* selama 24 jam nonstop atau berseling dengan rentang waktu 10 menit.

7. Sistem irigasi tetes

Bercocok tanam secara hidroponik sistem irigasi tetes terbilang sangat hemat air dan pupuk. Metode ini berkerja dengan cara membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar. Tekniknya sangat sederhana tapi efektif sebagai solusi pertanian di musim kering.

8. Sistem Bioponik

Sistem bioponik sering juga disebut sebagai hidroponik organik. Konsep dari bioponik ini adalah bercocok tanam dengan air tanpa tanah dan substrat, akan tetapi tanaman tidak kehilangan kandungan yang ada dalam tanah. Artinya, air tersebut tidak hanya mengandung mineral makanan tetapi juga kehidupan mikroorganisme.

9. Sistem *Run to Waste*

Sistem ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Intinya, larutan nutrisi yang ditampung dalam bak tersendiri dapat mengalir menuju akar tanaman, dan kemudian mengalir lagi sebagai limbah menuju bak penampungan (Sani, 2015).

Menurut Sani (2015), hidroponik adalah solusi bagi banyak kekurangan dari teknik pertanian konvensional. Selain untuk berkebun pribadi, keunggulan sistem hidroponik ternyata juga sangat bermanfaat untuk pertanian komersial. Adapun nilai lebih dari sistem hidroponik:

1. Hemat lahan/ruang

Dengan menggunakan sistem hidroponik, kita masih bisa menyalurkan hobby berkebun meskipun hanya memiliki lahan yang minim. Misalnya saja, kita tinggal di perkotaan yang memiliki lahan yang sempit bukanlah masalah besar jika menggunakan sistem hidroponik. Pasalnya, dengan sistem hidroponik yang tidak menggunakan tanah, artinya kita bisa sangat berhemat ruang untuk bercocok tanam.

2. Memberikan hasil yang maksimal

Jika bercocok tanam secara konvensional masih mempertimbangkan musim, berbeda dengan sistem hidroponik. Pada musim kemarau, kita tidak terkendala tanah yang kekeringan, atau banjir di musim hujan. Dengan sistem hidroponik, semuanya stabil. Kestabilan itulah yang membuat kita dapat menanam tanaman kapanpun kita suka. Kita tidak perlu harus berhenti hanya karena tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami. Oleh karena itu, tidak heran jika hasil yang kita dapat juga maksimal.

3. Produksi tanaman yang lebih tinggi

Dibandingkan dengan pertanian konvensional, tanaman hasil hidroponik pertumbuhannya terhitung lebih cepat sekitar 50%. Hal ini dikarenakan pada tanaman

hidroponik akar-akar tanaman akan langsung mendapatkan nutrisi dari cairan yang sudah tercampur dengan bubuk nutrisi.

Selain itu, hidroponik juga diketahui memiliki akar tanaman yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan akar tanaman yang ditanam di tanah. Dengan akar tanaman yang relatif kecil otomatis energi yang diperlukan untuk pertumbuhan akar akan lebih sedikit. Hasilnya, sisa energi tersebut dapat disalurkan ke bagian lain dari tanaman, seperti batang, tangkai, buah atau daun. Jadi tidak heran jika produksi tanaman hidroponik akan jauh lebih tinggi dibandingkan hasil dari pertanian konvensional.

4. Bebas hama dan parasit

Tanaman yang ditanam secara hidroponik cenderung aman dari hama dan parasit, dibandingkan tanaman yang memakai media tanah. Itulah kenapa, sistem hidroponik dikatakan hemat pestisida.

5. Perawatan lebih praktis

Bercocok tanam secara hidroponik bisa dikatakan lebih praktis dalam hal perawatan. Kita tidak perlu khawatir akan mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak untuk bercocok tanam. Misalnya, dalam hal menyiram tanaman. Jika memakai terori non hidroponik, barangkali kita akan cemas ketika bepergian dengan meninggalkan tanaman di rumah. Tapi dengan sistem hidroponik, kita akan tenang karena tidak perlu menyiram, tanaman setiap hari. Dengan media tanam berupa air, maka tugas kita hanya mengontrol sirkulasi air dan memberi nutrisi yang cukup.

Selain itu, ketika ada tanaman yang mati, akan sangat gampang untuk mengantinya dengan yang baru. Bahkan, pada saat memanen tanaman kita akan sangat dimudahkan karena tidak harus bersentuhan dengan tanah.

6. Menumbuhkan kreativitas

Bercocok tanam secara hidroponik ternyata dapat menumbuhkan kreativitas. Bagaimana tidak kreatif jika lahan sempit bias menjelma jadi kebun yang indah. Tanpa kreativitas, kita akan kesulitan mengatur tanaman. Itulah kenapa bercocok tanam secara hidroponik menumbuhkan kreativitas. Bahkan, menurut sebagian orang, bercocok tanam secara hidroponik itu adalah seni. Sehingga tak heran jika hasil dari garapan mereka terlihat indah dan artistik.

7. Harga jual hasil produksi hidroponik lebih mahal

Mendapat nutrisi yang cukup dan bebas hama, maka kualitas produk bertanam hidroponik jauh lebih berkualitas. Mulai dari daun, buah dan bunga cenderung sempurna. Tidak itu saja, tapi hasil tanaman secara hidroponik juga lebih aman dikonsumsi karena minimnya pemakaian pestisida dan bersih dari tanah. Lebih-lebih beberapa jenis tanaman biasa dipanen di luar musim yang seharusnya. Tak heran jika harga jualnya pun lebih mahal dari pertanian non hidroponik.

8. Sistem hidroponik ramah lingkungan

Bertanam hidroponik bisa dikatakan ramah lingkungan karena beberapa hal antara lain, pemakaian pestisida sangat minim, tidak membutuhkan banyak air, dan banyak memanfaatkan botol-botol bekas sebagai pot.

9. Tidak bergantung pada kondisi alam

Keuntungan dari sistem hidroponik seperti disinggung pada poin kedua, adalah bebas dari resiko kebanjiran, kekeringan ataupun erosi. Bahkan beberapa tanaman dapat tumbuh di wilayah yang semestinya tidak cocok bagi tanaman yang bersangkutan.

Menurut Sani (2015), bertanam hidroponik memang memiliki banyak sekali keuntungan dibanding pertanian konvensional, akan tetapi bukan berarti sistem ini tanpa memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari pertanian secara hidroponik adalah sebagai berikut:

1. Investasi awal yang besar

Untuk bertanam hidroponik, kita memang membutuhkan investasi yang cukup besar: misalnya untuk membangun *green house*, membeli peralatan dan bibit. Hal ini jelas akan sangat terasa bagi masyarakat ekonomi tengah. Sehingga bukan rahasia lagi jika investasi awal menjadi sebuah kendala untuk memilih bertanam hidroponik.

2. Perawatan yang mahal

Meski terbilang hemat tenaga manusia, akan tetapi perawatan tanaman hidroponik bisa dikatakan mahal. Apalagi jika cocok tanam tersebut menggunakan teknik yang cukup tinggi tingkat kesulitannya.

3. Teknik yang cukup ribet

Beberapa teknik cocok tanam secara hidroponik terbilang ribet, apabila kita memilih teknik yang salah maka hasilnya pun akan tidak maksimal. Bahkan tanaman bisa saja mati. Hal ini tentunya menjadi kendala untuk kemajuan sistem hidroponik.

4. Butuh keterampilan khusus

Dalam beberapa teknik hidroponik, kita membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya. Oleh karena itu, jika kita tidak memilih keterampilan khusus akan menjadi kendala untuk memilih sistem hidroponik.

5. Ketersediaan perangkat hidroponik yang langka dan mahal

Selain mahal, perangkat hidroponik juga terkadang sulit dijangkau.

6. Pengetahuan yang minim

Pengetahuan yang minim menjadi kendala bagi pertanian hidroponik. Hal ini mengingat teknik hidroponik yang tidak semuanya mudah.

7. Kesabaran untuk bekerja ulet

Tidak semua orang memiliki kesabaran dan keuletan dalam menjalankan pertanian secara hidroponik. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi mereka yang ingin terjun ke dunia hidroponik.

Menurut Sani (2015), untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kita bisa mempertimbangkan solusi tersebut:

1. Solusi masalah biaya

Untuk masalah biaya, kita bisa atasi dengan cara meminimalisir kebutuhan, pilihlah peralatan yang murah seperti pemanfaatan limbah rumah tangga. Jika kebutuhan yang tidak bisa ditekan, maka kita bisa mengatasinya dengan cara mencari investor atau kerjasama dengan penyuplai. Dari investor, kita akan mendapatkan modal untuk mengawali pertanian. Sedangkan dari penyuplai, kita bisa menawarkan penawaran bagi hasil jika dapat memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan.

2. Solusi masalah teknik bertanam hidroponik

Untuk kendala mengenai teknik bertanam hidroponik, kita bisa mengatasinya dengan mencari teknik yang paling bisa kita lakukan. Jangan mengerjakan teknik yang memang tidak sanggup kita *handle*. Tapi mulailah dengan teknik yang paling mudah sendiri bagi kita.

3. Solusi masalah keterampilan dan pengetahuan yang minim

Masalah keterampilan dan pengetahuan bisa kita asah dengan cara membaca banyak buku mengenai hidroponik, mengikuti seminar mengenai hidroponik, bertukar pengalaman, belajar pada ahlinya, dan berkomunitas dengan orang-orang yang mendalami bidang yang sama.

4. Solusi masalah ketersediaan perangkat hidroponik yang langka dan mahal

Sulitnya mencari perangkat hidroponik bisa kita atasi dengan mengganti dengan perangkat yang berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Artinya, kita harus pintar-pintar mencari ide untuk mengakali keterbatasan tersebut.

5. Solusi masalah kesabaran untuk bekerja ulet

Untuk masalah kesabaran dan keuletan, hanya motivasi untuk sukseslah yang bisa mengalahkannya.

D. Media Tanam Hidroponik

1. Arang sekam

Arang sekam adalah sekam bakar yang berwarna hitam yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, dan telah banyak digunakan sebagai media tanam secara komersial pada sistem hidroponik. Komposisi arang sekam paling banyak ditempati oleh SiO_2 yaitu 52% dan C sebanyak 31%. Komponen lain adalah Fe_2O_3 , K_2O , MgO , CaO , MnO , dan Cu dalam jumlah relatif kecil serta bahan organik (Setyoadji, 2015).

Karakteristik lain arang sekam adalah sangat ringan, kasar sehingga sirkulasi udara tinggi karena banyak pori, kapasitas menahan air yang tinggi, warnanya yang hitam dapat mengabsorpsi sinar matahari secara efektif, pH tinggi (8.5-9.0), serta dapat menghilangkan pengaruh penyakit khususnya bakteri dan gulma (Setyoadji, 2015).

Media arang sekam merupakan media tanam yang praktis digunakan karena tidak perlu disterilisasi, hal ini disebabkan mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Selain itu, arang sekam juga memiliki kandungan karbon (C) yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur (Septiani, 2012).



Gambar 2.5. Arang sekam (Dokumentasi Pribadi, 2016).

Sekam bakar merupakan salah satu alternatif yang dapat meminimalisir pemakaian media tanam berupa tanah. Penambahan sekam bakar ke dalam media tanam merupakan salah satu cara mengurangi pemakaian tanah sebagai media tanam. Sifat sekam bakar yang porous dan steril merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi tanaman (Gustia, 2013).

2. Serbuk sabut kelapa (*Cocopeat*).

Kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi agroindustri kelapa yang cukup besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Luas areal kebun kelapa di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu 3,76 juta hektar. Limbah hasil pengupasan buah kelapa antara lain tempurung dan sabut kelapa yang terdiri atas serat dan serbuk sabut kelapa. Negara penghasil serat dan serbuk sabut kelapa terbesar adalah India (120

kiloton/tahun) dan Sri Lanka (73 kiloton/tahun). Di Indonesia limbah buah kelapa hasil pengolahan atau pengupasan yang dihasilkan per tahunnya mencapai sekitar 19,05 juta m³ yang terdiri atas 35% serat dan 65% serbuk sabut kelapa (Adiyati, 1999).



Gambar 2.6. Serbuk sabuk kelapa (*Cocopeat*) (Hasriani, 2013)

Cocopeat mengandung klor yang cukup tinggi, bila klor bereaksi dengan air maka akan terbentuk asam klorida. Akibatnya kondisi media menjadi asam, sedangkan tanaman membutuhkan kondisi netral untuk pertumbuhannya. Kadar klor pada *cocopeat* yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari 200 mg/l. Oleh karena itu pencucian bahan baku *Cocopeat* sangat penting dilakukan (Sukendro, 2013).

Keunggulan *cocopeat* sebagai media tanam antara lain yaitu: dapat menyimpan air yang mengandung unsur hara, sifat *cocopeat* yang senang menampung air dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan pupuk

cair sehingga frekuensi pemupukan dapat dikurangi dan di dalam *cocopeat* juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, daya serap air tinggi, mengemburkan tanah dengan pH netral, dan menunjang pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan (Agoes, 1994).

Kekurangan *cocopeat* adalah banyak mengandung tanin. Zat tanin diketahui sebagai zat yang menghambat pertumbuhan tanaman. Untuk menghilangkan zat tanin yang berlebihan maka bisa dilakukan dengan cara merendam *cocopeat* di dalam air bersih selama beberapa jam, lalu diaduk sampai air berbusa putih. Selanjutnya buang air rendaman dan diganti dengan air bersih yang baru, hal ini dilakukan beberapa kali sampai busa tidak keluar lagi (Fahmi, 2013).

E. Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman

Secara harfiah, pertumbuhan diartikan sebagai perubahan yang dapat diketahui atau ditentukan berdasarkan sejumlah ukuran atau kuantitasnya. Pertumbuhan meliputi bertambah besar dan bertambah banyaknya sel-sel pada jaringan. Proses yang terjadi pada pertumbuhan adalah suatu kegiatan yang *irreversible* (tidak dapat kembali ke bentuk semula) (Anonim, 2015).

Proses pertumbuhan ditandai dengan terbentuknya suatu organ pada tanaman yang mengalami perubahan antara lain terbentuknya daun, batang, biji dan buah. Semua bagian tubuh-tumbuhan yang secara langsung maupun tidak langsung


berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan, yaitu yang terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat (Tjitroseopomo, 2007).

Di dalam biji terdapat embrio yang dilindungi oleh kulit biji, embrio tersebut mendapatkan pasokan makanan. Embrio sumbu dengan dua buah kutub yaitu calon akar dan batang. Pada kondisi baik biji akan berkecambah menjadi tumbuhan muda. Pertumbuhan akar menuju ke tanah dan pertumbuhan batang menuju atas, pertumbuhan akar dan batang ini, dengan pembentukan sel baru yang dilakukan oleh jaringan meristem pada titik tumbuh, diikuti dengan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Tumbuhan dewasa akan membentuk bunga setelah bunga masak akan terjadi penyerbukan dan pembuahan sehingga terbentuklah buah yang berisi biji. Biji ini nantinya dapat tumbuh sehingga lengkaplah daur hidupnya (Mulyani, 2006).

Perkembangan dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang teratur dan berkembang menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, atau lebih kompleks. Perkembangan menyangkut suatu seri perubahan pada organisme yang terjadi sepanjang daur kehidupan tumbuhan yang meliputi pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal (dalam) dan faktor luar (lingkungan). Faktor internal yaitu faktor yang melibatkan hormon yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor luar yang erat hubungannya dengan proses

perkembangan. Termasuk ke dalam faktor ini adalah panjang pendeknya hari, suhu, nutrisi, dan lain-lain (Nasaruddin, 2010).

F. Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) secara hidroponik.
2. Terdapat takaran media serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada arang sekam yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) secara hidroponik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Panoparama Indah Samata-Gowa.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental yang menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variables*). Penelitian ini merupakan eksperimen murni.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam dan variabel terikat adalah pertumbuhan tanaman sawi hijau (*B. juncea* L.).

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel antara lain:

1. Serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) merupakan media hidroponik yang diperoleh dari sabuk kelapa yang dirontokkan yang ditambahkan pada media arang sekam.
2. Pertumbuhan tanaman sawi hijau merupakan suatu peningkatan ukuran sel-sel tunggal, atau peningkatan jumlah sel atau keduanya yang ditandai dengan jumlah daun, panjang daun, lebar daun, panjang akar dan bobot basah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi (pengamatan), pengukuran langsung dan dibantu dengan kamera.

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

- a. Pertambahan jumlah daun (helai), jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna.
- b. Pertambahan panjang daun (cm), mengukur panjang daun dari pangkal sampai ujung daun.
- c. Pertambahan lebar daun (cm), mengukur lebar daun dari samping kanan ke kiri.
- d. Panjang akar (cm), mengukur panjang akar tanaman pada saat panen.
- e. Bobot basah (gr), menghitung bobot basah setelah dibersihkan dari kotoran kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik.

F. Instrumen penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol bekas air mineral, ember, gayung, *cutter*, gunting, gelas ukur, *handspayer*, kain flanel, label, mistar dan wadah penyemaian.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air, arang sekam, benih sawi hijau, nutrisi hidroponik AB-MIX dan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*).

G. Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan dan sehingga terdapat 20 unit percobaan.

M0= Arang sekam (kontrol)

M1= *Cocopeat* : Arang sekam (1:2)

M2= *Cocopeat* : Arang sekam (2:1)

M3= *Cocopeat* : Arang sekam (1:1)

Adapun prosedur kerja adalah sebagai berikut:

1. Media tanam

Sebelum menyiapkan media tanam terlebih dahulu mempersiapkan wadah yaitu memotong botol bekas air mineral dengan menggunakan *cutter* dan gunting,

membuat lubang sebagai tempat pembuangan air apabila nutrisi berlebih sekaligus sebagai rongga udara yang dibutuhkan akar tanaman, membuat beberapa lubang pada tutup botol air mineral dan selanjutnya menguntai kain flanel, memasang kain flanel pada tutup botol sebagai alat untuk menyalurkan air nutrisi dari bawah botol ke tanaman

Media serbuk kelapa (*cocopeat*) dibuat dengan cara merontokkan bagian dalam sabut kelapa yang sebelumnya telah direndam selama 3 jam.

Media arang sekam dibuat dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sekam dalam kondisi kering, kemudian memanaskan sekam hingga berwarna hitam, setelah sekam berwarna hitam kemudian segera menyisihkan dan menyiram dengan air untuk menghentikan pembakaran agar tidak menjadi abu. Kemudian mengeringkan arang sekam.

Kemudian memcampur dan menimbang semua macam media sesuai dengan masing-masing perlakuan dan memasukkan ke dalam wadah pertama.

2. Pembuatan larutan

Pembuatan larutan nutrisi AB Mix dilakukan dengan cara melarutkan AB mix A (83 gram) dan AB mix B (83 gram) masing-masing ke dalam 500 ml air, kemudian diaduk hingga tercampur rata, nutrisi ini disimpan dalam botol plastik. Sebagai larutan stok. Kemudian membuat larutan siap pakai yaitu dengan konsentrasi 5 ml/l air.

3. Penyemaian benih

Pembibitan tanaman sayuran dilakukan dengan menyemaikan benih tanaman sawi tersebut menggunakan media campuran arang sekam dan (*cocopeat*) di bak persemaian kemudian menyemprotkan air menggunakan *handspayer*.

4. Penanaman

Memasukkan bibit tanaman sawi hijau pada wadah yang berisi media.

5. Pemeliharaan

Melakukan pemeriksaan secara kontinyu, pengontrolan nutrisi pada semua wadah, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik yaitu bila dijumpai ada hama, mengambil dan mematikan hama tersebut dengan cara dipijit. Bila ada tanaman yang terserang penyakit layu, mencabut tanaman dan segera membuang medianya, wadah penanaman dapat digunakan lagi dengan media dan tanaman yang baru dan sehat.

H. Teknik pengolahan dan analisis data


Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 5\%}$) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 1\%}$), maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Data dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Jumlah Daun


Pertambahan jumlah daun (helai) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST) serta sidik ragamnya disajikan pada tabel lampiran 3a dan 3b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan jumlah daun (helai) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).



Gambar 4. 1. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

2. Panjang Daun


Pertambahan panjang daun (cm) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST) serta sidik ragamnya disajikan pada tabel lampiran 6a dan 6b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap panjang daun (cm) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).



Gambar 4. 2. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST).

3. Lebar Daun


Pertambahan lebar daun (cm) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST) serta sidik ragamnya disajikan pada tabel lampiran 9a dan 9b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap lebar daun (cm) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).



Gambar 4. 3. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

4. Panjang Akar


Panjang akar tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) umur 4 MST serta sidik ragamnya disajikan pada tabel lampiran 10a dan 10b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar (cm) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).



Gambar. 4. 4. Rata-rata panjang akar tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) umur 4 MST

5. Bobot Basah

Bobot basah tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) umur 4 MST serta sidik ragamnya disajikan pada tabel lampiran 11a dan 11b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap bobot basah (gr) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).



Gambar. 4.5. Rata-rata bobot basah tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) umur 4 MST

B. Pembahasan

Pertumbuhan tanaman menunjukkan pembelahan dan pembesaran sel. Pertambahan jumlah daun, panjang daun dan lebar daun adalah salah satu bagian dari pertumbuhan. Parameter ini menjadi hal yang diamati untuk mengukur pengaruh perlakuan yang diberikan pada penelitian.

Pada sistem hidroponik, larutan nutrisi yang diberikan mengandung komposisi garam-garam organik yang berimbang untuk menumbuhkan perakaran dengan kondisi lingkungan perakaran yang ideal. Kebutuhan hara berdasar suplai dari luar, larutan nutrisi yang diberikan terdiri atas garam-garam makro dan mikro yang dibuat dalam larutan stok A dan B.

Larutan nutrisi stok A terdiri atas unsur N, K, Ca, dan Fe, dimana Unsur Nitrogen (N) sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Sedangkan stok B terdiri atas unsur P, Mg, S, B, Mn, Cu, Na, Mo, dan Zn. Selain itu, nutrisi yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro merupakan hara yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman (Karsono, *et al.*, 2002).

Media tumbuh berfungsi sebagai tempat tumbuh atau penopang tempat berdirinya tanaman yaitu tempat melekatnya akar. Widodo (1996) menyatakan bahwa perakaran tanaman akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh air, hara,

dan udara yang cukup dari media tumbuh. Media tumbuh yang digunakan pada penelitian ini yaitu *cocopeat* dan arang sekam.

Arang sekam adalah sekam bakar yang berwarna hitam yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, dan telah banyak digunakan sebagai media tanam secara komersial pada sistem hidroponik. Pengaruh arang sekam terhadap pertumbuhan karena dapat dilihat dari karakteristik yaitu ringan dan kasar sehingga sirkulasi udara tinggi sebab banyak pori dan kapasitas menahan air yang tinggi. Komposisi arang sekam paling banyak ditempati oleh SiO_2 yaitu 52% dan C sebanyak 31%. Komponen lain adalah Fe_2 , O_3 , K_2O , MgO , CaO MnO , dan Cu dalam jumlah relatif kecil serta bahan organik. Unsur hara pada arang sekam antara lain nitrogen (N) 0.32%, fosfat (P) 0.15%, kalium (K) 0.31%, kalsium (Ca) 0.96%, Fe 180 ppm, Mn 80.4 ppm, Zn 14.10 ppm dan pH 8.5 – 9.0 (Setyoadji, 2015).

Cocopeat sebagai media tanam antara lain yaitu dapat menyimpan air yang mengandung unsur hara, sifat *cocopeat* yang senang menampung air dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan pupuk cair sehingga frekuensi pemupukan dapat dikurangi dan di dalam *cocopeat* juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, daya serap air tinggi, menggemburkan tanah dengan pH netral, dan menunjang pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan. Unsur hara pada *cocopeat* antara lain mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman yaitu kalium (K), fosfor (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium dan beberapa mineral lainnya (Agoes, 1994).

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perlakuan media tanam yaitu mempengaruhi jumlah daun, panjang akar, lebar daun, panjang akar dan bobot basah pengamatan I (2 MST- 1 MST) sampai pengamatan III (4 MST- 3 MST).

1. Jumlah Daun

Pengamatan jumlah daun sangat diperlukan sebagai salah satu indikator pertumbuhan yang dapat menjelaskan proses pertumbuhan tanaman. Pengamatan daun dapat berdasarkan atas fungsi daun sebagai alat fotosintesis. Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna.

Perlakuan media berpengaruh sangat nyata hanya pada pengamatan I (2 MST – 1 MST) kemudian selanjutnya hingga pengamatan ke III berpengaruh tidak nyata.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan jumlah daun (helai) tanaman. Hal ini diduga karena takaran media yang diberikan antara perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2) tidak berbeda jauh dengan perlakuan (M2) dengan media cocopeat : arang sekam (2:1) dan tidak berbeda jauh dengan perlakuan M3 dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini kemungkinan mengakibatkan pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata pada jumlah daun tanaman. Hasil rata-rata didapatkan pada

pengamatan jumlah daun (helai) tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. dapat dilihat bahwa jumlah daun yang terbanyak yaitu perlakuan (M1) dengan menggunakan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini diduga media arang sekam mempunyai daya simpan air yang cukup tinggi, sifatnya ringan sehingga mudah ditembus oleh akar. Seperti yang dikemukakan oleh Prihmantoro (2003), arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal, ringan, steril dan mempunyai porositas yang baik. Unsur hara pada arang sekam antara lain nitrogen (N) 0.32%, fosfat (P) 0.15%, kalium (K) 0.31%, kalsium (Ca) 0.96%, Fe 180 ppm, Mn 80.4 ppm, Zn 14.10 ppm dan pH 8.5 – 9.0. Lakitan (2007), mengemukakan bahwa unsur hara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan daun adalah Nitrogen (N). Konsentrasi Nitrogen (N) yang tinggi menghasilkan daun yang lebih besar dan banyak.

Sedangkan pada perlakuan M2 dengan media cocopeat : arang sekam (2:1) dan M3 dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) menghasilkan jumlah daun yang lebih sedikit. Hal ini diduga karena pada perlakuan M2 mengalami kekurangan unsur nitrogen (N). Didukung oleh pendapat Setyamidjaja (1986) bahwa fungsi N adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Bila kekurangan N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Unsur hara N juga berguna untuk pembentukan klorofil dan kloroplas pada daun yang

nantinya berguna untuk proses fotosintesis. Gardner, *et al.* (1991) mengemukakan bahwa daun dibutuhkan untuk penyerapan dan perubahan energi cahaya matahari menjadi pertumbuhan dan menghasilkan panen melalui fotosintesis.

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu botol bekas air mineral yang berfungsi sebagai tempat media dan tempat larutan nutrisi, ember berfungsi untuk membuat larutan nutrisi siap pakai, *cutter* berfungsi untuk memotong botol bekas air mineral, gunting berfungsi untuk memotong kain flanel, gelas ukur berfungsi mengukur larutan, *handspayer* berfungsi untuk menyemprot benih sawi hijau saat penyemaian, kain flanel berfungsi sebagai sumbu untuk menyerap nutrisi ke media dan tempat melekatnya akar tanaman, mistar berfungsi untuk mengukur tempat media yaitu 12 cm sedangkan tempat larutan nutrisi 14 cm juga dipakai untuk mengukur panjang kain flanel dimana panjang sumbu 20 cm, kapas berfungsi untuk menjepit kain flanel dimulut botol agar media tidak jatuh ke tempat nutrisi, label berfungsi untuk menandai perlakuan antara M0, M1, M2 dan M3, wadah penyemai berfungsi untuk menyemai benih sawi hijau.

2. Panjang Daun

Pengamatan panjang daun (cm) dilakukan dengan mengukur panjang dari pangkal pelepah sampai ujung daun.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabuk kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap

pertambahan panjang daun (cm) tanaman. Hal ini diduga karena takaran media yang diberikan antara perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2) tidak berbeda jauh dengan perlakuan (M2) dengan media cocopeat : arang sekam (2:1) dan tidak berbeda jauh dengan perlakuan M3 dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini kemungkinan mengakibatkan pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata pada panjang daun tanaman. Hasil rata-rata didapatkan pada pengamatan panjang daun (cm) tanaman sawi hijau dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa panjang daun yang terpanjang yaitu perlakuan (M3) dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini diduga pada perlakuan ini memiliki pertumbuhan yang optimal dimana media cocopeat mengandung unsur hara kalsium, magnesium, kalium, phosphor seperti yang dikemukakan Livy winata (2007). Unsur hara yang terkandung di dalam *cocopeat* dapat membantu pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, kandungan klorofil dan mempengaruhi level hormon. Media ini mempunyai struktur yang halus, sehingga media ini dapat mempertahankan air dan kelembaban sedangkan arang sekam mengandung unsur hara antara lain nitrogen (N) 0.32%, phosphat (P) 0.15%, kalium (K) 0.31%, calsium (Ca) 0.96%, Fe 180 ppm, Mn 80.4 ppm, Zn 14.10 ppm dan pH 8.5 – 9.0 sedangkan arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, ringan, mempunyai porositas yang baik sehingga baik untuk pertumbuhan awal tanaman. Seperti yang dijelaskan oleh Grewal (1998),

permukaan dengan tekstur halus mempunyai ruang pori total lebih banyak dan proporsinya relatif besar yang disusun oleh pori-pori kecil. Akibatnya adalah tanaman mempunyai kapasitas menahan air yang tinggi. Ketika air diberikan selain diserap oleh akar sebagian air tersebut akan lari ke tanah, pada saat akar membutuhkan lagi, air yang masih tertinggal pada media tanam bisa diserap akar dengan mudah. Arang sekam memiliki kemampuan drainase yang cukup tinggi untuk mengalirkan kembali air yang telah diserap, sehingga sesuai untuk pertumbuhan awal tanaman.

Sedangkan penambahan panjang daun yang menghasilkan daun yang pendek yaitu pada perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2), hal ini diduga karena kelebihan unsur N (nitrogen) Didukung oleh pendapat Setyamidjaja (1986) bahwa fungsi N adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Bila kekurangan N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Unsur hara N juga berguna untuk pembentukan klorofil dan kloplast pada daun yang nantinya berguna untuk proses fotosintesis.

3. lebar Daun

Pengamatan lebar daun (cm) dilakukan dengan mengukur lebar daun dari samping kanan ke kiri

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap penambahan lebar daun (cm) tanaman. Hal ini diduga karena takaran media yang

diberikan antara perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2) tidak berbeda jauh dengan perlakuan (M2) dengan media cocopeat : arang sekam (2:1) dan tidak berbeda jauh dengan perlakuan M3 dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini kemungkinan mengakibatkan pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata pada lebar daun tanaman. Hasil rata-rata didapatkan pada pengamatan lebar daun (cm) tanaman sawi hijau dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. dapat dilihat bahwa lebar daun yang terlebar yaitu perlakuan (M3) dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini diduga pada perlakuan ini memiliki pertumbuhan yang optimal dimana media cocopeat mengandung unsur hara kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor seperti yang dikemukakan oleh Livi winata (2007) bahwa unsur hara yang terkandung di dalamnya dapat membantu pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, kandungan klorofil dan mempengaruhi level hormon. Media ini mempunyai struktur yang halus, sehingga media ini dapat mempertahankan air dan kelembaban sedangkan arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, ringan, mempunyai porositas yang baik sehingga baik untuk pertumbuhan awal tanaman. Seperti yang dijelaskan oleh Grewal (1998), permukaan dengan tekstur halus mempunyai ruang pori total lebih banyak dan proporsinya relatif besar yang disusun oleh pori-pori kecil. Akibatnya adalah tanaman mempunyai kapasitas menahan air yang tinggi. Ketika air diberikan selain diserap oleh akar sebagian air tersebut akan lari

ke tanah, pada saat akar membutuhkan lagi, air yang masih tertinggal pada media tanam bisa diserap akar dengan mudah. Arang sekam memiliki kemampuan drainase yang cukup tinggi untuk mengalirkan kembali air yang telah diserap, sehingga sesuai untuk pertumbuhan awal tanaman.

Sedangkan pertambahan lebar daun yang menghasilkan daun yang pendek yaitu pada perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2), hal ini diduga karena kelebihan unsur N (nitrogen) Didukung oleh pendapat Setyamidjaja (1986) bahwa fungsi N adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Bila kekurangan N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Unsur hara N juga berguna untuk pembentukan klorofil dan kloroplas pada daun yang nantinya berguna untuk proses fotosintesis.

4. Panjang Akar

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar (cm) tanaman. Hal ini diduga karena akar yang dimiliki tanaman sawi hijau berakar serabut dimana pada perlakuan akar menjalar ke media dan sebagian turun ke kain flanel dan juga faktor lingkungan atmosfer media, pH media, temperatur media, keadaan fisik media dan kelembaban media. Hasil rata-rata didapatkan pada panjang akar (cm) tanaman sawi hijau dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa panjang akar yang terpanjang yaitu perlakuan (M3) dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) yaitu (22.50) selanjutnya M0= Arang sekam (control) yaitu (20.40) kemudian M1= cocopeat : Arang sekam (1:2) yaitu (17.94) dan yang terendah adalah M2: cocopeat : Arang sekam yaitu (17.10). Hal ini diakibatkan karena *cocopeat* dapat menyimpan air yang mengandung unsur hara, sifat *cocopeat* yang senang menampung air dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan pupuk cair sehingga frekuensi pemupukan dapat dikurangi dan di dalam *cocopeat* juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, daya serap air tinggi, menggemburkan tanah dengan pH netral, dan menunjang pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan (Agoes, 1994).

Arang sekam memiliki banyak pori yang dapat meningkatkan aerasi, serta porositas yang tinggi sehingga media tanam arang sekam bersifat lebih remah. Sifat ini yang diduga memudahkan akar dapat menembus media dan daerah pemanjangan akar akan semakin besar serta dapat mempercepat perkembangan akar, menurut Hanafiah (2007), partikel-partikel bahan organik merupakan penyusun ruang pori yang berfungsi sebagai sumber air dan udara, serta sebagai ruang untuk akar berpenetrasi, semakin banyak ruang pori akan dapat memperluas sistem perakaran dan perakaran dapat lebih mudah menyerap hara dan air dalam tanah. Tetapi semakin sedikit ruang pori maka akan semakin tidak berkembang sistem perakaran tanaman. Menurut Islami dan Utomo (1995),

jika kondisi lingkungan optimum bagi pertumbuhan tanaman, untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik tidak selalu memerlukan sistem perakaran yang luas. Akan tetapi karena umumnya kondisi pertumbuhan tanaman di lapangan tidak selalu berada pada kondisi optimum maka sistem perakaran akan mengalami kerusakan karena gangguan biologis, fisik, atau mekanisme menjadi kurang berfungsi maka pertumbuhan tanaman akar terhambat (Gardner, dkk., 1991).

5. Bobot Basah

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap bobot basah (gr) tanaman. Hal ini diduga karena takaran media yang diberikan antara perlakuan (M1) dengan media cocopeat : arang sekam (1:2) tidak berbeda jauh dengan perlakuan (M2) dengan media cocopeat : arang sekam (2:1) dan tidak berbeda jauh dengan perlakuan M3 dengan media cocopeat : arang sekam (1:1) hal ini kemungkinan mengakibatkan pengaruh penambahan serbuk sabut kelapa pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata pada bobot basah tanaman. Hasil rata-rata didapatkan pada bobot basah (gr) tanaman sawi hijau dapat dilihat pada gambar 4.5.

Berdasarkan gambar 4.7 terlihat bahwa pada perlakuan M3= cocopeat : arang sekam (1:1) yaitu (12.655), selanjutnya M2= cocopeat : arang sekam yaitu (11.892) kemudian M1= cocopeat : arang sekam (1:2) yaitu (9.614) dan M0= arang sekam (control) yaitu (9.572). hal ini diduga karena unsur hara yang ada

pada perlakuan M3 seimbang sehingga mengoptimalkan pertumbuhan, ketersediaan unsur hara yang cukup akan meningkatkan jumlah sel pada tanaman sehingga dapat meningkatkan berat basah konsumsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penambahan serbuk sabut kelapa (*cocopeat*) pada media arang sekam berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) baik pada penambahan jumlah daun, penambahan panjang daun, penambahan lebar daun, panjang akar dan bobot basah.
2. Perlakuan M0= arang sekam (kontrol) dan M1= *cocopeat* : arang sekam (1:2) memberikan penambahan jumlah daun (helai) tertinggi yaitu (1.10) sedangkan pada perlakuan M3= *cocopeat* : arang sekam (1:1) memberikan penambahan panjang daun (cm), penambahan lebar daun (cm) , panjang akar (cm) dan bobot basah (gr) tertinggi yaitu (4.28), (1.74), (22.50) dan (12.66).

B. SARAN

Adapun saran yang dapat saya ambil setelah melakukan penelitian yaitu:

1. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan media *cocopeat* sebagai kontrol.
2. Pemberian takaran media pada perlakuan tidak berbeda jauh dengan perlakuan lainnya sehingga penambahan serbuk sabut kelapa berpengaruh tidak nyata pada tanaman jadi perlu penelitian selanjutnya dengan media perbandingan yang berbeda jauh
3. Arang sekam dan *cocopeat* dapat digunakan sebagai media tanam hidroponik.

KEPUSTAKAAN

- Adiyati NM. *Kajian Komposisi dan Finansial Pada Pemanfaatan Serbuk sabut Kelapa Sebagai Media Tanam Lempengan*. Skripsi. Bogor: Program Sarjana Institut Pertanian bogor, 1999.
- Agoes DS. *Aneka Jenis Media Tanam dan Penggunaannya*. Jakarta: Penebar swadaya, 1994. Hal 98.
- Anonim, 2015. <http://www.teruskan.com/41407/cara-menanam-sawi-dengan-metode-hidroponik-sumbu.html> (Diakses tanggal 3 februari 2016).
- Anjeliza RY, A Masniawati, Baharuddin dan MA Salam, *Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi Hijau Brassica juncea L. Pada Berbagai Desain Hidroponik*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Badan pusat statistik. *Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia* (Diakses tanggal 2 Februari 2016). [http://bps.go.id/website/pdf-publikasi/watermask-Statistik-Tanaman-Sayuran-dan-Buah-buahan-Semusim-Indonesia-2013, pdf](http://bps.go.id/website/pdf-publikasi/watermask-Statistik-Tanaman-Sayuran-dan-Buah-buahan-Semusim-Indonesia-2013.pdf).
- Bahreisy S, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Cahyono B. *Teknik dan Strategi Budidaya Sawi Hijau*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. *Daftar komposisi bahan makanan*. Jakarta: Bhatara karya aksara, 1981. [Http://pergizi.org/hubungi-kami/1-kontak-departement/2-direktorat-gizimasyarakat.html](http://pergizi.org/hubungi-kami/1-kontak-departement/2-direktorat-gizimasyarakat.html) (15 Desember 2015)
- Douglas JS. *Advanced Guide to Hydroponics*. Garland Publ. New York, 1976.
- Fahmi ZI. *Media tanam sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman*. Balai besar perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Surabaya, 2013.
- Indriani YH, Prihmantoro H. dan *Hidroponik Sayuran Semusim Untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2003.
- Gardner FP, RB Pearce and RL Mitchell. *Fisiologi Tanaman Budidaya - (Physiology of Crop Plants)*. Jakarta: UI-Press, 1991.

- Gustia H. *Pengaruh Penambahan Sekam Bakar Pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (Brassica juncea L.)*. E-journal widya kesehatan dan lingkungan. Vol.1, no.1, 2013. Hal:12.
- Gunawan, Iy Winata. *Budidaya Anggrek*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Haryanto WT, Suhartini, Rahayu E. *Sawi dan Selada*. Jakarta: Edisi Revisi Penebar Swadaya, 2002. Hal : 5-26.
- Hanafiah, K. A. *Dasar-dasar ilmu tanah*. Buku. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasriani I, Kalsim DK, Sukendro A. *Kajian Serbuk Sabut Kelapa (Cocopeat) Sebagai Media Tanam*, 2013. [Http://dedikalsim.wordpress.com](http://dedikalsim.wordpress.com) (4 Agustus 2016).
- Herfianti. *Konsumsi Sayur Masyarakat Indonesia Di Bawah Rekomendasi FAO*, 2015. [Http://www.aseibssindo.org/index.php/component/content/article/126_konsumsi-sayur-masyarakat-indonesia-di-bawah-rekomendasi-fao.html](http://www.aseibssindo.org/index.php/component/content/article/126_konsumsi-sayur-masyarakat-indonesia-di-bawah-rekomendasi-fao.html) (15 januari 2016).
- Islami, T. dan W. H. Utomo. *Hubungan tanah, Air dan Tananam*. Buku. Cetakan ke-1. Malang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Irawan, A. *Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Media Tanah*. Bandung: M2S. 2003. Hal 1-51.
- Irawan A, Kafiar Y. *Pemanfaatan Cocopeat dan Arang Sekam Padi Sebagai Media Tanam Bibit Cempaka Wasian (Elmerrilia ovalis) use of saw dust and rice husk as a growth media of cempaka wasian (elmerrilia ovalis)*. Pros sem nas masy biodiv indon. Vol 1, no 4. 2015: 805-808.
- Karsono, Sudiby, dkk. *Hidroponik Skala Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Argo Media Pustaka. 2002.
- Lakitan, B. *Dasar-dasar fisiologi tumbuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mulyani ES. *Anatomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006. Hal 16.
- Nigrum F.G.K. *Efektivitas air kelapa dan ampas teh terhadap pertumbuhan tanaman mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) pada media tanaman yang berbeda*.

Surakarta: Skripsi. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2010.

- Rahimah DS. *Hidroponik di bawah langit*. Trubus No. 513 (Januari, 2016).
- Rukmana R. *Bertanam Petsai dan Dawi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rukmana R. *Bertanam Petsai dan Dawi*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sani B. *Hidroponik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Setyoadji D. *Tanaman Hidroponik*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Setyamidjaya. *Pupuk dan Pemupukan*. Jakarta: Simplex, 1986.
- Shihab HM, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Ilmu. 2008.
- Sunardjono H. *Bertanam 30 Jenis Sayur*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Supriati Y, Herliana E. *Bertanam 15 Sayuran Organik Dalam Pot*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Tim Karya Tani Mandiri, *Pedoman budidaya secara hidroponik*. Bandung; Nuansaauli, 2010. 160 hlm.
- Tjitrosoepomo G. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2013.
- Widodo, W. *Memperpanjang Umur Produktif Cabai*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1996, 49 hlm.
- Yulianti F, Susanto H. *Penelitian Tentang Kajian Arang Aktif Dari Sekam Padi Untuk Pengolahan Air Limbah Industri*. Bandung, 2009. [Httpesptk.fti.itb.ac.id/herriwpimagesnia-163%20presentasi%20frita.pdf](http://pesptk.fti.itb.ac.id/herriwpimagesnia-163%20presentasi%20frita.pdf).
- Yuri FD. *Bercocok Tanam Tanpa Tanah, Hidroponik dan Bonsai*. Pekalongan:CVbahagia. 1994.

LAMPIRAN

Tabel lampiran 1a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	1.50	1.00	1.00	0.50	0.00	4.00	0.80
M1	1.50	1.50	0.50	2.00	1.00	6.50	1.30
M2	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	9.50	1.90
M3	2.00	1.50	1.50	2.00	1.50	8.50	1.70
Total	7.00	6.00	5.00	6.50	4.00	28.50	5.70

Tabel lampiran 1b. Sidik ragam pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	3.537	1.179	8.576**	0.003
Ulangan	4	1.450	0.362		
Galat	12	1.650	0.138		
Total	19	6.637			

Keterangan: **= sangat nyata

Tabel lampiran 2a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (3 MST- 2 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.40
M1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.20
M2	2.00	0.50	1.00	1.00	0.50	5.00	1.00
M3	1.50	2.00	1.50	0.50	0.00	5.50	1.10
Total	3.50	2.50	3.00	2.50	2.00	13.50	2.70

Tabel lampiran 2b. Sidik ragam pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (5 MST- 4 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	2.937	0.979	2.410 ^{tn}	0.118
Ulangan	4	0.325	0.081		
Galat	12	4.875	0.406		
Total	19	8.138			

Keterangan: tn = tidak nyata

Tabel lampiran 3a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	1.00	1.00	0.50	1.50	1.50	5.50	1.10
M1	0.00	0.50	2.00	1.50	1.50	5.50	1.10
M2	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	3.50	0.70
M3	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00	3.50	0.70
Total	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00	18.00	3.60

Tabel lampiran 3b. Sidik ragam pertambahan jumlah tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	1.350	0.450	2.250 ^{tn}	0.135
Ulangan	4	1.700	0.425		
Galat	12	2.400	0.200		
Total	19	5.450			

Keterangan: tn= tidak nyata

Tabel lampiran 4a. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	1.00	0.80	1.10	0.00	0.10	3.00	0.60
M1	1.10	2.00	1.30	2.10	2.60	9.10	1.82
M2	2.50	1.90	3.00	2.97	2.50	12.87	2.57
M3	3.20	2.90	2.60	2.30	2.50	13.50	2.70
Total	7.80	7.60	8.00	7.37	7.70	38.47	7.69

Tabel lampiran 4b. Sidik ragam pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Sumber	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Keragaman(Sk)					
Perlakuan	3	13.942	4.647	14.611**	0.000
Ulangan	4	0.055	0.014		
Galat	12	3.817	0.318		
Total	19	17.814			

Keterangan: **= sangat nyata

Tabel lampiran 5a. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (3 MST- 2 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	4.10	3.20	4.40	3.30	2.00	17.00	3.40
M1	4.80	3.10	0.30	3.40	5.20	16.80	3.36
M2	3.70	3.10	5.20	3.70	4.20	19.90	3.98
M3	5.00	2.00	3.70	4.20	2.40	17.30	3.46
Total	17.60	11.40	13.60	14.60	13.80	71.00	14.20

Tabel lampiran 5b. Sidik ragam pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (5 MST- 4 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	1.258	0.419	0.228 ^{tn}	0.875
Ulangan	4	5.020	1.255		
Galat	12	22.072	1.839		
Total	19	28.350			

Keterangan: tn = tidak nyata

Tabel lampiran 6a. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	3.20	2.60	2.20	2.10	3.10	13.20	2.64
M1	3.60	2.60	3.80	1.50	2.70	14.20	2.84
M2	2.20	6.00	4.40	3.00	4.00	19.60	3.92
M3	0.50	4.80	6.10	2.30	7.70	21.40	4.28
Total	9.50	16.00	16.50	8.90	17.50	68.40	13.68

Tabel lampiran 6b. Sidik ragam pertambahan panjang daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	9.672	3.224	1.326 ^{tn}	0.312
Ulangan	4	17.062	4.265		
Galat	12	29.178	2.432		
Total	19	55.912			

Keterangan: tn= tidak nyata

Tabel lampiran 7a. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	0.40	0.30	0.50	0.40	0.00	1.60	0.32
M1	0.30	0.50	0.50	0.60	0.60	2.50	0.50
M2	0.50	0.20	0.80	0.50	0.20	2.20	0.44
M3	1.00	0.70	0.90	0.50	0.60	3.70	0.74
Total	2.20	1.70	2.70	2.00	1.40	10.00	2.00

Tabel lampiran 7b. Sidik ragam pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke I (2 MST- 1 MST)

Sumber	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Keragaman(Sk)					
Perlakuan	3	0.468	0.156	4.837*	0.020
Ulangan	4	0.245	0.061		
Galat	12	0.387	0.032		
Total	19	1.100			

Keterangan: *= nyata

Tabel lampiran 8a. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (3 MST- 2 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	1.30	0.90	1.30	0.50	1.00	5.00	1.00
M1	1.30	2.00	0.50	1.10	1.90	6.80	1.36
M2	1.00	0.90	1.50	1.00	0.90	5.30	1.06
M3	1.70	0.60	1.10	1.90	1.00	6.30	1.26
Total	5.30	4.40	4.40	4.50	4.80	23.40	4.68

Tabel lampiran 8b. Sidik ragam pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke II (3 MST- 2 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	0.426	0.142	0.534 ^{tn}	0.667
Ulangan	4	0.147	0.037		
Galat	12	3.189	0.266		
Total	19	3.762			

Keterangan: tn = tidak nyata

Tabel lampiran 9a. Rata-rata pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	1.30	0.90	0.60	0.50	1.40	4.70	0.94
M1	0.90	1.40	0.90	0.60	0.90	4.70	0.94
M2	1.10	2.40	1.20	0.70	1.90	7.30	1.46
M3	0.30	1.60	2.10	2.00	2.70	8.70	1.74
Total	3.60	6.30	4.80	3.80	6.90	25.40	5.08

Tabel lampiran 9b. sidik ragam pertambahan lebar daun tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) ke III (4 MST- 3 MST)

Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	2.374	0.791	2.453 ^{tn}	0.114
Ulangan	4	2.177	0.544		
Galat	12	3.871	0.323		
Total	19	8.422			

Keterangan: tn = tidak nyata

Tabel lampiran 10a. Rata-rata panjang akar tanaman sawi hijau
(*Brassica juncea* L.) umur 4 MST

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	39.00	20.00	15.00	5.00	23.00	102.00	20.40
M1	30.00	5.50	21.00	8.20	25.00	89.70	17.94
M2	21.00	22.00	4.50	11.00	27.00	85.50	17.10
M3	19.50	19.00	26.00	23.00	25.00	112.50	22.50
Total	109.50	66.50	66.50	47.20	100.00	389.70	77.94

Tabel lampiran 10b. Sidik ragam panjang akar tanaman sawi hijau
(*Brassica juncea* L.) umur 4 MST

Sumber	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Keragaman(Sk)					
Perlakuan	3	90.013	30.004	0.465 ^{tn}	0.712
Ulangan	4	672.343	168.086		
Galat	12	774.329	64.527		
Total	19	1536.686			

Keterangan: tn = tidak nyata

Tabel lampiran 11a. Rata-rata bobot basah tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.)
umur 4 MST

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	I	II	III	IV	V		
M0	9.16	10.55	11.55	10.00	6.60	47.86	9.57
M1	10.65	10.55	8.74	10.55	7.58	48.07	9.61
M2	14.79	12.19	11.38	10.55	10.55	59.46	11.89
M3	19.71	10.00	8.50	5.94	19.13	63.28	12.66
Total	54.31	43.29	40.18	37.04	43.85	218.66	43.73

Tabel lampiran 11b. Sidik ragam bobot basah tanaman sawi hijau
(*Brassica juncea* L.) umur 4 MST


Sumber Keragaman(Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	3	37.398	12.466	0.979 ^{tn}	0.435
Ulangan	4	42.393	10.598		
Galat	12	152.870	12.739		
Total	19	232.662			

Keterangan: tn = tidak nyata

Alat dan Bahan

Gambar lampiran 1. Alat






Gambar lampiran 2. Bahan




Gambar lampiran 3. Persiapan wadah



Gambar lampiran 4. Proses pembuatan serbuk sabut kelapa



Gambar lampiran 5. Proses pembuatan arang sekam



Gambar lampiran 6. Penyemaian



Gambar lampiran 7. Tanaman umur 3 MST



Gambar lampiran 8. Tanaman umur 4 MST



Gambar lampiran 9. tanaman perlakuan M0



Gambar lampiran 10. Perlakuan tananam M1




Gambar lampiran 11. Perlakuan tananam M2



Gambar lampiran 12. Perlakuan tananam M3



Gambar lampiran 13. Tata letak acakan tananan sawi hijau (*Brassica juncea*. L.)



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Risnawati B, lahir di Data pada tanggal 09 Januari 1993 merupakan anak kedua (terakhir) dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Burhanuddin, dan ibu Rabasiah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Karebasse dan lulus pada tahun 2005, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di Mts. Muhammadiyah Kaluarrang lulus pada tahun 2008 dan SMAN 1 Bontonompo lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2012. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Serbuk Sabut Kelapa (*Cocopeat*) Pada Media Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.) Secara Hidroponik” dan mendapat gelar S1 pada tahun 2016.

ALAUDDIN
M A K A S S A R