

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN TEMBAKAU (*Nicotiana tobaccum*)  
DENGAN EKSTRAK DAUN SIRSAK (*Annona muricata l*) TERHADAP  
KEMATIAN LALAT RUMAH (*Musca domestica*)  
(UJI PERBANDINGAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**ANDI NUR RIFA'ATIL FAHMIYAH AR**

**NIM : 70200112089**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR 2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Takalar, November 2016

Penyusun,

Andi Nur Rifa'atil Famiyah AR  
NIM: 70200112086



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tobaccum*) Dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona Muricata L*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca Domestica*) (Uji Perbandingan)”, yang disusun oleh Andi Nur Rifa’atil Fahmiah AR, NIM: 70200112089, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 28 November 2016 M  
28 Shafar 1438

H  
**DEWAN PENGUJI**

Penguji I : Muh. Saleh Jastam, SKM, M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes (.....)

Pembimbing II : Emmi Bujawati, SKM, M.Kes (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP: 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun sebuah Skripsi Kesehatan Lingkungan yang berjudul “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tobaccum*) Dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona Muricata L*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca Domestica*) (Uji Perbandingan)”. Sebagai syarat dalam penyelesaian pendidikan di Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad saw., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban saat ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Andi Abd Rahman dan Ibunda Andi Hasmin yang telah membimbing penulis dan memberikan bantuan baik dari segi moril maupun material. Serta kepada saudara-saudariku yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan semangat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Hi selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku wakil rektor bidang akademik pengembangan lembaga.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku wakil rektor bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan.
4. Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D., selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama
5. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep N.s., M.Kes selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes. Sebagai ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Azriful SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Emmy Bujawati, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas menyediakan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Saleh Jastam, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. Supardin., M.Hi selaku Penguji Integrasi Keislaman yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.

10. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Pihak Laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam proses penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Kesmas Angkatan 2012 (Achilles), khususnya Kesmas C '012 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
13. Teman-teman di Peminatan Kesehatan Lingkungan (Dewi, Iffah, Nuwa, Teten, Itha, Icha, Indah, Sukma, Ummi Aliah, Wahyu, Alim, Imam, Diman dan Ikhsan) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.
14. Sahabat- sahabat tersayang GG10 (Nuwa, Icha, Uni, Gagy, Ina, Dhifa, Nurika, Fate) yang selalu memotivasi dan memberi semangat.
15. Saudara-saudara seposko PBL di Desa Labbo Kec.Tompobulu Bantaeng (Nure, Wati, Fate, Inayah, Sam, Diyah, Sakya, Ajijah) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.
16. Sahabat-sahabat tersayang Alumni MAN 2 MODEL Makassar khususnya IPA3 (Indah, Thasya, Nisha, Khaeriyah) yang selalu memberikan semangatnya.

Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, penulis tidak mampu untuk membalasnya. Maka dari itu peneliti hanya dapat menyerahkan semua itu kepada Allah swt., semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat suatu ganjaran/pahala.


Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhirnya, harapan

dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Samata, 26 Oktober 2016

Penyusun

Andi Nur Rifa'atil Fahmiyah  
NIM 70200112089



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	7
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Tentang Lalat Rumah.....	13
B. Hubungan Lalat Terhadap Kesehatan .....	20
C. Pengendalian Lalat Rumah .....	22
D. Tinjauan Umum dan Kandungan Daun Tembakau .....	25

E. Tinjauan Umum dan Kandungan Daun Sirsak .....	28
F. Insektisida Hayati Dari Tumbuhan .....	30
G. Pemanfaatan Tumbuhan Dalam Prespektif Islam .....	32
H. Kerangka Teori .....	37
I. Kerangka Konsep .....	38
<b>BABA III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Parameter Penelitian .....	44
F. Alur Penelitian .....	45
G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen .....	46
H. Instrument Penelitian .....	46
I. Prosedur Penelitian .....	48
J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
B. Analisis Data .....	51
C. Pembahasan .....	61
D. Keterbatasan Peneliitian .....	71
<b>BABA V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65

B. Implikasi..... 66

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Penggunaan Insektisida Hayati/Botani .....10

Tabel 3.1	Ulangan (replikaasi) Perlakuan.....	41
Tabel 4.1	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau ( <i>Nicotiana tobaccum</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Pertama....	51
Tabel 4.2	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau ( <i>Nicotiana tobaccum</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Kedua.....	52
Tabel 4.3	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau ( <i>Nicotiana tobaccum</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Ketiga.....	53
Tabel 4.4	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau ( <i>Nicotiana tobaccum</i> ) dengan Berbagai Konsentrasi.....	54
Tabel 4.5	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak ( <i>Anonna muricata</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Pertama....	55
Tabel 4.6	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak ( <i>Anonna muricata</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Kedua.....	55
Tabel 4.7	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak ( <i>Anonna muricata</i> ) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Ketiga.....	56
Tabel 4.8	Data Jumlah Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak ( <i>Anonna muricata</i> ) dengan Berbagai Konsentrasi.....	57

Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Friedman Test</i> Pengukuran Kematian Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak di dalam Kandang Uji .....	58
Tabel 4.10	Hasil Uji <i>T-Test</i> Pengukuran Kematian Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak dengan Variasi Konsentrasi di dalam Kandang Uji .....	59
Tabel 4.11	Hasil Uji <i>Analisis Probit</i> Pengukuran Kematian Lalat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak dengan Variasi Konsentrasi di dalam Kandang Uji .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Morfologi Lalat

Rumah

15

Gambar 2.2 Siklus Lalat

Rumah

17

Gambar 2.3 Siklus Penularan Penyakit Pada Lalat

Rumah

22

Gambar 2.4 Gambar Daun

Tembakau

27

Gambar 2.5 Gambar Daun

Sirsak

30

Gambar 2.6 Kerangka

Teori

36

Gambar 2.7 Kerangka

Konsep

.....

37

Gambar 3.1 Desain

Penelitian

.....

39

Gambar 3.2 Alur

Penelitian

.....

44



## ABSTRAK

**Nama** : Andi Nur Rifa'atil Fahmiyah AR  
**NIM** : 70200112089  
**Judul Skripsi** : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tobaccum*) Dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona Muricata L*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca Domestica*) (Uji Perbandingan)

---

Lalat rumah (*Musca domestica*) adalah lalat yang banyak terdapat di Indonesia. Lalat ini merupakan vektor, dimana cara penularan yang paling sederhana dan sering terjadi adalah secara mekanis. Pada cara ini, vector menyebarkan parasit melalui kontak dengan *host* tanpa disertai perkembangbiakan parasit dalam tubuh lalat. Perannya sebagai vektor mekanis, disertai dengan jumlahnya yang banyak dan hubungannya yang erat dengan lingkungan hidup manusia maka jenis lalat rumah (*Musca domestica*) ini merupakan jenis lalat yang penting untuk diwaspadai ditinjau dari sudut kesehatan manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) serta untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak pada konsentrasi 60%, 70%, dan 80% terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) dan ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak dikatakan mampu mematikan lalat rumah apabila mencapai LC50.

Berdasarkan hasil uji *Paired Sample test* dan Uji *Friedman Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada semua perlakuan baik pada perlakuan ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak yaitu sig. <0.05 maka dinyatakan bahwa ekstrak tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) efektif terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).

Implikasi pada penelitian ini yaitu untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) yang lebih efektif dalam membunuh lalat rumah dalam ruangan dengan skala yang besar, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis.

---

**Kata Kunci** : Ekstrak daun Tembakau, Ekstrak Daun Sirsak, Jumlah Lalat Rumah yang Mati

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Lalat rumah (*Musca domestica*) adalah lalat yang banyak terdapat di Indonesia. Lalat ini merupakan vektor, dimana cara penularan yang paling sederhana dan sering terjadi adalah secara mekanis. Pada cara ini, vector menyebarkan parasit melalui kontak dengan *host* tanpa disertai perkembangbiakan parasit dalam tubuh lalat. Perannya sebagai vektor mekanis, disertai dengan jumlahnya yang banyak dan hubungannya yang erat dengan lingkungan hidup manusia maka jenis lalat rumah (*Musca domestica*) ini merupakan jenis lalat yang penting untuk diwaspadai ditinjau dari sudut kesehatan manusia (Rahajoe, 2011 : 2).

Dilihat dari kebiasaan lalat yang menyukai tempat-tempat seperti tempat sampah, maka kotoran mudah melekat pada bulu-bulu halus yang meliputi seluruh badan dan kaki-kaki lalat yang menyebabkan mudahnya lalat mentransmisikan parasit maupun organisme lain ke manusia. Kondisi lingkungan yang kotor dan berbau dapat merupakan tempat yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bagi lalat rumah.

Lalat tidak mungkin diberantas habis, melainkan dikendalikan sampai batas yang tidak membahayakan. Pengendalian lalat dapat dilakukan pada berbagai stadium dalam siklus hidupnya, sejak telur hingga dewasa (Sayono, 2005 : 3). Contoh penularan penyakit akibat *Musca domestica* adalah *amoebiasis*, *disentri amoeba* oleh *protozoa*, diare, *askariasis*, dan sebagainya (Soedarto, 2007 : 3). Banyaknya penyakit yang dapat ditularkan ke manusia maka perlu adanya proses

pengendalian yang efektif untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh lalat rumah (*Musca domestica*).

Yang kita ketahui Lalat rumah berperan sebagai salah satu vector yang dapat berperan dalam penularan penyakit seperti diare, thypus, parathypus, disentri dan cholera, tubuh lalat berbulu halus dan pada kakinya terdapat bulu-bulu yang mengandung cairan semacam perekat sehingga benda yang kecil mudah melekat, seekor lalat dapat membawa 6.500 jasad renik.

Lalat perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Lalat memiliki kemampuan reproduksi yang amat cepat, seekor lalat betina mampu bertelur 5 sampai 6 kali sebanyak 100 - 150 butir untuk setiap kalinya, atau 500 – 900 butir sepanjang hidupnya. Kemampuan dalam bereproduksi akan meningkat jika berada pada lingkungan yang sesuai terutama banyak bahan organik yang membusuk seperti sampah, tinja, dan bangkai (Misnosudar, 2008 : 5).

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), diare adalah penyebab nomor satu kematian anak di bawah lima tahun (balita) di seluruh dunia. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Hasil Survei Kesehatan Rumah menunjukkan angka kematian akibat diare adalah 23 per 100 ribu penduduk dan pada balita adalah 75 per 100 ribu balita (Depkes RI, 2005: 2).

Tangga ( SKRT) tahun 2004, Menurut Depkes RI (2009), seluruh insiden diare di Indonesia, 60-70% di antaranya anak-anak di bawah umur 5 tahun. Setiap anak mengalami diare rata-rata 1 sampai 2 kali setahun dan secara keseluruhan, rata-rata mengalami 3 kali episode diare per tahun ( Bela, 2009 : 2). Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Menurut hasil Riskesdas 2007, diare

merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%). Hasil survey morbiditas diare menunjukkan penurunan angka kesakitan penyakit diare yaitu dari 423 per 1.000 penduduk pada tahun 2006 turun menjadi 411 per 1.000 penduduk pada tahun 2010. Jumlah penderita pada KLB diare tahun 2012 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2011 dari 3.003 kasus menjadi 1.585 kasus pada tahun 2012. KLB diare terjadi di 15 provinsi dengan penderita terbanyak terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 292,274 dan 241 penderita.

Menurut Riskesdas (2013) insiden diare ( $\leq 2$  minggu terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala pada seluruh kelompok umur sebesar 3,5% (kisaran menurut provinsi 1,6% - 6,3%) dan insiden diare balita sebesar 6,7 % (kisaran provinsi 3,3% - 10,2%). Sedangkan *period prevalence* diare pada seluruh kelompok umur ( $\geq 2$  minggu - 1 bulan terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala sebesar 7 % dan balita sebesar 10,2%

Jumlah penderita pada KLB diare tahun 2013 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2012 dari 1.654 kasus menjadi 646 kasus pada tahun 2013. KLB diare pada tahun 2013 terjadi di 6 provinsi dengan penderita terbanyak terjadi di Jawa Tengah yang manvapai 294 kasus. Sedangkan angka kematian (CFR) akibat KLB diare tertinggi terjadi di Sumatera Utara yaitu 11,76%. Secara nasional angka kematian (CFR) pada KLB diare tahun 2013 sebesar 1,08%. Sedangkan target CFR pada KLB diare diharapkan  $<1\%$ .

Kemudian pada tahun 2014 terjadi 6 KLB diare yang tersebar di 5 provinsi, 6 kabupaten/kota. Dengan jumlah penderita 2.549 orang dengan kematian 29 orang pada provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, NTT, dan Jawa Timur.

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyakit diare adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan salah satunya adalah diare dari perantara vector yaitu lalat rumah, dengan begitu kita bisa memanfaatkan tumbuhan tembakau dan sirsak untuk membunuh vector (lalat rumah) tersebut.

Salah satu tumbuhan yang digunakan untuk insektisida hayati yaitu daun tembakau. Daun tembakau adalah jenis tanaman yang memiliki banyak fungsi, diantaranya digunakan sebagai insektisida nabati yang mampu untuk membunuh serangga dan mengendalikan jenis serangga lainnya. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk membunuh lalat pada penelitian ini adalah bagian daunnya yang dikeringkan kemudian dicampur dengan pelarut. Etanol 96%.

Dalam penelitian Suprpto ( 2001 : 2), ia menguji keefektifan zat kimia yang terkandung pada daun tembakau (*Nicotin*). Konsentrasi ekstrak daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*), dibagi menjadi 5 dengan lama pemaparan 24 jam, dengan lama pemaparan 24 jam, pada dosis 60 gr/l membunuh 7 ekor lalat rumah (*Musca domestica*) dengan lama pemaparan 24 jam, dosis 70 gr/l membunuh 10 ekor lalat rumah (*Musca domestica*) dengan lama pemaparan 24 jam, dosis 90 gr/l membunuh 10 ekor lalat rumah (*Musca domestica*) dengan lama pemaparan 24 jam, dosis 110 gr/l membunuh 15 dan 120 gr/l dapat membunuh 120 ekor lalat rumah (*musca domestica*) dengan lama pemaparan 24 jam.

Tika Julaiwa Poerba (2003 : 3) pernah meneliti efektifitas ekstrak daun tembakau terhadap kematian lalat rumah. Dalam penelitiannya, ia menguji keefektifan zat kimia yang terkandung pada daun tembakau (*Nicotin*), konsentrasi ekstrak daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*), dibagi menjadi 4 dosis yaitu: 90 gr/l, 110 gr/l, 130 gr/l dan 150 gr/l serta kontrol dengan 4 kali ulangan, dengan hasil yang didapatkan adalah pada masing-masing dosis dengan 4 kali pengulangan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. LD-50 ekstrak daun tembakau dalam 6 jam pada dosis 130 gr/l dalam 12 jam pada dosis 110 gr/l dan dalam 24 jam pada dosis 90 gr/l. Dosis efektif ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) yang dapat membunuh 50% atau lebih lalat rumah dalam waktu paling singkat adalah dosis 130 gr/l.

Buah sirsak termasuk buah semu, daging buah lunak atau empuk, berwarna putih, berserat, berbiji hitam pipih, kulitnya berduri, tangkai buah menguning, aromanya harum, dan rasanya manis agak asam segar. Buah sirsak yang normal dan sudah cukup matang mempunyai berat  $\pm 500$  gr, warna kulit agak terang, hijau agak kekuningan dan mengkilap. Bentuk buah bagian ujung agak membulat dengan diameter  $\pm 5$  cm, diameter bagian tengah  $\pm 7$  cm, serta panjang buah  $\pm 17$  cm. kerapatan duri maksimal 2-3 buah per 4 cm (diukur pada bagian buah yang durinya paling jarang).

Binar Eka Prananda melakukan penelitian Daun sirsak (*Annona muricata L*) memiliki kemampuan sebagai insektisida nabati untuk pengendalian hama lalat buah (*Bactrocera carambola L*) karena mengandung senyawa bioaktif acetogenin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui LC50 serta mengetahui efektivitas bubuk daun sirsak berdasarkan mortalitas, fertilitas, morfologi, perilaku, siklus hidup dan faktor lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan konsentrasi daun sirsak dengan variasi 4.99 %, 6.10 %, 7.19 %, 8.26 %, 9.30 %, 13.04 % dan 0 % (control) yang masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bubuk daun sirsak mampu membunuh 50 % hewan uji (LC50) 48 jam pada konsentrasi 8,38 %. Selain itu terjadi penurunan fertilitas dan terjadi perubahan perilaku menjauhi pakan dan perubahan perilaku terbang imago yang semakin lamban.

Tanaman sirsak dapat digunakan sebagai bahan insektisida, pada sirsak ditemukan senyawa bersifat bioaktif yang dikenal dengan nama *acetogenin*. Pada konsentrasi tinggi senyawa *acetogenin* akan bersifat *antifeedant* bagi serangga, sehingga menyebabkan serangga tidak mau makan. Pada konsentrasi rendah dengan pemberian oral bersifat sebagai racun perut dan dapat menyebabkan kematian, senyawa ini juga bersifat sitotoksik sehingga menyebabkan kematian sel. Daun sirsak yang diremas-remas dapat digunakan sebagai *repellent* tikus rumah.

Dari sampel diatas maka penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan Daun Sirsak (*Annona muricata l*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) (Uji Perbandingan).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) ?
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) ?

### **C. Hipotesis**

Peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata L*) efektif mematikan Lalat Rumah (*Musca domestica*).
- b. Ada hubungan antara variasi konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata L*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).

## 2. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) tidak efektif mematikan Lalat Rumah (*Musca domestica*).
- b. Tidak ada hubungan antara variasi konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).

## **D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif**

### 1. Defenisi Operasional

Untuk menghindari bias dalam memahami istilah- istilah yang akan digunakan pada penelitian ini, maka akan dirumuskan dan dijelaskan dari istilah- istilah tersebut

- a. Efektivitas ekstrak adalah keberhasilan ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak dalam mematikan lalat rumah yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antara konsentrasi dan waktu paparan (pengamatan selama 1 jam setiap 10 menit diperiksa).
- b. Ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak adalah daun tembakau dan sirsak yang telah diekstraksi dengan cara maserasi dengan etanol.
- c. Konsentrasi ekstrak adalah konsentrasi ekstrak untuk perlakuan dalam penelitian ini yaitu: 60%, 70%, dan 80%

d. Jumlah lalat rumah adalah banyaknya lalat rumah yang mati setelah pemberian perlakuan.

## 2. Kriteria Objektif

a. Ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) dikatakan efektif mematikan lalat rumah apabila ada peningkatan kematian pada lalat rumah apabila mencapai LC50.

b. Ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata l*) dikatakan tidak efektif mematikan lalat rumah apabila tidak ada peningkatan kematian pada lalat apabila tidak mencapai LC50.

## ***E. Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk mempermudah peneliti dalam penulisan skripsi dan penelitian ini lebih terarah dan berajalan dengan baik maka perlu menetapkan batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian Kesehatan Masyarakat, ilmu Kesehatan Lingkungan.
2. Masalah penelitian dibatasi pada efektivitas ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak terhadap Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan Daun Sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*)
3. Lalat rumah yang diteliti adalah lalat rumah yang sebelumnya ditangkap di Cafeteria Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ekstrak senyawa aktif daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) yang digunakan adalah *anabirine, anatobine, myosine, nicotinoid, nicotelline,*

*nicotine, nicotyrine dan pirrolidine* sehingga bersifat toksik untuk lalat rumah (*Musca domestica*).

5. Ekstrak senyawa aktif daun sirsak (*Annona muricata L*) yang digunakan adalah *acetogenin* yang memiliki aktivitas toksik.
6. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental *post test only control group design* dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan Daun Sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).
7. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai Mei-Juli 2016.

#### **F. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).

##### 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak pada konsentrasi 60%, 70%, dan 80% terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).
- b. Ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak dikatakan mampu mematikan lalat rumah apabila mencapai LC50.

## G. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Penggunaan Insektisida Hayati/Botani**

N O	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1.	Sri rahmi Yasin, Herlina Jusuf, Lia Amalia	Pengaruh ekstrak daun tembakau ( <i>nicotiana tabacum</i> ) sebagai Insektisida hayati terhadap pengendalian jumlah populasi lalat rumah ( <i>musca domestica</i> )	Variabel independen dalam penelitian ini adalah ekstrak daun tembakau dengan dosis 60 gr/l, 80 gr/l, 100 gr/l dan 120 gr/l, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah kematian lalat rumah ( <i>Musca domestica</i> ).	Penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni dengan desain <i>post test only control group design</i> .	Lalat rumah ( <i>Musca domestica</i> )	Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan adanya pengaruh dosis ekstrak daun tembakau ( <i>Nicotiana tabacum</i> ) sebagai insektisida hayati terhadap pengendalian jumlah populasi lalat rumah ( <i>Musca domestica</i> ) dengan nilai $p = 0,036$ ( $p < \alpha$ ) dimana $\alpha = 0,05$ . Konsentrasi efektif ekstrak daun tembakau untuk membunuh lalat rumah ( <i>Musca domestica</i> ) yaitu pada dosis 130 gr/l ekstrak daun temba kau.
2.	Tika Juleiva Purba	Efektivitas Daun Tembakau ( <i>Nicotiana tobacum</i> )	Penelitian ini dilakukan dengan 4 dosis ekstrak daun tembakau	Penelitian menggunakan	Lalat Rumah ( <i>Musca</i>	Hasil pengamatan pada masing-masing dosis 4 kali ulangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. LD-50

		sebagai Insektisida Hayati dalam membunuh Latat Rumah ( <i>Musca domestica</i> ).	(nicotiana tobacum) yaitu : 90 gr/l, 110 gr/l, 130 gr/l dan 150 gr/l serta control dengan 4 kali ulangan.	jenis Eksprimental	<i>domestica</i> ) stadium dewasa.	ekstrak daun tembakau dalam 6 jam pada dosis 130gr/l, dalam 12 jam pada dosis 110gr/l dan dalam 24 jam pada dosis 90gr/l. dosis efektif ekstrak daun tembakau yang dapat membunuh 50% atau lebih lalat rumah dalam waktu paling singkat adalah dosis 130gr/l.
3.	Binar Eka Prananda	Efektivitas Bubuk Daun Sirsak ( <i>Annona muricata Linn</i> ) Sebagai Pengendali Hama Lalat Buah.	Penelitian ini dilakukan dengan memberikan konsentrasi daun sirsak dengan variasi 4.99 %, 6.10 %, 7.19 %, 8.26 %, 9.30 %, 13.04 % dan 0 % (control) yang masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali ulangan.	Penelitian menggunakan jenis Eksprimental	Lalat Buah ( <i>Bactrocera carambolae linn</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bubuk daun sirsak mampu membunuh 50 % hewan uji (LC50) 48 jam pada konsentrasi 8,38 %. Selain itu terjadi penurunan fertilitas dan terjadi perubahan perilaku menjauhi pakan dan perubahan perilaku terbang imago yang semakin lamban.

## ***H. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu yang dapat menjadi bahan referensi atau landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya demi perkembangan bidang kesehatan lingkungan dalam rangka perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan Daun Sirsak (*Annona muricata L*) alternatif, aman, dan ramah lingkungan dalam upaya pengendalian terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).

### 2. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini diharapkan bukan hanya berkembang sebagai bahan informasi di bidang akademik saja, namun juga bisa berkembang secara aplikatif di masyarakat yaitu bisa menjadi alternatif aman bagi masyarakat yang ekonomis dan ramah lingkungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Lalat Rumah

##### 1. Identifikasi

Lalat adalah salah satu insekta ordo diptera yang mempunyai sepasang sayap berbentuk membran. Saat ini telah ditemukan tidak kurang dari 60.000 sampai 100.000 species lalat. Namun tidak semua species ini perlu diawasi, karena beberapa diantaranya tidak berbahaya bagi manusia ditinjau dari segi kesehatan (Depkes RI, 1991 : 10). Lalat adalah serangga dari ordo diptera yaitu mempunyai sepasang sayap berbentuk membiru, dalam hal ini lalat berperan sebagai vector yang membawa kuman penyebab penyakit dari orang yang sakit ke orang yang sehat, serta dapat membawa kotoran dari tempat hinggapnya yang jorok menuju kerumah bahkan langsung ke bahan makanan jadi (Syamsuddin S, 2003 : 6).

Ordo diptera terdiri dari 3 sub ordo dan berbagai family, salah satu sub ordo yang erat hubungannya dengan manusia adalah sub ordo *Cyclorhappa*, yaitu terdiri dari tiga family *Muscidae*, family *Cliphoridae* dan family *Sarcophagidae*. Ketiga family ini sering disebut istilah Domestic flies (Lalat domestic), karena didalam kehidupannya sangat erat hubungannya dengan manusia. (Zainal Abidin, 2003 : 7)

Ciri-ciri lalat rumah (*Musca domestica*) Sel 2A pendek dan tidak mencapai tepi sayap, sel R5 tertutup atau hampir tertutup. Bawah permukaan *Scutellum* biasanya tanpa rambut-rambut lurus, umumnya mempunyai lebih dari satu rambut-rambut sternopleural, lalat rumah dapat ditemukan disemua tempat, beberapa penting sebagai hama, ada yang bertindak sebagai vector penyebar penyakit kepada manusia, lalat rumah mempunyai proboscis pendek dan berdaging namun tidak

menggingit (Christina Lilies S, 1991 : 8). Tanda-tanda lalat domestik adalah terdiri dari 3 segmen dan diantara sayap dan badannya terdapat caliptera yang menonjol dengan panjang rata-rata 3-20 mm. Secara mudah lalat domestik dapat dilihat berdasarkan warna dada serta perut kelompok yaitu :

- a. Kelompok dengan warna dada kusam yang meliputi lalat rumah, jenis kecil, lalat kandang dan lalat daging.
- b. Kelompok dengan dada suram dan warna perut cerah metalik (seperti logam) bias hijau atau ungu.
- c. Kelompok dengan warna dada dan perut hijau metalik mengkilat, biru atau ungu.

## **2. Morfologi Lalat Rumah**


Menurut Sucipto (2011) bahwa: “Lalat rumah termasuk *Family Muscidae* sebarannya diseluruh dunia, berukuran sedang dan panjang 6-8 mm, berwarna hitam keabu-abuan dengan empat garis memanjang gelap pada bagian dorsal toraks dan satu garis hitam medial pada abdomen dorsal, matanya pada yang betina mempunyai celah yang lebih lebar sedangkan lalat jantan lebih sempit, antenanya terdiri dari tiga ruas, bagian mulut atau proboscis lalat disesuaikan khusus dengan fungsinya untuk menyerap dan menjilat makanan berupa cairan, sayapnya mempunyai vena 4 yang melengkung tajam ke arah kosta mendekati vena 3, ketiga pasang kaki lalat ini ujungnya mempunyai sepasang kuku dan sepasang bantalan disebut pulvilus yang berisi kelenjar rambut”.

Seperti serangga pada umumnya, tubuh lalat dewasa terdiri atas tiga bagian utama yaitu kepala, dada dan perut. Kepala (caput) terdiri dari enam ruas yang telah menyatu pada kepala terdapat sepasang mata majemuk, mata tunggal, sepasang antenna dan mulut dengan type mengisap. Larva tumbuh pada komposisi materi

organik. Setelah dewasa hidup disekitar mamalia dan piaraan serta manusia dan berbahaya, contoh: *Musca domestica* (lalat rumah) dengan mulut berlubang dan meracuni makanan dengan penyakit: *Calliphora vomitoria* dan *Lucilia caesar*, berwarna hijau: *Stomoxys macellaria*, ulat di hidung mamalia menyebabkan kematian: *Glossina*, lalat tse-tse membawa *trypanosoma* penyebab penyakit tidur (Hedikastomo, 1988).

Pada bagian dada (*thorax*) terdiri dari tiga ruas yaitu: *prothorax*, *mesothorax*, dan *metathorax* yang ada setiap ruasnya masing-masing terdapat sepasang kaki, kakinya tersusun atas ruas-ruas antara lain: *coxa*, *trochanter*, *femur*, *tibia*, *pretarsus* dan beberapa *tarsus*. Pada mesothorax terdapat sepasang sayap dan pada metathorax terdapat sepasang halter. Sayapnya mempunyai longitudinal line 4 yang jalannya menarik ke atas sehingga ujungnya hampir bertemu dengan long 3 (H. Adang Iskandar, 2002).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Morfologi Lalat Rumah (*Musca Domestica*)

(Sumber Wikipedia,2013)

### 3. Siklus Hidup Lalat Rumah

Lalat adalah insekta yang mengalami methamorphosis sempurna, artinya didalam siklus hidupnya melalui tahap-tahap telur, larva, kepompong dan dewasa. Perkembangan memerlukan waktu antara 7-22 hari tergantung dari suhu dan makanan yang tersedia. Lalat betina umumnya dapat menghasilkan telur pada usia 4-8 hari, dengan 75-150 butir sekali bertelur 5-6 kali (Depkes, 1991 :10).

a. Stadium Pertama (Stadium Telur)

Stadium ini lamanya 12-24 jam. Bentuk telur melonjong bulat berwarna putih dan biasanya menetas setelah 8-30 jam, tergantung suhu sekitar telur diletakkan pada bahan-bahan organik yang lembab ( sampah, kotoran, binatang, dan lain-lain ) pada tempat yang tidak langsung kena matahari.

b. Stadium Kedua ( Stadium Larva)

Stadium larva merupakan stadium terbanyak, terdapat 3 tingkat, yaitu :

- 1) Pertama yaitu : setelah keluar dari telur, belum banyak bergerak dan memiliki ukuran panjang 2 mm, berwarna putih, tidak bermata dan berkaki, amat aktif dan ganas terhadap makanan.
- 2) Kedua yaitu : tingkat dewasa, banyak bergerak dan memiliki ukuran panjang 4 mm.
- 3) Ketiga yaitu tidak banyak bergerak dan memiliki ukuran panjang 12 mm, tingkat ini memerlukan 3-9 hari.


c. Stadium Ketiga (Stadium Pupa)

Lamanya stadium ini 2-8 hari atau tergantung dari temperatur suhu setempat. Bentuk bulat lonjong dengan warna coklat hitam, stadium ini kurang lebih 5 mm.

d. Stadium Keempat (Stadium Dewasa)

Stadium ini adalah stadium terakhir yang sudah berwujud serangga yaitu lalat. Dari stadium telur sampai stadium dewasa memakan waktu 7 hari atau lebih tergantung pada keadaan sekitar tersedianya makanan, suhu dan kelembapan. Siklus hidup lalat rumah diketahui dari gambar dibawah ini (Serli, 2003 : 12).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2 Siklus Lalat Rumah (*Musca domestica*)

(Sumber Wikipedia,2013)

#### 4. Bionomik Lalat Rumah (Pola Hidup)

Sucipto (2011) menyatakan bahwa: “ Tempat yang disenangi lalat adalah tempat yang basah seperti sampah basah, kotoran binatang, tumbuh-tumbuhan yang busuk, kotoran yang menumpuk secara kumulatif”. Depkes RI (1991) memaparkan bahwa : “Tempat yang disenangi adalah tempat basah, benda-benda organik, tinja, sampah basah, kotoran binatang, tumbuh-tumbuhan busuk, kotoran yang menumpuk secara kumulatif (dikandang hewan) sangat disenangi oleh larva lalat, sedangkan yang tercecer jarang dipakai sebagai tempat berbiak lalat”. Secara umum tempat perindukan bagi lalat adalah tempat yang kotor dan basah.

Lalat mempunyai pola hidup tersendiri sesuai dengan keberadaannya sebagai insekta yang bertindak sebagai vector penyakit.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dari uraian berikut ini :

a. Kebiasaan Terbang

Jarak terbang lalat sangat tergantung pada makanan yang tersedia dan tidak suka terbang terus menerus. Lalat akan cepat tersebar dari sarangnya dan akan terbang sejauh 6-9 km. kadang-kadang dapat mencapai 19-20 km dari tempat berkembang biak. Menurut penyelidikan jarak terbang lalat pada daerah pemukiman yang padat penduduknya adalah sekitar 0,5 km.

b. Makanan

Baik lalat jantan maupun lalat betina hidup dari semua jenis makanan manusia, sampah dan tinja utamanya dalam wujud cairan, sedangkan makanan yang kering terlebih dahulu dibasahi dengan air ludahnya sehingga dapat dihisap. Air merupakan bagian makanan lalat yang penting dan biasanya hidup lebih dari 48 jam tanpa air. Pada waktu makan sering kali memuntahkan sebagian makanannya, bahkan meninggalkan bibit-bibit penyakit yang terdapat pada kaki, badan dan sayap. Apabila dibiarkan tanpa gangguan, muntahan dan kotoran lalat yang telah mengering membentuk semacam noda-noda kecil berwarna hitam (Adnyana. 1985).

c. Tempat Perindukan

Tempat yang disenangi adalah berupa kotoran (manusia dan hewan) benda-benda organik, sampah dan bahan-bahan lain yang berasal dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang membusuk.

#### d. Tempat Istirahat

Lalat beristirahat pada tempat-tempat tertentu. Pada siang hari jika tidak aktif maka lalat dapat ditemukan beristirahat pada lantai, dinding, plafond, jemuran pakaian, rumput-rumput, kawat listrik, tanah, tinja, anak tangga, kaleng-kaleng sampah dan tempat-tempat dengan tepi yang tajam yang permukaannya vertical. Biasanya tempat istirahat ini terletak berdekatan dengan tempat makanan atau tempat berkembang biak dan biasanya berlindung dari angin.

#### e. Lama Hidup / Umur

Lama kehidupan lalat tergantung pada makanan, air dan temperature. Pada musim panas berkisar pada 2-4 minggu, sedangkan pada musim dingin bisa mencapai 70 hari. Lalat dewasa dapat bertahan hidup antara 1-2 bulan dan ada yang 6 bulan sampai 1 tahun.

#### f. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik dalam hal ini dapat dikatakan sebagai cuaca mikro (*Micro climate*) yaitu segala kondisi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan lalat, yang merupakan kombinasi antara temperature (suhu), kelembapan, sinar dan kecepatan angin :

##### 1) Temperatur

Lalat tidak aktif pada suhu di bawah  $7,5^{\circ}\text{C}$  dan akan mati pada suhu  $0^{\circ}\text{C}$ . Lalat mulai terbang jika suhu lingkungan mencapai  $11^{\circ}\text{C}$  dan aktivitasnya akan mencapai maksimum pada suhu  $32,2^{\circ}\text{C}$  dan akan menurun secara drastis jika suhu mulai meningkat sampai mencapai  $45^{\circ}\text{C}$  bahkan dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan kematian pada lalat.

## 2) Kelembaban.

Kelembaban sangat erat hubungannya dengan suhu. Kematian lalat yang diakibatkan oleh pengaruh suhu tinggi maupun rendah akan lebih terlihat jika kelembaban udara tinggi. Pada kelembaban relatif 42% sampai 55% dengan suhu diatas 15,55°C, akan memperpanjang umur lalat. Dengan kelembaban yang sama pada suhu dibawah 20°C, lalat akan aktif dan hidup lama. Lalat akan mencapai kondisi fisik optimum pada suhu tinggi dan kelembaban yang rendah.

## 3) Sinar / Cahaya

Lalat merupakan serangga phototropic artinya lalat suka bergerak ke arah cahaya. Pada malam hari lalat tidak aktif lagi bila cahaya buatan (Artificial Illumination). Pengaruh cahaya terhadap aktivitas dari lalat erat hubungannya dengan suhu dan kelembaban,

## 4) Kecepatan Angin

Lalat sangat peka terhadap angin yang keras dan tidak akan terbang jauh dalam cuaca yang berangin. Pada kondisi angin yang keras lalat dapat diterbangkan jauh. Lalat rumah diperkirakan menyebar melalui angin (Wind Borne). Dengan kecepatan angin yang rendah lalat akan terbang searah atau menentang arah angin. Lalat akan bergerak menuju bau yang merangsang, meskipun angin akan lebih keras dari biasanya. Sebaliknya lalat akan bergerak searah dengan angin meskipun angin lebih lemah karena tidak ada bau yang menarik atau merangsang (Hafni, 1999)

### ***B. Hubungan Lalat Terhadap Kesehatan***

Lalat dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lalat juga sangat besar pengaruhnya sebagai vektor biologis dalam penyebaran penyakit seperti typhus, disentri, cholera larva dari beberapa jenis lalat

menyebabkan beberapa penyakit pada manusia atau hewan kadang-kadang bias meninggal dan beberapa jenis lainnya merusak tanaman (Depkes. 1986)


2004 mengemukakan bahwa, tubuh lalat berbulu halus dan pada kakinya mengandung cairan (lembab). Seekor lalat dapat mengandung mikroorganisme sebanyak 6.500.000 bakteri dapat masuk kedalam system pencernaan selama empat minggu, bakteri dapat ditularlan kepada generasi selanjutnya.

Golongan lalat terutama lalat domestic dapat menyebabkan kuman melalui 5 jalan yaitu :

1. Melalui mulutnya
2. Melalui muntahnya
3. Melalui bulu-bulu dibadannya
4. Melalui telapak kakinya (kakinya yang lembab)
5. Melalui saluran pencernaan dalam arti melalui tinjanya.

Penyebaran penyakit oleh lalat mengeluarkan feses setiap 45 menit setiap harinya. Melalui jalan itulah beberapa pathogen tersebar. Tetapi kuman lebih banyak disebabkan oleh karena arah makanannya memuntahkan cairan serta kebiasaannya berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya misalnya : dari sampah makanan atau minuman manusia. Dari kenyataan itu berarti lalat merupakan vektor penyebar kuman pathogen secara mekanik. Untuk lebih jelasnya sistematik penyebaran kuman secara mekanik dapat dilihat pada gambar dibawah ini (Harianti, 2004).

Untuk lebih jelasnnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.3 Siklus Penularan Penyakit Pada Lalat Rumah

(Sumber Wikipedia,2013)

Penyebaran secara mekanik oleh lalat rumah dari adanya uraian tersebut maka Nampak jelas bahwa lalat rumah merupakan jenis lalat yang dapat berperan dalam penyebaran berbagai jenis penyakit.

### C. Pengendalian Lalat Rumah

Pengendalian adalah upaya yang dilakukan untuk menurunkan densitas vector sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

#### 1. Tujuan Pengendalian

- a. Secara umum tujuan pengendalian vector terdiri atas (Kusnadi. 2005) :  
Mencegah wabah vector borne diseases dengan cara : memperkecil risiko kontak manusia dengan vector penyakit dan memperkecil sumber penularan penyakit.

- b. Mencegah dimasukkannya vector atau penyakit yang baru ke suatu kawasan dengan cara : legal approaches dan Insektisida / pestisida (spraying, baiting dan traping).

## 2. Tipe Pengendalian

Secara teoritis ada 3 macam pengendalian yang dilakukan yaitu (Pratt. 1979 dalam Hafni. 1999) :

- a. Pencegahan (*Prevantion*) artinya mengupayakan agar vector tidak menjadi masalah di suatu kawasan.
- b. Penekanan (*SuoreSSION*) densitas vector, artinya berusaha menurunkan densitas vector sampai pada tingkat yang tidak membahayakan kehidupan manusia, contoh : perbaikan sanitasi lingkungan.
- c. Pemusnahan sama sekali (*Eradication*) artinya memusnahkan vector dari suatu kawasan sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Pengendalian vector pada zaman modern lebih menitik beratkan kepada management kehidupan vector sedemikian rupa sehingga tidak menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

## 3. Metode Pengendalian

Pengendalian vector khususnya lalat rumah (*Musca domestica*) dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain (Pratt, 1979 dalam Hafni 1999) :

- a. Secara fisik-mekanik

Metode ini menitik beratkan pada pemanfaatan iklim, kelembapan dan suhu yang meliputi :

### 1) Screening (Penghalang)

Upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya lalat kedalam suatu bangunan dengan memasang kasa pada segala sesuatu yang memungkinkan lalat

masuk ke dalam rumah yaitu lubang ventilasi, pintu dan jendela. Hendaknya menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat.

2) Fly Trap (Perangkap)

Perangkap lalat disamping berguna untuk penelitian atau survey dapat juga digunakan untuk melakukan pengendalian, khususnya apabila keberadaan lalat tersebut sangat mengganggu kegiatan yang dilakukan. Tegasnya penggunaan perangkap lalat ini efektif untuk kawasan terbatas.

3) Electrocutation (Pemberian Aliran Listrik)

Menggunakan sumber arus listrik di rumah dengan jalan melakukan perubahan atau menurunkan tahanannya dan meningkatkan kuat arus listrik.

4) Electric Fan (Kipas Listrik)

Terutama digunakan pada ruang pengolahan makanan. Kipas listrik tersebut ditempatkan pada ambang pintu yang menuju ke tempat pengolahan makanan. Hembusan anginnya menghalangi lalat dan serangga lainnya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Hembusan angin harus lebih besar dari 500m/menit pada ketinggian 1 meter.

b. Secara Biologis

Pengendalian vector dengan cara ini dilakukan melalui pemanfaatan tumbuhan dan hewan, parasite, predator, maupun kuman pathogen.

c. Secara Fisiologis

Metode ini dilakukan dengan cara manipulasi bahan-bahan penarik dan penolak.

d. Menggunakan Keseimbangan Genetika

Pengendalian lalat dengan cara ini dilakukan dengan cara melepaskan lalat jantan yang sudah dimandulkan dengan menggunakan cobalt (Co). cara ini secara teoritis baik tetapi tidak praktis dianjurkan untuk digunakan.

e. Secara Kimiawi

Pengendalian lalat dengan cara ini lazim dikenal dengan pengendalian menggunakan insektisida. Pengendalian dengan cara ini memberikan hasil yang cepat akan tetapi mempunyai risiko yang lebih besar. Untuk itu diharapkan bahwa pengendalian dengan cara ini merupakan alternative terakhir. Pengendalian ini terdiri atas :

- 1) Spraying (Penyemprotan) baik penyemprotan residu maupun penyemprotan ruang.
- 2) Penggunaan umpan (*Fly baits*)
- 3) Aplikasi larvasida (*Larvicides*)

Menggunakan bahan pembantu, baik bersifat menghalau maupun yang bersifat menarik.

***D. Tinjauan Umum dan Kandungan Kimia Tentang Daun Tembakau (Nicotiana tobaccum)***

Tembakau termasuk kedalam kelas Dycotiledoneae, ordo personatae, family solanaceae dan genus nicotiana. Tembakau adalah tumbuhan semusim yang ditanam untuk mendapatkan daunnya dengan genus tanaman berdaun lebar yang bersal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun digulung dalam bentuk rokok atau cerutu.

Tembakau merupakan tanaman semusim, dimana bagian tanaman yang paling umum dimanfaatkan adalah daunnya. Daun yang memiliki panjang 20-50cm dan lebar 5-30 cm ini mempunyai kandungan nikotin 2-5%. Pada daun tembakau juga ditemukan bahan bioaktif golongan alkaloid. Daun tembakau digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok, cerutu dan merupakan insektisida nabati. Ekstrak daun tembakau efektif untuk mengendalikan lalat ( Purba, 2003 ).

Menurut Tika Julaiva Poerba 2003, tanaman tembakau merupakan tanaman tropis dan dapat tumbuh dalam rentang iklim yang luas. Tembakau dapat tumbuh dari daratan rendah sampai ketinggian 2.000 m diatas permukaan laut. Suhu optimum selama pertumbuhan 27-34°C dan memerlukan intensitas cahaya matahari yang kuat. Tinggi tanaman pada kondisi pertumbuhan normal dapat mencapai 2 meter atau lebih dengan batang yang tegak, kuat, dan berkayu.

Tembakau merupakan semak semusim dan tingginya dapat mencapai 2,5 m, memiliki batang berkayu yang tegak dan berwarna hijau. Daun tunggal dengan panjang 20-50 cm dan lebar 5-30 cm. tangkai daun panjangnya 1-2 cm, berwarna hijau keputihan. Bunga majemuk dan tumbuh di ujung batang. Buah kotak, berwarna hijau ketika masih muda dan cokelat setelah tua. Temperature yang cocok untuk pertumbuhan tembakau umumnya berkisar antara 21-32,3°C, tidak menyukai iklim yang sangat kering ataupun yang sangat basah, memerlukan penyinaran cahaya matahari sepanjang hari (Bambang.C, 1998 dalam Tika Julaiva Poerba 2003).

Keputusan Menteri Pertanian (2006) menyebutkan bahwa tanaman tembakau mengandung zat alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat ampuh jika digunakan pada serangga. Zat ini sering digunakan sebagai bahan utama insektisida. Nikotin ialah sejenis senyawa organik yang dijumpai pada tanaman

tembakau (daun tembakau mempunyai kandungan nikotin paling tinggi). Rumus kimia nikotin ialah 3-(2-(N- metilpirolidinil)). Sebanyak 5% dari bobot tembakau ialah nikotin yang merupakan racun saraf kuat (potent nerve poison) dan digunakan didalam racun serangga.

Nikotin dirumuskan untuk keperluan insektisida dalam berbagai bentuk yaitu senyawa murni, nikotin sulfat dan serbuk tembakau. Nikotin murni dianggap beracun bagi mamalia dengan sosisi fetal sebesar 50 mg/kg. oelh karena itu, nikotin murni sebagai insektisida botani dibatasi penggunaannya ( Tika Jualiva Poerba 2003 ).

Spesies tembakau berjumlah lebih kurang 1800 spesies. Namun yang dikenal dalam lapangan pertembakauan ada dua jenis yaitu : *Nicotiana Tobacum* dan *Nicotiana Rustica* (Bambang.C 1992).

Untuk lebih jelasnnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.4 Gambar Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*)

(Sumber : [www.biologipedia.com](http://www.biologipedia.com) )

Daun tembakau berbentuk oval atau bulat, tergantung pada varietasnya. Daun tumbuh berselang seling (spiral) mengelilingi batang tanaman. Daun tembakau yang mengandung nikotin digunakan sebagai insektisida hayati untuk mengendalikan lalat dirumah.

Daun dan batang tembakau dapat digunakan sebagai insektisida hayati. Umumnya yang digunakan adalah daunnya. Tetapi agar lebih praktis dalam pengolahannya banyak petani yang menyertakan batangnya juga. Daun dapat digunakan langsung dalam keadaan segar (tidak muda dan tidak tua) dengan menghaluskannya terlebih dahulu atau dengan mengeringkannya (Agus.K, 2000).

Kandungan bahan kimia terpenting dalam daun tembakau adalah zat nikotin, biasanya dalam bentuk Nicotin sulfat. Nicotin yang terdapat pada daun bawah adalah 0,16 % -2,89 %, pada daun tengah 0,3 % - 3,375 %, pada daun atas 0,5 % - 4,0 %. Nikotin merupakan organik kimia yang merupakan zat beracun dan mempunyai daya toksik yang cepat menimbulkan gejala keracunan dan dapat dipakai sebagai obat pembasmi serangga (Bambang.C, 1998).

Nikotin murni merupakan hasil ekstraksi tembakau yang sangat beracun bagi hewan berdarah panas. Insektisida biasanya dipasarkan dalam bentuk nikotin sulfat dengan konsentrasi 40% cairan. Serbuknya dapat membuat iritasi kulit sehingga tidak sesuai digunakan pada tanaman pangan. Nikotin lebih efektif ketika digunakan selama cuaca panas dan dapat terdegradasi dengan cepat. Nikotin digunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga kecil seperti kutu daun, lalat, belalang dan ulat (Cruces, 2005).

#### ***E. Tinjauan Umum dan Kandungan Kimia Tentang Daun Sirsak (*Annona muricata L*)***

Buah sirsak termasuk buah semu, daging buah lunak atau empuk, berwarna putih, berserat, berbiji hitam pipih. Kulitnya berduri, tangkai buah menguning, aromanya harum, dan rasanya manis agak asam segar. Buah sirsak yang normal dan sudah cukup matang mempunyai berat  $\pm$  500 gr, warna kulit agak terang, hijau agak kekuningan dan mengkilap. Bentuk buah bagian ujung agak membulat dengan

diameter  $\pm 5$  cm, diameter bagian tengah  $\pm 7$  cm, serta panjang buah  $\pm 17$  cm. kerapatan duri maksimal 2-3 buah per 4 cm (diukur pada bagian buah yang durinya paling jarang).

Tanaman sirsak dapat digunakan sebagai bahan insektisida. Pada sirsak ditemukan senyawa bersifat bioaktif yang dikenal dengan nama acetogenin akan bersifat antifeedant bagi serangga, sehingga menyebabkan serangga tidak mau makan. Pada konsentrasi rendah pemberian oral bersifat sebagai racun perut dan dapat menyebabkan kematian. Senyawa ini juga bersifat sitotoksik sehingga menyebabkan kematian sel.

Menurut Mulyaman, (2000), daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, antara lain asimisin, bulatacin dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa acetogenin memiliki keistimewaan sebagai antifeedant. Dalam hal ini, serangga tidak lagi memakan bagian tanaman yang disukainya. Sedangkan pada konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang biasa mengakibatkan serangga hama mengalami kematian.

Lebih lanjut Dadang (1999), menyatakan bahwa senyawa acetogenin yakni acimisin, squamosin bersifat sebagai insektisida, baik efek kematian, penghambat pertumbuhan dan perkembangan maupun penghambat makan serangga. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 24 jam, baik pada konsentrasi ekstrak daun *A. muricata* 10%, 20%, 30%, 40%, bersifat sebagai racun perut dalam hal ini serangga uji aktif makan, akhirnya mengalami kematian dan bersifat sebagai antifeedant, menyebabkan larva *H. armigera* menolak makan sehingga mengakibatkan kematian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.4 Gambar Daun Sirsak (*Annona muricata l*)

(Sumber : [www.alamtani.com](http://www.alamtani.com) )

Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Biji bersifat racun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami, seperti juga biji srikaya. Daun sirsak bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, anti diare, analgetik, anti disentri, anti asma, anthelmitic, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi (McLaughlin, 2008 : 5).

Menurut penelitian yang dilakukan Jannah ( 2010 ), acetogenin merupakan senyawa polyketides dengan struktur 30-32 rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada gugus *5-methyl-2-furanose*. Rantai furanose dalam gugus *hydrofuranose* pada C<sub>23</sub> memiliki aktivitas sitotoksik, dan derivat acetogenin yang berfungsi sitotoksik adalah *asimicin*, *bulatacin*, dan *squamocin*.

#### ***F. Insektisida Hayati Dari Tumbuhan***

Secara umum, insektisida hayati diartikan sebagai suatu insektisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Insektisida hayati mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena terbuat dari bahan alami

maka jenis ini terurai (*biodegradable*) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relative aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. Tujuan lainnya adalah agar penggunaan insektisida senitesis dapat di minimalkan sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan dapat dikurangi. Senyawa yang terkandung didalam tumbuhan dan diduga berfungsi sebagai insektisida diantaranya adalah golongan sianida, saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri ( Agus,K. 2000 ).

Nikotin dirumuskan untuk keperluan insektisida dalam berbagai bentuk yaitu senyawa murni, nikotin sulfat dan serbuk tembakau. Nikotin murni dianggap beracun bagi mamalia dengan dosis fetal sebesar 50 mg/kg. oleh karena itu, nikotin murni sebagai insektisida botani dibatasi penggunaannya (Cassanovaetal. 2002).

Daun sirsak memiliki kandungan senyawa acetogenin, antara lain asimisin, nolutacin dan squamosin. Senyawa acetogenin dapat berfungsi sebagai *anti feedent* apabila dalam konsentrasi tinggi. Pada keadaan ini, hama tidak lagi bergairah melahap makanan yang disukainya. Tetapi pada suhu rendah, senyawa acetogenin dapat bersifat racun bagi hama sehingga menyebabkan kematian (Septerina 2002).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat dijadikan alternative untuk mengendalikan hama. Penelitian yang dilakukan Sudarmanto (2009) dalam Jannah (2010) menyebutkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat menekan gangguan hama Thrips pada tanaman cabai. Ekstrak bubuk daun sirsak dapat digunakan untuk mengendalikan hama rayap tanah. Bukan saja untuk mengendalikan hama, ekstrak daun sirsak dapat pula digunakan untuk membunuh jentik nyamuk *Anopheles aconitus* dengan tingkat kematian 100 (Rislansyah 2000 dalam Jannah 2010).

#### ***G. Pemanfaatan Tumbuhan Dalam Prespektif Islam***

Nabi Muhammad saw. datang membawa kebenaran-kebenaran ilmiah di tengah bangsa yang terbelakang dan tak berilmu yaitu berupa kalam Allah swt. (Al-Qur'an). Kemukjizatan Al-Qur'an tampak dengan jelas, seperti banyaknya para ilmuan di berbagai bidang berhasil menyingkap mukjizat ilmiah yang termuat di dalam Al-Qur'an khususnya tentang ciptaan-Nya, baik itu benda hidup maupun tak hidup, proses penciptaan hingga berbagai macam faedah dari ciptaannya telah dibuktikan secara empiris, baik dalam bidang sains hingga kesehatan. Contohnya penciptaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang telah diungkapkan fungsi dan manfaatnya di dalam al-Qur'an, kini telah dibuktikan secara ilmiah, yaitu dalam bidang pengobatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26:7-

9. 
 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿٩﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

*“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.”*(Kementerian Kesehatan RI, 2014:367).

Berdasarkan ayat tersebut kata *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009:188).

Adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah di bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya

mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Mahakuasa. (Shihab,2009 :200)

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Āli-‘Imrān /3: 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾  
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka". (Kementerian Agama RI, 2014: 109-110).*

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya (serta pergantian malam dan siang) dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang (menjadi tanda-tanda) atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah swt. (bagi orang-orang yang berakal) artinya yang mempergunakan pikiran mereka. (Jalalain,2010:59)

Menurut Prof DR Yusuf al Hajj Ahmad (2014) surah selanjutnya yaitu surah Al-Hajj ayat 73, ayat ini merupakan kemujizatan tersendiri pada waktu itu ketika Allah menantang mereka (orang-orang kafir) bahwa sesembahan selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun, sebab penciptaan menjadi milik prerogative Sang Pencipta yang tidak ada tandingannya. Adapun tantangan

lain, dan mukjizat besar yang terkandung dalam ayat ini dan merupakan langkah maju mendahului sains modern sebagai berikut :

Ketika lalat mengambil sesuatu di makanan, ia mengeluarkan getah khusus yang berasal dari air liurnya, lalu dengan kecepatan tinggi yang diperkirakan mencapai sepersekian detik, getah tersebut sudah tercampur dengan makanan , sehingga memudahkan lalat untuk menyerapnya dengan belalainya. Karena itu, makanan yang sudah dirampas lalat, meski remeh dan tidak bernilai, tetap tidak bisa diselamatkan dan direbut kembali, sebab dengan efek getah tersebut ia sudah berubah secara kimiawi menjadi komposisi jenis khusus sebelum ke dalam perut lalat, sehingga orang akan kewalahan untuk merebut kembali makanan yang telah dicuri lalat.

Ayat ini juga mengandung aspek kemukjizatan lain yang baru diketahui seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu kemampuan lalat dalam menularkan virus virus penyebab penyakit. Manusia maupun sesembahan mereka selain Allah tidak akan mampu menciptakan serangga lemah seperti lalat. Lebih dari itu, merekapun tidak akan mampu merebut kembali sesuatu yang telah dirampas lalat, entah itu makanan, minuman, kesehatan hingga sebabnya hilangnya nyawa. Mereka bahkan jauh lebih lemah lagi, sementara Allah Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Āl-‘Hajj/22: 73.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ  
 اَللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهُ ۗ وَاِنْ يَّسْلُبُوْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ  
 ضَعْفَ الطَّالِبِ وَاَلْمَطْلُوْبِ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

*“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah.*

Wahai manusia, Kami akan menampakkan suatu kenyataan yang aneh di depan mata kalian. Maka dengarkanlah dan renungkan! Berhala-berhala itu tidak akan mampu menciptakan apa pun, termasuk seekor lalat, makhluk yang hina dan tidak berarti, meskipun mereka saling membantu untuk menciptakannya. Bahkan apabila makhluk yang tidak berarti itu mengambil sebagian dari binatang persembahan, berhala-berhala itu tidak mampu menghalangi atau mengambilnya kembali. Alangkah lemahnya sesuatu yang dikalahkan oleh lalat karena tidak mampu mengambil kembali sesuatu yang telah diambil darinya. Padahal lalat itu sendiri sudah lemah. Keduanya memang sama-sama lemah, tetapi berhala-berhala itu tampak lebih lemah. Oleh karena itu, bagaimana seorang manusia yang berakal sampai hati untuk menyembah dan mencari manfaat dari berhala-berhala seperti itu. (Shihab,2009:344)

Sebagaimana juga tercantum dalam hadis no.3073 :

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي  
عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً  
وَالْأُخْرَى شِفَاءً


Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata; telah bercerita kepadaku Utbah bin

Muslim berkata; telah mengabarkan kepadaku Ubaid bin Hunain berkata; saya mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya.*



#### ***H. Kerangka Teori***


Upaya Pengendalian Vektor



Gambar 2.5 Skema Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi dari Teori Hoedojo dan Zulhasril, 2

### I. Kerangka Konsep



Gambar 2.6 Skema Kerangka Konsep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan pengujian statistik. (Nur Ikhsan, 2014:49). Sedangkan metode eksperimen merupakan metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. (Sedarmayanti dan Syarifudin, 2002:33).


## 2. Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen (*experiment*) dengan rancangan *Posttest Only Control Group Design*, yaitu merupakan desain penelitian yang tidak menggunakan pretes terhadap sampel sebelum perlakuan. Dalam desain ini terdapat dua kelompok masing-masing dipilih secara acak (*randomization*), kelompok-kelompok tersebut dianggap sama sebelum dilakukan perlakuan. Desain penelitian ini mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. (Riyanto, 2011:62 dalam Nur Ikhsan, 2014:49). Jika ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok control maka perlakuan yang diberikan secara signifikan.

Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 3.1 Desain Penelitian

Keterangan :

S : Sampel

R : Randomisasi

K : Kelompok lalat rumah uji tanpa perlakuan (kontrol)

K1 : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 60 %

K2 : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 70 %

K3 : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 80 %

O : Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji tanpa perlakuan (kontrol)

O1 : Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 60 %

O2 : Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 70 %

O3 : Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 80 %

Di dalam penelitian ini, menggunakan masing-masing 3 perlakuan baik dari pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) yang terdiri dari 3 kelompok perlakuan dan 2 kelompok kontrol (kontrol positif dan kontrol negatif) dengan 3 kali ulangan (replikasi).



**Tabel 3.1 Ulangan (replikaasi) Perlakuan**

Perlakuan	Ulangan		
	I	II	III

K	KI	KII	KIII
P <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> I	P <sub>1</sub> II	P <sub>1</sub> III
P <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> I	P <sub>2</sub> II	P <sub>2</sub> III
P <sub>3</sub>	P <sub>3</sub> I	P <sub>3</sub> II	P <sub>3</sub> III

Keterangan :

- K : Kelompok lalat rumah uji dengan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) (Kontrol)
- P<sub>1</sub> : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 60 %
- P<sub>2</sub> : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 70 %
- P<sub>3</sub> : Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) pada konsentrasi 80 %.

### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah lalat rumah (*Musca domestica*) yang ditangkap di Cafeteria Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili atau representatif populasi (Riyanto, 2011). Sampel pada penelitian ini yaitu lalat rumah (*Musca domestica*). Hal ini sesuai dengan Pedoman Uji Hayati Insektisida Rumah Tangga, (Wahyuni, 2005 dalam Mirnawati, 2012:149). Sampel dibagi menjadi 3 kelompok pada masing-masing ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) sehingga total menjadi 6 kelompok, lalat rumah (*Musca domestica*) sebanyak 15 ekor yang akan diuji kerentanannya yang disemprotkan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) dengan konsentrasi 60%, 70 %, dan 80%. Jumlah sampel tiap-tiap perlakuan sama , yaitu sebanyak 15 sampel yang dipilih secara acak. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 360 ekor lalat rumah (*Musca domestica*).

#### **D. Metode Pengambilan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung sesuai dengan prosedur yang terencana meliputi melihat dan mencatat jumlah ataupun aktivitas tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti melihat dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, yaitu mengamati dan mencatat jumlah kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah disemprotkan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) dengan berbagai konsentrasi yang berbeda dan dengan batas lama pemaparan yang telah ditentukan.


## 2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen, baik berupa gambar maupun tulisan, serta menganalisa dokumen-dokumen yang ada, untuk mendukung penyusunan penelitian.

### ***E. Parameter Penelitian***

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah disemprotkan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) dengan berbagai konsentrasi dalam persen (%) dan kematian lalat rumah dalam kelompok kontrol. Kematian lalat rumah ditandai dengan lalat rumah yang tidak bergerak/ tidak memiliki respon terhadap rangsangan. Pengamatan dilakukan sampai jam ke 24 jam setelah perlakuan sesuai dengan standar WHO, yaitu mengenai standar penelitian pada serangga. (Soemardini, Heri, dan Lingga, 2013, dalam Fina Elis Suryani Sampan, 2013)

### ***F. Alur Penelitian***





Gambar 3.2 : Alur penelitian

## G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

### 1. Validasi

Validasi instrumen merupakan tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (instrumen penelitian) dalam melakukan ukurnya.

Validasi dijaga dengan :

- a. Menyamankan kondisi lalat rumah (*Musca domestica*)

- b. Menggunakan kriteria standar dalam menilai kematian lalat rumah (*Musca domestica*)
- c. Menggunakan dilakukan sesuai standar operasional prosedur.

## 2. Reliabilitas

Reliabilitas data dijaga dengan melakukan replikasi pengujian sebanyak tiga kali pada setiap kelompok uji.

### H. Instrumen Penelitian

#### 1. Bahan Penelitian

- a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak
  - 1) Daun tembakau dan daun sirsak
  - 2) Etanol 96%
  - 3) Es batu
- b. Bahan yang digunakan untuk pengenceran larutan uji
  - 1) Ekstrak kental daun tembakau dan daun sirsak
  - 2) Etanol 96%

#### 2. Alat Penelitian

- a. Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak
  - 1) Pisau
  - 2) Oven
  - 3) Blender
  - 4) Neraca analitik merek Kern
  - 5) Toples kaca (wadah maserasi)
  - 6) Corong
  - 7) Kertas saring
  - 8) *Rotavapor* merek Heidolph

- 9) Tempat Penyimpanan Ekstrak
  - 10) Aluminium foil
  - 11) Silica gel
- b. Alat yang digunakan untuk pengenceran larutan uji
- 1) Timbangan analitik
  - 2) Lumpang dan Alu
  - 3) Gelas ukur
  - 4) Batang pengaduk
  - 5) Pipet tetes
- c. Alat yang digunakan untuk perlakuan uji efektivitas
- 1) Kandang lalat rumah ukuran  $30 \times 30 \times 30 \text{ cm}^3$
  - 2) Sprayer
  - 3) Label
  - 4) *Hygrometer*
  - 5) *Thermometer*
  - 6) Kain kasa
  - 7) *Paper cup*

## **I. Prosedur Penelitian**

### **1. Tahap Persiapan**

#### **a. Pembuatan Ekstrak**

Daun tembakau yang akan diekstraksi diperoleh dari kebun tembakau di Tombolo Pao Malino dan daun sirsak yang akan diekstraksi diperoleh dari pohon sirsak yang diambil dari kebun di Takalar. Setelah itu daun tembakau dan daun

sirsak tersebut dicuci dengan air bersih yang mengalir, lalu dikeringkan dengan oven dengan suhu 30-45<sup>0</sup>C. Kemudian diserbukan dan disimpan dalam wadah bersih dan tertutup rapat.

Daun tembakau dan daun sirsak yang telah diserbukkan ditimbang masing-masing sebanyak 1000 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 96% secukupnya (hingga terlarut). Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama  $3 \times 24$  jam. Filtrat etanol diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotavapor* sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Kemudian dibebaskan etanol sampai diperoleh ekstrak daun tembakau dan daun sirsak.

#### b. Prosedur Kerja

- 1) Siapkan kandang uji yang telah diberi label dan siapkan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak didalam botol semprot.
- 2) Masukkan lalat rumah yang telah ditangkap ke dalam masing-masing kandang yang telah diberi label sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan, setiap kandang dimasukkan 15 ekor lalat rumah, jumlah keseluruhan dari lalat rumah uji adalah 360 ekor.
- 3) Kemudian dilakukan pengukuran dan pencatatan temperatur dan kelembaban udara pada masing-masing kandang uji yang telah berisi lalat rumah sebelum dilakukan perlakuan.
- 4) Semprotkan sebanyak 5 kali ekstrak daun tembakau pada setiap kandang dengan waktu yang bersamaan, kemudian amati dan catat jumlah lalat rumah yang

mati pada setiap 10 menit selama 60 menit, lakukan pada setiap perlakuan 1 2 dan 3 ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak.

5) Setelah itu hitung dan catat lalat rumah yang mati pada setiap kandang dan kematian lalat rumah dapat diamati secara fisik dengan tanda-tanda antara lain: lalat rumah tidak bergerak sama sekali walaupun telah mendapat rangsangan berupa sentuhan maupun hembusan angin serta tubuh nyamuk telah menunjukkan kekakuan.

#### ***J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Setelah diperoleh data jumlah lalat rumah (*Muscu domestica*) yang mati, maka dilakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Dilakukan *editing* dan *tabulating* data. Data selanjutnya dianalisis dengan melakukan uji statistik menggunakan program statistik komputer (SPSS 21.0). Hasil pengolahan dan uji statistik yang diperoleh disajikan dalam bentuk table dan grafik. Adapun uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Uji Friedman Test**

Uji Friedman dilakukan untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Data yang dianalisis adalah data nominal, sehingga dapat diketahui perbedaan efektivitas atau daya bunuh ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap lalat rumah (*Muscu domestica*).

##### **2. Uji T-Test**

Uji T-test untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua [variabel](#) bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

### 3. Analisis Probit

Analisis Probit dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan *Lethal Concentration* (LC50) daya bunuh ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap lalat rumah (*Muscu domestica*).



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan UIN Alauddin Makassar pada tanggal 6 Juni 2016 sampai 12 September 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembuatan ekstrak daun sirsak dan daun tembakau mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai 27 Agustus 2016.
2. Perlakuan pada sampel uji lalat rumah (*Musca domestica*) mulai tanggal 1 September 2016 sampai 12 September 2016.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada penyajian tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Pertama**

Konsentrasi Ekstrak Tembakau (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	0	1	1	2	0.3
70	45	0	0	0	0	1	2	3	0.5
80	45	1	1	2	1	2	3	10	1.6

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.1 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun tembakau pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 2 ekor adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 10 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 20 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 30 lalat yang mati adalah 2 ekor, pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 50 lalat yang mati adalah 2 ekor dan pada menit ke 60 lalat yang mati adalah 3 ekor.

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Kedua**

Konsentrasi Ekstrak Tembakau (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	0	1	2	3	0.5
70	45	0	0	0	1	2	1	4	0.6
80	45	1	0	2	1	2	3	9	1.5

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.2 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun tembakau pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat yang mati adalah 2 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 40 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 2 ekor dan menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 10 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 30 lalat yang mati adalah 2 ekor, pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 50 lalat yang mati adalah 2 ekor dan pada menit ke 60 lalat yang mati adalah 3 ekor.

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Ketiga**

Konsentrasi Ekstrak Tembakau (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	0	1	1	2	0.3

70	45	0	0	1	1	1	1	4	0.6
80	45	1	2	2	3	1	1	10	1.6

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.3 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun tembakau pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 30 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 40 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 10 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 20 lalat rumah yang mati adalah 2 ekor, pada menit ke 30 lalat yang mati adalah 2 ekor, pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 3 ekor, pada menit ke 50 lalat yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 60 lalat yang mati adalah 1 ekor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

**Tabel 4.4**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan Berbagai Konsentrasi**

Konsentrasi Ekstrak Tembakau (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Jumlah Lalat Rumah yang Mati pada Perlakuan Ke-			Total	Rata-Rata
		I	II	III		
Kontrol (-)	45	0	0	0	0	0

60	45	2	3	2	7	2
70	45	3	4	4	11	3
80	45	10	9	10	29	9

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.4 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah di semprotkan dengan etanol (sampel control) sebagai kontrol daun tembakau perlakuan pertama, kedua dan ketiga yaitu masing-masing 0 sedangkan hasil perhitungan jumlah kematian lalat dengan daun tembakau yang tertinggi pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor, pada perlakuan kedua pada konsentrasi 80% sebanyak 9 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor. Kematian lalat rumah setelah perlakuan yang paling banyak mematikan lalat rumah yaitu konsentrasi 80% dengan total sebanyak 29 ekor dan konsentrasi yang paling sedikit mematikan lalat rumah adalah konsentrasi 60% dengan total sebanyak 7 ekor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

**Tabel 4.5**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Pertama**

Konsentrasi Ekstrak Sirsak (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	1	1	0	2	0.3
70	45	0	0	1	1	0	1	3	0.5
80	45	0	0	0	1	0	3	4	0.6

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.5 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun sirsak pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 40 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 50 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 30 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, pada menit ke 40 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 60 lalat yang mati adalah 3 ekor.

**Tabel 4.6**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Kedua**

Konsentrasi Ekstrak Sirsak (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	0	0	1	1	0.1
70	45	0	0	0	0	1	1	2	0.3
80	45	0	0	0	1	0	3	4	0.6

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.6 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun sirsak pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 60 lalat yang mati adalah 3 ekor.

**Tabel 4.7**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata*) dengan Berbagai Waktu Lama Paparan pada Perlakuan Ketiga**

Konsentrasi Ekstrak Sirsak (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Lama Paparan pada Menit Ke-						Total	Rata-Rata
		10	20	30	40	50	60		
60	45	0	0	0	0	1	1	2	0.3
70	45	0	0	0	0	2	1	3	0.5
80	45	0	0	0	1	1	0	2	0.2

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan table 4.7 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) berdasarkan lama paparan setelah di semprotkan dengan ekstrak daun sirsak pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 60% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor dan menit ke 60 lalat yang mati adalah 1 ekor, pada konsentrasi 70% pada menit ke 50 lalat rumah yang mati adalah 2 ekor dan pada menit ke 60 lalat rumah yang mati adalah 1 ekor, adapun pada konsentrasi 80% pada menit ke 40 lalat yang mati adalah 1 ekor dan pada menit ke 50 lalat yang mati adalah 1 ekor.

**Tabel 4.8**  
**Data Jumlah Lalat Rumah (*Musca domestica*) yang Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata*) dengan Berbagai Konsentrasi**

Konsentrasi Ekstrak Sirsak (%)	Jumlah Lalat Rumah Uji	Jumlah Lalat Rumah yang Mati pada Perlakuan Ke-			Total	Rata-Rata
		I	II	III		
Kontrol (-)	45	0	0	0	0	0
60	45	2	1	2	5	1
70	45	3	2	3	8	2
80	45	4	4	2	10	3

*Sumber: Data Primer, 2016*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah di semprotkan dengan etanol (sampel control) sebagai kontrol daun sirsak pada perlakuan pertama, kedua dan ketiga yaitu masing-masing 0 sedangkan sedangkan hasil perhitungan jumlah kematian lalat dengan daun sirsak yang tertinggi pada perlakuan pertama yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor, pada perlakuan kedua pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 80% sebanyak 2 ekor kematian lalat rumah setelah perlakuan yang paling banyak mematikan lalat rumah pada konsentrasi 80% dengan total sebanyak 10 ekor dan konsentrasi yang paling sedikit mematikan lalat rumah adalah konsentrasi 60% dengan total sebanyak 5 ekor.

Adapun hasil pengukuran suhu dan kelembaban ruangan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa suhu ruangan penelitian pada perlakuan I, II, dan III adalah 30°C dan diperoleh hasil bahwa kelembaban ruangan penelitian pada perlakuan I, II, dan III adalah 73%.

### **B. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan menggunakan program aplikasi komputer *Statistic Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 21.0*. Adapun langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data, hal ini dilakukan untuk melihat apakah data yang di analisis tersebut terdistribusi normal atau tidak.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan pada hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah menyemprotkan ekstrak daun

tembakau dan daun sirsak dengan variasi konsentrasi masing-masing 60%, 70% dan 80% data tidak terdistribusi normal karena nilai *Sig. Shapiro-Wilk* yang didapatkan adalah 0,000 dimana nilai signifikan yang diperoleh tersebut  $< 0,05$ .

Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan tersebut, maka akan dilanjutkan dengan tahapan analisis data, karena data yang telah dilakukan uji normalitas tidak terdistribusi normal maka dilakukan analisis dengan menggunakan uji *Friedman Test*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variasi konsentrasi ekstrak daun tembakau dan daun sirsak terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji *Friedman Test* Pengukuran Kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak di dalam Kandang Uji**

Ekstrak	Nilai <i>P-value</i>
<b>Daun Tembakau</b>	0.029
<b>Daun Sirsak</b>	0.032

*Sumber: Data Primer, 2016*

Berdasarkan data pada table 4.3 di peroleh nilai *P-Value* dari hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah menyemprotkan ekstrak daun tembakau yaitu 0.029. Adapun hasil pengukuran kematian lalat (*Musca domestica*) setelah menyemprotkan ekstrak daun sirsak yaitu 0.032. Dari hasil uji statistic menunjukkan nilai sig.  $< 0.05$  maka  $H_a$  diterima atau dapat dinyatakan bahwa ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annoma muricata L*) efektif dalam mematikan lalat rumah (*Musca domestica*)

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji *T-Test* Pengukuran Kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak dengan Variasi Konsentrasi di dalam Kandang Uji**

Konsentrasi Ekstrak Daun Tembakau-Daun Sirsak	Nilai <i>P-Value</i>
<b>60%</b>	0.423
<b>70%</b>	0.225
<b>80%</b>	0.009

*Sumber: Data Primer, 2016*

Berdasarkan data pada table 4.4 diperoleh nilai *P-Value* dari hasil pengukuran kematian lalat rumah (*Musca domestica*) setelah menyemprotkan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak dengan variasi konsentrasi 60%, konsentrasi 70% dan konsentrasi 80% masing- masing 0.423, 0.225, dan 0.009. Dari hasil uji statistic menunjukkan nilai sig. < 0.05 maka  $H_a$  di terima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara variasi konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annoma muricata L*) terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).

Selanjutnya data penelitian diuji menggunakan analisis Probit dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mendapatkan nilai LC50 menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 21.0*. Dari hasil analisis Probit, dapat diestimasi besar konsentrasi yang mengakibatkan kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Analisis Probit Pengukuran Kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) setelah Menyemprotkan Ekstrak Daun Tembakau dan Daun Sirsak dengan Variasi Konsentrasi di dalam Kandang Uji**

No	<i>Lethal Concentration</i>	Konsentrasi (%)	Interval Konsentrasi (%)
1	<i>Lethal Cocentrasi</i> 50% (Daun Tembakau)	76.3	73.0 – 81.6
2	<i>Lethal Cocentrasi</i> 50% (Daun Sirsak)	102.1	86.7 – 234.0

*Sumber: Data Primer, 2016*

Bedasarkan tabel 4.5 menunjukkan *Lethal Concentration 50%* (Daun Tembakau) adalah konsentrasi 76.3 % sedangkan *Lethal Concentration 50%* (Daun Sirsak) adalah konsentrasi 102.1% selama 60 menit perlakuan. Semakin rendah nilai LC50 suatu zat maka zat tersebut mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dalam membunuh hewan uji, karena zat tersebut perlu konsentrasi yang lebih rendah untuk mematikan hewan coba (Ardianto,2008 dalam Haditomo,2010:34).

Ekstrak daun tembakau memiliki *Lethal Concentration 50%* pada konsentrasi 76.3% memiliki aktivitas yang tinggi dalam membunuh lalat dan *Lethal Concentration 50%* untuk ekstrak daun sirsak yaitu 102,1% memiliki aktivitas yang rendah dalam membunuh lalat. Hal ini dipengaruhi oleh besar konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini kurang sehingga jumlah lalat rumah yang mati karena terpapar oleh ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak juga kurang.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annoma muricata L*) terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*). Pada penelitian ini digunakan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annoma muricata L*) yang telah diekstraksi dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% yang dimaksudkan agar didapatkan kandungan alkaloid nikotin dan acetogenin yang terkandung dalam daun tembakau dan daun sirsak yang diduga memiliki efek insektisida.

Pelarut etanol 96% yang digunakan dalam pembuatan ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak adalah pelarut yang lebih selektif, sifat toksik yang rendah dari pelarut lainnya. Etanol 96% bersifat semipolar sehingga dapat melarutkan sehingga dapat melarutkan zat kimia yang bersifat polar maupun non polar. (Haditomo, 2010)

Ekstrak tembakau dan ekstrak sirsak masing-masing sebanyak 22 gram diencerkan kedalam pelarut etanol sebanyak 50 ml untuk mendapatkan larutan stok. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi 80%, sebanyak 12,5 ml ekstrak yang diambil dari larutan stok diencerkan kembali ke dalam 10 ml etanol. dengan untuk mendapatkan konsentrasi 70% sebanyak 14,2 ml ekstrak yang diambil dari larutan stok, diencerkan kembali ke dalam 10 ml etanol, adapun untuk mendapatkan konsentrasi 60% sebanyak 16,6 ml ekstrak yang diambil dari larutan stok, diencerkan kembali ke dalam 10 ml etanol, sehingga diperoleh konsentrasi ekstrak 80%, 70% dan 60%. Pelarut etanol dipilih karena merupakan pelarut yang dapat melarutkan baik senyawa polar maupun non polar dan larut dalam berbagai pelarut organik maupun air.

Setelah proses ekstraksi selesai dilanjutkan dengan memasukkan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak kedalam wadah yang telah disediakan kemudian diberi label untuk setiap konsentrasi. Lalat yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari cafeteria Universitas Islam Alauddin Makassar yang kemudian dibawa ke tempat perlakuan dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disediakan masing- masing 15 ekor.

Lalat yang berada dalam kandang perlakuan semua kondisinya dihomogenkan yaitu menggunakan kandang yang sama, alat penyemprot yang sama, suhu dan kelembaban dalam setiap kandang juga sama yang kemudian masing- masing diberikan perlakuan dengan larutan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak sesuai dengan konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lalat yang berada dalam

kandang control kemudian diberi perlakuan dengan menyemprotkan larutan etanol 96% yang merupakan larutan yang digunakan sebagai larutan control dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengukuran jumlah lalat yang mati saat disemprotkan dengan larutan etanol sebagai control diperoleh hasil bahwa tidak ada lalat yang mati saat diebrikan perlakuan pada kandang control baik pada perlakuan pertama, kedua dan ketiga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa larutan etanol tidak efektif dalam membunuh serangga.

Dari hasil perhitungan jumlah kematian lalat dengan daun tembakau yang tertinggi yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor, pada perlakuan kedua pada konsentrasi 80% sebanyak 9 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor. Adapun kematian lalat rumah setelah perlakuan pertama dengan daun sirsak yang tertinggi yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor, pada perlakuan kedua tertinggi pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 70% sebanyak 3 ekor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin banyak jumlah lalat yang mati. Hal ini dipengaruhi karena tembakau sebagai salah satu jenis tanaman insektisida botani yang ekstraknya dapat digunakan untuk membunuh serangga-serangga. Nikotin yang terkandung dalam daun tembakau digunakan sebagai insektisida dirumah-rumah dan kebun. (Sutikno,1992 dalam Palennari: 2009)

Dari hasil penelitian, ternyata daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) dapat membunuh lalat rumah, hal ini disebabkan karena ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) memiliki bahan aktif nikotin alkaloid yang bersifat racun dan dapat bertahan lama yang lebih sering penyerapannya masuk kedalam tubuh *Musca domestica* melalui kulit sehingga menyebabkan depresi (penekanan) terhadap susunan syaraf *Musca*

domestica sehingga menghambat enzim cholinesterase dan akhirnya mati. Adapun yang dimaksud Cholinesterase adalah suatu enzim, suatu bentuk dari katalis biologik yang dalam jaringan tubuh berperan untuk menjaga agar otot-otot, kelenjar-kelenjar dan sel-sel syaraf bekerja secara organisir dan harmonis (Erlina. I, 2003)

Berdasarkan cara masuk insektisida dalam hal ini ekstrak daun tembakau ke dalam tubuh *Musca Domestica* dapat dinyatakan sebagai racun kontak dan racun pernapasan. Sebagai racun kontak, ekstrak daun tembakau yang disemprotkan dapat langsung mengenai bagian tubuh lalat rumah yang menyebabkan lalat rumah jatuh dan akhirnya mati ditandai dengan tubuh lalat rumah mengering karena dehidrasi. Dimana dinyatakan sebagai racun kontak apabila insektisida dapat masuk ke dalam tubuh lalat rumah lewat kulit bersinggungan langsung (Djojsumarto, 2000).

Sebagai racun pernapasan, lalat rumah yang menghirup ekstrak daun tembakau yang menyebabkan lalat tersebut tergelepar sehingga akhirnya mengalami kematian. Racun pernapasan bekerja lewat saluran pernapasan. Kebanyakan racun pernapasan berupa gas (Djojsumarto, 2000).

Dalam penelitian ini suhu pada ruangan tempat perlakuan yaitu 30 °C dimana suhu pada ruangan ini sesuai dengan suhu yang diperlukan lalat untuk beraktivitas. Lalat tidak aktif pada suhu di bawah 7,5 °C dan akan mati pada suhu 0°C. Lalat mulai terbang jika suhu lingkungan mencapai 11 °C dan aktivitasnya akan mencapai maksimum pada suhu 22,2°C dan akan menurun secara drastis jika suhu mulai meningkat sampai mencapai 45 °C bahkan dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan kematian pada lalat. (Adnyana, 1985)

Selain itu kelembaban juga berpengaruh terhadap lalat. Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran kelembaban. Hasil pengukuran kelembaban pada ruangan yang digunakan yaitu 73%. Kematian lalat yang diakibatkan oleh pengaruh suhu tinggi

maupun rendah akan lebih terlihat jika kelembaban udara tinggi. Pada kelembaban relative 42% sampai 55% dengan suhu diatas 15,55 °C, akan memperpanjang umur lalat. Dengan kelembaban yang sama pada suhu dibawah 20 °C, lalat akan aktif dan hidup lama. Lalat akan mencapai kondisi fisik optimum pada suhu tinggi dan kelembaban yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian pada sampel control penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 96% diperoleh hasil bahwa penggunaan etanol 96% saja tidak efektif dalam membunuh lalat. Hal ini dapat dilihat pada table 4.5 dimana pada setiap perlakuan menggunakan etanol 96% tidak terjadi kematian lalat.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian pada setiap perlakuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak. Dimana pada semua subyek penelitian yang dilakukan terdapat kematian lalat setelah diberikan perlakuan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak baik pada perlakuan pertama, kedua dan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak efektif dalam terhadap kematian lalat rumah.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jumlah lalat rumah yang mati diperkuat dengan hasil analisis secara statistic dengan menggunakan uji *Paired Sample test* dan Uji *Friedman Test*. Berdasarkan hasil analisis data jumlah lalat rumah yang mati pada perlakuan pertama diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0.423. Adapun *Asymp. Sig. (2-tailed)* berturut-turut pada perlakuan kedua dan ketiga adalah 0.225, dan 0.009 karena nilai sig. <0.05 maka dinyatakan bahwa ada hubungan antara variasi konsentrasi ekstrak tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona*

*muricata L*) efektif terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2003) yang berjudul efektivitas daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) sebagai insektisida hayati dalam membunuh lalat rumah (*Musca domestica*) bahwa penyemprotan ekstrak daun tembakau pada dosis 130 gram daun tembakau dalam 1 liter air, dapat membunuh lalat percobaan 53% dalam waktu 6 jam. Dosis 100gr/liter air dapat membunuh 63% lalat percobaan.

Demikian halnya dengan yang dijelaskan oleh Anonimuous (1994) tentang pedoman pengenalan pestisida botani menjelaskan bahwa ekstrak biji sirsak dapat digunakan untuk mengendalikan nyamuk (*aedes aegypty*) dan larvanya, juga untuk mengendalikan lalat buah (*Drosophila melanogaster*).

Adapun hasil analisis data ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) dalam membunuh lalat rumah (*Musca domestica*) dengan menggunakan Uji *Friedman Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada perlakuan ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) berturut-turut yaitu 0.029 dan 0.032 karena nilai sig. < 0.05 maka dinyatakan bahwa ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) efektif dalam membunuh lalat rumah (*Musca domestica*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmi Yasin dkk tentang pengaruh ekstrak daun tembakau sebagai insektisida hayati terhadap pengendalian jumlah populasi lalat rumah (*Musca domestica*) dapat dilihat bahwa dalam waktu 24 jam tingkat kematian lalat tertinggi tercapai pada dosis 130 gr/l ekstrak daun tembakau dapat membunuh sebanyak 20 ekor lalat sedangkan tingkat kematian

lalat rumah terendah tercapai pada dosis 70 gr/l ekstrak tembakau hanya dapat membunuh sebanyak 3 ekor lalat rumah.

*Lethal Concentration* (LC) 50% adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% lalat uji. Pemilihan istilah *Lethal Concentration* lebih dipilih daripada istilah *Lethal Dose* (LD) karena pada penelitian ini sulit untuk menentukan dosis sehingga lebih dipilih istilah *Lethal Concentration* 50 yang secara lebih tepat menggambarkan konsentrasi ekstrak pada media percobaan. Dalam penelitian ini estimasi nilai *Lethal Concentration* 50% (LC<sub>50</sub>) dianalisis setelah pengamatan menit ke-60.

Estimasi nilai *Lethal Concentration* 50% melalui uji analisis probit adalah pada konsentrasi ekstrak daun tembakau 76.338 dengan interval 73.034 – 81.659 sedangkan nilai *Lethal Concentration* 50% ekstrak daun sirsak adalah 102.199 dengan interval 86.754 – 234.034 setelah 60 suatu menit perlakuan. Bila dikonversikan dengan satuan *part per million* (ppm) maka nilai LC<sub>50</sub> untuk ekstrak daun tembakau 76338 ppm dan ekstrak daun sirsak adalah 102199 ppm.

Semakin rendah nilai LC<sub>50</sub> zat maka zat tersebut mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dalam membunuh hewan uji, karena zat tersebut perlu konsentrasi yang leboh rendah untuk mematikan hewan coba (Ardianto,2008 *dalam* Haditomo,2010)

Ekstrak daun tembakau memiliki *Lethal Concentration* 50% pada konsentrasi 76.338% memiliki aktivitas yang tinggi dalam membunuh lalat dan *Lethal Concentration* 50% untuk ekstrak daun sirsak yaitu 102,199% memiliki aktivitas yang rendah dalam membunuh lalat. Hal ini dipengaruhi oleh besar konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini kurang sehingga jumlah lalat rumah yang mati karena terpapar oleh ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak juga kurang.

Pengendalian vector dengan menggunakan racun ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak termasuk salah satu pengendalian vector secara kimiawi karena racun ini mempunyai daya toksisitas melalui senyawa- senawa kimia penyusunnya.

Penyebaran penyakit oleh salah satu vector yaitu lalat dengan mengeluarkan feses setiap 45 menit setiap harinya. Melalui jalan itulah pathogen tersebar. Tetapi kuman lebih banyak disebabkan oleh karena memuntahkan cairannya ke makanan serta kebiasaannya berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya. ( Harianti)

Semakin tinggi tingkat kepadatan lalat maka semakin tinggi angka kejadian diare. Jalur transmisi penularan penyakit diare antara lain melalui air dan makanan serta binatang arthropoda secara mekanis. Lalat merupakan binatang arthropoda termasuk insekta ordo diptera yang dapat menyebarkan penyakit jika sudah hinggap di lingkungan yang kotor kemudian hinggap dimakanan sehingga dapat menyebabkan penyakit. (Azwar,1990 dalam Rudianto, 2005)

Demikian Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Al-Bukhari :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ . ﴿روا البخاري﴾

Artinya :

“Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak diperhatikan), yaitu kesehatan dan waktu luang”. (HR. Al-Bukhari)

Dalam hadist tersebut diketahui bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan termasuk kebersihan lingkungan tempat tinggal dan kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan

timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Lalat merupakan salah satu vector yang dapat menyebarkan penyakit seperti diare. Lalat dapat dikendalikan dengan menggunakan bahan alami yang ada di alam yang telah disediakan oleh Allah swt. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah swt dalam QS. An- Nahl/16 :10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

*“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”* (Departemen Agama Republik Indonesia,2008:268).

Demikian tulisnya Ibn’Asyur juga memahami kata-kata seluruh buah-buahan dalam artian buah-buahan yang dikenal pada satu daerah. Memang setiap kaum/wilayah ada buah-buahan khas baginya yang tidak terdapat di tempat lain (Shihab, 2007: 196).

Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu hal yang telah disebutkan itu (benar-benar ada tanda) yang menunjukkan akan keesaan

Allah swt. (bagi kaum yang memikirkan) mengenai ciptaan-Nya sehingga mereka mau beriman karenanya. (Al-Jalalain,2009)

Al-Quran juga mengungkapkan tentang fungsi dan kegunaan ciptannya. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit dan ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dipelajari dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Salah satu dari sekian banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata L*) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan insektisida.

Dalam daun tembakau mempunyai kandungan bahan bioaktif golongan alkaloid. Nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat ampuh terhadap serangga. Sebanyak 5% dari bobot tembakau ialah nikotin yang merupakan racun syaraf kuat (*potent nerve poison*) dan digunakan didalam racun serangga. Begitupula dengan daun sirsak yang dapat digunakan sebagai bahan insektisida. Pada sirsak ditemukan senyawa bersifat bioaktif yang dikenal dengan nama acetogenin akan bersifat antifedant bagi serangga sehingga menyebabkan serangga tidak mau makan. Pada konsentrasi rendah dengan pemberian oral bersifat sebagai racun perut dan dapat menyebabkan kematian. Senyawa ini juga bersifat sitotoksik sehingga menyebabkan kematian sel. (Anonymous,1994)

Kekuasaan Allah SWT dalam tumbuh-tumbuhan terlihat pada modifikasi tumbuh-tumbuhan sesuai dengan berbagai kondisi lingkungan. Semua tumbuhan memiliki susunan dan bentuk luar yang berbeda dengan tumbuhan lain. Setiap tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tentunya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam QS Tâhâ/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا  
بِهِ زَوْجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya :

*“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”*. (Departemen Agama RI,2008:315)

Kata *azwaj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti jenis-jenis tumbuhan, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangngan, atau tumbuhan berkeping dua satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem dan lain-lain (Shihab, 2009: 606).

Dia (yang telah menjadikan bagi kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khithab untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam). Lafal Syattaa ini menjadi kata sifat daripada lafal Azwaajan, maksudnya, yang berbeda-beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Lafal syattaa ini adalah bentuk jamak dari lafal Syatiitun, wazannya sama dengan lafal Mardhaa sebagai jamak dari lafal Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja Syatta artinya Tafarraqa atau berbeda-beda. (Al-Jalalain,2009)

Setiap tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tentunya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Tidak terkecuali daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan daun sirsak (*Annona muricata L*) yang memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu dapat berfungsi sebagai insektisida serangga.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah memperkuat bukti-bukti kebenaran pernyataan-pernyataan Al-Qur'an sesuai dengan fakta. Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa tanaman yang memiliki manfaat bagi makhluk lain, salah satu manfaat tanaman yang menurut ilmu pengetahuan modern memiliki khasiat dalam menyembuhkan beberapa macam penyakit. Saat ini banyak tanaman sudah diketahui memiliki potensi farmakologi. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang memanfaatkan tumbuhan tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan sirsak (*Annona muricata L*).

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pada penelitian ini tidak dilakukan penggolongan usia lalat rumah.
2. Pada penelitian ini sampel lalat yang diambil dari berbagai tempat sehingga dapat mempengaruhi kekebalan tubuh lalat.

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka diharapkan dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut, sehingga factor- factor keterbatasan dalam penelitian ini dapat teratasi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan ekstrak daun tembakau dan daun sirsak untuk mematikan lalat rumah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan jumlah kematian lalat dengan daun tembakau yang tertinggi yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor, pada perlakuan kedua pada konsentrasi 80% sebanyak 9 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 80% sebanyak 10 ekor. Adapun kematian lalat rumah setelah perlakuan

pertama dengan daun sirsak yang tertinggi yaitu pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor, pada perlakuan kedua tertinggi pada konsentrasi 80% sebanyak 4 ekor dan pada perlakuan ketiga pada konsentrasi 70% sebanyak 3 ekor.

2. Berdasarkan hasil uji *Paired Sample test* dan Uji *Friedman Test* diperoleh nilai *P-Value* pada semua perlakuan baik pada perlakuan ekstrak daun tembakau dan ekstrak daun sirsak yaitu sig.  $<0.05$  maka dinyatakan bahwa ekstrak tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) efektif terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).
3. Ekstrak daun tembakau memiliki *Lethal Concentration* 50% pada konsentrasi 76.338% dan *Lethal Concentration* 50% untuk ekstrak daun sirsak yaitu 102.199%. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun tembakau dengan konsentrasi 76.338% bisa mematikan 50% lalat uji sehingga dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi untuk mematikan keseluruhan lalat uji, adapun ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 102.199% tidak bisa mematikan 50% lalat uji sehingga memiliki aktivitas yang lebih rendah dalam membunuh hewan uji serta dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi untuk mematikan keseluruhan lalat uji.

#### **B. Saran Penelitian**

1. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan konsentrasi ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) yang lebih efektif dalam membunuh lalat rumah dalam ruangan dengan skala yang besar.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya ke masyarakat lebih mudah dan praktis.
3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek insektisida daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) terhadap genus lalat lainnya.



## Lampiran 1 : Friedman Test

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kontrol	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K1(60)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K2(70)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K3(80)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

## Friedman Test

Ranks

	Mean Rank
Kontrol	1.00
K1(60)	2.00
K2(70)	3.17
K3(80)	3.83

Test Statistics<sup>a</sup>

N	3
Chi-Square	8.793
df	3
Asymp. Sig.	.032

## Lampiran kedua

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kontrol	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K1(60)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K2(70)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
K3(80)	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

## Friedman Test

Ranks	
	Mean Rank
Kontrol	1.00
K1(60)	2.00
K2(70)	3.00
K3(80)	4.00

Test Statistics <sup>a</sup>	
N	3
Chi-Square	9.000
df	3
Asymp. Sig.	.029

### Lampiran Ketiga

#### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(60%)	2.33	3	.577	.333
	Konsentrasi t(60%)	1.67	3	.577	.333

#### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Konsentrasi t(60%) & Konsentrasi t(60%)	3	-1.000	.000

#### Paired Samples Test

		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(60%) - Konsentrasi t(60%)	.667	1.155	.667

#### Paired Samples Test

		Paired Differences		t	df
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Lower	Upper		
Pair 1	Konsentrasi t(60%) - Konsentrasi t(60%)	-2.202	3.535	1.000	2

#### Paired Samples Test

		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Konsentrasi t(60%) - Konsentrasi t(60%)	.423

### T-Test

#### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(70%)	3.67	3	.577	.333
	Konsentrasi t(70%)	2.67	3	.577	.333

#### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Konsentrasi t(70%) & Konsentrasi t(70%)	3	-.500	.667

**Paired Samples Test**

		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(70%) - Konsentrasi t(70%)	1.000	1.000	.577

**Paired Samples Test**

		Paired Differences		t	df
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Lower	Upper		
Pair 1	Konsentrasi t(70%) - Konsentrasi t(70%)	-1.484	3.484	1.732	2

**Paired Samples Test**

		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Konsentrasi t(70%) - Konsentrasi t(70%)	.225

T-TEST PAIRS=Kt3 WITH Ks3 (PAIRED)  
 /CRITERIA=CI (.9500)  
 /MISSING=ANALYSIS.

**T-Test**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(80%)	9.67	3	.577	.333
	Konsentrasi t(80%)	3.67	3	.577	.333

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Konsentrasi t(80%) & Konsentrasi t(80%)	3	-.500	.667

**Paired Samples Test**


		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Konsentrasi t(80%) - Konsentrasi t(80%)	6.000	1.000	.577

**Paired Samples Test**

		Paired Differences		t	df
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Lower	Upper		
Pair 1	Konsentrasi t(80%) - Konsentrasi t(80%)	3.516	8.484	10.392	2

**Paired Samples Test**

		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Konsentrasi t(80%) - Konsentrasi t(80%)	.009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Lampiran keempat

Probit Analysis

Probability	Confidence Limits		
	95% Confidence Limits for konsentrasi		
	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
.010	43.889	24.261	52.349
.020	47.691	30.645	55.115
.030	50.104	34.684	56.881
.040	51.919	37.713	58.218
.050	53.395	40.171	59.313
.060	54.651	42.257	60.251
.070	55.753	44.080	61.079
.080	56.739	45.708	61.825
.090	57.637	47.183	62.508
.100	58.462	48.536	63.143
.150	61.881	54.069	65.836
.200	64.599	58.343	68.101
.250	66.930	61.854	70.200
.300	69.024	64.813	72.279
.350	70.964	67.327	74.433
.400	72.804	69.478	76.711
.450	74.586	71.352	79.123
PROBIT .500	76.338	73.034	81.659
.550	78.091	74.597	84.314
.600	79.872	76.100	87.096
.650	81.713	77.592	90.034
.700	83.653	79.117	93.177
.750	85.747	80.725	96.607
.800	88.078	82.484	100.457
.850	90.795	84.505	104.975
.900	94.214	87.019	110.689
.910	95.040	87.622	112.072
.920	95.937	88.277	113.577
.930	96.924	88.995	115.232
.940	98.025	89.795	117.083
.950	99.282	90.706	119.195
.960	100.758	91.774	121.680
.970	102.573	93.085	124.736
.980	104.985	94.823	128.803
.990	108.788	97.555	135.220

**Lampiran Kelima**  
**Probit Analysis**

**Confidence Limits**

Probability	95% Confidence Limits for konsentrasi		
	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
.010	23.558	-172.633	45.527
.020	32.773	-125.478	50.855
.030	38.619	-95.625	54.302
.040	43.018	-73.224	56.950
.050	46.595	-55.057	59.159
.060	49.640	-39.652	61.097
.070	52.310	-26.208	62.860
.080	54.701	-14.244	64.512
.090	56.875	-3.451	66.102
.100	58.876	6.378	67.672
.150	67.163	44.212	77.030
.200	73.748	63.497	95.252
.250	79.398	70.946	119.981
.300	84.472	75.259	144.565
.350	89.173	78.598	168.003
.400	93.635	81.506	190.505
.450	97.951	84.189	212.405
PROBIT .500	102.199	86.754	234.034
.550	106.447	89.269	255.712
.600	110.763	91.791	277.773
.650	115.224	94.371	300.602
.700	119.926	97.069	324.682
.750	125.000	99.962	350.685
.800	130.649	103.168	379.658
.850	137.235	106.888	413.445
.900	145.521	111.551	455.975
.910	147.523	112.674	466.250
.920	149.697	113.894	477.413
.930	152.087	115.235	489.688
.940	154.757	116.731	503.398
.950	157.802	118.436	519.037
.960	161.380	120.437	537.411
.970	165.778	122.896	560.002
.980	171.625	126.161	590.036
.990	180.840	131.302	637.379



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. 0411-8221400 Samata-Gowa

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B./Un.06:2/FKIK/PP.00.9/II/2016  
6402

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Laboratorium Kompetensi Kesehatan Lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar menerapkan bahwa:

Nama : Andi Nur Rifa'atil Fahmiah AR  
Nim : 70200112089  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok E4/No12  
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Kesling  
Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*) Dengan Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata L*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Muscado mestic*) (Uji Perbandingan)

Benar telah melakukan penelitian di Laboratorium Kompetensi Kesehatan Lingkungan pada tanggal 06 Juni- 12 September 2016. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Samata-Gowa 4 November 2016

Mengetahui,  
Kepala Laboratorium



**Muhammad Saleh Iastam, SKM., M.Kes**  
NIP. 1975052005021008

**Lampiran Keenam : Dokumentasi Penelitian**



Gambar 1.  
Gambar Daun Tembakau (*Nicotiana tobaccum*)



Gambar 2.  
Daun cengkeh yang telah dikeringkan

Gambar 3.  
Daun Sirsak  
*muricata l*)



(*Annona*



Gambar 4.  
Daun Sirsak yang telah dikeringkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



Gambar 5.  
Daun tembakau dan sirisak kering di potong kecil-kecil dan direndam dengan etanol 96 %



Gambar 6.  
Daun tembakau dan daun sirisak setelah 2 x 24 jam.



Gambar 7.  
Setelah 2 X 24 jam perendaman



Gambar 8.  
Penyaringan daun tembakau dan daun sirih yang telah direndam dengan etanol 96%.



Gambar 9.  
Hasil penyaringan rendaman daun kering dengan etanol 96%



Gambar 10.  
Proses pemisahan ekstrak dari cairan etano menggunakan rotapapor



Gambar 11.  
Hasil Ekstrak yang telah dibebas etanolkan



Gambar 12.  
Perlakuan pada kontrol

ALAUDDIN  
MAKASSAR



Gambar 13.  
Perlakuan pada konsentrasi 60% 70% dan 80%



Gambar 14.

Pencatatan jumlah lalat rumah yang mati