

**EVALUASI EFEKTIVITAS ANTIEMETIK PADA PASIEN KANKER
PAYUDARA PASCA KEMOTERAPI DI RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AZIZAH
NIM. 70100113035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017
M A K A S S A R

**EVALUASI EFEKTIVITAS ANTIEMETIK PADA PASIEN KANKER
PAYUDARA PASCA KEMOTERAPI DI RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AZIZAH
NIM. 70100113035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah

NIM : 70100113035

Tempat Tanggal Lahir : Ujung pandang, 21 Desember 1995

Jurusan : Farmasi


Alamat : Jl. Dr. Leimena No.46 Makassar

Judul : Evaluasi Efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, Agustus 2016

Penyusun,



Nur Azizah
NIM. 70100113035

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Evaluasi efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar” yang disusun oleh Nur Azizah, NIM: 70100113035, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan 22 Dzulqa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
Sekretaris : Haeria, S.Si.,M.Si
Pembimbing I : Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si.,M.Si.,Apt
Pembimbing II : Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc.,Apt
Penguji I : Alifia Putri Febriyanti, S.Farm.,M.Farm.Klin,Apt
Penguji II : Drs. H. M. Kurdi, M.HI

()

(Haeria)

(Gemy)

(Asrul)

(Alifia)

(Kurdi)

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat keimanan, nikmat islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam untuk tuntunan dan suri tauladan senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tab'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dienu Islam hingga yaumul akhir

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini merupakan penelitian klinik yang membahas tentang "*Efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara yang pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016*". Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat diterima sehingga penelitian dapat dilaksanakan dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam pemilihan terapi mual muntah pasien kemoterapi di rumah sakit.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag** dan Ibunda **Hj. Hamna Katu** dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Andi Asrul Ismail, S.Farm.,M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Alifia Putri Febriyanti, S.Farm.,M.Farm.Klin.,Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Drs. H. M. Kurdi, M.HI selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Seluruh petugas dan staf instalasi rekam medis RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang telah banyak membantu penulis menyediakan dan menerangkan berbagai macam hal yang penulis butuhkan demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Kiki Rezky, Herlinda sukanto, A.Try Resti fauziah, Agus Ryanto dan teman-teman seperjuangan sesama peneliti klinik yang sudah banyak mengajarkan, menemani, dan membantu mengurus segala kelengkapan berkas demi sempurnanya skripsi ini.
13. Kakanda Nurhidayat dan teman-teman posko KKN-R Angt-53 Kelurahan Malino, Kec. Tinggimoncong (Hasan, ical, tenri, uli, ria, ana, isma) terima kasih dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan rasa nyaman, terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 15 Agustus 2017

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	12
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	12
B. Kanker Payudara.....	12
C. Kemoterapi Kanker.....	32
D. Mual dan Muntah Kemoterapi.....	38
E. Tinjauan Islam	43
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
B. Jenis Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	52
E. Variabel Penelitian.....	52
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Analisis Data	54
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan	81
BAB V. PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Implikasi Penelitian	94

KEPUSTAKAAN.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase kasus baru dan kematian akibat kanker di dunia	13
2. Estimasi jumlah kasus baru kanker di Indonesia	14
3. Anatomi payudara	19
4. Mekanisme mual dan muntah	39
5. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur	56
6. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan	57
7. Distribusi pasien berdasarkan stadium kanker payudara	58
8. Riwayat keluarga pasien	59
9. Riwayat usia menarce pasien	61
10. Riwayat usia kehamilan pertama pasien	62
11. Riwayat lama penggunaan kontrasepsi pasien	63
12. Kategori berat badan berdasarkan IMT	65
13. Distribusi jumlah siklus kemoterapi yang dijalani pasien	67
14. Distribusi lokasi benjolan kanker payudara pasien	67
15. Distribusi Jenis Kemoterapi	68
16. Distribusi patologi anatomi kanker payudara pasien	69
17. Distribusi regimen kemoterapi dan jumlah siklus	71
18. Persentase kesesuaian dosis antiemetik premedikasi kemoterapi	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Persetujuan Etik Penelitian	101
2. Skema Penelitian	102
3. Guideline terapi antiemetik MASCC/ESMO	103
4. Rekomendasi dosis antiemetik MACC/ESMO	105
5. Analisis Univariant Data karakteristik pasien	106
6. Analisis bivariant chi-square	109
7. Analisis Multivariant regresi logistik	115
8. Kuisisioner Penelitian	118
9. Surat Izin Penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	122
10. Surat Selesai meneliti	123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkatan resiko emetik agen kemoterapi	36
2. Kelompok resiko emetik – Dewasa – Agen tunggal IV	36
3. Kelompok Resiko emetik – Dewasa – Agen tunggal Oral	37
4. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur	56
5. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan	56
6. Distribusi pasien berdasarkan stadium kanker payudara	57
7. Riwayat keluarga pasien	58
8. Riwayat usia menarce pasien	60
9. Riwayat usia kehamilan pertama pasien	61
10. Riwayat lama penggunaan kontrasepsi pasien	63
11. Kategori berat badan berdasarkan IMT	64
12. Distribusi jumlah siklus kemoterapi yang dijalani pasien	66
13. Distribusi lokasi benjolan kanker payudara pasien	67
14. Distribusii Jenis Kemoterapi	68
15. Distribusi patologi anatomi kanker payudara pasien	68
16. Ditribusi regimen kemoterapi dan jumlah siklus	70
17. Jenis premedikasi, frekuensi tujuan terapi, golongan dan bentuk sediaan	72
18. Kesesuaian antiemetik dengan resiko emesis agen kemoterapi berdasarkan guideline MASCC/ESMO 2016	73
19. Kesesuaian dosis antiemetik dengan guideline MASCC/ESMO	74
20. Antiemetik dengan indikasi dan dosis yang tidak sesuai dengan Guideline MASCC/ESMO pada level minimal	75
21. Jenis antiemetik yang diberikan pasien dan keluhan emesisnya	76
22. Siklus yang dijalani pasien selama tahun 2016	77
23. Distribusi pasien dengan golongan dan antimetik yang sama serta keluhan emesisnya	78
24. Analisis bivariant variabel jenis kelamin, usia, siklus, kesesuaian terapi, kesesuaian dosis dengan emesis	79
25. Hasil analisis uji regresi logistik faktor yang mempengaruhi kejadian emesis	80

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 701001103035
Judul : Evaluasi efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar

Kemoterapi pada pasien kanker payudara dapat menyebabkan efek samping yang merugikan seperti mual dan muntah. Untuk mengatasi efek samping tersebut, maka diberikan terapi antiemetik sebelum pelaksanaan kemoterapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi, kesesuaian terapi dan dosis berdasarkan standar guideline MASCC/ESMO, dan variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analitik dengan rancangan *crosssectional* dan pengambilan data secara *retrospektif* dari data rekam medik pasien tahun 2016 yang memenuhi kriteria inklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 111 pasien. Efektivitas obat berdasarkan tidak adanya kejadian emesis sebesar 93,95% dengan kombinasi ondansetron dan dexametason sebagai pilihan terapi. Kesesuaian terapi antiemetik dan dosis berdasarkan standar pengobatan *Multinational Association Of supportive care in cancer/ european society for medical oncology (MASCC/ESMO)* sebesar 88%, kesesuaian dosis dexametason adalah 29,53% dan dosis ondansetron adalah 90,6%. Hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia, siklus kemoterapi, dan kesesuaian terapi antiemetik berdasarkan *guideline MASCC/ESMO* dengan efektivitas antiemetik, dengan variabel yang berpengaruh adalah siklus kemoterapi (OR=4,306) dan terapi antiemetik (OR=3,074).

Kata Kunci : *Kanker Payudara, kemoterapi, antiemetik, retrospektif*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Nur Azizah
NIM : 701001103035
Title : Evaluation of antiemetic effectiveness in post-chemotherapy breast cancer patients in Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar

Chemotherapy in breast cancer patients can cause adverse side effects such as nausea and vomiting. To overcome these side effects, then given antiemetic therapy before chemotherapy is given. This study aims to knowing the effectiveness of premedication antiemetics chemotherapy, therapeutic and dosage compatibility based on standard MASCC / ESMO guideline, and variables that influence antiemetic effectiveness in post-chemotherapy breast cancer patients. The type of this research is Descriptive Analytic with crosssectional design and retrospective data retrieval from patient's medical record data of 2016 that meet inclusion criteria.

The results showed that the number of samples meeting the inclusion criteria was 111 patients. The effectiveness of the drug based on the absence of an emesis event of 93.95% with combination of ondansetron and dexametason as the treatment option. The suitability of antiemetic therapy and dosage based on standard treatment of 88% of the Medicinian Association of supportive care in cancer / european society for medical oncology (MASCC / ESMO), dexamethasone dose adjustment was 29.53% and ondansetron dose was 90.6%. The statistical results show that there is a relationship between age, chemotherapy cycle, and the compatibility of antiemetic therapy based on MASCC / ESMO guideline with antiemetic effectiveness, with influencing variables are chemotherapy cycle (OR = 4,306) and antiemetic therapy (OR = 3,074)

Keywords: *Breast Cancer, chemotherapy, antiemetic, retrospective, Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kanker atau karsinoma adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan sel-sel dalam tubuh berubah dan membelah secara tidak terkendali. Sebagian besar jenis sel kanker akhirnya membentuk benjolan dan massa yang disebut dengan tumor, dan diberi nama sesuai tempat tumor tersebut berasal. Sebagian besar kanker payudara dimulai di bagian-bagian dari jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu (*lobulus*) dan saluran yang menghubungkan lobulus ke puting (*nipple*) dan selebihnya terdiri dari lemak, jaringan ikat dan jaringan getah bening yang kemudian dapat bermetastasis ke jaringan dan organ yang lain (Alteri, 2015)

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Kanker paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya. Berdasarkan Data GLOBOCAN, *International Agency for Research on Cancer* (IARC), diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 14.067.894 kasus baru kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Kanker payudara, kanker prostat, dan kanker paru merupakan jenis kanker dengan persentase kasus baru tertinggi tahun 2012 setelah dikontrol dengan umur, yaitu sebesar 43,3%, 30,7%, dan 23,1%. Sementara itu, kanker paru dan kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi setelah di kontrol dengan umur tertinggi akibat kanker.

Secara nasional prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4% atau diperkirakan sekitar 347.792 orang.

Provinsi D.I Yogyakarta memiliki prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar 4,1%. Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan estimasi penderita kanker terbanyak, yaitu sekitar 68.638 dan 61.230 orang. Sulawesi Selatan menempati urutan ke enam dari 34 provinsi yang tertinggi kasus kankernya yaitu berkisar 1,7% atau 14.119 orang. Penyakit kanker dapat menyerang semua umur, dimana hampir semua kelompok umur penduduk memiliki prevalensi penyakit kanker yang cukup tinggi. Prevalensi penyakit kanker tertinggi berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu sebesar 5,0% dan prevalensi terendah pada anak kelompok 1-4 tahun dan 5-14 tahun sebesar 0,1%, adapun prevalensi yang cukup tinggi pada kelompok umur 25-34 tahun, 35-44 tahun dan 45-54 tahun sebesar 0,9%;2,1% dan 3,5% (Kemenkes RI, 2015)

Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang perempuan. Penyakit kanker payudara menempati urutan kedua sebagai penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,5%. Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke enam sebagai provinsi dengan kanker payudara terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 0,7% atau 2.975 orang (Kemenkes. 2015) . Kanker payudara menempati urutan pertama kanker terbanyak jumlah pasiennya di RSUP Dr.Wahidin Sudirohuso Makassar yaitu 363 orang.

Dalam pelaksanaannya, kemoterapi menggunakan obat-obatan sitostatika. Sitostatika adalah kelompok obat (bersifat sitotoksik) yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Obat sitotoksik adalah obat yang sifatnya membunuh atau merusakkan sel-sel kanker. Terapi kanker dengan cara kemoterapi dapat menimbulkan berbagai macam efek samping, seperti mual dan muntah, iritasi

kulit (kemerahan, jerawat, gatal dan lain-lain), diare, konstipasi, kerontokan rambut, perubahan pada kuku, anemia, infeksi, pendarahan, kelelahan, sariawan, sakit tenggorokan, retensi cairan dan sebagainya. Efek samping tersebut dapat terjadi bergantung pada kondisi fisik masing-masing individu yang menerima terapi

Mual dan muntah akibat kemoterapi (*chemotherapy induced emesis*) adalah efek samping terkait pengobatan umum yang memiliki pengaruh yang merugikan pada kualitas hidup pasien kanker dan dapat mengganggu pola makan, aktivitas sehari-hari dan keengganan pasien untuk melanjutkan kemoterapi. Berdasarkan data dari Sukandar, 2014 tentang reaksi obat merugikan pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi, pasien menempatkan mual dan muntah pada daftar efek samping kemoterapi yang paling diresahkan setelah alopecia dan somatitis. Obat-obat yang digunakan untuk kemoterapi (sitotoksik) telah diketahui dapat menginduksi mual dan muntah pada pasien. Berdasarkan survei di Amerika, dari semua pasien yang mendapat kemoterapi, 70% sampai 80% diantaranya mengalami efek samping mual dan muntah (Nasif, 2011). Besarnya angka kejadian mual muntah sebagai efek samping dari kemoterapi mengakibatkan salah satunya adalah keengganan pada pasien kanker untuk menerima kemoterapi untuk pilihan terapinya.

Pemberian antiemetika sangat penting bagi pasien untuk mencegah muntah pada awal dan setelah kemoterapi sehingga dapat mencegah pasien dari rasa enggan dan trauma untuk mengikuti kemoterapi lagi, sebagai antisipasi muntah pada kemoterapi selanjutnya dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Nasif, 2011) 92,4% pasien masih mengalami mual dan muntah setelah diberikan antiemetik untuk mencegah emesis delayed. Antiemetik premedikasi kemoterapi untuk mencegah emesis akut merupakan hal yang penting

di berikan kepada pasien berdasarkan standar pengobatan yang sesuai dengan resiko emetogenesis agen kemoterapi yang akan diberikan. Oleh karena itu, pengontrolan mengenai efektivitas terapi dari antiemetik premedikasi kemoterapi perlu dilakukan dan hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian tersebut di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai agen kemoterapi kemoterapi berdasarkan tingkat emetogeniknya dan respon mual muntah setelah pemberian antiemetik premedikasi kemoterapi pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi sehingga dapat menjadi pedoman dalam pemilihan obat antiemetik yang diberikan pada pasien menggunakan standar guideline antiemetik MASCC/ESMO.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi ?
2. Apakah terapi dan dosis antiemetik premedikasi kemoterapi pada pasien kanker payudara telah sesuai dengan guideline antiemetik *Multinational Association of supportive care in cancer/ european society for medical oncology* (MASCC/ESMO) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016?
3. Apakah terdapat hubungan antarvariabel pada efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan menggunakan analisis statistik ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur hasil terapi yang telah dicapai dengan hasil terapi yang idealnya harus di capai dan yang menjadi bahan evaluasi pada penelitian ini adalah efektivitas antiemetik yang diberikan kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi
- b. Efektivitas adalah sesuatu yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai efek terapi yang diinginkan dan dalam penelitian ini antiemetik premedikasi kemoterapi yang akan dinilai efektivitasnya.
- c. Emetik adalah zat yang dapat menyebabkan mual dan dapat disertai dengan muntah
- d. Emesis adalah keadaan mual yang dapat disertai dengan muntah
- e. Antiemetik adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan rasa mual dan muntah yang disebabkan karena efek samping dari obat kemoterapi
- f. Tumor adalah kondisi dimana pertumbuhan sel tidak normal sehingga membentuk suatu lesi atau dalam banyak kasus benjolan di tubuh.
- g. Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara yang menyebabkan sel dan jaringan payudara berubah bentuk menjadi abnormal dan bertambah banyak secara tidak terkendali.
- h. Kemoterapi adalah terapi pemberian sitostatika untuk mengurangi, menghilangkan, atau menghambat pertumbuhan sel kanker.
- i. Pasca kemoterapi adalah keadaan setelah menerima kemoterapi pada setiap pasien kanker payudara berdasarkan catatan dari rekam medik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016.

- j. Mual atau *nausea* adalah suatu sensasi ingin muntah, secara samar dialihkan ke epigastrium dan abdomen, serta sering memuncak dengan muntah yang menjadi salah satu efek samping dari kemoterapi.
- k. Muntah atau *vomiting* adalah semburan dengan paksa isi lambung melalui mulut atau biasa juga disebut emesis yang menjadi salah satu efek samping kemoterapi.
- l. Populasi adalah semua anggota sekelompok orang kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas atau kelompok yang lebih besar yang menjadi sasaran generalisasi dalam hal ini adalah pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi.
- m. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu dalam hal ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi.
- n. Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum dari suatu populasi target yang akan dijadikan subjek penelitian.
- o. Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan beberapa subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian dikarenakan kriteria dan sebab-sebab tertentu.

2. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi sebagai regimen pengobatannya dan mendapatkan terapi antiemetik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan data rekam medik pasien tahun 2016 . Dari hasil penelusuran data akan diidentifikasi agen kemoterapi berdasarkan tingkat emetogeniknya, penggunaan obat mual dan muntah yang

diberikan, jenis dan dosisnya kepada pasien sebelum menjalani kemoterapi. Dan hasil dari penelusuran dibandingkan dengan Antiemetic Guideline oleh *Multinational Association Of Supportive Care In cancer/european society for medical oncology* tahun 2016 terkait terapi antiemetik pasien kemoterapi.

D. Kajian Pustaka

1. Bambang E.P.hariyanto, dkk (2015). *Kejadian Muntah pada Penderita Kanker yang menjalani pengobatan kemoterapi di RSUP. Prof. Dr. R. Kandou Manado*. Di dalam penelitiannya, Bambang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan potong lintang terhadap kejadian mual muntah semua pasien kanker dan Hasilnya dari 51 pasien, efek samping mual dan muntah dialami oleh 24 pasien (47,1%), pada wanita (51,6%) dan lebih sering pada anak perempuan usia 6-10 tahun yang terjadi pada fase konsolidasi dan induksi kemoterapi dengan efek besar pada pemberian HD-Mtx iv.1000 mg/m².

Jurnal penelitian ini ingin mengetahui kejadian mual muntah pada semua pasien kanker pasca kemoterapi, sedangkan penulis hanya berfokus pada penelitian terhadap pasien kanker payudara pasca kemoterapi.

2. Cici Priyatin, dkk (2013) *Faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap kejadian kanker payudara di RSUP Dr. Kariadi Semarang*. Penelitian ini menggunakan rancangan case control study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor resiko yang paling berpengaruh adalah riwayat keluarga dengan resiko 6.938 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara.

Jurnal penelitian ini ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian kanker payudara, sedangkan penulis ingin mengetahui efektivitas dari penggunaan antiemetik premedikasi setelah dilakukan kemoterapi pada pasien kanker payudara.

3. Dewi, dkk (2014) *Efektivitas ondasetron dalam menangani mual dan muntah pasca kemoterapi Metotreksat dosis tinggi pada pasien anak dengan leukimia limfoblastik akut di Rumah sakit umum pusat sanglah*. Penelitian ini menggunakan metode Observasional *cross-sectional* dan memperoleh hasil bahwa ondasetron efektif dalam menangani mual dan muntah yang dialami oleh pasien LLA setelah mendapat kemoterapi metotreksat dosis tinggi.

Jurnal penelitian ini mengkhususkan efektivitas ondasetron dosis tunggal dengan agen kemoterapi tertentu pada pasien leukimia, sedangkan penulis ingin mengetahui efektivitas ondasetron dosis kombinasi dengan antiemetik lainnya sebagai premedikasi kemoterapi pada berbagai agen kemoterapi pada pasien kanker payudara.

4. James J. Natale (2015) *Meninjau Pemberian antiemetik sebagai profilaksis dari kemoterapi yang menginduksi mual dan muntah*, USA. Peneliti menggunakan metode meta analisis dan memperoleh hasil bahwa 5-HT3 RA dan Palonosetron mempunyai khasiat yang lebih dalam mencegah emesis tertunda dari MEC (*moderately emetogenic chemotherapy*) dan kombinasi dengan NEPA (Netupitant/Palonosetron) menunjukkan keberhasilan dalam uji klinis dalam mencegah mual dan muntah akut, tertunda dan secara keseluruhan.

Jurnal penelitian ini ingin mengetahui agen antiemetik yang paling efektif dalam mencegah mual dan muntah dari efek samping kemoterapi dengan membandingkan hasil dari berbagai penelitian yang ada, sedangkan penulis ingin mengetahui penerapan dan efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi dalam mencegah mual dan muntah akut di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo makassar.

5. Elin Yulinah Sukandar (2014) *Evaluasi reaksi obat merugikan pada pasien kemoterapi kanker payudara di Salah satu Rumah sakit di Bandung*. Peneliti ingin

mengetahui ROM yang terjadi pada pasien kanker payudara yang sedang menjalani siklus kemoterapinya menggunakan jenis penelitian konkuren dan mendapatkan hasil bahwa ROM yang paling banyak dialami oleh pasien adalah alopecia, stomatitis dan mual muntah. Sedangkan ROM yang dapat dicegah hanya mual dan muntah.

Jurnal penelitian ini ingin mengetahui ROM dari kemoterapi dan yang dapat dicegah adalah mual muntah. Sedangkan penelitian ini, ingin mengetahui efektivitas antiemetik dalam mencegah efek samping kemoterapi yakni mual dan muntah pada pasien kanker payudara.

6. Piotr K Janicki (2016) *Manajemen akut maupun tertunda dari kemoterapi yang menginduksi mual dan muntah: peran netupitant kombinasi dengan palonosetron*, USA, 2016. Penelitian ini menggunakan metode Meta analisis dan memperoleh hasil bahwa Kombinasi tiga obat yang terdiri dari NK1RA, 5HT3RA dan deksametason sangat efektif dalam mengatasi mual dan muntah dari kemoterapi yang sangat emetogenik

Jurnal ini ingin mengetahui kombinasi obat yang paling efektif dalam mencegah mual muntah akut maupun tertunda dengan membandingkan dari berbagai penelitian yang ada. Sedangkan penulis ingin mengevaluasi kejadian mual dan muntah dari kombinasi obat antiemetik premedikasi yang diterapkan di RSUP Dr. Wahidin suidirohusodo Makassar.

7. Wahyu Utamingrum, dkk (2013) *Evaluasi Kepatuhan dan Respon Mual Muntah Penggunaan Antiemetik Pada Pasien Kanker Payudara yang menjalani Kemoterapi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo*. Peneliti ingin mengetahui respon mual muntah tertunda berdasarkan kepatuhan pasien menggunakan metode observasi prospektif dengan rancangan deskriptif analitik yang dilakukan dari bulan

Desember 2012 sampai Maret 2013 dan memperoleh hasil bahwa respon mual muntah merupakan respon terbanyak yang ditimbulkan oleh pemberian agen kemoterapi baik pada fase *acute emesis* (80%) dan *delayed emesis* (90%). Sebanyak 79% pasien patuh terhadap regimen antiemetik yang diberikan. Tidak ada hubungan antara kepatuhan penggunaan antiemetik dan respon mual muntah pada pasien kanker payudara di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Jurnal penelitian ini menggunakan metode prospektif untuk mengetahui kepatuhan pasien yang mempengaruhi respon mual dan muntah tertunda pasien kanker payudara pasca kemoterapi. Sedangkan penulis ingin mengetahui respon mual dan muntah akut setelah pemberian antiemetik premedikasi kemoterapi dengan mengacu pada standar guideline antiemetik MASCC/ESMO menggunakan metode *retrospektif*.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui efektivitas antiemetik premedikasi yang diberikan kepada pasien kanker payudara pasca kemoterapi dalam mengatasi mual dan muntah sebagai efek samping dari kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
- b. Mengetahui kesesuaian terapi dan dosis antiemetik premedikasi berdasarkan standar guideline antiemetik MASCC/ESMO Tahun 2016
- c. Mengetahui hubungan antarvariabel efektivitas antiemetik pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan menggunakan analisis statistik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk pengobatan dalam kasus mual dan muntah pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi.
- b. Dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun acuan dalam pemberian dan peningkatan mutu pelayanan medik yang tepat dan aman terutama pengobatan dalam hal penatalaksanaan kasus mual dan muntah pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar merupakan rumah sakit yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan, RSWS juga terlibat dalam penanganan pasien kanker payudara. Di rumah sakit ini, pasien kanker payudara memperoleh berbagai fasilitas layanan pengobatan kanker payudara, antara lain dengan operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon dan terapi lainnya. Penelitian ini dilakukan di RSWS karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang cukup besar dan menjadi pusat rujukan utama pasien kanker di Indonesia timur (www.rsupwahidin.com)

B. *Kanker payudara*

1. Definisi

Kanker payudara adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan sel-sel dalam jaringan payudara berubah dan tumbuh secara tidak terkendali yang dimulai dari bagian-bagian jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu (*lobulus*) dan saluran yang menghubungkan lobulus ke puting, yang kemudian menyebar ke bagian-bagian lain dari payudara yang terdiri dari lemak, jaringan ikat dan kelenjar getah bening dan dapat menyebar luas (*metastasis*) ke organ lain (Alteri, 2015)

2. Epidemiologi

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Kanker

paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya.



Gambar 1. Persentase kasus baru dan kematian akibat kanker di dunia

Berdasarkan Data GLOBOCAN, *International Agency for Research on Cancer* (IARC), diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 14.067.894 kasus baru kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh dunia. kanker payudara, kanker prostat, dan kanker paru merupakan jenis kanker dengan persentase kasus baru (setelah dikontrol dengan umur) tertinggi, yaitu sebesar 43,3%, 30,7%, dan 23,1%. Sementara itu, kanker paru dan kanker payudara merupakan penyebab kematian (setelah dikontrol dengan umur) tertinggi akibat kanker. WHO (*World Health Organization*) mengemukakan bahwa, insiden kanker di seluruh dunia tahun 1990 adalah 8,07 juta jiwa, mortalitas 5,7 juta. Setiap tahun jumlah penderita kanker di dunia bertambah menjadi 6,25 juta orang. Tahun 2000 insidennya 10,3 juta, mortalitas 7,1 juta. Pada tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk dunia mencapai 20 juta, mortalitas 12 juta, dan sebagian besar akan terjadi di negara berkembang (Globocan, 2012).

No	Provinsi	Estimasi Jumlah Kasus		Jumlah provider	Skining	Jumlah trainer
		Kanker Serviks	Kanker Payudara			
1	Aceh	1.401	1.869	0	0	0
2	Sumatera Utara	4.694	2.682	53	70.268	6
3	Sumatera Barat	2.285	2.285	40	507	6
4	Riau	694	694	34	0	12
5	Jambi	1.792	977	18	0	18
6	Sumatera Selatan	1.544	772	20	0	6
7	Bengkulu	705	705	20	498	15
8	Lampung	765	1.148	20	151	6
9	Kep. Bangka Belitung	323	194	0	0	18
10	Kep. Riau	1.416	378	17	685	12
11	DKI Jakarta	5.919	3.946	249	82.615	10
12	Jawa Barat	15.635	6.701	86	129.538	6
13	Jawa Tengah	19.734	11.511	243	101.107	21
14	DI Yogyakarta	2.703	4.325	90	9.280	6
15	Jawa Timur	21.313	9.688	118	92.345	6
16	Banten	2.252	2.252	35	600	5
17	Bali	1.438	1.233	169	78.359	7
18	Nusa Tenggara Barat	958	479	83	3.059	36
19	Nusa Tenggara Timur	1.002	1.252	31	322	18
20	Kalimantan Barat	882	441	91	2.655	24
21	Kalimantan Tengah	335	112	21	1.119	23
22	Kalimantan Selatan	2.087	1.328	0	38.213	15
23	Kalimantan Timur	752	1.879	51	486	6
24	Sulawesi Utara	1.615	346	0	21.833	6
25	Sulawesi Tengah	680	408	20	3.052	6
26	Sulawesi Selatan	3.400	2.975	83	8.469	6
27	Sulawesi Tenggara	354	590	70	51	16
28	Gorontalo	0	111	0	0	9
29	Sulawesi Barat	625	188	0	73	11
30	Maluku	824	165	0	0	23
31	Maluku Utara	819	218	0	0	19
32	Papua Barat	40	80	20	46	15
34	Papua	2.018	466	0	105	12
INDONESIA		98.692	61.682	1.682	645.436	405

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan Data Riset Subdti Pengendalian Penyakit Kanker Dit. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pembinaan Penyakit dan Pencegahan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI.

Gambar 2. Estimasi jumlah kasus baru kanker di indonesia

Global Health Estimates tahun 2013 menyatakan meskipun kanker payudara dianggap penyakit negara maju, hampir 50% dari kasus kanker payudara dan 58% kematian terjadi di negara berkembang. WHO memperkirakan kasus kanker payudara pada wanita akan terus meningkat tiap tahunnya (Jemal, 2011)

Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang perempuan. Penyakit kanker payudara menempati urutan kedua sebagai penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,5%. Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke enam sebagai provinsi dengan kanker payudara terbanyak di indonesia yaitu sebesar 0,7% atau 2.975 orang (Kemenkes. 2015)

3. Faktor Resiko

Penyebab secara pasti belum diketahui. Namun resiko untuk menderita kanker payudara meningkat pada wanita yang mempunyai faktor resiko seperti berikut (Suyatno, dkk. 2014):

a. Jenis Kelamin Wanita

Insiden kanker payudara pada wanita dibanding pria lebih dari 100:1. Secara umum 1 dari 9 wanita Amerika akan menderita kanker payudara sepanjang hidupnya.

b. Usia

Menurut *National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology and End Result Program*, Insiden kanker payudara meningkat cepat selama dekade ke-4 kehidupan. Setelah menopause insiden terus meningkat tapi lebih lambat, puncak insiden pada dekade ke-5 dan ke-6 dan level terendah pada dekade keenam dan ke tujuh. Satu dari 8 penderita kanker payudara berusia kurang dari 45 tahun dan berkisar 2/3 penderita kanker payudara berusia lebih dari 55 tahun.

c. Riwayat keluarga

Pasien dengan riwayat keluarga tingkat pertama (ibu dan saudara kandung) mempunyai resiko 4-6 kali dibanding wanita yang tidak mempunyai faktor resiko ini. Usia saat terkena juga mempengaruhi faktor resiko, pasien dengan ibu didiagnosis kanker payudara saat kurang dari 60 tahun resiko meningkat 2 kali. Pasien dengan keluarga tingkat pertama premenopause menderita bilateral breast cancer, mempunyai resiko 9 kali. Pasien dengan keluarga tingkat pertama post menopause menderita bilateral breast cancer mempunyai resiko 4-5,4 kali.

d. Usia melahirkan anak pertama

Jika usia 30 atau lebih resiko 2 kali dibanding wanita yang melahirkan usia kurang dari 20 tahun

e. Riwayat penderita kanker payudara

Merupakan faktor resiko untuk payudara kontralateral, resiko ini tergantung pada saat diagnosis. Resiko ini meningkat pada saat usia muda

f. Predisposisi genetikal

Resiko ini berjumlah kurang dari 10% kanker payudara. *Autosomal dominant inheritance* yang meningkatkan resiko terlihat pada *Li-Fraumeni syndrome*, *MuirTorre syndrome*, *Cowden disease*, *Peutz-Jeghers syndrome* dan mutasi BRCA-1 dan BRCA-2. *Ataxia telangiectasis (Autosomal recessive inheritances)*, mutasi PTEN dan TP63 juga merupakan faktor resiko lain.

g. Proliferasi benigna dengan hiperplasia atipikal

Faktor ini meningkatkan resiko 4 kali. Atipia dan hiperplasia disertai adanya riwayat keluarga resiko meningkat 10 kali. Pada tumor jinak yang menunjukkan ekspresi reseptor estrogen dan progesteron resikonya 3,2 kali. Hiperplasia atipikal terlihat pada 10% spesimen biopsi.

h. Radiasi

Radiasi dibawah usia 16 tahun mempunyai resiko 100 kali, sebelum umur 20 tahun mempunyai resiko 18 kali, usia 20-29 tahun resiko 6 kali. Radiasi setelah usia 30 tahun resiko tidak bermakna. Lebih kurang 0,1% pasien-pasien yang diradiasi akan timbul sarkoma setelah 5 tahun

i. Perubahan gaya hidup

Diet tinggi kalori, tinggi lemak, konsumsi alkohol dan merokok serta obesitas pada menopause.

j. Hormonal

Menopause dibawah 12 tahun resiko 1,7-3,4 kali, menopause usia diatas 55 tahun resiko 1,5 kali. Penggunaan kontrasepsi oral lebih dari 8-10 tahun juga meningkatkan resiko.

Penggunaan kontrasepsi oral yang mengandung kombinasi estrogen dan progesterin memberikan resiko yang lebih tinggi. Resiko ini juga lebih besar bagi

wanita yang memulai terapi hormon setelah menopause dibandingkan dengan mereka yang memulai sebelumnya. Dan wanita yang hanya menggunakan terapi hormon estrogen saja, mempunyai penurunan resiko kanker 23% lebih rendah setelah penggunaan bertahun (Alteri, dkk. 2015).

4. Patofisiologi

Kanker payudara dibagi menjadi kanker yang belum menembus membran basal (*noninvasif*) dan kanker yang sudah menembus membran basal (*invasif*). Bentuk utama karsinoma payudara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Noninvasif

1) *Karsinoma duktal in situ* (DCIS)

Merupakan kanker non-invasif dimana sel-sel abnormal ditemukan pada lapisan duktus laktiferus. DCIS mempunyai gambaran histologis yang bermacam-macam, dari bentuknya yaitu tipe solid, kribiformis, papilaris, dan clinging serta gambaran nukleus yang bervariasi dari derajat rendah dan monomorfik hingga derajat tinggi dan heterogen. Prognosis DCIS lebih dari 97% pasien dapat bertahan hidup lama (Kumar, dkk. 2016)

2) Penyakit paget

Penyakit pada puting payudara yang disebabkan oleh perluasan karsinoma duktal in situ ke duktus laktiferus, tampak sebagai erupsi ekzematosa kronik yang berkembang menjadi ulkus basah (Sjamsuhidajat, 2014).

3) *Karsinoma lobular in situ* (LCIS)

Sel-sel abnormal tumbuh dalam lobulus, kelenjar penghasil susu pada akhir saluran payudara. Pertumbuhannya tetap dalam lobulus dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Karsinoma lobular in situ biasanya di diagnosa sebelum menopause pada rentang usia 40-50 tahun. Gambaran mikroskopis dari LCIS

adalah uniform, sel bersifat monomorf dengan nukleus polos bulat dan terdapat dalam kelompok kohesif di duktus dan lobulus (Kumar, dkk. 2016).

b. Invasif

1) *Karsinoma lobular invasif*

Karsinoma lobular invasif telah menembus dinding lobulus dan mulai menyerang jaringan payudara sekitar. Sekitar 10% dari semua kanker payudara invasif adalah karsinoma lobular invasif. Sel-sel tersebut menginvasi stroma dan terkadang mengelilingi asinus atau duktus sehingga membentuk yang disebut sebagai mata sapi (*bull's eye*) (Kumar, dkk. 2016).

2) *Karsinoma duktal invasif*

Sekitar 70-80% dari semua kanker payudara adalah karsinoma duktal invasif. Kanker ini yang telah menembus dinding duktus laktiferus dan menyerang jaringan payudara sekitarnya. Kanker dengan tahap lanjut menimbulkan gambaran massa melekat ke otot pektolaris sehingga terjadi fiksasi lesi, melekat ke kulit sehingga menyebabkan retraksi dan cekungan (*dimpling*) kulit payudara (Kumar, dkk. 2016).

c. Karsinoma inflamasi

Karsinoma inflamasi ini jarang ditemukan yang mempunyai gambaran klinis berupa pembesaran dan pembengkakan payudara, kemerahan, biasanya tanpa terasa massa yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran limfa dermis. Kanker ini tumbuh dan menyebar dengan cepat, dengan prognosis yang buruk (Kumar, dkk. 2016).


5. Anatomi payudara

Payudara terletak pada hemitoraks kanan dan kiri. Batas payudara yang tampak dari luar pada superior di iga II, inferior pada iga VI, taut antar sternokostal bagian medial dan bagian lateral pada linea aksilaris anterior (Sjamsuhidajat, 2014)

1) Struktur payudara

Struktur payudara terdiri dari parenkim epitelial, lemak, pembuluh darah, saraf, saluran getah bening, otot dan fascia. Parenkim epitelial terdiri dari 15-20 lobus yang setiap lobus mempunyai duktus laktiferus dan bermuara ke papilla mamma. Setiap lobus terdiri dari lobulus-lobulus yang masing-masing terdiri dari 10-100 kelompok asini. Lobulus ini mempunyai struktur dasar dari glandula mammae (Sjamsuhidajat, 2014)

Fungsi glandula mamma adalah sintesis, sekresi dan ejsksi susu. Produksi susu dirangsang oleh hormon prolaktin serta dipengaruhi oleh progesteron dan estrogen. Sedangkan untuk ejsksi susu dirangsang oleh hormon oksitosin. Diantara lobulus terdapt jaringan ikat yaitu ligamentum *Cooper* sebagai penyangga untuk payudara (Sjamsuhidajat, 2014).



Gambar 3. Anatomi payudara

2) Fisiologi

Payudara mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama pada payudara di awal kelahiran hingga menopause. Saat pubertas, terjadi perkembangan duktus dan sinus laktiferus yang dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium (Sjamsuhidajat, 2014).

Perubahan yang kedua sesuai dengan siklus haid. Sekitar hari ke-8 haid, payudara membesar dan beberapa hari sebelum haid berikutnya terjadi pembesaran maksimal. Beberapa hari menjelang haid, payudara terasa nyeri dan menegang sehingga saat melakukan palpasi payudara sulit dilakukan (Sjamsuhidajat, 2014).

Perubahan terakhir terjadi pada masa kehamilan dan menyusui. Saat masa kehamilan terjadi proliferasi epitel duktus lobus dan duktus alveolus sehingga payudara membesar. Sel-sel alveolus akan memproduksi air susu yang dialirkan ke asinus, kemudian dikeluarkan melalui duktus ke puting susu yang dipicu oleh oksitosin (Sjamsuhidajat, 2014).

6. Manifestasi Klinis (Davey, 2005)

a. Penyakit lokoregional

- (1) Benjolan pada payudara
- (2) Keluar cairan dari payudara
- (3) *Peau orange* (kulit jeruk)
- (4) Benjolan di aksila

b. Penyakit sistemik

- (1) Nyeri tulang
- (2) Malaise
- (3) Penurunan berat badan
- (4) *Confusion*

- (5) Sesak napas
- c. Hiperkalsemia
- d. Efusi pleura
- e. Limfangitis karsinomatosis
- f. Obstruksi SVC
- g. Keterlibatan sekunder otak dan medula spinalis
- h. Organomegali

7. Diagnosa

- a. Anamnesis dan pemeriksaan fisik

Bertujuan untuk mengidentifikasi identitas penderita, faktor resiko, perjalanan penyakit, tanda dan gejala kanker payudara, riwayat pengobatan, riwayat penyakit yang pernah diderita. Keluhan utama yang sering yaitu munculnya benjolan dipayudara. Nyeri payudara dan *nipple discharge* adalah keluhan yang sering, tetapi tidak selalu pertanda kanker, kelainan jinak seperti *fibrocystic disease* dan *papiloma intraductal* juga bisa bergejala seperti ini. Malaise, nyeri tulang, dispnea dan kehilangan berat badan adalah keluhan yang jarang, tapi merupakan indikasi adanya metastasis (Suyatno, dkk. 2014: 54)

- b. Mammografi

Mammografi memegang peranan mayor dalam deteksi dini kanker payudara, sekitar 75% kanker terdeteksi paling tidak satu tahun sebelum ada gejala atau tanda. Lesi dengan ukuran 2 mm sudah dapat dideteksi dengan mammografi. Akurasi mammografi untuk prediksi malignansi adalah 70-80%. Namun akurasi pada pasien usia muda (kurang dari 35 tahun) dengan payudara yang padat adalah kurang akurat disamping nyeri yang signifikan.

Terdapat 2 tipe pemeriksaan mammografi: skrinning dan diagnostik. *Skrinning mammografi* dilakukan pada wanita yang asimtomatik. Deteksi dini kanker payudara yang masih kecil memungkinkan pasien untuk mendapatkan kesuksesan terapi dengan kualitas hidup yang lebih baik. Skrinning mammografi direkomendasikan setiap 1-2 tahun untuk wanita usia 40 tahun dan setiap tahun untuk usia 50 tahun atau lebih. Pada kondisi tertentu direkomendasikan sebelum usia 40 tahun (misal wanita dengan keluarga tingkat pertama menderita kanker payudara). Untuk skrinning mammografi, masing-masing payudara dibuat dalam posisi cranio-caudal (CC) dan medio-lateral oblique (MLO) (Suyatno, dkk. 2014)

c. MRI (*Magnetic resonance imaging*)

Merupakan instrument yang sensitif untuk deteksi kanker payudara, karena itu MRI sangat baik (excellent) untuk deteksi kekambuhan local pasca BCT atau augmentasi payudara dengan implant, deteksi multifocal cancer dan sebagai tambahan terhadap mammografi pada kasus tertentu. MRI sangat berguna dalam skrinning pasien usia muda dengan densitas payudara yang padat yang memiliki resiko kanker payudara yang tinggi. Sensitivitasnya mencapai 98% tapi spesifitasnya rendah, biaya pemeriksaannya mahal dan waktu pemeriksaannya yang lama oleh karena itu MRI belum menjadi prosedur rutin (Suyatno, dkk. 2014)

d. Biopsi

Diagnosa ini dapat memberikan informasi sitologi atau histopatologi. *Fine-needle aspiration biopsy* (FNAB) dilanjutkan dengan pemeriksaan sitologi merupakan cara praktis dan lebih murah daripada biopsi eksisional dengan resiko yang rendah. Teknik ini memerlukan patologis yang ahli dalam diagnosis sitologi dari karsinoma mammae dan juga dalam masalah pengambilan sampel, karena lesi yang dalam mungkin terlewatkan. Insidensi false-positive dalam diagnosis adalah

sangat rendah, sekitar 1-2% dan tingkat false-negative sebesar 10%. Kebanyakan klinisi yang berpengalaman tidak akan menghiraukan massa dominan yang mencurigakan jika hasil sitologi FNA adalah negatif, kecuali secara klinis, pencitraan dan pemeriksaan sitologi semuanya menunjukkan hasil negatif. Large-needle (*core-needle*) biopsy mengambil bagian sentral atau inti jaringan dengan jarum yang besar. Alat biopsi genggam membuat large-core needle biopsy dari massa yang dapat dipalpasi menjadi mudah dilakukan di klinik dan cost-effective dengan anestesi lokal. Open biopsy dengan lokal anestesi sebagai prosedur awal sebelum memutuskan tindakan definitif merupakan cara diagnosis yang paling dapat dipercaya. FNAB atau core-needle biopsy, ketika hasilnya positif, memberikan hasil yang cepat dengan biaya dan resiko yang rendah, tetapi ketika hasilnya negatif maka harus dilanjutkan dengan open biopsy. Open biopsy dapat berupa biopsy insisional atau biopsi eksisional. Pada biopsy insisional mengambil sebagian massa payudara yang dicurigai, dilakukan bila tidak tersedianya core-needle biopsy atau massa tersebut hanya menunjukkan gambaran DCIS saja atau klinis curiga suatu inflammatory carcinoma tetapi tidak tersedia core-needle biopsy. Pada biopsy eksisional, seluruh massa payudara diambil (Suyatno, dkk. 2014).

e. Bone Scan, Foto toraks, USG Abdomen

Pemeriksaan *bone scan* (sidik tulang) bertujuan untuk evaluasi metastasis di tulang. Pemeriksaan ini dianjurkan pada kasus *advanced local disease*, *lymfe node metastases*, *distant metastases* dan ada simptom pada tulang. Bone scan secara rutin tidak dianjurkan pada stadium dini yang asimtomatis karena berdasarkan beberapa penelitian hanya 2% hasil yang positif pada kondisi ini. Berbeda halnya pada simtomatis stadium III, insiden positif bone scan mencapai 25% oleh karenanya pemeriksaan bone scan secara rutin sangat bermanfaat. Foto toraks dan USG

Abdomen rutin dilakukan untuk melihat adanya metastasis di paru, pleura, mediastinum, tulang-tulang dada dan organ viseral (terutama hepar) (Suyatno, dkk. 2014).

f. Pemeriksaan laboratorium dan marker

Pemeriksaan laboratorium darah yang dianjurkan adalah darah rutin, alkaline phosphatase, SGOT, SGPT, dan tumor kanker. Kadar alkaline phosphatase yang tinggi dalam darah mengindikasikan adanya metastasis ke liver, saluran empedu dan tulang. SGOT dan SGPT merupakan gambaran liver, kadar yang tinggi dalam darah mengindikasikan adanya kerusakan dan metastasis pada liver. Tumor marker untuk kanker payudara yang dianjurkan *American Society of Clinical Oncology* adalah carcinoembryonic antigen (CEA), Cancer Antigen (CA) 15-3, dan CA 27.29. pemeriksaan ini sensitif tapi tidak spesifik oleh karena itu dianjurkan untuk follow up. Pemeriksaan genetika BRCA-1 dan BRCA-2 dianjurkan pada pasien dengan keluarga tingkat pertama menderita kanker payudara atau ovarium (Suyatno, dkk. 2014).

8. Indikator Prognostik

a. Status reseptor estrogen dan progesterone

Reseptor estrogen (ER) dan reseptor progesteron (PR) merupakan faktor prognostik yang lemah untuk pasien kanker payudara, namun reseptor ini adalah faktor prediktif terkuat untuk respon terhadap terapi endokrin. Tes ER dan PR harus dilakukan pada semua kanker payudara invasif. Keduanya dinilai oleh imunohistokimia (IHC) pada bagian parafin. IHC memungkinkan nilai ekspresi secara khusus untuk kanker invasif ataupun in situ. Nilai interpretasi yang positif memerlukan menunjukkan minimal 1% sel-sel tumor pada pewarnaan intensitas sel. Interpretasi reseptor yang negatif menunjukkan nilai yang kurang dari 1% sel-sel

tumor dengan pewarnaan dari setiap intensitas. Sekitar 70% dari semua kanker payudara memiliki ER yang positif dan 60-65% menunjukkan PR positif. Skor Allred mengategorikan persentase sel dengan memberikan nilai numerik 0-8, skor 0-2 dianggap negatif dan skor 3-8 menunjukkan positif (Shah, 2014)

b. Ekspresi protein HER2 dan amplifikasi gen

HER-2/neu adalah proto-onkogen yang mengkode transmembran tirosin kinase untuk mengaktifkan reseptor, dan terlibat dalam beberapa jalur payudara yang terlibat dalam proliferasi sel, kelangsungan hidup, motilitas sel dan invasi. HER2 dinilai oleh IHC. Fluoresensi hibridisasi in situ (FISH) assay biasa digunakan jika ekspresi HER2 saat evaluasi di IHC kurang jelas. HER2 adalah faktor prognostik untuk memberikan hasil negatif atau positif untuk perkembangan terapi yang menargetkan reseptor HER2/neu seperti trastuzumab (Herceptin), antibodi monoklonal yang ditargetkan pada protein HER2, dan agen baru anti-HER2 lainnya. Amplifikasi dilaporkan 10-30% dari kanker payudara invasif (Shah, 2014)

c. Tes Gen

Oncotype adalah alat tes berbasis reaksi berantai transkripsi terbalik yang dapat dilakukan pada bagian paraffin yang didasarkan pada analisis ekspresi gen 21 dan memberikan skor yang berkorelasi dengan hasilnya. Produk profiling molekuler lain adalah amsterdam profil gen-70, Mammaprint dimana analisis microarray ekspresi gen digunakan pada jaringan kanker payudara. Hal ini digunakan untuk menentukan prognosis pasien kanker payudara dan digunakan untuk semua tumor, termasuk ekspresi gen ER dan PR (Shah, 2014)

9. Pengobatan Kanker Payudara

Menurut Manuaba, 2010. Terapi yang dilakukan pada kanker payudara yaitu:

a. Pembedahan

Terapi bedah : terutama untuk kanker payudara stadium awal

Tipe pembedahan:

- 1) Mastektomi radikal (*Halstedt radical mastectomy*)
- 2) *Modified Radical Mastectomy* (Patey yaitu meotong m.pectolaris minor untuk dapat melakukan diseksi axilla sampai level.3)
- 3) *Modified radical mastectomy (Uchincloss & Maaden)* yaitu mempertahankan m.pectolaris mayor dan minor
- 4) Mastektomi simple (Mc Whirter) ditambah radioterapi t.u pada axilla
- 5) BCS (*Breast Converting Surgery*) yaitu eksisi tumor primer dengan atau tanpa diseksi axilla dan radioterapi

b. Radioterapi

Merupakan terapi loko regional dan pada umumnya eksternal dengan Co60 ataupun terapi dengan sinar X. Radioterapi dengan *brachytherapy* hanya dikerjakan pada kasus selektif dan hanya pada senter yang mempunyai fasilitas.

Radioterapi dapat dilakukan sebagai:

- 1) Radioterapi neoadjuvant (sebelum pembedahan)
- 2) Radioterapi adjuvant (sesudah pembedahan)
- 3) Radioterapi palliatif diberikan sebagai terapi paliatif, baik pada tumor primer maupun pada metastasis tulang, cerebral dan sebagainya.

c. Kemoterapi

Kemoterapi diberikan sebagai kombinasi. Kombinasi kemoterapi yang telah menjadi standar adalah:

- 1) CMF (Cyclophosphamide-Metotrexate-5 Flouro Uracil)
- 2) CAF; CEF (Cyclophosphamide-Adriamycin/Epirubicin-5 Flouro Uracil)
- 3) T-A (Taxanes/paclitaxel/Doxetacel-Adriamycin)
- 4) Gapecitabine (Xeloda-Oral)
- 5) Beberapa kemoterapi lain, seperti Navelbine, Gemcitabine (+ cisplatinum) digunakan sebagai kemoterapi lapis ke 3.
- 6) Imunoterapi

Merupakan jenis pengobatan kanker yang relatif baru dengan menguatkan daya tahan tubuh dan memperbesar kemampuan tubuh menghancurkan sel-sel kanker. Kemampuan imunoterapi menghancurkan sel-sel kanker terbatas, diperkirakan sampai sejumlah 10^5 - 10^7 sel kanker. Ada tiga macam imunoterapi, yaitu aktif (vaksin kanker), pasif dan terapi adjuvan.

d. Terapi gen

Dilakukan dengan beberapa cara: (1) mengganti gen yang rusak atau hilang, (2) menghentikan kerja gen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sel kanker, (3) menambahkan gen yang membuat sel kanker lebih mudah dideteksi dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, kemoterapi, maupun radioterapi, dan (4) menghentikan kerja gen yang memicu pembuatan pembuluh darah baru di jaringan kanker sehingga sel-sel kankernya mati.

e. Terapi hormon

Adalah terapi untuk mengubah hidup kanker sehingga pertumbuhan sel-selnya terganggu dan akhirnya mati sendiri. Terapi hormon hanya digunakan untuk

jenis kanker yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon (*hormon dependent*), seperti kanker mammae, endometrium, thiroid dan prostat.

f. Bioterapi

Adalah terapi dengan menggunakan produk biologi, seperti sitokin, interferon, anti angiogenesis, dsb

10. Terapi Non Farmakologi

Terapi non farmakologi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara yaitu (Alteri, 2015):

a. Menjalankan pola hidup yang sehat, seperti banyak makan sayur dan buah, olahraga teratur dan mengurangi makanan cepat saji (fast food)

b. Menghindari zat yang bersifat karsinogenik (dapat memacu timbulnya sel kanker) seperti rokok, alkohol, sinar radiasi, dll.

c. Normalkan kandungan omega-3 hingga omega-6 dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kandungan omega-3 dan omega-6 yang banyak terdapat dalam daging, telur, ikan air tawar, kedelai dan minyak nabati (kelapa, jagung, kelapa sawit).

d. Tidur cukup dan berkualitas.

e. Jauhkan diri dari lingkungan kotor dan polusi.

f. Kurangi makan makanan gorengan, Sebaiknya pilih yang direbus atau dikukus.

g. Konsumsi zat-zat gizi seperti Beta karoten, vitamin C, dan asam folat dan yang mengandung anti oksidan. Beta karoten banyak terdapat dalam wortel, vitamin C terdapat dalam buah-buahan berwarna orange seperti jeruk, sedangkan asam folat terdapat dalam makanan hasil laut.

h. Diet makanan berlemak (kurangi asupan makanan berlemak)

- i. Anjurkan pasien untuk secara rutin dan tepat waktu menjalani terapi
- j. Sarankan keluarga untuk memberikan dukungan kepada pasien

11. Stadium Kanker

Stadium penyakit kanker adalah suatu keadaan dari hasil penilaian dokter saat mendiagnosa suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya, sudah sejauh manakah tingkat penyebaran kanker tersebut naik ke organ atau jaringan sekitar maupun penyebaran ke tempat lain. Stadium hanya dikenal pada tumor ganas atau kanker dan tidak ada ada tumor jinak. Untuk menentukan suatu stadium, harus dilakukan pemeriksaan klinis dan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya yaitu histopatologi atau PA, rontgen, USG, dan bila memungkinkan dengan CT scan, scintigrafi, dan lain-lain. Banyak sekali cara untuk menentukan stadium, namun yang paling banyak dianut saat ini adalah stadium kanker berdasarkan klasifikasi sistem TNM yang direkomendasikan oleh UICC (*International Union Against Cancer* dari *World Health organization*) / AJCC (*American Joint Committee On Cancer* yang disponsori oleh *American cancer Society* dan *American College Of Surgeons*)

TNM merupakan singkatan dari “T” yaitu *tumor size* atau ukuran tumor, “N” yaitu *node* atau kelenjar getah bening regional dan “M” yaitu *metastasis* atau penyebaran jauh. Ketiga faktor T, N, dan M dinilai baik secara klinis sebelum dilakukan operasi, juga sesuatu operasi dan dilakukan pemeriksaan histopatologi (PA). Pada kanker payudara penilaian TNM sebagai berikut:

a. T (*tumor size*), ukuran tumor:

- 1) T 0 : tidak ditemukan tumor primer
- 2) T 1 : ukuran tumor diameter 2 cm atau kurang
- 3) T 2 : ukuran tumor diameter antara 2-5 cm

- 4) T 3 : ukuran tumor diameter > 5 cm
 - 5) T 4 : ukuran tumor beberapa saja, tetapi sudah ada penyebaran ke kulit atau dinding dada atau pada keduanya, dapat berupa borok, edema atau bengkak, kulit payudara kemerahan atau ada benjolan kecil di kulit di luar tumor utama.
- b. N (*node*), kelenjar getah bening regional (Kgb) :
- 1) N 0 : tidak terdapat metastasis pada kgb regional di ketiak/aksilla
 - 2) N 1 : ada metastasis ke kgb aksilla yang masih dapat digerakkan.
 - 3) N 2 : ada metastasis ke kgb aksilla yang sulit digerakkan
 - 4) N 3 : ada metastasis ke kgb diatas tulang selangka (*supraclavicula*) atau pada kgb di *mammary interna* di dekat tulang sternum
- c. M (*metastasis*), penyebaran jauh :
- 1) M x : metastasis jauh belum dapat dinilai
 - 2) M 0 : tidak terdapat metastasis jauh
 - 3) M 1 : terdapat metastasis jauh

Setelah masing-masing faktor T, N, dan M didapatkan, ketiga faktor tersebut kemudian digabung dan akan diperoleh stadium kanker sebagai berikut:

- a. Stadium 0 : T0 N0 M0
- b. Stadium 1 : T1 N0 M0
- c. Stadium II A : T0 N1 M0/ T1 N1 M0/ T2 N0 M0
- d. Stadium II B : T2 N1 M0 / T3 N0 M0
- e. Stadium III A : T0 N2 M0/ T1 N2 M0/ T2 N2 M0/ T3 N1 M0
- f. Stadium III B : T4 N0 M0/ T4 N1 M0/ T4 N2 M0
- g. Stadium III C : Tiap T N3 M0
- h. Stadium IV : Tiap T – Tiap N – M1

Sistem staging kanker payudara juga memberikan informasi tentang pilihan terapi yang sesuai berdasarkan stadium, yaitu (Rasjidi, 2010) :

1. Stage 0

Pada tahap ini sel kanker payudara tetap di dalam kelenjar payudara, tanpa invasi ke dalam jaringan payudara normal yang berdekatan

2. Stage I

Terdapat tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan batas yang jelas (kelenjar getah bening normal).

3. Stage IIA

Tumor tidak ditemukan pada payudara tapi sel-sel kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan ukuran 2 cm atau kurang dan telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak/aksilles, atau tumor yang lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak.

4. Stage IIB

Tumor dengan ukuran 2-5 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening yang berhubungan dengan ketiak, atau tumor yang lebih besar dari 5 cm tapi belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak.

5. Stage IIIA

Tidak ditemukan tumor di payudara. Kanker ditemukan di kelenjar getah bening ketiak yang melekat bersama atau dengan struktur lainnya, atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang dada, atau tumor dengan ukuran berapa pun yang telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, terjadi pelekatan dengan struktur lainnya, atau kanker ditemukan di kelenjar getah bening di dekat tulang dada.

6. Stage IIIB

Tumor dengan ukuran tertentu dan telah menyebar ke dinding dada atau kulit payudara dan mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak yang terjadi perlekatan dengan struktur lainnya, atau kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Kanker berinflamasi pada tahap IIIB.

7. Stage IIIC

Ada atau tidak kanker di payudara dan telah menyebar ke dinding dada/kulit payudara dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening baik diatas atau dibawah tulang belakang dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau kelenjar getah bening di dekat tulang dada.

8. Stage IV

Kanker telah menyebar dan bermetastasis ke bagian lain dari tubuh.

C. *Kemoterapi kanker*

1. **Tujuan penggunaan kemoterapi**

Kemoterapi adalah penggunaan obat anti kanker (sitostatika) untuk menghancurkan sel kanker. Obat ini umumnya bekerja dengan menghambat atau mengganggu sintesa DNA dalam siklus sel. Pengobatan kemoterapi bersifat sistemik, berbeda dengan pembedahan atau radiasi yang lebih bersifat lokal/setempat. Obat sitostatika dibawa melalui aliran darah atau diberikan langsung ke dalam tumor, jarang menembus *blood-brain barrier* sehingga obat ini sulit mencapai sistem saraf pusat (Suyatno. 2014).

Ada tiga jenis *setting* kemoterapi yakni adjuvan, neoadjuvan, dan primer (paliatif) (Suyatno, 2014):

a. Adjuvan kemoterapi

Adalah terapi tambahan setelah terapi utama (pembedahan). Tujuannya adalah untuk mengendalikan *occult micrometastatic disease* sehingga menurunkan resiko timbulnya kekambuhan dan metastasis jauh. Usia, ukuran tumor, karakter biologik tumor dan status kelenjar getah bening merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian kemoterapi.

b. Neoadjuvan Kemoterapi

Adalah pemberian kemoterapi pada penderita kanker dengan *high grade malignancy* dan belum pernah mendapat tindakan *loco-regional* dengan bedah atau radiasi. Tujuannya untuk memperkecil ukuran tumor dan kontrol mikrometastatis, disamping itu neoadjuvan dapat memberikan informasi tentang respon regimen kemoterapi.

c. Kemoterapi palliatif

Diberikan pada stadium lanjut (stadium IV) untuk mengendalikan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kanker . tujuannya untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik, kontrol progresi tumor, dan memperlama harapan hidup.

2. Cara kerja kemoterapi

Suatu sel normal akan berkembang mengikuti siklus pembelahan sel yang teratur. Beberapa sel akan membelah diri dan membentuk sel baru dan yang lain akan mati. Sel yang abnormal akan membelah diri dan berkembang secara tidak terkontrol, yang pada akhirnya akan terjadi suatu massa yang dikenal sebagai tumor.

Siklus sel secara sederhana dibagi menjadi 5 tahap yaitu:

- a. Fase G₀, dikenal juga sebagai fase istirahat. Ketika ada sinyal untuk berkembang, sel ini akan memasuki fase G₁.

- b. Fase G1, pada fase ini sel siap untuk membelah diri yang diperantarai oleh beberapa protein penting untuk bereproduksi. Fase ini berlangsung 18-30 jam.
- c. Fase S, disebut fase sintesis. Pada fase ini DNA akan digandakan. Fase ini berlangsung 18-20 jam
- d. Fase G2, sintesis protein terus berlanjut. Fase ini berlangsung 2-10 jam
- e. Fase M, Sel dibagi menjadi dua sel baru. Fase ini berlangsung 30-60 menit.

Siklus sel sangat penting dalam kemoterapi sebab obat kemoterapi mempunyai target dan efek merusak yang berbeda tergantung pada siklus selnya. Obat kemoterapi aktif pada saat sel sedang bereproduksi (bukan pada fase G0), sehingga sel tumor yang aktif merupakan target utama dalam kemoterapi. Namun, oleh karena sel yang sehat juga bereproduksi, maka tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan terpengaruh oleh kemoterapi, yang akan muncul sebagai efek samping obat (Brown, 2015).

3. Penggolongan Kemoterapi

Penggolongan obat-obat kemoterapi terdiri dari (ACS, 2015)

- a. Golongan alkylating agent

Bekerja sebagai pembunuh sel melalui beberapa mekanisme yang dapat terjadi, antara lain *depurination*, *double-stranded & single stranded breaks*, *interstrand & intra-strand cross-link*, gangguan replikasi DNA, dan gangguan transkripsi. Karena bekerja pada DNA, menyebabkan terjadinya gangguan formasi atau kode molekul DNA. Akibatnya sel yang terpapar dapat mengalami kematian atau masuk dalam proses mutagenesis atau karsinogenesis. Dengan demikian efek samping dari pemberian obat ini dapat menimbulkan resiko untuk terjadinya keganasan lain, dan efek karsinogenesisnya dapat terjadi pada sel sumsum tulang.

Yang termasuk dalam golongan ini antara lain *nitrogen mustard*, *mephalan*, *chlorambucil*, *cyclophosphamid*, dan *ifosfamide*.

b. Golongan platinum

Platinum akan berikatan dengan guanine pada N-7 rantai DNA sehingga menyebabkan terjadinya interstrand DNA cross-links. Platinum sangat aktif pada G1, tetapi juga dapat aktif pada siklus sel lainnya. Platinum mempunyai efek itu, sebelum pemberian obat ini diperlukan hidrasi yang cukup.

c. Golongan Taxanes

Taxane akan mengikat microtubule dan menghambat depolimerisasi microtubule. Preparat taxane yaitu *paclitaxel* dan *docetaxel*.

d. Golongan analog asam folat

Golongan ini bekerja dengan menghambat enzim dihydrofolate reductase (DHFR). Contohnya yaitu methotrexate (MTX)

e. Golongan Analog Pirimidine

Bekerja menghambat messenger RNA dan ribosom RNA, menyebabkan gangguan transkripsi RNA, serta menyebabkan pelepasan thymidine. Dengan cara ini, maka golongan ini dapat bekerja pada beberapa siklus sel tetapi yang terutama adalah fase S. Yang termasuk golongan ini yaitu 5-flourouracil (5-FU), cytarabine (Ara-C), dan Gemcitabine.

f. Golongan antibiotik

Golongan ini bekerja menurut beberapa cara. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain Doxorubicin, Actinomycin D, vinca alkaloid, golongan podophillotoksin, Mitomycin C

4. Efek samping kemoterapi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Citra Tri Wahyumi faisel dari Universitas Tanjung pura, diperoleh hasil bahwa dari 101 pasien yang menjalani kemoterapi, Efek samping tersering yang dialami pasien kanker payudara yang mulai muncul pada periode waktu segera sampai 3 hari yaitu mual (100%), muntah (100%), diare (80%), rentan terinfeksi (61,5%), neuropati (50%) dan myalgia (90%). Efek samping yang mulai muncul pada periode waktu >1 minggu yaitu stomatitis (41,7%) dan trombositopenia (100%). Efek samping yang mulai muncul pada periode waktu ≥ 3 minggu yaitu alopesia (45,8%) (Faisel, 2012).

5. Klasifikasi agen kemoterapi berdasarkan emetogenisitasnya

Terdapat macam-macam standar penggolongan emetogenisitas agen kemoterapi, salah satunya mengacu pada standar *Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) European Society for Medical Oncology (ESMO) Antiemetik Guideline 2016*

Tabel 1. Kelompok resiko emesis agen kemoterapi (Richard, dkk. 2016)

High	Resiko mendekati semua pasien (>90%)
Moderate	Resiko pada 30-90% pasien
Low	Resiko pada 10-30% pasien
Minimal	Resiko <10% pasien

Tabel 2. Kelompok resiko emetik – Dewasa – Agen tunggal IV (Richard, dkk. 2016: 14-16)

High	Antracycline /cyclophosphamide combination * Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide > 1500 mg/m ² Dacarbazine Methotrexate Streptozocin		
Moderate	Alemtuzumab Azacitidine Bendamustine Carboplatin Clofarabine	Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Idarubicin Ifosfamide	Oxaliplatin Romidepsin Temozolomide** Thiotepa Trabectedin

	Cyclophosphamide < 1500 mg/m ² Cytarabine > 1000 mg/m ²	Irinotecan	
Low	Aflibercept Belinostat Blinatumomab Bortezomib Brentuximab Cabazitaxel Carfilzomib Catumaxumab Cetuximab Cytarabine < 1000 mg/m ² Docetaxel	Eribulin Etoposide 5-Fluorouracil Gemcitabine Ipilimumab Ixabepilone Methotrexate Mitomycin Mitoxantrone Nab- paclitaxel Paclitaxel	Panitumumab Pemetrexed Pegylated liposomal doxorubicin Pertuzumab Temozolomide Topotecan Trastuzumab- emtansine Vinflunine
Minimal	Bevacizumab Bleomycin Busulfan 2-Chlorodeoxyadenosine Cladribine Fludarabine Nivolumab Ofatumumab	Pembrolizumab Pixantrone Pralatrexate Rituximab Trastuzumab Vinblastine Vincristine Vinorelbine	

* Kombinasi dari antrasiklin dan siklofosfamid pada pasien dengan kanker payudara harus dianggap sangat emetogenik.

** Tidak ada bukti langsung yang ditemukan untuk temozolomide IV. Klasifikasi didasarkan pada temozolomide oral, karena semua sumber mengindikasikan keamanan yang serupa.

Tabel 3. Kelompok Resiko emetik – Dewasa – Agen tunggal Oral (Richard, dkk. 2016)

High	Hexamethylmelamine Procarbazine		
Moderate	Bosutinib Ceritinib Crizotinib	Cyclophosphamide Imatinib Temozolomide	Vinorelbine
Low	Afatinib Axatinib Capecitabine Dabrafenib Dasatinib Everolimus Etoposide Fludarabine	Ibrutinib Idelalisib Lapatinib Lenalidomide Olaparib Nilotinib Pazopanib	Ponatinib Regorafenib Sunitinib Tegafur Uracil Thalidomide Vandetanib Vorinostat
Minimal	Chlorambucil Erlotinib Gefitinib Hydroxyurea Melphalan	Methotrexate L-Phenylalanine mustard Pomalidomide Ruxolitinib	Sorafenib 6-Thioguanine Vemurafenib Vismodegib

D. Mual dan Muntah Kemoterapi

Efek samping yang sering muncul pada saat kemoterapi adalah mual, dengan atau tanpa muntah. Zat-zat antineoplastik berbeda-beda kemampuannya dalam menyebabkan mual dan muntah. *Nitrogen mustard, nitrosourea, streptozotocin, cisplatin,* dan *aktinomycin* berpotensi menimbulkan muntah yang tinggi dan biasanya menimbulkan muntah pada semua pasien. *Doxorubicin, daunorubicin,* dan *cyclophosphamid* bersifat emetogenik sedang. Penggunaan *fluourasil* dan *metotrexat* secara tunggal menimbulkan anoreksia yang sangat parah. Penggunaan *5-fluouracil* selama 5 hari dan dosis tinggi metotreksat menimbulkan mual pada 50% pasien. Zat-zat lain seperti *klorambusil, melphalan,* dan *busulfan* menimbulkan kecenderungan untuk muntah. Mual dan muntah merupakan efek samping yang menakutkan bagi penderita dan keluarganya sehingga kadang-kadang penderita menolak pengobatan lanjutan karena efek samping tersebut muncul setelah pengobatan sitostatika berlangsung. Akibat lebih lanjut dari muntah yang tidak diobati atau mendapat pengobatan yang adekuat pada penderita kanker, pada umumnya keadaan yang lemah, nafsu makan dan minum menurun, status gizi yang kurang baik, dehidrasi, gangguan elektrolit dan pneumonia aspirasi (Wilbur MB, 2016)


Terjadi karena berkurangnya rasa kecap dan penyimpangan rasa kecap (*dysgeusia*), dapat diatasi dengan pemberian makanan berupa cairan sehingga tidak banyak dikunyah dan sedikit saliva. Menu makanan harus dirubah setiap hari, makanan yang diusulkan mengandung tinggi protein berupa BCAA, EAAs dan asam lemak Omega 3, sedangkan megasterol acetate walaupun merangsang nafsu makan tapi bersifat katabolik terutama pada pasien inaktif (Suyatno, 2015).

1. Tipe Mual dan Muntah

Tipe mual dan muntah sebagai efek samping kemoterapi berdasarkan waktu kejadiannya dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu *acute*, *delayed* dan *anticipatory*. Mual dan muntah termasuk dalam tipe *acute* bila terjadinya dimulai dalam beberapa menit sampai beberapa jam setelah kemoterapi dan berhenti dalam waktu 24 jam. Biasanya mual dan muntah sangat parah terjadi pada 5-6 jam pertama setelah terapi. Mual dan muntah termasuk dalam tipe *delayed* bila terjadi lebih dari 24 jam setelah kemoterapi dan berlanjut sampai beberapa hari. Kejadian paling parah biasanya terjadi 48 sampai 72 jam setelah terapi dan berhenti 6 atau 7 hari kemudian. Mual dan muntah tipe *anticipatory* terjadi pada pasien yang menderita mual dan muntah parah pada terapi kanker sebelumnya (Firmansyah, 2010).

2. Mekanisme mual-muntah

Daerah yang berperan dalam proses mual dan muntah adalah pusat muntah yang terletak di medulla oblongata dan daerah pemicu kemoreseptor/ *Cemoreseptor Trigger Zone* (CTZ) yang terletak di area postrema. Obat-obat kemoterapi (atau metabolitnya) dapat mengaktifkan langsung daerah pemicu kemoreseptor atau di pusat muntah. Beberapa reseptor di kedua daerah tersebut, termasuk dopamine tipe 2 (DA₂) dan serotonin tipe 3 (5-HT₃) berperan penting (Firmansyah, 2010)



Gambar 4. Mekanisme Mual dan Muntah

Warna dan bau obat-obat kemoterapi (dan bahkan rangsangan yang berhubungan dengan kemoterapi, seperti tanah diruang pengobatan atau dokter atau perawat yang memberi terapi) dapat mengaktifasi pusat muntah yang lebih tinggi di pusat otak dan memicu muntah. Obat-obat kemoterapi dapat pula bekerja secara perifer, dengan menyebabkan kerusakan sel di saluran pencernaan, dan melepaskan serotonin dari sel enterokromafin mukosa usus halus. Serotonin yang dilepaskan akan mengaktifkan reseptor 5-HT₃ pada saraf vagus dan serat aferen nervus splanknikus yang kemudian membawa sinyal sensoris ke medulla sehingga terjadi respon muntah (Firmansyah, 2010).

Ada kesamaan pendapat yang menyatakan bahwa mual muntah diatur oleh daerah yang disebut *tractus nucleus solitarius* atau pusat muntah yang terletak pada daerah percabangan yang sempit dari ventrikel. Rangsangan berupa impuls berasal dari 4 sumber yakni (1) reseptor kemoterapi, (2) gastrointestinal (3) daerah kortikal yang memancarkan stimulus yang psikogenik, (4) vestibular apparatus dari telinga bagian tengah (mempunyai peran yang kecil dalam menginduksi mual-muntah). Pada saat stimulus dari keempat daerah ini melebihi nilai ambang, saat inilah terjadi muntah (Firmansyah, 2010)

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mual-muntah

Faktor-faktor yang mempengaruhi mual muntah pada pemberian kemoterapi, misalnya agen kemoterapi, dosis, jadwal pemberian dan faktor individual seperti jenis kelamin, umur, sejarah kemoterapi terdahulu dan konsumsi etanol. Umur tidak secara langsung berhubungan dengan kejadian dan durasi mual muntah akut. Pasien berusia dibawah 30 tahun mungkin dapat beraksi berlebih. Pasien berumur di bawah 50 tahun dilaporkan mempunyai angka kejadian untuk muntahantisipasi dibanding pasien berusia di atas 50 tahun. Pasien yang pernah

mengonsumsi etanol kira-kira 4-7 gelas perhari, meningkatkan pemakaian antimual muntah karena berkurangnya kepekaan reseptor terhadap rangsangan muntah. Riset menunjukkan kemoterapi yang menginduksi mual muntah lebih sulit di kontrol pada wanita (Susanti, 2011)

4. Terapi Mual dan Muntah

a. Non Farmakologi

Terapi nonfarmakologi yang digunakan untuk menanggulangi mual dan muntah misalnya pasien dengan keluhan ringan mungkin berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman, dianjurkan untuk menghindari masuknya makanan. Intervensi non farmakologi diklasifikasikan sebagai intervensi perilaku termasuk relaksasi, hipnotis, biofeedback, distraksi kognitif, dan desensitisasi seismatik. Muntah psikogenik diatasi dengan intervensi psikologik. Terapi komplementer dapat efektif membantu dalam manajemen mual muntah akibat kemoterapi, terapi tersebut berupa relaksasi, guided imagery, distraksi, hipnotis, aromaterapi, akupresure dan akupuntur (Widagdo, 2014).

b. Farmakologi

Terapi farmakologi dapat menggunakan antiemetik. Antiemetik adalah zat-zat yang dapat menghilangkan rasa mual dan muntah. Antiemetik yang digunakan dalam terapi CINV (*Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting*) yaitu:

- 1) 5-HT₃ (serotonin reseptor antagonist)

Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor 5HT₃ pre sinaps di saraf sensoris vagus di saluran cerna dan sistem saraf pusat. Obat ini bermanfaat dalam penanganan mual dan muntah pada pasien yang menerima terapi sitotoksik serta mual pasca bedah. contohnya *Ondasetron*, *granisetron*, *palonosetron* dan *dolasetron* (Sukandar, dkk. 2009)

2) Dopamin antagonis

Obat ini berkhasiat menentang perasaan mual dan muntah dengan blokade neurotransmisi dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan merintang reseptor dopamin. Obat ini meningkatkan tonus sfingter esofagus, membantu pengosongan lambung dan meningkatkan perpindahan usus halus dengan pelepasan asetilkolin, contohnya *Metoklopramida* dan *Domperidone*.

Antagonis dopamin lain yaitu *fenotiazin* yang bekerja sentral dengan cara menghambat *Chemoreseptor trigger zone* (CTZ) yang dipakai dalam profilaksis mual muntah akibat penyakit neoplasia, pasca radiasi, pasca penggunaan opioid, anestesia umum dan sitotoksik (BPOM, 2009).

3) Antihistamin (H1-blocker)

Bekerja dengan menghambat reseptor H1 dan mengobati mual dan muntah akibat mabuk darat, gangguan vertigo dan kehamilan. Contoh : *Promethazine*, *cinnarizine*, *dimenhydrinate*, *diphenhydramine* (BPOM, 2009).

4) Antikolinergik

Antikolinergik/parasimpatolitik, bekerja dengan menurunkan motilitas dan sekresi gastrointestinal dengan menghambat Asetilkolin dan histamin dan HCl Contoh : *Hyoscine (scopolamine)* (BPOM, 2009).

5) NK1 reseptor antagonis

Menghambat ikatan antara substansi P dengan NK-1 reseptor secara spesifik. Digunakan dalam terapi mual muntah akut dan delayed akibat kemoterapi sitotoksik yang mengandung sisplatin, dan diberikan bersamaan dengan deksametason dan antagonis 5-HT₃, Contoh : *Aprepitant* (BPOM, 2009).

E. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan

Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia dituntut untuk berpikir serta menggali ilmu karena Islam sendiri telah mewajibkan untuk menuntut ilmu, dan sumber ilmu itu berasal dari Al-Qur'an. Posisi Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan dengan jalan mencari sumber ilmu dan sumber cara mengembangkan ilmu menjadi teknologi. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu memberikan benih-benih dasar untuk dapat dikembangkan oleh manusia menjadi ilmu dan teknologi yang tidak terhingga ragamnya dan arah pencapaiannya. Selain itu Al-Qur'an akan menjamin kebenaran ilmu yang bersumber dari-Nya, kebenaran arah pengembangannya, karena semua bersandar pada kalam Allah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan jiwa ketakwaan serta keimanan dari manusia sebagai subyek yang melakukannya.

Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan sebagaimana wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* adalah perintah untuk membaca dan memahami. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Qs. Al-Alaq (96): 1-5

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ نَكُنْ نَدْعُهُ الْإِنْسَانَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya :

“(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang mengajari (manusia) dengan perantaraan kalam (5) Dia mengajari kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Department Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2011)

Sesungguhnya Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat yang mulia ini yang merupakan rahmat pertama yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dan nikmat pertama yang dicurahkan Allah kepada mereka yang merupakan peringatan tentang awal penciptaan manusia dari segumpal darah. Dan

diantara kemurahan Allah Ta'ala adalah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Maka dengan ilmu ini Allah mengangkat dan memuliakan manusia dengan ilmu tersebut. Inilah jabatan yang hanya diberikan Allah kepada bapak manusia Adam a.s. sehingga membedakannya dari malaikat. Allah ta'ala berfirman, “*Bacalah, dan tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajarkan dengan perantara kalam*”. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Ar-rifa'i, 2000).

Dalam ayat itu pula dapat diketahui perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada manusia untuk menuntut ilmu, dan dijelaskan pula sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu yaitu kalam. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dan mengamalkannya merupakan ibadah. Semakin tinggi ilmu yang dikuasai maka semakin tinggi pula rasa takut kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga dengan sendirinya akan mendekatkan kita kepadaNya. Dan salah satu ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dan melalui sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* adalah mengenai penyakit dan obatnya.

Jika seseorang yang sakit kemudian berikhtiar dalam berobat dan menjalani penyakitnya dengan keimanan dan kesabaran maka penyakit apapun akan menjadi sembuh karena kehendak Allah. Karena tidak satu pun jenis penyakit baik penyakit hati maupun jasmani melainkan dalam Alqur'an dan As-sunnah ada cara yang membimbing manusia untuk berobat dan menghilangkan sebab-sebab yang mengakibatkan penyakit tersebut.

Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ
بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Dari sahabat Jabir Radhiyallahu anhu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Beliau bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya, apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla” [HR. Muslim no.4084]. (Muslim, 1992)

Dalam dunia kesehatan, hadist tersebut dapat diartikan bahwa obat akan memberikan efek ketika obat telah berikatan tepat dengan reseptor obat tersebut. Obat merupakan bahan yang sangat berpotensi menyembuhkan penyakit bila digunakan sesuai dengan aturan.

Semua penyakit memiliki obatnya, manusialah yang perlu berusaha untuk mencari dan menggunakan obat-obat tersebut dalam menyembuhkan penyakitnya. Orang yang mencari obatnya ia pasti akan mendapatkannya, sedangkan orang yang mengabaikannya, ia tidak akan mendapatkannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya bisa bersifat umum, termasuk untuk penyakit mematikan yang belum bisa disembuhkan karena keterbatasan pengetahuan manusia dalam menemukan penawar dari obat tersebut. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyatakan bahwa ketika penyakit bertemu obat yang yang tepat, maka penyakit dapat disembuhkan. Sebaliknya obat yang diberikan melebihi dosis, kurang dosis atau tidak sesuai dengan penyakitnya dapat menimbulkan jenis penyakit lain. Jika obat yang diberikan tidak efektif karena kurang dari dosis yang dibutuhkan, maka tidak akan cukup untuk menyembuhkan penyakit itu. Jika penyakit dan penderitanya tidak ditangani dengan obat dan penyembuhan yang cocok, penyembuhan tidak akan terjadi. Begitu pula jika perawatan tidak cocok, maka pengobatan tidak akan efektif. Adapun jika pengobatan dan perawatannya sudah cocok, namun Allah tidak berkehendak memberikan kesembuhan, maka penyakit tersebut akan terus ada hingga Allah berkehendak mengangkat penyakitnya (Jauziyah, 2006).

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. dalam QS. Asy-syu'ara/26:80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Departemen Agama RI. 2009: 579).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah adalah satu-satunya yang *haq* untuk disembah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah memiliki sifat-sifat yang hanya ada pada dirinya termasuk sifat *Asy-syafii* atau Maha Penyembuh. Jika Allah menakdirkan suatu penyakit, maka Dia pula lah yang menakdirkan kesembuhan sehingga suatu penyakit dapat sembuh. Tidak ada seorang pun selain Dia yang dapat menyembuhkan kecuali melalui upaya yang telah ditetapkan oleh-Nya (Ar-rifa'i, 2000). Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya senantiasa bertawakkal kepada Allah dalam usaha mencari obat dari penyakitnya, dengan tidak melanggar aturan yang Allah telah tetapkan. Upaya manusia dalam mencari kesembuhan hanyalah perantara yang jika Allah belum berkehendak menyembuhkan niscaya tidak akan sembuh, namun jika Allah berkehendak maka niscaya akan disembuhkan.

Dibalik penyakit yang di alami, tentu mengandung hikmah yang sangat berharga bagi si penderita khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Allah *Subhanahu Wa ta'ala* pasti menyimpan hikmah di balik setiap sakit yang kita alami. Allah *Subhanahu Wa ta'ala* menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tersendiri yang menjadi penyebab semua itu. Tidak mungkin Allah *Subhanahu Wa ta'ala* melakukan sesuatu tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah di balik itu semua . Oleh karena itu, sebaiknya kita untuk selalu menerima, ikhlas dan

bersabar atas apa yang dikaruniakan oleh-Nya kepada kita, termasuk dikaruniai penyakit.

Dari Anas ibn Malik radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa ia menceritakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عِظْمُ الْجُزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ

Artinya :

"Dari Anas bin Malik r.a. dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, bahwa beliau bersabda, “ Besarnya ganjaran pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Oleh karena itu, barangsiapa ridha (menerima ujian tersebut) maka baginya ridha Allah. Dan barangsiapa murka (tidak menerima ujian tersebut), maka baginya murka Allah". [HR. Ibnu Majah no. 4103] (Al-Albani, 2008)

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari kesalahan mereka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai Tuhan yang mempunyai tanda-tanda ketuhanan-Nya berupa hasil-hasil ciptaan-Nya, seperti langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Termasuk juga kejadian-kejadian yang berlangsung dalam makhluk-Nya tersebut seperti Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya, Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadits *Abu Hurairah R.a.*:

حَدَّثَنَا الْمُتَنِّيُّ بْنُ دُحْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (HR. Bukhari No. 5246). (Al-Bukhari, 1993)

Kesehatan adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. untuk manusia. Bentuk rasa syukur kita atas nikmat tersebut adalah dengan menjaga dan memeliharanya. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Hidup sehat ialah mencakup pemilihan makanan yang halal dan baik, pola makan dan minum, pola tidur yang sehat, menghindari stress, menjaga kebersihan hati, jasmani dan rohani yang semua itu mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh seperti kanker yang timbul karena gagalnya sistem pertahanan dan kekebalan tubuh dalam melawan segala paparan penyakit yang banyak bersumber dari pola hidup yang tidak sehat.

Muntah dalam perspektif Islam adalah salah satu dari lima cara mengeluarkan zat-zat kotor dari dalam tubuh yang jika mengendap akan menyebabkan penyakit pada jasmani yaitu buang air, muntah, bekam, membuang angin dan udara serta mengeluarkan keringat. Dan sunnah rasul telah menyebutkan kelima jenis ini (Al-Jauziyah, 2006).

Muntah ada dua jenis, yaitu muntah alamiah dan muntah yang dipaksa. Jenis muntah yang dipaksa berguna ketika terjadi pada saat yang tepat yaitu pada musim panas dan musim semi, bukan pada musim semi dan musim gugur. Sebagaimana

perkataan Al-Harits, “..*cucilah perutmu sekali sebulan dengan muntah secara sengaja untuk mengurangi lendir, membunuh kuman dan menumbuhkan daging*”.

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, “*Orang sehat seharusnya mendorong terjadinya muntah sebulan dua kali berturut-turut sehingga muntahan kedua membebaskan tubuh dari zat-zat yang tertinggal pada muntahan kedua*”. Muntah dapat memperkuat perut, menajamkan penglihatan, menghilangkan sakit kepala, luka pada ginjal dan kandung kemih serta melawan penyakit menahun seperti lepra, busung air, sakit gigi, stress dan sakit kuning. Namun, jika muntah itu berlebihan dan membahayakan maka harus dihentikan dengan cara minum obat yang dapat menghentikannya karena muntah yang terlalu sering dapat merusak lambung, gigi, penglihatan, pendengaran dan menyebabkan sakit kepala. Orang yang menderita radang tenggorokan, lemah paru-paru dan memiliki batang leher kecil dan rentan terhadap batuk darah seharusnya menghindari muntah (Al-Jauziyah, 2006).

Dalam pemberian kemoterapi, mual dan muntah merupakan efek samping dari obat-obat sitostatika. Sehingga dibutuhkan suatu obat yang dapat menghambat atau mengurangi efek samping tersebut. Obat bila digunakan dengan tepat dapat membantu menyembuhkan penyakit atau mengatasi masalah kesehatan. Namun yang perlu dihindari dalam penggunaan obat adalah penggunaan obat yang tidak rasional, yaitu penggunaan obat yang tidak tepat (tidak tepat dosis, indikasi, cara penggunaan, tidak mempertimbangkan kondisi/riwayat pasien, dan lain-lain), tidak efektif, tidak aman, dan juga tidak ekonomis. Penggunaan obat yang tidak rasional ini dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai segi, seperti pemborosan, efek samping obat meningkat, meningkatkan kegagalan pengobatan, mengurangi kualitas hidup pasien, meningkatkan resistensi antimikroba, dan lain-lain. Oleh

karena itu evaluasi mengenai rasionalitas obat dalam dunia medis harus terus ditingkatkan demi tercapainya pelayanan medik yang lebih berkualitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar , Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung pada bulan April - Juni 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dengan rancangan *cross sectional* dan pengambilan data dilakukan secara *retrospektif* (Sastroasmoro, 2011). Penelitian dilakukan berdasarkan data rekam medis pasien dari bulan Januari - Desember Tahun 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yaitu seluruh pasien yang didiagnosa menderita kanker payudara dan menjalani kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi.

Menurut M. Sophiyuddin Dahlan (2010), rumus untuk menentukan besaran sampel penelitian deskriptif kategorik dengan penggambaran berdasarkan klasifikasi tertentu yaitu:

$$n = \frac{Z\alpha^2 PQ}{d^2} = \frac{(1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(0,1)^2} = 96,04 \approx 96$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

Z_{α} = Derivat baku alfa (5% = 1,96)

P = Proporsi kategori variabel yang diteliti (50% = 0,5)

Q = 1 – P = 1 – 0,5 = 0,5

D = Presisi (10% = 0,1)

Jadi, besaran sampel yaitu 95 rekam medik.

D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1. Kriteria inklusi

- a. Usia >25 tahun
- b. Mendapatkan terapi antiemetik
- c. Siklus kemoterapi di tahun 2016

2. Kriteria eksklusi

Data rekam medik tidak jelas dan tidak lengkap

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependent : Efektivitas Antiemetik

2. variabel Independet :

- a. Jenis Kelamin
- b. Usia
- c. Siklus Kemoterapi
- d. Kesesuaian terapi antiemetik
- e. Kesesuaian Dosis antiemetik

F. Metode Pengumpulan Data

Data pasien kanker payudara di dapatkan dengan melakukan observasi. Observasi yang digunakan pada penelitian ini berupa pengamatan ke rekam medik dan penelusuran data pasien berupa nama, umur, jenis kelamin, stadium, siklus kemoterapi, jenis obat sitostatika yang diberikan (dosis dan rutenya) , obat mual muntah (dosis, rute pemberian, waktu pemberian) dan kejadian emesis. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Probability sampling* yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi karena adanya data subjek dan karakteristik yang dimiliki (Dahlan, 2010). Setelah data terkumpul, maka data tersebut disusun dalam lembar pengumpul dan diolah secara *statistik deskriptif* dan *analitik*.

G. Analisa Data

Dari data pengamatan yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara *deskriptif observasional* yaitu memberikan penggambaran tanpa adanya intervensi (Sastroasmoro, 2011) dengan mengevaluasi kejadian mual dan muntah setelah pemberian antiemetik, kesesuaian jenis dan dosis antiemetik yang diberikan dengan protokol berdasarkan guideline MASCC/ESMO Antiemetic Guideline oleh *Multinational Association Of Supportive Care In cancer* tahun 2016 dan guideline RSUP Dr. Wahidin Suirohusodo Makassar yang diperoleh dari data rekam medik pasien.

Adapun data rekam medik tersebut selanjutnya di analisis secara *statistik deskriptif* menggunakan SPSS *Statistics* 24.0. menggunakan analisis Univariate yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis setiap variabel yang ada secara

deskriptif. Data yang telah di kategorikan ditampilkan secara frekuensi kejadian

Adapun penggolongan data yaitu:

- a. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin, usia, Indeks massa tubuh, riwayat keluarga, riwayat kontrasepsi, usia menarce dan kehamilan pertama
- b. Distribusi pasien berdasarkan diagnosa, stadium, agen kemoterapi, dan siklus.
- c. Distribusi pasien berdasarkan kejadian emesis dan antiemetik premedikasi kemoterapi
- d. Distribusi kejadian mual dan muntah yang dialami pasien setelah pemberian antiemetik premedikasi dan kesesuaiannya dengan guideline antiemetik MASCC/ESMO dalam manajemen emesis akut.

Selanjutnya dilakukan Analisis statistik bivariant dengan menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dan independent lalu dilanjutkan dengan analisis Multivariant menggunakan uji *regresi logistik* diantara variabel yang saling berpengaruh untuk mengetahui variabel yang berpengaruh diantara variabel yang berhubungan dari kejadian emesis pasien kanker payudara pasca kemoterapi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Subjek Penelitian

Pasien yang dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 111 pasien. Hal ini telah sesuai dengan kriteria inklusi pengambilan sampel minimum yaitu 96 pasien. 111 pasien rawat inap yang dijadikan sampel telah terdiagnosis kanker payudara yang telah menjalani siklus pengobatan kemoterapi dan mendapatkan premedikasi berupa antiemetik selama periode Januari-Desember 2016.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif data yaitu karakteristik pasien, riwayat pasien yang meliputi riwayat keluarga, usia kehamilan pertama, usia menarce, penggunaan kontrasepsi hormonal dan *Indeks massa tubuh* (IMT), siklus dan regimen kemoterapi, penggunaan antiemetik dan mengidentifikasi efektivitas antiemetik serta kesesuaian terapi dan dosis berdasarkan regimen kemoterapi yang diberikan dengan mengacu pada *guideline* antiemetik *Multinational Association Of Supportive Care Cancer* (MASCC/ESMO) tahun 2016 menjadi bentuk data tabel.

a. Gambaran Karakteristik Pasien

Gambaran karakteristik pasien kanker payudara berdasarkan umur dan jenis kelamin yang tertera dalam rekam medik pasien adalah sebagai berikut:


1) Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Tabel 4. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

No	Karakteristik Pasien		Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	1	0,9
		Perempuan	110	99,1
Total			111	100
2	Umur (tahun)	26-35	6	5,4
		36-45	35	31,5
		46-55	49	44,1
		56-65	21	18,9
		>65	0	0
Total			111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Terdapat 111 pasien yang dijadikan sampel penelitian dan didapatkan usia pasien yang beragam. Jumlah total pasien yang menderita kanker payudara dari berbagai golongan usia untuk perempuan (99,1%) dan laki-laki (0,9%) Jumlah pasien paling banyak ditemukan pada usia 46-55 tahun dan paling sedikit pada usia >65 tahun yaitu masing-masing 51% dan 0%. Distribusi pasien berdasarkan umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 5. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur

2) Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan


Tabel 5. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
IRT	66	59,5
Wiraswasta	17	15,3
Petani	1	0,9

PNS	27	24,3
Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 pasien yang dijadikan sampel sebagian besar adalah ibu rumah tangga (59,5%). Distribusi pasien berdasarkan pekerjaannya, disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 6. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan

3) Distribusi pasien berdasarkan stadium kanker yang dialami


Tabel 6. Distribusi pasien berdasarkan stadium kanker payudara

Stadium	Jumlah Pasien	Persentase (%)
I	0	0
IIA	1	0,9
IIB	11	9,9
IIIA	17	15,31
IIIB	45	40,54
IIIC	11	9,9
IV	26	23,42
Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Berdasarkan stadium, dari 111 pasien yang dijadikan sampel mengalami stadium kanker payudara yang beragam. Stadium IIIB memiliki persentase stadium yang paling tinggi diantara stadium lainnya yaitu 45 pasien (40,54%), stadium IV yaitu 26 pasien (23,42%), stadium IIIA sebanyak 17 pasien (15,31%), stadium IIB dan IIIC yang masing-masing sebanyak 11 pasien (9,9%) dan stadium yang paling

kecil persentasenya yaitu stadium IIA (0,9%) sedangkan stadium I tidak ada yang terdiagnosa karena kanker payudara baru akan disadari dan diperiksa oleh pasien setelah mengalami stadium lanjut. Distribusi jumlah pasien berdasarkan stadium disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 7. Distribusi pasien berdasarkan stadium

b. Gambaran Faktor Resiko kanker payudara

Faktor resiko yang utama berhubungan dengan kejadian kanker payudara adalah keadaan hormonal dan genetik (Rasjidi, 2010b). Faktor hormonal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain usia menarce, usia kehamilan pertama, infertilitas dan penggunaan kontrasepsi hormonal dalam waktu lama. Distribusi faktor resiko dari 111 pasien kanker payudara yang dijadikan sampel, yakni sebagai berikut:


1) Riwayat Keluarga / Genetik

Tabel 7. Riwayat keluarga pasien

No.	Faktor resiko	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ada	36 pasien	32,4
2.	Tidak ada	73 pasien	65,8
3.	Tidak diketahui	2 pasien	1,8
Total		111 pasien	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 111 pasien terdapat 36 pasien (32,4%) yang mempunyai riwayat genetik, dimana salah satu anggota keluarga sedang atau pernah mengalami kanker payudara. 73 pasien (65,8%) tidak punya riwayat genetik dan 2 pasien yang tidak mengetahui ada tidaknya riwayat genetiknya. Distribusi faktor resiko tersebut, disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 8 . Distribusi faktor resiko riwayat keluarga pasien

Pada penelitian ini hanya 32,4% pasien yang memiliki resiko kanker payudara yang berasal dari riwayat keluarga yang pernah atau sedang mengalami kanker. Karena berdasarkan penelitian (Priyatin, 2013) Wanita yang memiliki riwayat keluarga yang sedang atau pernah menderita kanker payudara berisiko 6,938 kali lebih besar dibandingkan wanita yang tidak memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker payudara. Riwayat keluarga adalah salah satu faktor yang paling penting mengingat kanker bisa dipengaruhi oleh kelainan genetica. Beberapa keluarga bisa jadi memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kanker payudara tertentu bila dibandingkan dengan keluarga lainnya. Pada studi genetik ditemukan bahwa kanker payudara berhubungan dengan gen tertentu. Apabila terdapat BRCA 1, yaitu suatu gen kerentanan terhadap kanker payudara, probabilitas untuk terjadinya kanker tersebut sebesar 60% pada umur 50 tahun dan 85% pada umur 70

tahun. Faktor genetik tersebut akan diturunkan dari orangtua kepada anaknya. Gen tersebut terjadi karena adanya mutasi pada beberapa gen yang bersifat onkogen dan mensupresi tumor. Gen yang berperan penting dalam pembentukan kanker payudara diantaranya gen BRCA1 dan gen BRCA2 (Surbakti, 2012).

2) Riwayat Menarce

Tabel 8. Riwayat Usia Menarce pasien

No.	Faktor Resiko	Jumlah Pasien	Persentase (%)
1.	Usia <12 tahun	41	36,9%
2.	Usia >12 tahun	70	63,1 %
	Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Usia menarce berisiko mempertinggi kejadian kanker payudara, dimana wanita usia subur dengan usia menarce <12 tahun memiliki resiko 2,638 kali lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara dibandingkan yang usia menarcenya >12 tahun (Priyatin, 2013). Wanita dengan menstruasi dini mempunyai resiko 9 kali terjadinya kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak menstruasi dini. Umur menstruasi yang lebih awal berhubungan dengan lamanya paparan hormon estrogen dan progsteron pada wanita yang berpengaruh terhadap proses proliferasi jaringan termasuk jaringan payudara. Dari 111 pasien yang menjadi sampel, kelompok usia yang memiliki faktor resiko menarce <12 tahun hanya dimiliki oleh 41 pasien (36,9%) dan yang usia menarcenya >12 tahun jauh lebih banyak yaitu 70 pasien (63,1%). Distribusi faktor resiko tersebut disajikan dalam gambar berikut :

■ <12 tahun ■ >12 tahun



Gambar 9. Distribusi usia menarce pasien kanker payudara di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

3) Riwayat Kehamilan Pertama

Tabel 9 . Riwayat Usia Kehamilan Pertama Pasien


No.	Faktor Resiko	Jumlah Pasien	Persentase (%)
1.	Usia <35 tahun	72	64,9
2.	Usia >35 tahun	15	13,5
3.	Tidak pernah hamil	24	21,6
Total		111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 sampel pasien kanker payudara di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, faktor resiko kanker payudara yang berasal dari riwayat kehamilan pertama hanya dimiliki oleh 15 pasien (13,5%), dimana usia kehamilan pertamanya yaitu pada usia diatas 35 tahun dan 24 pasien (21,6%) yang tidak pernah hamil. Sedangkan terdapat 72 pasien (64,9%) yang tidak memiliki resiko dengan kehamilan pada usia <35 tahun. Hal tersebut berarti usia kehamilan pertama bukan sebab yang paling berisiko terhadap pasien di rumah sakit tersebut.

Distribusi faktor resiko tersebut disajikan dalam gambar berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 10 . Distribusi usia kehamilan pertama pasien kanker payudara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Pada Riwayat usia kehamilan pertama 35,1% pasien mempunyai faktor resiko penyebab kanker payudara yang dialami yang terdiri dari 13,5% yang melahirkan pertama diatas usia 35 tahun dan 21,6% yang tidak pernah hamil. Berdasarkan hasil penelitian (Priyatin, 2013) menunjukkan bahwa wanita yang hamil pada usia diatas 35 tahun, 2,634 kali lebih berisiko menderita kanker payudara dibanding mereka yang hamil di usia di bawah 35 tahun. Diperkirakan, periode antara terjadinya haid pertama dengan umur saat kehamilan pertama merupakan *window of initiation* perkembangan kanker payudara (Rasjidi, 2010a). Wanita yang hamil di usia yang lebih tua, akan mengalami siklus menstruasi yang lebih banyak sebelum hamil. Pada tiap siklus haid FSH (*Follicle stimulating hormone*) dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis yang menimbulkan beberapa folikel primer yang dapat berkembang dalam ovarium. Umumnya satu folikel atau bahkan lebih dari satu folikel yang berkembang menjadi folikel de Graff yang membuat estrogen. Siklus menstruasi ini akan mengakibatkan beberapa perubahan pada jaringan pada payudara akibat adanya hormon estrogen. Perubahan-perubahan ini akan mengakibatkan beberapa ketidaknormalan pada proses regenerasi sel. Kemudian akan memperbesar peluang untuk menderita kanker payudara. Wanita yang hamil di usia lebih muda akan lebih sedikit mengalami menstruasi. Peningkatan risiko

kanker payudara dapat berhubungan dengan siklus menstruasi ovulasi dan dapat berhubungan dengan menetapkan pemaparan ke estrogen endogen tanpa konsentrasi progesteron serum yang adekuat. Kehamilan pada usia lebih muda mencegah dediferensiasi seluler, sedangkan kehamilan pertama pada usia diatas 35 tahun atau tidak pernah hamil bertindak sebagai promotor tumor atas sel duktus payudara yang telah menjalani transformasi ganas (Sabiston,1995).


4) Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal

Tabel 10. Riwayat lama penggunaan kontrasepsi hormonal Pasien

No.	Faktor Resiko	Jumlah Pasien	Persentase (%)
1.	KB <5 tahun	8	7,2
2.	KB >5 tahun	72	64,9
3.	Tidak pernah	31	27,9
	Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 sampel, terdapat 72 pasien (64,9%) yang menggunakan kontrasepsi hormonal selama lebih dari 5 tahun, 8 pasien (7,2%) yang menggunakan <5 tahun dan 31 pasien (27,9%) yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal. Distribusi lama pemakaian kontrasepsi pasien kanker payudara di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016 disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 11 . Distribusi riwayat lama pemakaian kontrasepsi pasien kanker payudara Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2016

Data diatas menunjukkan bahwa 64,9% pasien mempunyai faktor resiko kanker payudara karena menggunakan kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun. Wanita yang menggunakan KB hormonal memiliki risiko 2,990 kali lebih besar terkena kanker payudara dibanding yang tidak menggunakan kontrasepsi (Setiowati, 2015) hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen yang terdapat dalam KB hormonal. Ada 2 teori yang membahas tentang cara estrogen dan progesteron menyebabkan kanker payudara. yang pertama, risiko mutasi sel saat pembelahan meningkat karena proliferasi sel oleh peningkatan estrogen dan progesteron juga meningkat. Teori kedua, estrogen dan progesteron merangsang sel-sel punca kanker payudara (Kresno, 2012).

5) Indeks Massa Tubuh (IMT)


Tabel 11. Kategori berat badan berdasarkan indeks massa tubuh

No.	Range IMT	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	$\leq 16,9$	Sangat Kurus	3	2,7
2	17,0-18,4	Kurus	8	7,2
3	18,5-24,9	Normal	60	54,1
4	25,0-29,9	Gemuk	34	30,6
5	30,0 – 34,9	Obesitas Tk.1	3	2,7
6	35,9 – 39,9	Obesitas Tk.2	1	0,9
7	$\geq 40,0$	Obesitas Tk.3	2	1,8
Total			111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 pasien yang dijadikan sampel, 60 pasien memiliki berat badan yang normal (54,1%), 34 pasien (30,6%) yang gemuk, 8 pasien (7,2%) yang kurus dan 3 pasien (2,7%) yang berat badannya sangat kurus. Sedangkan untuk faktor penyebab kanker payudara yakni obesitas hanya dimiliki oleh 6 orang pasien, dengan obesitas tingkat 1,2 dan 3 masing-masing 2,7%; 0,9%; dan 1,8%. Distribusi kategori berat badan pasien disajikan dalam gambar berikut:

M A K A S S A R



Gambar 12. Kategori berat badan pasien berdasarkan indeks massa tubuh (IMT)

Data diatas menunjukkan bahwa hanya ada 6 pasien (5,4%) mempunyai faktor resiko kanker payudara disebabkan obesitas dengan 2,7% obesitas tingkat 1, 0,9% obesitas tingkat 2 dan 1,8% pasien obesitas tingkat 3 dan sebagian besar memiliki berat badan yang normal sehingga kategori obesitas tidak memiliki pengaruh yang besar dari kejadian kanker payudara di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun data tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan, namun berdasarkan penelitian (Khotimah, 2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara obesitas dan kejadian kanker payudara. Hal ini berdasarkan teori baradero (2006) yang menyebutkan bahwa obesitas mempunyai efek perangsang pada perkembangan kanker payudara. Estrogen disimpan dalam jaringan adiposa. Makin banyak jaringan adiposa, makin banyak estrogen yang mengikat ER+ sel-sel kanker. Jaringan lemak merupakan tempat utama dalam produksi estrogen endogen. Oleh karena itu, wanita dengan berat badan lebih dari *Body Mass Index* (BMI) yang tinggi, mempunyai level estrogen yang tinggi. Obesitas juga berkaitan dengan rendahnya jumlah *Sex Hormon Binding Globulin* (SHBG), yang berperan dalam peningkatan jumlah estradiol. Menjaga indeks massa tubuh (IMT) berkisar 20-25 kg/m² akan mengurangi risiko kanker payudara. Sedangkan *World Cancer Reseach Found* tahun 2007 menganjurkan untuk menjaga IMT berkisar 21-23

kg/m² sehingga dapat mengurangi risiko mengalami kanker payudara (Seo, Bo Ri, 2015)

c. Gambaran penyakit pasien kanker payudara

1) Distribusi siklus kemoterapi


Tabel 12. Distribusi jumlah siklus kemoterapi yang dijalani pasien

Siklus kemoterapi	Jumlah	Persentase (%)
I	14	12,61
IA	-	-
IB	1	0,9
II	11	9,9
IIA	-	-
IIB	1	0,9
III	15	13,51
IIIA	-	-
IIIB	2	1,8
IV	13	11,7
IVA	-	-
IVB	2	1,8
V	16	14,41
VA	-	-
VB	2	1,8
VI	26	23,42
VIA	1	0,9
VIB	-	-
VII	2	1,8
VIIA	-	-
VIIIB	1	0,9
VIII	2	1,8
IX	1	0,9
X	-	-
XI	-	-
XII	1	0,9
Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 pasien yang dijadikan sampel, 26 pasien (23,42%) menjalani kemoterapi sampai siklus ke 6 dan 1 orang pasien (0,9%) yang sampai siklus ke 12 dan 14 pasien (12,61%) yang baru menjalani 1 siklus kemoterapi. Distribusi siklus kemoterapi pasien disajikan dalam gambar berikut:

M A K A S S A R



Gambar 13. siklus kemoterapi pasien kanker payudara


2) Distribusi lokasi benjolan

Tabel 13. Lokasi benjolan kanker payudara pasien

Lokasi	Jumlah	Persentase (%)
Kanan (Dextra)	46	41,44
Kiri (sinistra)	57	51,35
Kanan-Kiri (Bilateral)	8	7,20
Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 111 pasien, terdapat 57 pasien (51,35%) yang mengalami benjolan kanker payudara kiri, 46 pasien (41,44%) yang mengalami pada payudara kanan dan hanya 8 pasien (7,20%) yang mengalami benjolan tersebut pada kedua payudaranya. Distribusi lokasi benjolan disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 14. Distrbusi lokasi benjolan kanker payudara pasien


3) Distribusi Jenis Kemoterapi

Tabel 14. Jenis Kemoterapi

Lokasi	Jumlah	Persentase (%)
Adjuvant	238	53,2
Neoadjuvant	173	38,7
Paliatif	36	8,1
Total	447	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Dari 447 siklus yang dijalani oleh 111 pasien, jenis kemoterapi yang paling banyak dilakukan adalah kemoterapi adjuvant yaitu 238 siklus (53,2%), kemudian kemoterapi neoadjuvant sebanyak 173 siklus (38,7%) dan kemoterapi paliatif sebanyak 36 siklus (8,1%). Distribusi jenis kemoterapi disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 15. Jenis Kemoterapi

4) Distribusi Keadaan Patologi Anatomi Kanker Payudara


Tabel 15 . Distribusi patologi anatomi payudara pasien

No.	Patologi Anatomi (PA)	Jumlah	Persentase (%)
1	IDC low grade malignancy	18	16,2
2	IDC Moderate grade malignancy	50	45
3	IDC high grade malignancy	23	20,7
4	Locally advanced breast cancer sinistra	3	2,7
5	Adenocarcinoma mammae bilateral	3	2,7
6	Adenocarcinoma musinosum mamma	2	1,8
7	Invasive medullary carcinoma	1	0,9

	mammae		
8	Paget disease of breast	2	1,8
9	Fibrosing adenosis mammae	2	1,8
10	Adenocarcinoma mammae sinistra	2	1,8
11	Tubuler carcinoma low grade malignancy, fibroadenoma	1	0,9
12	Adenocarcinoma mammae dextra	1	,9
13	Invasive lobular carcinoma Mammae	2	1,8
14	Invasive breast carcinoma of no special thype	1	0,9
	Total	111	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Berdasarkan catatan rekam medik pasien, sebagian besar pasien telah memasuki fase *invasive ductal carcinoma* (IDC) yang terbagi atas 2 tingkatan yaitu 45% (50 pasien) pada keadaan *moderate*, 16,2% (18 pasien) pada keadaan *low* dan 20,7% (23 pasien) berada dalam keadaan *high malignancy*. Distribusi patologi anatomi karsinoma payudara pasien disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 16. Patologi Anatomi kanker payudara pasien

d. Gambaran penggunaan obat kemoterapi

1. Distribusi regimen kemoterapi pasien kanker payudara

Tabel 16. Regimen kemoterapi dan jumlah siklus


No.	Regimen kemoterapi	Jumlah Siklus	Persentase (%)
1.	Aromasin	1	0,2
2.	CAF	139	31,9
3.	CA	1	0,2
4.	DB	6	1,34
5.	Gemcitabine	15	3,35
6.	GB	3	0,67
8.	GP	21	4,69
9.	GPZ	2	0,44
10.	GZ	5	1,11
11.	Halaven-Zometa	1	0,2
12.	Halaven	2	0,4
	HER	48	10,73
13.	HER-NAV	2	0,44
14.	Navelbin	9	2,01
15.	NAV-5FU-Asam Folic	2	0,4
16.	Taxel (T)	3	0,67
17.	T-AV-Z	1	0,2
18.	TA	33	7,38
19.	TAC	121	27,06
20.	TAC-Z	1	0,2
21.	TAP	2	0,44
22.	TAS	3	0,67
23.	TC	8	1,78
25.	TG	3	0,67
27.	Tykerb-Xeloda	1	0,2
28.	Vinorel+Cape	8	1,78
29.	Xeloda-Zometa	1	0,2
30.	Zometa	1	0,2
	Total	447 siklus	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS tahun 2016

Keterangan :

C = cyclophosphamide , A = Apirubicin, F= 5-Flourourasil, D= Doxorubicin, B= Bondronat, G=gemcitabine, P=Carboplatin, Z=Zometa, HAL=Halaven, HER=Herceptine, NAV=Navelbin, Asam Folic, T= Taxel, AV=Avastin, S=Cisplatin, X=Xeloda, Vinorel+Cape= Nevelbin-Xeloda

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa regimen kemoterapi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi cyclophosphamide-Apirubicin-5 flourourasil (CAF) sebanyak 139 siklus (30,8%), kombinasi Taxel (Paclitaxel/Docetaxel)-Apirubicin-cyclophosphamide (TAC) sebanyak 121 siklus (27,06%), terapi hormon herceptine sebanyak 48 siklus (10,73) dan yang paling sedikit adalah regimen cyclophosphamide-Apirubicin(CA), aromasin, Halaven-zometa (HZ), Tykerb-Avastin-Zometa, Tykerb-Xeloda, Xeloda-Zometa dan penggunaan tunggal zometa yang masing-masing 1 siklus (0,2%). Distribusi regimen kemoterapi yang diberikan pasien disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 17. Distribusi regimen kemoterapi

e. **Gambaran pemilihan dan penggunaan antiemetik pada kasus kemoterapi pasien kanker payudara di RSUP. Dr. Wahidin Sudorohusodo Makassar**

1) Jenis Premedikasi

Tabel 17. Tujuan terapi, golongan, jenis obat dan rute pemberian

Tujuan Terapi	Golongan	Jenis Obat	Rute (Jumlah)	
			Intravena (IV)	Per Oral (p.o)
Anti Alergi	Antagonis Histamin H1	Diphenhidramin	108	-
Anti ulserasi	Antagonis Histamin H2	Ranitidin	109	-
	Pompa proton inhibitor	Omeprazole	1	-
Antiemetik	Antagonis Serotonin	Ondansetron	109	-
	Kortikosteroid	Dexametason	107	-

Berdasarkan tabel diatas, sebelum mendapatkan obat kemoterapi, pasien diberikan 3 jenis premedikasi yang masing-masing memiliki tujuan terapi yang berbeda, yaitu sebagai anti alergi, anti ulserasi dan antiemetik dalam dosis kombinasi maupun monoterapi melalui rute pemberian intravena karena efek samping dari obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi sangat tidak menyenangkan bagi pasien. Anti alergi yang digunakan adalah *Diphenhidramin* yang merupakan golongan antagonis histamin H1, Antiulserasi yang digunakan adalah *ranitidin* dan *omeprazole*, sedangkan antiemetik yang digunakan adalah *Ondansetron* dan *Dexametason*.

2) Tingkat kesesuaian pemberian antiemetik berdasarkan resiko agen kemoterapi yang diberikan

Tabel 18. Kesesuaian antiemetik dengan resiko emesis agen kemoterapi berdasarkan *guideline* MASCC/ESMO 2016

Terapi		Level Pemberian Obat menurut guideline	Jenis Obat	Jumlah siklus yang mendapat terapi antiemetik	Kesesuaian dengan guideline	% kesesuaian
Mono terapi	Dexametason	Risiko rendah dan agen cisplatin	5FU, gemcitabine, metotrexate, paclitaxel, docetaxel, cisplatin	7 siklus	1 siklus	0,22%
	Ondansetron	Risiko rendah dan agen cisplatin	5FU, gemcitabine, metotrexate, paclitaxel, docetaxel dan cisplatin	1 siklus	0 siklus	0%
Kombinasi	Ondansetron + Dexametason	Risiko tinggi, risiko moderat dan dosis tinggi	CA, cisplatin, cyclophosphamid >1500 mg, carboplatin, doxorubicin, epirubicin, cyclophosphamide <1500 mg	439 siklus	392 siklus	87,7%
Total				447 siklus	393 siklus	88%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 jenis pemberian antiemetik premedikasi kemoterapi yaitu monoterapi dan kombinasi. Pada penggunaan monoterapi yaitu Dexametason dari 7 siklus kemoterapi yang mendapat obat tersebut, hanya 1 siklus yang sesuai peresepannya dengan guideline (0,22%) dan Ondansetron hanya digunakan monoterapi pada 1 siklus namun pemberian tersebut tidak sesuai peresepannya dengan *guideline*. Pada penggunaan obat kombinasi yaitu Ondansetron dan dexametason, dari 439 siklus yang menggunakannya terdapat 392 siklus yang sesuai dengan *guideline* (87,7%) sehingga total kesesuaian pemilihan

antiemetik dengan standar *guideline* antiemetik yang ditetapkan oleh *Multinational Association Of Supportive Care in cancer (MASCC/ESMO)* yaitu 88%.

3) Dosis Antiemetik


Tabel 19. Kesesuaian Dosis antiemetik dengan *guideline* MASCC/ESMO

No.	Antiemetik	Level Pemberian	Jenis Obat	Dosis di Guideline	Dosis di RSWS	Jumlah siklus	Kesesuaian		% kesesuaian
							Sesuai	Tidak sesuai	
1	Dexametason	Minimal	Herceptin	Tidak ada	*Lihat tabel 20	48	1	47	0,22%
		Low	5FU, gemcitabine, metotrexate, paclitaxel, docetaxel	4-10 mg	10 mg	35	35	0	7,83%
		Moderate	carboplatin, doxorubicin, epirubicin, cyclophosphamide <1500 mg	8-10 mg	10 mg	96	96	0	21,48%
		High	CA, cisplatin, cyclophosphamide >1500 mg)	20 mg	10 mg	268	0	268	0%
Total						447	132	315	29,53%
2	Ondansetron	Minimal	Herceptin	Tidak ada	*Lihat tabel 20	48	6	42	1,34%
		Low	5FU, gemcitabine, metotrexate, paclitaxel, docetaxel	8 mg	8 mg	35	35	0	7,82%
		Moderate	carboplatin, doxorubicin, epirubicin, cyclophosphamide <1500 mg	8 mg	8 mg	96	96	0	21,47%
		High	CA, cisplatin, cyclophosphamide >1500 mg	8 mg	8 mg	268	268	0	59,95%
Total						447	405	42	90,6%

Tabel 20. Antiemetik dengan indikasi dan dosis yang tidak sesuai dengan guideline MASCC/ESMO pada level minimal

No.	Jenis Antiemetik	Indikasi Level Pemberian	Jenis Obat	Berdasarkan Guideline	Peresepan di RSWS	Jumlah siklus
1	Dexametason	Minimal	Herceptin	Tidak ada obat dan dosis yang disarankan	Dexametason 5 mg	6
					Dexametason 10 mg	41
2	Ondansetron	Minimal	Herceptin	Tidak ada obat dan dosis yang disarankan	Ondansetron 8 mg	42

Jenis antiemetik yang digunakan di RSWS terdiri atas 2 golongan obat yaitu kortikosteroid (*Dexametason*) dan antagonis serotonin (*Ondansetron*). Dari 447 siklus yang mendapatkan antiemetik dexametason, terdapat 132 siklus yang dosisnya sesuai dengan guideline MASCC/ESMO dan 315 siklus yang dosisnya tidak sesuai dengan guideline. Ketidaksesuaian ini dikarenakan di dalam guideline, pemberian dosis dexametason pada level *high* seharusnya 20 mg, namun yang diberikan hanya 10 mg, sehingga dosisnya kurang. Adapun pada dosis ondansetron, dari 447 siklus yang mendapatkan antiemetik ini, terdapat 405 siklus yang dosisnya sesuai dan 42 siklus yang dosisnya tidak sesuai. Dosis yang tidak sesuai pada level minimal untuk masing-masing antiemetik dexametason dan ondansetron, dapat dilihat pada tabel 20. Dimana terjadi ketidaksesuaian indikasi dan dosis yang diberikan di RSWS dengan guideline yang ditetapkan oleh MASCC/ESMO. Di dalam guideline, tidak ada obat ataupun dosis yang disarankan pemberiannya pada level minimal, namun di RSWS pasien diberikan dexametason 5 mg sebanyak 6 siklus dan dexametason 10 mg sebanyak 41 siklus, begitupun dengan ondansetron 8 mg sebanyak 42 siklus. Sehingga dapat disimpulkan kesesuaian dosis dexametason adalah 29,53% dan ondansetron sebesar 90,6%. Distribusi kesesuaian dosis disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 18. Persentase kesesuaian Dosis antiemetik premedikasi kemoterapi

f. Gambaran Efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi

1) Efektivitas antiemetik berdasarkan keluhan emesis pasien

Tabel 21. Jenis antiemetik yang diberikan pasien dan keluhan emetiknya

Antiemetik yang didapat Pasien	Jumlah siklus	Keluhan Emesis (<24 jam)	Tidak emesis	Persen Efektivitas
K	7	6	1	14,28%
O	1	-	1	100%
O+K	439	21	418	95,21%
Total	447	27	420	93,95%

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS, 2017(Data Diolah)

Keterangan : K = Kortikosteroid/Dexametason , O= Ondansetron

Berdasarkan tabel diatas, dari 447 siklus yang dijalani oleh 111 pasien kanker payudara yang mendapatkan regimen kemoterapi dengan premedikasi antiemetik, menunjukkan bahwa keluhan emesis hanya di dapatkan pada 27 siklus dan yang tidak emesis sebanyak 420 siklus hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi yaitu 93,95%.

2) Distribusi siklus pengobatan dan jumlah pasien yang emesis pada siklus tersebut di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun

2016

Tabel 22. Siklus yang dijalani pasien selama tahun 2016

No.	Siklus ke-	No. Pasien	Jumlah pasien	No. Pasien yang emesis	Jumlah Pasien emesis
1	1	6; 13; 20; 23; 32; 41; 43; 47;57; 65;73; 93; 95 dan 99	14	-	-
2	1-2	18;19; 28; 40; 45; 59; 69; 77; 87; 97;100;105 dan 108	13	105	1
3	1-3	4;10; 14; 24; 31; 53; 56; 58; 68; 71; 72; 74; 92;94 dan 111	15	-	-
4	1-4	11;15; 35;38; 39; 64; 66; 67; 81;88; 90; 101; 103; 107; 109	15	11 dan 88	2
5	1-5	1;2;7;8;26;29; 34;46;51;52; 61;63;70; 91 dan 102.	14	7	1
6	1-6	9;17;21;25;27;30;33;36;37; 44;48;49;60; 62;78;79;80;82; 85;86;89;104; 110 dan 106.	24	60; 89 dan 110	3
7	1-7	76 dan 84	2	-	-
8	1-9	16	1	-	-
9	3	12 dan 96	2	-	-
10	6	98	1	-	-
11	8	22	1	-	-
12	7-12	3	1	3	1
13	2-5	5 dan 54	2	5 dan 54	2
14	4-7	42	1	-	-
15	4-6	50	1	50	1
16	4-5	55	1	-	-
17	3-4	75	1	75	1
18	5-6	83	1	-	-
Total			111		12

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS, 2017(Data Diolah)

Tabel 21 menjelaskan bahwa masing-masing pasien menjalankan siklus kemoterapi yang berbeda-beda . Masing-masing angka menunjukkan bahwa pasien menjalankan kemoterapi pada siklus tertentu dengan 6 tahap pemasukan obat kemoterapi pada masing-masing siklus dan jarak interval 3-4 minggu. Diperoleh 18 variasi siklus pengobatan kemoterapi dan terdapat 24 pasien yang menjalankan siklus pengobatan yang lengkap (1-6 siklus) , 1 pasien yang menjalani hingga siklus 1-9 dan sebanyak 86 pasien yang tidak menjalani siklus yang lengkap pada tahun 2016.

3) Distribusi pasien yang mendapat golongan kemoterapi dan antiemetik yang sama

Tabel 23. Distribusi pasien dengan golongan kemoterapi dan antiemetik yang sama serta keluhan emesisnya

Jumlah Pasien	Jumlah Siklus	Golongan Kemoterapi	Level Emetogenesis	Golongan Antiemetik	Keluhan emesis	
					Ada	Tidak
3	1	Aromasin	M	K-SA	-	3
30	139	CAF	H-L	K-SA	3	27
1	1	CA	H	K-SA	-	1
1	6	DB	M-L	K-SA	-	1
5	15	Gemcitabine	L	K-SA	-	5
2	3	GB	L-L	K-SA	-	2
8	21	GP	L-M	K-SA	1	7
1	2	GPZ	L-M	K-SA	-	1
2	5	GZ	L	K-SA	-	2
1	1	Halaven-Zometa	L	K-SA	-	1
1	2	Halaven	L	K-SA	-	1
13	1	HER	MIN	SA	-	5
	6	HER	MIN	K	1	
	41	HER	MIN	K-SA	7	
2	2	HER-NAV	MIN-M	K-SA	1	1
3	9	Navelbin	M	K-SA	-	3
2	2	NAV-5FU-Asam Folic	M-L	K-SA	-	2
1	3	Taxel (T)	L	K-SA	-	1
1	1	T-AV-Z	L-MIN	K-SA	-	1
9	33	TA	L-M	K-SA	1	8
34	124	TAC	L-H	K-SA	2	32
1	1	TAC-Z	L-H	K-SA	-	1
1	2	TAP	L-M-M	K-SA	-	1
2	3	TAS	L-M-H	K-SA	-	2
3	8	TC	M-L	K-SA	-	3
3	3	TG	L-L	K-SA	-	3
1	6	TP	L-M	K-SA	-	1
1	1	Tykerb-Xeloda	L-L	K	-	1
2	8	Vinorel+Cape	M-L	K-SA	1	1
1	1	Xeloda-Zometa	L	K-SA	-	1
1	1	Zometa	L	K-SA	-	1
Total					17	119

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSWS, 2017(Data Diolah)

Keterangan :

K= Kortikosteroid, SA= Serotonin Antagonis, L = Low, M= Moderate, H= High, MIN= Minimal, C = cyclophosphamide , A = Apirubicin, F= 5-Flourourasil, D= Doxorubicin, B= Bondronat, G=gemcitabine, P=Carboplatin, Z=Zometa, HAL=Halaven, HER=Herceptine, NAV=Navelbin, Asam Folic, T= Taxel, AV=Avastin, S=Cisplatin, X=Xeloda, Vinorel+Cape= Nevelbin-Xeloda

3. Analisis Bivariant

Analisis bivariant dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan uji alternatif chi-square untuk mencari hubungan antara variabel kejadian emesis dengan variabel bebas yang ada.

Tabel 24. Analisis bivariant yang menghubungkan variabel jenis kelamin, usia, siklus, kesesuaian terapi, dan kesesuaian dosis dengan emesis

Kategori		Ada Emesis		Tidak ada emesis		Total		p
		N	%	n	%	n	%	
Jenis Kelamin	Laki-laki	0	0,0	6	100	6	100	1,00
	Perempuan	27	6,1	414	93,9	27	100	
Usia	26-35	2	8,3	22	91,7	24	100	0,017
	36-45	6	4,4	129	95,6	135	100	
	46-55	19	9,4	184	90,6	203	100	
	56-65	0	0,0	85	100	85	100	
Siklus	<siklus 6	18	4,4	388	95,6	406	100	0,00
	≥ siklus 6	9	22	32	78	41	100	
Kesesuaian terapi	sesuai	19	4,8	374	95,2	393	100	0,01
	Tidak sesuai	8	14	46	85,2	54	100	
Kesesuaian Dosis Ondansetron	sesuai	21	4,8	419	95,2	440	100	-
	Tidak sesuai	6	85,7	1	14,3	7	100	
Kesesuaian Dosis Dexametason	sesuai	12	9,2	118	90,8	130	100	1,000
	Kurang Dosis	7	2,6	261	97,4	268	100	
	Tidak sesuai	8	16,3	41	83,7	49	100	
Total		27	100,0	420	100,0	447	100	

Sumber : Statistik Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Keterangan : P (Probabilitas) < 0,05 signifikan

P (Probabilitas) > 0,05 tidak signifikan

Uji *Chi-square* yang dilakukan terhadap hasil penelitian berdasarkan variabel dependent dan independent diatas (tabel. 22) menunjukkan bahwa jenis kelamin ($p = 1,00$), Dosis dexametason ($p = 0,085$) dan dosis Ondansetron ($p = 1,000$) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Efektivitas antiemetik berdasarkan kejadian emesis karena memiliki nilai probabilitas >0,05. sedangkan faktor lainnya yaitu usia ($p = 0,017$), siklus kemoterapi ($p = 0,00$), dan Kesesuaian terapi

antiemetik ($p = 0,01$), menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap efektivitas berdasarkan ada tidaknya kejadian emesis pasca kemoterapi.

4. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kejadian emesis. Dengan menggunakan uji regresi logistik ganda bertujuan untuk mencari faktor yang mempengaruhi kejadian emesis.

Tabel 25. Hasil Analisis Uji Regresi Logistik Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Emesis

	Variabel	Koefisien	p	OR (IK 95%)
Langkah 1	Usia		,633	
	Usia(1)	-18,141	,997	,000 (0,00)
	Usia(2)	-18,370	,997	,000 (0,00)
	Usia(3)	-18,892	,996	,000 (0,00)
	Terapi Antiemetik	1,123	,032	3,074 (1,098-8,600)
	Siklus Kemoterapi	1,460	,003	4,306 (1,663 -11,148)
	Konstanta	19,077	,996	192860261,054

Sumber : Statistik Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Hasil analisis logistik terhadap variabel yang berpengaruh pada analisis *chi-square* menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kejadian emesis pasca kemoterapi adalah terapi antiemetik dan siklus kemoterapi. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai Odds Ratio (OR) dari yang terbesar ke yang terkecil adalah siklus kemoterapi (OR = 4,306) dan terapi antiemetik (OR=3,074).

B. Pembahasan

Penelitian tentang efektivitas antiemetik pasien kemoterapi kanker payudara ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo Makasar selama periode Januari-Desember 2016 yang merupakan rumah sakit rujukan utama pasien kanker di wilayah Indonesia Timur. Total seluruh populasi yaitu 363 pasien dan sampel yang diambil sebanyak 111 pasien. Adapun populasi yang tidak memenuhi kriteria inklusi yaitu pasien yang berusia di bawah usia 25 tahun, siklus kemoterapi bukan ditahun 2016, tidak mendapatkan premedikasi antiemetik dan data rekam medisnya tidak jelas dan tidak lengkap.

Hasil penelitian pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi perempuan sebesar 99,1% dan laki-laki hanya 0,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kanker payudara tidak terbatas pada perempuan saja, namun dapat terjadi pula pada laki-laki. Laki-laki juga dapat terkena kanker payudara, tetapi hal itu sangat jarang terjadi (Michaud et al, 2008). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Rahmawati, 2009), pasien pada tahun 2010 lebih bervariasi. Dan pada tahun 2008 pasien kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi diderita oleh perempuan sebanyak 100% dari 75 pasien yang diteliti. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 97% perempuan dan 3% laki-laki dari 100 pasien kanker payudara yang diteliti. Berdasarkan *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN), kanker payudara sering terjadi pada perempuan yang sudah menopause namun dapat pula terjadi pada semua usia. Perempuan sangat rentan menderita kanker ini karena pengaruh peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang lebih cepat dibanding laki-laki. Kedua reseptor tersebut dapat digunakan dalam menstimulasi pertumbuhan sel kanker. Reseptor ini disebut reseptor estrogen positif atau reseptor estrogen negatif dan reseptor progesteron positif atau progesteron negatif (www.nccn.org)

Ditemukan pada rentang usia 46-55 tahun atau di masa lansia awal merupakan urutan terbanyak pasien kanker payudara yaitu 44,1%. Menurut Depkes, 2009 kategori umur dewasa dimulai pada usia diatas 25 tahun, dimana usia 26-35 tahun adalah usia dewasa awal dan 36-45 tahun adalah dewasa akhir. Kelompok lansia dimulai pada usia 46-55 tahun sebagai masa lansia awal dan usia 56-65 tahun sebagai masa lansia akhir. Adapun usia diatas 65 tahun masuk dalam masa manula. Keadaan tersebut hampir sesuai dengan penelitian sebelumnya (Dewi, 2011) dan diperoleh rentang usia yang paling banyak adalah pada usia 46-50 tahun sebesar 28% dari 100 pasien yang diteliti. Kanker payudara adalah penyebab kematian terbesar pada wanita usia 20-59 tahun (Michaud et al, 2008). Faktor resiko terjadinya kanker payudara pada wanita yaitu usia awal menstruasi, usia kehamilan pertama, usia menopause dan penggunaan kontrasepsi.

Stadium kanker yang banyak diderita pasien kanker payudara pada stadium tiga, dengan distribusi stadium tersebut terdiri atas 3 tingkatan yaitu IIIA, IIIB dan IIIC, stadium IIIB menempati urutan tertinggi yaitu 40,54% atau 45 pasien. Hal ini menunjukkan karakteristik pasien kanker payudara yang paling banyak di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2016 merupakan pasien dengan stadium lanjut yaitu IIIB dan IV. Ini disebabkan karena pada stadium awal benjolan payudara belum terlalu nampak sehingga masih sedikit yang melakukan pemeriksaan awal. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan stadium III juga menempati urutan pertama yakni 59% dari 100 pasien yang diteliti (Dewi, 2011). Data di Indonesia maupun laporan negara maju kebanyakan kasus kanker payudara terdiagnosis ketika penyakit telah berada pada stadium lanjut yaitu stadium III dan stadium IV. Pada rekam medik pasien, sebagian besar ditulis dengan metode TNM, hanya sebagian kecil saja yang ditulis langsung dengan angka romawi. Metode TNM

adalah T (Tumor), N (nodus), dan M (Metastase), yang dikombinasikan dan dilambangkan dengan angka romawi ke dalam 8 tingkatan (Stadium 0, I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC dan stadium IV). Pengelompokan stadium berdasarkan terapinya dibagi menjadi dua yaitu kemoterapi *adjuvant* dan *neoadjuvant*. Kemoterapi *adjuvant* diberikan setelah pembedahan untuk menghilangkan sel-sel kanker yang masih tersisa atau yang sudah bermetastasis ke organ lain untuk mencegah kekambuhan. *Neoadjuvant* adalah kemoterapi yang bertujuan untuk memperkecil ukuran kanker sebelum dilakukan pembedahan sehingga kanker dapat diangkat (www.nccn.org).

Seluruh sampel pasien kanker payudara menjalani pengobatan dengan kemoterapi dalam berbagai macam siklus dari siklus I sampai siklus ke XII. Obat-obat kemoterapi dalam 1 siklus di injeksikan selama beberapa jam dengan jarak 1 jam antara regimen tertentu dengan regimen lainnya. Dan diselingi dengan istirahat beberapa minggu (3-4 minggu) untuk memberikan kesempatan bagi jaringan normal untuk tumbuh kembali. Seluruh pasien yang menjalani kemoterapi dikelompokkan berdasarkan siklus kemoterapi yang mereka jalani dapat dilihat pada tabel 12.

Dari 111 pasien, terdapat 57 atau 51,35% pasien yang mengalami benjolan kanker pada payudara kiri, 46 pasien (41,44%) yang mengalami pada payudara kanan dan hanya 8 pasien (7,20%) yang mengalami benjolan tersebut pada kedua payudaranya.

Berdasarkan catatan rekam medik pasien, pemeriksaan patologi anatomi pasien menunjukkan adanya 14 variasi hasil pemeriksaan anatomi patologi kanker payudara dan sebagian besar pasien telah memasuki fase *invasive ductal carcinoma* (IDC) sebesar 81,9% yang terbagi atas 3 tingkatan yaitu 45% (50 pasien) pada

keadaan *moderate*, 16,2% (18 pasien) pada keadaan *low* dan 20,7% (23 pasien) berada dalam keadaan *high malignancy*. Hal ini sesuai dengan kepustakaan yang menyatakan bahwa secara umum patologi kanker payudara yang terbanyak adalah IDC sebesar 76,5% (Saraswati, 2013). *Invasive ductal carcinoma* (IDC) merupakan jenis kanker yang paling umum dijumpai. Dimana sel kanker mulai timbul dari duktus, menerobos dinding duktus dan berkembang ke jaringan lemak payudara. Kanker kemudian akan menyebar (*bermetastasis*) ke organ tubuh lainnya melalui sistem getah bening dan aliran darah, dan sekitar 8 dari 10 kasus kanker payudara invasif merupakan jenis ini (Makki, 2015).

Regimen kemoterapi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi *cyclophosphamide-Apirubicin (Epirubicin/Doxorubicin)-5 flourourasil (CAF)* sebanyak 139 siklus (30,8%) dengan beberapa faktor yang menjadi alasan seorang dokter mengambil pilihan jenis obat. Salah satu faktor pemilihan obat yang digunakan diantaranya dilihat dari kondisi pasien itu sendiri, seperti hasil laboratorium, pemeriksaan jantung pasien, kelainan ginjal pada kadar kreatininnya, juga stadium pasien yang rata-rata sudah pada stadium lanjut (3-4). Dan berdasarkan rujukan pengobatan kemoterapi pada pasien kanker payudara terapi sesuai standar regimen kanker payudara yaitu menggunakan *antrasiklin, cyclophosphamide, flourourasil* dan *metotrexat* sebagai lini pertama dengan menggunakan 3 kombinasi agar kerja dari obat tersebut dapat optimum, sedangkan lini kedua terapi digunakan 2 kombinasi dari *adriamicin, cyclophosphamide, doxorubicin* dan *taxane* (Kemenkes, 2015). Namun ada beberapa kombinasi pada daftar diatas yaitu *gemcitabine-carboplatin, paclitaxel-carboplatin, tykerb-xeloda* yang belum lazim digunakan pada kanker payudara namun jika dilihat pada fungsi

obat tersebut masih memiliki mekanisme yang sesuai untuk pengobatan kanker payudara.

Mekanisme mual dan muntah dari efek samping kemoterapi ini terjadi karena pada daerah yang berperan dalam proses mual dan muntah yakni pusat muntah yang terletak di medulla oblongata dan daerah pemicu kemoreseptor/*Cemoreseptor Trigger Zone* (CTZ) yang terletak di area postrema. Obat-obat kemoterapi dapat mengaktifkan langsung daerah pemicu kemoreseptor atau di pusat muntah karena sifatnya yang nonselektif terhadap sel kanker. Beberapa reseptor di kedua daerah tersebut, termasuk dopamin tipe 2 (DA2) dan serotonin tipe 3 (5-HT3) berperan penting dalam mengaktifkan pusat muntah. Obat-obat kemoterapi dapat pula bekerja secara perifer, dengan menyebabkan kerusakan sel di saluran pencernaan, dan melepaskan serotonin dari sel enterokromafin mukosa usus halus. Serotonin yang dilepaskan akan mengaktifkan reseptor 5-HT3 pada saraf vagus dan serat aferen nervus splanknikus yang kemudian membawa sinyal sensoris ke medulla sehingga terjadi respon muntah (Firmansyah, 2010).

Sebelum mendapatkan obat kemoterapi, pasien diberikan 3 jenis premedikasi yang masing-masing memiliki tujuan terapi yang berbeda, diantaranya sebagai antiemetik, antialergi dan antiulserasi mengingat efek samping dari obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi sangat tidak menyenangkan bagi pasien. Anti alergi yang digunakan adalah *Diphenhidramin* yang merupakan golongan antagonis histamin H1, obat ini digunakan untuk mencegah terjadinya reaksi hipersensitivitas dan alergi dari obat kemoterapi atau campuran dari pelarut obat kemoterapi yang berupa kemerahan di kulit, *pruritis*, *angiodema*, *bronkospasmus*, *dispnea* sampai *syok anaphylactic* yang bisa mengancam nyawa karena sesak napas (Wang, 1999). Obat kedua yakni Antiulserasi yang digunakan adalah *ranitidin* dan

omeprazol, dimana obat ini diberikan sebagai profilaksis atau terapi stress ulcer dan refluks gastroesofageal. Adapun antiemetik yang digunakan adalah *Ondansetron* dan *Dexametason* untuk mencegah terjadinya emesis yang merupakan efek samping utama dari obat-obat kemoterapi. Pemberian antiemetik premedikasi kemoterapi umumnya diberikan dalam bentuk intravena, meskipun dapat pula diberikan secara oral bila pasien tidak muntah. Namun pemberian melalui intravena dapat lebih cepat bekerja karena langsung masuk ke aliran darah. Ondansetron merupakan antiemetik golongan antagonis reseptor serotonin tipe 3 (5-HT₃) yang dapat diberikan sebelum atau sesudah kemoterapi (Intravena/oral). Obat ini efektif untuk mengobati tingkatan terapi penyebab muntah (Firmansyah, 2010). Mekanismenya di duga dilangsungkan dengan mengantagonisasi reseptor 5-HT₃ yang terdapat pada CTZ di area postrema otak dan mungkin juga pada aferen vegal saluran cerna. Ondansetron biasanya dikombinasikan dengan *Dexametason*. *Dexametason* merupakan suatu kortikosteroid dengan efek antiinflamasi kuat dan dilaporkan pertama kali efektif sebagai antiemetik dan terbukti aman pada pasien yang menjalani kemoterapi (Haris, 1992), kombinasi antara Ondansetron dan Dexametason dapat memperkuat efek dari Ondansetron karena berkompetisi dengan histamin bebas untuk mengikat reseptor H₁ (Hesketh, 2008). Obat ini juga bersifat kompetitif terhadap efek histamin pada saluran *gastrointestinal*, *uterus*, pembuluh darah besar dan otot bronkial. Penghambatan reseptor H₁ juga menekan pembentukan edema, panas dan gatal yang disebabkan histamin (Hesketh, 2008). Obat-obat antiemetik sering dikombinasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan menurunkan toksisitas. Golongan kortikosteroid seperti *Dexametason* bekerja dengan meningkatkan aktivitas antiemetik bila diberikan bersama dengan antagonis reseptor 5-HT₃ (Firmansyah, 2010). Selain itu, mekanisme kerja dari Dexametason

dengan menghambat pelepasan asam arachidonat, modulasi substansi yang berasal dari metabolisme asam arachidonat dan pengurangan jumlah 5-HT₃. Dexametason meningkatkan potensi dari efek antiemetik obat lain secara farmakologis dengan meningkatkan sensitifitas reseptor, selain itu efek antiemetik dari Dexametason diduga melalui mekanisme menghambat pelepasan prostaglandin secara sentral sehingga terjadi penurunan kadar serotonin di sistem saraf pusat, menghambat pelepasan serotonin di saluran cerna sehingga tidak terjadi ikatan antara serotonin dengan reseptor 5-HT₃ (Frederikson, 1992), pelepasan endorfin (Haris, 1992) dan antiinflamasi kuat untuk mencegah inflamasi karena efek samping kemoterapi dan diduga glukokortikoid mempunyai efek yang bervariasi pada susunan saraf pusat dan akan mempengaruhi regulasi dari neurotransmitter, densitas reseptor, transduksi sinyal dan konfigurasi neuron (Wang, 1999).

Seluruh pasien mendapatkan antiemetik premedikasi. Tabel 18 menjelaskan bahwa pasien yang mendapatkan kesesuaian dalam pemilihan antiemetik berdasarkan resiko emesis agen kemoterapi yang mereka dapatkan dengan mengacu pada guideline MASCC/ESMO sebesar 88% dengan antiemetik yang paling sering digunakan dan efektif dalam mencegah timbulnya emesis pasca kemoterapi yaitu *Ondansetron* yang dikombinasi dengan *Deksametason*. Walaupun antiemetik tunggal *Ondansetron* juga memenuhi standar pengobatan, tetapi dalam standar pengobatan emesis obat tersebut dapat diberikan secara tunggal bila pasien mendapatkan regimen dengan level emetogenesis rendah.

Jenis antiemetik yang digunakan di RSWS terdiri atas 2 golongan obat yaitu kortikosteroid (*Dexametason*) dan antagonis serotonin (*Ondansetron*). Dari 447 siklus yang mendapatkan antiemetik dexametason, terdapat 132 siklus yang dosisnya sesuai dengan guideline MASCC/ESMO dan 315 siklus yang dosisnya tidak

sesuai dengan guideline. Ketidaksesuaian ini dikarenakan di dalam guideline, pemberian dosis dexametason pada level *high* seharusnya 20 mg, namun yang diberikan hanya 10 mg, sehingga dosisnya kurang. Adapun pada dosis ondansetron, dari 447 siklus yang mendapatkan antiemetik ini, terdapat 405 siklus yang dosisnya sesuai dan 42 siklus yang dosisnya tidak sesuai. Dosis yang tidak sesuai pada level minimal untuk masing-masing antiemetik dexametason dan ondansetron, dapat dilihat pada tabel 20. Dimana terjadi ketidaksesuaian indikasi dan dosis yang diberikan di RSWS dengan guideline yang ditetapkan oleh MASCC/ESMO. Di dalam guideline, tidak ada obat ataupun dosis yang disarankan pemberiannya pada level minimal, namun di RSWS pasien diberikan dexametason 5 mg sebanyak 6 siklus dan dexametason 10 mg sebanyak 41 siklus, begitupun dengan ondansetron 8 mg sebanyak 42 siklus. Pemberian antiemetik tanpa adanya level indikasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakrasionalan yang berakibat pula pada pemborosan biaya pengobatan. Sehingga dapat disimpulkan kesesuaian dosis dexametason adalah 29,53% dan ondansetron sebesar 90,6% (Lihat tabel 19 dan 20).

Berdasarkan tabel 21 dari 447 siklus yang dijalani oleh 111 pasien kanker payudara yang mendapatkan regimen kemoterapi dengan premedikasi antiemetik, menunjukkan bahwa keluhan emesis hanya di dapatkan pada 27 siklus pasien dan yang tidak emesis sebanyak 420 siklus hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi dalam mencegah kejadian emesis pasca kemoterapi yaitu 93,95%.

Antiemetik dosis tunggal *Dexametason* dan *Ondansetron* dalam standar pengobatan digunakan tunggal jika regimen kemoterapi mempunyai level emetogenesis rendah. Efektivitas penggunaan dosis tunggal *Dexametason* adalah 14,28% karena dari 7 siklus, yang tidak mengalami keluhan hanya 1 siklus. Dalam

tabel 21 tersebut menunjukkan bahwa masih ada pasien yang mual pada 6 siklus setelah pemberian Dexametason yakni pasien no.3 yang mendapat regimen Herceptine (level minimal) yang seharusnya jika herceptin diberikan, maka tidak ada premedikasi dianjurkan karena resiko emesisnya minimal namun dalam hal ini pasien hanya diberikan premedikasi Dexametason untuk mencegah reaksi efek samping pasca kemoterapi. Tapi tetap saja dengan pemberian Dexametason masih mengalami keluhan mual dalam waktu <24 jam (*acute emesis*). Hal ini dapat terjadi karena penurunan kepekaan reseptor antiemetik di dalam tubuh pasien ditambah dengan kondisi kesehatan fisik pasien yang kurang baik karena mempunyai penyakit penyerta hipertensi (140/100 mmHg) serta riwayat merokok dan Alkohol. Selain itu, pasien telah menjalani beberapa siklus kemoterapi hingga siklus ke XII dan telah mendapatkan beberapa regimen kemoterapi, sehingga menyebabkan pengobatan antiemetik menjadi kurang efektif. Hal yang sama juga terjadi pada pasien no. 89 yang telah mendapat premedikasi kombinasi *Ondansetron* dan *Dexametason* pada level emetogenesis minimal namun masih mengalami keluhan mual di siklus 1 dan 2, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pasien mengalami kanker payudara yang residif/kambuh setelah menjalani operasi MRM di tahun 2015 dan baru kembali memulai pengobatan dari awal dengan kondisi mengalami emesis *antisipatory* yang berlanjut pada emesis akut dengan kanker menunjukkan bahwa telah terjadi metastasis pada paru, hepar dan tulang yang berpengaruh pada kondisi psikis pasien. Namun pada pasien nomor 55 yang juga tidak mendapatkan kesesuaian antiemetik, dengan regimen Herceptin (level minimal) dan premedikasi *Ondansetron* dosis tunggal, tidak menunjukkan adanya keluhan emesis, hal ini karena kondisi pasien yang baik dengan tidak menunjukkan adanya penyakit penyerta, dan hanya mempunyai satu riwayat penggunaan regimen kemoterapi.

Dalam *guideline* antiemetik, seharusnya pasien tidak mendapatkan terapi antiemetik, tetapi dokter meresepkan Ondansetron sebagai terapi tambahan untuk mencegah terjadinya mual dan muntah pasca kemoterapi. Pada pasien yang mendapatkan premedikasi berupa antiemetik kombinasi *Ondansetron* dan *dexametason* sebelum kemoterapi, maka antiemetik tersebut dapat membantu untuk mencegah timbulnya emesis setelah pasien menjalani kemoterapi. Dan hasilnya dapat terlihat jelas yang dari 439 siklus yang dijalani pasien, hanya 21 yang mengalami keluhan, menunjukkan efektivitasnya 95,21% hal tersebut karena pasien tersebut menerima antiemetik yang sesuai dengan level emesis regimen kemoterapi yang mereka dapatkan. Selain itu, faktor lain yang mendukung pengobatan yaitu dari kondisi kesehatan mereka yang baik sehingga dapat menunjang pengobatan menjadi lebih baik dan efektif. Dengan tidak adanya keluhan emesis pada kombinasi tersebut, menunjukkan bahwa antiemetik yang mereka dapatkan efektif mencegah timbulnya mual dan muntah pasca kemoterapi. Walaupun *Ondansetron* dosis tunggal menunjukkan efektivitas 100%, tetapi dalam penelitian, hanya digunakan oleh 1 orang pasien, sehingga data tidak akurat dijadikan acuan. Sedangkan penggunaan *Dexametason* dosis tunggal hanya menunjukkan efektivitas 14,28%.

Meskipun pasien-pasien yang telah mendapatkan antiemetik yang sesuai masih ada yang mengalami emesis, tetapi dengan pemberian antiemetik premedikasi kemoterapi hal tersebut dapat dicegah atau dikurangi. Misalnya pada pasien nomor 105 yang mual hanya pada siklus 1 karena menjalani kemoterapi residif yang dimana pengobatannya baru dimulai. Pasien nomor 88 yang mual dan muntah pada siklus 1A dan 2A namun tidak pada siklus lainnya karena kanker telah bermetastasis pada vertebra, pasien nomor 60 yang mual hanya pada siklus 6 dan

pasien 54 yang mengalami mual dan muntah pada siklus 2 karena pada siklus ini terjadi peningkatan kadar gula darah sehingga menyebabkan pasien masih merasakan keluhan mual. nomor 54 yang mual dan muntah pada siklus 2 dan siklus lain tidak mengalami mual ataupun muntah. Dan juga beberapa pasien lain yang telah mendapatkan kesesuaian antiemetik hanya muntah 1 atau 2 kali dengan mual muntah yang ringan saja selama siklusnya dan itu dapat dinilai tidak berarti. Hal tersebut membuktikan bahwa kombinasi *Ondansetron* dan *Dexametason* lebih baik dan efektif untuk mencegah kejadian emesis <24 jam setelah kemoterapi.

Dari hasil Uji statistik *Chi-square* (Tabel. 24) yang dilakukan terhadap hasil penelitian berdasarkan variabel dependent dan independent menunjukkan bahwa jenis kelamin, dosis ondansetron dan dosis dexametason tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas antiemetik premedikasi berdasarkan kejadian emesis karena menunjukkan nilai probabilitas (p value <0,05) hal ini karena dari 111 pasien hanya 1 pasien dengan jenis kelamin laki-laki dan 110 pasien dengan jenis kelamin perempuan, menunjukkan tidak adanya keberagaman jenis kelamin. Begitu pula dengan dosis ondansetron yang menunjukkan kesesuaian dosis pada semua siklus, serta dosis dexametason yang banyak memiliki ketidaksesuaian dosis, namun tetap memberikan efektivitas terapi yang baik. Adapun faktor lainnya yaitu usia ($p = 0,017$), siklus kemoterapi ($p = 0,00$), dan kesesuaian terapi antiemetik ($p = 0,01$) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan efektivitas obat yang dilihat dari kejadian emesis pasca kemoterapi.

Hubungan antara usia dengan kejadian emesis menunjukkan nilai probabilitas 0,017 (p value <0,05) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, dimana semakin tinggi usia maka efektivitas obat semakin menurun seiring dengan terjadinya penurunan fungsi tubuh. Sehingga resiko

kejadian emesis pasca kemoterapi semakin besar dan resiko tersebut paling besar pada usia 46-55 tahun.

Hubungan antara siklus kemoterapi dengan kejadian emesis menunjukkan nilai probabilitas 0,00 (p value $< 0,05$) yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, dimana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi siklus yang dijalani pasien >6 siklus, maka efektivitas antiemetik semakin berkurang sehingga resiko kejadian emesis semakin besar.

Hubungan antara kesesuaian terapi antiemetik dengan kejadian emesis menunjukkan nilai probabilitas 0,01 (p value $< 0,05$) yang berarti bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kesesuaian terapi dengan emesis. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tidak sesuai pengobatan antiemetik berdasarkan *guideline* maka resiko emesis juga semakin besar.

Analisis multivariat dilakukan untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kejadian emesis yaitu siklus, usia, dan kesesuaian terapi. Dengan menggunakan uji regresi logistik ganda bertujuan untuk mencari faktor yang mempengaruhi kejadian emesis. Meskipun demikian analisis untuk multivariat yang menggunakan uji regresi logistik oleh sebagian ahli dianggap sebagai penelitian untuk membangun hipotesis (*hypothesis generating research*), yang berarti hasil analisis multivariat dapat digunakan sebagai latar belakang untuk mengembangkan penelitian baru yang menguji asosiasi antara variabel independen dan variabel dependen dengan desain penelitian yang lebih sederhana dan terarah. Maka didapatkan model akhir persamaan regresi logistik untuk menentukan faktor yang paling mempengaruhi kejadian emesis. Hasil dari regresi logistik tidak bisa langsung diinterpretasikan dari nilai koefisiennya seperti pada regresi linier. Interpretasi dapat dilakukan dengan melihat nilai dari $\exp(B)$ (nilai estimasi odds

rasio) atau nilai eksponen dari koefisien persamaan regresi yang terbentuk. Secara keseluruhan model ini dapat memprediksi besar/kecilnya, tinggi/rendahnya pengaruh faktor yang ada dalam pengaruhnya terhadap kejadian emesis sebesar 94.0%. Jadi dari hasil regresi logistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan nilai OR dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu siklus kemoterapi (OR=4,306) dan kesesuaian terapi antiemetik (OR=3,074) (Tabel. 25).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas antiemetik premedikasi kemoterapi sebesar 93,95% dengan kombinasi Ondansetron dan Dexametason sebagai pilihan terapi utama.
2. Kesesuaian Terapi sebesar 88% dan kesesuaian dosis antiemetik premedikasi kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan *guideline* MASCC/ESMO yaitu 29,53% pada dosis dexametason dan 90,6% pada dosis ondansetron.
3. Hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia, siklus, dan kesesuaian terapi antiemetik berdasarkan *guideline* MASCC/ESMO dengan efektivitas terapi antiemetik yang dilihat dari kejadian emesis pasien kanker payudara pasca kemoterapi, dan variabel yang berpengaruh adalah siklus kemoterapi (OR = 4,306) dan terapi antiemetik (OR=3,074).

B. Implikasi Penelitian

Membuat pedoman pengobatan dalam pemberian antiemetik baik premedikasi maupun rawat jalan kepada pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sehingga dapat mengetahui secara jelas jenis obat dan dosis yang diberikan sesuai dengan tingkat emetogenesis regimen kemoterapi yang diberikan.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al-Karim

ACS. *Chemotherapy drugs: How they work*. American: American cancer society, 2015.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *The Prophetic Medicine*. Terj. Ahmad Aswani dan Chrisna Farmadiani, *Rahasia Kesehatan Nabi*. Yogyakarta: Diglossia Media. 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Yoga Permana. Chm, 2008.

Al-Bukhari. *Shohih Bukhari* . terj Prof Tk. Ahmad Sunarto dkk. Semarang: CV. Syifa, 1993.

Alsagoff-Hood. *Kanker Paru dan Terapi Paliatif*. Surabaya. Airlangga Universitas Press, 1995.

Alteri, dkk. *Breast cancer facts & figures 2015-2016*. Atlanta : American Cancer Society, Inc, 2015.

Arisman. *Keracunan Makanan: Buku Ajar Ilmu Gizi*. Jakarta: EGC, 2008.

Ar-rifa'i, Muhammad nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Maktabah ma'rifat, 2000.

Asti. *105 Tokoh Penemu dan perintis Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.

Breast Cancer <http://www.nccn.org>, 2010. Diakses tanggal 15 Juli 2017

Bambang, dkk. "Kejadian Muntah pada penderita kanker yang menjalani Pengobatan kemoterapi di RSUP PROF. DR. R. D. Kandou Manado". *Jurnal e-clinic* 3, no.3 (2015): h. 781-784.

Badan POM. *Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008*. Jakarta: Sagung Seto, 2009.

Brown, L.Daniel. *Cellular mechanisms of chemotherapy*. Clinical guide to antineoplastic therapy A chemotherapy handbook, 2015

Davey, Patrick. *At a Glance Medicine*. Jakarta : Erlangga, 2005.

- Dahlan, M.Sopiyuddin. *Besar Sampel dan cara pengambilan sampel*. Jakarta: Salemba Medika. 2010
- Departement Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku Pencegahan Kanker Leher Rahim & Kanker Payudara*. Jakarta: Depkes RI, 2009.
- Desen, Wan. *Buku Ajar Onkologi Klinis*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2011.
- Desiyani, Nani. 2012. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara di Rumah Sakit Pertamina Cialap. *Jurnal Keperawatan soedirman (The soedirman Journal Of Nursing), Volume 4, No.2 Juli 2009*. h.61-66 MM
- Dewi, Andika Pupita. Evaluasi penggunaan antiemetik pada pengobatan kanker payudara di instalasi rawat inap RSUD. Dr. Moewardi surakarta tahun 210. *Skripsi* (2011)
- Dorland, W.A.Newman. *Kamus Kedokteran Dorland Ed.31*. Jakarta: EGC. 2014.
- Faisel, Citra Tri Wahyuni. “Gambaran Efek samping Kemoterapi Berbasis Antrasiklin Pada Pasien Kanker Payudara Di RSUD Dokter Soedarso Pontianak”. *Skripsi*. Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2012.
- Firmansyah, M.Adi. Cermin dunia kedokteran: *Penatalaksanaan Mual Muntah yang di Induksi Kemoterapi*, Jakarta: 2010
- Frederickson M, Hursti T, Furst Cj, et al. *Nausea in cancer chemotherapy is inversely related to urinary cortisol excretion*. Br j cancer (1992) : h. 80-779
- Gualiano, M.D.A.E., *Breast in Current Medical Diagnosis & Treatment 2002, 41th Edition*, Chapter XVI, 2002.
- Haris AL. *Cytotoxic-theraphy Induced Vomitting is Mediated via Enkephalin Pathways*. Lancet (1992) : h. 6-714
- Hesketh, PJ. *Chemotherapy induced nausea and vomitting*. N Engand J Medical, 2008
- International Agency for Research on cancer (IARC)/WHO. Globocan 2012: Estimated cancer incidence, mortality, and prevalence worldwide in 2012. *Diakses melalui http://globocan.iarc.fr/pages/fact_sheetspopulation.aspx pada tanggal 13 Maret 2017*
- Janicki, Piotr K. “Management of Acute and Delayed chemotherapy induced nausea and vomiting: role of netupitant palonosetron combination”. *Therapeutic and Clinical Risk Management*. No.3 (2016): h. 693-699

- Jayanti, esty. Evaluasi penggunaan kemoterapi pada pasien kanker paru di instalasi rawat inap RS X. *Skripsi*. Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Jemal A, Bray F,dkk. *Global cancer statistic*. *Ca Cancer J Clin* (2011) h: 69-90.
- Kartawiguna, Elna. “Faktor-faktor yang berperan pada karsinogenesis”. *Jurnal Kedokteran Trisakti* vol.20 No.1 (2001): h. 16-26
- Kumar V, dkk. *Robbins and cotran pathologic basis of disease* 9th ed. Philadelphia: Sauders Elsevier, 2016.
- Kemenkes RI. *Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di Indonesia 2007-2014*. Situasi penyakit kanker Vo.1 (2015) : h.2-3
- Kemenkes RI. *Stop Kanker*. Pusat data dan informasi kementerian kesehatan (2015):h.1-8
- Khotimah, kusnul.”Hubungan obesitas dengan kejadian kanker payudara di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: UMY. 2014
- Kresno, siti Boedina. *Ilmu Dasar Onkologi*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 2012
- Manuaba, TW. *Panduan Penatalaksanaan kanker Solid Peraboi*. Bandung: Sagung Seto, 2010.
- Makki, Jaafar. *Diversity of breast carcinoma: Histological ubtypes and clinical relevance*. *Clinical medicine insights pathology*, 2015. h: 23-31
- Mardiana, Lina. *Kanker pada wanita: Pencegahan dan pengobatan dengan tanaman obat*. Depok: Penebar swadaya, 2004.
- Martin, Susan dkk. *Standar perawatan pasien: Proses Keperawatan, Diagnosis, dan Evaluasi*. Jakarta: EGC, 1993.
- Maysaroh, hanik. *Kupas Tuntas Kanker pada perempuan dan Penyembuhannya*, 2008.
- Megantari, Irene. “Evaluasi pemilihan dan penggunaan antibiotika pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2005”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, 2007.
- Michaud,et al. *Pharmacotherapy a pathophysiologic Approach*, Mc Graw Hill : Newyork, 2008.
- Mutschler, Ernst. *Dinamika Obat farmakologi dan Toksikologi* Edisi 5. Bandung: Penerbit ITB, 1991.
- Muslim, Abu Husain, Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1992.


- Natale, James J. "Reviewing current and emerging antiemetics for chemotherapy-induced nausea and vomiting prophylaxis". *Hospital Practice* (2016): h. 226-234.
- National Comprehensive Cancer Network, *NCCN clinical practice guidelines in oncology antiemesis*, Version 1, 2012.
- Nursalam. Pengertian kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian (2013). Diakses melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.net> pada tanggal 14 Maret 2017
- Nasif, Hansen, dkk. *Efektivitas Antiemetik pada pasien yang menggunakan sitostatika pasca bedah pada berbagai jenis kanker di Rumah Sakit Umu Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi*. Jurnal sains dan teknologi farmasi Vol.16 No.2 (2011). h: 121-127
- Notoadmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Pitter, John. "Evaluasi Penatalaksanaan Mual-Muntah pada pasien kanker paru pascakemoterapi di Rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2004". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, 2006.
- Priyatin, Cici, dkk. Faktor Resiko yang berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara di RSUP DR. Kariadi Semarang. Vol.2 No.5 (2013). h: 9-19
- Popovic, Marko dkk. *Efficacy and savety of palonosetron for the prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials*. Berlin : Support Care Cancer, 2014.
- Rahmah, Diniyah Siti. *Evaluasi Penggunaan Obat Antimuntah pada Pasien Retinoblastoma Anak yang Menjalani Kemoterapi di Rumah Sakit kanker Dharmais*. Jakarta: FKIK UIN Syarif Hidayatullah. 2011
- Rahmawati, Z.N., Evaluasi penggunaan antiemetik dalam penatalaksanaan mual muntah karena kemoterapi pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2008. *Skripsi*. UMS : Surakarta, 2009.
- Ramli, Muchlis, *Update Breast cancer management diagnostic and treatment*. Jakarta: Department Ilmu Bedah FKUI, 2015.
- Rasjidi, Imam. *Epidemiologi Kanker pada Wanita*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2010a.
- Rasjidi, Imam. *Perawatan Paliatif Suportif & bebas nyeri pada kanker*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2010b.
- Rasjidi, Imam. *Kemoterapi Kanker Ginekologi Dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.

- Regina, Lorraine, B.C., Arthur, T.S., *Oncology Pocket Guide to Chemotherapy*. USA: Mosby Wolfe medical Communications, 1997.
- Richard, dkk. *Antiemetik Guideline 2016*. Eropa : Multinational Association of Supportive Care in cancer, 2016.
- Sabiston, *Buku Ajar bedah*. Jakarta: EGC. 1995
- Sastroasmoro, Sudigdo. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis Ed.IV*. Jakarta: Sagung Seto. 2011
- Saraswati, Putu, dkk. *Kanker payudara pada wanita usia tua di rumah sakit umum pusat (RSUP) Sanglah*. Sangah : Universitas Udayana, 2013. h. 1-9
- Setiowati, Ditya Ayu, dkk. *Hubungan antara pemakaian KB hormonal dengan kejadian kanker payudara di Poli Onkologi satu atap RSUD Dr. Soetomo Februari-April 2015*. Surabaya: FK Univ. Airlangga. 2015
- Seo, Bo Ri, dkk. *Obeity-Dependent changes in interstitial ECM Mechanics promote breast tumorigenesis*. Science translation Medicine, Vol. 7 Issue. 301, 2015
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan III. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shah, Rupen. *Pathogenesis, prevention, diagnosis and treatment of breast cancer*. World Journal of clinical oncology Vol.5 (2014) h: 283-298
- Simamora, Ns Raymond. *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2008.
- Sjamsuhidajat, R, dkk. *Buku Ajar Ilmu Bedah Edisi 3*. Jakarta: EGC, 2014.
- Sukardja, I Dewa Gede. *Onkologi klinik Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sukandar, Elin Yulina, dkk. *Iso Farmakoterapi*. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan, 2009.
- Surbakti, Elisabet. *Hubungan riwayat keturunan dengan terjadinya kanker payudara pada Ibu di RSUP H. Adam Malik Medan*. Medan: Poltekkes Kemenkes (2012) h: 15-21
- Suyatno, dkk. *Bedah Onkologi Diagnosis dan Terapi*. Jakarta: CV. Sagung Seto., 2014.
- Susanti, Lola. *Karakteristik Mual dan Muntah serta upaya penanggulangan oleh penderita kanker yang menjalani kemoterapi*. Sumatera Utara: USU, 2011.
- Swarjana, I Ketut. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: ANDI. 2012.

- Taniredja, Pof.Dr.Tukiran. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-obat Penting Edisi 7; Khasiat, Penggunaan dan Efek Sampingnya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Underwood JEC. *House Officer Series Hematology*. Jakarta: EGC, 2001.
- Utamingrum, Wahyu.dkk. Evaluasi Kepatuhan dan respon mual muntah penggunaan antiemetik pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo. *Tesis*. Yogyakarta: Ilmu Farmasi UGM, 2013.
- Wang, JJ, Ho ST, Liu YH. *Dexamethasone Decreases Epidural Morphine-related nausea and Vomitting*. *Anest Analg* 89 h. 20-117, 1999
- Widagdo, Prasetyo Ardhy. *Pengaruh aromaterapi lemon an relaksasi otot progresif terhadap penurunan intensitas mual muntah setelah kemoterapi pada pasien kanker payudara di Rumah sakit telogorejo semarang*. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan kebidanan* Vol.II No.I (2014) h 24-33
- Wilbur MB, Birrer MJ, Springgs DR. *Chemotherapy-induced nausea and vomiting*. *N Engl J Med* (2016) h. 177-179

Lampiran 1. Persetujuan Etik Penelitian


	<p>Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muslim Indonesia dan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI (KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar) <small>Jalan Urip Somoharjo Gedung Menara UMI lantai 3 Telp. & Fax. (0411) 428075 Makassar 90231</small></p>													
<p>REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK (<i>Expedited</i>) Nomor : 536/KEPK-UMI/VIII/2017</p>														
<p>Berdasarkan Pemeriksaan Protokol dan Dokumen yang berhubungan dengan Protokol Penelitian:</p>														
<p>Nama Peneliti : Nur Azizah</p>														
<p>Judul Penelitian : Evaluasi efektifitas antiemetic pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar</p>														
<p>No Register : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>U</td><td>M</td><td>I</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td> </tr> </table></p>			U	M	I	0	2	1	7	0	5	1	2	3
U	M	I	0	2	1	7	0	5	1	2	3			
<p>Telah di review secara (<i>Expedited</i>) oleh tim reviewer KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina dengan</p>														
<p>No Versi : 2</p>														
<p>No PSP : 2</p>														
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan reviewer, maka Pengurus KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina memberikan Persetujuan / Rekomendasi Etik untuk Pelaksanaan Penelitian tersebut di atas sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2018.</p>														
<p>Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti diminta untuk menjaga dan menghormati martabat manusia yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang baik dari penelitian ini.</p>														
<p>Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar. Jika ada perubahan protokol dan / atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).</p>														
<p>Makassar, 1 Agustus 2017</p>														
<p>Pengurus KEPK UMI – RS IBSI YW UMI</p>														
<p>Ketua</p>		<p>Sekretaris</p>												
														
<p><u>Dr. dr. Sri Vitayani, Sp.KK, FINSDV</u></p>		<p><u>Dr. Sitti Patimah, SKM, M.Kes</u></p>												

Lampiran 2. Skema Penelitian

Lampiran 3. Guideline terapi antiemetik berdasarkan *Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC/ESCO) 2016*

Resiko Emetik Agen Kemoterapi	Akut (<24 jam)	Delayed (>24 jam)	Antisipatory (sebelum kemoterapi)
Resiko tinggi (bukan AC)	Dosis tunggal 5HT3 (ond. 8 mg) + Dex (20 mg/12 mg) + NK1(Apr. 125 mg) *Palonosetron + netupitatan (digunakan kombinasi) Dex 20 mg tanpa NK1	Dex 8 mg (3-4h)/ Jika hari-1 menggunakan APR 125 mg, maka: -MCP (20 mgx4) + DEX (8 mgx2) digunakan pada 2-4 hari Atau APR (80 mgx1) + DEX (8 mgx1) selama 2-3 hari.	Dapat dilakukan dengan mengontrol mual muntahnya dengan terapi, relaksasi otot, hipnotis. Atau pemberian BENZODIAZEPINE
Resiko Tinggi AC (antrasiklin dan siklofosfami)	5HT3 (ond. 8 mg) + Dex (20 mg/12 mg) + NK1(Apr. 125 mg) Dex 20 mg diberikan tanpa NK1	Tidak diberikan. Atau Jika hari-1 diberikan APR 125 mg, maka hari 2-3 diberikan DEX (4 mgx2) atau APR (80 mgx1)	
Carboplatin	5HT3 (ond. 8 mg) + Dex (8 mg) + NK1(Apr. 125 mg)	Tidak diberikan Atau Jika hari 1 diberikan APR 125 mg, maka hari 2-3 diberi APR 80mgx1 Jika selain APR tidak disarankan	
Resiko Moderat	5HT3 (ond. 8 mg) + Dex (8 mg)	Tidak diberikan Jika pasien menerima terapi dari oxaliplatin, antrasiklin, dan siklofosfamide (moderate emesis) maka diberikan DEX 8 mg (2-3 hari)	
Resiko Rendah	5HT3 (ond. 8 mg)/ DEX (4-8 mg x1)/ DOP (Metoklopramide 20 mgx4 atau 1-2 mg/kgBB)	Tidak diberikan	

Resiko Minimal	Tidak Ada	Tidak diberikan	
Berisiko Muntah	-	Olanzapine 10 mg (3 hari)	
Cisplatin	5HT3 (ond. 8 mg)/ DEX (4-8 mg x1)	DEX 8 mgx1 (3-4 hari)	
Dosis Tinggi	5HT3 (ond. 8 mg) + Dex (12 mg) + NK1(Apr. 125 mg)	APR (80x1) selama 2-4 hari.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 4. Rekomendasi Dosis Antiemetik berdasarkan *Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC/ESMO) 2016*

a. Golongan Antagonis reseptor serotonin (5HT₃)

Obat Antiemetik	Rute	Dosis
Ondasetron	IV	8 mg atau 0,15 mg/kg
	Oral	16 mg
Granisetron	IV	1 mg atau 0,01 mg/kg
	Oral	2 mg atau 1 mg
Dolasetron	Oral	100 mg
Tropisetron	IV	5 mg
	Oral	5 mg
Palonosetron	IV	0,25 mg
	Oral	0,5 mg

b. Golongan Kortikosteroid (Dexametason)

Dexametasone		Dosis dan aturan
Resiko tinggi	Emesis akut	20 mg x 1 *12 mg jika diberikan dengan aprepitant atau netupitant
	Emesis tertunda	8 mg (selama 3-4 hari) * 8 mg dalam 1 hari jika diberikan dengan aprepitant dan netupitant
Resiko moderat	Emesis akut	8 mg x 1
	Emesis tertunda	8 mg x 1 (selama 2-3 hari) *banyak penelitian menggunakan 4 mg
Resiko rendah	Emesis akut	4-8 mg x 1

c. Golongan antagonis reseptor NK1

Obat	Dosis dan Aturan	
Aprepitant	Emesis akut	125 mg dalam sehari
	Emesis tertunda	80 mg x 1 diberikan selama 2 hari.
Fosaprepitant	Emesis akut	150 mg (IV) dalam sehari
	Emesis tertunda	Tidak diberikan
Rolapitant	Emesis Akut	180 mg (p.o)
Netupitant	Emesis akut	300 mg netupitant atau 0,5 mg palonosetron (p.o) dalam sehari

Lampiran 5. Analisis Univariant Data Karakteristik Pasien

IMT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Kurus	3	2,7	2,7	2,7
Kurus	8	7,2	7,2	9,9
Normal	60	54,1	54,1	64,0
Gemuk	34	30,6	30,6	94,6
Obesitas Tk. 1	3	2,7	2,7	97,3
Obesitas Tk. 2	1	,9	,9	98,2
Obesitas Tk. 3	2	1,8	1,8	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	1	,9	,9	,9
P	110	99,1	99,1	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid WIRASWASTA	17	15,3	15,3	15,3
PETANI	1	,9	,9	16,2
IRT	66	59,5	59,5	75,7
PNS	27	24,3	24,3	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Patologi Anatomi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IDC Low Grade Malignancy	18	16,2	16,2	16,2
IDC Moderate grade malignancy	49	44,1	44,1	60,4
IDC high grade malignancy	23	20,7	20,7	81,1
Locally advanced breast cancer sinistra	3	2,7	2,7	83,8
adenocarcinoma mammae bilateral	3	2,7	2,7	86,5
adenocarcinoma musinosum mamma	2	1,8	1,8	88,3
invasive medullary carcinoma mammae	1	,9	,9	89,2
paget disease of breast	2	1,8	1,8	91,0
fibrosing adenosis mammae	2	1,8	1,8	92,8

adenocarcinoma mammae sinistra	2	1,8	1,8	94,6
tubuler carcinoma low grade malignancy, fibroadenoma	1	,9	,9	95,5
adenocarcinoma mammae dextra	1	,9	,9	96,4
invasive lobular ca. mammae	2	1,8	1,8	98,2
invasive breast carcinoma of no special thype	1	,9	,9	99,1
infiltrating ductal carcinoma	1	,9	,9	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Stadium

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IIA	1	,9	,9	,9
IIB	11	9,9	9,9	10,8
IIIA	17	15,3	15,3	26,1
IIIB	45	40,5	40,5	66,7
IIIC	11	9,9	9,9	76,6
IV	26	23,4	23,4	100,0
Total	111	100,0	100,0	

LOKASI BENJOLAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SINISTRA	57	51,4	51,4	51,4
DEXTRA	46	41,4	41,4	92,8
BILATERAL	8	7,2	7,2	100,0
Total	111	100,0	100,0	

USIA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	6	5,4	5,4	5,4
2,00	35	31,5	31,5	36,9
3,00	49	44,1	44,1	81,1
4,00	21	18,9	18,9	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Riwayat Kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah hamil	24	21,6	21,6	21,6
usia <35 tahun	72	64,9	64,9	86,5
usia >35 tahun	15	13,5	13,5	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Riwayat Lama Kontrasepsi Hormonal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KB < 5 tahun	8	7,2	7,2	7,2
KB > 5 tahun	72	64,9	64,9	72,1
tidak pernah	31	27,9	27,9	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Riwayat_usia_Menarce

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10,00	2	1,8	1,8	1,8
11,00	9	8,1	8,1	9,9
12,00	30	27,0	27,0	36,9
13,00	23	20,7	20,7	57,7
14,00	18	16,2	16,2	73,9
15,00	25	22,5	22,5	96,4
16,00	3	2,7	2,7	99,1
18,00	1	,9	,9	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Riwayat_Keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ada	36	32,4	32,4	32,4
tidak ada	73	65,8	65,8	98,2
tidak diketahui	2	1,8	1,8	100,0
Total	111	100,0	100,0	

Jenis_Kemoterapi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid adjuvant	238	53,2	53,2	53,2
Neoadjuvant	173	38,7	38,7	91,9
paliatif	36	8,1	8,1	100,0
Total	447	100,0	100,0	

Lampiran 6. Analisis Bivariant chi-square

Statistics

		JK	Usia	Terapi	Dexa	Ondan	Emesis	Kat_Siklus
N	Valid	447	447	447	447	447	447	447
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	6	1,3	1,3	1,3
	Perempuan	441	98,7	98,7	100,0
	Total	447	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	24	5,4	5,4	5,4
	2,00	135	30,2	30,2	35,6
	3,00	203	45,4	45,4	81,0
	4,00	85	19,0	19,0	100,0
	Total	447	100,0	100,0	

Terapi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	393	87,9	87,9	87,9
	Tidak sesuai	54	12,1	12,1	100,0
	Total	447	100,0	100,0	

Dosis_Ondansetron

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sesuai	447	100,0	100,0	100,0

Dosis_Dexametason

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	132	29,5	29,5	29,5
	Tidak sesuai	315	70,5	70,5	100,0
	Total	447	100,0	100,0	

Emesis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	27	6,0	6,0	6,0
	Tidak ada	420	94,0	94,0	100,0
	Total	447	100,0	100,0	

M A K A S S A R

Kat_Siklus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 6 siklus	406	90,8	90,8	90,8
>= 6 siklus	41	9,2	9,2	100,0
Total	447	100,0	100,0	

CROSSTABS

/TABLES=JK Usia Terapi Dexa Ondan Kat_Siklus BY Emesis
 /FORMAT=AVALUE TABLES
 /STATISTICS=CHISQ PHI
 /CELLS=COUNT ROW
 /COUNT ROUND CELL.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
JK * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%
Usia * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%
Terapi * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%
Dexa * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%
Ondan * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%
Kat_Siklus * Emesis	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%

JK * Emesis

Crosstab

			Emesis		Total
			Ada	Tidak ada	
JK	Laki-laki	Count	0	6	6
		% within JK	0,0%	100,0%	100,0%
	Perempuan	Count	27	414	441
		% within JK	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	27	420	447
		% within JK	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,391 ^a	1	,532		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,753	1	,386		
Fisher's Exact Test				1,000	,687
Linear-by-Linear Association	,390	1	,532		

N of Valid Cases	447			
------------------	-----	--	--	--

- a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,030	,532
	Cramer's V	,030	,532
N of Valid Cases		447	

Usia * Emesis

Crosstab

			Emesis		Total
			Ada	Tidak ada	
Usia	26-35	Count	2	22	24
		% within Usia	8,3%	91,7%	100,0%
	26-45	Count	6	129	135
		% within Usia	4,4%	95,6%	100,0%
	46-55	Count	19	184	203
		% within Usia	9,4%	90,6%	100,0%
	56-65	Count	0	85	85
		% within Usia	0,0%	100,0%	100,0%
Total		Count	27	420	447
		% within Usia	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,233 ^a	3	,017
Likelihood Ratio	14,862	3	,002
Linear-by-Linear Association	,994	1	,319
N of Valid Cases	447		

- a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,45.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,151	,017
	Cramer's V	,151	,017
N of Valid Cases		447	

Terapi * Emesis

Crosstab

			Emesis		Total
			Ada	Tidak ada	
Terapi	Sesuai	Count	19	374	393
		% within Terapi	4,8%	95,2%	100,0%

Tidak sesuai	Count	8	46	54
	% within Terapi	14,8%	85,2%	100,0%
Total	Count	27	420	447
	% within Terapi	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,332 ^a	1	,004		
Continuity Correction ^b	6,666	1	,010		
Likelihood Ratio	6,412	1	,011		
Fisher's Exact Test				,010	,010
Linear-by-Linear Association	8,314	1	,004		
N of Valid Cases	447				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,26.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-,137	,004
	Cramer's V	,137	,004
N of Valid Cases		447	

Kejadian Emesis*Dosis Ondansetron

Crosstab

Count		Dosis_Ondansetron		Total
		sesuai	tidak sesuai	
Kejadian_Emesis	Ada	25	2	27
	Tidak ada	380	40	420
Total		405	42	447

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,133 ^a	1	,715		
Continuity Correction ^b	,001	1	,980		
Likelihood Ratio	,142	1	,706		
Fisher's Exact Test				1,000	,524
Linear-by-Linear Association	,133	1	,715		
N of Valid Cases	447				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,54.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian emesis*Dosis Dexametason

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kejadian emesis * Dosis_Dexametason	447	100,0%	0	0,0%	447	100,0%

Kejadian emesis * Dosis_Dexametason Crosstabulation

Count

		Dosis_Dexametason		Total
		Sesuai	Tidak sesuai	
Kejadian emesis	ADA	12	15	27
	TIDAK ADA	120	300	420
Total		132	315	447

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,072 ^a	1	,080		
Continuity Correction ^b	2,356	1	,125		
Likelihood Ratio	2,865	1	,091		
Fisher's Exact Test				.085	,066
Linear-by-Linear Association	3,065	1	,080		
N of Valid Cases	447				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,97.

b. Computed only for a 2x2 table

Kat_Siklus * Emesis

Crosstab

			Emesis		Total
			Ada	Tidak ada	
Kat_Siklus	< 6 siklus	Count	18	388	406
		% within Kat_Siklus	4,4%	95,6%	100,0%
	>= 6 siklus	Count	9	32	41
		% within Kat_Siklus	22,0%	78,0%	100,0%
Total		Count	27	420	447
		% within Kat_Siklus	6,0%	94,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	20,135 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	17,167	1	,000		
Likelihood Ratio	13,377	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	20,090	1	,000		
N of Valid Cases	447				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,48.

b. Computed only for a 2x2 table



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 7. Analisis Multivariant Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	447	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	447	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		447	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
ADA	0
TIDAK ADA	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding		
			(1)	(2)	(3)
Usia	26-35 tahun	24	1,000	,000	,000
	36-45 tahun	135	,000	1,000	,000
	46-55 tahun	203	,000	,000	1,000
	56-65 tahun	85	,000	,000	,000
Kat_Siklus	< 6 siklus	406	1,000		
	>= 6 siklus	41	,000		
Terapi	Sesuai	393	1,000		
	Tidak sesuai	54	,000		

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

		Predicted		
		Kejadian emesis		Percentage Correct
Observed		ADA	TIDAK ADA	
Step 0	Kejadian ADA	0	27	,0
	Emesis TIDAK ADA	0	420	100,0
Overall Percentage				94,0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	2,744	,199	191,076	1	,000	15,556

Variables not in the Equation

		Score	Df	Sig.
Step 0	Variables Usia	10,233	3	,017

Usia(1)	,235	1	,628
Usia(2)	,868	1	,352
Usia(3)	7,220	1	,007
Terapi(1)	8,332	1	,004
Kat_Siklus(1)	20,135	1	,000
Overall Statistics	33,870	5	,000

Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio)

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	30,383	5	,000
Block	30,383	5	,000
Model	30,383	5	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	173,516 ^a	,066	,179

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	1,919	4	,751

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Kejadian emesis= ADA		Kejadian emesis = TIDAK ADA		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	9	11,201	40	37,799	49
	2	2	1,324	12	12,676	14
	3	10	9,750	155	155,250	165
	4	6	4,381	116	117,619	122
	5	0	,345	32	31,655	32
	6	0	,000	65	65,000	65

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		Kejadian emesis		Percentage Correct
		ADA	TIDAK ADA	
Step 1	Kejadian emesis ADA	0	27	,0
	TIDAK ADA	0	420	100,0
	Overall Percentage			94,0

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a								
Usia			1,716	3	,633			
Usia(1)	-18,141	4246,084	,000	1	,997	,000	,000	.
Usia(2)	-18,370	4246,084	,000	1	,997	,000	,000	.
Usia(3)	-18,892	4246,084	,000	1	,996	,000	,000	.
Terapi(1)	1,123	,525	4,574	1	,032	3,074	1,098	8,600
Kat_Siklus(1)	1,460	,485	9,047	1	,003	4,306	1,663	11,148
Constant	19,077	4246,084	,000	1	,996	19286026 1,054		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Terapi, Kat_Siklus.

Model if Term Removed

Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
Step 1 Usia	-93,523	13,530	3	,004
Terapi	-88,839	4,162	1	,041
Kat_Siklus	-90,744	7,972	1	,005

Lampiran 8. Kuisiener Penelitian

LEMBAR PENGUMPUL DATA

A. Data Pasien

No. RM :	Diagnosa :	Tgl MRS/KRS :	Riwayat Pengobatan:	Komplikasi:
Nama/Jenis Kelamin :	Alasan MRS :	Keterangan KRS :		Komorbid :
Alamat :	Stadium :	Nama Dokter :		
Umur/BB/TB/IMT:	Siklus :	Status Px:		
Riwayat Alergi :	Rujukan dari :			
	RPD :			

No.	Faktor Resiko	Keterangan
1.	Riwayat Keluarga	
2.	Riwayat Kehamilan	
3.	Riwayat Kontrasepsi	
4.	Riwayat Menarce	

B. Data Pengobatan

No.	Nama Obat	Dosis Regimen	Lama Pemberian	Tanggal dan siklus										

C. Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Pemeriksaan	Tanggal	Kesan/Kesimpulan

B. LEMBAR EVALUASI

No.	Nama Obat	Efek Setelah Pemberian	Dialami pada siklus ke-													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ondansetron	1. Mual 2. Muntah 3. Mual dan Muntah 4. Tidak Mual dan Muntah														
2	Dexametasone	1. Mual 2. Muntah 3. Mual dan Muntah 4. Tidak Mual dan Muntah														
3	Diphenhidramin	1. Mual 2. Muntah 3. Mual dan Muntah 4. Tidak Mual dan Muntah														
4	Ranitidin	1. Mual 2. Muntah 3. Mual dan Muntah 4. Tidak Mual dan Muntah														

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp. (0411) 584675 – 581818, Fax. (0411) 587676		
Nomor	: <i>4622-01/P.2.1 / 4622 / 2017</i>	06 April 2017
Hal	: <u>Persetujuan Ijin Penelitian</u>	
Yang Terhormat.		
Ka. Inst. Rekam Medik Ka. Inst. Rawat Jalan Ka. Poliklinik B. Onkologi Di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		
Dengan ini kami hadapkan peneliti :		
Nama	: Nur Azizah	
NIM	: 70100113035	
Prog. Studi	: Farmasi Klinik	
Institusi	: Fak. Ked. Dan Ilmu Kes. UIN Alauddin	
Strata	: S1	
Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Efektivitas Penggunaan Anti Emetik pada Pasien Kanker Payudara Pasca Kemoterapi di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar” sesuai dengan permohonan penelitian dari Dekan FKIK UIN Alauddin, dengan nomor B922/FKIK/PP.00.9/03/2017 tertanggal 08 Maret 2017 . Selama Bulan April 2017 s.d Sampel Mencukupi . Dengan catatan selama penelitian berlangsung tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien. Demikian Surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.		
		An. Direktur SDM dan Pendidikan Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian
		
Cat : Identitas pasien harus dirahasiakan dan tdk diperbolehkan mengambil gambar pasien		dr. Muh. Iham Hamzah, DESS NIP. 19700820 200003 1 007
<u>KETERANGAN SELESAI MENGUMPULKAN DATA PENELITIAN</u>		
Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :		
Nama	: Nur Azizah	
NIM	: 70100113035	
Prog. Studi	: Farmasi Klinik FKIK UIN Alauddin	
BENAR telah melakukan penelitian pada bulan April 2017 s.d Sampel Mencukupi dengan tanpa mengganggu proses pelayanan. Demikian keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.		
		Makassar, 16 Juni 2017 An. KA. REKAM MEDIS  REKAM MEDIS.

Lampiran 10. Surat Selesai Meneliti

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245 Telp. (0411) 584675 – 581818 (<i>Hunting</i>), Fax. (0411) 587676 Laman : www.rsupwahidin.com Surat Elektronik : tu@rsupwahidin.com	
<u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> Nomor : LB.02.01/2.2/13978 /2017		
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur SDM dan Pendidikan RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menerangkan bahwa :</p>		
Nama	: Nur Azizah	
NIM	: 70100113035	
Prog. Studi	: Farmasi Klinik	
Institusi	: Fak. Ked. Dan Ilmu Kes. UIN Alauddin	
Strata	: S1	
<p>Benar Telah melakukan penelitian di Inst. Rekam Medik dan Poliklinik Bedah Onkologi dengan judul penelitian "Evaluasi Efektivitas Penggunaan Anti Emetik pada Pasien Kanker Payudara Pasca Kemoterapi di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar".</p>		
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>06 Juli 2017</p> <p>a. Direktur Utama</p> <p>Direktur SDM dan Pendidikan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Jintan</i></p> <p>Drs. Jintan Ginting, Apt, M.Kes NIP 196312031996031001</p> </div> </div>		
		

RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah Junaid dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 21 Desember 1995, merupakan anak ke enam dari 7 bersaudara. Anak dari pasangan suami istri Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag dan Hj. Hamnaku.

Pendidikan formal yang telah dilalui penulis dimulai dari SD INP Tello Baru ½ Makassar pada tahun 2001-2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar tahun 2007-2010 dan setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di MAN 2 Model Makassar pada tahun 2010-2013. Lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang beri julukan “Kampus Peradaban” tahun 2013-selesainya skripsi ini dengan mengambil Jurusan farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menempuh pendidikan di kampus peradaban, penulis aktif dalam berbagai organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi, Dewan mahasiswa FKIK, dan Study Club (SC) Al-‘Aafiyah. Motto Hidup penulis “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” ☺ ☺



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R