

**PEMBUATAN SERAT MAKANAN DARI LIMBAH KULIT PISANG  
(*Musa paradisiaca* Var. Raja) DENGAN MENGGUNAKAN  
BERBAGAI VARIASI KONSENTRASI ASAM ASETAT**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S. Farm)  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Andi Arnisa

NIM: 70100113045

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

**PEMBUATAN SERAT MAKANAN DARI LIMBAH KULIT PISANG  
(*Musa paradisiaca* Var. Raja) DENGAN MENGGUNAKAN  
BERBAGAI VARIASI KONSENTRASI ASAM ASETAT**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S. Farm)  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Andi Arnisa  
NIM: 70100113045

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arnisa  
NIM : 70100113045  
Tempat/Tgl. Lahir : Darubiah, 10 Oktober 1995  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Tun Abdul Razak Perum. Puri Diva Istanbul  
Judul : Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Pisang Raja (*Musa Paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Agustus 2017

Penulis,

**Andi Arnisa**  
**70100113045**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Asetat**" yang disusun oleh Andi Arnisa, NIM: 70100113045, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, **16 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **23 Dzulqa'idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 16 Agustus 2017 M**

**23 Dzulqa'idah 1438 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. (.....)

Sekretaris : Haeria, S. Si., M. Si. (.....)

Pembimbing I : Isriany Ismail, S. Si., M. Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : M. Rusdi, S. Si., M. Si., Apt. (.....)

Penguji I : Haeria, S. Si., M. Si. (.....)

Penguji II : Dr. Darsul S Puyu, M. Ag. (.....)



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
**NIP. 19530203 198312 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Pisang Raja (*Musa Paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Asetat” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Akhyar dan Ibunda Hj. Andi Hasriana dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, serta Saudaraku Andi Anna Rinayah, S.Kom yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2. Bapak Prof. Dr. Mardan. M.Ag., Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Bapak Prof. H. Lomba Sultan, M.A, Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D, Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, Selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
6. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II (bidang keuangan) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
11. Ibu Isriany Ismail, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Bapak M.Rusdi, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,


12. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
13. Bapak Dr. Darsul S. Puyu., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
14. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
15. Teman-teman posko KKN-R Desa Manjapai (Inna, Ayu, Cia, Arman), terima kasih dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman (Cia, Arwan, Ningsih, Niar, Faris, Ule, Succa, Khey, Kiky, Ancu, Azizah, Rifqa, Amel, Caca, Fira) terima kasih dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
17. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, Kalian Luar Biasa.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, 16 Agustus 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10-47</b>
A. Uraian Tumbuhan Pisang Raja.....	10
B. Serat Makanan.....	15
C. Pembuatan Serat Dari Limbah Kulit Buah .....	38
D. Ekstraksi .....	40
E. Tinjauan Islam Terhadap Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Sebagai Serat Makanan .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48-51</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	48

B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52-57</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
C. Kesimpulan .....	58
D. Saran.....	58
<b>KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>59-61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>62-69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Komposisi Kimia Daging Buah Pisang Raja .....	12
2. Perbedaan Serat Larut dan Serat Tidak Larut .....	30
3. Komponen Serat Pangan Dalam Berbagai Bahan Pangan .....	31
4. Hasil Persen Rendamen Ekstrak Kulit Pisang .....	52
5. Hasil Persen Penentuan kadar Air Ekstrak Kulit Pisang .....	52
6. Hasil Persen Penentuan Kadar Abu Ekstrak Kulit Pisang .....	53
7. Hasil Persen Kadar Serat Kasar Ekstrak Kulit Pisang .....	53
8. Hasil Persen Penentuan Daya Serap Air Ekstraksi Kulit Pisang .....	53


## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Buah Pisang Raja .....	10
2. Kulit Pisang Raja .....	67
3. Hasil Serat Makanan .....	67
4. Hasil Pengamatan Penetapan Kadar Abu.....	68
5. Hasil Pengamatan Penetapan Kadar Air .....	68
6. Hasil Pengamatan Daya Serap Air.....	69
7. Hasil Pengamatan Penentuan Serat Kasar.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Pembuatan Serat Makanan .....	62-63
2. Perhitungan .....	64-66
3. Gambar Hasil Penelitian .....	67-69



## ABSTRAK

**Nama : Andi Arnisa**

**Nim : 70100113045**

**Jurusan : Farmasi**

**Judul Skripsi : Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Va. Raja) Dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Asetat**

---

Telah dilakukan penelitian tentang Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Pisang Dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Asetat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui limbah kulit pisang (*Musa paadisiaca* Var. Raja) dijadikan sebagai serat makanan dan untuk mengetahui dikonsentrasi berapakah serat makanan dari limbah kulit pisang yang paling berkualitas. Dengan menggunakan parameter yang dianalisis, yaitu rendamen, kadar air, kadar abu, kadar serat kasar dan daya serap air.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi asam asetat 0,8 % merupakan konsentrasi yang paling efektif dalam pembuatan serat makanan dari limbah kulit pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja).

**Kata kunci: Serat Makanan, Asam Asetat, *Musa paradisiaca* Var. Raja.**

## ABSTRACK

**Name** : Andi Arnisa  
**Registration Number** : 70100113045  
**Departement** : Pharmacy  
**The Title of Thesis** : Making Of The Food Fiber From Waste Banana Skin (*Musa paradisiaca* Var. Raja) With Using Variation Acetic Acid Concentration

---

The research has been done about making of the food fiber from waste banana skin (*Musa paradisiaca* Var. Raja) with using variation of acetic acid concentration, crude fiber concentration. The aim of this research was to determine how concentration of acetic acid can produced the best food fiber. Which the parameters analyzed was rendamen, water concentration, ash concentration and water absorption.

The results of this research shown that concentration of acetic acid 0,8% was the most qualified concentration in the manufacture of dietary fiber from waste banana skin (*Musa paradisiaca* Var. Raja) .

**Keyword:** Dietary fiber, Acetic acid, (*Musa paradisiaca* Var. Raja).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pada dekade terakhir ini telah terungkap oleh para ilmuwan bahwa serat yang terdapat pada bahan pangan ternyata mempunyai efek positif bagi sistem metabolisme manusia. Awalnya serat dikenal oleh ahli gizi hanya sebagai pencahar dan tidak memberi reaksi apapun bagi tubuh. Pandangan akan serat mulai berubah, setelah dilaporkan bahwa konsumsi rendah serat menyebabkan banyak kasus penyakit kronis seperti jantung koroner, apendikitis, divertikulosis dan kanker kolon, serat yang memiliki efek fisiologis tersebut kemudian disebut sebagai serat pangan atau *dietary fiber*.

Serat makanan (*dietary fiber*) didefinisikan sebagai bagian dari komponen bahan pangan nabati yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia. Definisi ini diperluas lagi sehingga seluruh polisakarida dan lignin yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia termasuk ke dalam serat makanan. Didasarkan atas fungsinya didalam tanaman, serat makanan dibagi menjadi tiga fraksi utama, yaitu :

1. Polisakarida struktural, terdapat dalam dinding sel dan terdiri dari selulosa dan polisakarida non-selulosa (hemiselulosa dan substansi pektat).
2. Non-polisakarida struktural, sebagian besar terdiri dari lignin.
3. Polisakarida non-struktural, termasuk gum dan mucilage serta polisakarida lainnya seperti karagenan dan agar dari alga dan rumput laut.

(Apriyantono, et al., 1989)

Klasifikasi serat makanan, yaitu serat yang tidak larut seperti lignin, selulosa dan hemiselulosa baik untuk kesehatan usus, memperlancar keluarnya feses, mencegah wasir, dan baik untuk mengontrol berat badan sedangkan serat yang larut air seperti pektin dan gum baik untuk menurunkan kolesterol (Clara, 2006).

Dibandingkan dengan protein, lemak dan karbohidrat selama ini pembahasan mengenai serat makanan seringkali terabaikan. Serat termasuk bagian dari makanan yang tidak mudah diserap dan sumbangan gizinya dapat diabaikan, namun sebenarnya mempunyai fungsi penting yang tidak tergantikan oleh zat lainnya (Clara, 2006).

Pada awalnya serat dipandang sebagai indeks dalam menilai kualitas makanan, makin tinggi kandungan serat dalam makanan maka nilai gizi makanan tersebut dipandang semakin buruk. Akan tetapi pada dasawarsa terakhir ini, para ahli sepakat bahwa serat merupakan komponen penyusun diet manusia yang sangat penting (Hutagalung, 2004).

Agar jumlah serat yang dikonsumsi tidak kurang, juga tidak berlebihan, dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi secara bervariasi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran dan buah-buahan. Konsumsi serat 30-45 gr perhari cukup untuk menjaga kebugaran tubuh (Hazal, 2016).

Serat pangan larut diantaranya pektin, gum dan mucilago tidak termasuk serta kasar. Umumnya mereka berperan utama dalam menurunkan kolesterol darah dan konstipasi (sulit buang air besar) (Prangdimurti, 2007:

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi dinding sel tanaman penghasilnya. Pada dasarnya komponen-komponen dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, mucilago yang kesemuanya termasuk dalam serat pangan. Serat pangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: Serat pangan larut (soluble dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah pektin dan gum yang merupakan bagian dalam dari sel pangan nabati. Serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur, dan serat tidak larut (insoluble dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. Di Indonesia itu sendiri terdapat buah-buahan yang mengandung banyak serat, diantaranya buah naga, jeruk, jambu, manggis, apel, berbagai jenis pisang, pepaya dan belimbing (Santoso, 2011).

Buah pisang mengandung pektin dalam konsentrasi tinggi. Kandungan pektin pada kulit pisang raja berkisar antara 0,9% dari berat kering (Farida, 2012).

Pisang raja merupakan tumbuhan dengan bentuk hidup termasuk dalam famili Musaceae. Spesies pisang ini, pada umumnya, ditemukan di daerah tropis. Selain daging buahnya, komponen lain seperti kulitnya dapat dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kulit pisang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi (Ahwange, 2009).

Tanaman pisang (*Musa paradisiaca*) merupakan tanaman penghasil buah yang banyak terdapat di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Departemen Pertanian (2008), produksi pisang di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 5,03 juta ton dan volume ekspor mencapai 1,50 juta ton. Oleh karena itu pisang ditetapkan sebagai komoditas buah unggulan nasional. Salah satu bagian dari

tanaman pisang yang dapat dimanfaatkan adalah kulit pisang. Walaupun sebagai limbah buangan, kulit pisang masih mempunyai gizi yang cukup lengkap diantaranya memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan beberapa mineral yang diperlukan tubuh (Anhwange, dkk., 2009).

Kulit pisang raja dipilih karena umumnya sering digunakan dalam industri, aroma harum dan rasanya lebih manis dibandingkan dengan jenis pisang lainnya. Selain itu, kulit pisang raja masih mempunyai kandungan energi yang tinggi, vitamin dan beberapa mineral yang sangat diperlukan tubuh. Berdasarkan penelitian Ahwange, dkk, (2009), kulit pisang raja mengandung karbohidrat yang tinggi yakni 59,00 % protein 0,90% dan lemak 1,70%. Dengan kandungan gizi yang cukup tinggi dimungkinkan diolah menjadi bahan baku pembuatan makanan yang disubtitusikan pada tepung terigu sehingga dapat mengurangi jumlah pemakaiannya. Kandungan gizi yang cukup lengkap ini dapat dijadikan alternatif pemenuhan konsumsi pangan bagi masyarakat utamanya di tingkat rumah tangga, selain kaya akan gizi, murah dan bahannya pun mudah didapatkan (Ahwange, 2009).

Dari segi agama Islam telah memberikan kepedulian terhadap kesehatan umat manusia, sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, dalam hal ini, Islam sebenarnya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syuara (26) ayat 7 :

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

*Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.* (Departemen Agama RI. 2009)

Dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* (Shihab, 2002), dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah SWT. Dimana mereka (orang kafir) tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna, masing-masing mempunyai kekhususan sendiri baik daun, bunga dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah yang sejenis dan dialiri dengan air yang sama, tetapi menghasilkan buah-buahan yang berlainan bentuk, warna dan rasanya. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Pencipta-Nya (Departemen Agama RI. 2009). Sehingga kita sebagai manusia telah diberi akal untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tersebut khususnya ilmu yang membahas tentang pengobatan yang berasal dari tanaman seperti tanaman buah pisang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian pembuatan serat makanan dari limbah kulit pisang (*Musa paradisiaca* Var.raja) dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi asam asetat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kulit pisang (*Musa Paradisiaca* Var. Raja) dapat dibuat serat makanan?
2. Konsentrasi manakah yang dapat menghasilkan serat makanan yang berkualitas?
3. Bagaimana tinjauan islam terhadap pemanfaatan kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) sebagai serat makanan?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup**

#### 1. Definisi Operasional

##### a. Serat

Merupakan bagian bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus dengan fermentasi lengkap atau partial pada usus besar.

##### b. Serat makanan

Merupakan karbohidrat polimer dengan derajat polimerisasi tidak kurang dari 3, yang tidak dicerna atau diserap diusus halus.

##### c. Asam asetat

Merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan.

#### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menentukan serat makanan menggunakan variasi konsentrasi asam asetat yang hasilnya terbaik.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sapta Raharja, et al. tentang "*Ekstraksi Dan Analisa Dietary Fiber Dari Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia)*" Cara pembuatan dietary fiber menggunakan hidrolisis asam dan hidrolisis basa dengan konsentrasi masing-masing 0,1%, 0,25%, 0,5% dan 1% dengan menggunakan pelarut H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> untuk hidrolisis asam dan NaOH untuk hidrolisis basa. Hasil yang didapatkan untuk serat makanan larut pada serat mengkudu yaitu hasil hidrolisis asam lebih tinggi dari hasil hidrolisis basa.

Hasil analisa keragaman menunjukkan faktor jenis pelarut memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai serat makanan larut. Faktor konsentrasi pelarut yang tersarang pada jenis pelarut tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai serat makanan larut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meng-mei Ma dan Tai-hua Mu tentang *“Effects of extraction methods and particle size distribution on the structural, physicochemical, and functional properties of dietary fiber from deoiled cumin”*. Cara ekstraksi serat pangan menggunakan Metode Alkali Dietary Fiber Ekstraksi (ADFE) yaitu menggunakan 1.5 L NaOH 0.5 M dan diaduk pada kecepatan 150 rpm selama 2 jam pada suhu 50°C. Di netralisasi dengan HCl 0.5 M dan disentrifugasi pada 7000 rpm selama 15 menit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferawalden Sinaga tentang *“Studi Pembuatan Serat Makanan Dari Tongkol Jagung”*. Cara pembuatan serat yaitu serbuk tongkol jagung yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam asetat, asam klorida dan asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 0,2%, 0,4%, 0,6% 0,8% dan 1% selama 12 jam. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir sampai tidak berbau asam. Setelah itu masing-masing residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit, lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 6 jam, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran mesh 80. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis %

Rendamen, % kadar abu, % kadar air, % kadar serat kasar, % daya serap air dan uji organoleptik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pakaya, Rini et al dengan judul penelitian "*Pengaruh Penambahan Jantung Pisang Goroho (Musa Sp.) Terhadap Kandungan Gizi Dan Organoleptik Abon Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis)*" menggunakan uji organoleptik, kadar protein, kadar lemak, kadar air dan kadar abu sebagai parameter yang akan diamati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saragih, Bernatal dengan judul. "*Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang Dari Berbagai Varietas Dan Umur Panen Yang Berbeda*" menggunakan kadar air (%), kadar abu (%), rendemen (%), daya kembang tepung dan daya serap air (%) sebagai parameter yang akan diamati.

Ahriansyah dalam jurnal "*Pembuatan Serat Makanan Dari Limbah Kulit Kentang (Solanum tuberosum)*". Cara pembuatan serat yaitu serbuk tongkol jagung yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam asetat, asam klorida dan asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 0,2%, 0,4%, 0,6% 0,8% selama 12 jam. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir sampai tidak berbau asam. Setelah itu masing-masing residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit, lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 6 jam. Hasil yang diperoleh kemudian

dianalisis % Rendamen, % kadar abu, % kadar air, % kadar serat kasar, % daya serap air dan uji organoleptik.

Belum ada penelitian sebelumnya tentang Pembuatan serat makanan dari limbah kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* Var .Raja) dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi asam asetat.

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah limbah kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dapat dijadikan serat makanan.
- b. Untuk mengetahui dikonsentrasi berapakah serat makanan dari limbahkulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) yang dihasilkan paling berkualitas.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap pemanfaatan limbah kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) sebagai tanaman obat.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi ilmiah, pengetahuan serta gambar kepada penulis dan masyarakat tentang pembuatan serat makanan dari limbah kulit pisang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tumbuhan Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. *Raja*)

##### 1. Klasifikasi

Klasifikasi Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. *Raja*) menurut Tjitrosoepomo (2001) sebagai berikut:

Kingdom : Plantae  
Phyllum : Spermatophyta  
Kelas : Monocotyledonae  
Ordo : Zingiberales  
Famili : Musaceae  
Genus : *Musa*  
Species : *Musa paradisiaca* Var. *Raja*



Gambar 1. Buah Pisang Raja

##### 2. Nama Daerah

Sumatera : Galuh, puntik, punti, awal pisag  
Nusa tenggara : Bui, pisang, mutu, uki  
Maluku : Uki, kula, uru  
Jawa : Cau, gedang  
Sulawesi : Loka punu, unti

##### 3. Morfologi

Pisang Raja merupakan jenis tanaman berbiji, berbatang semu yang dapat tumbuh sekitar 2,1 - 2,9 meter, berakar serabut yang tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75 - 150 cm, memiliki batang semu tegak yang berwarna hijau hingga merah dan memiliki noda coklat atau hitam pada batangnya. Helaian

daunnya berbentuk lanset memanjang yang letaknya tersebar dengan bagian bawah daun tampak berlilin. Daun ini diperkuat oleh tangkai daun yang panjangnya antara 30 - 40 cm. Memiliki bunga yang bentuknya menyerupai jantung, berkelamin satu yaitu berumah satu dalam satu tandan dan berwarna merah tua. Buahnya melengkung ke atas, dalam satu kesatuan terdapat 13 - 16 buah dengan panjang sekitar 16 - 20 cm (Daniells, dkk., 2001).

#### **4. Kandungan Kimia**

Kulit buah pisang raja mengandung zat seperti protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B dan C (Atun, 2007), senyawa golongan flavonoid yaitu katekin, gallokatekin dan epikatekin serta senyawa golongan tanin (Someya, dkk., 2002).

#### **5. Kegunaan**

Kulit buah pisang raja digunakan sebagai obat penyakit kuning, antidiare, obat gangguan pencernaan (dispepsia) seperti penyakit maag, obat luka, menurunkan kolesterol darah, dapat digunakan sebagai tepung untuk olahan makanan (Cahyono, 2009), melembabkan kulit, menghilangkan bekas cacar, menghaluskan tangan dan kaki, antinyamuk dan menjaga kesehatan retina mata dari kerusakan akibat cahaya berlebih (Satuhu, 1996).

#### **6. Kandungan Gizi**

Pisang adalah buah yang kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, kalsium dan besi. Bila dibandingkan dengan jenis makanan nabati lain, mineral pisang, khususnya besi, hampir seluruhnya dapat diserap oleh tubuh. Kandungan vitaminnya sangat tinggi, terutama provitamin A, yaitu betakaroten. Pisang juga

mengandung vitamin B, yaitu tiamin, riboflavin, niasin, dan vitamin B6/ pridoxin (Riana, 2000).

Di Indonesia, komoditas pisang menduduki tempat pertama di antara jenis buah-buahan lainnya, baik dari segi luas peranamannya maupun dari segi produksinya. Bobot kulit pisang mencapai 40 % dari buahnya. Dengan demikian kulit pisang menghasilkan limbah dengan volume yang besar ( Farida, 2012).

Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang cukup banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. Menurut data Badan Statistik (2009) volume produksi pisang di Indonesia tahun 2007 hingga tahun 2010 berturut-turut sebesar 5.454.226 ton, 5.741.351 ton dan 6.373.533 ton. Sedangkan sampai saat ini kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah kulit pisang yang cukup banyak akan memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kulit pisang biasanya hanya langsung dibuang dan dibiarkan menjadi sampah sehingga nilai ekonomi kulit pisang sangat rendah. Hal tersebut sangat disayangkan karena ternyata kulit pisang masih memiliki nutrisi berupa sukrosa, mineral (Susmiati, 2006).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan kandungan gizi dalam buah pisang raja, diantaranya, yaitu : (Riana,2000).

Tabel 1. Komposisi kimia daging buah pisang raja (Nilai per 100 g)

Komponen Pisang Raja	Nilai
Air	67,30 g

Energi	116,00 kkal
Protein	0,79 g
Total lemak	0,18 g
Serat	16,02 %
Karbohidrat	31,15 g
Ampas	0,58 g

Menurut hasil penelitian dari Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, tanaman pisang mengandung berbagai macam senyawa seperti air, gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, pektin, protopektin, lemak kasar, serat kasar, dan abu. Sedangkan didalam kulit pisang terkandung senyawa pektin yang cukup besar. Ekstraksi dengan menggunakan asam asetat dapat menarik senyawa-senyawa seperti pektin asetat. Kulit pisang dengan menggunakan pelarut asam asetat mampu menarik senyawa-senyawa pektin (Berry, 2009).

Umumnya buah pisang dapat dinikmati dalam keadaan segar atau dalam bentuk olahan. Hampir semua bagian dari tanaman pisang dapat dimanfaatkan, seperti daun, batang, bonggol pisang, bunga pisang, dan kulit buah pisang sekalipun. Begitu banyak makanan tradisional khas daerah yang memerlukan pengemasan dengan daun pisang, sehingga begitu besar ketergantungannya pada tanaman pisang. Bagian dari pisang yang selama ini masih jarang dimanfaatkan adalah kulit pisang. Melalui cara pengolahan yang cukup sederhana, kulit pisang dari jenis pisang raja dan pisang ambon dapat diolah menjadi bahan baku minuman anggur (*wine*). Menurut Lina Susanti (2006), kulit pisang dapat

dimanfaatkan untuk pembuatan nata. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitiannya tentang perbedaan penggunaan jenis kulit pisang terhadap kualitas nata. Hasil analisisnya terbukti bahwa ada perbedaan kualitas yang nyata pada nata kulit pisang yang dibuat dari jenis kulit pisang yang berbeda dilihat dari sifat organoleptiknya. Selain itu, kulit pisang juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jelly, cuka, dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian Leyla Noviagustin (2008), ternyata kulit pisang juga dapat dijadikan tepung. Hal ini dibuktikan dengan penelitiannya tentang pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai substituen tepung terigu dalam pembuatan mie. Hasil analisisnya terbukti bahwa pati limbah kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan substituen tepung terigu dalam pembuatan mie dengan konsentrasi sebesar 20%.

Buah pisang banyak mengandung karbohidrat baik isinya maupun kulitnya. Pisang mempunyai kandungan khrom yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Khrom bersama dengan insulin memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Kekurangan khrom dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Umumnya masyarakat hanya memakan buahnya saja dan membuang kulit pisang begitu saja. Di dalam kulit pisang ternyata memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga lemak yang cukup. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu 68,90 % dan karbohidrat Universitas Sumatera Utara sebesar 18,50 %. Karbohidrat atau Hidrat Arang yang dikandung oleh kulit pisang adalah amilum. Amilum atau pati ialah jenis polisakarida karbohidrat (karbohidrat

kompleks). Amilum (pati) tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Amilum merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa di seluruh penduduk dunia, terutama di negara berkembang oleh karena di konsumsi sebagai bahan makanan pokok. Disamping bahan pangan kaya akan amilum juga mengandung protein, vitamin, serat dan beberapa zat gizi penting lainnya (Johari dan Rahmawati, 2006).

### **B. Serat Makanan**

Dalam ilmu gizi, serat sayuran dan buah yang kita makan disebut serat kasar (crude fiber). selain serat kasar, terdapat juga serat pangan. Serat makanan tidak hanya terdapat pada sayur dan buah, tetapi juga ada dalam makanan lain misalnya beras, kentang, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Serat dalam makanan lazim disebut sebagai dietary fiber sangat baik untuk kesehatan manusia. Serat makanan ini semakin mendapat perhatian sejak tahun 1970-an yaitu sejak kelompok peneliti *Burkitt et al.* (1972) dan *Trowel* (1972) memelopori penelitian serat dengan pendekatan epidemiologi. Hasil penemuannya menunjukkan bahwa pada masyarakat dengan western diet yang umumnya rendah serat, banyak ditemukan orang yang mengidap berbagai penyakit seperti diverticulitis, kanker kolon, atherosklerosis, coronary heart disease, diabetes mellitus dan appendicitis (Clara, 2006).

Serat pangan tidak mengandung zat gizi, akan tetapi memberikan keuntungan bagi kesehatan yaitu mengontrol berat badan atau kegemukan (*obesitas*), menanggulangi penyakit diabetes, mencegah gangguan gastrointestinal, kanker kolon (usus besar), serta mengurangi tingkat kolesterol darah dan penyakit kardiovaskuler. Serat pangan selain memberikan efek positif terhadap kesehatan, juga memberikan efek negatif, sehingga serat pangan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan dan sebagai acuan kebutuhan serat yang dianjurkan yaitu 30 gram/hari (Santoso, 2011)

Dugaan bahwa serat (fiber) merupakan senyawa inert secara gizi didasarkan atas asumsi bahwa senyawa tersebut tidak dapat dicerna oleh enzim – enzim pencernaan. Hasil-hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ternyata senyawa yang tidak dapat dicerna tersebut tidak hanya terdiri dari selulosa tetapi juga lignin, pentosan, hemiselulosa, gum dan senyawa pektin. Oleh karena itu akhirnya digunakan istilah serat pangan (*dietary fiber*), untuk menunjukkan bahwa lignin serta karbohidrat lain yang tidak dapat dicerna termasuk kedalamnya (Deddy, 2001).

Serat makanan yang diterjemahkan dari *dietary fiber* menurut Trowal (1972) merupakan bagian dari sela tanaman yang tidak dapat dicernakan oleh enzim dalam tubuh kita. Pada tahun 1974 ia mengemukakan bahwa serat makanan terdiri dari polisakarida yang terdapat pada dinding sel, lignin, lipid, tumbuhan dan zat – zat yang tidak dapat diidentifikasi. Serat makanan terutama terdiri dari selulosa. Disamping itu terdapat senyawa – senyawa lain seperti hemiselulosa,

pektin, gom tanaman, musilago, lignin dan polisakarida yang tersimpan dalam tanaman dan alga (Clara, 2006).

Sifat fisik serat makanan tergantung baik pada komposisi maupun komponen-komponen penyusun serat makanan. Sifat fisik penting pertama adalah kelarutan. Ada dua tipe serat makanan yaitu serat larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Kelarutan dari gum, pektin, musilase dan kemampuannya membentuk larutan dengan viskositas tertentu atau perbedaan kekuatan gel sangat dipengaruhi oleh ukuran dan distribusi polimer yang berbeda yang terkandung pada setiap sumber serat makanan. Sifat fisik penting yang kedua adalah kapasitas mengikat air, yaitu kemampuan serat makanan yang tidak larut dalam air untuk mengembang dan menyerap air. Kemampuan ini dipengaruhi oleh partikel dan distribusi. Serat makanan ini termasuk golongan karbohidrat yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin dan gum. Selulosa dan hemiselulosa terdapat pada bekatul atau sekam padi, kacang-kacangan, dan hampir pada semua buah dan sayuran (Trowel, 1972)

Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Namun akhir-akhir ini istilah serat mengalami perkembangan dengan pengertian yang lebih tepat sehubungan dengan perannya di dalam tubuh. Dalam ilmu gizi, pengertiannya dijelaskan sebagai *all structural materials of the plant cell taken in our diet which are resistant to digestive tract* (Speller). Dalam kepustakaan terakhir disebut sebagai *unavailable carbohydrates* dan bagian tanaman yang disebut lignin, yang tidak dapat diserap tubuh sebagai *crude fiber* adalah non-karbohidrat (Clara, 2006)

Sedangkan Meyer (2004) mendefinisikan serat sebagai bagian integral dari bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari dengan sumber utama dari tanaman, sayur-sayuran, sereal, buah-buahan, kacang-kacangan (Santoso, 2011).

*Luciana B Sutanto* berpendapat serat adalah bahan makanan nabati yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dalam tubuh. Sayuran dan buah adalah bahan makanan yang banyak mengandung serat alias dietary fiber. Serat makanan (dietary fiber) adalah komponen dalam tanaman yang tidak tercerna secara enzimatis menjadi bagian – bagian yang dapat diserap oleh saluran pencernaan. Serat secara alami terdapat dalam tanaman. Serat terdiri atas berbagai substansi yang kebanyakan diantaranya adalah karbohidrat kompleks. Beberapa karbohidrat tidak dapat di hidrolisa oleh enzim-enzim pencernaan pada manusia. Sisa yang tidak dicerna ini di kenal dengan diet serat kasar yang kemudian melewati saluran pencernaan dan di buang dalam feses. Serat makanan ini terdiri dari dinding sel tanaman yang sebagian mengandung 3 macam polisakarida dan juga mengandung zat yang bukan karbohidrat (Susmiati, 2006).

Serat yang berasal dari makanan sesampainya disaluran pencernaan akan mengikat asam empedu yang sampai kesana, sebelum menjalankan tugasnya membantu penyerapan lemak, asam empedu sudah terikat oleh serat yang kemudian bersama dengan serat yang kemudian bersama dengan serat dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk kotoran. Untuk menggantikan asam empedu yang hilang tersebut, kolestrerol dalam tubuh akan dirombak sehingga makin banyak serat makin asam empedu yang dibuang, berarti semakin banyak asam empedu yang dibuang, berarti semakin banyak kolestrerol yang dikeluarkan dalam tubuh,

dengan demikian kadar kolesterol dalam tubuh akan menurun. Lemak dan sterol-sterol lain juga akan lebih banyak dikeluarkan dalam tubuh. Salah satu bukti paling jelas manfaat serat dalam makanan adalah pada penanganan konstipasi (sembelit). Serat mencegah dan mengurangi konstipasi karena dapat menyerap air ketika melewati saluran pencernaan sehingga meningkatkan ukuran feses. Akan tetapi jika asupan air rendah serat justru akan memperparah konstipasi atau dapat menyebabkan gangguan pada usus besar. Tambahan dua gelas air dari enam gelas air per hari diperlukan untuk mengimbangi peningkatan serat (Siagian, 2003).

Serat pangan larut dalam air hangat atau panas serta dapat terendapkan oleh air yang telah dicampur dengan empat bagian etanol. Gum, pektin, dan sebagian hemiselulosa larut yang terdapat dalam dinding sel tanaman merupakan sumber serat larut. Serat pangan yang tidak larut dalam air panas maupun dingin sumbernya terdiri dari selulosa, lignin, sebagian besar hemiselulosa, sejumlah kecil kutin, lilin tanaman dan kadang – kadang senyawa pektat yang tidak dapat larut. Serat pangan tidak larut merupakan kelompok terbesar dari serat pangan total dalam makanan, sedangkan serat larut hanya menempati jumlah sepertiganya (Deddy, 2001)

Gordon (1989) menyatakan bahwa serat pangan total mengandung gula-gula dan asam – asam gula sebagai bahan pembangun utama serta grup fungsional yang dapat mengikat dan terikat atau bereaksi satu sama lain atau dengan komponen lain. Gula – gula yang membentuk serat pangan total adalah glukosa, galaktosa, silosa, ,annosa, arabinosa, rhamnosa dan fukosa, sedangkan asam-asam gulanya adalah asam manuronat, galakturonat, glukuronat, guluronat, dan 4-O

metilglukuronat. Grup fungsional serat pangan total adalah hidrogen, hidroksil, karbonil, sulfat dan metil. Semua komponen serat pangan total memberikan karakteristik fungsional pada serat yang meliputi kemampuan daya ikat air, kapasitas untuk mengembang, meningkatkan densitas kamba, membentuk gel dengan viskositas yang berbeda-beda, mengadsorpsi minyak/lemak, pertukaran kation, serta memberikan warna dan flavor (Deddy, 2001).

Definisi terbaru diusulkan oleh *Komite Codex Nutrisi dan Makanan untuk Penggunaan Diet Khusus* (2009) adalah sebagai berikut: “Serat pangan adalah polimers karbohidrat dari bahan baku pangan dengan perawatan fisiologis atau kimia dan telah terbukti memiliki efek fisiologis (Hazal, 2016).

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi dinding sel tanaman penghasilnya. Pada dasarnya komponen-komponen dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, mucilago yang kesemuanya termasuk dalam serat pangan. Serat pangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : Serat pangan larut (*soluble dietary fiber*), termasuk dalam serat ini adalah pektin dan gum yang merupakan bagian dalam dari sel pangan nabati. Serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur, dan serat tidak larut (*insoluble dietary fiber*), termasuk dalam serat ini adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin, yang banyak ditemukan pada sereal, kacang-kacangan dan sayuran. (Santoso, 2011).

Serat pangan memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan, meliputi melancarkan pencernaan dan mencegah kanker kolon, menurunkan

kadar glukosa darah, berfungsi sebagai prebiotik, mengontrol kegemukan dan obesitas serta mengurangi kadar kolesterol dalam darah (Fairudz, 2015).

Serat larut adalah jenis serat yang dapat larut dalam air, sehingga dapat melewati usus halus dengan mudah dan difermentasi di mikroflora usus besar. Sedangkan, serat tidak larut adalah jenis serat yang tidak dapat larut dalam air. Jenis serat ini tidak dapat membentuk gel ketika melewati usus halus dan sangat sulit difermentasi oleh mikroflora usus besar manusia (Fairudz, 2015).

Ada berbagai komponen kimiawi dari sifat-sifat fisik spesifik yang ditemukan dalam serat makanan, dan hal ini akan mempengaruhi kondisinya didalam usus. Menurut Mendeloff (1975), meskipun proses pengunyahan sayuran dan buah di dalam mulut dapat menstimulir kerja maksimal dari bagian pharynx, namun saat terjadi proses penelanan (swallowing) seratnya belum mengalami perubahan. Demikian juga pada *bread-cereals* tidak berbeda nyata dengan yang ada pada *white-bread*. Didalam lambung, kelompok sayuran berserat tinggi, bila dimakan mentah akan lama berada di lambung dibandingkan dengan yang sudah dimasak sedangkan kelompok kacang-kacangan yang berserat tinggi membutuhkan waktu penggosongan lebih lama dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, karena lebih banyak mengandung lemak (Clara, 2006).

Serat makanan mempunyai daya serap air yang tinggi. Adanya serat makanan dalam feses menyebabkan feses dapat menyerap air yang banyak sehingga volumenya menjadi besar dan teksturnya menjadi lunak. Adanya

volume feses yang besar akan mempercepat kontraksi usus untuk lebih cepat buang air sehingga waktu transit makanan lebih cepat (Fairudz, 2015).

Serat pangan dapat mereduksi difusi glukosa darah, mengurangi pemecahan glukosa yang dilakukan oleh alfa-amilase, perpanjangan waktu absorpsi karbohidrat sehingga mengurangi peningkatan kadar glukosa postprandial dan peningkatan sensitivitas insulin dengan peningkatan ekspresi Glucose Transporter Type 4 (GLUT-4) yang diduga terutama dilakukan oleh jenis serat pangan yang tidak larut (Fairudz, 2015).

Serat pangan terbukti dapat menurunkan level HbA1C pada penderita DM tipe 2 yang diberi intervensi serat >50 gr/hari. Pada keterkaitannya dengan level kolesterol, serat larut air dapat menjerat lemak di dalam usus halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian, serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah (Fairudz, 2015).

Hampir semua fungsi metabolisme serat makanan berkaitan dengan dengan kolon. Flora bakteri bekerja aktif didalam kolon. Setelah mencapai kolon. Flora bakteri bekerja aktif didalam kolon. Setelah mencapai kolon, serat relative tidak ada perubahan saat dilambung dan usus halus. Metabolisme bakteri ini menyebabkan pemecahan serat makanan di dalam kolon. Lebih kurang separuh dari serat makanan (terutama yang termasuk unavailable carbohydrate) dalam

western diet akan diurai oleh kerja enzim dan bakteri usus menjadi produk-produk sebagai berikut : (Clara, 2006)

a. Dirombak menjadi :

1. 50% serat tidak tercerna (*undigested cellulosa*).
2. 50% asam lemak berantai pendek.

b. Dipergunakan oleh tubuh:

1. Sedikit fraksi air akan diserap oleh bakteri usus atau diserap oleh bakteri usus atau diserap oleh serat melalui *hydrophobic binding*.
2. Asam empedu deoksikolat (deoxy cholic acid), asam litokolat diserap untuk membentuk koloni bakteri. Kedua asam empedu ini bersifat kokarsinogen atau membantu mempercepat pertumbuhan karsinoma. Stalder (1984) membuktikan korelasi positif antara kadar asam empedu dengan insiden kanker kolon.
3. Asam lemak volatile merupakan anion utama didalam feses, kemurnian lemak larut air mempunyai efek osmotik dan efek pencahar untuk peristaltik.
4. Hydrogen dan CO<sub>2</sub>, gas metana yang meningkatkan flatulens, sebagai hydrogen bebas melalui nafas.
5. Meningkatkan kandungan dan berat/ volume feses.

Jenis- Jenis Serat Larut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Zaimah, 2009).

1. Pektin

Pektin adalah suatu kelompok dari komponen yang mengandung pektin yang terdiri dari pectin, pectic acid dan pectinic acid. Merupakan dietary fiber sekaligus

functional fiber. Adalah kelompok polisakarida yang unsur utamanya asam D-galakturonat dengan ikatan 1,4 yang terdapat pada rantai utama sedangkan pada rantai cabang terdapat ramnosa, arabinosa, xylosa, fruktosa dan galaktosa. Pektin membentuk sebagian dinding utama sel tumbuhan dan sebagian lamella bagian tengah. Merupakan serat larut air yang membentuk gel dan hampir seluruhnya dapat dimetabolisir oleh bakteri kolon (Zaimah, 2009).

Istilah pektin berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengental atau menjadi padat. Kelompok senyawa pektin secara umum disebut substansi pektat yang terdiri atas protopektin, asam pektinat, dan asam pektat. *American Chemical Society* pada tahun 1944 telah menetapkan istilah baku untuk menyeragamkan nama-nama pektin yang hingga kini masih dipakai (Nussinovitch 1997), yaitu substansi pektat merupakan kelompok zat turunan karbohidrat kompleks berbentuk koloid yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar mengandung asam anhidrogalakturonat dalam suatu kombinasi turunannya menyerupai rantai. Gugus karboksil asam-asam poligalakturonat dapat teresterifikasi sebagian dengan gugus metil dan sebagian atau seluruhnya dapat dinetralkan oleh satu atau lebih jenis basa. Protopektin adalah zat pektat yang tidak larut dalam air dan jika dihidrolisis menghasilkan asam pektinat atau pektin. Asam pektinat adalah istilah yang digunakan bagi asam poligalakturonat yang mengandung gugus metil ester dalam jumlah yang cukup banyak. Asam pektinat dalam keadaan yang sesuai mampu membentuk gel dengan ion-ion logam. Pektin adalah istilah yang digunakan untuk asam-asam pektinat yang dapat larut dalam air dengan kandungan metil ester dan derajat netralisasi beragam dan dapat

membentuk gel dengan asam dan gula pada kondisi yang sesuai. Asam pektat adalah zat pektat yang seluruhnya tersusun dari asam poligalakturonat yang bebas dari gugus metil ester (Zaimah, 2009).

Stabil pada pH rendah oleh karena itu dapat dijumpai pada makanan yang asam. Bahan makanan yang mengandung banyak pektin adalah apel, strawberi dan jeruk. Saat ini pektin dapat diekstraksi dari jeruk atau apel dan dipakai sebagai bahan tambahan makanan disamping dipakai untuk membentuk jel pada pembuatan jelli dan selai. Pektin juga ditambahkan pada beberapa makanan enteral sebagai sumber serat (Zaimah, 2009).

## 2. Gum

Gum adalah salah satu kelompok senyawa yang dapat disebut sebagai hidrokoloid. Gum terdiri dari berbagai jenis gula dan derivatnya. Jenis gula yang paling utama adalah galaktosa, asam glukoronat, asam uronat, arabinosa, ramnosa dan manosa. Di usus besar difermentasi dengan sangat baik oleh bakteri usus. Gum arabikum merupakan hidrokoloid tumbuhan yang paling sering digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Gum sangat dikenal karena mudah larut, pH stabil dan sifat khasnya pada pembentukan gel. Gum ditemukan dalam bahan makanan seperti oat, barley dan tumbuhan polong (Zaimah, 2009).

## 3. B-glukan

B-glukan adalah polimer glukosa yang mempunyai ikatan campuran antara ikatan  $\beta$ 1,4 D-glukosa dengan ikatan  $\beta$ 1,3 D-glukosa. Setiap 2 atau 3 unit kelompok  $\beta$ 1,4 D-glukosa dipisahkan oleh 1 unit kelompok ikatan  $\beta$ 1,3 D-

glukosa.  $\beta$ -glukan ini sangat baik difermentasi oleh bakteri di dalam usus besar. Saat ini ekstraksi  $\beta$ -glukan dipakai sebagai functional fiber. (Zaimah, 2009).

B-Glukan, salah satu jenis serat larut air yang banyak ditemukan pada oat, telah mendapat banyak perhatian karena potensinya dalam mengurangi level kolesterol. Viskositas usus halus yang lebih besar dan kecendrungan absorpsi asam empedu yang lebih menurun adalah salah satu mekanisme yang diduga terjadi pada konsumsi B-glukan (Fairudz, 2015).

#### 4. Fructans – Inulin, Oligofruktosa dan fruktooligosakarida

Fruktans termasuk ke dalamnya inulin, oligofruktosa dan fruktooligosakarida mengandung rantai fruktosa dengan panjang yang bervariasi. Inulin terdiri dari 2 – 60 unit fruktosa. Oligofruktosa berasal dari hidrolisis parsial inulin dan biasanya mengandung 2 – 8 unit fruktosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi fruktooligosakarida dapat merangsang pertumbuhan bifidobakteria yang bekerja sebagai prebiotik (Zaimah, 2009).

Jenis serat lain yang berpotensi untuk mengurangi kadar kolesterol adalah inulin. Inulin memiliki beberapa mekanisme untuk menurunkan kadar kolesterol. Mekanisme pertama adalah dengan menghambat emulsifikasi lemak dan kolesterol oleh garam empedu (Fairudz, 2015).

Kedua, melalui pembentukan asam lemak rantai pendek. Asam-asam lemak rantai pendek (SCFA) memiliki kemampuan dalam menghambat sintesis kolesterol dan menurunkan sekresi trigliserol, sehingga pembentukan asam-asam lemak rantai pendek tersebut berpotensi dapat menurunkan kapasitas kolesterol (Fairudz, 2015).

Proses regulasi lipid oleh SCFA dapat dijelaskan sebagai berikut: propionate menghambat HMG-KoA reduktase yang merupakan katalis pembentukan mevalonic acid dan dari  $\beta$ -hydroxy  $\beta$ -methyl glutaryl coA. Mevalonic acid adalah precursor pembentukan kolesterol. Adanya inhibisi mevalonic acid akan menghambat sintesis kolesterol (Fairudz, 2015).

Produk hasil fermentasi serat pangan oleh bakteri usus, yaitu Short Chain Fatty Acids (SCFA) atau disebut juga asam lemak rantai pendek juga memiliki pengaruh terhadap penurunan kolesterol, yaitu dari pembentukan propionate, yang dapat menghambat enzim HMG-koA reduktase, sehingga menghambat sintesis kolesterol (Fairudz, 2015).

Jenis-jenis serat tidak larut air :

1. Selulosa

Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak, sebagai material struktur dinding sel semua. Selulosa mempunyai bobot molekul tinggi dan terdapat dalam jaringan tanaman pada dinding sel sebagai mikrofibril. Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari berat kering tanaman. Selulosa dicerna dalam tubuh ternak dalam saluran pencernaan oleh selulase hasil jasad renik dan menghasilkan selubiosa, yang kemudian dihidrolisis lebih lanjut untuk menghasilkan glukosa. Hasil pencernaan oleh jasad renik terhadap selulosa adalah asam-asam lemak terbang (VFA) yang terdiri dari campuran asam asetat, asam propionat dan asam butirat, dan sebagai hasil sampingan adalah gas metan dan CO<sub>2</sub> (Tillman *et al.*, 1989).

Sellulosa merupakan komponen utama dinding sel. Bahan ini adalah polimer linier unit glukosa dengan ikatan  $\beta$  1,4. Susunan yang terdiri dari ikatan  $\beta$  tersebut membentuk ikatan hidrogen inter dan intra molekul yang kuat, sehingga menjadikannya tidak dapat larut dalam air. Sellulosa ditemukan pada dinding parenkimal tumbuhan, kurang lebih 30% dari berat keringnya. Saat ini sudah dapat dimodifikasi secara kimiawi menjadi lebih larut dan digunakan sebagai bahan tambahan makanan, seperti karboksimetilsellulosa, metilsellulosa dan hidroksipropilmetilsellulosa. Degradasinya oleh bakteri usus bervariasi tetapi secara umum tidak dapat difermentasi dengan baik. Bahan makanan yang kaya sellulosa contohnya bekatul, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran dari keluarga kol dan apel. Sellulosa dalam bentuk bubuk biasa ditambahkan pada makanan yang dipakai untuk pembuatan roti, kue dan produk daging beku seperti nugget ayam dan juga pada jus campuran beberapa jenis buah (Zaimah, 2009).

## 2. Hemiselulosa

Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel tanaman yang larut dalam alkali dan menyatu dengan selulosa. Hemiselulosa terdiri atas unit D-glukosa, Dgalaktosa, D-manosa, D-xylosa, dan L-arabinosa yang terbentuk bersamaan dalam kombinasi dan ikatan glikosilik yang bermacam-macam. Hemiselulosa terdapat bersama-sama dengan selulosa dalam struktur daun dan kayu dari semua bagian tanaman dan juga dalam biji tanaman tertentu. Hemiselulosa yang terhidrolisis akan menghasilkan heksosa, pentosa dan asam uronat. Hemiselulosa dihidrolisa oleh jasad renik dalam saluran pencernaan dengan enzim hemiselulase, hasil akhir fermentasinya adalah VFA. Jumlah

hemiselulosa biasanya antara 15-30% dari berat kering bahan lignoselulosa. Hemiselulosa mengikat lembaran serat selulosa membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabilitas dinding sel. Hemiselulosa juga berikatan silang dengan lignin membentuk jaringan kompleks dan memberikan struktur yang kuat (Suparjo *et al.*, 2008).

Hemisellulosa Adalah kelompok heterogen dari senyawa-senyawa yang mengandung sejumlah gula pada rantai utama dan cabangnya. Gula inilah yang menentukan klasifikasi hemisellulosa, terdiri dari xilosa, manosa dan galaktosa pada rantai utama sedangkan pada rantai cabang ditemukan arabinosa, asam glukoronat dan galaktosa. Jenis gula yang terdapat pada rantai cabang memberikan karakteristik penting bagi hemisellulosa. Hemisellulosa yang mempunyai molekul asam pada rantai cabangnya akan sedikit bermuatan listrik dan larut di dalam air, sedangkan hemisellulosa lainnya tidak larut. Hal ini juga mempengaruhi fermentabilitas bakteri usus terhadap hemisellulosa. Bahan makanan yang tinggi kadar hemisellulosanya adalah bekatul dan biji-bijian utuh (Zaimah, 2009).

### 3. Lignin

Lignin merupakan komponen yang tidak memiliki hasil akhir dari proses pencernaan dan keberadaannya dapat menghambat proses pencernaan pada ternak. Pada tanaman kandungan lignin akan bertambah seiring bertambahnya umur tanaman dan mencapai level tertinggi pada saat tanaman sudah dewasa (Tillman *et.al.*, 1989). Lignin merupakan komponen dinding sel yang sulit dicerna oleh bakteri, sehingga dengan kadar lignin yang lebih rendah bakteri akan lebih

mudah mendegradasi zat-zat makanan yang terdapat dalam isi sel (McDonald *et al.*, 1988). Lignin adalah gabungan beberapa senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen dan oksigen, namun proporsi karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa karbohidrat. Lignin sangat tahan terhadap degradasi kimia, termasuk degradasi enzimatik (Tillman *et al.*, 1989). Struktur Lignin sering digolongkan sebagai karbohidrat karena hubungannya dengan selulosa dan hemiselulosa dalam menyusun dinding sel, namun lignin bukan karbohidrat. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi karbon yang lebih tinggi pada lignin (Suparjo *et al.*, 2008).

Lignin Adalah komponen non karbohidrat utama dari serat. Merupakan polimer 3 dimensi yang terdiri dari unit-unit fenol dengan ikatan intra molekuler yang kuat. Lignin biasanya tidak termasuk dalam komponen penting makanan manusia, karena umumnya berhubungan dengan jaringan-jaringan keras dan berkayu yang membentuk komponen struktural tumbuhan. Lignin tidak larut air dan tidak difermentasi oleh bakteri usus. Kandungan lignin yang tinggi ditemukan pada wortel, gandum dan buah yang bijinya dapat dimakan seperti arbei (Zaimah, 2009).

Tabel 2. Perbedaan Serat Larut dan Serat Tidak Larut

<b>Larut air (SDF)</b>	<b>Tidak larut air (IDF)</b>
Pektin, gum, dan mucilage	Selulosa, hemiselulosa dan lignin (penyusun dinding sel tanaman)
Tidak termasuk serat kasar	Termasuk serat kasar
Berperan utama dalam menurunkan kolesterol darah dan konstipasi (sulit buang air besar)	Kontribusi terhadap volume feses dan waktu transit di usus □ mencegah konstipasi dan hemoroid (wasir)

Umumnya dapat difermentasi oleh bakteri usus	Umumnya tidak dapat difermentasi oleh bakteri usus
Sumber: buah, sayur, oat bran, barley, flaxseed, psyllium, kacang-kacangan, susu kedelai dan produk kedelai	Sumber: wheat bran, corn bran, rice bran, kulit buah dan sayur, biji-bijian.

Komponen serat pangan terdapat pada Tabel 3 , yaitu : ( Deddy, 2001)

Tabel 3. Komponen serat pangan dalam berbagai bahan pangan

Jenis Bahan Pangan	Jenis Jaringan	Komponen Serat Pangan Yang Terkandung
Buah-buahan dan sayuran	Terutama jaringan parenkhim	Selulosa, substansi pektat, hemiselulosa dan jenis glikoprotein
	Jaringan terlignifikasi	Selulosa, lignin, hemiselulosa dan jenis glikoprotein
Serealia dan hasil olahannya	Jaringan parenkhim	Hemiselulosa, selulosa, ester-ester fenolik dan glikoprotein
	Jaringan terniglifikasi	Hemiselulosa, selulosa, lignin. Ester-ester fenolik dan glikoprotein
Biji-bijian selain serealia	Jaringan parenkhim	Selulosa, hemiselulosa, substansi pekat dan glikoprotein
	Jaringan dengan penebalan dinding endosperma	Galaktomanan, sejumlah selulosa, substansi pekat dan glikoprotein
Aditif pangan		Gum guar, gum arabik, gum alginat, karagenan, gum xanthan, selulosa temodifikasi, dan pati temodifikasi

Manfaat serat pangan untuk kesehatan yaitu (Olwin,2005) :

### 1. Mengontrol berat badan atau kegemukan

Serat larut air (soluble fiber), seperti pektin serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan. Sehingga makanan kaya akan serat, waktu dicerna lebih lama dalam lambung, kemudian serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama sehingga mencegah untuk mengonsumsi makanan lebih banyak. Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi juga dilaporkan dapat mengurangi berat badan. Serat makanan akan tinggal dalam saluran pencernaan dalam waktu relatif singkat sehingga absorpsi zat makanan berkurang. Selain itu, makanan yang mengandung serat yang relatif tinggi akan memberikan rasa kenyang karena komposisi karbohidrat kompleks bersifat menghentikan nafsu makan sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi makanan. Makanan dengan kandungan serat kasar relatif tinggi biasanya mengandung kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas dan penyakit jantung (Susmiati, 2006).

### 2. Penanggulangan penyakit diabetes

Diabetes melitus adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah lebih tinggi dari normal (normal: 60 mg/dl sampai 145 mg/dl). Mekanisme serat yang tinggi dapat memperbaiki kadar gula darah yaitu berhubungan dengan kecepatan penyerapan makanan (karbohidrat) masuk ke dalam aliran darah yang di kenal dengan *Glycaemic Index* (GI). GI ini mempunyai angka dari 0 – 100. Makanan yang cepat di rombak dan cepat di serap masuk ke aliran darah mempunyai angka GI yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah.

Sebaliknya, makanan yang lambat di rombak dan lambat di serap masuk ke aliran darah mempunyai angka GI yang rendah sehingga dapat menurunkan kadar gula darah (Susmiati, 2006).

Berbagai penelitian sampai dengan tahun 2002, telah menunjukkan bahwa serat dapat memperbaiki respon glukosa darah dan indek insulin. Serat kasar (*viscous fiber*) menghambat lewatnya glukosa melalui dinding saluran pencernaan menuju pem-buluh darah. Para ahli percaya bahwa perbaikan yang berarti pada pengendalian kadar gula darah hanya dapat dicapai dengan pemberian suplemen serat dosis tinggi secara hati-hati, hal ini tidak dapat dicapai dengan mengonsumsi makanan berserat tinggi (Susmiati, 2006).

Berdasarkan temuan baru ini, American Diabetes Association memperbarui rekomendasi kecukupan serat per hari bagi penderita diabetes. Rekomendasi yang baru menyatakan kecukupan serat pada penderita diabetes turun dari 40 gram menjadi 20-35 gram per hari (tidak berbeda dengan kecukupan untuk orang yang bukan penderita diabetes) (Susmiati, 2006).

### 3. Mencegah gangguan gastrointestinal

Konsumsi serat pangan yang cukup, akan memberi bentuk, meningkatkan air dalam fese menghasilkan feses yang lembut dan tidak keras sehingga hanya dengan kontraksi otot yang rendah feses dapat dikeluarkan dengan lancar. Hal ini berdampak pada fungsi gastrointestinal lebih baik dan sehat. (Susmiati, 2006).

Utama serat dalam makanan ialah pada kemampuannya mengikat air, sellulosa dan pektin. Serat dapat membantu mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk diekskresikan keluar. Tanpa bantuan serat, feses dengan kandungan air rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran usus dan mengalami kesukaran melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar karena gerakan-gerakan peristaltik usus besar menjadi lebih lamban. (Susmiati, 2006).

Salah satu bukti paling jelas manfaat serat adalah pada penanganan konstipasi (sembelit). Serat mencegah dan mengurangi konstipasi karena ia menyerap air ketika melewati saluran pencernaan sehingga meningkatkan ukuran feses. Akan tetapi jika asupan air rendah, serat justru akan memperparah konstipasi atau bahkan dapat menyebabkan gangguan pada usus besar. Tambahan 2 gelas air dari kebutuhan 6 gelas air per hari diperlukan untuk mengimbangi peningkatan konsumsi serat (Susmiati, 2006).

#### 4. Mencegah kanker kolon (usus besar)

Penyebab kanker usus besar diduga karena adanya kontak antara sel-sel dalam usus besar dengan senyawa karsinogen dalam konsentrasi tinggi serta dalam waktu yang lebih lama. Beberapa hipotesis dikemukakan mengenai mekanisme serat pangan dalam mencegah kanker usus besar, yaitu konsumsi serat pangan tinggi akan mengurangi waktu transit makanan dalam usus lebih pendek, serat pangan mempengaruhi mikroflora usus sehingga senyawa karsinogen tidak terbentuk, serat pangan bersifat mengikat air sehingga konsentrasi senyawa karsinogen menjadi lebih rendah.

Telah lama di duga bahwa asupan serat yang tinggi dapat mengurangi risiko kanker kolon. Beberapa mekanisme efek pelindungannya telah diketahui. (Susmiati, 2006).

1. Serat meningkatkan ukuran feses dan menyelubungi komponen penyebab kanker di dalam feses.
2. Serat mempersingkat waktu lewatnya sisa pencernaan pada saluran pencernaan sehingga mengurangi paparan dinding usus terhadap karsinogen. Akhirnya, fermentasi serat terlarut oleh bakteri menghasilkan komponen yang protektif terhadap kanker kolon

#### 5. Mengurangi tingkat kolesterol

Serat larut air menjerat lemak di dalam usus halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah. Pengaruh serat pada kadar kolesterol darah masih mengundang perdebatan dan membingungkan. Beberapa jenis serat dapat menurunkan kadar kolesterol darah, sementara serat yang lain tidak. Serat larut air menjerat lemak didalam usus halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah.

## 6. Terhadap jantung koroner

Beberapa penelitian pada manusia telah menemukan hubungan terbalik antara asupan serat dan risiko Penyakit Jantung Koroner (PJK). Beberapa peneliti menduga bahwa serat mencegah PJK melalui perannya dalam mencegah kegemukan, penggumpalan darah dan aterosklerosis. Peneliti lain masih meragukan bahwa serat bukan faktor pelindung yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa mengonsumsi makanan berserat tinggi merupakan ciri dari gaya hidup dan pola makan sehat yang berperan pada menurunnya risiko PJK. Karena hubungan antara asupan serat yang tinggi dan penurunan risiko PJK belum dapat dipastikan sebagai akibat dari serat tertentu maka para ahli menganjurkan walaupun serat dapat membantu agar orang jangan menekankan pada asupan serat untuk meminimalkan risiko PJK (Susmiati, 2007).

## 7. Terhadap divertikulitis

Singkatnya waktu transit makanan dengan kandungan serat kasar yang relatif tinggi juga dilaporkan mencegah penyakit divertikulitis karena berkurangnya tekanan pada dinding saluran pencernaan. Serat makanan tidak larut (IDF) sangat penting perannya dalam pencegahan disfungsi alat pencernaan, seperti konstipasi (susah buang air besar), wasir, kanker usus besar dan infeksi usus buntu (Susmiati, 2007).

## 8. Efek fisiologi dari mikro flora usus dan hasil fermentasi asam lemak rantai pendek

1. Berperan sebagai imonomodulator contoh penyerapan procarcinoma, menyerang sel malignan.

2. Menghambat pertumbuhan *bakteri peptolitik*
3. Meningkatkan absorpsi mineral
4. Menurunkan intoleran dan alergi makanan
5. Menghasilkan nutrien dan enzim pencernaan

Proses fermentasi dan produksi asam lemak rantai pendek akan menekan koloni dan pH fecal. Yang akan menghambat pertumbuhan organisme patogen. pH yang rendah akan menurunkan degradasi peptida dan pembentukan zat toksik seperti ammonia, *phenolic* dan penurunan aktivitas enzimatis. Asam lemak rantai pendek akan masuk ke peredaran darah dan menimbulkan efek sistemik yang bermanfaat bagi perubahan metabolisme glukosa dan kolesterol (Susmiati, 2006).

#### 9. Terhadap absorpsi mineral

Disamping memberikan manfaat terhadap kesehatan, serat makanan juga telah lama diketahui sebagai penyebab ketidakterersediaan (non-availability) beberapa mineral. Telah terbukti bahwa serat makanan mempengaruhi ketidakterersediaan biologis (non-bioavailability) dan homeostasis beberapa mineral.

Fakta ilmiah mendukung bahwa pangan yang berserat tinggi memiliki efek yang lebih menguntungkan dari pada suplemen serat dalam pencegahan dan penanganan penyakit kronik. Walaupun beberapa jenis suplemen serat dapat berperan dalam penanganan penyakit tertentu (konstipasi kronik dan diabetes), para ahli lebih menganjurkan untuk mengonsumsi pangan sumber serat dan seimbang dari pada mengonsumsi suplemen serat (Susmiati, 2006).

### **Pengaruh Merugikan Serat Pangan**

Di samping memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan, serat pangan diketahui juga memberikan pengaruh yang merugikan. Adapun pengaruh yang merugikan serat pangan dilaporkan Leveile (1977) dan EspinosaNava, (1982) dalam Deddy Muchtadi (2001); yaitu sebagai penyebab ketidaktersediaan (unavailability) beberapa zat gizi seperti vitamin-vitamin larut dalam lemak (terutama vitamin D dan E), serta mempengaruhi aktivitas enzim-enzim protease. Dilaporkan Jansen Silalahi dan Netty Hutagalung (2010) selain mengurangi absorpsi zat gizi juga menyebabkan flatulen, juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan mineral dan dapat menyebabkan defisiensi mineral sehingga meningkatkan resiko osteoporosis pada orang usia lanjut (Susmiati, 2006).

### **C. Pembuatan Serat Dari Limbah Kulit Buah**

#### **a. Sortasi**

Sortasi dan penggolongan mutu sangat diperlukan untuk menggolongkan bahan pangan sesuai dengan ukuran dan ada tidaknya cacat. Penggolongan mutu adalah klasifikasi komoditi dan kelompok menurut standar yang secara komersil dapat diterima (Satuhu, 1996).

#### **b. Pencucian**

Pencucian meningkatkan penampakan hasil, dimana sering sekali pada hasil terdapat kotoran, tanah, serangga, jamur, dan sebagainya yang mengakibatkan hasil tidak sedap dipndang. Tidak jarang pula masih terdapat sisa-sisa fungisida dan insektisida pada hasil (Pantastico, 1993)

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran (tanah) yang menempel, residu fungisida atau insektisida. Pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan air atau dengan sikat (Baliwati et, al., 2004).

c. Perendaman

Bahan –bahan yang masih kotor dicuci bersih hingga bebas dari pasir dan kotoran-kotoran lainnya. Bahan yang telah dicuci kemudian direndam dalam larutan kaporit 0,25% selama 5 jam. Dengan perendaman ini diharapkan bahan menjadi lebih putih. Setelah perendaman, bahan-bahan yang telah putih tersebut dicuci kembali dengan air mengalir untuk menghilangkan bau kaporit. Kaporit yang tergolong dalam senyawa klorin bila dicampur dengan air akan terhidrolisis. Asam hipoklorit akan terdisosiasi dalam air membentuk ion hidrogen ( $H^+$ ) dan ion hipoklorit ( $OCL$ ). Pada pH rendah asam hipoklorit lebih dominan, sedangkan pada pH tinggi, ion hipoklorit lebih terdapat dalam jumlah lebih banyak (Laksmi, 1987).

Bahan-bahan yang telah selesai direndam dalam larutan kaporit segera dibilas dengan air mengalir agar kotoran-kotoran dan bau kaporit dihilangkan (Wahyu, 1990).

d. Pengeringan

Pengeringan sebagai cara suatu cara untuk menghilangkan atau mengeluarkan sebagian air dari dalam bahan pangan dengan menggunakan energi panas sampai batas dimana mikroorganisme tidak dapat tumbuh didalamnya (Winarno, 1993).

Kegiatan –kegiatan bakteri membutuhkan kelembaban. Jadi, pengeringan pangan, yang menurunkan kandungan air secara berarti, membantu menghentikan kegiatan bakteri. Dalam bahan-bahan pangan yang telah dikeringkan, nilai gizi meningkat untuk zat-zat makanan yang tahan terhadap panas, cahaya, dan pengaruh udara dalam jangka waktu lama (Harper, 1986).

Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkut dan pengepakan, berat bahan juga menjadi berkurang (Winarno, 1993).

#### **D. Ekstraksi**

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang ditetapkan (Dirjen POM, 1995)

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa kimia yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Departemen kesehatan, 2000).

Ekstraksi dilakukan pada suasana sedikit asam. Proses pengasaman bertujuan untuk memecahkan dinding sel sehingga memudahkan proses ekstraksi. Pengasaman dapat dilakukan dengan menggunakan asam sulfat, asam asetat, atau asam sitrat (Winarno, 1993).

Proses pemasakan mengukur pH sampai pH 6. Selama pemasakan akan terjadi penghancuran dinding sel yang terjadi akibat hidrolisis pada waktu pengasaman maupun pada waktu ekstraksi. Proses penghancuran dinding sel bertujuan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah proses pelarutan (Astawan, 1991).

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat terdesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara di luar sel dan di dalam sel (Depkes, 1986).

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirok dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air etanol atau pelarut lain. Bila cairan

penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat diambahkan baha pengawet, yang diberikan pada awal penyarian (Depkes, 1986).

Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antra larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel (Depkes, 1986).

Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari (Depkes, 1986).

Agar diperoleh rendamen yang maksimal dan bermutu baik, dilakukan ekstraksi yang tepat. Factor yang sangat berpengaruh terhadap jumlah dan mutu pektin yang terekstrak adalah suhu, waktu dan keasaman selama ekstraksi berlangsung. Faktor lain seperti jenis asam harus mendapat perhatian, karena semakin kuat asam yang digunakan maka akan meningkatkan jumlah rendemen (Hanifah, 2002).

Asam asetat lebih banyak diproduksi pada konsentrasi gula yang tinggi. Jumlah asam asetat yang diproduksi selama fermentasi adalah kecil dari 0,030 g/100 ml, tergantung pada jenis fermentasi dan kondisi fermentasi. Jumlah asam asetat yang tinggi dapat terjadi akibat kegiatan bakteri sebelum dan sesudah fermentasi. Bertambahnya asam asetat ini karena terjadinya oksidasi alkohol dan perombakan bakteri terhadap gula, asam sitrat, gliserol dan lainnya (Oxtoby, 2003).

## Penyaringan

Bahan yang diekstraksi disaring dan penyaringan yang umum dilakukan dengan menggunakan kain blacu berwarna putih. Dalam penyaringan ini akan diperoleh filtrate. Ampas yang tertinggal pada kain blacu dipress. Pengepresan yang baik akan menghasilkan ampa dengan kandungan air 76-78% (Soebardjo, et al., 1988).

### ***E. Tinjauan Islam Terhadap Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Sebagai Serat***

#### ***Makanan***

Bumi diciptakan dari satu sistem yang kompleks yang tersusun dari beberapa sistem kecil yang belum tentu diketahui secara pasti oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT selalu memerintahkan kepada hambanya untuk menuntut ilmu secara tersirat maupun tersurat. Hal ini seiring dengan Firman Allah SWT. dalam QS Ali-Imran; 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya;

*Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau meniptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Departemen Agama. 2007).*

Ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *Ulul Albab*. Mereka adalah orang-orang yang terus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring, atau bagaimana pun dan mereka

memikirkan penciptaanya, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: *“Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia”* tanpa tujuan yang hak (Shihab. 2002)

Diatas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek befikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah (Shihab. 2002).

Jadi Allah SWT. menciptakan alam raya tidak sia-sia. Segala apa yang ada dimuka bumi memiliki manfaat. Tinggal bagaimana kita mencari tahu dengan menuntut ilmu agar kita mengetahuinya. Dan adapun manusia yang menyia-nyiakan ciptaan Allah SWT. maka celakalah ia.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh manusia untuk menemukan berbagai hal yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia itu sendiri. Seharusnya hal ini bisa menjadi dasar untuk tiap-tiap manusia menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Dalam ilmu pengetahuan modern disebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa tumbuhan yang dapat mencegah sampai menyembuhkan penyakit. Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keragaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaanNya yang menakjubkan. Rasulullah saw. bersabda, dalam hadits Abu Hurairah RA :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» (رواه البخاري)

Artinya :

*Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-Zubairiy menceritakan kepada kami, 'Umar bin Sa'id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula" (H.R. Al-Bukhari: 5678).*

Ungkapan “setiap penyakit pasti ada obatnya”, artinya bisa bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditampakkan Allah untuk menggapainya. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah swt. Itu pasti ada penawarnya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Tumbuhan Pisang Raja merupakan ciptaan Allah swt berupa tumbuhan yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik dari buah, kulit, akar, batang, daun semua ada manfaatnya, namun untuk mengetahui atau membuktikan manfaat dari Kulit Pisang Raja maka perlu untuk diteliti lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk menambah data ilmiah tentang tumbuhan tersebut, selain itu dari beberapa hasil penelitian telah membuktikan manfaat dari tumbuhan ini sebagai

antianemia dan menyehatkan jantung, hal ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah swt, tidaklah Allah swt menurunkan penyakit jika Allah tidak menurunkan obatnya.

Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan manusia dan penciptanya (Allah SWT) serta manusia dan alam sekitarnya. Oleh sebab itu maka dapat ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya.

Islam mengatur profesi kedokteran, pengobatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Sebagaimana dalam surah al-Baqarah (2); 222 yang menegaskan perintah Tuhan untuk membersihkan diri.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri* (Departemen Agama RI. 2009)

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT. menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan sangat dekat dengan yang namanya kesehatan. Selain itu, kesehatan sangatlah penting untuk dijaga. Memelihara kesehatan dan membudayakan hidup sehat berarti melaksanakan sebagian dari syariat Islam.

Semua itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan hingga menjadi satu tanaman yang sempurna. Sekiranya Allah SWT. berkehendak mencabut nikmat itu dari kita. Dia kan menjadikannya abu dan kita akan terheran-heran bagaimana tanaman tersebut menjadi sedemikian rupa (Hisham Thalbah, 2002: 50)

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional.

Allah berfirman dalam QS Luqman (31): 10

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahannya;

*Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan adanya segala pasangan yang baik. (Departemen Agama.2007)*

Dari beberapa ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT. menciptakan berbagai macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini, dimanfaatkan sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk diketahui manfaatnya sebagai bahan pengoba

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *eksperimen laboratory*.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Analisis Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental

#### ***C. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data***

##### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan adalah alat centrifuge, ayakan, blender, desikator, erlenmeyer, kurs porselin, oven, tanur, tabung centrifuge, tabung reaksi, timbangan analitik.

##### **2. Bahan yang digunakan**

Bahan yang digunakan adalah aluminium foil, air suling, etanol, larutan kaporit, larutan asam asetat

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1. Pembuatan Serat Makanan

###### *a. Penyiapan sampel*

##### 1. Pengambilan sampel

Sampel pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) dibersihkan, dan dikupas kulitnya secara manual dengan bantuan pisau, kemudian kulit pisang dicuci, dilakukan di laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.

##### 2. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian direndam dalam larutan kaporit 0,25% selama 5 jam, kemudian dicuci dengan air mengalir sampai bau kaporitnya hilang. Lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 6 jam. Setelah itu dihaluskan dengan bantuan blender.

###### *b. Ekstraksi sampel*

Serbuk kulit pisang yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam asetat konsentrasi 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,8% selama 12 jam. Kemudian disaring. Setelah itu diukur pH-nya sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit, lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 6 jam. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dengan parameter yaitu Rendamen (%), Kadar air (%), Kadar Abu (%), Kadar serat kasar (%), Daya serap air (%).

c. *Pengamatan Dan Pengukuran Data*

1. Penentuan Rendamen (%) (Ferawalden., 2009)

Rendamen dihitung atas dasar rumus sebagai berikut :

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{b}{a} \times 100\%$$

Dimana : a = berat awal

b = berat akhir

2. Penentuan Kadar Air (%) (Metode Oven) (Ferawalden., 2009)

Ditimbang bahan sebanyak 2 gram didalam aluminium foil yang telah diketahui berat kosongnya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu sekitar 105°C - 110°C selama 3 jam, lalu didinginkan di dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. Selanjutnya dipanaskan kembali di dalam oven selama 30 menit, kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai diperoleh berat yang konstan.

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Berat awal} - \text{Berat akhir}}{\text{Berat awal}} \times 100\%$$

3. Penentuan Kadar Abu (%) (Ferawalden., 2009)

Ditimbang bahan sebanyak 2 gram dalam kurs porselin yang kering dan telah diketahui beratnya, kemudian dipijarkan dalam tanur pada suhu 400°C selama 3 jam hingga diperoleh abu dan dimasukkan ke dalam desikator. Ditimbang berat abu setelah dingin.

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

4. Penentuan Kadar Serat Kasar (%) (Ferawalden., 2009)

Ditimbang bahan sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam erlenmeyer, kemudian ditambahkan 200 ml larutan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,2 N dan didihkan dengan

pendingin balik, selama 30 menit, lalu disaring melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam erlenmeyer dicuci dengan aquadest mendidih. Residu pada kertas saring dipindahkan kedalam erlenmeyer kembali dengan spatula dan dicuci dengan larutan NaOH 0,3 N sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk kedalam erlenmeyer, kemudian didihkan kembali dengan pendingin balik selama 30 menit. Disaring dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya. Setelah itu kertas saring beserta isinya dikeringkan pada suhu 110°C sampai beratnya konstan, didinginkan dalam desikator dan ditimbang, dengan rumus sebagai berikut :

1. Berat residu = berat serat kasar
2. Dihitung persentase kadar serat kasar dengan rumus :

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{\text{Berat Serat Kasar}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

#### 5. Penentuan Daya Serap Air (Ferawalden., 2009)

Daya serap air dapat ditentukan dengan metode sentrifuge 0,5 sampel dicampur dengan 5 gram aquadest dalam tabung sentrifuge yang telah diketahui beratnya, kemudian dikocok selama 30 detik. Didiamkan selama 30 menit lalu air yang berada diatas endapan dibuang kemudian berat endapan dicatat. Selisih berat endapan dengan berat contoh merupakan jumlah penyerapan oleh serat.

$$\text{Daya serap air \%} = \frac{\text{Berat endapan} - \text{Berat sampel}}{\text{Berat air}} \times 100\%$$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

**Tabel 4.** Hasil Persen Rendamen Ekstrak Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Konsentrasi (%)	Berat Awal	Berat Akhir	Rendamen
0,2	50 gram	6,226 gram	12,452 %
0,4		6,244 gram	12,488 %
0,6		6,628 gram	13,256 %
0,8		6,784 gram	13,568 %

**Tabel 5.** Hasil Persen Penentuan kadar Air Ekstrak Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Konsentrasi (%)	Berat Awal	Berat Akhir	Kadar Air
0,2	2 gram	1,77 gram	11,5 %
0,4		1,92 gram	4,0 %
0,6		1,95 gram	2,5 %
0,8		1,96 gram	2 %

**Tabel 6.** Hasil Persen Penentuan Kadar Abu Ekstrak Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Konsentrasi (%)	Berat Awal	Berat Akhir	Kadar Abu
0,2	2 gram	0,0015 gram	0,075 %
0,4		0,0018 gram	0,09 %
0,6		0,0023 gram	0,115 %
0,8		0,0025 gram	0,125 %

**Tabel 7.** Hasil Persen Kadar Serat Kasar Ekstrak Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Konsentrasi (%)	Berat Awal	Berat Akhir	Kadar Serat Kasar
0,2	2 gram	0,88 gram	44 %
0,4		0,91 gram	45 %
0,6		0,92 gram	46 %
0,8		1,89 gram	94,5 %

**Tabel 8.** Hasil Persen Penentuan Daya Serap Air Ekstraksi Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi Asam Asetat

Konsentrasi (%)	Berat Awal	Berat Endapan	Penentuan Daya Serap Air
0,2	0,5 gram	1,0 gram	10 %
0,4		1,4 gram	18 %
0,6		1,12 gram	12,4 %
0,8		3,0 gram	50 %

## **B. Pembahasan**

Serat makanan merupakan komponen dalam makanan yang tidak tercerna secara enzimatis menjadi bagian-bagian yang dapat diserap disaluran pencernaan. Serat secara alami terdapat dalam tanaman. Serat terdiri dari berbagai substansi yang kebanyakan adalah karbohidrat kompleks.

Tanaman pisang mengandung berbagai macam senyawa seperti air, gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, pektin, protopektin, lemak kasar, serat kasar, dan abu. Sedangkan didalam kulit pisang terkandung senyawa pektin yang cukup besar. Ekstraksi dengan menggunakan asam asetat dapat menarik senyawa-senyawa seperti pektin. Kulit pisang dengan menggunakan pelarut asam asetat mampu menarik senyawa-senyawa pektin (Berry, 2009).

Pektin adalah suatu kelompok dari komponen yang mengandung pektin yang terdiri dari pectin, pectic acid dan pectinic acid. Merupakan dietary fiber sekaligus functional fiber dan pektin merupakan termasuk serat larut air (Zaimah, 2009).

Dari data yang diperoleh untuk Rendamen (%) (Tabel 4) dapat dilihat bahwa rendamen tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,8% yaitu sebesar 13,568 % dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,2% yaitu sebesar 12,452%. Rendamen merupakan rasio antara hasil yang diperoleh dengan bahan dasarnya. Dalam setiap proses produksi diharapkan menghasilkan rendamen yang tinggi. Agar diperoleh rendamen yang maksimal dan bermutu baik, dilakukan ekstraksi yang tepat. Jumlah rendamen juga tergantung dari konsentrasi asam yang digunakan. Menurut Hanifah (2002),

bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap jumlah dan mutu serat yang terekstrak adalah suhu, waktu dan keasaman selama ekstraksi berlangsung.

Dari data yang diperoleh untuk kadar air (%) (Tabel 5) dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,2% yaitu sebesar 11,5% dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,8% yaitu sebesar 2%. Ikatan polimer yang panjang mengandung air yang lebih banyak dengan adanya asam dapat memutuskan ikatan polimer yang panjang menjadi pendek sehingga airnya menguap. Konsentrasi asam yang digunakan dalam ekstraksi juga berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan. Hal ini tergantung pada kemampuan asam dalam memutus ikatan polimer suatu bahan. Jumlah kadar air dalam bahan akan menyebabkan kerusakan pada bahan tersebut yang disebabkan oleh mikroba maupun serangga. Menurut (Ferdiaz, 1989), batas kadar air mikroba masih dapat tumbuh adalah pada kadar air 14-15 %. Konsentrasi asam yang semakin tinggi maka kadar air akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena asam yang ditambahkan menyebabkan terjadinya proses difusi (Anwar, 1984).

Dari data yang diperoleh untuk kadar abu (%) (Tabel 6) dapat dilihat bahwa kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,8% yaitu sebesar 0,125% dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam asetat 0,2% yaitu sebesar 0,075%. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuan. Mineral dalam suatu bahan merupakan garam organik (seperti garam-garam malak, oksalat, asetat dan pektat) dan garam

anorganik (seperti garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat dan nitrat). Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Karena kadar abu dalam suatu bahan makin rendah kandungan mineralnya akan semakin rendah dan juga sebaliknya. Menurut (Afrianti, 2004) Semakin tinggi kadar abu pada serat maka semakin tinggi kandungan nutrisi serat tersebut.

Dari data yang diperoleh untuk kadar serat kasar (%) (Tabel 7) dapat dilihat bahwa kadar serat kasar tertinggi terdapat pada konsentrasi asam asetat 0,8% yaitu sebesar 94,5% dan yang terendah terdapat pada konsentrasi asam asetat 0,2% yaitu sebesar 44%. Serat kasar adalah senyawa yang biasa di analisa dilaboratorium yaitu senyawa yang tidak dapat dihidrolisa oleh asam atau alkali. Didalam buku daftar komposisi bahan makanan, yang dicantumkan adalah kadar serat kasar bukan kasar serat makanan. Tetapi kadar serat kasar dalam suatu makanan dapat dijadikan indeks kadar serat makanan. Karena umumnya didalam serat kasar ditemukan sebanyak 0,2-0,5 bagian jumlah serat makanan. Serat kasar merupakan indicator dari daya cerna suatu bahan. Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika direbus berturut-turut dalam  $H_2SO_4$  dan NaOH. Tujuan penambahan  $H_2SO_4$  yaitu untuk menguraikan senyawa N didalam pakan atau menghidrolisis makanan yang terkandung dalam sample, sedangkan untuk penambahan NaOH untuk menguraikan lemak dalam pakan sehingga mudah larut.

Dari data yang diperoleh untuk daya serap air (%) (Tabel 8) dapat dilihat bahwa daya serap air yang paling tertinggi terdapat pada konsentrasi asam asetat 0,8% yaitu sebesar 50% dan yang terendah terdapat pada konsentrasi asam asetat 0,2% yaitu sebesar 10%. Daya serap air merupakan kemampuan bahan dalam

menyerap air. Serat makanan yang baik mempunyai kemampuan-kemampuan menyerap air yang baik pula karena didalam tubuh akan menyerap komponen-komponen yang tidak penting bagi tubuh. Pada penggunaan konsentrasi asam yang lebih kecil, ukuran partikel serat yang akan dihasilkan akan semakin kecil dan kemampuannya untuk mengikat air akan semakin rendah sejalan dengan ukuran partikel serat. Penggunaan konsentrasi asam yang tinggi dapat memutuskan ikatan hydrogen dengan lebih cepat dan menghasilkan struktur serat yang renggang sehingga daya serap air yang tinggi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampel kulit pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) dapat dijadikan serat makanan dengan proses ekstraksi menggunakan konsentrasi asam asetat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kulit pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja) dapat dibuat serat makanan.
2. Konsentrasi asam asetat 0,8 % merupakan konsentrasi yang paling berkualitas dalam pembuatan serat makanan dari limbah kulit pisang (*Musa paradisiaca* Var. Raja).
3. Menurut Islam Pisang merupakan salah satu tumbuhan yang diciptakan oleh Allah dan memiliki banyak manfaat baik itu dari daun, kulit buah, akar dan batang. Manfaat dari kulit buah pisang, yaitu dapat dijadikan serat makanan. Dimana, dalam kulit pisang terdapat senyawa pektin yang bermanfaat sebagai penurunan kolesterol.

#### ***B. Saran***

Sebaiknya dilakukan penelitian dari limbah lain yang dapat menghasilkan serat makanan sebagai pemanfaatan limbah dalam masyarakat.

## KEPUSTAKAAN


- Afrianti. *Pati Termodifikasi Dibutuhkan Industri Makanan*. 2002
- Ahwange B.A et.al. *Nutrient Composition And Sensory Evaluation Of Ripe Banana Slice and Bread Prepared from Ripe Banana*. Agriculture Food Chemistry, 2009
- Apriyantono, A., D. Fardiaz., N.L. Puspitasari., Sedarnawati. *Petunjuk Laboratorium Analisis Pangan. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan Dan Gizi*. Bogor; Institute Pertanian Bogor, 1989.
- Astawan, M dan Wahyuni. *Teknologi Pengolahan Pangan Nabati Tepat Guna*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1991.
- Atun, et. al. *Identification And Antioxidant Activity Test Of Some Compunds From Methanol Extract Peel Of Banana (Musa Paradisiaca)*. Indonesian Jurnal Of Chemistry, 2007.
- Baliwati Y.F, Khomsam dan Dwiriani. *Pengantar Pangan Dan Gizi*. Jakarta; Penebar Swadaya, 2004..
- Cahyono. *Potensi Pengembangan Budaya Dan Peluang Agribisnis Pisang . Ketahanan Pangan Dan Agribisnis*. Sumatera Utara; PSE, 2009.
- Clara M. Kusharto. *Serat Makanan Dan Peranannya Bagi Kesehatan*. IPB; Bogor, 2006.
- Daniells dkk. *Budidaya Pisang*. Jakarta; Penebar Swadaya, 2010.
- Deddy Muchtadi. *Sayuran Sebagai Sumber Serat Pangan Untuk Mencegah Timbulnya Penyakit Degeneratif*. Bogor; IPB, 2001.
- Departemen Kesehatan, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Depkes RI, 2000.
- Dirjen Pom. *Farmakoterapi Indonesia Edisi IV*. Jakarta; Departemen Kesehatan RI, 1995
- Fairudz, Alyssa dan Khairun Nisa. *Pengaruh Serat Pangan terhadap Kadar Kolesterol Penderita Overweight*. Lampung; Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2015


- Farida Hanum. *Ekstraksi Pektin Dari Kulit Buah Pisang Raja*. Universitas Sumatera Utara; Sumatera, 2012.
- Ferawalden Sinaga. *Studi Pembuatan Serat Makanan Dari Tongkol Jagung*. Sumatera; Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Ferdiaz S. *Mikrobiologi Pangan*. Bogor; IPB, 1989.
- Gembong Tjitrosoepomo. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta; UGM Press, 2001.
- Hanifah, N. *Kajian Sifat Fisik Kimia Dan Organoleptik Pektin Kulit Pisang Dari Beberapa Varieta Dan Tingkat Kematangan*. Jakarta; Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia, 2002.
- Harper, L.J and J.A. Driskel, *Pangan, Gizi Dan Pertanian*. Terjemahan Suhardji. Jakarta; UI-Press, 1986.
- Hazal, Ozyurt, et al. *Effect Of Food Processing On The Physicochemical Properties Of Dietary Fibre*. Turkey; Faculty of Engineering, 2016
- Hutagalung, H. *Karbohidrat*. Sumatera; Bagian Ilmu Gizi Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan terjemahan perkata*. Bandung; Sygma, 2007
- Laksmi, B.S. *Sanitasi Dalam Industry Pangan*. Bogor; IPB Press, 1987.
- Olwin Nainggolan dan Cornelis Adimunca,. *Diet Sehat Dengan Serat*. Jakarta; Depkes RI, 2005
- Oxtoby, D.W., H.P. Gilis and N.H. *Prinsip-prinsip Kimia Modern*. Terjemahan S.S Achmadi. Jakarta; Erlangga, 2003.
- Pantastico, ER.B. *Fisiologi Pasca Panen Penanganan Dan Pemanfaatan Buah-Buahan Dan Sayur-Sayuran Tropika Dan Sub Tropika*. Terjemahan Kamariyani. Yogyakarta; UGM Press, 1993.
- Riana,. *Nutrisi Pisang*, Jakarta; Penebar Swadaya, 2000.
- Santoso, Agus. *Serat Pangan (Dietary Fiber) Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan*. Unwidha Klaten. Fakultas Teknologi Pertanian. 2011
- Satuhu.S. *Penanganan Dan Pengolahan Buah*. Jakarta; Penebar Swadaya, 1996.
- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta; Lantera Hati, 2002

- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 6*. Jakarta; Lantera Hati, 2002
- Siagian A. *Serat makanan*. Jakarta; Penebar Swadaya, 2003.
- Soebardjo, et al. *Penerapan Teknologi Pengolahan Serat*. Bogor; BPPIHP, 1988.
- Someya, dkk. *Antioxidants Compounds From Bananas*, Food Chemistry, 2002.
- Susmiati, *Peran Serat Makanan Dari Aspek Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Dan Terapi Penyakit*. FK Universitas Andalas, 2006
- Tala, Zaimah. *Manfaat Serat Bagi Kesehatan*, Sumatera; FK USU , 2009.
- Trowel H. *Ishemic Heart Disease and Dietary Fiber*. Am J Clin Fiber Intake, 1972
- Wahyu. *Pembuatan Tepung Agar-agar Rumpun Laut*. Jakarta; Trubus, 1990.
- Winarno, F.G. *Gizi, Teknologi Dan Konsumen*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1993.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Pembuatan Serat Makanan





## Lampiran 2. Perhitungan

### 1. Rendamen (%)

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

#### a. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{6,226}{50} \times 100 \% = 12,452 \%$$

#### b. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{6,244}{50} \times 100 \% = 12,488 \%$$

#### c. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{6,628}{50} \times 100 \% = 13,256 \%$$

#### d. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{6,784}{50} \times 100 \% = 13,568 \%$$

### 2. Penentuan Kadar Air (%)

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

#### a. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,77}{2} \times 100 \% = 11,5 \%$$

#### b. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,92}{2} \times 100 \% = 4,0 \%$$

#### c. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,95}{2} \times 100 \% = 2,5 \%$$

#### d. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,96}{2} \times 100 \% = 2 \%$$

## 3. Kadar Abu (%)

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{berat abu}}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

a. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{0,0015}{2} \times 100 \% = 0,075 \%$$

b. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{0,0018}{2} \times 100 \% = 0,09 \%$$

c. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{0,0023}{2} \times 100 \% = 0,115 \%$$

d. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{0,0025}{2} \times 100 \% = 0,125 \%$$

## 4. Daya Serap Air (%)

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{\text{berat endapan} - \text{berat sampel}}{\text{berat air}} \times 100 \%$$

a. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{1,0 - 0,5}{5} \times 100 \% = 10 \%$$

b. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{1,4 - 0,5}{5} \times 100 \% = 18 \%$$

c. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{1,12 - 0,5}{5} \times 100 \% = 12,4 \%$$

d. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{3,0 - 0,5}{5} \times 100 \% = 50 \%$$

## 5. Kadar Serat Kasar (%)

$$\text{Kadar serat kasar (\%)} = \frac{\text{kadar serat kasar}}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

a. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar serat kasar (\%)} = \frac{0,88}{2} \times 100 \% = 44 \%$$

b. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar serat kasar (\%)} = \frac{0,91}{2} \times 100 \% = 45 \%$$

c. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar serat kasar (\%)} = \frac{0,92}{2} \times 100 \% = 46 \%$$

d. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar serat kasar (\%)} = \frac{1,89}{2} \times 100 \% = 94,5 \%$$

**Lampiran 3. Gambar**

Gambar 2. Kulit Pisang ( *Musa paradisiaca* )



Gambar 3. Hasil Serat Makanan



Gambar 4. Hasil pengamatan penentuan kadar Abu



Gambar 5. Hasil pengamatan kadar air



Gambar 6. Hasil pengamatan daya serap air



Gambar 7. Hasil Pengamatan pada serat kasar

## BIOGRAFI

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Andi Arnisa di lahirkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober 1995, adalah anak Kedua dari 2 bersaudara pasangan dari bapak H. Akhyar dan ibu Hj. Andi Hasriana. Pendidikan TK yang ditempuh di TK Ananda, dan melanjutkan pendidikan dasar yang ditempuh di SDN. Negeri 166 Bira, Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba (2001-2007). Kemudian pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMP Negeri 3 Bulukumba (2007-2010). Pendidikan tingkat menengah ( sederajat) ditempuhnya di SMA Negeri 3 Bulukumba (2010-2013). Lalu dilanjutkan menempuh program sarjana Farmasi (S.Farm) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013 sampai sekarang).

Setelah lulus dari SMA dia berambisi untuk melanjutkan kuliah di Universitas yang ia inginkan dengan jurusan Farmasi tetapi sangat disayangkan ia tidak lulus dalam SNMPTN 2013. Dia tidak berputus asa, karena masih ada pendaftaran pada jalur SBMPTN, dia mendaftar di Universitas Islam Negeri dengan jurusan Farmasi, dan kemudian dia diterima(lulus) di perguruan tinggi tersebut.Pada waktu itu universitas yang diinginkan nya yaitu UIN alauddin makassar jurusan farmasi dan atas kehendak Allah SWT akhirnya ia lulus di universitas tersebut dan sampai sekarang menjalani proses perkuliahan di kampus PERADABAN tersebut.