

UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK EKSTRAK DAUN BIDARA (*Ziziphus spina-christi* L.) TERHADAP MENCIT JANTAN (*Mus Musculus*)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FAUZIAH NUGRAHWATI

70100112089

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Nugrahwati
NIM : 70100112089
Tempat/TanggalLahir : Ujung Pandang/25 November 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Asrama Haji Pondok Asri 2 A3/1.
Judul : Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) Terhadap Mencit Jantan (*Mus Musculus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAUZIAH NUGRAHWATI
NIM. 70100112089

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad saw. yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Badollahi dan Ibunda Hafsah yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau dan buat keluarga saudaraku tercinta serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan Kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan sekaligus pembimbing pertama penulis yang dengan sabar telah memberi banyak saran dan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Nurshalati Tahar S.farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Munifa Wahyuddin, S.farm., M.Sc, Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Dr. Supardin., M.Hi. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
10. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. Apt. selaku penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis.
11. Karlina Amir Tahir, S.Si.,M.Si.,Apt. pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
12. Seluruh dosen jurusan Farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboran Zoologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Dinda Musdalifah, A.Rahmi Azhariyani, Istiqamah, Eka Safitri, Andi Tantri Nurul Mukmin, Miftah Ulfah Shaleh, Nurul Hikmah Ashri, Dewi Ratih Dahlan, Nurul azizah, Anitsah Fiqardina, Nurul Wahidah Amir, Amhar Jamil, Aswin Khaliq Syam yang membuat banyak warna dalam hidupku, Selalu kompak dan Selalu Ceria dalam menghadapi setiap permasalahan yang di hadapi.

15. Teman-teman seperjuangan angkatan “Isohidris 2012” yang telah banyak membantu penulis, terkhusus buat mantan anggota kelas Farmasi C (Hakul, Ikhfa, Samday, Novi, Husnul, Herma, Mega, Ani, Hanik, Dinda, Mega, Hamida, Salmia, Putri, Zulfi, Mani’ah, dilah, dan teman lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu) terima kasih untuk semua bantuan, kekompakan, kebersamaan, dan kerjasamanya dalam meniti pendidikan dalam jenjang Sarjana Semoga Kelak nanti kita semua menjadi seorang Farmasis yang menjunjung tinggi Keikhlasan dan Kejujuran dalam bekerja.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, November 2016

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAUZIAH NUGRAHWATI

NIM : 70100112089

DAFTAR ISI


JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Uraian Tanaman.....	8
1. Klasifikasi tanaman.....	8
2. Nama Daerah.....	8
3. Morfologi.....	8

4. Kandungan Kimia	9
5. Kegunaan	9
B. Uraian Hewan Coba	10
1. Klasifikasi Mencit.....	10
2. Morfologi	10
C. Uraian Ekstraksi.....	12
1. Pengertian Ekstraksi	12
2. Mekanisme Ekstraksi	12
3. Maserasi	13
D. Demam	16
1. Pengertian Demam.....	16
2. Mekanisme Demam	17
3. Penyebab Demam	17
4. Penerapan Klinis	18
5. Macam-macam Demam	19
E. Mekanisme Antipiretik	21
1. Penatalaksanaan Demam	21
2. Terapi Non Farmakologi	22
3. Terapi Farmakologi	22
F. Paracetamol (Asetaminofen)	23
1. Farmakokinetik	23
2. Farmakodinamik	23

3. Efek Samping	24
4. Dosis	24
5. Interaksi	24
G. Pandangan Islam Tentang Tanaman Obat	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi Sampel	34
C. Instrumen Penelitian	34
1. Alat	34
2. Bahan	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Penyiapan Sampel	35
F. Prosedur Kerja	35
1. Ekstraksi Sampel	35
2. Uji Aktivitas Antipiretik	36
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
KEPUSTAKAAN	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	
1. Skema Kerja Penyiapan Sampel	49
2. Skema Kerja Pembuatan Larutan Koloidal Na-CMC 1%	50
3. Skema Kerja Uji Aktivitas Antipiretik	51
Lampiran 2	
Perhitungan Dosis.....	52
Lampiran 3	
1. Gambar Proses Maserasi Sampel	53
2. Gambar Proses Penyaringan Sampel	53
3. Gambar Proses Evaporasi Sampel	53
4. Gambar Ekstrak Etanol Daun Bidara	54
5. Gambar Hewan Coba	54
6. Gambar Penimbangan Hewan Coba	54
7. Gambar Pengukuran Suhu Rektal Hewan Coba	55
8. Gambar Proses Pemasukan Obat Dalam Tubuh Hewan Coba	55
9. Gambar Termometer Digital	55
10. Gambar Daun Bidara	56
11. Gambar Pohon Bidara.....	56
Lampiran 4	
Hasil Perhitungan Penurunan Suhu Rektal Mencit	57

Hasil Analisis SPSS	58
Uji Tes Homogeniti Farian	59
Uji Anova	59
Tukey HSD Sebelum Induksi	60
Tukey HSD Setelah Induksi	60
Tukey HSD Waktu 30 Menit	61
Tukey HSD Waktu 60 Menit	61
Tukey HSD Waktu 90 Menit	62
Tukey HSD Waktu 120 Menit	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Biologis Mencit	10
2. Hasil Analisa Pengukuran Penurunan Suhu Rektal Mencit	38
3. Uji ANOVA	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Proses Maserasi Sampel	53
2. Gambar Proses Penyaringan Sampel	53
3. Gambar Proses Evaporasi Sampel	53
4. Gambar Ekstrak Etanol Daun Bidara	54
5. Gambar Hewan Coba	54
6. Gambar Penimbangan Hewan Coba	54
7. Gambar Pengukuran Suhu Rektal Hewan Coba	55
8. Gambar Proses Pemasukan Obat Dalam Tubuh Hewan Coba	55
9. Gambar Termometer Digital	55
10. Gambar Daun Bidara	56
11. Gambar Pohon Bidara.....	56

ABSTRAK

Nama : Fauziah Nugrahwati

Nim : 70100112089

Judul : Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) Terhadap Mencit Jantan (*Mus Musculus*)

Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai obat penyembuh demam. Pada penelitian ini akan dilakukan studi eksperimen untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) sebagai antipiretik.

Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit (20-30g) dibagi atas 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif diberi NaCMC, sebagai kontrol positif berturut-turut diberi paracetamol 47,073 mg/kg bobot badan, kelompok perlakuan 1, 2, 3 diberi ekstrak daun bidara pada konsentrasi berturut-turut 100, 150, dan 200mg. Suhu mencit diukur sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan termometer digital, kemudian diinduksi dengan pepton 5%. Penurunan suhu diamati setiap 30 menit sekali selama 2 jam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek antipiretik ekstrak etanol daun bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) pada menit ke-30 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata ($p > 0,05$), tetapi pada menit ke-60, 90, dan 120 hasil yang berbeda nyata ($p < 0,05$) dimana dosis yang digunakan dalam menurunkan suhu tubuh adalah 100, 150 dan 200 mg/BB mencit.

Kata kunci : Daun bidara, Antipiretik, *Mus Musculus*, Aktivitas, Pepton, Demam

ABSTRACT

Name : Fauziah Nugrahwati

Nim : 70100112089

Title : Antipyretic Activity Test Leaf Extract Bidara(*Ziziphusspina-christi* L.)
Against Male mice(*Musmusculus*)

The leaves bidara (*Ziziphusspina-christi* L.) hang long known by the public as a healer to fever. In this research will be conducted the study experiments to know the leaf extract bidara (*Ziziphusspina-christi* L.) as antipiretik.

This study used 15 mice (20-30g) were divided into 5 groups: negative control group was given NaCMC, as a positive control in a row was given paracetamol 47,073 mg / kg body weight, group 1, 2, 3 were given the leaf extract at a concentration bidara respectively 100, 150 and 200mg. The temperature of the mice was measured before and after treatment using a digital thermometer, then diinduksi with 5% peptone solution. This drop in temperature is observed every 30 minutes for 2 hours.

The results showed that the antipyretic effect of ethanol extract of leaves bidara(*Ziziphusspina-christi* L.) in the 30th minute show results that are not significantly different ($p > 0.05$), but the minute 60, 90, and 120 results were significantly different ($p < 0.05$) in which doses are best at lowering body temperature is 200 mg / BB mice.

Keyword: Bidara, Antipyretic, *Mus musculus*, Activity, Peptone, Fever

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki ribuan jenis tumbuhan yang tersebar di berbagai daerah. Keanekaragaman hayati yang ada tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat modern dan tradisional. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan memakai obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit. Semakin mahalnya harga obat modern dipasaran merupakan salah satu alasan untuk menggali kembali penggunaan obat tradisional. Banyak jenis tanaman obat di Indonesia yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, sebagian spesies tanaman tersebut bahkan telah diuji secara klinis kandungan fitokimia, khasiat dan keamanan penggunaannya (Akhyar, 2010: 1).

Penelitian ilmiah tentang obat-obatan tradisional di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea, Cina dan India. Akibatnya perkembangan obat tradisional ditanah air tidak terlampau pesat. Pemakainya hanya sebatas kalangan tertentu. Selain itu, obat tradisional juga belum bisa sepenuhnya diterima oleh kalangan medis. Pada zaman dahulu, obat tradisional dikonsumsi dalam kondisi segar dan masih diolah dengan cara sangat sederhana. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat terhadap ramuan tradisional juga masih tinggi karena saat itu belum banyak obat-obatan kimia yang diproduksi seperti sekarang. Sementara itu, alasan pemakaian obat tradisional saat ini lebih disebabkan semakin tingginya harga obat buatan pabrik yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat (Prapanza, Ivan 2011: 1).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian. Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan dalam al-qur'an mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Thalbah, 2009).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga telah banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Thalbah, 2009).

Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat adalah bidara. Di India masyarakat menggunakan bidara sebagai obat diare, kencing manis, demam dan malaria sedangkan di Malaysia rebusan kulit kayunya dimanfaatkan sebagai obat sakit perut dan sebagian masyarakat lagi menggunakan daun bidara untuk mengatasi masalah kecantikan seperti mengatasi jerawat, keriput dan lingkaran hitam pada bawah mata.

Secara empiris daun Bidara biasa digunakan sebagai obat penurun demam, namun belum ada penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian tentang “Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Daun Bidara

(*Ziziphus spina-christi* L.) Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) dari berbagai konsentrasi ekstrak bidara.

Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian untuk obat baru yang efektif dan relatif lebih aman. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggali dan mengembangkan obat tradisional terutama yang berasal dari alam karena Indonesia memiliki beranekaragam tanaman yang berkhasiat obat dan banyak yang belum diteliti secara ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) memiliki aktivitas sebagai Antipiretik?
2. Berapakah dosis ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) yang memiliki aktivitas sebagai Antipiretik?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Bidara adalah tumbuhan pohon dengan tinggi sampai dengan diameter yang diperoleh dari kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut. Ekstrak Etenol merupakan sediaan pekat yang diperoleh dari penarikan zat aktif menggunakan pelarut etanol.
 - c. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu.

- d. Demam merupakan suatu keadaan dimana suhu tubuh meningkat di atas 37°C. Demam adalah suatu respon pertahanan tubuh terhadap substansi asing yang masuk kedalam tubuh dan umumnya disebabkan oleh bakteri dan virus. Mencit jantan (*Mus musculus*) adalah mencit yang biasa digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium pada penelitian ini.
- e. Hewan coba atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik.
- f. Induksi adalah influensi, imbasan atau yang menyebabkan. Dalam penelitian ini induksi pepton merupakan tindakan atau proses merangsang atau menyebabkan terjadinya demam pada mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan coba.
- g. Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan demam (suhu tubuh yang tinggi).
- h. Rektal adalah cara penggunaan obat yang diberikan melalui lubang pada tubuh seperti anus atau lubang kencing.
- i. Oral adalah cara penggunaan obat yang diberikan melalui mulut.
- j. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menentukan pengaruh ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) terhadap penurunan suhu tubuh mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi pepton, dengan mengamati perubahan suhu rektal mencit yang telah dijadikan preperat setelah melalui beberapa perlakuan.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian Syilfia Hasti dkk dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru (2012) dengan judul uji efek antipiretik ekstrak etanol, fraksi *n*-heksana dan fraksi etil asetat daun beringin (*Ficus benjamina* L.) pada tikus jantan (*Rattus norvegicus*). Adapun hasil yang didapat dari 4 kg daun segar Beringin yang dimaserasi dengan etanol 96% diperoleh ekstrak kental 435,602 g dengan rendemen 10,89%. Dari fraksi *n*-heksana dan fraksi etil asetat berturut-turut 49,7033 g (2,706%) dan 1,4532 g (0,09%). Ekstrak etanol dan fraksi etil asetat daun Beringin yang diujikan pada tikus putih jantan dengan dosis 100, 200 dan 400 mg/kg BB dan fraksi *n*-heksana dosis 100 dan 200 mg/kg BB tidak memiliki efek sebagai antipiretik. Fraksi *n*-heksana daun Beringin yang diujikan pada tikus putih jantan dengan dosis 400 mg/kg BB memiliki efek sebagai antipiretik.

2. Berdasarkan penelitian dari Siwi Hastuti dan Susi Endrawati (2016), Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia, Sukoharjo, Jawa Tengah, Program Study Farmasi dengan judul Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etil Asetat Daun Seligi (*Phyllanthus buxifolius* Muell.Arg) Pada Mencit Jantan Galur Swiss. Adapun hasil yang didapat yaitu Ekstrak etil asetat daun seligi dosis 100, 200 dan 400mg/kg BB menunjukkan daya antipiretik berturut-turut adalah $18,77 \pm 1,99$, $24,81 \pm 4,34$ dan $35,39 \pm 2,84$ %. Namun, daya antipiretik sediaan uji masih lebih rendah dibanding kontrol positifnya yaitu parasetamol dosis 91 mg/kgBB yang mempunyai daya antipiretik sebesar $50,38 \pm 6,90$ %. Analisis statistik menunjukkan bahwa parasetamol dosis 91 mg/kgBB dengan ekstrak seligi semua dosis dan ekstrak seligi 400 mg/kgBB dengan ekstrak seligi 100mg/kgBB terdapat perbedaan yang signifikan. Pada ekstrak seligi 400 mg/kgBB

dengan ekstrak seligi 200 mg/kgBB dan ekstrak seligi 200 mg/kgBB dengan dosis ekstrak seligi 100 mg/kgBB tidak ada beda yang signifikan.

3. Berdasarkan penelitian dari Stefany Kalay dkk (2014), FMIPA UNSRAT Manado Program Study Farmasi dengan judul Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Prasman (*Eupatorium Triplinerve* Vahl.) Pada Tikus Jantan Galur Wistar (*Rattus Norvegicus* L.) Yang Diinduksi Vaksin Dtp Hb. Dari hasil penelitian diperoleh hasil data yang telah dilakukan uji anova, didapat nilai signifikan = 0,02 (sig<0,05) hal ini berarti terdapat perbedaan yang bermakna antara kelima kelompok perlakuan. Pengambilan keputusan untuk memilih hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak didasarkan pada perbandingan F hitung dan F tabel, dengan syarat jika F hitung kurang dari F tabel maka tolak H1 dan terima H0 dan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan diterima H1. Dari hasil uji *one way anova* pada rata-rata suhu rektal tikus diperoleh nilai F hitung 7,296 dengan tingkat signifikan 0,02. Jika dibandingkan dengan F tabel, perhitungan pada V1 menggunakan jumlah varian (perlakuan) dikurangkan 1 ($5-1 = 4$) diperoleh nilai 4 dan V2 diperoleh dengan menggunakan jumlah sampel (20) dikurangkan jumlah varian (5), sehingga diperoleh nilai 15. Pada titik inilah diperoleh F tabel bernilai 3,06 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ($7,296 > 3,06$) dan hipotesis yang diterima adalah H1 yaitu ekstrak etanol daun Prasman dengan dosis 0,03 g/KgBB, 0,06 g/KgBB, 0,12 g/KgBB mempunyai efek antipiretik.

Penelitian tentang uji aktivitas antipiretik pada daun Bidara belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga pada penelitian ini akan dilihat hasilnya apakah ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) memiliki aktivitas antipiretik.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.).
- b. Mengetahui dosis ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) yang memiliki aktivitas antipiretik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif dalam pengobatan demam .
- b. Meningkatkan penggunaan ekstrak tumbuhan untuk pengobatan.
- c. Menambah informasi tentang khasiat penggunaan daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.).



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi (Gembong, 2010: 19).

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Bangsa	: Rosales
Suku	: Rhamnaceae
Marga	: Ziziphus
Jenis	: <i>Ziziphus spina-christi</i> L.

2. Nama Daerah

Bidara atau widara (*Ziziphus spina-christi* L.) tumbuh di Indonesia. Dikenal pula dengan berbagai nama daerah seperti **Jawa:** widara atau dipendekkan menjadi dara. **Madura:** bukul. **Bali:** bekul. **NTT:** sawu, rote, kom, kon. **Makassar:** bidara. **Bima:** rangka. **Sumba:** kalangga (Heyne, K. 1987: 18).

3. Morfologi

Bidara adalah sejenis pohon kesil yang selalu hijau, penghasil buah yang tumbuh didaerah afrika utara dan tropis serta Asia Barat, Tumbuh di Israel di lembah-lembah sampai ketinggian 500m. Khususnya di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) (Heyne, 1987: 1270).

Tanaman ini berasal dari Timur Tengah dan telah menyebar di wilayah Tropik dan sub tropik, termasuk Asia Tenggara. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan

berbagai kondisi, tetapi tumbuhan ini lebih menyukai udara yang panas dengan curah hujan berkisar antara 125 mm dan di atas 2000 mm. Suhu maksimum agar dapat tumbuh dengan baik adalah 37-48C, dengan suhu minimum 7-13C. tanaman ini umumnya ditemukan pada daerah dengan ketinggian 0-1000 m dpl (Dahiru, 2010: 10).

4. Kandungan Kimia

Ziziphus spina-christi L. hanya tiga dari kandungan kimia yang meliputi polifenol, saponin dan tanin. Sterol seperti, sitosterol, Terpenoid, pitosterol, triterpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid, glikosida dan tanin (Chang, 2002: 179).

Kandungan senyawa kimia yang berperan sebagai pengobatan dalam tanaman bidara antara lain alkaloid, fenol, flavanoid, dan terpenoid (Adzu dkk, 2001: 1317).

Tanaman Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*) memiliki kandungan fenolat dan flavanoid yang kaya akan manfaat. Senyawa fenolat adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi, senyawa yang berasal dari tumbuhan yang memiliki cirri sama, yaitu cincin aromatic yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil (Harbon, 1987: 13).

5. Kegunaan

Kandungan fenolat pada tanaman bidara kaya akan mafaat biologis antara lain; antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antifungi dan mencegah timbulnya tumor (Prior, 2003: 78).

Khasiat bidara untuk melindungi sel DNA manusia yang disebabkan oleh kerusakan dari radiasi actinic diuji menggunakan alat tes kontrol dimodifikasi oleh Regentec, spin dari perusahaan riset dari Universitas Nottingham (Abdel-Galil F.M, 1991: 1348).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Mencit (Malole, 1989: 5).

Kingdom	: Animalia
Divisi	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Sub Kelas	: Theria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus Musculus</i>

2. Morfologi

Mencit adalah hewan pengerat yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole, 1989: 5).

Tabel 1. Nilai Fisiologis Mencit (Malole, 1989: 6).

- Berat badan	
- Jantan	20-40 g
- Betina	25-40 g
- Luas permukaan tubuh	20 g : 36 cm ²
- Temperatur tubuh	36,5-38,0°C
- Jumlah diploid	40
- Harapan hidup	1,5-3,0 tahun
- Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari

- Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
- Mulai dikawinkan :	
- Jantan	50 hari
- Betina	50-60 hari
- Lama hamil	19-21 hari
- Umur sapih	21-28 hari
- Jumlah anak perkelahiran	10-12 ekor
- Jumlah pernapasan	94-163/menit
- Detak jantung	325-780/menit
- Volume darah	76-80 mg/Kg
- Tekanan darah	113-147/81-106 mmHg
- Siklus birahi	4-5 hari (polyestrus)
- Glukosa dalam darah	62-175 mg/dl
- Kolesterol	26-82 mg/dl
- Kalsium dalam serum	3,2-9,2 mg/dl
- Phosphat dalam serum	2,3-9,2 mg/dl
- Suhu rektal	35-39°C (rata-rata 37,4°C)
- Butir darah merah	7,0-12,5x10 ⁶ mm ³
- Hematokrit	39-49%
- Hemoglobin	10,2-16,6 mg/dl
- Butir darah putih	6-15x10 ³ /mm ³
- Neutropil	10-40%
- Lymphosit	55-95%
- Eosinophil	0-4%

- Monosit	0,1-3,5%
- Basophil	0-0,3%
- Platelet	160-410x10 ³ /mm ³
- Protein serum	3,5-7,2 g/dl
- Albumin	2,5-4,8 g/dl
- Globulin	0,6 g/dl
- Nitrogen dalam urea darah	17-28 mg/dl

C. Uraian Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses melarutkan komponen-komponen kimia yang terdapat dalam suatu sampel dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan komponen yang diinginkan. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan masa komponen zat padat ke dalam dan perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian terdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1986: 4).

Dari hasil ekstraksi diperoleh ekstrak. Ekstrak adalah sediaan cair yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

2. Mekanisme Ekstraksi

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar

sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM, 1986: 5).

Pada proses ekstraksi dapat dibedakan menjadi 2 fase yaitu:

- a. Fase pembilasan. Pada saat cairan ekstraksi kontak dengan material simplisia maka sel-sel yang rusak atau tidak utuh lagi akibat operasi penghalusan langsung bersentuhan dengan bahan pelarut. Dengan demikian komponen sel yang terdapat di dalamnya lebih mudah diambil atau dibilas. Oleh karena itu, dalam fase pertama ekstraksi ini, sebagian bahan aktif telah berpindah ke dalam bahan pelarut. Semakin halus serbuk simplisia, akan semakin optimal proses pembilasannya.
- b. Fase ekstraksi. Membran sel yang mengering, mengkerut di dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan bahan pelarut masuk ke bagian dalam sel. Hal itu terjadi melalui pembengkakan, dimana membran mengalami pembesaran volume akibat masuknya sejumlah molekul bahan pelarut. Dengan mengalirnya bahan pelarut ke dalam ruang sel, protoplasma akan membengkak dan bahan kandungan sel akan terlarut sesuai dengan tingkat kelarutannya. Bahan kandungan sel akan terus masuk ke dalam cairan disebelah luar sampai difusi melintasi membran mencapai keseimbangannya yakni pada saat konsentrasi antara larutan di sebelah dalam dan sebelah luar sel sama besar (Voigt, 1995: 562-564).

3. Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif,

zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari. Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan diluar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel (Dirjen POM, 1986: 10).

Menurut (Fachruddin, 2001: 20) maserasi umumnya dilakukan dengan cara memasukkan simplisia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring ke dalam wadah penampung kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan.

Maserasi dapat dilakukan modifikasi misalnya:

1. Digesti

Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40° - 50° C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap panas.

Dengan pemanasan akan memperoleh keuntungan antara lain:

- a. Kekentalan pelarut akan berkurang, yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas.
 - b. Daya melarutkan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan.
 - c. Koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi.
- Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan.

Jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka, perlu dilengkapi dengan pendingin balik, sehingga cairan penyari yang menguap akan kembali ke dalam bejana.

2. Maserasi dengan mesin pengaduk

Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.

3. Remaserasi

Cairan penyari dibagi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama., sesudah diendapkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.

4. Maserasi melingkar

Maserasi dapat diperbaiki dengan menguasahkan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini penyari selalu mengalir kembali secara

berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Keuntungan cara ini:

- a. Aliran cairan penyari mengurangi lapisan batas
- b. Cairan penyari akan didistribusikan secara seragam, sehingga akan memperkecil kepekatan setempat.
- c. Waktu yang diperlukan lebih pendek.

5. Maserasi melingkar bertingkat

Pada maserasi melingkar penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat (Dirjen POM, 1986: 10).

D. Demam

1. Pengertian Demam

Demam merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan suhu di atas normal. Bila diukur pada rectal suhunya mencapai $> 38^{\circ}\text{C}$, jika diukur pada oral, suhunya di atas $37,8^{\circ}\text{C}$ dan jika diukur melalui aksila suhunya di atas $37,2^{\circ}\text{C}$ (99°F). (Schmitt, 1984). Sedangkan menurut NAPN (*National Association of Pediatrics Nurse*) disebutkan bahwa demam terjadi bila bayi yang berumur kurang dari 3 bulan memiliki suhu rectal melebihi 38°C , pada anak dengan umur lebih dari 3 bulan suhu aksila dan oralnya lebih dari $38,3^{\circ}\text{C}$.

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang, misalnya terhadap toksinbakteri, peradangan, dan rangsangan pirogenik lain. Bila produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas yang dapat ditoleransi

maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara keseluruhan , tetapi bila telah melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini membahayakan tubuh. Batas kritis sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini belum diketahui secara pasti karena sangat sulit melakukan penelitian mengenai hal tersebut (Sherwood, 2001: 6).

2. Mekanisme Demam

Demam terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangasangan pirogenik, maka monosit, makrofag, dan sel-sel Kupffer mengeluarkan suatu zat kimia yang dikenal sebagai pirogen endogen IL-1 (*Interleukin 1*), TNF α (*Tumor Necrosis Factor α*), IL-6 (*Interleukin 6*), INF (*Interferon*) yang bekerja pada pusat termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan patokan thermostat. Hipotalamus memepertahankan suhu di titik patokan yang baru dan bukan di suhu normal. Sebagai contoh, pirogen endogen meningkatkan titik patokan menjadi 38,9°C, hipotalamus merasa bahwa suhu normal prademam sebesar 37°C sudah terlalu dingin untuk suhu tubuh, sehingga organ ini memicu mekanisme-mekanisme respon dingin untuk meningkatkan suhu tubuh. (Ganong, 2002: 8).

Berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan suhu tubuh berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang. Rangsangan endogen seperti eksotoksin dan endotoksin menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen diantaranya, IL-1 dan TNF α , selain IL-6 dan IFN. Pirogen endogen ini akan bekerja pada system saraf pusat tingkat OVLT (*Organum Vasculosum Laminae Terminalis*) yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nucleus preoptik, hipotalamus anterior, dan septum palusolum. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E2 melalui metabolisme asam arakidonat jalur

COX-2 (*Cyclooxygenase 2*), dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh yang biasa disebut dengan istilah demam (Nelwan dan Sudoyo, 2006: 407).

3. Penyebab Demam

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam adalah respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. Demam bisa juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan (*Overhating*), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan system imun (Lubis, 2009: 33).

4. Penerapan Klinis

Demam pada anak dapat diukur dengan menempatkan thermometer ke dalam rektal, mulut, telinga, serta dapat juga di ketiak segera setelah air raksa diturunkan, selama satu menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca (Corwin, 2007: 160)

Menurut AAP (*American Academy of Pediatrics*) tidak mengajurkan lagi penggunaan thermometer kaca berisi merkuri karena kebocoran merkuri dapat berbahaya bagi anak dan juga meracuni lingkungan.

Pengukuran suhu mulut aman dan dapat dilakukan pada usia di atas 4 tahun, karena sudah dapat bekerjasama untuk menahan thermometer di mulut. Pengukuran ini juga lebih akurat dibandingkan dengan suhu ketiak (*aksila*). Pengukuran aksila mudah dilakukan, namun hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut kurang akurat. Pengukuran suhu tubuh melalui rectal cukup akurat karena lebih mendekati suhu tubuh yang sebenarnya dan paling

sedikit terpengaruh oleh suhu lingkungan, namun pemeriksaannya tidak nyaman bagi anak-anak (Faris, 2009). Pengukuran suhu melalui telinga (*Infrared Tympanic*) tidak dianjurkan karena dapat memberikan hasil yang tidak akurat sebab liang telinga masih sempit dan basah (Corwin, 2007: 160).

Pemeriksaan suhu tubuh dengan perabaan tangan tidak dianjurkan karena tidak akurat sehingga tidak dapat mengetahui dengan cepat jika suhu mencapai tingkat yang membahayakan. Pengukuran suhu inti tubuh yang merupakan suhu tubuh yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mengukur suhu di dalam tenggorokan atau pembuluh arteri paru. Namun hal ini sangat jarang dilakukan karena terlalu invasif (Corwin, 2007: 161).

Adapun kisaran nilai normal suhu tubuh adalah :

- a. Suhu oral, antara $35,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$
- b. Suhu aksila, antara $34,7^{\circ}\text{C} - 37,3^{\circ}\text{C}$
- c. Suhu rectal, antara $36,6^{\circ}\text{C} - 37,9^{\circ}\text{C}$
- d. Suhu infrared tympanic, antara $35,7^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$

Suhu tubuh yang diukur di mulut akan lebih rendah $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$ dari suhu rectal, dan jika suhu tubuh yang diukur di ketiak akan lebih rendah $0,8 - 1,0^{\circ}\text{C}$ dari suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$ dari suhu ketiak.

5. Macam-Macam Demam (Harrison, 1995: 101).

Ada beberapa macam demam yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu :

1. Demam Septik

Pada setiap demam septik suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali pada ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Demam ini disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang paling tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal maka hal tersebut disebut sebagai demam hektik.

2. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.

3. Demam Intermitten

Pada demam intermiten suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

4. Demam kontinyu

Pada setiap demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat celcius. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

5. Demam siklik

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula.

6. Mekanisme Penurunan Suhu Badan (Guyton, 1983: 12)

a. Vasodilatasi

Pada hampir semua area tubuh, pembuluh darah pada kulit mempunyai kecenderungan untuk berdilatasi. Hal ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi, vasodilatasi penuh akan meningkatkan kecepatan pemindahan panas kulit sebanyak delapan kali lipat.

b. Berkeringat

Efek dari peningkatan suhu yang menyebabkan berkeringat digambarkan oleh garis kurva, yang memeperlihatkan peningkatan tujuan dalam kecepatan kehilangan panas melalui evaporasi yang dihasilkan melalui keringat ketika suhu inti tubuh meningkat di atas suhu kritis ($98,6^{\circ}\text{F}$). disamping itu, peningkatan suhu tubuh sebesar 1°C menyebabkan berkeringat cukup banyak untuk membuang sepuluh kali kecepatan metabolisme pembentukan panas tubuh.

c. Penurunan pembentukan panas tubuh

Mekanisme yang menyebabkan pembentukan panas berlebihan, seperti menggigil dan termogenasi kimia, dihambat dengan kuat.

E. Mekanisme Antipiretik

Antipiretik merupakan obat yang dapat menurunkan suhu tubuh akibat demam/suhu yang lebih tinggi. Suhu normal pada manusia berada dikisaran antara $36 - 37^{\circ}\text{C}$. Kebanyakan analgetik juga memberikan efek antipiretik, dan begitupun sebaliknya antipiretik juga dapat mengurangi rasa sakit yang diderita pasien. Masing-masing obat tergantung yang mana efek paling dominan. Salah satu contoh Acetaminofen dan aspirin memiliki efek antipiretik yang lebih dominan ketimbang efek analgesiknya (Anief, 2004: 20).

1. Penatalaksanaan Demam

Demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh atau reaksi fisiologi terhadap perubahan titik patokan di hipotalamus. Penatalaksanaan demam bertujuan untuk merendahkan suhu tubuh yang terlalu tinggi, bukan untuk menghilangkan demam. Penatalaksanaan demam dapat dibedakan menjadi dua garis besar yaitu secara non farmakologi dan secara farmakologi. Akan tetapi, diperlukan penanganan demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur < 3 bulan dengan suhu rectal > 38°C, penderita dengan umur 3-12 bulan dengan suhu rectal di atas 39°C, penderita dengan suhu > 40,5°C, dan demam dengan suhu yang tidak turun-turun selama 48-72 jam (Kaneshiro & Zieve, 2010: 4).

2. Terapi Non Farmakologi

Adapun yang termasuk dalam terapi non farmakologi dari penatalaksanaan demam antara lain :

- a. Pemberian cairan dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi dan beristirahat yang cukup.
- b. Tidak memberikan penderita pakaian panas yang berlebihan pada saat menggigil. Memakai satu lapis pakaian dan satu lapis selimut sudah cukup untuk memberikan rasa nyaman kepada penderita.
- c. Memberikan kompres hangat pada penderita. Pemberian kompres hangat efektif terutama setelah pemberian obat. Jangan memberikan kompres dingin karena akan menyebabkan keadaan menggigil dan meningkatkan kembali suhu inti tubuh (Kaneshiro & Zieve, 2010: 4).

3. Terapi Farmakologi

Obat-obatan yang sering digunakan dalam mengatasi demam (antipiretik) adalah parasetamol (Asetaminofen) dan ibuprofen. Parasetamol cepat bereaksi dalam menurunkan panas sedangkan ibuprofen memiliki efek kerja yang lama (Graneto, 2010). Pada anak-anak, dianjurkan untuk pemberian parasetamol sebagai antipiretik. Penggunaan OAINS tidak dianjurkan dikarenakan fungsi antikoagulan dan resiko sindrom Reye pada anak-anak (Kaneshiro & Zieve, 2010: 5).

F. Parasetamol (asetaminofen)

Parasetamol atau asetaminofen biasa digunakan secara luas sebagai analgetik atau antipiretik, walaupun efek analgetik dan antipiretiknya setara dengan aspirin, parasetamol berbeda karena tidak adanya efek anti-inflamasi (Katzung, 2012). Parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1983. Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus aminobenzen (Freddy, 2007). Nama parasetamol maupun asetaminofen berasal dari nama zat kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu: N-acetyl-para-aminophenol atau paraacetyl-amino-phenol. Pada umumnya parasetamol dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi/pengobatan mandiri (Priyanto, 2008: 118).

1. Farmakokinetik

Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu $\frac{1}{2}$ jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Parasetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung, 2012).

2. Farmakodinamik

Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgetiknya serupa salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa (Priyanto, 2008: 118).

3. Efek Samping

Reaksi alergi terhadap parasetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa. Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati dalam darah tanpa disertai ikterus; keadaan ini reversibel bila obat dihentikan (Katzung, 2012). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak reversibel (Tjay, 2002).

4. Dosis

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 mg/kgBB/hari (Priyanto, 2008: 119).

5. Interaksi

Parasetamol memperkuat daya kerja antikoagulan, antidiabetika oral, dan metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfinpirazon berkurang bila disertai dengan penggunaan parasetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan spironolakton. Kerja analgetiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-propoksifen. Penggunaan alkohol disertai parasetamol akan meningkatkan resiko perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombotiknya yang mengakibatkan

perdarahan meningkat, penggunaan parasetamol perlu dihentikan satu minggu sebelum pencabutan gigi (Tjay, 2002).

Penggunaan parasetamol sebagai kontrol positif karena;

- a. Parasetamol merupakan antipiretik yang secara umum dipakai di masyarakat dan mudah didapat.
- b. Parasetamol sedikit merusak mukosa lambung.

G. Pandangan Islam Tentang Tanaman Obat

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Syu'ara/26: 80 :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku”
(Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2011: 711).

Ayat ini diturunkan karena masyarakat yang hidup di zaman Nabi Ibrahim mengalami sakit, namun mereka masih saja meminta pertolongan kepada berhala-berhala mereka. Sehingga turun ayat ini, agar Nabi Ibrahim menyampaikan kepada

masyarakat yang hidup pada saat itu supaya sadar bahwa sesungguhnya Allahlah yang memberi sakit, dan Dialah pula yang menyembuhkan sakit itu.

Firmannya-Nya: *wa idzâ maridhtu/dan apabila aku sakit* berbeda dengan redaksi lainnya. Dalam hal penyembuhan-seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum-secara tegas beliau menyatakan bahwa Yang melakukan nya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu (Shihab. 2002: 258).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski yang menentukan hasilnya adalah Allah Swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan. Hal tersebut sinergis dengan firman Allah swt. dalam QS Al--Syu'ara/26: 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam pasangan (tetumbuhan) yang baik? (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2011: 963).

Kata *ilâ/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini: *awalan yarâ ilâ al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi* merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya sampai seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya.

Kata *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasang-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan *apakah mereka tidak melihat*, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab. 2002: 187-188).

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah swt. memerintahkan pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang

bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat demam. Dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun mineral. Dimana ketiganya menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah swt. yang memiliki manfaat untuk kebutuhan manusia. Lebih lanjut disebutkan pula dalam QS al- An'am/6: 99, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2011: 189).

Ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang disebut di atas, bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak *dari langit, lalu Kami*, yakni Allah, *mengeluarkan*, yakni menumbuhkan *disebabkan olehnya*, yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau*.

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih lanjut bahwa, *Kami keluarkan darinya*, yakni dari tanaman yang menghijau itu, *butir yang saling bertumpuk*, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih. Selanjutnya, Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu berkaitan dengan butir karena butir yang disebut pertama pada ayat yang lalu (ayat 95). Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Di dunia kedokteran, ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan semacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari segala macam penyakit.

Di bagian akhir ayat ini disebutkan: *perhatikan buahnya di waktu (pohonnya) berbuah dan kematangannya*. Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya.

Adapun ayat 99 yang ditutup dengan *liqaumin yu'minûn/bagi kaum yang beriman*, ia ditutup sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman (Shihab, 2002: 573-576)

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah Swt memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan

bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Salah satu tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pengobatan yaitu daun bidara, dimana daun bidara ini sangat banyak manfaatnya buat manusia dimana pada QS Al-waqiah/56: 27-32 terdapat ayat tentang tumbuhan bidara yang berbunyi :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“27. dan golongan kanan, Alangkah bahagiannya golongan kanan itu. 28. berada di antara pohon bidara yang tak berduri, 29. dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), 30. dan naungan yang terbentang luas, 31. dan air yang tercurah, 32. dan buah-buahan yang banyak” (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya 2011: 535).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari ‘Urwah bin Rutawim, tetapi mursal. Dan diriwayatkan pula oleh Sa’id bin Manshur di dalam Sunan-nya dan al-Baihaqi di dalam Kitab al-Bats, yang bersumber dari ‘Atha’ dan Mujahid bahwa setelah Rasulullah mengizinkan orang-orang Tha-if menguasai lembah yang indah dan bersarang madu, mereka mendengar bahwa syurga itu serba indah. Mereka pun berangan-angan memiliki lembah di syurga, seperti yang dimilikinya waktu itu. Maka turulah ayat ini (al-Waqi’ah: 27-29) yang melukiskan di syurga Na’im ini yang disediakan bagi golongan kanan.

Kata makhdud terambil dari kata khadhada asy-syauk, yakni yang dipotong durinya. Menurut al-Biqai, ini mengisyaratkan bahwa di surge benar-benar tidak ada sesuatu yang tidak berguna atau yang dapat mengganggu. “duri yang dapat mengganggu dicabut oleh Allah swt demi kenyamanan penghuninya”. Kata thalh ada yang melukiskan sebagai pohon yang batangnya sangat kuat, dahan-dahannya panjang dan tinggi memiliki duri yang banyak, dedaunnya sangat hijau, memiliki duri tapi tidak mengganggu, dan memiliki aroma yang harum (Shihab, 2009: 352-353).

Maksud ayat diatas yaitu “dalam tafsir disebutkan pohon bidara yang dimaksud adalah yang telah dihilangkan durinya, demikian pendapat Ibnu Abbas rodiyallohu’anhu. Berkata Ibnu Katsir rohimahulloh setelah menukil beberapa pendapat (tentang pohon biadara dalam ayat tersebut) yang dimaksud adalah pohon bidara di dunia banyak durinya dan sedikit buahnya, adapun diakhirat kebalikannya, tidak ada durinya dan buahnya banyak.

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah Saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun karena Allah Maha Suci (al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Hal ini patut menjadi perhatian, karena perihal halal haram menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Islam yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Swt karena permasalahan obat yang diminum. Selain itu, suatu obat selain halal juga baik, antara lain tidak membawa mudharat yang akan mencacatkan tubuh atau berbau takhayul, bid’ah, dan khurafat.

Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain.

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diriwayatkan pula oleh Muslim R.A. bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ
الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ
دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

“Harun bin Ma’ruf dan Abu Tahir, Ahmad bin Isa menceritakan kepada Ismail sambil berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amardan Al-Harits mengabarkan kepada saya dari Abdurrabbi bin Sa’id, dari Abu Zubaer dari Jabir dari Rasulullah Saw. bahwasanya dia bersabda; “untuk semua penyakit itu ada obat, maka apabila obat bagi penderita itu telah sampai maka dia telah sembuh dengan izin Allah .” (HR. Muslim).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt. yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya.

Dikenal beberapa cara pengobatan dalam Islam untuk menyembuhkan penyakit. Di antaranya, penyembuhan dengan air, bekam, do'a, dan obat-obat tradisional. Di samping itu, bahan-bahan tradisional juga bisa digunakan sebagai obat. Karena memang sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat dan biasa dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kunyit, temulawak, daun sirih, kayu manis, cengkeh, buah mengkudu dan lain sebagainya

Semua yang diciptakan Allah swt. memiliki manfaat, termasuk tumbuhan-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat. Bila dilihat kembali tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah melakukan eksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun oleh para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu yang sangat banyak. Sekelompok orang memang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya.

Mereka mengetahui formula obat-obatan dan penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah-lah yang menjadikan semua itu. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat dengannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian eksperimental

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi persiapan kandang, pakan, hewan coba, pembuatan simplisia, dan pembuatan ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri atas tahap perlakuan dan pengamatan.

B. *Populasi Sampel*

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) yang di ambil di daerah Kecamatan Ma'rang Desa Padanglampe Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

C. *Instrumen Penelitian*

1. Alat

Alat yang digunakan antara lain adalah alat-alat gelas (*pyrex*), bejana maserasi, cawan porselin, rotavafor (*Heidolph*), timbangan analitik (*AND*), kanula, dan termometer, lumpang dan alu, spoit (*One Med*), penangas.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah air suling, daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L), etanol 70%, Na CMC 1%, mencit (*Mus musculus*) jantan, makanan hewan uji (pelet), aquadest, tablet paracetamol, pepton

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi eksperimental. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung.

Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti.

E. Penyiapan Sampel

1. Pengambilan Sampel

Sampel daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) diperoleh di daerah Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari, pukul 08.00 – 10.00 wita. Daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak dan tidak berjamur.

2. Pengolahan Sampel

Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung, kemudian di serbukkan.

F. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi sampel

Simplisia daun Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*) disediakan sebanyak 500 g lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan etanol 70% hingga seluruh simplisia terbasahi dan ditambahkan kembali etanol 70% hingga batas pelarut 2 cm di atas simplisia. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari sambil diaduk sekali-kali. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol 70% dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening.

2. Uji Aktivitas Antipiretik

a. Pembuatan larutan koloidal Na-CMC 1 % b/v

Sebanyak 100 ml aquadest dipanaskan pada suhu 70°C. dimasukkan Na-CMC sebanyak 1 gram sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk elektrik hingga terbentuk larutan koloid yang homogen.

b. Pemilihan dan penyiapan hewan coba

Hewan uji yang digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*) jantan yang sehat sebanyak 15 ekor dengan bobot badan 20-30 gram. Sebelumnya mencit diaklimatisasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan stres akibat transportasi. Mencit dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, tiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit jantan yang ditentukan secara acak. Kelompok 1 dan 2 sebagai kontrol sedangkan kelompok 3–5 sebagai kelompok perlakuan.

c. Perlakuan pada hewan coba

Hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol daun Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis.

- Kelompok 1 : diinduksi dengan pepton 5% kemudian diberikan Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif
- Kelompok 2 : diinduksi dengan pepton 5% kemudian diberikan paracetamol
- Kelompok 3 : diinduksi dengan pepton 5% kemudian diberikan 100 mg/KgBB mencit ekstrak etanol daun Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*)
- Kelompok 4 : diinduksi dengan pepton 5% kemudian diberikan 150 mg/KgBB mencit ekstrak etanol daun Srikaya Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*)
- Kelompok 5 : diinduksi dengan pepton 5% kemudian diberikan 200 mg/KgBB mencit ekstrak etanol Bidara (*Ziziphus spina-christi L.*)

G. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan *software SPSS* dengan uji *Analysis of Variance (ANOVA)*.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan terhadap penurunan suhu rektal dari masing-masing mencit pada setiap kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil analisa pengukuran penurunan suhu rektal setelah diberi perlakuan

Perlakuan	Replikasi	Suhu awal	Setelah diinduksi Pepton	Penurunan suhu rektal mencit (menit)			
				30'	60'	90'	120'
NaCMC	1	35,4	37,2	37,1	37,2	37,1	37,1
	2	36,5	37,8	37,8	37,7	37,8	37,7
	3	36,9	38,1	38,1	38	38	38,1
100 mg/30 gram BB mencit	1	36,5	37,8	37,5	37,3	37	36,6
	2	36,2	38	37,8	37,5	36,8	36,3
	3	36	37,9	37,6	37,2	36,8	36,2
150 mg/30 gram BB mencit	1	36,2	37,8	37,6	37,1	36,8	36,3
	2	36,9	37,9	37,4	37,2	37	36,9
	3	36,9	38,4	38	37,8	37,3	37
200 mg/30 gram BB mencit	1	35,9	37,9	37,5	37	36,7	36,2
	2	36	38	37,6	37,1	36,8	36,1
	3	36,2	37,8	37,3	36,8	36,5	36,3
Paracetamol	1	35	37,9	36,6	36,2	35,4	35
	2	35,8	38	37,4	36,7	36,1	35,9
	3	36,1	38,1	37,6	36,7	36,2	36,1

B. Pembahasan

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan untuk menurunkan suhu tubuh bila demam. Demam didefinisikan suatu keadaan ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu normal. Demam terjadi ketika ada stimuli pada monosit makrofag yang sesuai, sel-sel ini menghasilkan sitokin pirogenik yang menyebabkan peningkatan set point lawan efeknya di hipotalamus (Corwin, 2007).

Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) merupakan salah satu tanaman yang dipercaya secara empiris oleh masyarakat sebagai tanaman obat tradisional untuk menurunkan panas (demam) sehingga perlu dilakukan penelitian yang bersifat ilmiah dalam hal ini aktivitas antipiretiknya untuk menurunkan suhu tubuh sehingga dapat dibuktikan keamanan dan pemanfaatannya.

Ekstraksi daun bidara dilakukan secara maserasi menggunakan cairan penyari etanol 70%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa yang bersifat polar sehingga digunakan cairan penyari etanol 70%. Ekstraksi dengan metode maserasi merupakan ekstraksi secara dingin, metode ini tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang diperkirakan nantinya akan merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Maserasi juga dilakukan dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus Musculus*) dibagi dalam 5 kelompok pengujian yaitu pengujian terhadap ekstrak daun bidara secara oral dengan dosis 100 mg, 150 mg, dan 200 mg masing-masing per 30 gram BB mencit, sebagai kontrol positif digunakan paracetamol 1,95 mg/30 gram BB mencit dan

kontrol negative digunakan NaCMC 1% secara oral 1 ml/30 gram BB mencit. Mencit dibuat demam dengan pemberian larutan pepton 5% secara oral 1 ml/30 gram BB mencit. Pemberian bahan uji berupa ekstrak daun bidara dan kontrol pada mencit adalah 30 menit sesudah penginjeksian pepton.

Pepton merupakan protein digunakan sebagai inducer demam yang akan menyebabkan demam pada mencit. Protein yang berlebih pada tubuh mencit akan menyebabkan toksik sehingga mencit akan mengalami demam, hal ini disebabkan karena alat-alat tubuh pada mencit tidak dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton ± 5 menit mencit mengalami berbagai hal yaitu menggigil, peningkatan rasa haus, peningkatan denyut jantung dan mengantuk. Pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal. Protein secara berlebih tidak menguntungkan tubuh. Kelebihan asam amino dapat memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein akan menyebabkan dehidrasi, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, asidosis dan demam.

Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit jantan dengan berat badan 20-30 gram. Alasan pemilihan mencit jantan karena mencit jantan tidak mengalami siklus hormonal seperti mencit betina. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetik atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam

pengelolaannya, di samping factor ekonomis, mudah tidaknya diperoleh, serta mampu memberikan reaksi biologis yang mirip kejadiannya pada manusia (Lisdiyanti, 2008).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan rata-tara selisih penurunan suhu rata-rata antara waktu terhadap suhu demam dari menit ke 30 hingga menit ke 120 menit. Untuk dosis 100 mg/30 g, 150 mg/30 g BB mencit, 200mg/30 g BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 30 masing-masing berturut-turut sebesar 0,27, 0,37, 0,44, 0,04 dan 0,8°C. Untuk dosis 100 mg/30 g, 150 mg/30 g BB mencit, 200 mg/30 g BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 60 masing-masing berturut-turut sebesar 0,6, 0,67, 0,94, 0,07 dan 1,47°C. Untuk dosis 100 mg/30 g, 150 mg/30 g BB mencit, 200 mg/30 g BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 90 masing-masing berturut-turut sebesar 1,04, 1, 1,24, 0,07 dan 2,1°C. Untuk dosis 100 mg/30 g, 150 mg/30 g BB mencit, 200 mg/30 g BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 120 masing-masing berturut-turut sebesar 1,54, 1,3, 1,7, 0,07 dan 2,34°C. Penurunan suhu yang hampir sama dengan kontrol positif paracetamol yaitu pada dosis 200 mg/30 gram BB mencit.

Tabel 3. Uji ANOVA

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
sebelum induksi	Between Groups	1.700	4	.425	1.806	.204
	Within Groups	2.353	10	.235		
	Total	4.053	14			
setelah induksi	Between Groups	.203	4	.051	.738	.587
	Within Groups	.687	10	.069		
	Total	.889	14			
waktu 30	Between Groups	.483	4	.121	.883	.508
	Within Groups	1.367	10	.137		

waktu 60	Total	1.849	14			
	Between Groups	2.180	4	.545	6.240	.009
	Within Groups	.873	10	.087		
waktu 90	Total	3.053	14			
	Between Groups	4.737	4	1.184	11.536	.001
	Within Groups	1.027	10	.103		
waktu 120	Total	5.764	14			
	Between Groups	6.417	4	1.604	10.111	.002
	Within Groups	1.587	10	.159		
	Total	8.004	14			

Ket: p value pada menit ke-30 = 0,508 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan penurunan suhu rektal yang bermakna antar tiap kelompok perlakuan

p value pada menit ke-60, 90, dan 120 berturut-turut = 0,009, 0,001 dan 0,002 yang berarti bahwa terdapat perbedaan penurunan suhu rektal yang bermakna antar tiap kelompok perlakuan.

Berdasarkan Uji One way ANOVA didapatkan bahwa data suhu rektal antar tiap perlakuan pada menit ke-30 diperoleh nilai $p=0,508$ ($p>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan penurunan suhu rektal antar kelompok perlakuan. Sedangkan pada menit ke-60, 90, dan 120 berturut-turut = 0,009, 0,001 dan 0,002 ($p<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penurunan suhu rektal yang bermakna antar tiap kelompok perlakuan.

Pada kelompok yang diberikan sediaan ekstrak daun Bidara dengan dosis 100 mg, 150 mg dan 200 mg masing-masing memberikan hasil yang positif dimana semua kelompok mencit yang mengalami demam (kenaikan suhu) setelah

diinduksikan dengan pepton, mengalami penurunan suhu rektal yang menunjukkan bahwa sediaan ekstrak Bidara memiliki efek sebagai antipiretik.

Pada menit ke 30 semua sampel tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terjadi penurunan suhu rektal yang bermakna pada setiap kelompok sedangkan pada menit ke 60,90 dan 120 terjadi perubahan yang signifikan pada setiap kelompok sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan suhu rektal yang bermakna pada setiap kelompok.

Penentuan efek penurunan demam dengan mengukur suhu setelah pemberian obat hingga rentang waktu 2 jam. Kondisi demam pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan thermometer digital.

Dari hasil perhitungan penurunan suhu rektal mencit pemberian ekstrak bidara dan kontrol dapat dilihat pada Lampiran 4, dimana untuk pemberian ekstrak 100 mg/30 g/BB mencit rata-rata suhu awal yaitu 36,23 setelah diinduksikan pepton maka rata-rata suhunya yaitu 37,9 setelah pemberian ekstrak pada menit ke 30 suhu rata-rata mencit yaitu 37,63, pada menit ke 60 yaitu 37,3, pada menit ke 90 yaitu 36,86 dan pada menit ke 120 suhu rata-rata mencitnya yaitu 36,36. Untuk pemberian ekstrak 150 mg/30 g/BB mencit rata-rata suhu awal yaitu 36,66 setelah diinduksikan pepton maka rata-rata suhunya yaitu 38,03 setelah pemberian ekstrak pada menit ke 30 suhu rata-rata mencit yaitu 37,66, pada menit ke 60 yaitu 37,36, pada menit ke 90 yaitu 37,03 dan pada menit ke 120 suhu rata-rata mencitnya yaitu 36,73. Untuk pemberian ekstrak 200 mg/30 g/BB mencit rata-rata suhu awal yaitu 36,03 setelah diinduksikan pepton maka rata-rata suhunya yaitu 37,9 setelah pemberian ekstrak pada menit ke 30 suhu rata-rata mencit yaitu 37,46, pada menit ke 60 yaitu 36,96, pada menit ke 90 yaitu 36,66 dan pada menit ke 120 suhu rata-rata mencitnya yaitu

36.2. Sedangkan untuk kontrol negatif yang menggunakan NaCMC memiliki rata-rata suhu awal 32,26 setelah diinduksi suhu rata-ratanya 37,7 setelah pemberian NaCMC pada menit ke 30 suhu rata-rata menciit 37,66, pada menit ke 60 yaitu 37,63, pada menit ke 90 yaitu 37,63 dan pada menit ke 120 suhu rata-rata menciitnya yaitu 37,63. Dan untuk kontrol positifnya yaitu paracetamol, didapatkan suhu awal rata-rata yaitu 36,16 setelah diinduksikan suhu rata-ratanya 37,90, setelah pemberian paracetamol pada menit ke 30 didapatkan suhu rata-rata yaitu 37,52, pada menit ke 60 yaitu 37,15, pada menit ke 90 yaitu 36,81 dan pada menit ke 120 suhu rata-rata menciitnya yaitu 36,51.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa:

1. Ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) memiliki aktivitas sebagai antipiretik pada mencit.
2. Ekstrak daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L.) yang memiliki aktivitas antipiretik yaitu dosis 100 mg, 150 mg dan 200 mg/30 gram BB mencit.

B. Saran

Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi senyawa aktif antipiretik yang terdapat pada ekstrak daun Bidara.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdel-Galil F.M., El-Jissry M.A. *Cyclopeptide alkaloids from Zizyphus spina-christi*. *Phytochemistry* v. 30 (4): p. 1348-1349; 1991.

Akhyar. *Uji Daya Hambat Analisis KLT Bioautografi Ekstrak Akar dan Buah Bakau (Rhizopora stylosa Griff) terhadap Vibrio harveyi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2010.

Anief, Mohammad. *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.

Corwin, Elizabeth J. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 2007.

Chang C, Yang M, Wen, Hm Chem J. *Estimation Of total Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods*, *Journal Of Food Drud Analysis*. 2002.

D Dahiru, End OO. *Evaluation of The Antioksidan Effects of Ziziphus mauritiana Lam. Leaf Extracts againt Chronic Ethanol-Induced Hepatotoxicity In Rat Liver*. *African Journal Traditional Complementary Alternative Mediines (CAM)*. 2010.

Dirjen POM. *Farmakope Indonesia*. Ed. IV. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1995.

Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Ed. II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI Bhakti Husada, 1986.

Ganong, William, f. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC. 2002.

Guyton, A. C. *Buku Teks Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1983.

Harborne, J.B. *Metode Fitokimia*. Bandung: ITB. 1987

Harrison, *Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: EGC. 1995.

Heyne K. *Tumbuhan Berguna Indonesia, jil. 3*. Yay. Arana Wana Jaya, Jakarta. 1987.


- Kaneshiro N. K. and Zieve D. *Fever*. University of Washington. 2010.
- Katzung, B.G. *Farmakologidasar Dan Klinik*. Penerjemah: Dripta Sjabana Dkk. Edisi Kedua. Jakarta: Penerit Salemba Medika. 2002.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. PT Adhi Aksara Abdi Indonesia. 2011.
- Latif, AM. *Chinee Apple Indian Jujube Ziziphus mauritiana*. America: Queensland Government. 2000.
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Malole, M. B. M. dan pramono, c. s. u. *Penggunaan Hewan –Hewan Coba Percobaan Di Laboratorium*. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi, IPB. 1989.
- Nelwan, R.H.H., Sudoyo, A.W. *Demam: Tipe dan Pendekatan Dalam*; Editor. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi Keempat Jilid Ketiga*. Jakarta: Pusat Penerbit Departemen Ilmu Penyakit Dalam. 2006.
- Prapanza, Ivan dkk. *Khasiat dan Manfaat Sambiloto*. Jakarta : Agromedia. 2012.
- Priyanto. *Farmakologi Dasar*. Depok: Lembaga Studi dan Konsultasi Farmakologi. 2008.
- Prior R L. *Fruit and vegetable in The Prevention of Cellular Oksidative Damage*. Am J Clin Nutr. 2003.
- Sherwood, L. *Fisiologi Manusia; dari Sel ke Sistem*. Edisi 2. Jakarta: EGC. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siwi Hastuti dan Susi Endrawati. *Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etil Asetat Daun Seligi (Phyllanthus buxifolius Muell.Arg) Pada Mencit Jantan Galur Swiss*. Sukoharjo, Jawa Tengah : Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia, Program Study Farmasi. 2016.

- Stefany Kalay dkk. *Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Prasman (Eupatorium Triplinerve Vahl.) Pada Tikus Jantan Galur Wistar (Rattus Norvegicus L.) Yang Diinduksi Vaksin Dtp Hb*. Manado: Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT. 2014.
- Syilfia Hasti dkk. *Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol, Fraksi N-Heksana Dan Fraksi Etil Asetat Daun Beringin (Ficus benjamina L.) Pada Tikus Putik Jantan (Rattus norvegicus)*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. 2012
- Thalbah, Hisham. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadist*. Perpustakaan Nasional RI. 2009.
- Tjay, t. h. rahardja. K. *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya. Edisi VI*. Jakarta: penerbit PT. elex media komputindo. 2002.
- Tjitrosoepomo, Gembong.. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1985
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1. Skema Kerja

1. Penyiapan Sampel




Gambar 1. Skema Kerja Ekstrak Daun Bidara

2. Pembuatan larutan koloidal Na-CMC 1 % b/v



Gambar 2. Skema Kerja Pembuatan Larutan NaCMC 1%

3. Perlakuan pada hewan coba



Gambar 3. Skema Kerja Uji Aktivitas Antipiretik

Lampiran 2. Perhitungan Dosis

1. Perhitungan Dosis dan Pemberian Paracetamol

a. Konversi dosis mencit dan manusia

Dosis lazim untuk manusia : 500 mg

Factor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g

Dosis untuk mencit 20 g : $500 \text{ mg} \times 0,0026 = 1,3 \text{ mg}$

b. Penyediaan Sediaan Paracetamol

Volume pemberian untuk : 1 ml untuk 30 g BB mencit

Dosis untuk mencit 30 g : $30 \text{ g}/20 \text{ g} \times 1,3 \text{ mg} = 1,95 \text{ mg}$

Dibuat stok sebanyak 20 ml : 20 ml

Jumlah paracetamol yang dibuat : $1,95 \text{ mg} \times 20 \text{ ml} = 39 \text{ mg}$

c. Perhitungan tablet Paracetamol

Berat rata-rata 20 tablet : 603,5 mg

Berat yang ditimbang : $39 \text{ mg}/500 \text{ mg} \times 603,5 \text{ mg} = 47,073 \text{ mg}$

Jadi untuk mendapatkan Paracetamol 39 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 47,073 mg yang disuspensikan hingga 20 ml menggunakan NaCMC.

Lampiran 3. Gambar

Gambar 1. Proses Maserasi Sampel daun Bidara



Gambar 2. Proses Penyaringan Sampel daun Bidara



Gambar 3. Proses Evaporasi Sampel daun Bidara



Gambar 4. Ekstrak Etanol daun Bidara



Gambar 5. Hewan Coba Mencit Jantan (*Mus musculus*)



Gambar 6. Penimbangan Hewan Coba Mencit Jantan (*Mus musculus*)



Gambar 7. Pengukuran suhu rektal Hewan Coba Mencit Jantan (*Mus musculus*)



Gambar 8. Proses pemasukan obat dalam tubuh Hewan Coba



Gambar 9. Thermometer digital



Gambar 10. Gambar tanaman Bidara



Gambar 11. Gambar Pohon Bidara



Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min.	Max.
						Lower Bound	Upper Bound		
sebelum induksi	NaCMC	3	36.2667	.77675	.44845	34.3371	38.1962	35.40	36.90
	bidara 100mg	3	36.2333	.25166	.14530	35.6082	36.8585	36.00	36.50
	bidara 150mg	3	36.6667	.40415	.23333	35.6627	37.6706	36.20	36.90
	bidara 200mg	3	36.0333	.15275	.08819	35.6539	36.4128	35.90	36.20
	paracetamol	3	35.6333	.56862	.32830	34.2208	37.0459	35.00	36.10
	Total	15	36.1667	.53807	.13893	35.8687	36.4646	35.00	36.90
setelah induksi	NaCMC	3	37.7000	.45826	.26458	36.5616	38.8384	37.20	38.10
	bidara 100mg	3	37.9000	.10000	.05774	37.6516	38.1484	37.80	38.00
	bidara 150mg	3	38.0333	.32146	.18559	37.2348	38.8319	37.80	38.40
	bidara 200mg	3	37.9000	.10000	.05774	37.6516	38.1484	37.80	38.00
	paracetamol	3	38.0000	.10000	.05774	37.7516	38.2484	37.90	38.10
	Total	15	37.9067	.25204	.06508	37.7671	38.0462	37.20	38.40
waktu 30	NaCMC	3	37.6667	.51316	.29627	36.3919	38.9414	37.10	38.10
	bidara 100mg	3	37.6333	.15275	.08819	37.2539	38.0128	37.50	37.80
	bidara 150mg	3	37.6667	.30551	.17638	36.9078	38.4256	37.40	38.00
	bidara 200mg	3	37.4667	.15275	.08819	37.0872	37.8461	37.30	37.60
	paracetamol	3	37.2000	.52915	.30551	35.8855	38.5145	36.60	37.60
	Total	15	37.5267	.36345	.09384	37.3254	37.7279	36.60	38.10
waktu 60	NaCMC	3	37.6333	.40415	.23333	36.6294	38.6373	37.20	38.00
	bidara 100mg	3	37.3333	.15275	.08819	36.9539	37.7128	37.20	37.50
	bidara 150mg	3	37.3667	.37859	.21858	36.4262	38.3071	37.10	37.80
	bidara 200mg	3	36.9667	.15275	.08819	36.5872	37.3461	36.80	37.10
	paracetamol	3	36.5333	.28868	.16667	35.8162	37.2504	36.20	36.70
	Total	15	37.1667	.46701	.12058	36.9080	37.4253	36.20	38.00
waktu 90	NaCMC	3	37.6333	.47258	.27285	36.4594	38.8073	37.10	38.00
	bidara 100mg	3	36.8667	.11547	.06667	36.5798	37.1535	36.80	37.00
	bidara 150mg	3	37.0333	.25166	.14530	36.4082	37.6585	36.80	37.30
	bidara 200mg	3	36.6667	.15275	.08819	36.2872	37.0461	36.50	36.80
	paracetamol	3	35.9000	.43589	.25166	34.8172	36.9828	35.40	36.20
	Total	15	36.8200	.64165	.16567	36.4647	37.1753	35.40	38.00

waktu 120	NaCMC	3	37.6333	.50332	.29059	36.3830	38.8837	37.10	38.10
	bidara 100mg	3	36.3667	.20817	.12019	35.8496	36.8838	36.20	36.60
	bidara 150mg	3	36.7333	.37859	.21858	35.7929	37.6738	36.30	37.00
	bidara 200mg	3	36.2000	.10000	.05774	35.9516	36.4484	36.10	36.30
	paracetamol	3	35.6667	.58595	.33830	34.2111	37.1222	35.00	36.10
	Total	15	36.5200	.75612	.19523	36.1013	36.9387	35.00	38.10

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
sebelum induksi	2.675	4	10	.094
setelah induksi	3.536	4	10	.048
waktu 30	2.476	4	10	.112
waktu 60	1.596	4	10	.250
waktu 90	2.925	4	10	.077
waktu 120	2.484	4	10	.111

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
sebelum induksi	Between Groups	1.700	4	.425	1.806	.204
	Within Groups	2.353	10	.235		
	Total	4.053	14			
setelah induksi	Between Groups	.203	4	.051	.738	.587
	Within Groups	.687	10	.069		
	Total	.889	14			
waktu 30	Between Groups	.483	4	.121	.883	.508
	Within Groups	1.367	10	.137		
	Total	1.849	14			
waktu 60	Between Groups	2.180	4	.545	6.240	.009
	Within Groups	.873	10	.087		
	Total	3.053	14			

waktu 90	Between Groups	4.737	4	1.184	11.536	.001
	Within Groups	1.027	10	.103		
	Total	5.764	14			
waktu 120	Between Groups	6.417	4	1.604	10.111	.002
	Within Groups	1.587	10	.159		
	Total	8.004	14			

sebelum induksi

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha =	
		0.05	
		1	
paracetamol	3	35.6333	
bidara 200mg	3	36.0333	
bidara 100mg	3	36.2333	
NaCMC	3	36.2667	
bidara 150mg	3	36.6667	
Sig.		.142	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

setelah induksi

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha = 0.05
		1
NaCMC	3	37.7000
bidara 100mg	3	37.9000
bidara 200mg	3	37.9000
paracetamol	3	38.0000
bidara 150mg	3	38.0333
Sig.		.552

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

waktu 30

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	
paracetamol	3	37.2000	
bidara 200mg	3	37.4667	
bidara 100mg	3	37.6333	
NaCMC	3	37.6667	
bidara 150mg	3	37.6667	
Sig.			.559

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

waktu 60

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
paracetamol	3	36.5333	
bidara 200mg	3	36.9667	36.9667
bidara 100mg	3		37.3333
bidara 150mg	3		37.3667
NaCMC	3		37.6333
Sig.		.426	.113

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

waktu 90

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
paracetamol	3	35.9000		
bidara 200mg	3	36.6667	36.6667	
bidara 100mg	3		36.8667	36.8667
bidara 150mg	3		37.0333	37.0333
NaCMC	3			37.6333
Sig.		.087	.640	.087

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

waktu 120

Tukey HSD

sampel uji	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
paracetamol	3	35.6667	
bidara 200mg	3	36.2000	
bidara 100mg	3	36.3667	
bidara 150mg	3	36.7333	36.7333
NaCMC	3		37.6333
Sig.		.051	.112

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

RIWAYAT HIDUP



Fauziah Nugrahwati. Lahir di Ujung Pandang 25 November 1993. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan suami isteri H. Badollahi dan Hj. Hafsah Mulai mengenyam bangku sekolah di Tk Kemala Bhayangkari Pangkep, kemudian pada tingkat SDN 28 Tumampua 2 Pangkep pada tahun 2000 lalu melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin pada tahun 2009-2012. Pada tahun yang sama berhasil diterima sebagai mahasiswa jurusan farmasi, fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R