

**Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn.)  
Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Jantan**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**HAIRIL ANWAR ODDING**  
NIM. 70100112027  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hairil Anwar Odding  
NIM : 70100112027  
Tempat/Tgl. Lahir : Sudu, 11 Juli 1993  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jln. Toa Daeng 3, Kompleks Toa Daeng Country No.18.  
Judul : Uji aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) terhadap mencit (*Mus Musculus*) jantan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, 28 Oktober 2016

Penulis,

**HAIRIL ANWAR ODDING**  
**NIM: 70100112027**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Alhamdulillah adalah kata yang pantas kita ucapkan karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah swt. sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan lainnya untuk tegaknya syiar Islam yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan skripsi ini berarti selangkah lagi penulis maju dalam bidang ilmu pengetahuan menuju ke arah perjuangan cita-cita hidup kelak di kemudian hari. Meskipun begitu penulis menyadari bahwa apa yang terurai sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, namun bagi penulis merupakan suatu keberhasilan yang tidak lepas dari dukungan moral dan material dari semua pihak. Oleh karena itu sederatan nama yang tak terkira jumlahnya pantas mendapatkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya karena membantu terselesainya mulai proses belajar sampai pada penulisan dan perampungan skripsi ini sebagai suatu kelengkapan studi untuk memperoleh gelar sarjana.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Odding dan Ibunda Hastuti serta keluargaku dengan penuh kesabaran dan tiada henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, dan selalu memberikan nasehat, kritik, semangat serta motivasi maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I (Bidang akademik) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. selaku Wakil Dekan II (Bidang administrasi umum dan keuangan) Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III (Bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan selaku penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran pada skripsi penulis.
7. Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi dan sebagai pembimbing pertama terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan

9. bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
10. Andi Armisman Edy Paturusi S. Farm, M.Si, Apt sebagai pembimbing kedua terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
11. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi atas semua saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini.
12. Dosen-dosen Jurusan Farmasi dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan, Isohidris yang terus memberi dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Makassar, 28 Oktober 2016

**HAIRIL ANWAR ODDING**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Hipotesis .....	3
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1. Defenisi Operasional .....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	4
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	7
A. Uraian Tanaman .....	7
1. Klasifikasi Tanaman .....	7

2. Nama Daerah .....	7
3. Morfologi .....	8
4. Kegunaan .....	9
B. Uraian Hewan Coba .....	10
1. Klasifikasi .....	10
2. Karakteristik Hewan Coba .....	10
C. Uraian Ekstraksi .....	13
1. Pengertian Ekstraksi .....	13
2. Mekanisme Ekstraksi .....	13
3. Maserasi .....	14
D. Demam .....	16
1. Pengertian Demam .....	16
2. Mekanisme Demam .....	17
3. Penyebab Demam .....	18
4. Penerapan Klinis .....	18
5. Macam-macam Demam .....	20
6. Mekanisme Penurunan Suhu Badan .....	21`
E. Mekanisme Antipiretik .....	22
1. Penatalaksanaan Demam .....	22
2. Terapi Non-Farmakologi .....	23
3. Terapi Farmakologi .....	23
F. Paracetamol .....	23
G. Penginduksi Demam (Pepton) .....	26
H. Pandangan Islam Tentang Tanaman Obat .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Lokasi Penelitian .....	33
B. Sampel .....	33
C. Instrumen Penelitian .....	33

1. Alat .....	33
2. Bahan .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
1. Penyiapan Sampel .....	34
2. Ekstraksi Sampel Etanol Daun Srikaya ( <i>Annona squamosa</i> L.) .....	34
3. Pembuatan Na-CMC 1% b/v .....	35
4. Pembuatan Pepton 10% .....	35
5. Pembuatan Suspensi Paracetamol .....	35
6. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba .....	35
7. Perlakuan Terhadap Hewan Uji .....	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Hasil Ekstraksi Daun Srikaya .....	38
2. Hasil Perlakuan Uji .....	38
B. Pembahasan .....	40
BAB V PENUTUP .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
KEPUSTAKAAN .....	48
LAMPIRAN .....	51
RIWAYAT HIDUP .....	70




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Nilai Fisiologi Mencit .....	11
2. Hasil Ekstraksi Daun Skrikaya ( <i>Annona squamosa</i> Linn) .....	38
3. Hasil Pengukuran Penurunan Suhu Rektal Mencit Yang Diberi Pemberian Ekstrak Daun Srikaya ( <i>Annona squamosa</i> Linn) .....	39
4. Penurunan Suhu Rektal Mencit .....	39
5. Berat badan Mancit jantan yang digunakan untuk penelitian .....	60
6. Perhitungan Penurunan Suhu Rektal Mencit Yang Diberi Pemberian Ekstrak Daun Srikaya ( <i>Annona squamosa</i> Linn) dan kontrol .....	63
7. Perhitungan rata-rata suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun srikaya ( <i>Annona squamosa</i> Linn) dan kontrol .....	64
8. Analisis keseragaman dan F tabel penurunan suhu rektal pada hewan coba .....	66
9. One-Way ANOVA .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema penyiapan sampel .....	51
2. Skema pembuatan larutan koloidal Na-CMC 1 % b/v .....	52
3. Skema perlakuan pada hewan coba .....	53
4. Lampiran Gambar .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran Skema kerja .....	51
2. Lampiran Gambar .....	54
3. Lampiran Perhitungan dan Analisis Statistik .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Hairil Anwar Odding  
NIM : 70100112027  
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Jantan

---

Telah dilakukan penelitian uji aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) terhadap mencit (*Mus musculus*) jantan. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian aktivitas antipiretik beberapa varian dosis ekstrak etanol daun srikaya terhadap mencit. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui sejauhmana aktivitas antipiretik dari ekstrak etanol daun srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) dan untuk mengetahui dosis ekstrak etanol daun srikaya yang memiliki aktivitas antipiretik .

Metode yang digunakan adalah ekstraksi sampel dengan cara maserasi bertingkat dan ekstrak yang diperoleh dibagi dalam 3 konsentrasi yaitu 100, 150, dan 200 mg/gBB mencit kemudian digunakan paracetamol pada kelompok kontrol positif. Pada penelitian ini digunakan pepton 10% sebagai penginduksi demam pada mencit yang diberikan secara peroral kemudian diberi ekstrak etanol daun srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) secara peroral. Pengukuran suhu rektal dilakukan setiap interval waktu 30 menit, dan pengukuran dilakukan hingga waktu ke 120 menit setelah penginduksian pepton.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dosis 100, 150 mg, dan 200 mg/gBB mencit dapat menunjukkan adanya aktivitas antipiretik pada mencit yang signifikan ( $p= 1$  dan 5%)

**Kata kunci:** daun srikaya, dan antipiretik

## ABSTRACT

Name : Hairil Anwar Odding  
NIM : 70100112027  
Title : Activity assessment of antipyretic of ethanol extract Srikaya leaf (*Annona Squamosa* Linn.) in male mice (*Mus musculus*)

---

A research activity antipyretic of extracts ethanol leaf ethanol extract Srikaya leaf (*Annona Squamosa* Linn.) male mice (*Mus musculus*). This research did by varieties of Srikaya leaf extract on mice. This research intent to know concentration extract of Srikaya leaf (*Annona Squamosa* Linn.) that has antipyretic activity.

This research used extraction method on tacks at three concentrations (100, 150, and 200 mg/kg weigh mice) paracetamol of positive control with pepton 10% induction by paroral. After treatment, the alteration of body temperature in mice was measured interval from 30 to 120 minutes during treatment.

The results of this research show that the extract Srikaya leaf (*Annona Squamosa* Linn.) of at concentrations (100, 150, and 200 mg/g weigh mice) have significantly antipyretic effect ( $p= 1$  and 5%)

**Key Words:** Srikaya leaf, and antipyretic

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Seorang muslim, kita pasti pernah terserang penyakit ringan, sedang ataupun berat. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah Swt. Allah juga telah menetapkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nabi berobat dengan al-Quran dan obat lainnya. Beliau pun menganjurkan kita untuk berobat dengan beberapa obat-obatan, hal tersebut disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR.bukhari No. 5246

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ  
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadak 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga..*

Dari hadits tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dengan bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaat. Allah swt. menciptakan alam semesta beserta isinya tidak diciptakan dengan sia-sia akan tetapi memiliki fungsi masing-masing Kita sebagai manusia telah diberi akal untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tersebut khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari tumbuhan (Shibab, 2009). Obat itu sendiri adalah zat yang dapat digunakan untuk

merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Sedangkan ilmu yang membahas tentang obat yaitu ilmu farmasi. Dimana dalam ilmu farmasi mengajarkan untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam yang dapat dijadikan sebagai obat.

Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang besar dalam hal keanekaragaman hayati di darat maupun di laut, banyak diantaranya mengandung obat. Tumbuhan obat merupakan aset nasional yang perlu digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Kecenderungan masyarakat untuk *back to nature*, dengan indikasi utama peningkatan kebutuhan produk-produk konsumsi untuk kesehatan dari bahan alam, merupakan peluang bagi pengembangan tanaman obat sebagai obat tradisional. Salah satu jenis tumbuhan yang dapat dikembangkan yaitu daun Srikaya (*Annona squamosa* Linn.).

Srikaya adalah tanaman yang tumbuh subur hampir diseluruh wilayah Indonesia. Srikaya merupakan tumbuhan perdu yang berumur panjang dengan tinggi mencapai 2-4 m. Buah tanaman Srikaya ini semu, bulat mengerucut, berwarna hijau dengan diameter 5-10 cm, permukaan tidak merata atau ada tonjolan, dengan biji berbentuk pipih atau kepingan kecil berwarna hitam mengkilat, tanaman ini dapat berbuah pada umur 3-5 tahun dengan perbanyakannya secara generatif (melalui biji).

Senyawa kimia yang terdapat pada daun Srikaya yaitu alkaloid (Annonain, Retikulin), mirisil alcohol, senyawa polifenol, flavonoid, leukosianidin, asam kafeat, asam kumarat, sedangkan pada buahnya mengandung protein, kalsium, fosfor, gula, vitamin A, vitamin C, asam amino, dan tannin pada daun buah muda. Biji Srikaya

mengandung selulosa, amilum, lemak, protein, gula, resin, minyak lemak, bahan beracun, asetogenin (*Annonacin-A*, *Squamosten-A*, *Neoannonin*, *Squamocin-I*, *asiminacin*, *Squamostatine-D*, *Squamostatine-E*). Akar dan kulit batang Srikaya mengandung senyawa borneol, kamper, terpen, alkaloid annonain, asetogenin, (*squamone,2,4 cis dan trans bullatacinone*) (Hegnaur, 1986).

Secara empiris daun Srikaya sering digunakan sebagai obat penurun demam, namun belum ada penelitian ilmiah sebelumnya mengenai hal tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian tentang “Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn.) Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Jantan” dari berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun Srikaya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) memiliki efek Antipiretik ?
2. Berapa konsentrasi ekstrak daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) yang memiliki aktivitas Antipiretik?
3. Bagaimana tinjauan agama tentang pemanfaatan daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) sebagai tanaman obat?

#### **C. Hipotesis**

1. Ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) memiliki potensi Antipiretik pada mencit (*Mus musculus*) berdasarkan pada hasil metabolit sekunder pada daun Srikaya khususnya kandungan Flavonoid yang cukup tinggi.



2. Ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) memiliki efek antipiretik yang hampir sama dengan antipiretik pembanding (Paracetamol) dalam penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1. Definisi Operasional**

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut. Ekstrak Etenol merupakan sediaan pekat yang diperoleh dari penarikan zat aktif menggunakan pelarut etanol.

Demam merupakan suatu keadaan dimana suhu tubuh meningkat di atas 37°C. Demam adalah suatu respon pertahanan tubuh terhadap substansi asing yang masuk kedalam tubuh dan umumnya disebabkan oleh bakteri dan virus. Mencit jantan (*Mus musculus*) adalah mencit yang biasa digunakan sebagai hewan percobaan pada penelitian di laboratorium.

Induksi adalah influensi, imbasan atau yang menyebabkan. Dalam penelitian ini induksi pepton merupakan tindakan atau proses merangsang atau menyebabkan terjadinya demam pada mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan coba.

##### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Menentukan pengaruh ekstrak daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) terhadap penurunan suhu tubuh mencit (*Mus musculus*) jantan yang diinduksi pepton, dengan mengamati perubahan suhu rektal mencit yang telah dijadikan preparat setelah melalui beberapa perlakuan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian Syilfia Hasti dkk dari *Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru (2012)* dengan judul uji efek antipiretik ekstrak etanol, fraksi n-

heksana dan fraksi etil asetat daun beringin (*Ficus benjamina* L.) pada tikus jantan (*Rattus norvegicus*). Adapun hasil yang didapat dari 4 kg daun segar Beringin yang dimaserasi dengan etanol 96% diperoleh ekstrak kental 435,602 g dengan rendemen 10,89%. Dari fraksi *n*-heksana dan fraksi etil asetat berturut-turut 49,7033 g (2,706%) dan 1,4532 g (0,09%). Ekstrak etanol dan fraksi etil asetat daun Beringin yang diujikan pada tikus putih jantan dengan dosis 100, 200 dan 400 mg/kg BB dan fraksi *n*-heksana dosis 100 dan 200 mg/kg BB tidak memiliki efek sebagai antipiretik. Fraksi *n*-heksana daun Beringin yang diujikan pada tikus putih jantan dengan dosis 400 mg/kg BB memiliki efek sebagai antipiretik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Antonius P. Rumengan, Desy A. Mantiri, Billy J. Kepel, dan Rene C (2014), Fakultas Kedokteran Unsrat Manado dengan judul kajian anti piretik dan anti oksidan dari ekstrak alga hijau (*boergesenia forbesii*). Metode yang digunakan untuk uji antipiretik pada penelitian ini yaitu menaikkan suhu tubuh dari hewan uji (Mencit jantan) dengan memberikan larutan pepton 10% dengan dosis 150 mg/kg secara subkutan pada bagian belakang leher. Kontrol positif menggunakan 1% parasetamol dengan dosis 150 mg/kg. Hewan perlakuan menggunakan ekstrak alga hijau *Boergesenia forbesii* 1% dengan dosis 150 mg/kg dan Pengukuran suhu dilakukan setiap 30 menit dengan menggunakan termometer pada bagian anus, untuk melihat perubahan suhu yang terjadi. Hasil yang diperoleh menunjukkan ekstrak alga hijau *Boergesenia forbesii* memiliki aktifitas antipiretik.

Berdasarkan penelitian Setiadi Ihsan (2015), Fakultas MIPA Program Studi Farmasi Universitas Garut, dengan judul uji aktivitas antipiretik ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica*) terhadap tikus putih galur wistar. Pada penelitian tersebut telah dilakukan pengujian antipiretik ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica*) terhadap tikus betina galur Wistar. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica*) dosis 50mg/KgBB, 100mg/KgBB dan 200mg/KgBB memiliki aktivitas antipiretik dengan menurunkan suhu tubuh tikus demam yang berbeda bermakna terhadap kontrol ( $p < 0,01$ ), dimana efek penurunan suhu yang paling baik adalah dosis 200mg/KgBB.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn).
- b. Mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) dengan aktivitas antipiretik tertinggi.
- c. Mengetahui tinjauan agama tentang pemanfaatan daun Srikaya (*Annona Squamosa* Linn) sebagai tanaman obat.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif dalam pengobatan demam .
- b. Meningkatkan penggunaan ekstrak tumbuhan untuk pengobatan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tanaman

##### 1. Klasifikasi

Klasifikasi tanaman Srikaya dalam sistematika tumbuhan sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Super Divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Tjitrosoepomo, 2009)

##### 2. Nama Daerah

Tanaman Srikaya mempunyai bermacam-macam sebutan. Masyarakat Aceh menyebut Srikaya adalah delima bintang atau serba bintang, orang Melayu menyebutnya delima Srikaya, dan seraikaya bagi masyarakat di daerah Lampung. Sarikaya adalah sebutan untuk tanaman Srikaya di daerah Sunda, dan orang Jawa menyebutnya serkaya atau surikaya. Masyarakat Madura, Gorontalo, dan Buru menyebutnya sarkaya, serekaya, dan sirikaya, ata bagi masyarakat Timor, sirkaya

bagi masyarakat Bali, Srikaya kebo bagi masyarakat Sumbawa, nagametawata bagi orang-orang Sumba, dan garoso bagi masyarakat Bima. Masyarakat Sulawesi Utara, Ternate, dan Tidore menyebutnya atis, sedangkan masyarakat halmahera menyebutnya atisi atau hirikaya (Achmad, dkk., 2007).

### 3. Morfologi

Tanaman ini tumbuh dengan perdu, berumur panjang, dengan tinggi mencapai 2-4 m. Akar tunggal, batang berkayu, silindris, tegak berwarna keabu-abuan, memiliki kulit tipis, permukaan kasar, percabangan banyak, dengan arah cabang miring keatas. Daun tanaman tunggal, bertangkai pendek, tersusun selang seling, berwarna hijau, berbentuk memanjang dengan panjang mencapai 6-17 cm dengan lebar 2,5 – 7,5 cm, helaian daun tipis kaku, ujung dan pangkal meruncing, bagian tepi merat, pertulangan menyirip dengan permukaan halus.

Bunga tanaman ini tunggal, tumbuh pada ketiak daun dan ujung batang, bertangkai, memiliki kelopak berwarna hijau kekuningan. Selain itu, buah tanaman Srikaya ini semu, bulat mengerucut, berwarna hijau dengan diameter 5-10 cm, permukaan tidak merata atau ada tonjolan, dengan biji berbentuk pipih atau kepingan kecil berwarna hitam mengkilat, tanaman ini dapat berbuah pada umur 3-5 tahun dengan perbanyakannya secara generatif (melalui biji).

Berdasarkan pada buku yang ditulis oleh Hegnaur (1986) daun Srikaya mengandung senyawa alkaloid (Annonain, Retikulin), mirisil alkohol senyawa polifenol, flavonoid, leukosianidin, asam kafeat, asam kumarat, sedangkan pada buahnya mengandung protein, kalsium, fosfor, gula, vitamin A, vitamin C, asam

amino, dan tannin pada daun buah muda. Biji Srikaya mengandung selulosa, amilum, lemak, protein, gula, resin, minyak lemak, bahan beracun, asetogenin (*Annonacin-A*, Skuamosten-A, Neoannonin, *Squamocin-I*, *Squamocin-K*, *Squamocin-N*, *Squamocin-E*, *Squamocin*, Annonin-III (metrilin), *Squamocin-B*, *Squamocin-D* (*asiminacin*), *Squamocin-F*, *Squamostatine-A* (almuneguin), *Squamostatine-D*, *Squamostatine-E*. Akar dan kulit batang Srikaya mengandung senyawa borneol, kamper, terpen, alkaloid annonain, asetogenin, (*squamone*, 2,4 *cis* dan *trans bullatacinone*).

Beberapa flavonoid menghambat fosfodiesterase, sedangkan flavonoid lain menghambat aldoreduktase, monoaminoksidase, protein kinase, DNA polimerase dan lipooksigenase. Penghambatan siklooksigenase dapat menimbulkan pengaruh lebih luas karena reaksi siklooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju ke hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin sendiri penting dalam peningkatan hypothalamic therm set point. Mekanisme penghambatan inilah yang menerangkan efek antipiretik dari flavonoid (Tjay, 2002).

#### 4. Kegunaan

Berbagai bagian tumbuhan Srikaya di Indonesia seperti daun, akar, buah, kulit batang, dan biji, sudah sejak lama digunakan masyarakat dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Misalnya, daun tumbuhan ini digunakan untuk mengatasi encok, batuk, salesma, demam, rematik, gangguan saluran pencernaan seperti diare, disentri, dan penyakit kulit, seperti borok, luka, bisul, kudis, ekzema, dan menurunkan kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Adapun biji *Annona squamosa* digunakan untuk pengobatan gangguan pencernaan

dan cacingan, sedangkan buah tumbuhan ini digunakan pula untuk gangguan pencernaan seperti diare, dan disentri. Akar dan kulit batang digunakan untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan seperti sembelit, diare, dan disentri. Dilaporkan pula bahwa buah *Annona squamosa*, kecuali sebagai bahan minuman dan makanan, digunakan pula sebagai sari rapet, sedangkan biji digunakan sebagai insektisida (Achmad, dkk., 2007).

## **B. Uraian Hewan Coba**

### **1. Klasifikasi Mencit (Malole, 1989).**

Kerajaan	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Subkelas	: Theria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

### **2. Karakteristik Hewan Coba**

Mencit adalah hewan pengerat yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole, 1989).

**Tabel 1.** Nilai Fisiologis Mencit (Malole, 1989)

- Berat badan	
- Jantan	20-40 g
- Betina	25-40 g
- Luas permukaan tubuh	20 g : 36 cm <sup>2</sup>
- Temperatur tubuh	36,5-38,0°C
- Jumlah diploid	40
- Harapan hidup	1,5-3,0 tahun
- Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari
- Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
- Mulai dikawinkan :	
- Jantan	50 hari
- Betina	50-60 hari
- Lama hamil	19-21 hari
- Umur sapih	21-28 hari
- Jumlah anak perkelahiran	10-12 ekor
- Jumlah pernapasan	94-163/menit
- Detak jantung	325-780/menit
- Volume darah	76-80 mg/Kg
- Tekanan darah	113-147/81-106 mmHg
- Siklus birahi	4-5 hari (polyestrus)



- Glukosa dalam darah	62-175 mg/dl
- Kolesterol	26-82 mg/dl
- Kalsium dalam serum	3,2-9,2 mg/dl
- Phosphat dalam serum	2,3-9,2 mg/dl
- Suhu rektal	35-39°C(rata-rata 37,4°C)
- Butir darah merah	7,0-12,5x10 <sup>6</sup> mm <sup>3</sup>
- Hematokrit	39-49%
- Hemoglobin	10,2-16,6 mg/dl
- Butir darah putih	6-15x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>
- Neutropil	10-40%
- Lymphosit	55-95%
- Eosinophil	0-4%
- Monosit	0,1-3,5%
- Basophil	0-0,3%
- Platelet	160-410x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>
- Protein serum	3,5-7,2 g/dl
- Albumin	2,5-4,8 g/dl
- Globulin	0,6 g/dl
- Nitrogen dalam urea darah	17-28 mg/dl

### **C. Uraian Ekstraksi**

#### **1. Pengertian Ekstraksi**

Ekstraksi adalah proses melarutkan komponen-komponen kimia yang terdapat dalam suatu sampel dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan komponen yang diinginkan. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan masa komponen zat padat ke dalam dan perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian terdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1986).

Dari hasil ekstraksi diperoleh ekstrak. Ekstrak adalah sediaan cair yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995).

#### **2. Mekanisme Ekstraksi**

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM, 1986).

Dengan mengalirnya bahan pelarut ke dalam ruang sel, protoplasma akan membengkak dan bahan kandungan sel akan terlarut sesuai dengan tingkat

kelarutannya. Bahan kandungan sel akan terus masuk ke dalam cairan disebelah luar sampai difusi melintasi membran mencapai keseimbangannya yakni pada saat konsentrasi antara larutan di sebelah dalam dan sebelah luar sel sama besar (Voigt, 1995).

### 3. Maserasi

Istilah *maceration* berasal dari bahasa latin *macerare*, yang artinya “merendam”. Merupakan proses paling tepat dimana obat (sampel) yang telah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 2005).

Ekstraksi adalah suatu cara penyarian simplisia dengan menggunakan penyari tertentu (Harborne, 1987). Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair (Ditjen POM, 2000).

Secara umum ekstrak senyawa metabolit sekunder dari seluruh bagian tumbuhan seperti bunga, buah, daun, kulit batang dan akar dengan proses maserasi menggunakan pelarut organik polar.

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dalam pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Penekanan utama pada maserasi adalah tersedianya waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang akan diekstraksi (Guether, 1987).

Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dalam perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel

akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan bahan alam dalam pelarut tersebut (Lenny, 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah:

a) Ukuran Bahan

Bahan yang akan diekstrak sebaiknya memiliki luas permukaan yang besar untuk mempermudah kontak antara bahan dengan pelarut sehingga ekstraksi berlangsung dengan baik (Hukmah, 2007). Kehalusan bubuk yang sesuai akan menghasilkan ekstraksi yang sempurna dalam waktu yang singkat (Guether, 1987).

b) Lama dan Suhu Ekstraksi

Lamanya waktu maserasi berbeda-beda tergantung pada sifat atau ciri campuran obat dan menstruum. Lamanya harus cukup supaya dapat memasuki semua rongga dari struktur sampel dan melarutkan semua zat yang mudah larut. Lamanya maserasi bisa memerlukan waktu beberapa jam atau beberapa hari untuk ekstraksi yang optimum (Ansel, 2005: 612).

Ekstraksi akan berlangsung cepat dilakukan pada suhu yang tinggi, tetapi hal ini dapat mengakibatkan beberapa komponen yang terdapat dalam rempah-rempah akan mengalami kerusakan (Hijaz, 2009). Ekstraksi yang baik dilakukan pada kisaran suhu 20 °C sampai 80 °C tetapi suhu yang digunakan harus di bawah

titik didih pelarut yang digunakan. Semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan semakin besar sehingga hasil ekstraksi semakin bertambah banyak (Hukmah, 2007).

c) Jenis dan Konsentrasi Pelarut

Menurut (Hukmah, 2007), ada dua pertimbangan dalam memilih jenis pelarut yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi, pelarut tidak berbahaya dan beracun. Pelarut yang paling aman adalah etanol.

**D. Demam**

**1. Pengertian Demam**

Demam merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan suhu di atas normal. Bila diukur pada rectal suhunya mencapai  $> 38^{\circ}\text{C}$ , jika diukur pada oral, suhunya di atas  $37,8^{\circ}\text{C}$  dan jika diukur melalui aksila suhunya di atas  $37,2^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ ). (Schmitt, 1984). Sedangkan menurut NAPN (*National Association of Pediatrics Nurse*) disebutkan bahwa demam terjadi bila bayi yang berumur kurang dari 3 bulan memiliki suhu rectal melebihi  $38^{\circ}\text{C}$ , pada anak dengan umur lebih dari 3 bulan suhu aksila dan oralnya lebih dari  $38,3^{\circ}\text{C}$ .

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang, misalnya terhadap toksinbakteri, peradangan, dan rangsangan pirogenik lain. Bila produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas yang dapat ditoleransi maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara keseluruhan, tetapi bila telah melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini membahayakan tubuh. Batas kritis

sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini belum diketahui secara pasti karena sangat sulit melakukan penelitian mengenai hal tersebut.(Sherwood, 2001).

## 2. Mekanisme Demam

Demam terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangasangan pirogenik, maka monosit, makrofag, dan sel-sel Kupffer mengeluarkan suatu zat kimia yang dikenal sebagai pirogen endogen IL-1 (*Interleukin 1*), TNF $\alpha$  (*Tumor Necrosis Factor  $\alpha$* ), IL-6 (*Interleukin 6*), INF (*Interferon*) yang bekerja pada pusat termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan patokan thermostat. Hipotalamus memepertahankan suhu di titik patokan yang baru dan bukan di suhu normal. Sebagai contoh, pirogen endogen meningkatkan titik patokan menjadi 38,9°C, hipotalamus merasa bahwa suhu normal prademam sebesar 37°C sudah terlalu dingin untuk sushu tubuh, sehingga organ ini memicu mekanisme-mekanisme respon dingin untuk meningkatkan suhu tubuh. (Ganong, 2002).

Berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan suhu tubuh berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang. Rangsangan endogen seperti eksotoksin dan endotoksin menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen diantaranya, IL-1 dan TNF $\alpha$ , selain IL-6 dan IFN. Pirogen endogen ini akan bekerja pada system saraf pusat tingkat OVLT (*Organum Vasculosum Laminae Terminalis*) yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nucleus preoptik, hipotalamus anterior, dan septum palusolum. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E2 melalui metabolisme asam arakidonat jalur

COX-2 (*Cyclooxygenase 2*), dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh yang biasa disebut dengan istilah demam. (Nelwan dan Sudoyo, 2006)

### 3. Penyebab Demam

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam adalah respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. Demam bisa juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan (*Overhating*), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan system imun (Lubis, 2009).

### 4. Penerapan Klinis

Demam pada anak dapat diukur dengan menempatkan thermometer ke dalam rektal, mulut, telinga, serta dapat juga di ketiak segera setelah air raksa diturunkan, selama satu menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca (Soedjatmiko, 2005)

Menurut AAP (*American Academy of Pediatrics*) tidak mengajurkan lagi penggunaan thermometer kaca berisi merkuri karena kebocoran merkuri dapat berbahaya bagi anak dan juga meracuni lingkungan.

Pengukuran suhu mulut aman dan dapat dilakukan pada usia diatas 4 tahun, karena sudah dapat bekerjasama untuk menahan thermometer di mulut. Pengukuran ini juga lebih akurat dibandingkan dengan suhu ketiak (*aksila*). Pengukuran aksila mudah dilakukan, namun hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga hasil yang

diperoleh dari pengukuran tersebut kurang akurat. Pengukuran suhu tubuh melalui rectal cukup akurat karena lebih mendekati suhu tubuh yang sebenarnya dan paling sedikit terpengaruh oleh suhu lingkungan, namun pemeriksaannya tidak nyaman bagi anak-anak (Faris, 2009). Pengukuran suhu melalui telinga (*Infrared Tympanic*) tidak dianjurkan karena dapat memberikan hasil yang tidak akurat sebab liang telinga masih sempit dan basah (Lubis, 2009)

Pemeriksaan suhu tubuh dengan perabaan tangan tidak dianjurkan karena tidak akurat sehingga tidak dapat mengetahui dengan cepat jika suhu mencapai tingkat yang membahayakan. Pengukuran suhu inti tubuh yang merupakan suhu tubuh yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mengukur suhu di dalam tenggorokan atau pembuluh arteri paru. Namun hal ini sangat jarang dilakukan karena terlalu invasif (Soedjatmoko, 2005).

Adapun kisaran nilai normal suhu tubuh adalah :

- a. Suhu oral, antara  $35,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$
- b. Suhu aksila, antara  $34,7^{\circ}\text{C} - 37,3^{\circ}\text{C}$
- c. Suhu rectal, antara  $36,6^{\circ}\text{C} - 37,9^{\circ}\text{C}$
- d. Suhu infrared tympanic, antara  $35,7^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$

Suhu tubuh yang diukur di mulut akan lebih rendah  $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$  dari suhu rectal, dan jika suhu tubuh yang diukur di ketiak akan lebih rendah  $0,8 - 1,0^{\circ}\text{C}$  dari suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah  $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$  dari suhu ketiak.



## 5. Macam-Macam Demam (Soeparman,1987).

Ada beberapa macam demam yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu :

### 1. Demam Septik

Pada setiap demam septic suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali pada ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Demam ini disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang paling tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal maka hal tersebut disebut sebagai demam hektik.

### 2. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.

### 3. Demam Intermiten

Pada demam intermiten suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

### 4. Demam kontinyu

Pada setiap demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat celcius. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

## 5. Demam siklik

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula.

## 6. Mekanisme Penurunan Suhu Badan (Guyton, 1983)

### a. Vasodilatasi

Pada hampir semua area tubuh, pembuluh darah pada kulit mempunyai kecenderungan untuk berdilatasi. Hal ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi, vasodilatasi penuh akan meningkatkan kecepatan pemindahan panas kulit sebanyak delapan kali lipat.

### b. Berkeringat

Efek dari peningkatan suhu yang menyebabkan berkeringat digambarkan oleh garis kurva, yang memperlihatkan peningkatan tujuan dalam kecepatan kehilangan panas melalui evaporasi yang dihasilkan melalui keringat ketika suhu inti tubuh meningkat di atas suhu kritis ( $98,6^{\circ}\text{F}$ ). disamping itu, peningkatan suhu tubuh sebesar  $1^{\circ}\text{C}$  menyebabkan berkeringat cukup banyak untuk membuang sepuluh kali kecepatan metabolisme pembentukan panas tubuh.

### c. Penurunan pembentukan panas tubuh

Mekanisme yang menyebabkan pembentukan panas berlebihan, seperti menggigil dan termogenasi kimia, dihambat dengan kuat.

### ***E. Mekanisme Antipiretik***

Antipiretik merupakan obat yang dapat menurunkan suhu tubuh akibat demam/suhu yang lebih tinggi. Suhu normal pada manusia berada dikisaran antara 36 – 37°C. Kebanyakan analgetik juga memberikan efek antipiretik, dan begitupun sebaliknya antipiretik juga dapat mengurangi rasa sakit yang diderita pasien. Masing-masing obat tergantung yang mana efek paling dominan. Salah satu contoh Acetaminofen dan aspirin memiliki efek antipiretik yang lebih dominan ketimbang efek analgesiknya (Anief, 1997).

#### **1. Penatalaksanaan Demam**

Demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh atau reaksi fisiologi terhadap perubahan titik patokan di hipotalamus. Penatalaksanaan demam bertujuan untuk merendahkan suhu tubuh yang terlalu tinggi, bukan untuk menghilangkan demam. Penatalaksanaan demam dapat dibedakan menjadi dua garis besar yaitu secara non farmakologi dan secara farmakologi. Akan tetapi, diperlukan penanganan demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur < 3 bulan dengan suhu rectal > 38°C, penderita dengan umur 3-12 bulan dengan suhu rectal di atas 39°C, penderita dengan suhu > 40,5°C, dan demam dengan suhu yang tidak turun-turun selama 48-72 jam (Kaneshiro & Zieve, 2010).

#### **2. Terapi Non Farmakologi**

Adapun yang termasuk dalam terapi non farmakologi dari penatalaksanaan demam antara lain :

- a. Pemberian cairan dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi dan beristirahat yang cukup.
- b. Tidak memberikan penderita pakaian panas yang berlebihan pada saat menggigil. Memakai satu lapis pakaian dan satu lapis selimut sudah cukup untuk memberikan rasa nyaman kepada penderita.
- c. Memberikan kompres hangat pada penderita. Pemberian kompres hangat efektif terutama setelah pemberian obat. Jangan memberikan kompres dingin karena akan menyebabkan keadaan menggigil dan meningkatkan kembali suhu inti tubuh (Kaneshiro & Zieve, 2010).

### 3. Terapi Farmakologi

Obat-obatan yang sering digunakan dalam mengatasi demam (antipiretik) adalah paracetamol (asetaminofen) dan ibuprofen. Paracetamol cepat bereaksi dalam menurunkan panas sedangkan ibuprofen memiliki efek kerja yang lama (Graneto, 2010). Pada anak-anak, dianjurkan untuk pemberian paracetamol sebagai antipiretik. Penggunaan OAINS tidak dianjurkan karenakan fungsi antikoagulan dan resiko sindrom Reye pada anak-anak (Kaushik, Pineda & Kest, 2010).

#### **F. Paracetamol (asetaminofen)**

Paracetamol atau asetaminofen biasa digunakan secara luas sebagai analgetik atau antipiretik, walaupun efek analgetik dan antipiretiknya setara dengan aspirin, paracetamol berbeda karena tidak adanya efek anti-inflamasi (Katzung, 2012). Paracetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang sama dan

telah digunakan sejak tahun 1983. Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus aminobenzen (Freddy, 2007). Nama paracetamol maupun asetaminofen berasal dari nama zat kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu: N-acetyl-para-aminophenol atau paraacetyl-amino-phenol. Pada umumnya paracetamol dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi/pengobatan mandiri (Tjay, 2002).

#### 1. Farmakokinetik

Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu  $\frac{1}{2}$  jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam (Freddy, 2007). Paracetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung, 2012). Parasetamol diabsorpsi cpat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu  $\frac{1}{2}$  jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar keseluruh cairan tubuh. Dalam plasma, 25% parasetamol terikat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati, sebagian asetaminofen (80%) dikonjugasi dengan asam glukuronat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu obat ini juga dapat mengalami hidrosilasi. Metabolit hasil hidrosilasi ini dapat menimbulkan methemoglobinemia dan hemolysis eritrosit. Obat ini dieksresikan melalui ginjal, sebagian kecil sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi (Tanu, 2012).

## 2. Farmakodinamik

Paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgetiknya serupa salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa (Freddy, 2007).

## 3. Efek Samping

Reaksi alergi terhadap paracetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa (Freddy, 2007). Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati dalam darah tanpa disertai ikterus; keadaan ini reversibel bila obat dihentikan (Katzung, 2012). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak reversibel (Tjay, 2002).

## 4. Dosis

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 mg/kgBB/hari (Chan dan Gennrich, 2004).

## 5. Interaksi

Paracetamol memperkuat daya kerja antikoagulansia, antidiabetika oral, dan metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfipirazon berkurang bila disertai

dengan penggunaan paracetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan spironolakton. Kerja analgetiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-propoksifen. Penggunaan alkohol disertai paracetamol akan meningkatkan resiko perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombotiknya yang mengakibatkan perdarahan meningkat, penggunaan paracetamol perlu dihentikan satu minggu sebelum pencabutan gigi (Tjay, 2002).

Penggunaan paracetamol sebagai kontrol positif karena Paracetamol merupakan antipiretik yang secara umum dipakai di masyarakat dan mudah didapat selain itu paracetamol sedikit merusak mukosa lambung.

#### ***F. Penginduksi Demam (Pepton)***

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai induksi demam pada mencit. Demam dapat disebabkan gangguan otak atau akibat bahan toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu. Protein merupakan salah satu jenis pirogen yang dapat menyebabkan efek perangsangan terhadap pusat pengaturan suhu sehingga menimbulkan demam. Pemerian pepton berupa serbuk, kuning kemerahan hingga coklat, memiliki bau khas tetapi tidak busuk. Larut dalam air membentuk larutan coklat kekuningan, bereaksi sedikit asam, tidak larut dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 1995).

Pepton merupakan derivat protein yang larut dalam air, yang didapat dari hidrolisis parsial protein oleh asam atau enzim dalam pencernaan. Pepton juga sering digunakan sebagai media pada pembiakan bakteri. Pepton diduga dapat membentuk

pirogen endogen, yang merupakan salah satu zat yang dapat menimbulkan demam (Anonim, 2003)

Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas antipiretik senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, poten sebagai pemicu demam dan tidak mempunyai sifat toksik (Budiman, 2010).

### **G. Pandangan Islam Tentang Tanaman Obat**

Arti sehat secara harfiah adalah suatu yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Orang dikatakan sehat apabila terbebas dari serangan penyakit, sebaliknya dikatakan sakit apabila kondisi fisiknya tidak baik akibat penyakit menular atau penyakit tidak menular. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tentu memiliki juga solusi untuk menjalani hidup sehat.

Dalam Islam juga dikenal dengan istilah pengobatan yang kuratif atau tindakan penyembuhan dari penyakit yang diderita seseorang. Pada hakekatnya tidak seorangpun suka tertimpa penyakit dan siapapun pasti menghendaki agar senantiasa dalam keadaan sehat, karena kegembiraan hati ketika sehat adalah *sunatullah*.

Setiap manusia dituntut untuk berusaha tetapi segala hasil yang diusahakan tetap dikembalikan kepada sang pencipta begitu pula dengan kesembuhan seseorang dari penyakitnya. Tuhan sendiri yang menjamin kesembuhan setiap hambanya yang



sedang sakit jika berobat. Hal ini seperti digambarkan dalam (QS asy-Syu'aara''/26:79-81).

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

*“Yang telah menciptakan aku, maka hanya Dia Yang menunjuki aku, dan Yang hanya Dia memberi aku makan dan minum kepadaku. dan apabila aku sakit, maka hanya Dialah yang menyembuhkan aku dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali)”* (Departemen Agama RI, 2001: 991).

Dari ayat di atas dapat saya simpulkan bahwa yang menciptakan kita di muka bumi ini dengan segala kesempurnaan yang diberikan hanyalah Allah yang maha esa, maka dari itu hanya dia pulalah yang memberikan aku rezeki berupa makanan dan minuman yang halal dan toyyiban. Dan dalam mengarungi kehidupan ini, tak luput aku diberikan cobaan berupa sakit sebagai bukti kasih sayang Allah kepadaku untuk menguatkan imanku agar aku selalu ingat dan dekat kepadanya. Karena cobaan yang diberikan berupa sakit itu datangnyanya dari Allah, maka satu-satunya tempat untuk meminta dan yang akan memberikan kesembuhan hanyalah Allah. Dan dia pulalah yang akan mematikan aku kemudian membangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala yang telah diperbuat selama diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi.

Para ahli pengobatan tradisional telah melakukan eksperimen terhadap obat yang berasal dari tanaman. Mereka merujuk pada berbagai buku medis yang disusun oleh pakar pengobatan. Pada masa kenabian sudah terdapat sekelompok orang yang

ahli dalam pengobatan. Sebagaimana Allah Swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang muslim kita harus menyadari kebesaran Allah Swt dalam menumbuhkembangkan tanaman sampai menjadi sebuah tanaman yang sempurna. Allah swt berfirman dalam (QS al-Waqi'ah/56:63-65).

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾  
 وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾  
 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ  
 حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

*“Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian tanam. Kalian ataukah kami yang menumbuhkannya? Kalau kami berkehendak, benar-benar kami jadikan ia hancur dan kering, maka kalian akan heran dan tercengang”*. (Departemen Agama RI, 2001).

Dari ayat diatas Allah swt. Menunjukkan bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini berupa tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya ataupun yang kita tanam tiada lain yang menumbuhkannya hanyalah Allah swt. Dan dari tumbuhan itu Allah memberikan rahmat berupa buah, biji, daun, bunga dan segala yang ada pada tumbuhan itu untuk kelangsungan hidup manusia termasuk digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Allah dapat pula menunjukkan kebesarannya dengan mematikan semua tumbuhan itu jika ia berkehendak dengan kekeringan ataupun dengan serangan hama. Sungguh Allah maha kuasa atas segala yang ada di muka bumi ini.

Melalui ayat ini Allah Swt mengingatkan kepada hamba-hambanya agar menyadari kebesaran nikmat-Nya, berupa penumbuhan biji tanaman dan benihnya, penganugrahan akar, batang, daun, tangkai, duri, bunga, buah, biji, protein, vitamin dan beberapa hal lain yang hanya dimiliki oleh tumbuhan (Thalbab et al, 2009).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Oleh karena itu, para peneliti mulai berlomba-lomba untuk meneliti kandungan tumbuhan-tumbuhan yang secara klinis bermanfaat bagi kesehatan.

Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS asy-Syu'ara'/26: 7-9) yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang”* (Departemen Agama RI, 2001).

*Apakah mereka tidak melihat ke bumi,* dari ayat ini sungguh Allah menunjukkan bukti kemahakuasaannya dengan menciptakan muka bumi beserta seluruh isinya termasuk tumbuh-tumbuhan yang begitu banyaknya Allah tumbuhkan yang luasnya sampai batas mata memandang. Dari tumbuhan itu sungguh berbagai kebaikan yang Allah berikan termasuk tumbuhan obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. memerintahkan hambanya mengarahkan pandangannya hingga seantero bumi untuk memperhatikan

keanekaragaman tumbuh-tumbuhan serta keajaiban yang terdapat pada tumbuhan itu. Tumbuhan yang baik adalah yang subur dan bermanfaat bagi makhluk hidup.

Selain ayat di atas, Allah Swt. berfirman dalam (QS al An'am/6:99).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
خُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ  
وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

*“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”* (Departemen Agama RI, 2001).

Ayat ini masih merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt.

*Dan dia yang menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan deras dan banyak dari langit, lalu dari air hujan itu Kami tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.*

Ayat ini mengemukakan tentang tumbuh-tumbuhan dengan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, semua jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, karbohidat. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada

bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber utama air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi hanya tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkan kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium yang menggunakan mencit sebagai hewan percobaan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Sampel***

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun srikaya yang diambil di daerah Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.

#### ***C. Instrumen Penelitian***

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan antara lain adalah Bejana Maserasi, Blender, Cawan porselin, Gelas kimia 250 ml (Iwaki pyrex), Gelas ukur 10 ml (Iwaki pyrex), Gelas Ukur 50 ml (Iwaki pyrex), Gelas ukur 100 ml (Iwaki pyrex), Kanula, Kain saringan, Rotavafor, Timbangan Analitik, Termometer.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan adalah air suling, daun Srikaya (*Annona squamosa* L.), etanol 96%, Na CMC 1%, mencit (*Mus musculus*) jantan, Pepton 10%, Paracetamol, makanan hewan uji (pelet).

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi eksperimental. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung.

Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti.

##### **1. Penyiapan Sampel**

Daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) yang diperoleh dari Kabupaten Enrekang Sulawesi selatan, kemudian dipisahkan-pisahkan lalu dibersihkan dengan cara dicuci dengan air mengalir. Kemudian dirajang dan dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu diserbukkan.

##### **2. Ekstraksi Sampel Etanol Daun Srikaya (*Annona squamosa* L.)**

Sampel daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) yang telah kering ditimbang sebanyak 800 gram dimasukkan ke dalam wadah maserasi, dibasahi dengan pelarut etanol 96% hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali etanol hingga batas pelarut 2 cm di atas simplisia. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Kemudian dilakukan remaserasi selama 2 x 24 jam, lalu dipisahkan antara ampas dan filtrat dengan cara disaring. Filtrat yang diperoleh kemudian di rotavapor dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol yang kental. Setelah itu, ekstrak etanol dibebaskan dengan ditambahkan 5 tetes air suling kemudian dipanaskan diatas penangas sampai

menguap hingga diperoleh ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* L.). Ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

### **3. Pembuatan Na-CMC 1 % b/v**

Sebanyak 1 gram Na-CMC dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam 50 ml air suling panas (suhu 70°C) sambil diaduk hingga terbentuk larutan koloidal dan dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 ml.

### **4. Pembuatan Pepton 10%**

Larutan pepton 10% dibuat dengan menimbang 10g pepton kemudian dilarutkan dalam 100 ml air suling.

### **5. Pembuatan Suspensi Paracetamol**

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 602,95 mg. dimasukkan semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak 46 mg yang disuspensikan dalam larutan Na-CMC 1% sebanyak 20 ml.

### **6. Pemilihan dan penyiapan hewan coba**

Hewan uji yang digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*) jantan yang sehat sebanyak 15 ekor dengan bobot badan 20-30 gram. Sebelumnya mencit diaklimatisasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan stres akibat transportasi. Mencit dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, tiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit jantan yang ditentukan secara acak. Kelompok 1 sebagai kontrol sedangkan kelompok 2–5 sebagai kelompok perlakuan.



## 7. Perlakuan terhadap hewan uji

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. Pertama-tama diukur suhu rektal awal mencit, kemudian diinduksi demam menggunakan pepton 10% 1 ml/30 gram BB mencit secara peroral setelah 30 menit suhu rectal mencit kemudian diukur kembali dengan menggunakan thermometer digital, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut

- Kelompok 1 : diberi perlakuan pemberian Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif.
- Kelompok 2 : kontrol positif paracetamol dengan perlakuan pemberian per oral dosis 1,95 mg/30 gram BB mencit.
- Kelompok 3 : diberi perlakuan pemberian ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) per oral dengan dosis 100 mg/gram BB mencit.
- Kelompok 4 : diberi perlakuan pemberian ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) per oral dengan dosis 150 mg/gram BB mencit.
- Kelompok 5 : diberi perlakuan pemberian ekstrak etanol daun Srikaya (*Annona squamosa* L.) per oral dengan dosis 200 mg/gram BB mencit.

Setelah diberi perlakuan suhu rectal mencit kemudian diukur kembali masing-masing pada menit ke 60, 90 dan 120.

***E. Teknik Pengolaan dan Analisis Data***

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis Rancangan Acak Lengkap (RAL)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstraksi Daun Srikaya

Ekstraksi 800 gram simplisia daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) yang dimaserasi menggunakan larutan etanol 96% sebanyak 2 kali siklus maserasi hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 65,734 gram. Data dapat dilihat pada tabel

Tabel 2. Hasil ekstraksi daun Srikaya (*Annona squamosa* Linn).

Maserasi	Jenis Ekstrak	Pelarut	Bobot (Gram)	(Rendamen)
1	Ekstrak Kental	Etanol 96%	36.628	9.16%
2	Ekstrak Kental	Etanol 96%	29.106	7.27%
<b>Jumlah</b>			65.734	16.43%

##### 2. Hasil perlakuan uji

Mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian sediaan uji ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) secara oral menunjukkan perubahan suhu yang berbeda-beda dan dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif dan negatif. Hasil pengukuran rata-rata penurunan suhu mencit yang diberi perlakuan tersebut disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil pengukuran penurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn).

Kelompok	Replikasi	Pengukuran (°C)				
		B	B <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>
Negative	1	36.4	37.4	37.5	37.4	37.4
	2	36.7	37.2	37.6	37.2	37.2
	3	36.3	36.4	37.0	37.3	37.3
Positif (Paracetamol)	1	35.8	37.3	36.8	36.3	35.8
	2	35.5	36.9	36.5	36.1	35.7
	3	35.2	36.3	36.0	35.5	35.1
Dosis 100 mg/g BB Mencit	1	36.0	36.7	36.4	36.3	36.0
	2	35.3	36.1	35.9	35.7	35.5
	3	35.5	36.4	36.1	35.9	35.6
Dosis 150 mg/g BB Mencit	1	35.6	37.5	37.1	36.7	36.3
	2	34.3	35.7	35.4	34.9	34.7
	3	35.7	37.1	36.7	36.3	36.0
Dosis 200 mg/g BB Mencit	1	36.2	37.5	36.9	36.5	36.3
	2	36.2	37.5	36.9	36.5	36.2
	3	36.3	37.5	37.0	36.6	36.4

Tabel 4. Hasil penurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian kontrol.

Kelompok	Replikasi	Penurunan Suhu (°C)				
		B <sub>0</sub> ke B <sub>1</sub>	B <sub>1</sub> ke B <sub>2</sub>	B <sub>2</sub> ke B <sub>3</sub>	Jumlah	Rata-Rata
Positif (Paracetamol)	1	0.5	0.5	0.5	1.5	<b>0.5</b>
	2	0.4	0.4	0.4	1.2	<b>0.4</b>
	3	0.3	0.5	0.4	1.2	<b>0.4</b>
<b>Jumlah</b>		1.2	1.4	1.9	3.9	1.3
<b>Rata-Rata</b>		<b>0.4</b>	<b>0.46</b>	<b>0.43</b>	<b>1.3</b>	<b>0.43</b>
<b>Dosis 100</b>	1	0.3	0.1	0.3	0.7	<b>0.24</b>

<b>mg/g BB Mencit</b>	2	0.2	0.2	0.2	0.6	<b>0.2</b>
	3	0.3	0.2	0.3	0.8	<b>0.26</b>
<b>Jumlah</b>		0.8	0.5	0.8	2.1	0.7
<b>Rata-Rata</b>		<b>0.26</b>	<b>0.17</b>	<b>0.26</b>	<b>0.7</b>	<b>0.23</b>
<b>Dosis 150 mg/g BB Mencit</b>	1	0.4	0.4	0.4	1.2	<b>0.4</b>
	2	0.3	0.5	0.2	1.0	<b>0.33</b>
	3	0.4	0.4	0.3	1.1	<b>0.36</b>
<b>Jumlah</b>		1.1	1.3	0.9	3.3	1.09
<b>Rata-Rata</b>		<b>0.36</b>	<b>0.43</b>	<b>0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.36</b>
<b>Dosis 200 mg/g BB Mencit</b>	1	0.6	0.4	0.2	1.2	<b>0.4</b>
	2	0.6	0.4	0.3	1.1	<b>0.43</b>
	3	0.5	0.4	0.2	1.2	<b>0.36</b>
<b>Jumlah</b>		1.7	1.2	0.7	3.5	1.19
<b>Rata-Rata</b>		<b>0.56</b>	<b>0.4</b>	<b>0.23</b>	<b>1.16</b>	<b>0.39</b>

Keterangan :

- B : suhu tubuh awal
- B<sub>0</sub> : suhu tubuh menit ke-30 setelah di induksi pepton
- B<sub>1</sub> : suhu tubuh menit ke-60 suhu tubuh setelah di beri ekstrak
- B<sub>2</sub> : suhu tubuh menit ke-90 setelah diberi ekstrak
- B<sub>3</sub> : suhu tubuh menit ke-120 setelah diberi ekstrak

### **B. Pembahasan**

Antipiretik merupakan golongan obat yang diperlukan untuk menurunkan suhu tubuh bila terjadi peningkatan suhu tubuh (demam). Demam didefinisikan sebagai suatu kejadian ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu normal. Demam terjadi ketika ada stimulus pada monosit makrofag yang sesuai, sehingga sel-sel ini menghasilkan sitokin pirogenik, yang menyebabkan peningkatan sel point di hipotalamus (Elizabeth J. Corwin, 2002).

Tanaman yang berkhasiat sebagai antipiretik yaitu srikaya. Pemanfaatan daun srikaya sebagai obat penurun panas masih secara empiris sehingga perlu dilakukan penelitian yang bersifat ilmiah dalam hal ini efek antipiretiknya untuk menurunkan suhu tubuh sehingga dapat dibuktikan keamanan dan pemanfaatannya. Secara turun-temurun masyarakat menggunakan rebusan daun srikaya untuk mencegah masuk angin atau influenza, menurunkan demam, dan mengobati luka (Achmad, dkk., 2007).

Ekstraksi daun srikaya dilakukan secara maserasi menggunakan cairan penyari etanol 96%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa yang bersifat polar dan semi polar sehingga digunakan cairan penyari etanol 96%. Ekstraksi dengan metode maserasi merupakan ekstraksi secara dingin, metode ini tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang diperkirakan nantinya akan merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Maserasi juga dilakukan dalam ruang tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia. Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak kental daun srikaya (*Annona squamosa* Linn.) sebanyak 65.734 gram dan rendamennya 16,43%.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) dibagi dalam 5 kelompok pengujian yaitu pengujian terhadap ekstrak daun srikaya secara oral dengan dosis 100 mg, 150 mg, 200 mg, dan masing-masing per 30 gram BB mencit, sebagai control positif digunakan paracetamol 1,95 mg/ 30 gram BB mencit

dan control negatif yang digunakan Na-CMC 0,1 mg/ 30 gram BB mencit. Mencit dibuat demam dengan pemberian larutan pepton 10% secara oral 1 ml/30 gram BB mencit, lalu suhu rektal mencit diukur dengan menggunakan thermometer digital setiap interval waktu 30 menit hingga menit ke 120.

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai penginduksi demam pada hewan coba. Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas antipiretik senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, pepton sebagai pemicu demam dan tidak mempunyai sifat toksik (Budiman, 2010).

Protein yang berlebihan pada tubuh mencit akan menyebabkan demam pada mencit. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton  $\pm$  5 menit mencit mengalami berbagai hal yaitu menggigil, mengantuk, peningkatan rasa haus dan demam. pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal.

Demam dapat timbul dari terpaparnya tubuh terhadap pirogen eksogen karna ketika pirogen eksogen masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan terstimulasinya pirogen endogen untuk melindungi tubuh dan menciptakan kekebalan melawan pirogen eksogen tersebut. Contoh pirogen endogen yang ada dalam tubuh adalah

interleukin-1 (IL-1),  $\alpha$ -interferon, dan tumor necrosis factor (TNF). IL-1 berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh yaitu antara lain dapat menstimulasi limfosit T dan B, mengaktivasi netrofil, merangsang sekresi reaktan (C-reactive protein, haptoglobin, fibrinogen) dari hepar, mempengaruhi kadar besi dan seng plasma dan meningkatkan katabolisme otot. IL-1 bereaksi sebagai pirogen yaitu dengan merangsang sintesis prostaglandin E2 di hipotalamus, yang kemudian bekerja pada pusat vasomotor sehingga meningkatkan produksi panas sekaligus menahan pelepasan panas, sehingga menyebabkan demam. TNF (cachectin) juga mempunyai efek metabolisme dan berperan juga pada penurunan berat badan yang kadang-kadang diderita setelah seseorang menderita infeksi. TNF bersifat pirogen melalui dua cara, yaitu efek langsung dengan melepaskan prostaglandin E2 dari hipotalamus atau dengan merangsang pelepasan IL-1. Sedangkan, alpha-interferon (IFN- $\alpha$ ) adalah hasil produksi sel sebagai respons terhadap infeksi virus.

Prostaglandin yang dihasilkan pirogen-pirogen itu kemudian mensensitisasi reseptor dan diteruskan oleh reseptor sampai hipotalamus yang akan menyebabkan peningkatan derajat standar panas hipotalamus (Hypothalamic Thermostat). Peningkatan derajat standar panas hipotalamus inilah yang akan memicu sistem pengaturan suhu tubuh (thermoregulation) untuk meningkatkan suhu, maka terjadilah demam.

Parasetamol sebagai salah satu obat analgetik non opioid bekerja melalui penghambatan siklooksigenase. Parasetamol menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam arakhidonat menjadi prostaglandin terganggu. Setiap obat



menghambat siklooksigenase secara berbeda. Parasetamol menghambat siklooksigenase pusat lebih kuat dari pada aspirin, inilah yang menyebabkan Parasetamol menjadi obat antipiretik yang kuat melalui efek pada pusat pengaturan panas. Parasetamol hanya mempunyai efek ringan pada siklooksigenase perifer. Inilah yang menyebabkan Parasetamol hanya menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol tidak mempengaruhi nyeri yang ditimbulkan efek langsung prostaglandin, ini menunjukkan bahwa parasetamol menghambat sintesa prostaglandin dan bukan blokade langsung prostaglandin. Obat ini menekan efek zat pirogen endogen dengan menghambat sintesa prostaglandin, tetapi demam yang ditimbulkan akibat pemberian prostaglandin tidak dipengaruhi, demikian pula peningkatan suhu yang disebabkan oleh latihan fisik (Aris 2009).

Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit jantan dengan berat badan 20-30 gram. Alasan pemeliharaan mencit jantan, karena mencit jantan tidak mengalami siklus hormonal seperti mencit betina. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetik, atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengelolaan, di samping faktor ekonomis, mudah diperoleh, dan mampu memberikan reaksi biologis yang mirip pada reaksi biologis manusia (Lisdiyanti, 2008).

Penentuan efek penurunan demam dilakukan dengan mengukur suhu setelah pemberian obat hingga rentang waktu 2 jam. Kondisi demam pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan thermometer digital.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan rata-rata selisih penurunan suhu rata-rata antar waktu terhadap suhu demam dari menit ke 60, 90 dan menit ke 120. Untuk dosis 100 mg/30 gram, 150 mg/30 gram, 200 mg/30 gram BB mencit, dan paracetamol pada menit ke 60 menit masing-masing mengalami penurunan suhu berturut-turut sebesar 0.26, 0.36, 0.56 dan 0.4°C. Pada menit yang sama control negatif dengan penginduksi Na-CMC mengalami kenaikan suhu rata-rata sebesar 0.36°C . Untuk dosis 100 mg/30 gram, 150 mg/30 gram, 200 mg/30 gram BB mencit, dan paracetamol pada menit ke 90 masing-masing berturut-turut sebesar 0.17, 0.43, 0.4, dan 0.46°C. Untuk dosis 100 mg/30 gram, 150 mg/30 gram, 200 mg/30 gram BB mencit dan paracetamol pada menit ke 120 masing-masing berturut-turut mengalami penurunan suhu sebesar 0.26, 0.3, 0.23 dan 0.43°C. Penurunan suhu rata-rata mencit setiap interval waktu dari menit ke-30 sampai menit ke-120 Untuk dosis 100 mg/30 gram, 150 mg/30 gram, 200 mg/30 gram BB mencit, dan paracetamol secara berturut turut sebesar 0.23, 0.36, 0.39 dan 0.43°C. Penurunan suhu yang hampir sama dengan kontrol positif paracetamol yaitu pada dosis 200 mg/30 gram BB mencit.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pengaruh sediaan terhadap suhu tubuh dan pengaruh lama pemberian (onset) terhadap suhu tubuh mencit menunjukkan hasil bahwa pemberian beberapa dosis ekstrak daun srikaya memberikan efek antipiretik yang berbeda-beda dan menunjukkan penurunan tubuh yang signifikan (1% dan 5%). Hal ini dapat dilihat pada tabel dimana F hitung > F table.

Adapun tinjauan islam yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dijelaskan melalui surah Asy- Syu'ara ayat 7-9. Dimana Allah swt. Berfirman bahwa: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut, Allah menunjukkan bukti kemahakuasaannya dengan menciptakan muka bumi berserta seluruh isinya termasuk tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak Allah tumbuhkan yang luasnya sampai batas mata memandang. Dari tumbuhan itu sungguh berbagai kebaikan yang Allah berikan termasuk tumbuhan obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu tumbuhan ciptaan Allah swt. adalah tumbuhan srikaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daun srikaya dapat dimanfaatkan sebagai obat penurun demam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) dengan dosis 100 mg, 150 mg, dan 200 mg masing-masing per 30 gram BB mencit dapat memberikan efek antipiretik pada mencit.
2. Efek antipiretik ekstrak daun srikaya yang paling efektif digunakan untuk menurunkan dosis suhu rektal mencit demam yaitu dosis 200 mg/30 gram BB mencit.
3. Setiap penyakit ada obatnya begitupun dengan demam sebagai reaksi tubuh yang menandakan adanya suatu gejala penyakit, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka telah ditemukan salah satu obat yang diciptakan oleh Allah swt yaitu daun srikaya sebagai tumbuhan yang biasa dijadikan obat penurun demam. Islam membolehkan penggunaan obat-obatan selama halal, baik dan bermanfaat (halalan-thayyiban).

#### ***B. Saran***

1. Perlu penambahan variasi dosis dan waktu dalam pengamatan
2. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

## KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Departemen Agama. 2001
- Achmad, dkk., maulana. *Kamus Ilmiah Popular Absolut*. Yogyakarta. 2007.
- Amila, dkk. *Uji Antipiretik Jus Jeruk Nipis Pada Tikus Putih Galur Sprague Dawley Sel Kelamin*. Bandung: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi Unisba. 2008
- Anief, Mof. *Formulasi Obat Topical Dengan Dasar Penyakit Kulit. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. 1997.
- Ansel, H. C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi ed. IV*. UI Press. 2008.
- Azwar, azrul. *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1999
- Chan p. d. Gennrich, j. 1. *Current Clinical Strategies Pediatrics*. 2004.
- Elizabeth J. Corwin. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta : EGC. 2002.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI, 1979
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Depkes RI. 1995.
- Fachruddin, dan irfan Fachruddin. *Pilihan Sabdarasul Hadis-Hadis Pilihan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Freddy, Rangkuti. *Manajemen Persediaan Aplikasi Dibidang Bisnis*. Jakarta: PT. rajagrafindo persada. 2007.
- Ganong, William, f. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC. 2002.
- Gejalakshmi, Wilmana P. F. *Analgetik-Antipiretik. Analgesic Anti-Inflamasi Nonsteroid Dan Obat Pirai: Farmakologi Dan Terapi. Edisi Ke-4*. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1995.
- Guenther, E. *Minyak Atsiri diterjemahkan S. Ketaren Jilid I*. Jakarta: Penerbit UI Press. 1987.
- Guyton, A. C. *Buku Teks Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1983.


- H. M. Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensic*, Malang: Malang Fakultas Kedokteran UNIBRAW. 2005.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia*. Bandung: ITB. 1987
- Hegnaur, R. *Phytochemistry And Plant Taxonomy-An Assay On The Chemotaxonomy Of Higher Plant, J, Phytochemistry*. 1986
- Hukmah, S. *Aktivitas Antioksidan Katekin dari Teh Hijau (Camellia Sinensis O.K. Var. Assamica (mast)) Hasil Ekstraksi Dengan Variasi Pelarut dan Suhu.Skripsi*. Malang Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri. 2007.
- Kaneshiro N. K. and Zieve D. *Fever*. University of Washington. 2010.
- Katzung,B.G. *Farmakologidasar Dan Klinik. Penerjemah: Dripta Sjabana Dkk. Edisi Kedua*. Jakarta: Penerit Salemba Medika. 2002.
- Kaushik A, Pineda C, Kest H. *Diagnosis And Management Of Dengue Fever In Children. Peds In Review*. 2010.
- Lenny S. *Senyawa Flavonoid, Fenilpropanoida dan Alkaloida*. Medan: Fak. MIPA. USU. 2006.
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Malole, M. B. M. dan pramono, c. s. u. *Penggunaan Hewan –Hewan Coba Percobaan Di Laboratorium*. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi, IPB. 1989
- Nelwan, R.H.H., Sudoyo, A.W. *Demam: Tipe dan Pendekatan Dalam:; Editor. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi Keempat Jilid Ketiga*. Jakarta: Pusat Penerbit Departemen Ilmu Penyakit Dalam. 2006.
- Schmitt, b.d. *fever in childhood*. 1984.
- Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001.
- Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam. Jilid I*. Jakarta: FKUI. 1987.
- Swem D. *Bailey's Industrial Oil And Fat Products. Volume 2*. New York: John Wiley and Son. 1982.

- Syilfia Hasti dkk., *Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol, Fraksi N-Heksana Dan Fraksi Etil Asetat Daun Beringin (Ficus benjamina L.) Pada Tikus Putik Jantan (Rattus norvegicus)*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. 2012
- Sherwood, L. *Fisiologi Manusia; dari Sel ke Sistem. Edisi 2*. Jakarta: EGC. 2001.
- Tanu, Ian. *Departemen Farmakologi dan Terapeutik Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: FK-UI. 2011
- Tjay, t. h. rahardja. K. *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya. Edisi VI*. Jakarta: penerbit PT. elex media komputindo. 2002.
- Tjitrosoepomo, Gembong.. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1985
- Vanderlip, S.L. New York: Mice Barron's. 2001
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Ugm Press. 1995.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Kerja


#### 1. Penyiapan Sampel




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## 2. Pembuatan larutan koloidal Na-CMC 1 % b/v




## 3. Perlakuan pada hewan coba



**Lampiran 2. Gambar****Gambar 1. Proses Maserasi Sampel daun Srikaya****Gambar 2. Proses Penyaringan Sampel daun Srikaya****Gambar 3. Proses Evaporasi Sampel daun Srikaya**

**Gambar 4. Ekstrak Etanol daun Srikaya**



**Gambar 5. HewanCoba Mencit Jantan (*Musmusculus*)**



**Gambar 6. Penimbangan Hewan Coba Mencit Jantan (*Mus musculus*)**



**Gambar 7. Pengukuran suhu rektal Hewan Coba Mencit Jantan (*Mus musculus*)**



**Gambar 8. Proses pemasukan obat dalam tubuh Hewan Coba**



**Gambar 9. Thermometer digital**



**Gambar 10. Gambar penimbangan Na-CMC**



**Gambar 11. Proses Penimbangan Ekstrak Etanol daun Srikaya**



**Gambar 12. Proses Penimbangan Paracetamol**



**Gambar 13. Proses Pembuatan Aquades**





### Lampiran 3. Perhitungan dan Analisis Statistik

#### 1. Perhitungan Dosis Obat Paracetamol dan Perhitungan Dosis Ekstrak

Tabel 5. Berat badan Mancit jantan yang digunakan untuk penelitian

No	Perlakuan	Kelompok	Berat Badan
1.	Na-CMC 1%	A	27 gr
		B	29 gr
		C	27 gr
2.	Paracetamol	A	30 gr
		B	27 gr
		C	28 gr
3.	Dosis 100 mg/g BB Mancit ekstrak daun Srikaya	A	28 gr
		B	29 gr
		C	29 gr
4.	Dosis 150 mg/g BB Mancit ekstrak daun Srikaya	A	27 gr
		B	28 gr
		C	30 gr
5.	Dosis 200 mg/g BB Mancit ekstrak daun Srikaya	A	29 gr
		B	29 gr
		C	27 gr

##### a. Perhitungan Paracetamol, sebagai kontrol positif

Dosis paracetamol 500 mg untuk manusia, dan Faktor konversi manusia 70 kgBB untuk mencit 30 gr adalah 0,0026.

$$\begin{aligned}
 \text{Dosis Hewan (30 gr)} &= D_o \times FK \times \frac{\text{Berat mencit ditimbang}}{\text{Berat mencit terstandar}} \\
 &= 500 \text{ mg} \times 0,018 \times \frac{30 \text{ gr}}{20 \text{ gr}} \\
 &= 1,95 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

Menurut FI edisi III penetapan kadar tablet = 20 tablet, maka diambil 20 tablet Paracetamol, digerus, dan ditimbang berat totalnya= 12059 mg

$$\begin{aligned}
 \text{Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 20 tablet}}{20} \\
 &= \frac{12059}{20} \\
 &= 602.95 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{\text{Dosis hewan}}{D_0} \times \text{berat rata-rata} \\
 &= \frac{1.95 \text{ mg}}{500 \text{ mg}} \times 602.95 \text{ mg} \\
 &= 0,0039 \text{ mg} \times 602.95 \text{ mg} \\
 &= 2.3 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

Pembuatan sediaan suspensi Paracetamol: ditimbang 46 mg (2.3 mg x 20 ml) Paracetamol yang telah digerus, kemudian dilarutkan dalam 20 ml Na-CMC 1%

Volume pemberian (volume maksimal maksimal 1 ml/30grBB Mencit):

$$\text{Untuk berat badan mencit 30 gr} = \frac{30 \text{ gr}}{30 \text{ gr}} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$\text{Untuk berat badan mencit 29 gr} = \frac{29 \text{ gr}}{30 \text{ gr}} \times 1 \text{ ml} = 0.96 \text{ ml}$$

$$\text{Untuk berat badan mencit 28 gr} = \frac{28 \text{ gr}}{30 \text{ gr}} \times 1 \text{ ml} = 0.93 \text{ ml}$$

$$\text{Untuk berat badan mencit 27 gr} = \frac{27 \text{ gr}}{30 \text{ gr}} \times 1 \text{ ml} = 0.9 \text{ ml}$$

b. Perhitungan variasi dosis ekstrak etanol daun srikaya.

1) Dosis 100mg/grBB Mencit

$$\text{Dosis mancit} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 100 \text{ mg/gBB} = 3 \text{ mg}$$

Pembuatan sediaan suspensi dosis 100mg/grBB Mencit: ditimbang 15 mg (3 mg x 5 ml), kemudian dilarutkan dalam 5 ml Na-CMC 1%

## 2) Dosis 150mg/grBB Mencit

$$\text{Dosis mancit} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 150 \text{ mg/gBB} = 4.5 \text{ mg}$$

Pembuatan sediaan suspensi dosis 150mg/grBB Mencit: ditimbang 22.5 mg (4.5 mg x 5 ml), kemudian dilarutkan dalam 5 ml Na-CMC 1%

## 3) Dosis 200 mg/grBB Mencit

$$\text{Dosis mancit} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 200 \text{ mg/gBB} = 6 \text{ mg}$$

Pembuatan sediaan suspensi dosis 200mg/grBB Mencit: ditimbang 30 mg (6 mg x 5 ml), kemudian dilarutkan dalam 5 ml Na-CMC 1%

2. Hasil perhitungan penurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) dan kontrol.

Tabel 6. Hasil perhitungan penurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) dan kontrol.

Kelompok	Hewan	Pengukuran					Jumlah	rata-rata
		B	B <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>		
Negative	mencit 1	36.4	37.4	37.5	37.4	37.4	186.1	<b>37.22</b>
	mencit 2	36.7	37.2	37.6	37.2	37.2	185.9	<b>37.18</b>
	mencit 3	36.3	36.4	37.0	37.3	37.3	184.3	<b>36.86</b>
jumlah		109.4	111	112.1	111.9	111.9	556.3	111.26
rata-rata		<b>36.4</b>	<b>37.0</b>	<b>37.3</b>	<b>37.3</b>	<b>37.3</b>	<b>185.3</b>	<b>37.06</b>
positif PCT	mencit 1	35.8	37.3	36.8	36.3	35.8	182	<b>36.4</b>
	mencit 2	35.5	36.9	36.5	36.1	35.7	180.7	<b>36.14</b>
	mencit	35.2	36.3	36.0	35.5	35.1	178.1	<b>35.62</b>

	3							
jumlah		106.5	110.5	109.3	107.9	106.6	540.8	108.16
<b>rata-rata</b>		<b>35.5</b>	<b>36.8</b>	<b>36.43</b>	<b>36.0</b>	<b>35.53</b>	<b>180.26</b>	<b>36.05</b>
<b>dosis 100 mg</b>	mencit 1	36.0	36.7	36.4	36.3	36.0	181.4	<b>36.28</b>
	mencit 2	35.3	36.1	35.9	35.7	35.5	178.5	<b>35.7</b>
	mencit 3	35.5	36.4	36.1	35.9	35.6	179.5	<b>35.9</b>
jumlah		106.8	109.2	108.4	107.9	107.1	539.4	107.88
<b>rata-rata</b>		<b>35.6</b>	<b>36.4</b>	<b>36.1</b>	<b>35.9</b>	<b>35.7</b>	<b>179.7</b>	<b>35.94</b>
<b>dosis 150 mg</b>	mencit 1	35.6	37.5	37.1	36.7	36.3	183.2	<b>36.6</b>
	mencit 2	34.3	35.7	35.4	34.9	34.7	175	<b>35.0</b>
	mencit 3	35.7	37.1	36.7	36.3	36.0	181.8	<b>36.3</b>
jumlah		105.6	110.3	109.2	107.9	107	539.2	107.9
<b>rata-rata</b>		<b>35.2</b>	<b>36.7</b>	<b>36.4</b>	<b>35.9</b>	<b>35.6</b>	<b>179.8</b>	<b>35.96</b>
<b>dosis 200 mg</b>	mencit 1	36.2	37.5	36.9	36.5	36.3	183.4	<b>36.68</b>
	mencit 2	36.2	37.5	36.9	36.5	36.2	183.3	<b>36.66</b>
	mencit 3	36.3	37.5	37.0	36.6	36.4	183.8	<b>36.76</b>
jumlah		108.7	112.5	110.8	109.6	108.9	550.5	110.1
<b>rata-rata</b>		<b>36.2</b>	<b>37.5</b>	<b>36.9</b>	<b>36.5</b>	<b>36.3</b>	<b>183.4</b>	<b>36.68</b>

Tabel 7. Perhitungan rata-rata suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun srikaya (*Annona squamosa* Linn) dan kontrol.

Perlakuan	B	B <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	Jumlah
<b>Negatif</b>	36.4	37.0	37.3	37.3	37.3	<b>185.3</b>
<b>Positif</b>	35.5	36.8	36.43	36.0	35.53	<b>180.26</b>
<b>100 mg</b>	35.6	36.4	36.1	35.9	35.7	<b>179.7</b>
<b>150 mg</b>	35.2	36.7	36.4	35.9	35.6	<b>179.8</b>
<b>200 mg</b>	36.2	37.5	36.9	36.5	36.3	<b>183.4</b>
<b>Jumlah</b>	<b>178.9</b>	<b>184.4</b>	<b>183.13</b>	<b>181.6</b>	<b>180.43</b>	<b>908.46</b>

Keterangan :

- B : Suhu tubuh awal  
 B<sub>0</sub> : Suhu tubuh menit ke 30 setelah di induksi  
 B<sub>1</sub> : Suhu tubuh menit ke 60 setelah di beri ekstrak  
 B<sub>2</sub> : Suhu tubuh menit ke 90 setelah diberi ekstrak  
 B<sub>3</sub> : Suhu tubuh menit ke 120 setelah diberi ekstrak

$$\begin{aligned} \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{ulangan}} \\ &= \frac{(908.46)^2}{5 \times 5} \\ &= \frac{825299.5716}{25} \\ &= 33011.9828 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \Sigma(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\ &= [(36.4)^2 + (37.0)^2 + \dots + (36.3)^2 - 32997.4491] \\ &= 33021.9749 - 33011.9828 \\ &= 9.9921 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(\text{T}_{ij})^2}{r} - \text{FK} \\ &= \frac{[(185.3)^2 + (180.26)^2 + \dots + (183.4)^2]}{5} - 33011.9828 \\ &= \frac{165085.4476}{5} - 33011.9828 \\ &= 33017.0895 - 33011.9828 \\ &= 5.1067 \end{aligned}$$

D. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)

$$\begin{aligned} &= JKT - JKP \\ &= 9.9921 - 5.1067 \\ &= 4.8854 \end{aligned}$$

E. Derajat Bebas Total (DBT)

$$\begin{aligned} &= \sum n - 1 \\ &= (5 \times 5) - 1 \\ &= 25 - 1 \\ &= 24 \end{aligned}$$

F. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)

$$\begin{aligned} &= p - 1 \\ &= 5 - 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

G. Derajat Bebas Galat (DBG)

$$\begin{aligned} &= DBT - DBP \\ &= 24 - 4 \\ &= 20 \end{aligned}$$

H. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$\begin{aligned} \text{(KTP)} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\ &= \frac{5.1067}{4} \\ &= 1.276675 \end{aligned}$$

I. Kuadrat Tengah Galat (KTG)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\ &= \frac{4.8854}{20} \end{aligned}$$

$$= 0.24427$$

J. F Hitung Perlakuan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{1.276675}{0.24427} \\ &= 5.2222 \end{aligned}$$

### 3. Analisis Varians dan F tabelnya

Tabel 8. Analisis keseragaman dan F tabel penurunan suhu rektal pada hewan coba.

Standar keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	5.1067	1.276675	5.2222*	2.87	4.43
Galat	20	4.8854	0.24427			
Total	24	9.9921				

Keterangan :

\* = Signifikan

Ns = Non signifikan

Kesimpulan

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5 %. F hitung dinyatakan signifikan jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan.

### 4. Statistik ANOVA

Tabel 9: *one-way* ANOVA

#### Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Negative	5	37.0600	.39115	.17493	36.5743	37.5457	36.40	37.30

Positif	5	36.052 0	.56619	.25321	35.3490	36.7550	35.50	36.80
100 mg	5	35.940 0	.32094	.14353	35.5415	36.3385	35.60	36.40
150 mg	5	35.920 0	.62209	.27821	35.1476	36.6924	35.20	36.70
200 mg	5	36.680 0	.53104	.23749	36.0206	37.3394	36.20	37.50
Total	25	36.330 4	.65341	.13068	36.0607	36.6001	35.20	37.50

### Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.070	4	20	.398

### ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.264	4	1.316	5.283	.005
Within Groups	4.982	20	.249		
Total	10.247	24			

### Post Hoc Tests

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: hasil

	(I) sampel	(J) sampel	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey	negatif	positif	1.00800*	.31567	.033	.0634	1.9526
HSD		100 mg	1.12000*	.31567	.015	.1754	2.0646



LSD	150 mg	1.14000*	.31567	.013	.1954	2.0846	
	200 mg	.38000	.31567	.749	-.5646	1.3246	
	negatif	-1.00800*	.31567	.033	-1.9526	-.0634	
	positif	100 mg	.11200	.31567	.996	-.8326	1.0566
	150 mg	.13200	.31567	.993	-.8126	1.0766	
	200 mg	-.62800	.31567	.306	-1.5726	.3166	
	negatif	-1.12000*	.31567	.015	-2.0646	-.1754	
	positif	100 mg	-.11200	.31567	.996	-1.0566	.8326
	150 mg	.02000	.31567	1.000	-.9246	.9646	
	200 mg	-.74000	.31567	.172	-1.6846	.2046	
	negatif	-1.14000*	.31567	.013	-2.0846	-.1954	
	positif	150 mg	-.13200	.31567	.993	-1.0766	.8126
	100 mg	-.02000	.31567	1.000	-.9646	.9246	
	200 mg	-.76000	.31567	.154	-1.7046	.1846	
	negatif	-.38000	.31567	.749	-1.3246	.5646	
	positif	200 mg	.62800	.31567	.306	-.3166	1.5726
	100 mg	.74000	.31567	.172	-.2046	1.6846	
	150 mg	.76000	.31567	.154	-.1846	1.7046	
	positif	1.00800*	.31567	.005	.3495	1.6665	
	negatif	100 mg	1.12000*	.31567	.002	.4615	1.7785
	150 mg	1.14000*	.31567	.002	.4815	1.7985	
	200 mg	.38000	.31567	.243	-.2785	1.0385	
	negatif	-1.00800*	.31567	.005	-1.6665	-.3495	
	positif	100 mg	.11200	.31567	.726	-.5465	.7705
150 mg	.13200	.31567	.680	-.5265	.7905		
200 mg	-.62800	.31567	.061	-1.2865	.0305		
negatif	-1.12000*	.31567	.002	-1.7785	-.4615		
positif	100 mg	-.11200	.31567	.726	-.7705	.5465	
150 mg	.02000	.31567	.950	-.6385	.6785		
200 mg	-.74000*	.31567	.030	-1.3985	-.0815		
negatif	150 mg	-1.14000*	.31567	.002	-1.7985	-.4815	
positif	-.13200	.31567	.680	-.7905	.5265		

	100 mg	-.02000	.31567	.950	-.6785	.6385
	200 mg	-.76000*	.31567	.026	-1.4185	-.1015
	negatif	-.38000	.31567	.243	-1.0385	.2785
200 mg	positif	.62800	.31567	.061	-.0305	1.2865
	100 mg	.74000*	.31567	.030	.0815	1.3985
	150 mg	.76000*	.31567	.026	.1015	1.4185

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

### Homogeneous Subsets

		Hasil		
	sampel	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
TukeyHSD <sup>a</sup>	150 mg	5	35.9200	
	100 mg	5	35.9400	
	positif	5	36.0520	
	200 mg	5	36.6800	36.6800
	negatif	5		37.0600
	Sig.			.154
Tukey B <sup>a</sup>	150 mg	5	35.9200	
	100 mg	5	35.9400	
	positif	5	36.0520	
	200 mg	5	36.6800	36.6800
	negatif	5		37.0600

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

## RIWAYAT HIDUP



Mahasiswa bernama lengkap Hairil Anwar Odding, lahir di Desa Sudu, Kec. Alla', Kab. Enrekang, tepatnya pada tanggal 11 Juli 1993. Ia merupakan buah hati dari pasangan Hastuti dan Odding yang terlahir sebagai anak ke empat dari enam bersaudara.

Mengawali pendidikan dasar di SDN 73 Sudu Kec. Alla', Kab. Enrekang dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Alla, Kab. Enrekang, kemudian menamatkan pendidikan sekolah menengah di SMA Negeri 1 Alla Kab. Enrekang. Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurusan Farmasi dan tercatat sebagai Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar angkatan 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R