

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK n-HEKSAN BATANG  
BROTOWALI (*Tinospora crispa* L. Miers) TERHADAP BEBERAPA  
BAKTERI PATOGEN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
INDRA HIDAYAT ZAHMI ASIS  
NIM. 70100109043

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Hidayat Zahmi Asis  
NIM : 70100109043  
Tempat/TanggalLahir : Nabire/12Juni 1991  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : BTN Bumi Samata Permai  
Judul : uji aktivitas antibakteri hasil ekstrak n-heksan batang  
brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers) terhadap beberapa  
bakteri patogen

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, Oktober2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**INDRA HIDAYAT ZAHMI ASIS**

NIM. 70100109043

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.**

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada **ALLAH SWT** atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita **MUHAMMAD SAW**, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **HAMZAH ASIS, Amd Kesling** dan Ibunda **SUPARMI** yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku tercinta Intan Ilahiyad Zahmi Asis, Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak / Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dra Hj Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Muh. Fitrah, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Drs. Muhammad Kurdi, M.Hi. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt selaku penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis.
12. Nurshalati Tahar, S.Farm.,M.Si.,Apt. pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Maret 2016

Penyusun

**INDRA HIDAYAT ZAHMI ASIS**

NIM. 70100109043



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Uraian Tanaman .....	8
1. Klasifikasi.....	8
2. Morfologi Tanaman.....	8
3. Kandungan Kimia.....	9
4. Kegunaan.....	10

B. Uraian Mikroba uji .....	11
1. Echerichia coli .....	
a. Klasifikasi .....	
b. Morfologi .....	
2. Bacillus Subtillis .....	
a. Klasifikasi.....	12
b. Morfologi .....	12
3. Pseudomonas aeruginosa .....	13
a. Klasifikasi .....	13
b. Morfologi .....	13
4. Staphylococcus Aureus .....	14
a. Klasifikasi .....	14
b. Morfologi .....	14
5. Staphylococcus Epidermis.....	15
a. Klasifikasi.....	15
b. Morfologi.....	15
6. Streptococcus Mutans.....	16
a. Klasifikasi.....	16
b. Morfologi.....	16
7. Salmonella Typi.....	17
a. Klasifikasi.....	17
b. Morfologi.....	17



8. <i>Vibrio Sp</i> .....	18
a. Klasifikasi .....	18
b. Morfologi .....	18
<b>C. Metode Ekstraksi</b> .....	19
1. Cara Dingin .....	20
a. Maserasi .....	20
1). Modifikasi maserasi melingkar .....	21
2). Modifikasi maserasi digesti .....	21
3). Modifikasi maserasi melingkar bertingkat .....	21
b. Perkolasi .....	22
2. Cara panas .....	22
a. Refluk .....	22
b. Soxhlet .....	22
c. Digesti .....	23
d. infuse .....	23
e. Dekok .....	23
<b>D. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis</b> .....	23
<b>E. KLT-Bioautografi</b> .....	24
a. Bioautografi Langsung .....	25
b. Bioautografi kontak .....	26
c. Bioautografi pencelupan .....	26

<b>F. Sterilisasi</b> .....	26
1. Sterilisasi fisik.....	27
a. Pemanasan basah.....	27
1). Perebusan .....	27
2). Pemanasan dengan tekanan .....	27
3). Tindalisasi.....	28
4). Pasteurisasi .....	28
b. Pemanasan kering.....	28
c. Sterilisasi radiasi.....	29
2. Sterilisasi Mekanika .....	29
3. Sterilisasi kimia .....	30
a. Desinfeksi.....	30
b. Antiseptis .....	30
<b>G. Antimikroba</b> .....	31
1. Pengertian Antimikroba .....	31
2. Sifat antimikroba.....	31
a. Bakteriostatik .....	31
b. Bakteriosida.....	32
3. Prinsip Kerja Antimikroba .....	32
4. Mekanisme Antimikroba.....	32
a. Mengganggu metabolisme sel mikroba .....	32
b. Penghambatan sintesis dinding sel.....	33
c. Penghambatan terhadap fungsi membrane sel .....	34

d. Penghambatan terhadap sintesis protein .....	35
e. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat.....	36
<b>H. Tinjauan Islam</b> .....	36
<b>BAB III</b> <b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis dan Lokasi Penelitian</b> .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Lokasi Penelitian .....	40
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	40
<b>C. Populasi dan Sampel</b> .....	40
<b>D. Pengumpulan data</b> .....	40
<b>E. Instrumen penelitian</b> .....	41
1. Alat yang digunakan.....	41
2. Bahan yang digunakan .....	41
<b>F. Metode kerja</b> .....	42
1. Pengambilan sampel daun.....	42
2. Pengolahan sampel.....	42
3. Ekstraksi sampel	
4. Partisi ekstrak.....	42
5. Sterilisasi alat. ....	43
6. Pembuatan medium.....	44
7. Penyiapan bakteri uji.....	45
8. Penyiapan suspensi bakteri. ....	45
9. Skrining aktivitas antibakteri. ....	45

10. Pengujian secara KLT bioautografi .....	46
11. Identifikasi senyawa bercak dengan beberapa pereaksi bercak .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
1. Hasil ekstraksi batang brotowali .....	48
2. Hasil partisi ekstrak .....	48
3. Pengujian skrining antibakteri .....	49
4. Identifikasi senyawa kimia .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Implikasi penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil ekstrak etanol 96% batang brotowali .....	48
2. Hasil partisi ekstrak etanol 96% batang brotowali .....	48
3. Hasil skrining aktivitas antibakteri Partisi Ekstrak Batang Brotowali .....	49
4. Hasil dentifikasi Golongan Senyawa Kimia Batang Brotowali .....	52




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Profil KLT Ekstrak n-Heksan, Etil, & Metanol.....	14
2. Penghambatan Pada Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (PA).....	31
3. Penghambatan Pada Bakteri <i>Vibrio sp</i> .....	52
4. Penghambatan Pada Bakteri <i>Streptococcus mutans</i> (SM).....	53
5. Penghambatan Pada Bakteri <i>Streptococcus epidermidis</i> (SE) .....	54
6. Penghambatan Pada Bakteri <i>Escheria coli</i> (EC) .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Ekstrak, Partisi, dan KLT Bioautografi.....	63
2. Skema kerja Identifikasi senyawa kimia .....	64
3. Foto Pengerjaan .....	65
4. Daftar Riwayat hidup.....	74



## ABSTRAK

Nama : INDRA HIDAYAT ZAHMI ASIS

NIM : 70100109043

Jurusan : Farmasi

Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK n-HEKSAN  
BATANG BROTOWALI (*Tinospora crispa* L. Miers)  
TERHADAP BEBERAPA BAKTERI PATOGEN

---

Telah dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak n-Heksan batang brotowali (*Tinospora crispa* L.Miers). Ekstraksi senyawa dilakukan dengan cara maserasi dengan pelarut etanol 96 %. Hasil uji fitokimia menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard menunjukkan bahwa ekstrak tersebut positif mengandung golongan senyawa steroid, dan pereaksi Alumunium Klorida menunjukkan bahwa ekstrak tersebut positif mengandung senyawa Flavanoid.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%. Tahap partisi menggunakan pelarut n-heksan; kemudian partisi etil asetat dan partisi metanol. Tahap uji senyawa aktif ekstrak n-Heksan menggunakan metode KLT Bioautografi. dengan pelarut kloroform; metanol (1:1) dan menggunakan eluen n-Heksan; Etil Asetat (3:1). Tahap akhir identifikasi senyawa aktif pada KLT menggunakan beberapa pereaksi.

Dari hasil penelitian diatas, metode KLT bioautografi menunjukkan penghambatan pada beberapa bakteri yaitu *E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. epidermis*, *S. mutans*, dan *Vibrio sp.* Dan dari hasil identifikasi senyawa kimia maka diperoleh senyawa flavanoid dengan nilai Rf: 0,54 dan steroid dengan nilai Rf: 0,81.

**Kata kunci :** batang brotowali, partisi, identifikasi, steroid, flavanoid.



## ABSTRACT

Name : INDRA HIDAYAT ZAHMI ASIS  
NIM : 70100109043  
Study : Farmasi  
Title : ANTIBACTERIA ACTIVITY TEST OF BROTOWALI STEM  
(*Tinospora crispa* L. Miers) n-HEXANE EXTRACT AGAINST  
SOME PATOGEN BACTERIALS

---

Antibacteria activity test of brotowali stem (*Tinospora crispa* L. Miers) n-hexane extract have been done. Compound extraction done by maseration with etanol 96% solvent. Result of phytochemical test using Lieberman-Burchard reagent showing that the extract contains steroid compound group, and aluminium chloride reagent showing that the extract positively contains flavanoid compound.

This research consist of several steps. The extraction step using ethanol 96% solvent. The partition step using n-hexane solvent; then ethyl acetate partition; and \methanol partition. The active compound test of n-hexane extract step using TLC bioautography with chloroform:methanol (1:1) solvent and using n-hexane-ethyl acetate (3:1) solvent. The active compound identification step on TLC using several reagent.

From the above research, TLC bioautography showing some hamper on growing of *E. Coli*, *P. Aeruginosa*, *S. Epidermis*, *S. Mutans*, dan *Vibrio sp* bacteria. And from the result of chemical compound identification showing flavanoid with Rf value: 0,54, and steroid with Rf value: 0,81

**Keywords** :, brotowali stem, partition, identification, steroid, flavanoid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A.LatarBelakang***

Peran tanaman dalam mendukung kehidupan manusia telah ada sejak manusia ada di muka bumi. Bahkan pemanfaatan tanaman untuk kesehatan akhirnya menjadi bagian dari budaya masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi (Widiyastuti, 2004: 56).

Saat ini penggunaan herbal dalam pengobatan komplementer dan alternatif di Indonesia semakin populer. Bukti-bukti empiris dan dukungan ilmiah yang semakin banyak terhadap khasiat herbal menyebabkan herbal semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. (Ning Harmanto, Ahkam Subroto, 2007: 138)

Kelebihan dari pengobatan dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional tersebut ialah tidak adanya kurangnya efek samping yang ditimbulkan seperti yang sering terjadi pada pengobatan kimiawi.

Penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius yang dihadapi oleh dunia. Hampir 14 juta orang tiap tahunnya meninggal dunia akibat menderita penyakit infeksi (Schlein, 2009: 90). Penyakit infeksi diduga menjadi salah satu masalah utama yang menyebabkan kecacatan dan kematian di negara berkembang (Ambrus, 2004: 37). Infeksi dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu kerentanan hospes, kemampuan mikroba untuk menimbulkan infeksi dan keadaan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan mikroba. Salah satu bakteri penyebab infeksi yang dapat menimbulkan

kesakitankematian akibat infeksi oleh bakteri ini diduga mencapai 50%, tergantung dengan jenis infeksi (Kulkarni, 2009: 48).

Para ahli dari berbagai negara seperti Jerman, India, Cina, Australia, Indonesia, dan sebagainya, tidak henti-hentinya mengadakan penelitian dan pengujian berbagai tumbuhan yang secara tradisional digunakan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Hasil penelitian dan pengujian secara ilmiah tersebut disimpulkan bahwa penggunaan tumbuhan tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dari penelitian dan pengujian para ahli, telah diketahui adanya komposisi kandungan kimiawi obat-obatan yang terdapat pada jenis tumbuhan tertentu yang telah lama digunakan oleh nenek moyang kita sebagai obat tradisional. (Thomas,ANS, 1992: 9).

Para ilmuwan terus berusaha untuk mencari sumber antimikroba baru, terutama padatumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang digunakan untuk obat tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian zat antimikroba baru (Ervizal,2001: 30).

Salah satu obat tradisional yang telah dikenal sebagian masyarakat memiliki khasiat yang bermanfaat bagi tubuh adalah Brotowali (*Tinospra crispa L. Miers*). Tanaman ini merupakan tanaman merambat yang tumbuh liar di ladang dan hutan atau sering ditanam oleh masyarakat pedesaan sebagai tanaman obat (Manan, 2003: 20). Brotowali merupakan tanaman yang banyak ditemukan pada daerah beriklim tropis. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand ditenggarai sebagai wilayah dari mana tanaman ini berasal, sehingga Brotowali banyak tumbuh di negara-negara tersebut (Saptorini, 2007: 18).

Brotowali dikenal oleh masyarakat luas sebagai jamu yang memiliki rasa pahit. Tanaman ini telah diketahui memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai antipiretik, analgesik, antiparasitik, antiseptik, antidiabetik dan antitumor. Efek tersebut didapat dari kandungan bahan-bahan aktif yang terdapat di dalamnya. Brotowali (*Tinosporacrispa*(L) Miers), mengandung senyawa pikoretin, berberin, danpalmatin, yang termasuk senyawa golongan alkaloid; pikroretosid dan tinokrisposid yang merupakan suatu senyawa glikosida; serta senyawa triterpenoid. Batang Brotowali sangat bermanfaat sebagai obat sakit perut, sakit punggung, sakit pinggang, serta gatal-gatal dan luka yang sulit disembuhkan (Kresnady, 2003: 57).

Masyarakat seringkali menggunakan Brotowali sebagai obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, akan tetapi Brotowali masih jarang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi dengan penyebab bakteri. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas senyawa fitokimia yang dimiliki brotowali apakah memiliki aktivitas sebagai antibakteri atau tidak.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah ekstrak n-Heksan batang brotowali (*Tinosporacrispa L.*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapabakteri patogen?
2. Komponen senyawa aktif apakah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen pada ekstrak n-Heksan batang brotowali (*Tinospora crispa L.*)?

3. Bagaimana tinjauan islam mengenai pemanfaatan tanaman sebagai obat?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya

1. Ekstrak merupakan suatu sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
2. Aktivitas antibakteri merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan baik dari daun, korteks, biji, bunga, akar, dan buah yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri.
3. n-Heksan merupakan senyawa kimia hidrokarbon alkana dengan rumus kimia  $C_6H_{14}$  (isomer utama **n-heksana** memiliki rumus  $CH_3(CH_2)_4CH_3$ ). yang digunakan untuk mengekstraksi sampel . Senyawa ini berwujud cairan tidak berwarna dan memiliki aroma khas.
4. Bakteri patogen merupakan kelompok bakteri parasit yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada hewan dan tumbuhan.

Ruang lingkup penelitian ini, hanya membatasi pada jenis bakteri patogen saja, tidak untuk bakteri non-patogen. Kemudian, dari segi metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode difusi agar dan KLT-Bioautografi untuk mengetahui daya hambat suatu sampel. Pelarut atau cairan penyari yang digunakan yakni penyari n-heksan.

### ***D. Kajian pustaka***

Berdasarkan jurnal skripsi Indah Rukmini yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Asam Jawa Terhadap Beberapa Bakteri Patogen Secara

KLT-Bioautografi, Indah Rukmini mengambil dasar terhadap metode yang digunakan yakni dengan mengukur adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak daun Asam Jawa dengan menggunakan KLT-Bioautografi. Tetapi, pada penelitian ini penulis menggunakan ekstrak yang telah melalui proses fraksinasi sehingga pemisahan senyawa lebih kompleks (Rukmini, 2011).

Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Nur Puspita Sari Siregar yang berjudul Uji Antimikroba Batang Brotowali (*Tinosporacrispa L. Miers*) Terhadap *Pseudomonas aeruginosa* Secara *In Vitro* dengan dasar kandungan kimia yang terdapat pada batang brotowali adalah alkaloid berberin, saponin, dan tannin memiliki efek antimikroba. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Puspita Sari Siregar menggunakan metode dilusi tabung kemudian digoreskan pada media Nutrient Agar Plate untuk menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) ekstrak batang brotowali, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan KHM ekstrak brotowali pada konsentrasi 5% dan KBM batang brotowali berada pada konsentrasi ekstrak 6% (Siregar, N.P.S, 2010).

Berdasarkan jurnal penelitian Armisman yang berjudul Uji Aktivitas Antimikroba dan Fraksinasi Ekstrak Daun Jati, menjelaskan berbagai macam metode ekstraksi, jenis-jenis mikro organisme patogen, dan teknik-teknik fraksinasi. Penulis kemudian menjadikan penelitian Armisman sebagai salah satu dasar untuk mengambil suatu metode yakni KLT-Bioautografi untuk mengetahui daya hambat sampel. Selain itu, metode fraksinasi yaitu Kromatografi Cair Vakum juga dijadikan metode oleh penulis (EdyPatturusi, 2008).

Hasil penelitian ekstrak batang brotowali dengan pelarut metanol juga menunjukkan adanya perubahan suhu tubuh dan titer antibody dalam darah tikus tiap masing-masing dosis. Pada perlakuan induksi ekstrak batang brotowali dengan pelarut metanol dosis 250 mg/kg BB mengalami penurunan suhu tubuh tikus putih dari 39,7 °C menjadi 37,6 °C; P2 dengan dosis 500 mg/kg BB mengalami penurunan suhu tubuh tikus putih dari 38,9 °C menjadi 37,5 °C ; P3 dengan dosis 1000 mg/kg BB mengalami penurunan suhu tubuh tikus putih dari 39,1 °C menjadi 37,4 °C. Dosis yang mampu menurunkan gejala demam *typhoid* pada ekstrak batang brotowali dengan pelarut metanol yaitu 250 mg/kg BB (Hidayati, 2011)

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan penelitian ini sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui efek antibakteri hasil partisi ekstrak n-heksan batang brotowali (*Tinospora crispa L.*) terhadap beberapa bakteri patogen.
2. Untuk mengetahui komponen kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang penggunaan batang brotowali dalam pengobatan penyakit

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terhadap pemanfaatan dan pengolahan batang brotowali sebagai antibakteri terhadap beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tanaman

##### 1. Klasifikasi Tanaman (Kresnady, 2001)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Ordo	: Ranunculales
Famili	: Menispermaceae
Genus	: <i>Tinospora</i>
Spesies	: <i>Tinospora crispa</i> L.. Miers

##### 2. Morfologi Tanaman

Brotowali merupakan tanaman perdu merambat dengan ketinggian dapat mencapai 2,5 meter. Seperti tumbuhan dikotil lainnya, Brotowali juga terdiri dari bagian akar, batang, daun, bunga dan buah (Saptorini, 2007).

Akar dari tanaman Brotowali termasuk jenis akar tunggang. Batangnya berwarna hijau, memiliki benjolan (berbintil-bintil rapat), mengandung banyak air, dan memiliki tebal 1 cm. Daunnya merupakan daun tunggal yang berwarna hijau muda, berbentuk jantung, berujung lancip dengan tulang daun menjari. Daun Brotowali memiliki ukuran panjang 7 - 12 cm dan lebar 5 - 10 cm. Bunganya merupakan bunga



bermakhota enam dan berbentuk tandan semu dengan warna hijau muda, yang nantinya akan berubah menjadi merah dan putih. Brotowali juga memiliki buah yang berwarna merah muda yang memiliki panjang 7 - 8 mm (Saptorini, 2007).

Bagian dari tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat dan dipercaya memiliki manfaat klinis adalah akar, batang, dan daun (Dweck, 2005). Tanaman yang batangnya pahit ini menyukai tempat yang terkena cahaya matahari. Dapat ditemukan tumbuh liar atau ditanam sebagai tanaman obat. Perbanyakan dilakukan dengan cara stek (Dalimartha, 2005).

### **3. Kandungan Kimia**

Brotowali mengandung banyak senyawa kimia yang berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Kandungan senyawa kimia berkhasiat obat tersebut, terdapat pada seluruh bagian tumbuhan Brotowali mulai dari akar, batang, dan daun (Kresnady, 2001).

Sejumlah literatur menyebutkan, secara umum tanaman Brotowali (*Tinospora crispa L. Miers*) mengandung senyawa kimia, seperti alkaloid berberine, damar lunak, pati, glikosida, pikroretrosid, harsa, zat pahit pikoretin, tinokrisposid, palmatin, kolumbin, dan kaokulin atau pikrotoksin (Kresnady, 2001).

Selain itu, Brotowali juga mengandung zat-zat lain seperti saponin dan tanin (Soedarmillah, 1999; Syukur, 1999).

Kandungan alkaloid berberine, saponin, dan tanin diduga merupakan bahan aktif yang banyak terdapat pada batang Brotowali dan memiliki efek bakterisida (Saptorini, 2007).

#### 4. Kegunaan

Sebagai obat tradisional, Brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers) memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Oleh masyarakat, Brotowali banyak digunakan untuk menyembuhkan demam, hiperglikemia, luka, infeksi cacing di usus dan infeksi di kulit. Dekok batangnya dipercaya sebagai antipiretik, anti-malaria dan pembersih ulkus di kulit (Rahman *et al.*, 1999). Air rebusan batang Brotowali sering digunakan untuk mencuci luka, koreng, dan kudis (Dalimartha, 2005).

Di Indo Cina, semua bagian tanaman ini digunakan sebagai obat demam pengganti kina. Di Malaysia, Brotowali sudah dikenal secara turun-temurun sebagai obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus. Di Indonesia, seperti di Bali, batang Brotowali banyak digunakan untuk mengobati sakit perut, demam, dan sakit kuning. Oleh masyarakat Jawa, tanaman ini dipercaya memiliki khasiat untuk menurunkan demam dan sebagai obat luar, seperti untuk luka dan gatal-gatal (Kresnady, 2001).

Di Filipina Brotowali dianggap obat serbaguna, antara lain digunakan untuk mengobati pasien yang menderita gangguan mental (psikosis). Beberapa penelitian yang dilakukan pada tikus, air rebusan batang Brotowali memiliki efek menenangkan. Bagian batang dan daun

adalah bagian dari tanaman ini yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan berbagai macam penyakit (Saptorini, 2007).

Secara ilmiah, Brotowali telah dibuktikan memiliki efek antibakterial, (Zakaria *et al.*, 2006), antifilarial, antipteretik (Kongkathip *et al.*, 2002) dan antihiperqlikemik (Noor, 1998). Ekstrak Brotowali (*Tinospora crispa L. Miers*) dilaporkan dapat menghambat sintesis dan pelepasan *nitric oxide* yang berperan dalam beberapa proses fisiologi tubuh, seperti proses inflamasi (Sulaiman *et al.*, 2008).

## B. Uraian Mikroba Uji

### 1. *Escherichia coli*

#### a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 141)

Domain	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Enterobacteriales
Familia	: Enterobacteriaceae
Genus	: <i>Escherichia</i>
Spesies	: <i>Escherichia coli</i>

- b. Sifat dan morfologi.** *Escherichia coli* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus 1,1-1,5  $\mu\text{m}$  x 2,0-6,0  $\mu\text{m}$ , motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh dengan mudah padamedium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar. Michael J, and Chan. E.C.S, 2008: 949)

## 2. *Bacillus subtilis*

### a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 172)

Domain	: Bacteria
Phylum	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Bacillales
Familia	: Bacillaceae
Genus	: Bacillus
Spesies	: <i>Bacillus subtilis</i>

- b. Sifat dan morfologi.** *Bacillus subtilis* merupakan bakteri gram positif memiliki sel batang 0,3-2,2  $\mu\text{m}$  x 1,27 -7,0  $\mu\text{m}$ . Sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Katalase positif yang umumnya ditemukan di tanah Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif. Bersifat termofilik yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 45-55°C dan mempunyai pertumbuhan yang optimum pada suhu 60-80°C. (Pelczar. Michael j. and Chan. E.C.S, 2008: 947)

## 3. *Pseudomonas aeruginosa*

### a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 95)

Domain	: Bakteria
--------	------------

Phylum : Proteobacteria  
 Class : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Pseudomonadales  
 Familia : Pseudomonadaceae  
 Genus : Pseudomonas  
 Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

**b. Sifat dan morfologi.** . *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-1,0  $\mu\text{m}$ . Motil dengan flagellum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Termasuk dalam golongan bakteri kemoorganotrof, dimana yang dimaksud dengan kemoorganotrof yakni kelompok mikroorganisme yang menggunakan hasil reduksi oksidasi senyawa organik sebagai donor elektron. Mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok ini adalah mikroorganisme heterotrofik Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan. (Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 952)

#### 4. *Staphylococcus aureus*

##### a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 187)

Domain : Bakteria  
 Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli  
 Ordo : Bacillales  
 Familia : Staphylococcaceae  
 Genus : Staphylococcus  
 Spesies : *Staphylococcus aureus*

**b. Sifat dan morfologi.** *Staphylococcus aureus* adalah bakteri Gram positif. Sel- sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat yang berikatan dengannya. Kemoorganotrof, yakni kelompok mikroorganisme yang menggunakan hasil reduksi oksidasi senyawa organik sebagai donor elektron. Mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok ini adalah mikroorganisme heterotrofik. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40°C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar.Michael J. and Chan, E.C.S, 2008: 954-955)

## 5. *Staphylococcus epidermis*

**a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 187)**

Domain : Bakteria

Phylum : Firmicutes  
 Class : Bacilli  
 Ordo : Bacillales  
 Familia : Staphylococcaceae  
 Genus : Staphylococcus  
 Spesies : *Staphylococcus epidermis*

- b. Sifat dan morfologi.** *Staphylococcus epidermis* adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, artinya dapat menghasilkan energi pada keadaan anaerob tetapi tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40°C. Terutama berdisosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 954)

**6. *Streptococcus mutans***

**a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 203)**

Domain : Bakteria  
 Phylum : Firmicutes  
 Class : Bacilli  
 Ordo : Lactobacillales  
 Familia : Streptococcaceae  
 Genus : Streptococcus

Spesies : *Streptococcus mutans*

- b. Sifat dan morfologi.** *Streptococcus mutans* termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob dimana fakultatif aerob adalah bakteri dapat menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi tetapi dapat juga menghasilkan energi dengan cara anaerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein, dan asam lipokat. Bersifat nonmotil (tidak bergerak). Bersifat asidogenik yakni menghasilkan asam. (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 955)

## 7. *Salmonella typhi*

### a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24 – 122)

Domain : Bakteria

Phylum : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : Salmonella

Spesies : *Salmonella typhi* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and

Lilburn, 2004: 24-122)

- b. Sifat dan morfologi.** *Salmonella typhi* adalah bakteri gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5  $\mu\text{m}$ , biasanya tunggal



dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, artinya dapat menghasilkan energi dengan keadaan anaerob. Meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas dari manosa. Sebagian besar isolat motil (dapat bergerak). Menghasilkan H<sub>2</sub>S. Tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang biak pada suhu kamar. Mati pada suhu 56°C atau pada keadaan kering. Bakteri ini dapat ditemukan disaluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan. Memiliki tiga jenis antigen yaitu antigen O, antigen Vi atau K, dan antigen H. (Pelczar, Michael J. and Chan, E.C.S, 2008: 953)

## 8. *Vibrio sp*

### a. Klasifikasi (Garrity, G. M., Bell, J. A., and Lilbum 2004 : 24 – 109)

Domain : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gammaproteobacteria

Ordo : Vibrionales

Familia : Vibrionaceae

Genus : *Vibrio*

Spesies : *Vibrio sp*

b. **Sifat dan morfologi.** *Vibrio sp* adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, tumbuh melengkung atau lurus, 0,5 x

1,5-3,0  $\mu\text{m}$ , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-37°C. (Pelczar, Michael J. and Chan . E.C.S, 2008: 956)

### ***C. Metode Ekstraksi***

Proses untuk mendapatkan ekstrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut (Dirjen POM, 1986:10).

Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang diisolasi. Umumnya kita perlu “membunuh” jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Mencemplungkan jaringan daun segar atau bunga, bila perlu dipotong-potong, ke dalam etanol mendidih adalah suatu cara yang baik untuk mencapai tujuan itu. Alkohol bagaimanapun juga adalah pelarut serbaguna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan. Selanjutnya bahan dapat dimaserasi dalam suatu wadah toples kaca, lalu disaring. Tetapi hal ini hanya betul-betul diperlukan bila kita ingin mengekstraksi habis. Bila mengisolasi

senyawa dari jaringan hijau, keberhasilan ekstraksi dengan alkohol berkaitan langsung dengan seberapa jauh klorofil tertarik oleh pelarut itu. Bila pada ampas sampel sama sekali tidak berwarna hijau lagi, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terkestraksi. (Harborne, 1998: 6-7).

## 1. Cara Dingin

### a. Maserasi

Maserasi merupakan penyarian secara sederhana karena dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan dan zat aktif di dalam sel dan diluar sel maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa ini berulang-ulang kali terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar sel dan di dalam sel (Dirjen POM, 1986: 10)

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara didalam dan diluar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan

senyawa bahan alam pelarut tersebut. Secara umum pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses maserasi (Dawis, 2000) Metode maserasi dapat dilakukan modifikasi seperti berikut :

#### 1) Modifikasi maserasi melingkar

Maserasi melingkar adalah penyarian yang dilakukan dengan menggunakan cairan penyari yang selalu bergerak dan menyebar (berkesinambungan) sehingga kejenuhan cairan penyari merata. Keuntungan cara ini antara lain, aliran cairan penyari mengurangi lapisan batas, cairan penyari akan didistribusikan secara seragam, sehingga memperkecil kepekatan setempat, waktu yang diperlukan lebih singkat.

#### 2) Modifikasi maserasi digesti

Maserasi digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan panas lemah, yaitu pada suhu 40 – 50°C. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan akan diperoleh keuntungan seperti, kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan, dan koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu *absolute* dan berbanding terbalik dengan kekentalan, hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi.

#### 3) Modifikasi maserasi melingkar bertingkat

Maserasi melingkar bertingkat sama dengan maserasi melingkar tetapi pada maserasi melingkar bertingkat dilengkapi dengan beberapa

bejana penampungan sehingga tingkat kejenuhan cairan penyari setiap bejana berbeda-beda. (Dirjen POM, 1986: 12-15)

#### b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetapan / penampungan ekstrak) yang jumlahnya 1-5 bahan (Dirjen POM 1986: 16)

Perkolasi merupakan proses melewati pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektivitas dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan. (Darwis, 2000)

## 2. Cara Panas

#### a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3 – 5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

#### b. Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi

kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendinginan balik.

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 – 50°C.

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur pemanas air (bejana infus tercelup dalam pemanas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu 15-20 menit.

e. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama >30°C dan temperatur sampai titik didih air.

#### ***D. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis***

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan, yang pertamakali dipakai untuk memisahkan zat warna tanaman. Meskipun demikian untuk senyawa-senyawa yang berwarna tak lama dan hampir kebanyakan pemisahan-pemisahan secara kromatografi sekarang diperuntukkan untuk senyawa-senyawa tak berwarna termasuk gas (Sastroamidjojo, 1985: 30)

Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah :

- a. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan
- b. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus

- c. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap.

Manfaat dilakukan kromatografi pada hakekatnya adalah dengan tujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa yang ada (kualitatif), berapa kadarnya (kuantitatif) dan bagaimana memperoleh yang murni (Gritter, 1991: 1,14).

Kromatografi lapis tipis adalah salah satu cara memisahkan suatu komponen berdasarkan adsorbasi dan partisi. Adsorben yang digunakan berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata diatas lempeng aluminium. Komponen yang dipisahkan naik mengikuti pelarutnya sesuai kecepatan elusinya masing-masing terjadi pemisahan. Ukuran partikel adsorben harus halus, agar lapisan adsorben pada lempeng aluminium terbentuk rata dan homogen sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata, dengan demikian komponen dapat terpisah baik.

KLT memiliki beberapa kelebihan yaitu pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya tidak terlalu mahal. Selain itu pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit (Sastroamidjojo, 1985, 34,36, Gritter, 1991: 114-115)

#### **E. KLT-Bioautografi**

Bioautografi, berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan autografi berarti melakukan aktivitas sendiri. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu

kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor, dan lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan pada metode difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan disekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambat ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji. (Djide. M. N, Sartini, Kadir. S. H, 2006: 299-302)

Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas antibakteri atau antikapang. Metode ini menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, antikapang, dan antiprotozoa. Bioautografi dapat digunakan untuk mencari antibakteri atau antikapang yang terkandung dalam suatu sampel tumbuhan atau tanaman, dan juga dengan metode ini kita dapat mendeteksi golongan senyawa. (Mace K, Choma I, Colorado RJ, 2005: 67-71)

KLT-Bioautografi dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu :

d. Bioautografi Langsung

Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel



pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu

e. Bioautografi kontak

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan diatas permukaan medium Nutrient Agar yang telah diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut di pindahkan diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram ke dalam media agar dan akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona yang jernih.

f. Bioautografi Pencelupan.

Pada prakteknyametode ini dilakukan sebagai berikut yaitu bahwa lempeng kromatografi yang telah dielusi, diletakkan dalam cawan petri, sehingga permukaannya tertutup oleh medium agar yang berfungsi sebagai 'base layer'. Setelah medium agar memadat, selanjutnya dituangi medium yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai 'seed layer'. Kemudian diinkubasikan pada suhu dan waktu yang sesuai.

## **F. Sterilisasi**

Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh atau memutuskan semua mikroorganisme atau jasad renik yang ada, sehingga jika ditumbuhkan di dalam suatu medium tidak ada lagi mikroorganisme atau jasad renik yang dapat berkembang biak. Sterilisasi harus dapat membunuh mikroorganisme atau jasad renik yang paling tahan panas yaitu spora bakteri.

Jenis-jenis sterilisasi :

### 1. Sterilisasi Fisik

#### a. Pemanasan Basah

Untuk membunuh mikroorganisme atau jasad renik dapat digunakan beberapa perlakuan fisik, misalnya dengan pemanasan basah, pemanasan kering, radiasi, dan lain-lain.

#### 1) Perebusan

Air mendidih atau uap air pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan virus dalam waktu lima menit. Beberapa spora juga dapat terbunuh pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  selama beberapa menit, tetapi masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap panas dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

#### 2) Pemanasan dengan tekanan

Pengukusan dengan tekanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat berupa autoklaf yaitu untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Spora yang paling tahan panas akan mati pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$

selama 15 menit. Kekuatan membunuh dari uap air panas disebabkan pada waktu kondensasi, pada bahan yang disterilisasi dilepaskan sejumlah besar panas latent. Pengerutan yang disebabkan oleh kondensasi menyebabkan penyerapan uap air baru yang berarti lebih banyak panas yang diserap. Sterilisasi untuk bahan cair, susu, sediaan cair, larutan, emulsi atau suspensi yang bahannya mengandung bahan yang mudah rusak.

### 3) Tindalisasi

Proses sterilisasi dengan cara menggunakan pemanasan dengan suhu  $100^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit dan dilakukan setiap hari berturut-turut selama tiga hari. Waktu inkubasi dilakukan diantara dua proses pemanasan, dua proses pemanasan sengaja dilakukan agar spora yang bergerminasi menjadi sel vegetatif, sehingga mudah dibunuh pada pemanasan berikutnya.

### 4) Pasteurisasi

Proses pemanasan pada suhu rendah yaitu  $63-70^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit dan dilakukan setiap hari selama tiga hari berturut-turut. Proses ini biasa dilakukan terhadap bahan atau zat-zat yang tidak tahan pada pemanasan tinggi seperti susu. Ada beberapa mikroorganisme yang tahan pada suhu tinggi atau termofil dan spornya tahan pada proses pasteurisasi. Setelah proses pasteurisasi dilakukan, maka produk harus didinginkan dengan cepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang masih hidup.

#### b. Pemanasan kering

Pemanasan kering kurang efektif untuk membunuh mikroorganisme dibandingkan dengan pemanasan basah. Berbeda pada pemanasan basah yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein, pada pemanasan kering yang menyebabkan dehidrasi sel. Pemanasan kering juga dapat menyebabkan oksidasi komponen-komponen dalam sel. Pemanasan kering sering digunakan dalam sterilisasi alat gelas di laboratorium, dimana digunakan oven dengan suhu 160-180°C, selama 1,5 – 2 jam dengan sistem udara statis. Jika digunakan oven yang dilengkapi dengan sirkulasi udara, maka hanya dibutuhkan waktu setengahnya, karena aliran udara panas ke alat-alat gelas akan lebih efisien.

#### c. Sterilisasi Radiasi

Sinar matahari yang dipancarkan langsung pada sel vegetatif mikroorganisme dapat menyebabkan kematian pada sel tersebut, sedangkan sporanya biasanya lebih tahan. Efek bakterial dari sinar matahari tersebut disebabkan oleh bagian ultra violet dari spektrum sinarnya. Sinar ultra violet (UV) yang dipancarkan dari lampu uap merkuri sering digunakan untuk menyinari ruangan-ruangan tertentu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi mikroorganisme di udara pada ruangan. Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan mempunyai aktivitas mutagenik dalam sel-sel yang masih hidup.

#### 2. Sterilisasi Mekanik

Biasa disebut penyaringan. Cara-cara penyaringan telah banyak digunakan untuk mensterilkan medium laboratorium dan larutan-larutan yang dapat mengalami kerusakan jika dipanaskan. Penyaringan dengan ukuran pori-pori 0,45 mikro dan akan menghilangkan mikroorganisme yang ada pada larutan tersebut. Penyaring yang banyak digunakan tersebut dibuat dari gelas sinter, film selulosa (gelmen, Milipore) dan abestos atau penyaring Seitz. Pori-pori penyaring tersebut berkisar antara 0,22-10 mikron. Pori-pori yang lebih besar biasanya digunakan untuk menjernihkan sebelum digunakan pori-pori yang lebih halus, sehingga tidak terjadi penyumbatan. Penyaring yang biasa digunakan untuk menahan atau menyaring virus atau mikroplasma adalah penyaring yang memiliki ukuran yang sangat kecil yakni penyaring Seitz.

### 3. Sterilisasi Kimia

Bahan kimia ini menimbulkan pengaruh yang lebih selektif terhadap mikroorganisme dibanding dengan perlakuan fisik seperti panas dan radiasi. Cara ini sering disebut dengan :

#### a. Desinfeksi

Suatu proses untuk membunuh mikroorganisme yang bersifat patogen yang sering digunakan adalah dengan cara kimia atau fisik, cara ini ditujukan untuk pemakaian pada benda mati, tetapi tidak selalu efektif terhadap bentuk spora.

#### b. Antiseptis

Suatu proses untuk membunuh atau memusnahkan mikroorganisme atau jasad renik yang pada umumnya menggunakan cara kimia dan penggunaannya ditujukan kepada makhluk hidup. Bahan antiseptik dapat bersifat bakterisid atau fungisid yaitu dapat membunuh bakteri atau fungi dan dapat pula bersifat bakteriostatik atau fungistatik yaitu hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau fungi (Djide. M. N, Sartini, 2008: 191-194)

## **G. Antimikroba**

### **5. Pengertian Antimikroba**

Bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, disinfektansia, dan preservatif.

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide. M. N, Sartini, 2008: 399)

### **6. Sifat Antimikroba**

#### **a. Bakteriostatik**

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan

berkembang biak. Contoh sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin.

b. Bakteriosida

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan atau berkembang biak. Contoh penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Djide. M. N, Sartini, 2008: 399)

## 7. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat karena reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya pada hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia. (Djide. M. N, Sartini, 2008: 340)

## 8. Mekanisme Antimikroba

a. Mengganggu metabolisme sel mikroba

Pada umumnya bakteri memerlukan para amino benzoic acid (PABA) untuk mensintesis purin dan pirimidin (prekursor DNA dan RNA), bila asam fosfat tidak ada, sel-sel tidak dapat tumbuh atau membelah (Mycek 2001: 283-284)

Antimikroba bekerja memblokir terhadap metabolit spesifik mikroba, seperti Sulfonamida. Sulfonamida menghambat pertumbuhan sel

dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri. Sulfonamida secara struktur mirip dengan asam folat, PABA, dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung mempersatukan PABA dan sebagian menjadi asam dihidropteroat (Djide. M. N, Sartini, 2008: 341)

b. Penghambatan sintesis dinding sel

Ada antibiotik yang merusak dinding sel mikroba dengan menghambat sintesis enzim atau inaktivasi enzim, sehingga menyebabkan hilangnya viabilitas dan sering menyebabkan sel lisis. Antibiotik ini meliputi penisilin, sefalosporin, sikloserin, vankomisin, ristosetin, dan basitrasin. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan (Suwandi, 1992)

Dinding sel bakteri menentukan bentuk karakteristik dan berfungsi melindungi bagian dalam sel terhadap perubahan tekanan osmotik dan kondisi lingkungan lainnya. Didalam sel terdapat sitoplasma yang dilapisi dengan membran sitoplasma yang merupakan tempat berlangsungnya proses biokimia sel. Adanya mekanisme yang mempengaruhi langkah akhir sintesis dinding sel (bakteri transpeptidase atau ikatan silang) sehingga membran kurang stabil secara osmotik, akan terjadi lisis pada sel. (Suwandi, 1992, Mycek, 2001: 284)

c. Penghambatan terhadap fungsi membran sel

Dibawah dinding sel bakteri adalah lapisan membran sel lipoprotein yang dapat disamakan dengan membran sel pada manusia. Membran ini mempunyai sifat permeabilitas selektif dan



berfungsi mengontrol keluar masuknya substansi dari dan ke dalam sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi *waste product*. Selain itu membran sel juga berkaitan dengan replikasi DNA dan sintesis dinding sel. Oleh karena itu, substansi yang mengganggu fungsinya akan sangat lethal terhadap sel. Beberapa antibiotik yang dikenal mempunyai mekanisme kerja mengganggu membran sel yaitu antibiotik peptida (polimiksin, gramicidin, sirkulin, tirosidin, valinomicin)

Membran sel merupakan lapisan molekul lipoprotein yang dihubungkan dengan ion Mg selama pembentukan membran, dapat meningkatkan permeabilitas sel atau menyebabkan sel lisis. Beberapa antibiotik bersatu dengan membran dan berfungsi sebagai ionophores, yaitu senyawa yang memberi jalan masuknya ion abnormal. Proses ini dapat mengganggu biokimia sel, misalnya Gramicidin. Polimiksin dapat merusak membran sel setelah beraksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel. Sehingga polimiksin lebih aktif terhadap bakteri Gram negatif dari pada Gram positif yang mempunyai jumlah fosfor lebih rendah. (Suwandi, 1992)

d. Penghambatan terhadap sintesis protein

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat

mengakibatkan koagulasi irreversible komponen-komponen seluler yang vital ini.

Antimikroba mempunyai fungsi riobosom pada mikroorganismenya yang menyebabkan sintesis protein terhambat. Dimana dapat berikatan dengan ribosom 30S yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks, sehingga salah dalam menerjemahkan tanda m-RNA menghasilkan polipeptida yang abnormal. Selain ini juga dapat berikatan dengan ribosom 50S yang dapat menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang memanjang. Contohnya aminoglikosida, kloramfenikol, tertrasiklin, eritromisin, dan linkomisin (Ganiswara, 1995: 572-573)

e. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel. Untuk pertumbuhannya, kebanyakan sel tergantung pada sintesis DNA, sedangkan RNA diperlukan untuk transkripsi dan menentukan informasi sintesis protein dan enzim. Ada beberapa jenis RNA, yaitu t-RNA, r-RNA, dan m-RNA yang masing-masing mempunyai peranan pada sintesis protein. (Suwandi, 1992)

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA dependen RNA-polymerase bakteri, memblokir helix

DNA. Contoh quinolon, pyrimethamin, trimethoprim, dan trimetrexat (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 458)

#### H. Tinjauan Islam

Ajaran islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan manusia dan penciptanya (Allah SWT). Serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu maka dapat ditegaskan bahwa islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya.

QS. An-Nahl/16:11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya

*Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.(11)*

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bermacam jenis tumbuhan di muka bumi ini sebagai tanda kekuasaan-Nya. Semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia dan pasti memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Namun untuk dapat memanfaatkan kesemua itu, dibutuhkan ilmu pengetahuan yang mendalam. Nah ilmu pengetahuan ini hanya dapat dimiliki bagi orang-orang yang berpikir dan senantiasa berusaha memahami tanda-tanda tersebut.

Soal penyakit adalah salah satu bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Ujian ini antara lain bermaksud agar setiap orang menyadari bahwa manusia hamba Allah, yang tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Dialah yang menurunkan dan menyembuhkan penyakit bagi hambaNya. Tidak semua pasien yang sembuh dari penyakit yang dideritanya, bagaimanapun kualitas obat yang diberikan dan bagaimanapun ahlinya dokter yang merawatnya. Ini sebagai bahan renungan kepada setiap hambaNya, bahwa ada maha kekuatan yang abstrak yang Maha Mengatur dan Maha Menentukan segala urusan.

QS al-Thaha/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّاكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ آءًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣

Terjemahnya

*Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.(53 ). (Departemen Agama RI, 1977: 481)*

Ayat diatas menyatakan: Dia, yakni Allah, Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagaimana besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbu-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya. Demikian itu

semua Allah ciptakan buat kamu binatang-binatang kamu (Shihab, 2002: 604-605).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tersedia banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, termasuk batang brotowali dan manusia memiliki tugas untuk mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut.

QS. Al Israa'/17:82

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahannya

*Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian(82)*

(Departemen Agama RI, 1977)

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam Al Quran terkandung ilmu untuk menawar segala penyakit. Oleh karena itu banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Jabir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا أَنْزَلَ لِلْهُدَاءِ إِلَّا أَنْزَلَ لِلْهُشْفَاءِ

Terjemahnya :

“ *Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut* ” (ZadulMa’ad 4. 2008; 270)

Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Terjemahnya :

“ *Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah* ” (H.R. Muslim). (ZadulMa’ad 4. 2008; 270-271)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit, memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, ataupun untuk meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan sebagaimana kita mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. (Zadul Ma’ad 4. 2008; 270-271).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dan lokasi penelitian dilaksanakan dalam laboratorium Fitokimia dan laboratorium Mikrobiologi.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendekati kearah penelitian eksperimental.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tumbuhan brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers.) yang ada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

##### **2. Sampel**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini batang brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers.).

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada. (Sukmadinata, 2005: 220).

#### ***E. Instrumen Penelitian***

### 1. Alat yang digunakan

Autoklaf, bejana maserasi, batang pengaduk, botol pengencer, cawan petri, cawan porselin, chamber, gelas erlenmeyer, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 50 ml, gelas kimia, inkubator, kompor listrik, Laminar Air Flow, lampu spiritus, lampu UV 254 dan 366 nm, lemari pendingin, magnetik stirrer, neraca O'Haus, oven, ose bulat, penangas air, rotary evaporator, sendok tanduk, seperangkat alat kromatografi cair vakum, spoit 1 ml, spoit 10 ml, timbangan analitik, dan vial.

### 2. Bahan yang digunakan

Airsuling (aquadestillata), biakan murni (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp.*, DMSO (DimetilSulfoksida), etil asetat, HCl, kloroform, etanol 96%, silika gel 60 GF<sub>254</sub>, metanol, medium Nutrient Agar (NA), ekstrak n-heksan hasil partisi batang brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers), larutan fisiologis Natrium Klorida (NaCl) 0,9%, N-heksan, Aluminium klorida, Kloroform, Besi (III) klorida (FeCl<sub>3</sub>), Dragenddorf, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dan Liebermann-Burchard.

## F. Metode Kerja

### 1. Pengambilan sampel daun

Batang brotowali (*Tinosporacrispa* L. Miers.) batang yang diambil, adalah batang yang bersih, sehat, bukan batang yang berjamur atau telah layu.

### 2. Pengolahan sampel



Batang brotowali (*Tinospora crispa* L. Miers.) yang telah diambil dibersihkan kemudian dipisahkan dari kotoran yang menempel pada sampel batang, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian di angin-anginkan ditempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Setelah kering, lalu diserbukkan dengan cara diblender dan diusahakan tidak terlalu halus, kemudian sampel siap untuk diekstraksi.

### 3. Ekstraksi sampel

Sampel batang brotowali (*Tinosporacrispa* L. Miers.) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 500 gram dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol hingga terendam semua bagian sampel dan ditutup rapat. Dibiarkan selama 24 jam sambil diaduk sekali-kali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Ekstrak etanol yang diperoleh dipekatkan dengan alat rotavapor.

### 4. Partisi Ekstrak

Ekstrak etanol 96 % Batang Brotowali (*Tinospora crispa*L.Miers) dipartisi secara cair padat dengan menggunakan pelarut n-heksan, kemudian senyawa yang larut n-heksan dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan yang jernih. Setelah itu, ekstrak yang tidak larut n-heksan dilarutkan dengan Etil asetat, kemudian senyawa yang larut etil asetat dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan yang jernih. Setelah itu, ekstrak yang tidak larut etil asetat dilarutkan dengan Metanol,

kemudian senyawa yang larut Metanol dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisidilakukanhinggadiperolehlarutan yang jernih.

### 5. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan detergen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan larutan detergen selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCL 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan dalam oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik seperti spoit yang tidak tahan dalam pemanasan tinggi, disterilkan pada autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum inokulasi atau ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

### 6. Pembuatan Medium

#### a. Medium Nutrien Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak beef	5,0 gram
Pepton	10,0 gram
Agar	15,0 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Medium Glukosa Nutrien Broth (GNB)

Komposisi :

Ekstrak beef	5,0 gram
Glukosa	10,0 gram
Pepton	10,0 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer, dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Djide, M. N., Sartini, 2008: 22-23)

## 7. Penyiapan Bakteri Uji

Bakteri uji digunakan dalam penelitian ini meliputi *Escherichia coli* (Penyebab diare), *Bacillus subtilis* (gastroenteritis), *Salmonella thyposa* (Penyebab Thypoid), *Pseudomonas aeruginosa* (penyebab pneumonia, ISK), *Staphylococcus aureus* (Penyebab penyakit kulit), *Staphylococcus epidermidis* (Penyebab Jerawat), *Streptococcus mutans* (penyebab karang gigi), dan *Vibrio sp* (disentri). Bakteri-bakteri ini berasal dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C.

## **8. Pembuatan Suspensi Bakteri**

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam telah diremajakan dalam medium NA miring, disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9 %) kemudian diukur kekeruhannya 25% T pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm.

## **9. Skrining Aktivitas Antibakteri**

Pada tahap skrining aktivitas, ekstrak etanol dilarutkan dalam dimetilsulfoksida (DMSO), kemudian dicampurkan dengan media NA yang telah dicairkan. Campuran tersebut dituangkan ke dalam cawan petri dan digoyang-goyangkan agar rata dan dibiarkan memadat. Biakan mikroba uji yang telah diencerkan diratakan dengan menggunakan metode drygalsky (metode surface plate), kemudian cawan petri diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

## **10. Pengujian Secara KLT-Bioautografi**

Metode ini didasarkan atas difusi senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Lempeng kromatografi yang sebelumnya telah dielusi, ditempatkan di atas permukaan medium Nutrien Agar yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang tepat, akan nampak zona hambat senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

## **11. Identifikasi Bercak Aktif dengan Beberapa Penampakan Bercak**

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai berikut :

a. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan yaitu Dragendorf, jika sampel positif mengandung alkaloid, maka timbul warna jingga dengan latar belakang kuning.

b. Steroid

Pereaksi yang digunakan yaitu Liebermann-Buchard sampel terlebih dahulu dipanaskan setelah disemprot pereaksi, jika sampel positif mengandung steroid, maka timbul noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan senyawa triterpen. Kromatogram diamati pada lampu UV 254 dan 366

c. Flavanoid

Pereaksi yang digunakan yaitu Aluminium Klorida diamati di lampu UV, jika sampel mengandung senyawa flavanoid maka noda akan berfluoresensi hijau.

d. Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) Klorida, jika sampel positif mengandung fenol akan dihasilkan warna hijau atau biru.

e. Khumarin

Pereaksi yang digunakan KOH etanolik, jika sampel positif mengandung senyawa khumarin akan dihasilkan warnamerah terang.

f. Penampakan bercak H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Kromatogram disemprotkan pereaksi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% dipanaskan pada suhu 105°C selama 5 menit dan diamati. Kebanyak senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, dan hitam (Sutrisno, R.B : 4-78)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Hasil Ekstraksi batang brotowali

**Tabel 1.** Hasil ekstrak etanol 96% batang brotowali

Berat Sampel (g)	Jenis Pelarut	Volume Pelarut (ml)	Berat Ekstrak (g)
500	Etanol 96%	1000	27,25

Batang brotowali kering sebanyak 500 gram di maserasi dengan menggunakan metode maserasi. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan menggunakan Etanol 96% sebesar 27,25 gram.

##### 2. Hasil Partisi Ekstrak

**Tabel 2.** Hasil Partisi Ekstrak Etanol 96 % Batang Brotowali

Ekstrak	Berat Sampel (g)	Jenis Pelarut	Volume Pelarut (ml)	Berat Ekstrak (g)
Etanol 96%	27,25	n-Hexan	500	5,5
≠ n-heksan	21,75	Etil Asetat	300	1,3
≠ etil asetat	20,45	Metanol	800	13,9

Setelah diekstraksi, ekstrak etanol 96 % batang brotowali (*Tinospora crispera* L. Miers) sebanyak 27,25 g dipartisi secara cair padat dengan menggunakan pelarut n-heksan, kemudian senyawa yang larut n-heksan dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan yang jernih. Setelah itu,

ekstrak yang tidak larut n-heksan dilarutkan dengan Etil asetat, kemudian senyawa yang larut etil asetat dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan yang jernih. Setelah itu, ekstrak yang tidak larut etil asetat dilarutkan dengan Metanol, kemudian senyawa yang larut Metanol dan yang tidak larut dipisahkan, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, dan diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan yang jernih. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2.

### 3. Pengujian Skrinning Antibakteri

**Tabel 3.** Hasil Skrinning Aktivitas Antibakteri Hasil Partisi Ekstrak Batang Brotowali (*Tinospora crispera* L. Miers) Terhadap Beberapa Bakteri Uji.

No	Sampel	Bakteri Uji							
		BS	EC	PA	SA	SE	SM	ST	Vsp
1.	Ekstrak Etil Asetat	-	+	+	-	+	-	-	-
2.	Ekstrak Metanol	-	-	-	-	+	-	-	-
3.	Ekstrak n-Heksan	-	+	+	-	+	+	-	+

Keterangan :

BS : *Bacillus Subtillis*

EC : *Escherichia coli*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thyposa*

SA : *Staphylococcus aureus*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

SM : *Streptococcus mutans*

Vsp : *Vibrio sp.*

Setelah mendapatkan hasil dari partisi maka dilanjutkan pengujian skrining antibakteri. Uji ini merupakan uji pendahuluan untuk mengetahui aktivitas antimikroba suatu sampel dimana hasil yang diperoleh dapat menjadi patokan untuk pengujian selanjutnya. Pengujian skrining aktivitas antibakteri Batang brotowali (*Tinospora crisper* L. Miers) yang digunakan yaitu ekstrak metanol, ekstrak etil asetat dan n-Heksan terhadap bakteri uji *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp.* Diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap satu jenis bakteri yaitu, *Staphylococcus epidermidis* yang ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri pada medium agar. Sedangkan ekstrak etil asetat memiliki aktivitas anti bakteri terhadap tiga jenis bakteri yaitu, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. Sedangkan ekstrak n-Heksan memiliki aktivitas antibakteri terhadap lima jenis bakteri yaitu, *Vibrio sp*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. Lihat Tabel 3.

Dari pengujian tersebut diperoleh hasil dimana ekstrak n-Heksan memberikan hasil terbaik dibandingkan ekstrak Etil Asetat dan Metanol. Selanjutnya ekstrak n-Heksan dilanjutkan pada pengujian Kromatografi Lapis Tipis (KLT).





Gambar 1. Profil n-Heksan, Etil Asetat, Metanol

Ekstrak n-Heksan kemudian dilarutkan dengan menggunakan Kloroform : Metanol (1 : 1), kemudian ditotol pada lempeng KLT, kemudian dielusi dengan eluen n-Heksan : Etil Asetat (3:1).



Gambar 2. Menghambat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (PA)

Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam



Gambar 3. Menghambat Pada Bakteri *Vibrio sp*

Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam



Gambar 4. Menghambat Pada Bakteri *Streptococcus mutans* (SM)

Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam



Gambar 5. Menghambat Pada Bakteri *Streptococcus epidermidis* (SE)

Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam



Gambar 6. Menghambat Pada Bakteri *Escheria coli* (EC)

Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam

Setelah didapatkan profil KLT maka dilanjutkan dengan pengujian KLT bioautografi terhadap lima jenis bakteri patogen yang didapatkan dari hasil pengujian skrining antibakteri, hasil yang diperoleh seperti yang tercantum pada gambar diatas.

#### 4. Identifikasi komponen senyawa kimia

**Tabel 4.** Hasil Identifikasi Golongan Senyawa kimia batang brotowali

<b>Pereaksi</b> <b>Semprot</b>	<b>Komponen</b> <b>Kimia</b>	<b>Warna</b>	<b>Nilai</b> <b>Rf</b>	<b>Ket.</b>
Dragendorf	Alkaloid	-	-	-
AlCl <sub>3</sub> 5 %	Flavonoid	Hijau	0,54	Flavanoid
Lieberman- Bouchard	Steroid	Coklat	0,81	Steroid
FeCl <sub>3</sub> 5 %	Fenol	-	-	-
KOH	Khumarin	-	-	-

Keterangan: (+) Flavanoid dan Steroid

Identifikasi senyawa kimia dilakukan dengan eluen n-heksan:etil asetat (3:1). Dipotong lempeng KLT menjadi 5 bagian. Diberi tanda masing-masing yaitu alkaloid, flavonoid, steroid/ terpenoid, dan fenolik, antrakuinon, ditotol pada bagian-bagian tersebut. Lalu dimasukkan dalam chamber dan ditunggu hingga eluen bergerak naik sampai batas atas. Untuk alkaloid disemprot dengan reagen Dragendorf, steroid/ terpenoid disemprot dengan reagen LB, untuk fenolik disemprot FeCl<sub>3</sub>, untuk flavonoid disemprot dengan AlCl<sub>3</sub> 5%. Hasil identifikasi senyawa golongan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.

Setelah pemberian batas atas, sampel ditotol tegak lurus pada batas bawah yang telah dibuat. Namun sebelum dilakukan penotolan, terlebih dahulu lempeng diaktifkan pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$  selama 20 menit. Lempeng perlu diaktifkan agar lapisan silika gel sedikit mungkin mengandung air. Penotolan dilakukan dengan menggunakan pipa kapiler secara tegak lurus dengan permukaan lempeng sampai diperoleh totolan yang sempurna. Setelah itu lempeng yang telah ditotol dimasukkan dalam chamber yang berisi eluen n-heksan:etil asetat (3:1) yang telah dijenuhkan terlebih dahulu. Dalam hal ini chamber ditutup rapat dengan tujuan agar atmosfer dalam chamber terjenuhkan oleh uap pelarut. Penjenuhan udara dalam chamber dengan uap akan menghentikan penguapan pelarut. Untuk mengetahui hal ini, biasanya ditempatkan kertas saring yang akan terbasahi oleh pelarut. Setelah lempeng dimasukkan dalam chamber, chamber ditutup dan dielusi sampai batas atas lempeng. Lempeng diangkat dan dikeringkan. Noda yang muncul diamati pada UV 254 nm, UV 366 nm, dan disemprot dengan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10%, hasilnya dicatat dan dihitung nilai  $R_f$ -nya.

Untuk mengamati noda yang muncul pada lempeng maka digunakan lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm, 366 nm, dan disemprot dengan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10%. Adapun digunakan lampu UV 254 nm karena adanya interaksi antara sinar UV dan gugus kromofor yang tidak terlihat oleh ausokrom yang ada pada noda. Flouresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tinggi dan kembali ke keadaan semula. Energi yang mengakibatkan adanya perbedaan flouresensi warna yang dihasilkan tiap noda

karena lempeng yang berflouresensi sebagai komponen kimia yang berada di bawah panjang gelombang 254 nm. Sinar UV yang dipancarkan akan diserap semua sehingga menghasilkan noda yang gelap. Sedangkan pada lampu UV 366 nm yang terlihat adalah noda yang berwarna terang karena silika gel yang digunakan tidak berflouresensi di bawah UV 366 nm.

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya komponen-komponen bioaktif yang terdapat pada sampel uji. Uji fitokimia meliputi uji alkaloid, uji steroid/triterpenoid, flavonoid, saponin, fenol hidrokuinon, Molisch, Benedict, Biuret dan Ninhidrin. Uji positif terdapat pada flavanoid dan steroid, dimana uji flavanoid menggunakan  $AlCl_3$  yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau disebabkan adanya gugus hidroksi pada C-3 atau C-5 dan keton yang membentuk kompleks dengan pereaksi  $AlCl_3$ . Sementara, untuk senyawa steroid didapatkan melalui uji Liebermann-Burchard, dimana memberikan warna coklat disebabkan oleh gugus hidroksil dari kolesterol bereaksi dengan pereaksi dan menambah konjugasi dari ketidak jenuhan pada cincin yang terhubung.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol dan Partisi Batang Brotowali ( *Tinospora crispa* L. Miers) memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri patogen.

2. Ekstrakn-Heksan Batang Brotowali ( *Tinospora crispa* L. Miers) mengandung golongan senyawa Steroid dengan nilai Rf 0,81 dan golongan senyawa Flavanoid dengan nilai Rf 0,54 pada eluen n-heksan : etilasetat (3:1).

3. Dalam ajaran Islam, tumbuh-tumbuhan dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap penyakit yang diderita sebagaimana dalam QS. An-Nahl/16:11, salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan yaitu Batang Brotowali ( *Tinospora crispa* L. Miers) sebagai obat Diare, infeksi kulit, jerawat, dan karang gigi bagi suku bugis Makassar.

#### **B. Saran**

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melanjutkan pada tingkatan fraksi dan isolasi senyawa batang botowali.

## KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006
- Backer, C.A and Van Den Brink, R.C B  
achuizan. *Flora of Java (Spermatophytesnly)*. Addenda et corrigenda vol.III
- Choma I. *The Use of Thin-Layer Chromatography with Direct Bioautography for Antimicrobial Analysis*. LCGC Europe. 2005.
- Colorado R. J., Galeano J. E., and Martinez M. A. *Development of Direct Bioautography as Referance Method for Testing Antimicrobial Activity of Gentamicin Againts Escherichia coli*. Vitae. 2007
- Dalimartha, S. 2005. *Ramuan Tradisional untuk Pengobatan Diabetes Mellitus*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu. 1977
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1995
- Djide. M. N, Sartini, Kadir. S.H, *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin, 2006.
- Djide. M. N, Sartini, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2008
- Edy Patturusi, Armisman. “Ekstraksi dan Fraksinasi Daun Jati”. *Laporan Hasil Penelitian*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2008
- Gabriel J. F. *Fisika Kedokteran*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 1998
- Ganiswara, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 4. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran. Jakarta : Universitas Indonesia 1995.
- Garrity. G. M., Bell. J. A. and Lilburn. T. G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologi*, 2nd Edition, United States of America, Springer, New York Berlin Hendelberg. 2004.



- Mycek, M. J. *Farmakologi Ulasan Bergambar*, Cetakan 1, Terjemahan Azwar Agoes, Jakarta : Widya Medika. 2001.
- Rukmini, Indah “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Asam Jawa Terhadap Beberapa Bakteri Patogen Secara KLT-Bioautografi”. Laporan *Hasil Penelitian*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2011.
- Santoso, Budi. *Ragam dan Khasiat Tanaman Obat*. Jakarta Selatan : PT. Agromedia Pustaka. 2008.
- Saptorini, E. 2007. *Brotowali Obat Antitumor*. Senior 71. Online. (<http://mauhidupsehat.blogspot.com/2008/11/brotowali-obat-anti-tumor.html>, diakses tanggal 1 Maret 2016).
- Sastroamidjojo, H. *Kromatografi*. Liberty. Yogyakarta. 1985.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah Vol 9*. Jakarta Pusat : Lentera Hati. 2009.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah Vol 5*. Jakarta Pusat : Lentera Hati. 2002.
- Siregar, N.P.S. *Uji Anti Mikroba Ekstrak Batang Brotowali (Tinosporacrispa L. Miers) Terhadap Pseudomonas aeruginosa secara In Vitro*. Malang: Universitas Brawijaya. 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2006
- Soedarmilah, S. 1999. *Jamu Jawa Asli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sutrisno, R. B., *Pereaksi KLT (Kromatografi Lapis Tipis)*. Jakarta : Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 1998.
- Sutrisno, R. B., *Taksonomi Spermatophyta Untuk Farmasi*. Edisi 1. Jakarta : Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 1998.
- Suwandi, U. *Mekanisme Kerja Antibiotik*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan . PT Kalbe Farma
- Suwarto, Agus. *9 Buah dan Sayur Sakti Tangkal Penyakit*. Yogyakarta. Liberplus. 2010.
- Syukur, C. 1999. *Tanaman Obat Komersial*. Jakarta: Penebar Swadaya dan Hernani
- Thomas A. N. S. *Tanaman Obat Tradisional*. 2nd ed. Yogyakarta. Kanisius. 1992.

Utami, Prapti, dr. *Buku Pintar Tanaman Obat 431 Jenis Tanaman Penggempur Aneka Penyakit*. PT Agromedia Pustaka. 2008.

Widiyastuti. S, Y. *Penanganan Hasil Panen Tanaman Obat Komersial*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004; 5


Zakaria, Z.A., Mat Jais, A.M., Somchit, M.N., Sulaiman M.R., Faizal, F.O. 2006.

*The In vitro Antibacterial activity of Tinosporacrispa Extracts*. Journal of Biology Science; 6(2): 398-401. Online. (<http://scialert.net/pdfs/jbs/2006/398-401.pdf>, diakses tanggal 2 Februari 2016).





## SKEMA KERJA

### 1. Ekstraksi dan Partisi Ekstrak



## 2. Identifikasi Senyawa Kimia



**Lampiran 3. Gambar**

1. Proses pengeringan sampel batang brotowali



2. proses ekstraksi menggunakan  
pelarut etanol 96% dengan metode maserasi




3. Pemisahan hasil ekstrak dengan ampas

Sampel



4. Proses pemisahan pelarut dengan hasil ekstrak


menggunakan rotavapor



5. Hasil ekstraksi dipartisi dengan pelarut  
n-heksan, etil asetat, metanol



6. Pemisahan hasil partisi menggunakan  
Sentrifuge




7. Ekstrak hasil partisi n-heksan



8. Ekstrak hasil partisi etil asetat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R






9. Ekstrak hasil partisi metanol



10. Proses skrining antibakteri

11. Hasil skrining antibakteri n-heksan



12. Hasil skrining antibakteri etil asetat


### 13. Hasil penentuan profil KLT



Keterangan : Profil KLT ekstrak n- Heksan, etil asetat, dan metanol dalam perbandingan Eluen Hexan : Etil (3:1)


### 14. Proses uji aktivitas antibakteri metode KLT





Keterangan : Proses KLT Bioautografi dengan Metode temple dengan menggunakan Ekstrak n-Heksan

#### 15. Hasil KLT bioautografi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan Zona Hambat ditandai dengan Lingkaran Hitam

### 16. Identifikasi senyawa kimia kumarin

menggunakan KOH etanolik 10%



Keterangan : Hasil Menyatakan Negatif (-) tidak adanya senyawa kumarin

### 17. Identifikasi senyawa kimia Flavanoid

menggunakan  $AlCl_3$



Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan menunjukkan warna hijau pada lampu UV 366

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

18. Identifikasi senyawa Alkaloid dengan menggunakan pereaksi Dragendorff




Keterangan : Hasil Menyatakan Negatif (-)

19. Identifikasi senyawa steroid dengan menggunakan pereaksi Liberman Buchart



Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan menunjukkan warna biru pada lampu UV 366

20. Identifikasi senyawa Fenolik menggunakan  
pereaksi  $\text{FeCl}_3$



Keterangan : Hasil Menyatakan Negatif(-)

21. Identifikasi senyawa kimia organik menggunakan  
 $\text{H}_2\text{SO}_4$



Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) dengan menunjukkan adanya bercak  
noda senyawa organik



22. Identifikasi senyawa kimia menggunakan

UV 254 dan 366



Keterangan : Hasil Menyatakan Positif (+) menandakan adanya penampakan noda

## **RIWAYAT HIDUP**

Indra Hidayat Zahmi Asis, lahir di Papua, Kabupaten Nabire, pada tanggal 12 Juni 1991. Merupakan anak pertama dari pasangan Hamzah Asis dan Suparmi. jenjang pendidikan dimulai dari Madrasah Al-khaerat Smoker, kemudian SMP NEG 3 Nabire dan dilanjutkan di SMA NEG 1 Nabire. Tendaftar sebagai mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2009.

