

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU POST SEKSIO SESAREA (SC)
HARI KE II PADA NY."M" DI RSKDIA PERTIWI
MAKASSAR TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Program
Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

HARDIANA

NIM:70400113021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN**

MAKASSAR

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II Pada Ny”M”diRSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2016** yang disusun oleh **Hardiana, Nim :70400113021**, mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30-08-2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Jumat, 30-08-2016 M1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr.dr. H. Andi Armyin Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S. KM, M.Keb** (.....)

Pembimbing : **Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S. KM, M.Keb** (.....)

Penguji I : **Anieq Mumthi'ah Al-Kautzar, S.ST, M.Keb** (.....)

Penguji II : **Dra.Hj. Hartini, M.Hi** (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr.dr. H. Andi Armyin Nurdin, M.Sc

Nip: 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiana
NIM : 70400113021
Tempat/Tanggal Lahir : Bola Galung, 14 Februari 1995
Jurusan/ Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Samata, Oktober 2016
Penyusun

Hardiana
70400113021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidaya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal KTI ini yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar**” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis dapat mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas kedokteran Dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Ibu **Hj.Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb** selaku Prodi Kebidanan dan juga selaku dosen pembimbing atas waktu dan tanggung jawabnya dalam membimbing dari awal hingga penyelesaian KTI ini.
4. Ibu **Anieq Mumthi'ah Al-Kautzar, S.ST, M.keb** selaku penguji atas keikhlasan hatinya yang telah senantiasa menyempatkan waktu dan tenaganya selama ini dalam memberikan masukan beserta dukungannya dalam penyusunan KTI ini.
5. Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.Hi** selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pendidikan.
7. Bapak **H. Tura. S.Si, M.Kes**, Selaku Direktur RSKDIA Pertiwi Makassar dan beserta stafnya yang memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
8. Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku tercinta yang tiada hentinya yang selalu memberi do'a dan dukungan kepada saya, ayahanda Haberin dan Ibunda Naima yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan,

semangat serta kerja kerasnyalah sehingga anakmu ini mampu melewati pendidikan.

9. Kepada seluruh teman-temanku yang di kebidanan selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2013 yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terimakasih atas semangat serta dukungan kalian kalianlah dan jangan lupa kekompakan nya selalu dipertahankan sobatku.

Meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 10 Juni 2016
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

Hardiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Masa Nifas.....	10
1. Pengertian Masa Nifas.....	10
2. Tujuan Asuhan Masa Nifas.....	10
3. Periode Masa Nifas.....	11
4. Adaptasi Fisiologi Pada Masa Nifas.....	12
5. Proses Adaptasi Psikologi Pada Masa Nifas.....	21
6. Kebutuhan dasar Ibu pada Masa Nifas.....	24
7. Program Tindak Lanjut Asuhan Masa Nifas di Rumah.....	30
8. Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas.....	32
9. Asuhan Pada Ibu Masa Nifas dengan Post Seksio Sesarea (SC)..	34
B. Tinjauan Tentang Seksio Sesarea (SC).....	38
1. Pengertian.....	38
2. Klasifikasi	38
3. Indikasi.....	38
4. Komplikasi.....	39
5. Perawatan Post Seksio Sesarea (SC).....	41
6. Asuhan Pada Ibu Post Seksio Sesarea (SC).....	44
C. Tinjauan Agama Islam Tentang	47
1. Masa Nifas.....	47
2. Seksio Sesarea (SC).....	49

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	53
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	55
BAB III STUDI KASUS.....	58
Langkah I. Identifikasi Dasar.....	58
Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	66
Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial.....	69
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi.....	70
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	70
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan.....	75
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	78
Pendokumentasian.....	80
BAB IV PEMBAHASAN.....	92-96
Pembahasan.....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
Tabel 1.1	Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi.....	12
Tabel 1.2	Jadwal Kunjungan Masa Nifas.....	30
Tabel 1.3	Keterkaitan antara proses manajemen kebidanan dan pendokumentasian.....	56
Tabel 1.4	Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar konsultasi/bimbingan.

Lampiran 2 : Surat izin pengambilan data dari Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan

Lampiran 3 : Surat izin pengambilan data awal dari RSKDIA Pertiwi.

Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan.

Lampiran 5 : Surat izin penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan bagian
Balitbanda.

Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari RSKDIA Pertiwi
Makassar.

Lampiran 8 : Data dari WHO

Lampiran 9 : Data dari SDKI 2012

Lampiran 10 : Profil kesehatan Prov. Sulsel Tahun 2014

Lampiran 11 : Daftar ibu nifas dan jumlah Ibu Post Seksio Sesarea (SC) di RSKDIA
Pertiwi Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap wanita menginginkan Persalinan nya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi dengan sempurna. Ada dua cara persalinan yaitu persalinan lewat vagina yang lebih lebih dikenal dengan persalinan alami dan persalinan *caesar* atau *section caesarea* (Veibymiaty Sumelung, Dkk, 2014).

Seksio Sesarea (SC) adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerektomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya (Purwoastuti, Dkk, 2015).

WHO memperkirakan bahwa angka persalinan dengan bedah caesar adalah sekitar 10% sampai 15% dari semua proses persalinan dinegara-negara berkembang dibandingkan dengan 20% di Britania Raya dan 23% di Amerika Serikat (Purwoastuti, Dkk, 2015).

Pada beberapa keadaan, tindakan Seksio Sesarea ini bisa direncanakan atau diputuskan jauh-jauh sebelumnya. Operasi ini disebut operasi sesarea elektif. Kondisi ini dilakukan apabila dokter menemukan ada masalah kesehatan pada ibu atau menderita suatu penyakit, sehingga tidak mungkin untuk melahirkan secara normal (Purwoastuti, Dkk, 2015).

Beberapa kerugian dari persalinan yang dijalani melalui bedah Seksio Sesarea yaitu adanya komplikasi yang dapat terjadi antara lain cedera kandung kemih, cedera pada pembuluh darah, cedera pada usus dan infeksi pada rahim. Dalam hal ini bakteri merupakan sumber penyebab infeksi yang mengakibatkan terhambatnya proses penyembuhan luka (Norman, Dkk, 2011).

Menurut WHO (*World Health Organisation*) Tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI) di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (29/100.000 kelahiran hidup), Thailand (48/100.000 KH), Vietnam (59/100.000 KH), serta Singapore (3/100.000 kelahiran hidup). Dibandingkan dengan negara-negara maju, angkanya sangat jauh berbeda seperti Australia (7/100.000 kelahiran hidup) dan Jepang (5/100.000 kelahiran hidup) (WHO 2011).

Berdasarkan data SDKI, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 359/100.000 kelahiran hidup (KH), padahal pada tahun 2007 AKI di Indonesia adalah 228/100.000 kelahiran hidup (KH).

Di Indonesia penyebab terbesar kematian ibu selama tahun 2010-2013 masih tetap sama yaitu perdarahan 30,3%, hipertensi 27,1%, dan infeksi 7,3%. Sedangkan di Sulawesi Selatan penyebab angka kematian ibu pada tahun 2013 sebanyak 115 orang (0,8%), dan angka kematian ibu hamil sebanyak 18 orang (15,6%), ibu bersalin sebanyak 59 orang (51,3%), ibu nifas sebanyak 38 orang (33%) (Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan 2013).

Data yang diperoleh dari rekam medik RSKDIA Pertiwi Makassar pada tahun 2014 sampai 2015 jumlah ibu nifas dengan indikasi Seksio sesarea yaitu pada tahun 2014 periode bulan januari sampai desember yaitu 1181 orang dari 4936 orang ibu nifas dan tahun 2015 periode bulan januari sampai desember sebanyak 1351 orang dari 4515 orang ibu nifas.

Berdasarkan hasil uraian diatas salah satu penyebab angka kematian ibu yaitu perdarahan sehingga membutuhkan penanganan dan mendapatkan pemantauan khususnya pada pasca persalinan karena tindakan operasi agar dapat menurunkan terjadinya berbagai komplikasi pada ibu Post Seksio Sesarea (SC), maka dengan adanya kasus ini sehingga saya tertarik untuk menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Partum Pada Ny."M" Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Penulisan karya tulis ilmiah meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Partum Pada Ny."M" Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II di RSKDIA Makassar tahun 2016.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Partum Pada Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis data Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil ditemukan data bahwa ibu telah dioperasi Seksio Sesarea (SC) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal akibat adanya plasenta previa yang menutupi jalan lahir.
- b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu dapat menimbulkan nyeri pada daerah bekas Seksio Sesarea (SC).
- c. Merumuskan diagnosa/masalah potensial Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu keadaan nyeri pada luka operasi memungkinkan terjadinya infeksi apabila tidak ditangani dengan baik.
- d. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu tidak dilakukan tindakan segera mengingat keadaan pasien pada saat pelaksanaan manajemen tidak dalam keadaan darurat atau bahaya.
- e. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil penulis merencanakan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial.

- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
- g. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program baik di Depkes maupun pihak di RSKDIA Pertiwi Makassar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program post partum care.

2. Manfaat Pendidikan

Untuk menambah wacana bagi Pembaca di Perpustakaan dan berbagai masukan bagi Program Studi D3 kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Manfaat Ilmiah

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang ibu post partum care.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan. Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan ibu post partum care.
2. Studi Kasus. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi : Identifikasi data dasar,identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

- a. Anamnesa. Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang diSbutuhkan.
- b. Pemeriksaan Fisik. Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi,dan auskultasi.
- c. Pengkajian psikososial. Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional,respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga,petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi. Yaitu studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dari dokter dan bidan.
4. Diskusi. Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Sistematika Penulisan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menuli karya tulis ilmiah ini terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Ruang Lingkup Pembahasan
- C. Tujuan Penulisan
 1. Tujuan Umum
 2. Tujuan Khusus
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan

- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang Masa Nifas
 1. Pengertian Masa Nifas
 2. Tujuan Masa Nifas
 3. Periode Masa Nifas
 4. Adaptasi Fisiologi Pada Masa Nifas

5. Proses Adatasi Psikologi Pada Masa Nifas
6. Kebutuhan dasar pada Masa Nifas
7. Program Tindak Lanjut Asuhan Masa Nifas di Rumah
8. Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas
9. Asuhan Ibu pada Masa Nifas Dengan Post Seksio Sesarea (SC)

B. Tinjauan Khusus Tentang Seksio Sesarea (SC)

1. Pengertian
2. Klasifikasi
3. Indikasi
4. Komplikasi
5. Perawatan Post Seksio Sesarea (SC)
6. Asuhan Pada Ibu Post Seksio Sesarea (SC)

C. Tinjauan Agama Islam Tentang

1. Masa Nifas
2. Post Seksio Sesarea (SC)

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

BAB III STUDI KASUS

- A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar
- B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual
- C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial
- D. Langkah IV : Tindakan Emergency / Kolaborasi
- E. Langkah V : Rencana Tindakan / Intervensi
- F. Langkah VI : Implementasi
- G. Langkah VII : Evaluasi
- H. Pendokumentasian (SOAP)

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini membandingkan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktek yang dilaksanakan yang di laksanakan di RSKDIA Pertiwi Makassar dalam memberikan asuhan pada Post Seksio Sesarea (SC).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Beberapa Pengertian Masa Nifas Menurut Para ahli, yaitu :

- a. Masa Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu (Saleha, 2013).
- b. Masa nifas disebut juga masa post partum atau puerperium adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Sunarsih, 2011).
- c. Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi (Dewi Maritalia 2012).

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Asuhan masa nifas haruslah diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis bagi ibu maupun bagi bayinya. Diperkirakan 60% kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan yang terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. selama bidan memberikan asuhan sebaiknya

bidan mengetahui apa tujuan dari pemberian asuhan paada masa nifas, adapun tujuan dari pemberian asuhan masa nifas antara lain:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa nifas ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologis maka kesehatan ibu dab bayi selalu terjaga.
- b. Melaksanakan skrinning yang komprehensif (menyeluruh) dimana bidan harus memberikan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis yaitu mulai penkajian data subjektif, objektif maupun penunjang.
- c. Setelah bidan melaksanakan pengkajian data maka bidan harus menganalisis data tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas ini dapat mendeteksi masalah yang dapat terjadi pada ibu dan bayi.
- d. Mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yakni setelah masalah ditemukan maka bidan dapat langsung masuk kelangkah berikutnya sehingga tujuan diatas dapat dilakukan (Aiyeyeh Rukiyah 2011).

3. Periode Masa Nifas

- a. *Puerperium Dini*. Suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan.
- b. *Puerperium intermedial*. Suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam minggu.
- c. *Remote puerperium*. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi (Reni Heryani 2012).

4. Adaptasi fisiologi pada Masa Nifas

a. Perubahan uterus

Segera setelah lahirnya plasenta, pada uterus yang berkontraksi posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengahan antara umbilikus dan simfisis, atau sedikit lebih tinggi. Dalam keadaan normal, uterus mencapai ukuran besar pada masa sebelum hamil sampai dengan kurang dari 4 minggu, berat uterus setelah kelahiran kurang lebih 1 kg sebagai akibat involusi. Satu minggu setelah melahirkan beratnya menjadi kurang lebih 500 gram, pada akhir minggu kedua setelah persalinan menjadi kurang lebih 300 gram, setelah itu menjadi 100 gram atau kurang.

Tabel 1.1 Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi

Involusi	TFU	Berat
Bayi lahir	Setinggi Pusat, 2 jbpst	1,000 gr
1 minggu	Pertengahan pusat simfisis	750 gr
2 minggu	Tidak teraba diatas simfisis	500 gr
6 minggu	Normal	50 gr
8 minggu	Normal tapi sebelum hamil	30 gr

Keterangan:

jbpst = jari bawah pusat

TFU = Tinggi Fundus Uteri (Saleha, 2013).

Namun pada keadaan yang abnormal tinggi fundus mengalami perlambatan akibat adanya luka insisi pada posisi Seksio Sesarea (SC) timbul rasa nyeri akibat luka insisi sehingga involusi lebih lambat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses involusi uteri diantaranya:

- 1) Gizi. Faktor gizi dapat memperlambat penurunan TFU karena pada ibu nifas Post Seksio Sesarea (SC) tidak boleh langsung makan dan harus diet makanan terlebih dahulu. Jadi bila gizi ibu Post Partum kurang, maka proses pertunbuan serta pemeliharaan jaringan terutama untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat persalinan mengalami gangguan sehingga pengembalian alat-alat kandungan atau involusio uteri menjadi lebih lambat dan rentan terkena infeksi.

Gizi yang adekuat akan mempercepat pemulihan kesehatan ibu pasca persalinan dan pengembalian kekuatan otot-ototnya menjadi lebih cepat serta akan mengakibatkan kualitas maupun kuantitas Air Susu Ibu atau ASI. Disamping itu juga ibu pasca persalinan akan lebih mampu menghadapi serangan-serangan kuman sehingga tidak terjadi infeksi dalam nifas (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012).

- 2) Mobilisasi. Mobilisasi dini adalah aktifitas segera yang dilakukan setelah beberapa jam dengan beranjak dari tempat tidur pada ibu dengan pasca persalinan.

Hasil penelitian bahwa sebagian besar (60,6%) Ibu Nifas Post Seksio Sesarea (SC) mengalami keterlambatan penurunan TFU Hal ini disebabkan oleh ibu Post Seksio Sesarea (SC) kurang melakukan mobilisasi dini karena rasa nyeri yang timbul akibat pada luka jahitan pada abdomen (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012).

Mobilisasi dini (early mobilization) bermanfaat untuk:

- a) Melancarkan pengeluaran lokia, mengurangi infeksi puerperium.
- b) Ibu merasa lebih sehat dan kuat.
- c) Mempercepat involusi alat kandungan.
- d) Fungsi usus, sirkulasi, paru-paru dan perkemihan lebih baik.
- e) Meningkatkan kelancaran peredaran darah, sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisi metabolisme.
- f) Memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada ibu.
- g) Mencegah thrombosis pada pembuluh tungkai (Elisabeth Siwi Walyani, dkk. 2015, Hal 113).

- 3) Usia. Usia reproduksi yang optimal bagi seorang wanita adalah umur antara 20-35 tahun, dibawah dan diatas usia tersebut akan meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan. Usia mudah dibawah 20 tahun karena perkembangan organ-organ reproduksi yang belum optimal dimana sistim dalam tubuh terutama organ reproduksi masih dalam proses pematangan (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012).

Pada usia yang lebih tu diatas 35 tahun telah terjadi kemunduran fungsi fisiologi maupun reproduksi secara umum, penurunan daya ingat membuat informasi yang disampaikan oleh bidan tidak terserap dengan baik sehingga memungkinkan terjadi komplikasi yang tidak di inginkan pada pasca persalinan.

- 4) Pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi proses penurunan Tinggi Fundus Uteri dikarenakan pekerjaan akan mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga akan mempengaruhi kebutuhan kesehariannya (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012)
- 5) Pendidikan. Tinggi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan dan cara memahami yang di jelaskan oleh bidan.

b. Lokia

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina selama masa nifas (Saleha, 2013).

Berikut ini adalah beberapa jenis Lokia yang terdapat pada wanita pada Masa Nifas, yaitu:

- 1) Lokia rubra (*cruenta*) berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekonium selama 2 hari pasca persalinan. Inilah lokia yang akan keluar selama tiga hari post partum.
- 2) Lokia sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan.
- 3) Lokia serosa adalah lokia berikutnya. Dimulai dengan versi yang lebih pucat dari lokia rubra. Lokia ini berbentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan. Lokia alba mengandung cairan serum, jaringan desidua, leukosit, dan eritrosit.

4) Lokia alba adalah lokia yang terakhir yang dimulai dari hari ke-14 kemudian makin lama makin sedikit hingga sama sekali berhenti sampai satu atau dua minggu berikutnya. Bentuknya seperti cairan putih berbentuk krim serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua (Saleha, 2013).

c. Serviks

Segera setelah persalinan bentuk serviks akan menganga seperti corong berwarna merah kehitaman, setelah bayi lahir, tangan masih bisa masuk ke rongga rahim, setelah 2 jam dapat dilalui oleh 2-3 jari dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari (Dewi Martalia, 2012).

d. Bekas implantasi plasenta

Proses involusi tempat melekatnya plasenta mempunyai kepentingan klinis yang besar, karena bila proses ini terganggu dapat terjadi perdarahan nifas (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012).

e. Rasa sakit (*after pains*)

Mules-mules sesudah partus akibat kontraksi uterus kadang-kadang akan sangat mengganggu selama 2-3 hari Post partum. Perasaan mules ini lebih terasa bila wanita tersebut sedang menyusui. Perasaan sakit itupun timbul bila masih terdapat sisa-sisa selaput ketuban, sisa-sisa plasenta atau gumpalan darah didalam kavum uteri (Fitriana dan Lilis Dwi, 2012).

f. Laktasi

Selama sembilan bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah

melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak lagi untuk menghambatnya kelenjar pituitari akan mengeluarkan prolaktin (hormon laktogenik). Sampai hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai bisa dirasakan. Pembuluh darah payudara menjadi bengkak terisi darah, sehingga timbul rasa hangat, bengkak dan rasa sakit. Sel-sel acini yang menghasilkan ASI juga mulai berfungsi ketika bayi mengisap puting refleks saraf merangsang lobus posterior pituitari untuk mengekresi hormon oksitosin. Oksitosin merangsang refleks let down (mengalirkan) sehingga menyebabkan ejsi ASI melalui sinus laktiferus payudara ke duktus yang terdapat pada puting. Ketika ASI dialirkan karena isapan bayi atau dengan dipompa sel-sel acini terangsang untuk menghasilkan ASI lebih banyak. Refleks ini dapat berlanjut sampai waktu yang cukup lama (Saleha, 2013:58).

g. Perubahan sistem pencernaan

Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi Seksio Sesarea (SC) biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Dibandingkan ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih cepat lapar karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada proses persalinan (Dewi Maritalia, 2012).

h. Perubahan Sistem urinaria

Pada awal Post partum kandung kemih mengalami oedema, kongesti dan hipotonik, hal ini disebabkan karena adanya overdistensi pada saat kala II persalinan dan pengeluaran urin yang tertahan selama proses persalinan. Maka hal ini biasanya

di perlukan kateterisasi pada ibu karena kondisin organ reproduksi ibu belum berfungsi secara optimal pasca operasi.

Pada tahap ini perlunya bidan harus memantau kelancaran aliran urine yang keluar, untuk menjaga kelancaran aliran urine yang keluar harus diperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Pipa jangan sampai tertekuk
- 2) Kantong penampungan harus dikosongkan secara teratur ke wadah penampungan urine yang terpisah bagi tiap-tiap pasien. Saluran urin dari kantong penampungan tidak boleh menyentuh wadah panampungan
- 3) Kateter yang kurang lancar/tersumbat harus dirigasi dengan teknik No.5, bila perlu diganti dengan yang baru
- 4) Kantong penampungan harus selalu terletak lebih rendah dari kandung kemih (Hasbih Ibrahim, 2011 hal:26).

i. Sistem Endokrin

Selama kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam proses tersebut, diantaranya :

- 1) Oksitosin. Oksitosin disekresi dari kelenjar otak bagian belakang. Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin. Hal tersebut dapat membantu uterus kembali ke bentuk semula.

- 2) Prolaktin. Menurunnya kadar estrogen menimbulkan terangsangnya kelenjar pituitari bagian belakang untuk mengeluarkan prolaktin, hormon ini berperang dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi susu.
- 3) Estrogen dan Progesteron. Selama hamil volume darah meningkat walaupun mekanismenya secara penuh belum dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat estrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang meningkatkan volume darah. Di samping itu, progesteron memengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal ini sangat memengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul, perineum dan vulva, serta vagina (Saleha, 2013).

j. Perubahan Tanda-tanda Vital

Tanda-tanda Vital yang sering digunakan sebagai indikator bagi tubuh yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan adalah nadi, pernafasan, suhu, dan tekanan darah.

- 1) Suhu Badan . Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat sekitar $0,5^{\circ}\text{Celcius}$ dari keadaan normal ($36^{\circ}\text{--}37,5^{\circ}\text{Celcius}$), namun tidak lebih dari $38^{\circ}\text{ Celcius}$. Hal ini disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan.
- 2) Nadi. Denyut Nadi normal berkisar antara 60–80 kali per menit pada saat proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan. Namun pada masa nifas denyut nadi akan kembali normal.

- 3) Tekanan darah. Tekanan darah normal untuk systole berkisar antara 110-140 mmHg dan untuk diastole antara 60-80 mmHg. Namun setelah persalinan, tekanan darah dapat sedikit rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya perdarahan pada saat proses persalinan.
- 4) Pernafasan. Frekuensi pernafasan normal berkisar antara 18-24 kali permenit. Setelah persalinan, frekuensi pernafasan akan kembali normal. Keadaan pernafasan biasanya berhubungan dengan suhu dan denyut nadi.

k. Perubahan Sistem Kardiovaskuler

Kardiak output meningkat selama persalinan dan berlangsung sampai kala III ketika volume darah uterus dikeluarkan. Penurunan terjadi pada beberapa hari pertama postpartum dan akan kembali normal pada akhir minggu ke 3 postpartum.

l. Perubahan Sistem Hematologi

Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama post partum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah (Reni Heryani, 2012).

m. Perubahan Sistem Musculoskeletal

Ligament, fasia dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu persalinan, setelah bayi lahir, secara berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali sehingga tidak jarang uterus jatuh kebelakang dan menjadi retrofleksi, karena ligament rotundum menjadi kendur. Stabilitas secara sempurna terjadi pada 6-8

minggu setelah persalinan. Sebagai akibat setelah putusny serat-serat elastik kulit dan distensi yang berlangsung lama akibat besarnya uterus pada saat hamil, dinding abdomen masih lunak dan lendur untuk sementara waktu. Pemulihan dibantu dengan latihan (Wulandari, dkk, 2011: 97-108).

5. Proses Adaptasi Psikologis Pada Masa Nifas

Perubahan psikologi sebenarnya sudah terjadi pada saat kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang dan cemas bercampur menjadi satu. Perasaan senang timbul karena akan berubah peran menjadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayi yang telah lama dinanti-nantikan. Timbulnya perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkanya, apakah bayi akan dilahirkan dengan sempurna atau tidak.

Hal ini dipengaruhi oleh polah asuh dalam keluarga dimana wanita tersebut dibesarkan, lingkungan, adat istiadat setempat, suku, bangsa, pendidikan serta pengalaman yang didapat (Dewi Maritalia, 2012).

a. Adaptasi psikologis ibu dalam Masa nifas

Pada primipara, menjadi orang tua merupakan pengalaman ters endiri dan dapat menimbulkan stress apabila tidak ditangani dengan segera. Perubahan peran dari wanita biasa menjadi seorang ibu memerlukan adaptasi sehingga ibu dapat melakukan peranya dengan baik.

Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa Nifas antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Fase Taking in. Merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya.

Pada fase ini, kebutuhan istirahat, asupan nutrisi dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ibu dapat mengalami gangguan psikologi berupa : kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya dan kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya.

- 2) Fase Taking Hold. Merupakan fase yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidak mampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya dan ibu sensitif dan lebih mudah tersinggung.

Sebagai bidan disini harus memberikan asuhan penuh terhadap kebutuhan ibu tentang cara perawatan bayi, cara menyusui yang baik dan benar, cara perawatan bekas luka sesar, mobilisasi, senam nifas, nutrisi, istirahat, kebersihan diri dan lain-lain.

- 3) Fase Letting Go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya.

b. *Postpartum blues* atau *Baby blues*

Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut dengan *Baby blues*, yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil, sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan (Reni Heryani, 2012:50-51).

Hal yang dapat dilakukan seorang bidan, yaitu:

- 1) Menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin.
- 2) Memberikan penjelasan yang diberikan pada ibu, suami dan keluarga bahwa hal ini merupakan suatu hal yang umum dan akan hilang sendiri dalam dua minggu setelah melahirkan.
- 3) Simpati, memberikan bantuan dalam merawat bayidan dorongan pada ibu agar tumbuh rasa percaya diri.
- 4) Memberikan bantuan dalam merawat bayi.
- 5) Menganjurkan agar beristirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi

(Reni Heryani, 2012).

c. Kemurungan Masa Nifas

Kemurungan Masa Nifas disebabkan perubahan dalam tubuh selama kehamilan, persalinan dan nifas. Kemurungan dalam masa nifas merupakan hal yang umum, perasaan-perasaan demikian akan hilang dalam dua minggu setelah melahirkan. Tanda dan gejala kemurungan masa nifas antarlain: emosional, cemas, hilang semangat, mudahn marah, sedih tanpa sebab, sering menangis.

Penatalaksanaan: bicarakan apa yang dialami ibu, temani ibu, berikan kesempatan ibu untuk bertanya, berikan dorongan ibu untuk merawat bayinya, biarkan ibu bersama dengan bayinya, gunakan obat bila perlu (Reni Heryani, 2012).

6. Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Nifas

Dalam Masa Nifas, alat-alat reproduksi khususnya pasca operasi belum bisa berangsur pulih di bandingkan dengan ibu nifas yang melahirkan normal.

Untuk membantu proses penyembuhan maka di perlukan beberapa kebutuhan dasar ibu pada Masa Nifas, yaitu diantaranya:

- a. Kebutuhan Nutrisi. Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada Masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat sekitar 25%, karenaberguna untuk proses kesembuhan karena sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi semua itu akan meningkatkan tiga kali dari kebutuhan bias (Walyani, dkk., 2015:103).

Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut:

- 1) Mengkinsumsi tambahann 500 kalori tiap hari.
- 2) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral.
- 3) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari
- 4) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pasca persalinan.
- 5) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melai ASI (Saleha, 2013).

b. Cairan

Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sedikitnya 3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air putih, sari buah, susu dan sup (Reni Heryani, 2012).

Kegunaan cairan bagi tubuh menyangkut beberapa fungsi berikut:

- 1) Fungsi system perkemihan.
- 2) Keseimbangan dan keselarasan berbagai proses didalam tubuh.
- 3) Sistem Urinarius (Walyani, dkk, 2015:108-110).

c. Mobilisasi dini (early mobilization)

Pada pasien Post Seksio Sesarea (SC) biasanya mulai ambulasi 24-36 jam sesudah melahirkan, jika pasien menjalani analgesia epidural pemulihan sensibilitas yang total harus dibuktikan dahulu sebelum ambulasi dimulai.

Adapun manfaat mobilisasi dini pada ibu Post Seksio Sesarea (SC), yaitu:

- a) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan ambulasi dini dengan bergerak, otot-otot dan panggul akan kembali normal sehingga otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Dengan demikian ibu merasa sehat dan membantu memperoleh kekuatan, mempercepat kesembuhan serta membantu mempercepat organ-organ tubuh bekerja seperti semula.
- b) Mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli dengan mobilisasi sirkulasi darah normal/lancar sehingga resiko terjadinya trombosis dan tromboemboli dapat dihindari.

Tahap-tahap mobilisasi dini pada pasien Post Seksio Sesarea (SC), yaitu:

- (1) Pada hari pertama dapat dilakukan miring ke kanan dan ke kiri yang dapat dimulai sejak 6-10 jam setelah ibu sadar. Latihan pernapas dapat dilakukan ibu sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar.
 - (2) Hari kedua, ibu dapat duduk dan dianjurkan untuk bernapas dalam-dalam lalu menghembuskannya disertai batuk-batuk kecil yang gunanya untuk melonggarkan pernapasan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada diri ibu bahwa ia mulai pulih, kemudian posisi tidur terlentang diubah menjadi setengah duduk.
 - (3) Selanjutnya secara berturut-turut, hari demi hari ibu yang sudah melahirkan dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan kemudian berjalan sendiri pada hari ke-3 sampai 5 hari setelah operasi.
- d. Kebutuhan Eliminasi

- 1) Buang Air Kecil (BAK). Pada persalihan normal masalah berkemih dan buang air besar tidak mengalami hambatan apapun. Kebanyakan pasien dapat melakukan BAK secara spontan dalam 8 jam setelah melahirkan (Elisabeth Siwi Walyani, dkk. 2015. Hal 113). Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi (Saleha, 2013).

Berikut ini sebab-sebab terjadinya kesulitan berkemih (retensio urine)

pada ibu post partum :

- a) Berkurangnya tekanan intra abdominal.
- b) Otot-otot perut masih lemah.
- c) Edema dan uretra.
- d) Dinding kandung kemih kurang sensitive (Saleha, 2013).
- e. Buang Air Besar (Defekasi). Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar (defekasi) setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau per rectal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (huknah) (Saleha, 2013).
- f. Aktivitas Seksual. Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi syarat berikut ini:
 - 1) Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu-satu dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap.
 - 2) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ini bergantung pada keputusan pasangan yang bersangkutan (Saleha, 2013).

g. Kebutuhan Perawatan Payudara.

Sebaiknya perawatan mammae telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting lemas, tidak keras, dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Berikut ini cara perawatan payudara yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Sokong payudara kiri dengan tangan kiri (kanan dengan tangan kanan) dua atau tiga jari dari tangan yang berlawanan membuat gerakan memutar sambil menekan, dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu, setiap payudara minimal 2 kali gerakan.



2. Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara. Urutlah dari tengah sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan kedua payudara perlahan-lahan sambil membuat sentakan kecil. Lakukan gerakan ini \pm 30 kali.



3. Sokong payudara dengan satu satu tangan, sedang tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah putting susu. Lakukan gerakan ini \pm 30 kali setiap payudara.



4. Pengompresan
Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres dingin selama 1 menit. Kompres berganti-ganti selama 3 kali berturut-turut akhiri dengan kompres hangat.

7. Program Tindak Lanjut Asuhan Masa Nifas di Rumah

a. Jadwal Kunjungan Rumah

Program dan kebijakan teknis yang lebih baru mengenai jadwal Kunjungan Masa Nifas di Rumah Paling sedikit dilakukan empat kali, yaitu diantaranya:

TABEL 1.2 Jadwal Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah perdarahan masa nifas. Terjadinya perdarahan nifas. • Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan memberi rujukan bila perdarahan berlanjut. • Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. • Pemberian ASI pada masa awla menjadi ibu. • Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. • Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. <p>Jika bidan menolong persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi dalam keadaan stabil.</p>

2	Enam hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan involusio uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau. • Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan pasca melahirkan. • Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat. • Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit. • Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi agar tetap hangat.
3	Dua minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama seperti yang diatas (enam hari setelah persalinan).

b. Keuntungan dan Keterbatasan

Kunjungan rumah post partum memiliki keuntungan yang sangat jelas karena membuat bidan dapat melihat dan berinteraksi dengan anggota keluarga didalam lingkungan yang alami dan aman. Bidan mampu mengkaji kecukupan sumber yang ada dirumah dan dilingkungan sekitar (Marmi, 2011:157).

Selain keuntungan, kunjungan rumah Post Partum juga memiliki keterbatasan yang masih sering dijumpai, yaitu sebagai berikut:

1. Besarnya biaya untuk mengunjungi pasien yang jaraknya jauh.
2. Terbatasnya pelayanan bidan dalam memberi pelayanan kebidanan.

3. Kekhawatiran tentang keamanan untuk mendatangi pasien di daerah tertentu (Saleha 2013).

8. Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas dan Penanganannya

a. Infeksi Masa Nifas

Infeksi nifas adalah peradangan yang terjadi pada organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau virus ke dalam organ reproduksi tersebut selama proses persalinan dan masa nifas (Dewi Maritalia, 2012).

Ibu yang mengalami infeksi nifas biasanya ditandai dengan demam (peningkatan suhu tubuh di atas 38°C) yang terjadi selama 2 hari berturut-turut.

- 1) Etiologi. Pada umumnya Mikroorganisme penyebab infeksi nifas yaitu bakteri aerob dan anaerob, diantaranya:

a) *Streptococcus haemolyticus aerobicus*

b) *Staphylococcus aureus*

c) *Escherichia coli*

d) *Clostridium welchi* (Saleha, 2013).

- 2) Patofisiologi. Patofisiologi terjadinya infeksi Masa nifas sama dengan patofisiologi infeksi yang terjadi pada sistem tubuh yang lain. Masuknya mikroorganisme ke dalam organ reproduksi dapat menyebabkan (infeksi lokal) atau bahkan menyebar ke organ lain (infeksi sistemik). Infeksi sistemik lebih berbahaya daripada infeksi lokal, bahkan dapat menyebabkan kematian bila terjadi sepsis (Dewi Maritalia, 2012).

3) Macam-macam infeksi nifas

- a) Edometritis. Endometritis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada endometrium. Infeksi ini merupakan jenis infeksi yang sering terjadi pada masa nifas. Mikroorganisme masuk ke endometrium melalui luka bekas insersio plasenta dan dalam waktu singkat dapat menyebar ke seluruh endometrium.
- b) Peritonitis. Peritonitis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada peritonium (selaput dinding perut). Pada masa nifas peritonium terjadi akibat menyebarnya atau meluasnya infeksi yang terjadi pada uterus melalui pembuluh limfe.
- c) Thrombophlebitis. Thrombophlebitis adalah penjalan infeksi melalui fena. Hal ini terjadi pada masa nifas karena terbukanya vena-vena selama proses persalinan sehingga memudahkan masuknya mikroorganisme pathogen (Dewi Maritalia, 2012).

4) Gambaran klinis

- a) Infeksi lokal seperti: Pembengkakan luka episiotomi, terjadi penanahan, perubahan warna lokal, pengeluaran lochia bercampur nanah, mobilisasi terbatas karena rasa nyeri, temperatur badan dapat meningkat.
- b) Infeksi general seperti: tampak sakit dan lemah, temperatur meningkat diatas 39°C , tekanan darah dapat menurun dan nadi meningkat, pernapasan dapat meningkat dan napas terasa sesak, kesadaran gelisah sampai menurun dan koma, terjadi gangguan involusi uterus, lochia berbau, bernanah serta kotor (Ai yeyeh Rukiyah, 2011).

b. Keadaan abnormal pada rahim

1) Sub involusi. Pada beberapa keadaan proses involusi rahim tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga proses pengecilan rahim terhambat. Keadaan demikian disebut sub involusi uteri.

2) Perdarahan Masa Nifas

Penyebabb perdarahan masa nifas adalah sebagai berikut:

- a) Sisa plasenta dan polip plasenta
- b) Endometritis Puerperalis
- c) Seba-sebab fungsional
- d) Perdarahan luka (Saleha, 2013).

3) Perdarahan oleh sebab-sebab Fungsional

Hal yang termasuk perdarahan oleh seba-sebab fungsional antara lain :

- a) Perdarahan karena hiperplasia glandularis yang dapat terjadi yang berhubungan dengan siklus anovulatorius dalam nifas.
- b) Perubahan dinding pembuluh darah. Pada golongan ini tidak ditemukan plasenta, endometritis, ataupun luka (Saleha,2013).

9. Asuhan Ibu Pada Masa Nifas dengan Post Seksio Sesaria (SC)

Setelah pasca persalinan, ibu tidak boleh ditinggalkan begitu saja, Sebagai bidan perlunya memberikan beberapa asuhan lanjutan dirumah untuk memastikan ibu dan bayinya sehat.

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada Masa Nifas dengan Post Seksio Sesarea (SC), yaitu :

1) Memeriksa Tanda-tanda vital

Periksalah suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah ibu secara teratur minimal sekali dalam satu jam jika ibu memiliki masalah kesehatan (Saleha, 2013 hal:86).

2) Membersihkan badan ibu dan merawat luka jahitan

Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh, yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka dan luka operasi yaitu luka bersih sehingga mudah untuk perawatannya, namun jika salah dalam merawat, maka akan bisa berakibat fatal.

Dalam perawatan luka Post Seksio Sesarea (SC) diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya :

- a) Setiap satu minggu kasa harus dibuka Idealnya kasa yang dipakai harus diganti dengan kasa baru setiap satu minggu sekali. Tidak terlalu sering agar luka cepat kering, jika sering dibuka luka bisa menempel pada kasa sehingga sulit untuk kering.
- b) Bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa Jika luka operasi keluar darah, maka segeralah untuk mengganti kasanya agar tidak basah atau lembab oleh darah. Karena darah merupakan kuman yang bisa cepat menyebar keseluruhan bagian luka.

- c) Jaga luka agar tidak lembap Usahakan semaksimal mungkin agar luka tetap kering karena tempat lembap akan menjadikan kuman cepat berkembang. Misalkan suhu kamar terlalu dingin dengan AC yang membuat ruangan lembap sehingga bisa jadi luka pun ikut lembap, hindari ruangan lembap, dan atur suhu AC.
 - d) Menjaga kebersihan, agar luka operasi tidak terkena kotoran yang mengakibatkan cepat berkembangnya kuman, maka kebersihan diri dan lingkungan sekitar semaksimal mungkin harus dijaga. Jauhkan luka dari kotoran, untuk itu seprei dan bantal harus selalu bersih dari debu.
 - e) Gunakan bahan elastik atau pembalut yang kedap air (Opset) Jika mau mandi atau aktifitas yang mengharuskan bersentuhan dengan air, gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air (opset) untuk melindungi luka bekas operasi agar tidak terkena air. Upayakan agar tidak sampai basah karena luka bisa mempercepat pertumbuhan kuman (Nunung, Dkk, 2013).
- 3) Memberikan penyuluhan mengenai pola makanan yang sehat dan memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan.

Petunjuk untuk mengolah makanan yang sehat:

- a) Pilih sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan ikan yang segar.
- b) Cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengolah makanan.
- c) Cuci bahan makanan yang bersih lalu potong-potong.
- d) Hindari pemakaian zat pewarna, pengawet (vetsin).
- e) Jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipakai.
- f) Perhatikan kadaluarsa dan komposisi zat makanan, jika dikemas dalam kaleng.

- g) Simpan peralatan dapur dalam keadaan bersih dan aman.
 - h) Jangan biarkan binatang berkeliaran didapur (Elisabeth, 2015).
 - i) Menjaga kebersihan. Kebersihan diri berguna untuk mengurangi infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman, kebersihan diri meliputi kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, maupun lingkungan. Oleh karena itu menjaga kebersihan diri secara keseluruhan sangatlah penting untuk menghindari infeksi, baik pada luka jhaian maupun kulit (Reni Heryani, 2012).
- 4) Istirahat. Istirahat yang cukup banyak memberikan manfaat bagi ibu setelah menghadapi ketegangan dan kelelahan saat melahirkan.

Hal-hal yang bisa dilakukan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur adalah sebagai berikut:

- a) Anjurkan ibu untuk istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.
 - b) Sarankan ibu untuk kembali ke kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur (Saleha, 2013).
- 5) Perhatikan gejala infeksi Pada Ibu. Suhu tubuh ibu yang baru melahirkan biasanya ggi dari pada suhu normal, khususnya jika cuaca saat itu sangat panas. Namun jika ibu merasa sakit, terserang demam, atau denyut nadinya cepat, atau dia merasa perih saat kandunganya disentuh, bisa jadi dia terkena infeksi. Infeksi seperti ini biasanya terjadi jika ketuban pecah lebih awala sebelum persalinan dimulai, atau jika persalinan terlalu lama, atau dia merasa kelelahan saat persalinan (Saleha, 2013).

B) Tinjauan Khusus Tentang Seksio Sesarea (SC)

1. Definisi

Seksio Sesarea (SC) adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu (laparotomi) dan rahim (histerektomi) untuk mengeluarkan bayi. Seksio Sesarea umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya (Purwoastuti, Dkk, 2015).

2. Klasifikasi operasi Seksio Sesarea (SC)

Ada beberapa jenis Seksio Sesarea (SC), yaitu diantaranya :

- a. Jenis klasik yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis ini sudah sangat jarang dilakukan saat ini karena sangat beresiko terhadap terjadinya komplikasi.
- b. Sayatan mendatar di bagian atas dari kandung kemih sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Metode ini meminimalkan risiko terjadinya perdarahan dan cepat penyembuhannya.
- c. Histerektomi caesar yaitu bedah caesar diikuti dengan pengangkatan rahim. Hal ini dilakukan dalam kasus-kasus di mana pendarahan yang sulit tertangani atau ketika plasenta tidak dapat dipisahkan dari rahim.
- d. Bentuk lain dari Seksio Sesarea (SC) seperti extraperitoneal CS atau Porro CS (Purwoastuti, Dkk, 2015).

3. Indikasi

Dokter spesialis kebidanan akan menyarankan Seksio Sesarea (SC) ketika proses kelahiran melalui vagina kemungkinan akan menyebabkan risiko kepada sang ibu atau bayi. adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan disaran nya bedah caesar antar lain :

a. Indikasi yang berasal dari ibu

yaitu pada plasenta previa terutama pada primigravida, primi para tua disertai letak ada, *disproporsi sefalo pelvic* (disproporsi janin/panggul, sejarah kehamilan dan persalinan yang buruk, terdapat kesempitan panggul, solusio plasenta tingkat I-II, komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia-eklamsia, atas permintaan, kehamilan yang disertai penyakit (jantung, DM, gangguan perjalanan persalinan (kista ovarium, mioma uteri, dan sebagainya).

b. Indikasi yang berasal dari janin

c. *Fetal distress*/gawat janin, prolapsus tali pusat dengan pembukaan kecil, kegagalan persalinan vakum atau forseps ekstraksi (Ralph Benson, Dkk, 2013).

4. Komplikasi

Menurut Sarwono Prawirohardjo (2011) komplikasi yang mungkin timbul dalam Post Seksio Sesarea (SC) :

a. Syok

Peristiwa ini terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat sel-sel jaringan tidak mendapat zat-zat makanan dan O₂ dengan akibat terjadi kematian nya.

Penyebab-penyebab syok adalah: hemoragi merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan bila terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik, atau kombinasi antara berbagai sebab tersebut.

Gejala-gejalanya ialah nadi dan pernafasan meningkat, tensi menurun, oliguri, penderita gelisah, eksterimitas dan muka dingin, serta warna kulit keabu-abuan. Dalam hal ini sangat penting untuk membuat diagnosis sedini mungkin yang dikenal dengan sistem peringatan dini (*early warning system*), karena jika terlambat, perubahannya sudah tidak dapat dipengaruhi lagi.

b. Gangguan Saluran Kemih

Pada operasi ada kemungkinan terjadi retensio urinae. Pengeluaran air seni perlu diukur, jika air seni yang dikeluarkan jauh berkurang, ada kemungkinan oliguri atau retensio urinae. Pemeriksaan abdomen seringkali dapat menentukan adanya retensi. Apabila daya upaya supaya penderita dapat berkemih tidak berhasil, maka terpaksa dilakukan kateterisasi.

c. Infeksi Saluran Kemih

Kemungkinan infeksi saluran kemih selalu ada, terutama pada penderita-penderita yang untuk salah satu sebab dikateter. Penderita menderita panas dan seringkali menderita nyeri pada saat berkemih, dan pemeriksaan air seni (yang dikeluarkan dengan kateter atau sebagai *midstream urine*) mengandung leukosit dalam kelompok. Hal ini dapat segera diketahui dengan meningkatnya leukosit esterase.

d. Distensi Perut

Pada pasca laparatomi tidak jarang perut agak kembung akan tetapi, setelah flatus keluar, keadaan perut menjadi normal. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa distensi bertambah, terdapat timpani diatas perut pada periksa ketok, serta penderita merasa mual dan muntah.

e. Infeksi *puerperal*

Pada komplikasi ini biasanya bersifat ringan, seperti kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas, bersifat berat seperti Tromboflebitis, peritonitis, sepsis dan lainnya.

f. Terbukanya Luka Operasi Eviserasi

Sebab-sebab terbukanya luka operasi pasca pembedahan ialah luka tidak dijahit dengan sempurna, distensi perut, batuk atau muntah keras, serta mengalami infeksi.

5. Perawatan Post Seksio Sesarea (SC)

Perawatan Post Seksio Sesarea (SC) sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi kebugaran tubuh seperti sedia kala. Adapun perawatan Post Seksio Sesaria (SC) yang harus dilakukan oleh bidan yaitu diantaranya:

- a. Periksa tekanan darah, frekuensi nadi dan pernapasan, ukur jumlah urine yang tertampung dikantong urine dan periksa/ukur jumlah perdarahan selama operasi.
- b. Buat laporan operasi dan cantumkan hasil pemeriksaan diatas pada lembar laporan. Catat lama operasi, jenis kelamin, nilai apgar score dan kondisi bayi saat lahir, lembar operasi ditanda tangani oleh operator.

- c. Buat instruksi perawatan yang meliputi: jadwal pemeriksaan ulang tekanan darah, frekuensi nadi dan pernapasan, jadwal pengukuran jumlah produksi urine, berikan instruksi dengan jelas, singkat dan terperinci yang mencakup nama, obat, dosis, cara pemberian, dan waktu atau jam pemberian.
- d. Nasihat dan konseling Post Seksio Sesarea (SC)
- 1) Kepada keluarga pasien beritahu bahwa: operasi telah selesai dan sampaikan jalannya operasi, kondisi ibu saat ini dan apa yang diharapkan, minimal mencakup 24 jam post operasi. Waktu lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan dan keadaan operasi. Risiko fungsi reproduksi pasien dan kehamilan/persalinan yang akan datang, alat kontrasepsi yang akan digunakan. Jelaskan rencana perawatan dan perkiraan waktu pasien dapat dipulangkan, sertakan keluarganya untuk ikut mengawasi pasien, khusus terhadap risiko fungsi reproduksi berupa bekas Seksio Sesarea (SC).
 - 2) Kepada pasien (setelah sadar/dapat berkomunikasi) beritahu mengenai keadaannya saat ini. Waktu lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan dan keadaan bayi. Risiko fungsi reproduksi, kehamilan dan persalinan yang akan datang. Lakukan konseling dan rencanakan upaya-upaya pencegahan kehamilan (bila tidak dilakukan tubektomi). Jelaskan hingga pasien memahami, menerima dan dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai serta jelaskan kembali risiko yang dihadapi oleh pasien, berikan cukup waktu untuk berdiskusi hingga diyakini bahwa pasien telah cukup mengerti dan paham (Siti Nunung, Dkk, 2013).

Adakalanya dokter akan memantau kondisi terakhir pasiennya, dan apabila dinyatakan sudah stabil, maka pihak medis tentunya akan memperbolehkan untuk pulang. Pastikan pula untuk melakukan check up secara rutin untuk memeriksa kondisi terkini si ibu (Purwoastuti, Dkk, 2015).

6. Asuhan Pada Ibu Post Seksio Searia (SC)

Setelah pasca operasi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena pada tahap ini ibu sangat rentan terhadap infeksi akibat perlukaan karena persalinan. Dengan memberikan asuhan dan pemantauan khusus pada ibu pasca operasi maka kemungkinan terjadinya infeksi pada klien lebih rendah.

- a. Pemberian cairan intravena. Kebutuhan cairan intravena, termasuk darah selama dan setelah seksio sangat bervariasi. cairan yang diberikan secara intravena terdiri dari larutan Ringer Laktat atau larutan sejenis dan Dekstrosa 5% dalam air. Biasanya diberikan dalam 1-2 liter cairan yang mengandung elektrolit seimbang selama dan segera setelah operasi.
- b. Ruang pemulihan. Di ruang pemulihan, jumlah perdarahan dari vagina harus dipantau dengan ketat, dan fundus harus sering diperiksa dengan palpasi, dengan palpasi untuk memastikan bahwa uterus tetap berkontraksi kuat. Balutan tebal dengan banyak plester dapat mengganggu palpasi dan pemijatan fundus serta menimbulkan rasa tidak nyaman kemudian saat plester, dan mungkin kulit diangkat. Ibu didorong untuk bernapas dalam dan batuk.

Setelah ibu sadar penuh, perdarahan minimal, tekanan darah memuaskan, dan aliran urine paling tidak 30 ml per jam, pasien dapat dipulangkan ke kamarnya.

- c. Pemberian analgesik (Anti nyeri). Untuk ibu dengan ukuran tubuh rata-rata, diberikan meperidin 75 mg, atau morfin 10 mg secara intramuskulus sampai sesering tiap 3 jam untuk menghilangkan rasa nyaman. Jika bertubuh kecil, mungkin diperlukan meperidin 50 mg atau jika besar, 100 mg. Suatu antiemetik (misalnya prometazin 25 mg) biasanya diberikan bersama narkotik. Metode pemberian analgetik lainnya misalnya pemberian narkotik epidural pasca partum atau analgesik yang dikontrol oleh pasien sedang dievaluasi dengan hasil awal yang menjajikan.
- d. Tanda Vital. Tekanan darah, nadi, jumlah urin, dan fundus uteri diperiksa paling tidak setiap jam selama 4 jam. Setiap kelainan dilaporkan. Setelah itu, selama 24 jam pertama, hal-hal diatas bersamaan dengan suhu, diperiksa setiap 4 jam.
- e. Terapi Cairan Dan Makanan. Secara umum, 3 liter cairan, termasuk Ringer Laktat seyogianya adekuat untuk pembedahan dan 24 jam pertama sesudahnya. Namun, jika pengeluaran urine kurang dari 30 ml per jam, pasien harus segera dievaluasi kembali. Penyebab oligouria dapat beragam mulai dari pengeluaran darah yang tidak diketahui sampai efek antidiuretik infus oksitosin.

Jika tidak terjadi manipulasi intra-abdomen yang ekstensi atau sepsis, ibu yang seyogianya mampu menerima cairan per oral sehari setelah pembedahan.

Jika tidak mampu, cairan intravena dilanjutkan atau diulang. Pada hari kedua setelah pembedahan, sebagian besar ibu dapat menerima makan biasa.

- f. **Kandung Kemih Dan Usus.** Kateter umumnya dapat dilepas dari kandung kemih 12 jam setelah operasi atau, yang lebih menyenangkan, pagi hari setelah operasi. Kemampuan ibu mengosongkan kandung kemihnya sebelum terjadi peregangan yang berlebihan harus dipantau seperti pada persalinan pervaginam. Bising usus biasanya tidak terdengar pada hari pertama pembedahan, samar-samar pada hari kedua, dan aktif pada hari ketiga. Pada hari kedua dan ketiga pasca operasi, dapat timbul nyeri gas akibat gerakan usus yang tidak terkoordinasi. Supositoria rektum biasanya dapat memicu defekasi, jika tidak ibu harus diberi anema.
- g. **Ambulasi.** Umumnya, sehari setelah pembedahan, pasien harus turun sebentar dari tempat tidur dengan bantuan paling tidak dua kali. Lama waktu ambulasi Post Seksio Sesarea (SC) dengan general anestesi dan regional anestesi cenderung sama. Selisih rata-rata lama waktu ambulasi dini hanya 2 jam 40 menit (Umi Solikhah, 2011).
- h. **Pemeriksaan Laboratorium.** Hematokrit secara rutin diukur pada pagi hari setelah pembedahan. Hematokrit diperiksa lebih dini jika terjadi pengeluaran darah berlebihan atau terjadi oliguria atau tanda-tanda yang lain yang mengisyaratkan hipovolemia. Jika hematokrit menurun secara signifikan dari kadar praoperasi, pemeriksaan diulang, dan dilakukan penelitian untuk menentukan penyebab penurunan tersebut. Jika hematokrit yang rendah itu tetap stabil, ibu yang bersangkutan tersebut dapat pulang tanpa kesulitan. Jika kecil kemungkinannya

terjadi pengeluarn darah lebih kanjut, terapi besi untuk memperbaiki gangguan hematologik lebih dianjurkan dari pada transfusi.

- i. Perawatan Payudara. Menyusui dapat dimulai sehari setelah pembedahan. Jika ibu yang bersangkutan memilih untuk tidak menyusui karena ada hal lain, maka pemakaian penyangga payudara yang tidak menekan biasanya dapat mengurangi rasa tidak nyaman.
- j. Pemulangan Dari Rumah Sakit. Ibu dapat dipulangkan dengan aman pada hari keempat atau kelima pasca persalinan, kecuali jika terjadi penyulit selama Masa Nifas. Aktifitas ibu selama minggu berikutnya harus dibatasi pada perawatan diri dan bayinya dengan bantuan. Evaluasi pasca salin perta sebaliknya dilakukan tiga minggu setelah persalinan, bukan 6 minggu seperti cara tradisional.
- k. Pemberian Antimikroba Profilaksis. Suatu Penelitian mengevaluasi intervensi terapi pada kelompok perempuan nulipara beresiko tinggi yang menjalani seksio sesarea akibat disproporsi sefalopelvik. Karena frekuensi infeksi panggul adalah 85%, menganggap bahwa pemberian antimikroba adalah pengobatan dan bukan profilaksis. Mereka mengamati bahwa pemberian penisil ditambah gentamisin atau sefamandol saja segera setelah tali pusat dijepit dan diikuti dua pemebrian dosis dan obat yang sama dengan interval 6 jam menyebabkan penurunan drastis morbiditas akibat infeksi.

Saat ini peneliti hanya memberikan dosis tunggal yaitu antimikroba spektrum luas, misalnya sefalosporin atau penisil spektrum luas. Regimen ini terbukti sama efektif, dan pemilihan anti mikroba harus mempertimbangka

beberapa hal, yaitu: alergi pasien, ketersediaan obat, biaya dan kebiasaan dokter memakai obat yang bersangkutan (Norman,dkk 2011).

Setelah memberikan Asuhan pada Ibu Post Seesarea (SC) maka tentunya bidan dapat menolong ibu dengan baik mengingat kembali pengalaman bedah sesar dengan menimbulkan rasa puas tersendiri dan keberhasilan pencapaian asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap ibu, dapat membuat perbedaan dalam mengalami dan mengingat peristiwa penting ini (Baston Helen dan Hall Jenifer 2011:166).

C. Tinjauan Agama Islam Tentang

1. Masa Nifas

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu dalam keadaan Post partum agar masa nifas berjalan dengan baik dan tidak ada komplikasi yang menyertai, dalam hal ini sebaiknya ibu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatannya seperti halnya makan-makanan yang bergizi, menjaga personal hygiene terutama pada daerah luka bekas operasi agar tidak terjadi infeksi, menyusui bayinya dengan baik.

Untuk itu ibu harus tahu mengenai larangan-larangan dalam masa nifas, yaitu:

1. Larangan melakukan shalat. Larangan ini berdasarkan atas hadits Nabi SAW yang diwariskan oleh Fatimah Binti Abi Hubaisy yang artinya :
"Apabila haid, tinggalkan shalat" (HR. Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi dan An-Nasa'i).

2. Larangan melakukan puasa dengan ketentuan puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas harus diqada dihari lainnya.
3. Larangan melakukan tawaf. Larangan ini didasarkan atas hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada Aisyah RA."Apabila engkau dalam keadaan haid, kerjakanlah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang haji lainnya, tetapi engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah kecuali setelah suci"(HR.Bukhari, Muslim).
4. Larangan membaca al-Qur'an. Larangan ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW Yang artinya:"tidak diperbolehkan"(Mughniyah, 2009).
5. Larangan bergaul suami istri. Larangan ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

" mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (Q.S. al-Baqarah (2) : 222).

Penjelasan tentang ayat diatas menjelaskan bahwa: Allah SWT melarang suami menggauli istrinya dimasa haidh dimana berakibat buruk dengan berdampak negatif pada kesehatan antara lain dapat menjadikan vagina luka dan infeksi serta dapat hamil diluar kandungan dan lain-lain sebagainya.

2. Seksio Sesarea (SC)

Islam merupakan agama yang begitu memperhatikan kehidupan umatnya. Berbagai aspek diatur didalamnya dimana semuanya dituangkan dalam Al-Qur'an dan dilengkapi dengan terjemahnya. Mulai dari konsepsi sampai meninggalnya seseorang islam semua telah diatur oleh Allah SWT.

Pada Pasca Pelahiran sesar merupakan suatu indikasi yang diperuntukan bagi ibu untuk dapat menyelamatkan Nyawanya maupun bayinya. Namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang bisa terjadi sehingga berdampak buruk pada ibu maupun pada bayinya kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-ahqaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri" (Q.S: Al-ahqaaf(46):15).

Ayat diatas bagaikan menyatakan: Sesungguhnya Kami telah memerintahkan manusia siapapun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka dan kami telah mewasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapapun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Ini antara lain kerana ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampakkan sperma kedalam rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami berbagai kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan (Quraish Shihab, 2002:67-68).

Adapun kaitanya ayat tersebut dengan judul Penelitian yang saya susun yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II. Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa betapa susahny ibu mengandung selama

kurang lebih sembilan bulan lamanya, dan selama persalinan tersebut banyak komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dan dapat berdampak pada ibu dan bayinya, semua itu dapat beresiko yang akhirnya berdampak pada kematian. Berbagai komplikasi yang dapat timbul dari ibu mulai dari dalam rahim sang ibu dalam mengandung dengan susah payah sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, sampai mengalami gangguan fisik dan psikis. Sehingga berbagai asuhan yang dapat diberikan pada ibu untuk menjaga kesehatan dan janin yang dikandungnya seperti hendaknya mengonsumsi makanan yang segar, lunak, bergizi, ringan dan sedang takarannya.

Begitu pula makanan yang baik untuk ibu menurut islam haruslah dipilih yang betul-betul halal, sehingga bisa menciptakan generasi yang jujur dan jujur terhadap agama dan bangsanya. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik/Halalan Thoyyiban sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

"dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Q.S Al-Maidah:88).

Sebagaimana manusia dapat mengantisipasi komplikasi dari penyulit-penyulit pada masa kehamilan tetapi setiap kematian Allah SWT yang menentukan. Firman Allah SWT dalam Q.S Ali ' Imran/3: 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya :

"tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan" (Q.S. Ali imron (3):185).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidan dengan menggunakan metode pemecahan masalah (Nurhayati, dkk, 2012: 139).

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.

Varney mengatakan bahwa seorang bidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial (Nurhayati, dkk, 2013:139).

Varney kemudian menyempurnakan proses kebidanan menjadi tujuh langkah yaitu:

- a. Pengkajian/ Pengumpulan Data Dasar. Pengkajian ibu post partum berfokus pada status fisiologis dan psikologi ibu, tingkat kenyamanannya, kurangnya pengetahuan terkait dengan kesiapan untuk belajar, perilaku bonding, serta

penyesuaian terhadap transisi yang diperlukan untuk menjadi ibu. Selain ibu, bayi juga perlu dikaji mengenai penyesuaian fisiologis bayi terhadap lingkungan di luar rahim, kenormalan fisik, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan bayi.

b. Identifikasi Diagnosis. Setiap ibu dan keluarga mengantisipasi perawatan postpartum di rumah, karenanya mereka akan memiliki respon yang unik. Setelah menganalisis data dengan cermat, bidan dapat menegakkan diagnosis berdasarkan data yang akan menjadi pedoman bidan dalam menerapkan tindakan. Diagnosis yang relevan untuk ibu post partum yang dirawat di rumah adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang tanda-tanda komplikasi.
- 2) Pengetahuan yang tidak adekuat mengenai menyusui yang tidak efektif.
- 3) Keletihan yang berhubungan dengan kurangnya istirahat.
- 4) Kurang pengetahuan/keterampilan dan harapan yang tidak realistis dalam peran menjadi orang tua.

c. Antisipasi Timbulnya Diagnosis atau Masalah Potensial. Merupakan kegiatan antisipasi, pencegahan jika memungkinkan, menunggu dan waspada, serta persiapan untuk segala sesuatu yang terjadi pada ibu postpartum yang dirawat di rumah.

d. Perlunya Tindakan Segera Dan Kolaborasi. Bidan melakukan perannya sebagai penolong dan pengajar dalam mempersiapkan ibu dan keluarganya pada masa postpartum. Bidan yang member perawatan postpartum di rumah melanjutkan perawatan berbagai entuk dan cara, misalnya konseling, support, pengajaran dan

perujukan yang didasarkan pada tambahan berkelanjutan kedalam data dasar. Beberapa data dapat mengindikasikan adanya situasi darurat dimana bidan harus segera bertindak dalam rangka menyelamatkan jiwa pasien.

- e. Rencana Asuhan Sesuai Kebutuhan. Suatu rencana asuhan diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan ibu dan keluarganya. Sedapat mungkin bidan melibatkan mereka semua dalam rencana dan mengatur prioritas serta pilihan mereka untuk setiap tindakan yang dilakukan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai disusun dengan ibu dan keluarga.

Tujuan yang ingin dicapai meliputi hal-hal berikut: (Saleha, 2013:78-79)

- 1) Ibu post partum akan mengalami pemulihan fisiologis tanpa komplikasi.
 - 2) Ibu post partum dapat menyebutkan pengetahuan dasar yang akurat mengenai cara menyusui yang efektif.
 - 3) Ibu postpartum mampu mendemonstrasikan perawatan yang tepat untuk diri dan bayinya.
 - 4) Orang tua akan mendemonstrasikan interaksi yang positif satu sama lain terhadap bayi dan anggota keluarga yang lain.
- f. Implementasi Langsung untuk Memenuhi Kebutuhan. Dapat dilakukan oleh bidan atau sebagian dilaksanakan oleh ibu sendiri, keluarga atau anggota kesehatan yang lain.
- g. Evaluasi Keefektifan Asuhan. Untuk bisa efektif, evaluasi didasarkan pada harapan pasien yang diidentifikasi saat merencanakan asuhan kebidanan. Bidan bisa

merasa cukup yakin bahwa asuhan yang diberikan cukup efektif, jika hasil akhir berkualitas bisa dicapai.

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning)

1. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi yang sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi suatu rencana asuhan.
2. Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan guna menyusun dokumentasi asuhan.
3. SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.

SUBJEKTIF

1. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.
2. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya)
3. Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda "0" atau "X".

OBJEKTIF

1. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik,
2. Hasil pemeriksaan laboatorium/ pemeriksaan diagnostic lain,
3. Informasi dari keluarga atau orang lain.

ASSESSMENT

1. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif.
2. Diagnostik/ masalah
3. Diagnosis/ masalah potensial
4. Antisipasi diagnosi/ maslah potensial/ tindakan segera.

PLANNING

Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E), meliputi: asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostic/laboratorium, konseling, dan tindak lanjut (follow up).

TABEL 1.3. Keterkaitan antara proses manajemen kebidanan dan pendokumentasian

Tujuh langkah dari Helen Varney	Lima Langkah Kompetensi Inti Bidan Indonesia	SOAP/Note/Progres Note
I. Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data	1. Subyektif 2. Obyektif
II. Identifikasi diagnosa/masalah aktual III. Antisipasi diagnosa/Msalah potensial IV. Menilai perlunya tindakan segera/konsultasi /rujukan	2. Identifikasi Diagnosa/masalah	3. Assesmant/Diagnosa
V. Pengembangan rencana asuhan VI. Implementasi Asuhan VII. Evaluasi efektifitas Asuhan	3. Membuat rencana tindakan 4. Implementasi 5. Evaluasi	4. Planning/Rencana Tindakan: (Dokumentasi implementasi) <ul style="list-style-type: none"> • Asuhan mandiri • Kolaborasi • Tes Diagnostik • Pendidikan/Konseling Follow Up

(Manguji, 2012).

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY."M" DENGAN
POST SEKSIO SESAREA (SC) HARI KE II
DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR
TANGGAL 12 JULI 2016

Tanggal Masuk Rumah Sakit : 10 Juli 2016, Pukul	18.30 Wita
Tanggal Operasi : 10 Juli 2016, Pukul	21.30 Wita
Tanggal Pengkajian : 12 Juli 2016, Pukul	09.30 Wita

Langkah I IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama	: Ny. "M"	/ TN."A"
Umur	: 28 Tahun	/ 30 tahun
Nikah / lamanya	: 1x	/ ± 6 tahun
Agama	: Islam	/ Islam
Suku	: Makassar	/ Makassar
Pendidikan	: SMA	/ SMA
Pekerjaan	: IRT	/ Swasta
Alamat	: Jl.Mesjid Raya LR.108 A NO.2	

B. DATA BIOLOGIS

1. Keluhan Utama

Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi seksio sesarea (SC)

2. Riwayat Keluhan

- a. Keluhan di rasakan setelah operasi sejak tanggal 10 Juli 2016 pukul 24.00 wita
- b. Sifat keluhan hilang timbul
- c. Lokasi keluhan di daerah abdomen bagian bawah (daerah bekas luka operasi seksio sesarea)
- d. ibu merasa cemas dengan keadaanya
- e. Upaya ibu untuk mengatasi keluhan yaitu dengan istirahat (berbaring dalam posisi terlentang)

C. RIWAYAT KESEHATAN YANG LALU

1. Ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi, jantung, DM, hepatitis maupun penyakit menular lainnya.
2. Ibu tidak pernah ada operasi sebelumnya.
3. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obatan dan Alkohol.
4. Tidak ada riwayat alergi

D. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA

Tidak ada penyakit menular dan turunan dalam keluarga

E. RIWAYAT REPRODUKSI

1. Riwayat haid

- a. Menarche : Umur 13 tahun
- b. Siklus Haid : 28-30 hari
- c. Lamanya : 3-5 hari
- d. Dismenorea : ada, setiap hari pertama sampai hari kedua haid

2. Riwaya Obstetri

- a. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang ketiga dan tidak pernah keguguran
- b. Menikah umur 22 tahun

3. Riwayat Gynekologi

- a. Ibu tidak pernah mengalami tumor kandungan atau tumor payudara sebelumnya.
- b. Ibu tidak pernah mengalami infeksi organ reproduksi.
- c. Ibu tidak pernah menderita penyakit kelamin.

4. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB pil sejak tahun 2014 selama \pm 8 bulan.

F. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Kebutuhan Nutrisi

Kebiasaan :

- a. Menu makan nasi dan lauk pauk
- b. Frekuensi makan 3 x sehari
- c. Nafsu makan baik
- d. Kebutuhan minum \pm 6-7 gelas /hari

Setelah operasi hari ke II :

- a. Menu makan nasi dan lauk pauk
- b. Frekuensi 3 x sehari
- c. Nafsu makan kurang baik
- d. Kebutuhan minum \pm 6–7 gelas / hari

G. Kebutuhan Eliminasi

Kebiasaan :

1. Frekuensi BAK 4–5 x sehari
2. Warna kuning jernih
3. Bau amoiak
4. Frekuensi BAB 1 kali sehari
5. Konsisten padat

Setelah operasi Hari ke II:

Kateter masih terpasang dengan jumlah urine \pm 250 ml didalam urine bag dan setelah keluar dari ruangan operasi sampai keruang nifas nyeri daerah operasi padaa saat duduk di toilet.

H. Personal Hygiene

Kebiasaan :

1. Mandi 2x sehari dengan menggunakan sabun mandi
2. Sikat gigi 2x sehari
3. Keramas 3x sehari
4. Mengganti pakaian tiap habis mandi

Setelah operasi hari ke II : Klien tidak dapat mandi sendiri

I. Kebutuhan istirahat / Tidur

Kebiasaan :

1. Tidur siang jam 13.00–15.00 WITA
2. Tidur malam jam 22.00–05.00 WITA

Setelah operasi hari ke II:

Klien dapat tidur apabila tidak nyeri pada daerah bekas luka operasi.

J. Riwayat ANC

1. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang ketiga dan tidak pernah keguguran
2. HPHT Tanggal 18-10-2015
3. TP Tanggal 25-07-2016
4. ANC Sebanyak 5x di tempat praktik dokter
5. Ibu mengkonsumsi tablet Fe sebanyak \pm 90 butir selama hamil
6. Imunisasi TT booster pada tanggal 10-01-2016

K. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Tahun	Kehamilan	Persalinan			Bayi			Nifas
		Jenis	Tempat	Penolong	Sex	BBL/PBL	Keadaan	
2011	Aterm	PBK	RSB	Bidan	L	2800 gram/48cm	Hidup	Normal
2013	Aterm	PBK	RSB	Bidan	P	3800 gram/49cm	Hidup	Normal
2016	Persalinan sekarang							

L. Riwayat Persalinan sekarang

1. Ibu masuk rumah sakit pukul 18.30 wita dengan rujukan dari dokter spesialis kebidanan diagnosa $G_{III} P_{II} A_0$ gravid aterm (37 minggu) rencana Seksio Sesarea (SC) adanya pengeluaran lendir dan darah pada tanggal 10 Juli 2016 sejak pukul 16.00 wita.
2. Ibu dioperasi Seksio Sesarea (SC) pada tanggal 10 Juli 2016 jam 21.30-22.30 wita dengan anastesi spinal, jenis kelamin perempuan, BBL 3400 gram, PB 49 cm, Apgar score 8/10.
3. Indikasi seksio sesarea (SC) Plasenta previa totalis dengan hasil USG tampak plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus.

M. Riwayat Psikologi, Spiritual dan Ekonomis

1. Klien menerima keadaanya dan setelah operasi ini klien berharap agar cepat sembuh
2. Ibu dapat beradaptasi dengan keadaan dan lingkungannya
3. Ibu menganggap kelahiran bayinya merupakan anugrah dari Tuhan
4. Suami dan Keluarga senantiasa berdo'a agar ibu dan bayi selamat
5. Biaya persalinan ditanggung oleh suami
6. Penghasilan suami dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

N. Pemeriksaan terfokus Post sectio caesar hari ke II

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis

3. TTV

TD : 110/70 mmHg

N : 78x/menit

P : 18x/menit

S : 37°C

4. Kepala

Inspeksi : kulit kepala bersih, rambut hitam dan bergelombang, tidak mudah dicabut.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, benjolan maupun massa.

5. Wajah

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, wajah nampak pucat dan meringis apabila menggerakkan badannya.

Palpas : tidak ada oedema dan nyeri tekan

6. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus.

7. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran pada kelenjar thyroid.

Palpasi : tidak ada pembengkakan kelenjar lymfe dan vena jugularis.

8. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hyperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak ada massa dan nyeri tekan, ada kolostrum bila dipencet

9. Abdomen

Inspeksi : tampak luka bekas operasi tertutup verban

Palpasi : terdapat nyeri tekan pada luka bekas operasi (perut bagian bawah, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari bawah pusat.

10. Genitalia

Inspeksi : terdapat pengeluaran lochia rubra tidak berbau, terpasang kateter tetap

Palpasi : tidak ada oedema dan kelenjar bartolini.

11. Anus

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varices

12. Eksteremitas

a. Atas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, terpasang infus RL 28 Tpm

Palpasi : tidak ada oedema

b. Bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : tidak ada oedema dan varices

O. Pemeriksaan Penujang

1. Pemeriksaan Laboratorium Pre Operasi Tanggal 10 Juli 2016

-Leucocyte : 11,44/mm³

-Erythrocyte : 2,49 jt/mm³

- Haemoglobi : 10,1 gr %
- Haemotokrit : 30,6 %
- Trombosit : Hct : 30,6 %
- HbSAg : –
- Gula darah : 100 mg/dL

2. Pemeriksaan laboratorium 2 Jam Post operasi tanggal 10 Juni 2016

HB = 10 gr %

P. Riwayat Terapi/ Pengobatan pada Post Seksio Sesarea Hari ke I

1. Infus RL 28 Tpm
2. Instruksi residen terapi injeksi lanjut :
 - Ranitidine 1 amp/ 8 jam/ IV
 - Cefoperazone 1 gr /12 jam / IV
 - Asam Traneksamat 500 mg / 8 jam / IV
 - Ketorolac 1 amp / 8 jam / IV
 - Transamin 1 amp / 8 jam / IV

Langkah II Identifikasi Masalah/ Diagnosa Aktual

Diagnosa : P_{III}A₀ Post Seksio hari II

Masalah aktual : Nyeri luka bekas seksio sesarea (SC)

1. Diagnosa

P_{III}A₀ Post Seksio Sesarea (SC) hari ke II

a. Data subjektif

- Ibu mengatakan dioperasi tanggal 10 Juli 2016 jam 21.30 Wita
- Ibu mengatakan masih merasakan nyeri luka setelah operasi
- Keluhan dirasakan sejak setelah operasi tanggal 10 Juli 2016 Pukul 24.00 wita.

b. Data objektif

- Keadaan umum ibu baik
- Kesadaran komposmentis
- TFU 2 jari bawah pusat
- Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- Tampak pengeluaran lochia rubra
- Pengkajian tanggal 12 Juli 2016 jam 09.30 Wita

c. Analisis dan Interpretasi Data

Seksio sesarea adalah proses persalinan dengan melalu pembedahan melalui perut ibu (laparotomi) dan rahim (histerektomi) untuk mengeluarkan bayi (Purwoastuti, Dkk, 2015).

Ibu mengatakan melahirkan tanggal 10 Juli 2016 jam 21.40 Wita dan pengkajian tanggal 12 Juli 2016 jam 09.30 Wita, dari tanggal melahirkan sampai tanggal pengkajian menunjukkan bahwa ibu dalam post seksio hari kedua.

Setelah janin dilahirkan, fundus uteri kira-kira setinggi pusat segera setelah lahir TFU \pm 1 jrbpst dan akan mengecil terus hingga 10 hari post partum (Ilmu kebidanan Sarwono Edisi III, Hal 236-237).

Lochia rubra (*cruenta*) berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekonium selama 2 hari pasca persalinan. Inilah lochia yang akan keluar selama dua sampai tiga hari post partum (Saleha, 2013).

Pasca persalinan kontraksi akan semakin baik karena adanya rangsangan dari payudara pada saat menyusui, sehingga hormone prolaktin akan mencegah terjadinya perdarahan (Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan, Hal 192).

2. Masalah Aktual

Diagnosis : P_{III}A₀ Post Seksio Sesarea (SC) hari ke II Dengan Nyeri Pada luka operasi

a. Data subjektif

- Ibu melahirkan tanggal 10 Juli 2016 dan ini merupakan anak yang ketiga
- Ibu mengatakan mendapat jahitan pada bagian perut
- Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi
- Ibu mengatakan sakitnya hilang timbul

b. Data objektif

- P_{III}A₀
- Bayi lahir tanggal 10 Juli 2016 pukul 21.40 wita
- Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak
- Tampak luka operasi tertutup kasa steril pada abdomen
- Tingkat nyeri sedang

c. Analisa dan interpretasi Data

Terputusnya kontinuitas jaringan akan melepaskan hormon vasilitator yang merangsang saraf perifer ke hipotalamus sehingga terjadi feedback ke dalam tubuh melalui saraf efferent sehingga dipersepsikan sebagai nyeri (Nunung, Dkk, 2013).

3. Kecemasan

a. Data subjektif

- Ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaan yang dialaminya
- Ibu sering menanyakan tentang keadaanya.

b. Data objektif

Ekspresi ibu tampak murung dan meringis bila ditekan pada daerah abdomen

c. Analisa dan interpretasi data

Kurangnya pengetahuan tentang keadaanya menyebabkan timbul rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi dapat mempengaruhi mekanisme coping dalam menghadapi konsinya sehingga cemas dipersepsikan.

LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya infeksi luka operasi

a. Data subjektif

- Ibu dioperasi tanggal 10 Juli 2016, jam 21.30 Wita
- Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi

b. Data objektif

- Tampak luka bekas operasi tertutup kain kasa
- Tanda-tanda Vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 78x/ menit

Pernafasan : 18x/ menit

Suhu : 37°C

c. Analisa dan interpretasi data

Adanya luka operasi merupakan pintu masuknya kuman pathogen dan menjadi tempat untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan infeksi (Sarwono Prawirohardjo, 2011).

LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukannya tindakan segera

LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Post seksio hari kedua

Masalah aktual : Nyeri luka operasi

Tujuan : Antisipasi terjadinya infeksi luka operasi

- a. Post operasi hari kedua berlangsung normal
- b. Nyeri luka bekas operasi berkurang atau teratasi
- c. Kecemasan teratasi
- d. Tidak terjadi infeksi luka bekas operasi
- e. Proses involusio uteri berjalan normal

f. Proses laktasi berjalan normal

Kriteria :

a. Keadaan umum ibu baik

b. Tanda-tanda vital dalam batas normal :

TD sistole = 110-130 mmHg

TD diastole = 70/90 mmHg

Nadi = 60-90x/menit

Pernapasan = 16-24x/menit

c. Tidak ada keluhan rasa nyeri

d. Ekspresi wajah ibu tidak meringis

e. Luka bekas operasi kering

f. Tidak ada tanda-tanda infeksi (bengkak, kemerahan, nyeri, panas, ada pus)

g. Proses involusio uteri berlangsung normal ditandai dengan :

1) Kontraksi uterus teraba keras dan bundar

2) Lokia : rubra tidak berbau

3) TFU : 2 jari bawah pusat (turun 1 cm setiap hari)

h. Proses laktasi berjalan normal

1) ASI lancar

2) Ibu menyusui sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan bayinya (secara ondemand)

3) Saat ibu menyusui Bayinya mengisap dan menelan dengan tenang

4) Payudara ibu terasa kosong saat selesai menyusui

Intervensi tanggal 12 Juli 2016 jam 09.40 Wita

1. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya

Rasional :

Untuk menciptakan jalinan yang baik antara ibu dengan petugas kesehatan.

2. Observasi Keadaan Umum ibu

Rasional :

Untuk mengetahui keadan umum ibu dan sebagai petunjuk untuk melakukan pemantauan dan perawatan selanjutnya.

3. Observasi Tanda-tanda vital

Rasional :

Untuk mengetahui keadaan umum ibu dan memudahkan mengambil tindakan selanjutnya.

4. Observasi TFU, kontraksi dan pengeluaran lochia

Rasional :

Sebagai indikator untuk menilai/mengetahui proses involusi berjalan normal atau tidak.

5. Melakukan perawatan payudara

Rasional :

Payudara yang bersih akan menciptakan suasana nyaman pada ibu sehingga membantu melancarkan ASI

6. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan mengandung protein, karbohidrat, vitamin A, C, D

Rasional : membantu dalam proses pemulihan ibu.

7. Menjelaskan ibu penyebab nyeri

Rasional :

Dengan memberi penjelasan pada ibu mengenai penyebab nyeri, maka ibu dapat mengerti dan beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan sehingga ibu mau bekerja sama dalam proses perawatannya.

8. Observasi tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

Rasional :

Tanda-tanda infeksi perlu diketahui secara dini untuk mencegah terjadinya komplikasi agar dapat mengetahui tindakan selanjutnya.

9. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Rasional :

Istirahat yang cukup memberikan kesempatan otot dan otak untuk relaksasi setelah mengalami proses operasi sehingga pemulihan tenaga serta stamina ibu dapat berlangsung dengan baik.

10. Berikan konseling tentang personal hygiene dan ajarkan pada ibu cara perawatan luka

Rasional :

Untuk memberikan rasa nyaman pada ibu dan untuk mencegah terjadinya infeksi.

11. Berikan konseling KB pada ibu Post Seksio Sesarea (SC)

Rasional :

Dengan cara menjarangkan kehamilan dan mengatur jumlah keluarga serta sebagai acuan dalam membantu klien memilih dan menentukan alat kontrasespsi yang dipakai.

12. Anjurkan ibu untuk menyusui secara ondemand sesuai kebutuhan bayi

Rasional :

Isapan bayi merangsang hipofisis posterior mengeluarkan oksitosin dan hipofisis anterior memproduksi prolaktin agar ASI keluar serta dengan adanya bayi menyusui sesering mungkin dapat membantu proses involusio.

13. Observasi pemberian cairan infus

Rasional :

Pemberian cairan infus mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya hipotermi, dehidrasi dan komplikasi pada organ-organ lainnya.

14. Observasi pengeluaran urin

Rasional : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh ibu, sebab kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada ibu.

15. Anjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur

Rasional :

Mobilisasi dapat melatih otot-otot abdomen sehingga terjadi peningkatan tonus otot, mempercepat proses penyembuhan, mencegah trombotis dan tromboemboli.

16. Gunakan teknik aseptik dan antiseptic dalam melakukan tindakan

Rasional :

Untuk mencegah agar tidak terkontaminasi kuman pathogen, baik dari ibu maupun petugas kesehatan.

17. Penatalaksanaan dosis pemberian terapi oral

Rasional : Cefadroxil 2x1, asmev 3x1, Nutribreast 3x1

Cefadroxil merupakan golongan antibiotik yang dapat membunuh jenis kuman penyebab infeksi, Asam mefenamat merupakan golongan analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri.

LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Tanggal 12 Juli 2016 jam 09.40 Wita

1. Mengucapkan selamat kepada ibu

Hasil : terlaksana dan ibu merasa bersyukur

2. Mengobservasi keadaan Umum ibu

Hasil :

Keadaan ibu masih sedikit nyeri pada daerah luka operasi ditandai bila bergerak wajah ibu meringis

3. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil :

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal ditandai dengan

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82x/menit

Pernapasan : 22x/menit

Suhu : 36,2° C

4. Mengobservasi TFU, kontraksi dan pengeluaran lochia

Hasil :

TFU : 2 jari bawah pusat

Kontraksi uterus : Baik (teraba bulat dan keras)

Lokia : Rubra tidak berbau

5. Melakukan perawatan payudara

Hasil : terlaksana dan payudara ibu tampak bersih

6. Menganjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan mengandung protein, karbohidrat, vitamin A, C, D

Hasil : ibu mengerti dan mau melaksanakannya

7. Menjelaskan ulang penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, dan serabut akibat dari rangsangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbulnya nyeri.

Hasil : ibu telah memahami keadaanya

8. Observasi tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

Hasil : verban tampak kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi

9. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil :

- g. Tidur siang 1-2 jam
- h. Tidur malam 7-8 jam

10. Memberikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah/ kotor.

Hasil : Ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melakukannya.

11. Memberikan konseling mengenai jenis KB pada ibu Post Seksio Sesarea (SC) yaitu:

- a. Mal : Mal merupakan metode yang dipakai dengan mengandalkan air susu ibu (ASI) selama 6 bulan penuh.
- b. Mini Pil : alat kontrasepsi oral yang dikonsumsi setiap hari 1x1 dapat digunakan 3 hari pasca persalinan dan sangat efektif bagi ibu menyusui.
- c. Suntik 3 Bulan : jenis kontrasepsi yang disuntikan ke dalam tubuh ibu yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu, suntikan pertama diberikan 6 minggu pada pasca persalinan.
- d. Implan/AKBK : alat kontrasepsi hormonal yang dipasang dibawah kulit pada daerah lengan atas.
- e. IUD/AKDR : alat kontrasepsi dalam rahim terbuat dari bahan plastik.

Hasil : ibu mengerti dan berencana memilih kontrasepsi implan.

12. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayi sesering mungkin dan sesuai dengan kebutuhan bayi

Hasil : ibu mengerti dan mau melaksanakannya

13. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer laktat 28 tetes permenit

Hasil : keadaan ibu merasa lebih baik

14. Observasi pengeluaran urine

Hasil : urine sebanyak 250 ml tertampung didalam urine bag.

15. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur

Hasil : ibu sudah bisa melakukan gerakan di tempat tidur dengan miring ke kiri dan ke kanan

16. Menggunakan teknik aseptik dan antiseptik dalam melakukan tindakan

Hasil : telah dilakukan tehnik aseptik dan antiseptik

17. Penatalaksanaan dosis pemberian terapi oral

Hasil : - Cefadroxil : 2×1

- Asam mefenamat : 3×1

- Nutribreast : 3×1

LANGKAH VII EVALUASI

Tanggal 12 Juli 2016, jam 09.50 Wita

1. Post seksio sesarea (SC) hari kedua berlangsung normal ditandai dengan :

- Keadaan umum ibu baik

- TTV dalam batas normal :

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 78×/menit

Pernafasan : 18×/menit

Suhu : 37°C

2. Ibu dapat beristirahat dengan tenang
3. Tinggi fundus Uteri 2 jari bawah pusat (Teraba keras dan bundar)
4. Nyeri berkurang, ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
5. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi (demam, merah, berranah, bengkak)
6. Proses involusio uteri berjalan normal
7. Proses laktasi berjalan lancar

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY."M"

DENGAN POST SEKSIO SESAREA (SC) HARI KE II

DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR

TANGGAL 12 JULI 2016

(SOAP)

Tgl. Masuk : 10 Juli 2016, Pukul 18.30 Wita
 Tgl. Operasi : 10 Juli 2016, Pukul 21.30 Wita
 Tgl. Pengkaji : 12 Juli 2016, Pukul 09.30 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny. "M" / TN."A"

Umur : 28 Tahun / 30 tahun

Nikah / lamanya : 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Swasta

Alamat : Jl.Mesjid Raya LR.108 A NO.2

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan dioperasi tanggal 10 Juli 2016, Pukul 21.30 Wita
2. Ibu mengatakan masih merasa nyeri pada daerah luka operasi bila bergerak

3. Ibu mengatakan ASI nya sudah ada tapi masih sedikit
4. Ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing
5. Ibu mengatakan sudah platus tapi belum BAB
6. Ibu tidak ada riwayat hipertensi, asma dan jantung
7. Ibu tidak alergi makanan maupun obat-obatan
8. Ibu dan keluarga sangat senang dengan kelahiran bayinya
9. Ibu pernah menggunakan jenis KB pil selama \pm 8 bulan

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tampak luka bekas operasi pada abdomen bagian bawah, luka masih basah
3. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak
4. Nyeri tekan pada daerah luka operasi
5. Kontraksi Uterus Baik (teraba keras dan bundar)
6. Tampak pengeluaran lochia rubra tidak berbau
7. ASI (+)
8. TFU 2 Jari bawah pusat
9. TTV : Tekanan darah : 110/70 mmHg
 Nadi : 78x/ menit
 Pernafasan : 18x/ menit
 Suhu : 37° C

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : P_{III} A₀ Post Seksio Sesarea (SC) hari ke II

Masalah aktual : Nyeri luka operasi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya infeksi luka Post seksio Sesarea(SC)

PLANNING (P)

Tanggal 12 Juli 2016, Pukul 09.40 Wita

1. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya

Hasil : ibu merasa bahagia dan dihargai

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil :

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 78×/ menit

Pernafasan : 18×/ menit

Suhu : 37°C

3. Mengobservasi Tinggi Fundus (TFU), kontraksi dan pengeluaran lochia

Hasil :

TFU : 2 Jari bawah pusat

Kontraksi uterus : Baik (Teraba keras dan bundar)

Lokia : Rubra tidak berbau

4. Melakukan perawatan payudara

Hasil : terlaksana dan ibu merasa nyaman

5. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan mengandung protein karbohidrat, protein, vitamin A, C, D.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan nya.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : tidur siang 1-2 jam, malam 7-8 jam dan ibu dapat beristirahat apabila rasa sakit berkurang.

7. Menjelaskan ibu penyebab yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, dan serabut akibat dari rangsangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.

Hasil : ibu mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan.

8. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

Hasil : tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka operasi.

9. Memberikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah/ kotor.

Hasil : Ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melakukan nya.

10. Melakukan perawatan payudara

Hasil : terlaksana dan payudara ibu tampak bersih

11. Memberikan konseling Keluarga Berencana (KB) apa yang cocok pada ibu pasca operasi yaitu: MAL(Metode Amenore Laktasi), KB Suntik 3 Bulan, Mini Pil, AKDR/Implan, AKDR/IUD

Hasil : ibu mengerti dan ingin menggunakan Kb implan.

12. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemand sesering mungkin sesuai kebutuhan bayi

Hasil : ibu mengerti dan mau melaksanakannya

13. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer laktat 28 tetes permenit

Hasil : keadaan ibu merasa lebih baik

14. Observasi pengeluaran urine

Hasil : urine sebanyak 250 ml tertampung didalam urine bag.

15. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur

Hasil : ibu sudah melakukan gerakan disekitar tempat tidur dengan miring ke kiri dan ke kanan

16. Menggunakan teknik aseptik dan antiseptic dalam melakukan tindakan

Hasil : telah dilakukan tehnik aseptik dan antiseptik

17. Penatalaksanaan dosis pemberian terapi oral

Hasil : Cefadroxil 2×1 , Asam mefenamat 3×1 , Nutribreast 3×1

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY."M"

DENGAN POST SEKSIO SESAREA (SC) HARI KE III

DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR

TANGGAL 13 JULI 2016

(SOAP)

Tgl. Masuk : 10 Juli 2016, Pukul 18.30 Wita
 Tgl. Operasi : 10 Juli 2016, Pukul 21.30 Wita
 Tgl. Pengkaji : 13 Juli 2016, Pukul 08.30 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny. "M" / TN."A"
 Umur : 28 Tahun / 30 tahun
 Nikah / lamanya : 1x / ± 6 tahun
 Agama : Islam / Islam
 Suku : Makassar / Makassar
 Pendidikan : SMA / SMA
 Pekerjaan : IRT / Swasta
 Alamat : Jl.Mesjid Raya LR.108 A NO.2

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu sudah miring kiri dan ke kanan
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan belum BAB

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi mulai kering
4. Nyeri tekan sudah berkurang
5. Masih ada pengeluaran bercak darah
6. Kateter sudah di aff dan BAK sudah lancar
7. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82×/menit

Pernafasan : 22×/menit

Suhu : 36,5° C

ASSESMENT (A)

Diagnosa : P_{III} A₀ Post Seksio Sesarea (SC) hari ke III

Masalah aktual : Nyeri luka Post seksio Sesarea (SC)

Masalah potensial : Potensial terjadi infeksi pada luka Post Seksio Sesarea (SC)

PLANNING (P)

Tanggal 13 Juni 2016, Pukul 08.40 Wita

1. Memberikan motivasi kepada ibu untuk memenuhi sendiri kebutuhannya

Hasil : ibu semangat dan mau melakukannya sendiri

2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil:

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82×/menit

Pernafasan : 22×/menit

Suhu : 36,5° C

3. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dalam proses penyembuhan

Hasil :

Ibu mengerti dan bersedia melaksanakannya.

4. Mengganti perban luka operasi pada ibu

Hasil : ibu bersedia digantikan perban lukanya.

5. Memberitahukan kepada ibu bahwa infusnya akan dibuka sesuai dengan instruksi dokter karena keadaan ibu sudah membaik

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk di aff.

6. Memberikan dukungan moril kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih

Hasil : ibu semangat dan merasa senang serta berterimakasih.

7. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan oral yaitu Asam mefenamat 500 gram, asam sulfat ferosus (SF) 3×1, Cefadroxil 2×1, Metronidazole 3×1, Dulcolax sp.

Hasil : ibu bersedia meminum obat yang telah diberikan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY."M"
DENGAN POST SEKSIO SESREA (SC) HARI KE IV
DI RSKDI DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR
TANGGAL 14 JULI 2016**

(SOAP)

Tgl. Masuk : 10 Juli 2016, Pukul 18.30 Wita
Tgl. Operasi : 10 Juli 2016, Pukul 21.30 Wita
Tgl. Pengkaji : 14 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny. "M" / TN."A"

Umur : 28 Tahun / 30 tahun

Nikah / lamanya : 1x / ± 6 tahun

Agama : Islam / Islam

Suku : Makassar / Makassar

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Swasta

Alamat : Jl.Mesjid Raya LR.108 A NO.2

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Sudah bisa duduk dan berjalan disekitar tempat tidur
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan sudah BAB

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi mulai kering
4. Nyeri tekan sudah berkurang
5. Pengeluaran bercak darah sedikit
6. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,8° C

ASSESMENT (A)

Diagnosa : P_{III} A₀ Post Seksio Caessar (SC) hari ke IV

Masalah aktual : nyeri luka Post Seksio Sesarea (SC)

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya infeksi Post Seksio Sesarea (SC)

PLANNING (P)

Tanggal 14 Juli 2016, pukul 09.10 Wita

1. Memberikan motivasi pada ibu untuk memenuhi sendiri kebutuhannya

Hasil :ibu bersedia melakukan nya.

2. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dalam proses penyembuhan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan nya.

3. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82×/menit

Pernafasan : 22×/menit

Suhu : 36,8°C

4. Mengganti perban luka operasi pada ibu

Hasil : ibu bersedia untuk digantikan perban lukanya dengan menggunakan verban offsit

5. Memberikan dukungan moril kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dengan keadaan nya

Hasil : ibu senang dan berterimakasih

6. Memberikan konseling pada ibu sebelum pulang mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Hindari aktifitas berat

Pada masa-masa pemulihan patut dihindari, karena pada aktifitas berat dapat memungkinkan terjadinya perdarahan pada daerah luka serta meningkatkan kemungkinan luka terbuka.

b. Hindari pakaian ketat

Menggunakan pakaian ketat akan menekan bekas sayatan sehingga sirkulasi darah ke daerah luka menjadi tidak lancar.

c. Merawat luka jahitan dirumah dengan cara

- bersihkan kedua tangan, gunakan sarung tangan yang bersih dan steril
- bersihkan luka dengan menggunakan kasa steril dan cairan seperti NaCl
- ganti perban sesering mungkin yang ibu bisa
- oleskan sedikit salep antibiotik jika diperlukan dari anjuran dokter
- tutup kembali luka menggunakan sofratule (perban yang dibungkus dan tahan air sehingga luka tidak basah).


Hasil : ibu sudah memahami mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang ke rumah sakit yaitu 7 hari setelah operasi caesar untuk memantau keadaan luka jahitan

Hasil : ibu bersedia untuk datang kembali kerumah sakit pada jadwal yang telah diberikan

8. Ibu dianjurkan untuk pulang, keadaan umum ibu baik, pemberian obat-obatan dilanjutkan di rumah seperti Asam mefenamat 500 gram, Asam sulfatferosus (SF) 1×1, Cefadroxil 2×1, Metronidazole 3×1

Hasil : ibu merasa senang dan bersedia mengkonsumsi obat yang dianjurkan.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny."M" dengan Post Seksio Sesarea (SC) hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar, Pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2016. Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis akan membahas berdasarkan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah Varney dengan uraian sebagai berikut :

1. Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psokosial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi serta pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan da dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Menurut teori yang ada bahwa Seksio Sesarea (SC) dilakukan apabila ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko

kepada ibu maupun janin, dengan melalui pembedahan irisan dilakukan melalui perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerektomi).

Berdasarkan studi kasus pada Ny."M" Post Seksio hari kedua ditemukan data ibu dioperasi Seksio Sesarea (SC) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal akibat adanya plasenta previa totalis yang menutupi jalan lahir Sehingga harus melakukan tindakan operasi sesar, apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

2. Identifikasi Diagnosa/Masala aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Pada tinjauan pustaka dikatakan bahwa adanya luka operasi menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan sehingga rangsangan pada saraf meningkat, impuls nyeri disebabkan ke korteks cerebri sehingga nyeri dipersepsikan. Sedangkan pada studi kasus pada Ny."M" ditemukan kontraksi uterus teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra, TFU 2 jari bawah pusat, dan nyeri yang dirasakan ibu pada daerah abdomen saat bergerak sehingga ditegakkan diagnosa Masa Nifas dengan Post Seksio Sesarea (SC) Hari ke II.

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny”M” secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu nyeri pada daerah bekas Seksio Sesarea (SC), sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa keadaan nyeri luka operasi kemungkinan dapat terjadi infeksi apabila tidak ditangani dengan baik.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny”M” dilahan praktek dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu terjadi infeksi. Dengan demikian penerapan tinjauan dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny”M” nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

4. Tindakan Segera/Kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada Post Seksio caessar (SC) hari ke II tindakan segera dilakukan apabila ada perdarahan Post Seksio Sesarea (SC), tetapi pada studi kasus Ny”M” dengan Post Seksio Sesarea (SC), tidak ditemukan indikasi untuk melakukan tindakan segera atau kolaborasi mengingat keadaan pada saat

pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan tidak dalam keadaan darurat atau bahaya. Dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus dilahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Pada studi kasus Ny[”]M[”] dengan Post Seksio Sesarea (SC) hari ke II, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu istirahat yang cukup, anjurkan ibu makan-maksan yang bergizi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, berikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah/kotor, jelaskan penyebab nyeri, anjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, lakukan perawatan payudara, observasi keadaan luka, observasi pemberian infus, observasi kandung kemih dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan, pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada pada Ny[”]M[”].

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi

dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada studi kasus Ny”M” dengan Post Seksio Sesarea (SC) hari ke II, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang nifas di RSKDIA Pertiwi Makassar.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi : luka insisi/operasi kering, nyeri pada daerah bekas operasi berkurang, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, nyeri, dan panas.

Berdasarkan studi kasus Ny”M” Post Seksio Sesarea (SC) tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny”M” secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny”M” dengan Post seksio caessar (SC) hari kedua DI RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis data Ibu Post Partum Pada Ny”M” Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil ditemukan data bahwa ibu telah dioperasi Seksio Sesarea (SC) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal akibat adanya plasenta previa yang menutupi jalan lahir.
2. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Ibu Post Partum Pada Ny”M” Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu dapat menimbulkan nyeri pada daerah bekas Seksio Sesarea (SC).
3. Merumuskan diagnosa/masalah potensial Ibu Post Partum Pada Ny”M” Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu keadaan nyeri pada luka operasi memungkinkan terjadinya infeksi apabila tidak ditangani dengan baik.
4. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi Ibu Post Partum Pada Ny”M” Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II RSKDIA Pertiwi Makassar

dengan hasil yaitu tidak dilakukan tindakan segera mengingat keadaan pasien pada saat pelaksanaan manajemen tidak dalam keadaan darurat atau bahaya.

5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil penulis merencanakan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial.
6. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ibu Post Partum Pada Ny”M“ Post Seksio Sesarea (SC) Hari Ke II di RSKDIA Pertiwi Makassar dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.

B. Saran

1. Bagi ibu (Klien)
 - a. Diharapkan pada setiap ibu Post Seksio Sesarea (SC) agar senantiasa menjaga kebersihan diri terutama pada daerah bekas operasi agar luka tidak terkena kotoran untuk mencegah timbulnya infeksi.
 - b. Diharapkan kepada ibu agar mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayuran hijau, lauk-pauk dan buah, dengan memperhatikan makanan yang bergizi agar ibu sehat sehingga akan membantu luka cepat kering dan sembuh.

- c. Diperlukan keterlibatan suami / keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara ibu dan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.

2. Untuk bidan

- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan sangat berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan memberikan konseling ANC untuk mempersiapkan persalinan dan kemungkinan komplikasi.
- b. Sebagai bidan diharapkan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- c. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara petugas profesional lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) agar proses berjalan dengan mudah.
- d. Sebagai tenaga bidan yang profesional dan muslimah harus dapat memberikan dukungan motivasi serta banyak berdoa selama proses persalinan berlangsung.
- e. Perlunya bukti pertanggung jawaban petugas kesehatan terhadap semua asuhan yang diberikan maka setiap tindakan yang dilakukan harus didokumentasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson, Ralph C dan Martin L Pernold. *Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta:EGC, 2013.
- Data SDKI 2012. *Angka kematian ibu melonjak*. nasional.sindownes.com. Diakses tanggal 3 februari 2016.
- Fauziah, Yulia. *Obstetri Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Fadlun dan Feryanto Achmad. *Asuhan kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Gant, Norman F dan F Gary Cunningham. *Dasar-Dasar Ginekologi & Obstetri*. Jakarta: EGC, 2011.
- Heryani, Reni. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Menyusui*. Jakarta Timur: CV Trans Info Media, 2012.
- Herbold, Nancie Edelstein, Sari. *Buku Saku Nutrisi*. EGC:2011
- Ibrahim Hasbih. *Analisis Pelaksanaan Standar Terhadap Penyakit Infeksi Nosokomial*. Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Ikhwa. 2014. <https://ikhwamedia.wordpress.com>. *Tafsir-doa-surah-al-ahqoof-ayat-15/*.=fhaljq. Diakses tanggal 5 februari 2016.
- Ikhtiarinawati F, Fitriana dan Dwi Ns, Lilis. 2012. *Jurnal Midpro*, edisi 2/2012. *Perbedaan Penurunan Tinggi Fundus Uteri Berdasarkan Jenis Persalinan Pada Ibu Nifas Fisiologi Dan Post Sectio Caesarea*. *Jurnal Midpro*, edisi 2/2012. <http://journal.unisla.ac.id/pdf/19512013/3.%20perbedaan%20penurunan%20tinggi%20fundus%20uteri.pdf>. Diakses tanggal 3 Februari 2016.
- Lestari, indryani Maya dan Misbah Nurul. 2014. *Hubungan Antara Paritas dan Umur Ibu Dengan Kejadian Plasenta Previa*. Volume.2. No.2. Banten: Jurnal Obstetika Scientia . <http://ejurnal.latansamishiro.ac.id/index.php/OBS/article/download/127/12>. Diakses tanggal 5 februari 2016.
- Manguji, Betty. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC, 2012.
- Maritalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

- Nugroho, Taufan. *Buku Ajar Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Rukiyah, Aiyyeyeh dan Dkk. *Asuhan Kebidanan III (Nifas)*. Jakarta: CV.Trans Info Media, 2011.
- Rahmawati Nur, Eni. *Ilmu Praktis Kebidanan*. Surabaya: Victory Inti Cipta, 2011.
- Saleha, Sitti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol.13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan kehamilan*. Makassar:Alauddin university Press, 2013.
- Solikhah, Umi. *Asuhan Keperawatan Gangguan Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Purwoastuti, Endang, dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukarni, Icesmi. *Patologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Neonatus Resiko Tinggi*. Yogyakarta:Nuha Medika, 2014.
- Syahriar, Alfa. *Kupas Tuntas Darah Kebiasaan Wanita*. Solo: Zam-zam, 2012.
- Runiari, Nengah. Dkk. 2014. *Usia Dan Paritas Dengan Plasenta Previa Pada Ibu Bersalin*.<http://poltekkesdenpasar.ac.id/files/JURNAL%20GEMA%20KEPERAWATAN/JUNI%202014/Nengah%20Runiari,%20dkk.pdf>. Diakses Tanggal 3 Februari 2016.
- Veibymiaty, Dkk. 2014. *Faktor-faktor yang berperan meningkatnya angka kejadian SectioCaesarea*.volume2.No.1.Manado.<http://ejournal.unsrat.ac.id/indeks.php/jkp/article/viewFile/4052/3568>. Diakses tanggal 5 Juni 2016.
- Wulandari, Setyo Retno. *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*. Jakarta : Gosyen Publishing, 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PEMILIK

Nama : Hardiana
Nim : 70400113021
T.T.L : BONE, 14 FEBRUARI 1995
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Kajuara, Kab.Bone
Nama Orang Tua : a. Ayah : Haberin
b. Ibu : Naima

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2009 SD Neg.266 Gona, Kab.Bone
2. Tahun 2009-2011 SMP Neg.1 Kajuara, Kab.Bone
3. Tahun 2011-2013 SMK Neg.2 Sinjai Utara
4. Mengikuti pendidikan D3 Kebidanan UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2013 sampai 2016