

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI ETIL ASETAT KORTEKS KAYU
JATI (*Tectona grandis* L.F.) TERHADAP BEBERAPA BAKTERI UJI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
M.REZA HARSAL
NIM. 70100112042

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.REZA HARSAL
NIM : 70100112042
Tempat/TanggalLahir : Enrekang, 18 September 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Pa'bentengan lorong 2 no.25 A. Alauddin II
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Korteks Kayu
Jati (*Tectona grandis* L.F.) Terhadap Beberapa Bakteri Uji

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M.REZA HARSAL
NIM. 70100112042
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antimikroba Fraksi Etil Asetat Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) Terhadap Beberapa Mikroba Uji” yang disusun oleh M.Reza Harsal, NIM : 70100112042, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis 24 november 2016 M yang bertepatan dengan 24 shafar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar 24 November 2016 M
24 shafar 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Haeiria, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) Terhadap Beberapa Bakteri Uji” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dengan selesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda yaitu Andi dan Ibunda Hasmia beserta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu

mendukung baik dari segi materi maupun non materi, yang selalu memberikan nasehat, kritik, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Juga selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

8. Andi Armisman Edy Paturusi, S,Farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
9. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
10. Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.Ag selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
11. Syamsuri Sakri, S.Farm., M.Si., Apt. pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggaranya ujian akhir.
12. Bapak/Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
13. Teman-teman angkatan 2012 “Isohidris” yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini. Kakanda angkatan 2005-2011 dan adinda angkatan 2013-2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah subhānahu wata’āla. Amin.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Makassar, November 2016

Penyusun

M.REZA HARSAL
()



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1. Batasan masalah.....	3
2. Defenisi operasional.....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5

F. Kajian Pustaka.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Uraian Tanaman.....	7
1. Klasifikasi Tanaman.....	7
2. Morfologi.....	7
3. Nama Daerah.....	8
4. Kandungan Kimia.....	8
5. Khasiat.....	8
B. Uraian Bakteri Uji.....	9
1. <i>Escherichia coli</i>	9
2. <i>Bacillus subtilis</i>	10
3. <i>Pseudomonas aerigenosa</i>	10
4. <i>Stapylococcus aureus</i>	11
5. <i>Staphylococcus epidermidis</i>	12
6. <i>Streptococcus mutans</i>	13
7. <i>Salmonella thypi</i>	14
8. <i>Vibrio sp</i>	14
C. Metode Penyarian (Ekstraksi) Bahan Alam.....	15
1. Ekstraksi.....	15
2. Fraksinasi.....	19
3. Identifikasi.....	20

D. Kromatografi Cair Vakum	20
E. KLT Bioautografi	21
F. Media.....	23
G. Antibakteri.....	24
1. Antimikroba Yang Menghambat Sintesis Dinding Sel Mikroba.....	24
2. Antimikroba Yang Menghambat Fungsi Membran Sel Mikroba.....	25
3. Antimikroba Yang Menghambat Sintesis Protein	25
4. Antimikroba Yang Menghambat Sintesis asam nukleat	25
H. Uji Aktivitas Antibakteri.....	25
1. Dilusi Cair Dan Dilusi Padat	25
2. Metode Difusi.....	26
I. Pengujian Secara KLT Bioautografi.....	27
J. Tijakan Islam.....	27
1. Pentingnya Kesehatan Dalam Islam.....	27
2. Penyakit dan Obatnya.....	29
3. Manfaat Tumbuh-Tumbuhan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sampel.....	33

D. Instrumen Penelitian.....	33
1. Alat.....	33
2. Bahan.....	34
E. Prosedur Kerja.....	34
1. Penyiapan Sampel.....	34
2. Ekstraksi Korteks Kayu Jati.....	34
3. Fraksinasi Komponen Kimia.....	34
4. Identifikasi Komponen Kimia.....	35
5. Persiapan Bakteri Uji.....	36
6. Pengujian Fraksi Aktif dengan Metode KLT Bioautografi.....	36
7. Cara pembuatan Konsentrasi Fraksi Aktif Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F.</i>).....	37
8. Pengujian KHM dan KBM Antibakteri Fraksi Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F.</i>) dengan Metode Difusi.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Hasil Ekstraksi Korteks Kayu Jati.....	39
2. Hasil Pemisahan Senyawa Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT).....	39
3. Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat Korteks Kayu Jati Melalui Kromatografi Cair Vakum (KCV).....	40

4. Hasil Uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Kimia Fraksi Korteks Kayu Jati.....	41
5. Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi Korteks Kayu Jati.....	42
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
KEPUSTAKAAN.....	53
LAMPIRAN.....	57
DOKUMENTASI.....	62
BIOGRAFI.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Ekstraksi Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>)	39
2. Hasil Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>)...	39
3. Hasil Profil KLT Fraksi Etil Asetat Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>).....	40
4. Hasil Uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Kimia Fraksi Etil Asetat Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>)	41
5. Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi 1 Etil Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>).....	42
6. Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi 2 Etil Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>).....	43
7. Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi 3 Etil Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis L.F</i>).....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tumbuhan Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F)	7
2. Tumbuhan Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F)	62
3. Preparasi Sampel Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	62
4. Proses Refluks Sampel Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	62
5. Ekstrak Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	63
6. Hasil Identifikasi Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	63
7. Proses Fraksinasi Ekstrak Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	64
8. Hasil Identifikasi Profil KLT Fraksi Gabungan Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	65
9. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi Gabungan Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F)	67
10. Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi Gabungan Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.).....	69
11. Hasil Identifikasi Komponen Kimia Fraksi Aktif Korteks Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i> L.F.)	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Ekstraksi korteks kayu jati (<i>Tectona grandis L.F.</i>)	57
2. Skema Kerja Fraksinasi dengan Metode KCV	58
3. Skema Kerja KLT-Bioautografi	59
4. Skema Kerja Potensi Antimikroba	60
5. Skema Kerja Identifikasi Komponen Kimia	61
6. Dokumentasi Penelitian	62



ABSTRAK

Nama Penulis : M. Reza Harsal
NIM : 70100112042
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) Terhadap Beberapa Bakteri Uji.

Telah dilakukan penelitian uji aktivitas antibakteri fraksi korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) terhadap beberapa mikroba uji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek, konsentrasi dan golongan senyawa dari fraksi korteks kayu jati yang memberikan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri uji. Korteks kayu jati diekstraksi dengan metode refluks menggunakan pelarut etil asetat. Ekstrak aktif kemudian diidentifikasi profil KLT dengan eluen n-heksan : etil asetat (3:1), selanjutnya difraksinasi menggunakan KCV. Hasil fraksi kemudian diuji aktivitas antimikroba secara KLT-Bioautografi dilanjutkan dengan uji potensi antimikroba dan diidentifikasi bercak melalui penyemprotan dengan pereaksi warna untuk mengetahui kandungan senyawa aktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi gabungan I, II, dan III pada uji KLT-Bioautografi memiliki aktivitas antimikroba pada *Escheria coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp*, dengan nilai Rf 0,14; 0,28; 0,57; dan 0,64 serta hasil uji potensi antimikroba konsentrasi 1000 ppm dan 750 ppm menunjukkan hambatan pada semua mikroba uji dan menunjukkan adanya kandungan senyawa steroid, terpenoid, flavonoid, dan fenol.

Kata kunci: Refluks, Antibakteri, *Tectona grandis* L.F., Uji Aktivitas Antibakteri

ABSTRACT

Author Name : M. Reza Harsal
NIM : 70100112042
Thesis title : Antibacterial Activity Test Cortex Fraction of Teak (*Tectona grandis* L.F.) Against some Microbes

Antibacterial activity test cortex fraction of teak (*Tectona grandis* L.F.) against some microbes has been studied. This study aims to determine the effect, and the concentration of the compound of the cortex fraction of teak provide antibacterial activity against several bacterial test. The cortex teak extracted by reflux method using ethyl acetate solvent. Active extract was then identified profiles TLC with eluent n-hexane: ethyl acetate (3: 1), subsequently fractionated using VLC. Results fraction is then tested the antimicrobial activity of the TLC-Bioautografi continued with antimicrobial potency test and identified spots by spraying with a color reagent to determine the content of the active compound.

The results showed that the fraction of the combined I, II, and III in the TLC test-Bioautografi antimicrobial activity on *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp*, with a value of Rf 0,14; 0,28; 0,57; and 0,64, and the results of antimicrobial potency test concentration of 1000 ppm and 750 ppm showed a drag on all the microbes and shows that it contains steroidal compounds, terpenoids, flavonoids, and phenols.

Keywords: Reflux, antibacterials, *Tectona grandis* L.F., Antibacterial Activity Test

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan tanahnya subur sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Di antara berbagai jenis tersebut beberapa jenis tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat. Berdasarkan penggunaan tradisional dan berbagai penelitian ilmiah, tanaman tersebut memiliki berbagai efek farmakologis dan bioaktivasi penting mulai dari potensi sebagai agen anti penyakit infeksi sampai penyakit degeneratif. Obat tradisional umumnya lebih mudah pembuatannya dan umumnya tanaman obat banyak tersebar di sekitar lingkungan kita, sehingga masyarakat dapat menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan. Indonesia sangat kaya dengan tumbuhan obat yang dimanfaatkan untuk obat tradisional dan telah lama digunakan secara empiris yang memberi manfaat dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan pengobatan berbagai penyakit. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat memanfaatkan tumbuhan menjadi obat tradisional untuk menanggulangi berbagai macam penyakit. Penelitian mengenai obat tradisional pun telah banyak digunakan untuk memberi bukti ilmiah mengenai khasiat tanaman tersebut (Aristiani, Astuti, 2005).

Tumbuhan yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat adalah tumbuhan jati. Tumbuhan jati secara empiris banyak digunakan sebagai obat kolesterol, obat kegemukan, borok, dan radang tenggorokan sedangkan menurut literatur bunga jati dapat digunakan sebagai obat bronkitis, melancarkan serta membersihkan kantung kemih. Bagian buah jati dapat digunakan sebagai obat diuretik. Adapun ekstrak daunnya dapat menghambat kerja bakteri tuberkolosa

(Sumarna Y 2015 : 8) Bagian kulit batangnya juga digunakan untuk menyembuhkan bronkitis. (Trubus. vol; 11).

Pada penelitian antimikroba dengan menggunakan bagian daun jati pengujiannya telah sampai pada tahap fraksinasi dan memberikan hasil yang cukup baik dalam menghambat pertumbuhan beberapa mikroba. Kemudian perlu dilakukan penelitian pada bagian lain dari tumbuhan jati untuk mengetahui golongan senyawa antibakteri yang terdapat dalam korteks kayu jati, mengingat ketersediaan daun jati sangat sulit didapatkan saat musim kemarau karena daun jati memiliki waktu tumbuh yang dipengaruhi oleh musim, selain itu pentingnya senyawa antibakteri yang baru karena banyak bakteri yang telah resistensi terhadap antibiotik sekarang ini disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai.

Adanya penggunaan kulit kayu jati sebagai pengobatan bronkitis, borok dan radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri maka kortek (kulit kayu) jati diduga mengandung senyawa kimia yang berkhasiat sebagai antibakteri. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ferdi Angriawan Muchlis melaporkan bahwa ekstrak larut etil asetat korteks kayu jati memiliki daya antibakteri yang sangat baik terhadap bakteri *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio colera*.

Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan golongan senyawa antibakteri yang baru, karena telah banyak bakteri yang resisten terhadap antibiotik akibat dari penggunaan antibiotik di masyarakat yang tidak rasional.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah:

1. Apakah fraksi Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) dapat memberikan daya hambat terhadap beberapa bakteri uji.
2. Berapa konsentrasi fraksi Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) yang memberikan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri uji.
3. Apakah golongan senyawa dari fraksi korteks jati (*Tectona grandis* L.F.) yang memberikan aktivitas antibakteri ?
4. Bagaimana sifat senyawa yang terkandung dalam Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) pada uji KBM dan KHM ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Batasan Masalah

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekstrak Korteks Kayu Jati yang diambil dari Kampus II UIN Alauddin Makassar, bakteri uji yang digunakan adalah bakteri uji yang merupakan biakan murni Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

2. Defenisi Operasional

- a. Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair, dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai,
- b. Fraksinasi adalah metode pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya.

c. Daya antimikroba adalah kemampuan suatu zat untuk menghambat atau mencegah pertumbuhan atau metabolisme mikroba.

d. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme bakteri yang merugikan,

e. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membunuh mikroba jenis lain.

f. Zona hambat yaitu daerah berbentuk lingkaran bening pada medium yang tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme akibat pengaruh antimikroba yang diberikan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian yaitu laboratorium Fitokimia dan Mikrobiologi Farmasi UIN Alauddin Makassar

2. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan kurang lebih selama 30 hari.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari fraksi ekstrak korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) terhadap bakteri uji.

Untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) yang memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji.

Untuk mengetahui golongan senyawa dari fraksi korteks jati (*Tectona grandis* L.F.) yang memberikan aktivitas antibakteri.

Untuk mengetahui sifat senyawa yang terkandung dalam Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) pada uji KBM dan KHM ?

2. Kegunaan Penelitian

Diperoleh hasil fraksi korteks kayu jati sebagai penghambat pertumbuhan bakteri yang dikembangkan menjadi sediaan obat antibakteri dari fraksi korteks kayu jati yang dapat digunakan oleh masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian aktifitas farmakologi terhadap jati, telah melaporkan bahwa jati mempunyai efek farmakologi sebagai antitukak, antianemia, antibakteri dan menyembuhkan luka (Goswami, dkk, 2009).

Penelitian lain juga melaporkan bahwa jati mempunyai aktifitas yaitu mengobati pilek, sakit kepala, laksatif, sedatif, bronkitis, diuretik, anti diabetes, kudis, analgetik, dan anti inflamasi (Nayeem, and Karverkar, 2010; Ghaisas, dkk., 2009; Diallo, dkk., 2008).

Selain itu juga telah dilakukan uji aktifitas sitotoksik dari ekstrak petrol akar kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) yang menunjukkan aktifitas sitotoksik yang tinggi dengan menggunakan Metoda Brine Shrimp Lethality Bioassay dengan Lc50 5 ppm (Sandermann and Simatupang, 1966).

Pemeriksaan fitokimia ekstrak etanol daun jati (*Tectona grandis* L.F.) Verbenaceae, menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, saponin, tanin galat, tanin katekat, kuinon, dan steroid/triterpenoid (Hartati, dkk., 2005).

Yohanes A., dkk (2012), uji sitotoksik ekstrak dan fraksi daun jati (*Tectona grandis* L.F.) dengan Metoda Brine Shrimp Letthality Bioassay. Menunjukkan Ekstrak daun jati (LC50) 16,58 ppm lebih toksik dibanding fraksi-fraksinya (LC50 fraksi *n*-heksana 21,83 ppm, fraksi etil asetat 21,31 ppm fraksi sisa 21,27 ppm). Tidak terdapat perbedaan toksisitas yang nyata antara masing-masing fraksi daun jati dengan rentang LC50 (18,04-24,71 ppm).

Ferdi angriawan muchlis, Uji aktivitas antibakteri korteks jati (*Tectona grandis* L.F.) terhadap beberapa bakteri, dalam penelitian ini diketahui bahwa ekstrak korteks jati (*Tectona grandis* L.F.) mengandung senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri.

Berdasarkan uraian di atas maka hal ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui golongan senyawa antibakteri yang terkandung dalam korteks. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ilmiah Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Korteks Jati (*Tectona grandis* L.F.) Terhadap Beberapa Bakteri Uji. dilakukan untuk membuktikan apakah kandungan korteks jati memiliki efek aktivitas antibakteri dan golongan senyawa antibakteri yang terkandung dalam korteks jati sehingga penggunaannya dalam masyarakat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Mengingat pemanfaatan kulit jati yang beragam dimasyarakat dan masih berdasarkan pengalaman yang turun temurun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan Jati (*Tectona grandis* L.F.)

1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub Kelas	: Magnoliidae
Bangsa	: Verbenales
Suku	: Verbenaceae
Marga	: Tectona
Jenis	: <i>Tectona grandis</i> L.F. (Backer. C.A V brink R.C.B, 1968: 85-594, Sutrisno B, 1998 : 9 - 234).



Gambar 1. Tumbuhan Jati (*Tectona grandis* L.F.).

2. Morfologi

Pohon, tinggi A 25 m. Batang : tegak, berkayu, bulat, permukaan kasar, percabangan simpodial, coklat muda. Daun : tunggal, lonjong, tersebar, panjang 30-50 cm, lebar 30-40 cm, tepi rata, ujung runcing, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, kasar, hijau pucat. Bunga: majemuk, tersusun dalam anak payung, di ujung batang, tangkai silindris, panjang 11-14 cm, berbulu coklat, kelopak bentuk lonceng, coklat, benang sari panjang 0,5-1 cm, putih, putik panjang \pm 0,5 cm, hijau pucat, mahkota bentuk bintang, permukaan halus, putih Buah : kotak, lonjong, masih muda hijau setelah tua coklat. Biji: bulat, berbulu, diameter \pm 1 cm, masih muda hijau setelah tua kuning muda. Akar : tunggang, putih kotor (Sumarna.Y. 2015: 13)

3. Nama Daerah

Jati (Makasar), Jati (Manado), Jati (Palu), Jati (Mamuju), Jati (Kendari), Dodolan (Sunda), Jati, Jatos, Deleg (Jawa), (Heyne.K, 1987 : 1671).

4. Kandungan Kimia

Batangnya mengandung antraquinon, senyawa naptalain, triterpenoid, daun jati mengandung quinon dan kayunya mengandung tanin 7,14%, bunga jati menghasilkan minyak yang mengandung asam lenoleat (54%) dengan laurit, maristat, palmitat, stearat, oleik, linoleat, asam asaridi dan 44,5% minyak lemak (Khare.C.P, 2007 :649-650).

5. Khasiat

Kayu jati yang diremas-remas halus dengan air dapat digunakan sebagai obat radang. Air seduhan dari daunnya, diminum seperti teh dapat digunakan sebagai obat kolera (Heyne.K, 1987 :1672-1973).

Bunga jati dapat digunakan sebagai obat bronchitis dan melancarkan serta membersihkan kantung kencing. Bagian buah dan benih jati dapat digunakan sebagai obat diuretik. Adapun ekstrak daunnya dapat menghambat kerja bakteri tuberkolosa (Sumarna. Y, 2015:8). Bagian kulit batangnya juga digunakan untuk menyembuhkan bronchitis (Trubus, vol: 11).

B. Uraian Bakteri Uji

1. *Escherichia coli*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilbum, 2004 : 24-114)

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Enterobacteriales
 Suku : Enterobacteriaceae
 Marga : *Escherichia*
 Jenis : *Escherichia coli*

- b. Sifat dan Morfologi

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1 - 1,5 gm x 2,0 - 6,0 pm, motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrien sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 949)

Escherichia coli merupakan bakteri anaerob dan mampu memfermentasi semua karbohidrat. Biasanya *E. coli* Menyerang organ-organ tratus digestivus manusia maupun binatang dan menyebabkan infeksi pada traktus urinarius,

menyebabkan meningitis pada bayi prematur dan neonatal. Strain entero patogenik dari *E. coli* adalah sering menyebabkan diare akut pada anak-anak di bawah dua tahun (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 949)

2. *Bacillus subtilis*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn. 2004 :24-172)

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Bacillaceae
 Marga : Bacillus
 Jenis : *Bacillus subtilis*

- b. Sifat dan morfologi.

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 -2,2 pm x 1,27-7,0 pm. Sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora, tidak lebih dari satu dalam sel sporangium. Kemoorganotrof, metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 947).

3. *Pseudomonas aeruginosa*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 2004 ; 24-95)

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Pseudomonadales
 Suku : Pseudomonadaceae
 Marga : Pseudomonas
 Jenis : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi.

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 - 1,0 x 1,5 - 4,0 pm. Motil dengan flagelum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat, beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H₂ atau CO sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelezar, Michael J. and Chan, E.C.S, 2008 : 952).

Pseudomonas aeruginosa menjadi patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan *tidak* normal, misalnya di selaput lendir pada saluran kemih dan kulit yang rusak. (Jawetz, dkk. 2001:395)

4. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi (Garrity, G. M., Bell, J. A., and Lilburn, 2004: 24-187)

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae
 Marga : Staphylococcus
 Jenis : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5 μm , terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Non motil, tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam tekoat yang berkaitan dengannya Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi dan ferroentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40° C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 954-955).

5. *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-187)

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : *Staphylococcus epidermidis*

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5 μm , terdapat tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40° C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 954).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasi negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Syahracham, Agus 1994 :177).

6. *Streptococcus mutans*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-203)

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Lactobacillales

Suku : Streptococcaceae

Marga : Streptococcus

Jenis : *Streptococcus mutans*

- b. Sifat dan morfologi

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter kurang dari 2 μm , terdapat berpasangan atau dalam rantai bila ditumbuhkan dalam medium cair. Kadang-kadang terdapat galur motil dalam

kelompok serologis D. Metabolisme fermentatif. Anaerobik fakultatif (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S 200S: 955).

Staphylococcus merupakan parasit pada manusia yang ada dimana-mana, salah satu contoh adalah *Staphylococcus* yang merupakan patogen utama pada manusia. Bakteri ini merupakan flora normal pada kulit, dan termasuk populasi yang paling besar pada kulit yang dapat menyebabkan bisul. (Jawetz, dkk, 2001: 373).

7. *Salmonella typhi*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 2004: 24-122)

Domain : Bacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Enterobacteriales
 Suku : Enterobacteriaceae
 Marga : Salmonella
 Jenis : *Salmonella typhi*

- b. Sifat dan morfologi

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, biasanya motil dengan flagelum peritrikus, mungkin terdapat mutan nonmotii. Kebanyakan galur akan tumbuh pada medium sintesis tanpa faktor tumbuh khusus dan dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon Sebagian besar galur bersifat aerogenik, namun *S. typhi* merupakan kekecualian penting, tidak pernah menghasilkan gas. Kandungan G+G DNA berkisar dari 50 sampai 53 mol % (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008: 953).

8. *Vibrio colera*

- a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn, 2004: 24-109)

Domain : Bacteria
Filum : Proteobacteria
Kelas : Gammaproteobacteria
Bangsa : Vibrionales
Suku : Vibrionaceae
Marga : Vibrio
Jenis : *Vibrio colera*

b. Sifat dan morfologi

Vibrio colera adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, tumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 pm x 1,5-3,0 pm, terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar, hanya sesekali non motil. Seringkah mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-37° C (Pelezar. Michael J. and Chan. E.C.S, 2008 : 956).

C. Metode Penyarian (Ekstraksi) bahan alam

1. Ekstraksi

a. Pengertian Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair, dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu

maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter atau campuran etanol dan air (Depkes R.I. 1986).

Ekstraksi merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh pelarut tertentu sehingga terjadi larutan zat aktif dalam larutan tersebut (Lenny, 2006).

b. Mekanisme Kerja Ekstraksi

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel dan proses ini berulang terus samapai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM, 1995).

c. Jenis-Jenis Ekstraksi

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat bahan, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna (Voight, 1994).

Menurut Dirjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

a) Cara dingin, yaitu:

1) Maserasi

Maserasi adalah proses dimana bahan alam secara keseluruhan berupa serbuk kasar ditempatkan dalam wadah tertutup dan ditambahkan pelarut dalam wadah yang tertutup pada suhu kamar dalam jangka waktu minimal 3 hari dengan pergantian

pelarut baru. Campuran kemudian disaring dan diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kental (Handa, 2008).

Maserasi (*macerace* = mengairi, melunakkan) adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope (umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok kembali (Voight, 1971).

Maserasi dilakukan dengan memasukkan ke dalam sebuah bejana sepuluh bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok, lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk (Depkes R.I. 2000).

2) Perkolasi

Percolare berasal dari kata "*colare*", artinya menyerakai dan "*per*" = *through*, artinya menembus. Dengan demikian, perkolasi adalah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator dimana simplisia terendam dalam cairan penyari, zat-zat akan terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan (Syamsuni, 2006). Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap perendaman antara, tahap perkolasi sebenarnya (pengetesan/penampungan perkoloat) sampai diperoleh ekstrak (Depkes R.I., 2000). Keuntungan dari metode perkolasi ini adalah proses penarikan zat berkhasiat dari tumbuhan lebih sempurna, sedangkan kerugiannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan peralatan yang digunakan mahal (Agoes, 2007).

b) Cara panas, yaitu:

1) Refluks

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian seterusnya. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam (Harborne, 1987; Dirjen POM, 1986).

2) Soxhletasi

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes R.I, 2000). Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Sarker SD, dkk., 2006).

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu), pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40°-50° C.

4) Infus

Infus adalah ekstraksi dengan air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98° C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekokta

Dekokta adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 menit) dan temperatur sampai titik didih air (Enda, 2009).

6) Destilasi uap

Destilasi uap biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Sarker SD, dkk., 2006).

Partisi merupakan proses sorpsi yang analog dengan ekstraksi pelarut (Rohman, 2007). Distribusi atau partisi dapat dirumuskan bila suatu zat terlarut terdistribusi antara dua pelarut yang tidak dapat campur, maka pada suatu temperatur yang konstan untuk setiap spesi molekul terdapat angka banding distribusi yang konstan antara kedua pelarut itu, dan angka banding distribusi ini tidak tergantung pada spesi molekul lain apapun yang mungkin ada. Hasil dari proses partisi yang diperoleh masing-masing dapat diuji aktivitas biologisnya untuk mengidentifikasi keaktifan komponen bioaktif yang terkandung (Svehla, 1990).

2. Fraksinasi

Fraksinasi adalah proses untuk memisahkan golongan kandungan senyawa yang satu dengan golongan yang lainnya dari suatu ekstrak. Prosedur pemisahan dengan fraksinasi ini didasarkan pada perbedaan kepolaran kandungan senyawanya (Harborne, 1987). Dalam metode fraksinasi pengetahuan mengenai sifat senyawa yang terdapat dalam ekstrak akan sangat mempengaruhi proses fraksinasi. Oleh karena itu, jika digunakan air sebagai pengestraksi maka senyawa yang terekstraksi akan bersifat polar, termasuk senyawa yang bermuatan listrik. Jika digunakan pelarut non polar misalnya heksan, maka senyawa yang terekstraksi bersifat non polar dalam ekstrak juga. Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi kolom (KK), *size-exclusion chromatography* (SEC), *solid-phase extraction* (SPE) (Sarker SD, dkk., 2006).

3. Identifikasi

Sebelum melakukan isolasi terhadap senyawa kimia yang diinginkan dalam suatu tumbuhan maka perlu dilakukan identifikasi pendahuluan kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada masing-masing tumbuhan, sehingga dapat diketahui kandungan senyawa yang ada secara kualitatif dan mungkin juga secara kuantitatif golongan senyawa yang dikandung oleh tumbuhan tersebut (Darwis, 2000: 4).

Senyawa yang didasarkan pada pembagian campuran dua senyawa dalam dua fase dimana fase gerak bergerak terhadap fase diamnya. Fase diam berupa serbuk yang dilapiskan tipis merata pada lempeng kromatografi (plat, gelas, logam atau lempeng yang cocok). Fase diam berfungsi sebagai penyerap. Pada system inilah dikenal istilah kecepatan rambat suatu senyawa yang diberi symbol R_f (Retardation factor). Harga R_f ditentukan oleh jarak rambat senyawa dari titik awal dan jarak

rambat fase gerak dari titik awal. Harga Rf ini dapat digunakan untuk identifikasi senyawa yang dianalisa (Dwiatmaka, 2001).

D. Kromatografi Cair Vakum

Kromatografi adalah suatu metode fisik, dimana komponen-komponen yang dipisahkan didistribusikan diantara 2 fase, salah satu fase tersebut adalah fase stationer dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir lembut di sepanjang landasan stationer. Dalam semua teknik kromatografi, zat-zat terlarut yang dipisahkan bermigrasi sepanjang kolom, dan dasar pemisahan terletak dalam laju perpindahan sebuah zat terlarut itu dan yang lain menahannya (Underwood, 2002).

Vacuum Liquid Chromatography (VLC) atau kromatografi cair vakum merupakan pengembangan dari kromatografi kolom. Pada VLC, elusi diaktivasi dengan menggunakan vakum. Elusi dilakukan dengan menggunakan fase gerak dengan gradien polaritas dari polaritas paling rendah sampai polaritas yang paling tinggi. Pemisahan senyawa pada VLC didasarkan pada kelarutan senyawa yang dipisahkan dalam fase gerak yang digunakan. Fase gerak dengan gradien polaritas diharapkan dapat memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki polaritas berbeda memiliki kekuatan melarutkan yang bagus, mudah diaplikasikan dalam kromatografi skala besar (sampai 100 g) dan cepat merupakan salah satu kelebihan dari kromatografi cair vakum, Teknik ini ekonomis dan secara signifikan mengurangi penggunaan pelarut dan jumlah silica yang digunakan. Artinya setiap komponen akan terdapat sedikit fraksi dan mengurangi tercampurnya setiap fraksi jika diamati (Padmawinata, 1995).

E. KLT Bioautografi

Bioautografi berasal dari kata bio=makhluk hidup, autografi-melakukan aktivitas sendiri. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengerjaan kromatografi lapis Tipis (KLT). Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula di isolasi langsung dari komponen yang aktif (Mahmudah, 2011:20).

Bioautografi dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu:

1. Bioautografi langsung, yaitu dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung diatas lempeng kromatografi Lapis Tipis (KLT).Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu (Djide, Satini & Syahrudin, 2006: 299-302).

2. Bioautografi kontak, dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah di inokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung. Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan di atas permukaan medium Nutrien Agar yang telah di inokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah

berdifusi dari lempeng kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah di inkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona yang jernih. Dan untuk memetjelasnya digunakan indikator aktivitas dehidrogenase (Djide, Satini & Syahrudin, 2006: 299-302).

3. Bioautografi pencelupan, dimana medium agar telah di inokulasikan dengan suspensi bakteri dituang diatas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Pada prakteknya metode ini dilakukan dengan lempeng kromatografi yang telah dielusi, diletakkan dalam cawan petri, sehingga permukaannya tertutup oleh medium agar yang berfungsi sebagai “base layer” Setelah medium agar memadat (base layemya memadat), selanjutnya dituangi medium yang telah disuspensikan dengan kultur mikroba yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai “ Seed layer”. Kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai (Djide, Satini & Syahrudin, 2006: 299-302).

F. Media

Media adalah kumpulan zat-zat organik maupun anorganik yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan cara tertentu dalam pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.

Untuk mendapatkan suatu lingkungan kehidupan yang cocok bagi pertumbuhan bakteri, maka syarat-syarat media harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.

1. Susunan nutrisi. Dalam suatu media yang digunakan untuk pertumbuhan haruslah ada air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin dan garam.

2. Tekanan osmose. Mengingat sifat-sifat bakteri juga sama seperti sifat-sifat sel yang lain terhadap tekanan osmose maka bakteri untuk pertumbuhannya membutuhkan media yang isotonis.
3. Derajat keasaman (pH). Pada umumnya bakteri membutuhkan pH netral. Namun ada pada bakteri tertentu yang membutuhkan pH alkalis, yakni vibrio membutuhkan pH antara 8-10 untuk pertumbuhan yang optimal.
4. Temperatur. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal dari bakteri membutuhkan temperatur tertentu. Umumnya untuk bakteri yang patogen membutuhkan temperatur sekitar 37°C sesuai dengan temperatur tubuh.
5. Sterilitas media, merupakan suatu syarat yang penting. Media yang tidak steril tidak dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan biologi karena tidak dapat dibedakan dengan pasti apakah bakteri tersebut berasal dari bahan yang diperiksa ataukah hanya merupakan kontaminan (Depkes RI, 1986).

G. Antibakteri

Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang dapat digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroba yang menyebabkan infeksi pada manusia. Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya masing-masing dikenal sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisida bila kadar antimikroba ditingkatkan melebihi KHM (Jawetz, dkk., 2001).

Secara umum kemungkinan situs penyerangan suatu zat antibakteri dapat diduga dengan meninjau struktur serta komposisi sel bakteri. Kerusakan pada salah

satu situs dapat mengawali terjadinya perubahan-perubahan yang menuju kepada matinya sel tersebut. Mekanisme kerja antibakteri sebagai berikut:

1. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel mikroba

Antimikroba jenis ini menghambat proses sintesis dinding sel bakteri sehingga mengakibatkan kerusakan dinding sel bakteri, sehingga sel lisis. Hal ini merupakan dasar efek bakterisida pada bakteri yang peka. Obat yang termasuk kelompok ini adalah penisilin (ampisilin dan amoksisilin), basitrasin, sefalosporin, sikloserin, vankomisin (Jawetz, dkk., 2001).

2. Antimikroba yang menghambat fungsi membran sel mikroba

Antimikroba jenis ini dapat merusak permeabilitas selektif dari membran sel mikroba, sehingga mengakibatkan isi sel penting seperti polipeptida keluar membran. Obat yang termasuk kelompok ini ialah imidazol, polimiksin (Jawetz, dkk., 2001).

3. Antimikroba yang menghambat sintesis protein

Untuk kehidupannya sel bakteri perlu mensintesis berbagai protein. Penghambatan sintesis protein terjadi dengan berbagai cara antara lain:

- a) Kloramfenikol berikatan dengan ribosom 50 S dan menghambat pengikatan asam amino baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidiltransferase;
- b) Tetrasiklin berikatan dengan 30 S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA-asam amino. Obat yang termasuk kelompok ini antara lain kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, tetrasiklin dan aminoglikosida.

4. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat

Antimikroba kelompok ini berikatan dengan enzim polymerase-RNA (pada subunit H (amino asil)) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh

enzim tersebut. Contoh obat dalam kelompok ini adalah rifampisin, trimetoprim, sulfonamida, siprofloksasin (Jawetz, dkk., 2001).

H. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri dari suatu zat dapat dilakukan dengan cara:

a. Dilusi cair dan dilusi padat

Pada prinsipnya antibiotik diencerkan hingga memperoleh beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi dapat ditambah suspensi kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi dapat dicampur dengan media Nutrien Agar lalu ditanami bakteri uji.

b. Difusi

Prinsip metode difusi uji potensi yang berdasarkan pengamatan luas daerah hambatan pertumbuhan bakteri karena berdifusinya antibakteri dari titik awal pemberian ke daerah difusi. Dalam metode ini, ada beberapa cara yaitu cara Kirby Bauer, cara sumuran dan cara pour plate.

1) Cara Kirby Bauer

Kuman dengan konsentrasi 10^8 CFU/ml dioleskan pada permukaan media agar hingga rata kemudian diletakkan kertas samir (disk) yang mengandung antibiotik di atasnya.

2) Cara Sumuran

Prinsipnya sama dengan Kirby Bauer, tetapi disk antibiotik diganti dengan larutan antibiotik yang diteteskan pada sumuran yang dibuat dengan diameter tertentu pada media agar.

3) Cara Pour Plate

Pada cara ini suspensi kuman dengan konsentrasi 10^8 CFU/ml ditambahkan pada media agar yang masih mencair. Setelah media mengeras, diletakkan kertas samir (disk) antibiotik.

Pada metode difusi dikenal dua macam pengertian, yaitu:

- 1) Zona Radikal: Suatu daerah disekitar disk dimana sama sekali tidak ditemukan pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri tersebut diukur dengan menggunakan diameter dari zona radikal tersebut.
- 2) Zona irradikal: Suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. Disini akan terlihat pertumbuhan yang kurang subur dibanding daerah diluar pengaruh antibakteri tersebut (Depkes R.I., 1986).

I. *Pengujian secara KLT Bioautografi*

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang leleh dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan diatas permukaan medium Nutrien Agar yang telah di inokulasi dengan mikroorganisme yang sensitive terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis (Djide, Sartini dan Kadir, 2006: 301).

Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan dan diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng kromalogram kedalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroba uji nampak pada permukaan membentuk zona jernih (Djide, Sartini dan Kadir, 2006:301).

J. *Tinjauan Islam tentang Tanaman Obat*

1. Pentingnya Kesehatan Dalam Islam

Islam mencakup segenap aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya masalah kesehatan dan pengobatan. Ilmu pengobatan Islam bertumpu pada cara-cara alami dan metode pengobatan Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi seorang muslim dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakitnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dibekali akal oleh Allah SWT, disamping sebagai insting yang mendorong manusia untuk mencari segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melestarikan hidupnya seperti makan, minum dan tempat berlindung. Dalam mencari hal-hal tersebut, manusia akan mendapat pengalaman yang baik dan yang kurang baik maupun yang membahayakan. Maka akal yang mengolah, meningkatkan serta mengembangkan pengalaman tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Karena itu, manusia selalu dalam proses mencari dan menyempurnakan hingga selalu progresif. Akal yang membentuk serta membina kebudayaan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya termasuk dalam bidang pengobatan. Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua, oleh karena itu hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Dari Jabir bin ‘Abdullah ra, Bahwa Rasulullah saw bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Artinya:

”Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengena tepat pada penyakitnya ia akan sembuh dengan izin Allah ta’ala” (Hendrik, 2009: 67).

Penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya adalah mutlak kekuasaan Allah SWT, bukan kekuasaan manusia, karena penyakit datang dari Allah SWT, dan pasti Allah akan menurunkan obatnya. Beberapa kaidah dalam pengobatan yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim saat berusaha mengobati penyakit yang dideritanya, adalah bahwa obat dan dokter hanya merupakan sarana kesembuhan terhadap suatu penyakit. Dalam berusaha mencari obat/pengobatan, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang syirik dan diharamkan oleh syariat-syariat Islam (baik yang berhubungan dengan teknik pengobatan maupun obat-obatnya) (Hendrik, 2009: 68).

2. Penyakit dan Obatnya

Indikasi sakit, sembuh, dan sehat dalam bahasa Al-Quran, secara berurutan dapat didasarkan pada kata *maradl*, *syifa'*, dan *salim*. Kata *maradl dan syifa'* secara berdampingan diungkapkan dalam surat Asy-Syuara' ayat 80 berikut ini.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ النَّاسُ
وَمَا أَشْفَىٰ لَهُمْ إِلَّا رِجْءٌ وَآسَافُورٌ
وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
يَأْتُواكَ بِسُحُوفٍ مَّسْكُومٍ

Terjemahnya :

“Dan apabila Aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku” (Departemen Agama RI, 2008: 370).

Pada ayat ini tampak dengan jelas bahwa sakit (*maradl*) terkait dengan manusia, sedangkan kesembuhan (*syifa'*) merupakan sesuatu yang diberikan kepada manusia, dan bersandar kepada Allah SWT, kandungan makna ini mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya, kesembuhan akan terjadi, dan atas izin dari Allah SWT (Muntaha, 2012: 23). Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit :

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ

Artinya :

“Berobatlah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan obatnya, kecuali kematian dan ketuaan” (Hendrik, 2009: 67).

Obat setiap penyakit itu pasti ada karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan juga obatnya, dan kewajiban kita sebagai manusia untuk mencari obat dari penyakit tersebut. Dan Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadist yang berasal dari sahabat Jabir r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Jabir dari Rasulullah SAW bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah Azza wajallah” (HR. Muslim).

Sakit dan sehat adalah dua hal yang datang silih berganti dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sakit mengganggu ketentraman hidup manusia, karena itu, mereka selalu berusaha untuk menghindari dari serangannya dan akan terus berusaha mencari kesembuhan.

Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang pengobatan, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin Disamping Al-Quran mengisyaratkan tentang pengobatan juga menceritakan tentang keindahan alam semesta dan juga keberagaman tubuhan yang ada didalamnya yang dapat kita jadikan sebagai sumber dari pembuatan obat- obatan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16 :11 sebagai berikut:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Departemen Agama. 2005: 403).

3. Manfaat Tumbuh-tumbuhan

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi penyembuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan- bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut

Di dalam firman Allah swt. dalam Qs. Thaha/20 : 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Departemen Agama RI, 2005 : 481)

Ayat-ayat di atas menyatakan: *Dia*, yakni Allah, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagaimana besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia*, Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, *dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis*, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 1996: 604-605). Karena itu, *makan dan*

gembalakanlah binatang-binatang kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Darinya, yakni dari bumi atau tanah itulah (bukan dari selainnya) Kami dengan kematian dan penguburan sehingga kamu bercampur lagi dengan tanah dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu yakni membangkitkan kamu, pada kali yang lain, yakni pada Hari Kiamat (Shihab, 1996; 604-605).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan daunnya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat dilihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, termasuk korteks jati dan manusia bertugas mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan segala sesuatu yang diciptakan Allah swt yang memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi.

Tumbuhan korteks jati merupakan salah satu tanaman yang memberikan beberapa manfaat yang banyak digunakan sebagai obat alami.

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa segala ciptaan Allah swt di dunia ini tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-

tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian seperti Tumbuhan korteks jati (*Tectona grandis* L.F).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini bersifat eksperimental dengan menguji daya hambat konsentrasi fraksi korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) terhadap beberapa bakteri uji yang ditandai dengan daerah berbentuk lingkaran bening pada medium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi, Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) yang berasal dari kampus II UIN Alauddin Makassar Samata-Gowa.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah cawan porselin, autoklaf, cawan petri, erlenmeyer, gelas ukur, inkubator, jangka sorong, kompor gas, lampu spiritus, Laminar Air Flow (LAF), lemari pendingin, ose bulat, oven, pinset, spoit, tabung reaksi, timbangan analitik, dan vial.

2. Bahan yang di gunakan

Air suling, etil asetat, aluminium foil, kapas, medium NA, medium NB, kertas timbang, kultur murni *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio collera*, dan sampel Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.).

E. Prosedur kerja

1. Penyiapan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada bagian batang utama dan cabang yang dikelupas dengan ukuran tertentu. Selanjutnya dicuci pada air yang mengalir sampai bersih setelah itu dilakukan proses sortasi basah lalu di keringkan dengan cara di angin-anginkan, setelah simplisia kering di lakukan sortasi kering, setelah itu simplisia di rajang untuk memperluas permukaan simplisia, kemudian simplisia di blender sehingga didapatkan serbuk korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.).

2. Ekstraksi Korteks Kayu Jati

Sebanyak 1 kg sampel korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) diekstraksi dengan cara refluks sebanyak 3 kali dan setiap kali refluks dilakukan selama 4 jam menggunakan pelarut etil asetat. Selanjutnya, ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan *rotary evaporator* sehingga diperoleh ekstrak kental etil asetat. Ekstrak kental kemudian di fraksinasi.

3. Fraksinasi Komponen Kimia

a. Persiapan Kolom Kromatografi Cair Vakum

Kolom kromatografi cair vakum dibersihkan kemudian dipasang tegak lurus. Adsorben (silika gel 60GF254) dimasukkan dalam kolom kemudian ditambahkan

cairan pengelusi, selanjutnya pompa vakum dijalankan hingga adsorben (silica gel) rapat.

b. Pemisahan komponen kimia

Fraksi aktif etil asetat korteks jati (*Tectona grandis* L.F.) yang memiliki aktivitas antimikroba yang paling besar ditimbang sebanyak 3 gram, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit silika gel sehingga ekstrak mengering seperti serbuk. Dimasukkan 20 gram silika gel ke dalam sinter glass dengan cara kering lalu dimampatkan. Setelah mampat di masukkan serbuk ekstrak dan dimampatkan dengan pompa vakum kemudian di elusi dengan eluen yang pertama kali digunakan. Cairan pengelusi dibuat dengan gradient kepolaran yang meningkat berdasarkan profil KLT. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian dilihat profil KLT-nya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna bercak yang sama digabung menjadi satu dan diuji aktivitas antibakteri dengan metode KLT-bioautografi.

4. Identifikasi Komponen Kimia

Hasil Fraksinasi ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan eluen yang sesuai dengan profil KLT yang diperoleh kromatogramnya diamati di bawah UV 254 dan 366 nm kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda antara lain sebagai berikut:

- a. H_2SO_4 10% : Kromatogram dipanaskan dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, dan hitam.
- b. Pereaksi Dragendorff : Pengamatan langsung yang menghasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.
- c. FeCl_3 5% : Pengamatan langsung menghasilkan warna hitam-biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.

- d. Pereaksi Lieberman Burchard : Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan. Munculnya noda berfluoresensi merah menunjukkan adanya triterpenoid, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.
- e. AlCl_3 5% : Diamati dengan sinar UV 366, dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.
- f. KOH : Pengamatan langsung menghasilkan warna merah untuk senyawa kumarin.

5. Persiapan Bakteri Uji

a. Peremajaan bakteri

Bakteri uji digunakan dalam penelitian ini meliputi (*Bacillus subtilis*, *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeroginosa*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Vibrio colera*). Bakteri - bakteri ini berasal dari biakan murni yang diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C .

b. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

Bakteri uji yang telah dimurnikan berumur 24 jam disuspensikan kedalam larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) steril hingga tingkat kekeruhanya 25% T. Pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm (Harnita. 2008:578).

6. Pengujian Fraksi Aktif dengan Metode KLT-Bioautografi

Fraksi-fraksi gabungan selanjutnya diuji aktivitas senyawa antimikrobanya dengan metode Kromatografi Lapis Tipis-Bioautografi yaitu dengan meletakkan lempeng KLT di atas permukaan medium Nutrien Agar 10 ml yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme $20 \mu\text{l}$ yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis selama 15 - 30 menit yang sebelumnya telah dielusi. Hasil pengujian KLT-bioautografi dengan spot/noda yang memberikan zona

penghambatan pada permukaan media agar pada (Djide, dkk, 2006 dan Mulyati E.S, 2009)

7. Cara pembuatan konsentrasi Fraksi Aktif Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)

Dibuat fraksi korteks jati dalam 4 konsentrasi yaitu 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm, dan 250 ppm. Larutan konsentrasi fraksi korteks jati yang dibuat adalah 10 mg kemudian dilarutkan dengan 0,2 ml DMSO dan dicukupkan 10 ml air steril dan didapatkan larutan stock 1000 ppm. Kemudian untuk konsentrasi 750 ppm diambil 3,75 ml larutan stock dengan mikro pipet dan dimasukkan dalam vial kemudian dicukupkan dengan air steril sebanyak 5 ml, untuk konsentrasi 500 ppm diambil 2,5 ml larutan stock dengan mikro pipet dan dimasukkan kedalam vial kemudian dicukupkan dengan air steril sebanyak 5 ml, kemudian untuk konsentrasi 250 ppm diambil 1,25 ml dari larutan stock dengan mikro pipet dan dimasukkan dalam vial kemudian dicukupkan dengan air steril sebanyak 5 ml.

8. Pengujian KHM dan KBM Antibakteri Fraksi Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) Dengan Metode Difusi

Disiapkan fraksi korteks kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.). Medium NA sebanyak 10 ml di campurkan dengan bakteri uji 20 μ l dalam botol coklat dan dihomogenkan kemudian dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril. Biakan ini dicampur dengan baik supaya bakteri terdistribusi secara merata kemudian cawan petri digoyang-goyangkan dengan membentuk angka delapan sehingga biakan menutupi seluruh permukaan lempeng NA. Setelah itu paperdisk yang telah ditetesi sampel fraksi aktif 20 μ l diletakkan diatas permukaan medium dengan menggunakan pinset steril. di inkubasi pada suhu 37° C selama 1x24 jam, di amati

daerah hambatan yang terbentuk di ukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong untuk uji KHM, uji KBM di ukur pada hari kedua pada suhu 37⁰C selama 1x24 jam dan diamati zona hambatnya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Korteks Kayu Jati

Setelah dilakukan ekstraksi Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.) sebanyak 1 kg dengan metode refluks menggunakan cairan penyari etil asetat, kemudian diperoleh ekstrak etil asetat kental. Maka diperoleh hasil ekstrak seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstraksi sampel Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)

Sampel	Pelarut	Berat ekstrak	% rendamen
Korteks Kayu Jati 1 kg	Etil Asetat	6,904gram	0,6904

2. Hasil Pemisahan Senyawa Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Pemisahan senyawa ekstrak larut etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) dengan metode KLT menggunakan perbandingan eluen N-heksan : etil asetat (3:1). Dari hasil penotolan pada lempeng yang diamati penampakan bercaknya pada lampu UV 254 dan 366, menunjukkan jumlah bercak yang timbul yaitu pada nilai Rf 0,28, 0,42 dan 0,57. Hasil pemisahan senyawa tersebut secara KLT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Profil KLT Ekstrak Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)

No.	Ekstrak	UV 254 nm		UV 366 nm		Perbandingan
		Noda	Rf	Noda	Rf	
1.	Etil asetat			1	0,28	N-heksan : Etil asetat (3:1)
				2	0,42	
				3	0,57	

3. Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat Melalui Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Fraksinasi ekstrak etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis L.F*) melalui kromatografi cair vakum menggunakan campuran perbandingan eluen hasil profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil fraksi kemudian dielusi dengan campuran eluen N-Heksan : etil asetat dan etil asetat : etanol sehingga diperoleh 4 gabungan fraksi yang sama melalui penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil profil KLT fraksi etil asetat Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis L.F.*)

Fraksi gabungan	Fraksi	Jumlah bercak	Penampakan bercak			
			UV 254 nm		UV 366 nm	
			Rf	Warna	Rf	Warna
I	1	1	0,71	Hijau tua	0,71	Ungu tua
	2	1	0,71	Hijau tua	0,71	Ungu tua
	3	1	0,57	Hujau	0,57	Biru
	4	2	0,71	Hijau tua	0,71	Ungu tua
II	5	1	0,28	Hijau	0,42	Biru muda
	6	2	0,57	Hijau	0,57	Biru
		3	0,71	Hijau	0,71	Putih
		1	0,28	Hijau tua	0,42	Biru
	7	2	0,35	Hijau tua	0,71	Biru
		1	0,14	Hijau	0,071	Orange
		2	0,28	Hijau	0,14	Hitam
		3	-	-	0,28	Pink
	8	4	-	-	0,42	Biru
		1	0,14	Hhijau tua	0,071	Hijau
		2	0,28	Hijau tua	0,28	Biru
	9	1	0,071	Hijau	0,071	Hijau
III	10	1	-	-	0,071	Hijau
	11	1	-	-	0,071	Hijau
	12	1	0,071	Hijau	0,071	Hijau muda
	13	1	0,14	Hijau	0,071	Putih

Keterangan :

Fase gerak : n-heksan : etil asetat (3:1)
 Fase diam : Silika gel F254
 Penampakan bercak : Lampu UV 254 nm
 Lampu UV 366 nm

4. Hasil Uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Kimia

Lempeng kromatogram fraksi gabungan yang telah dielusi kemudian diuji dengan KLT-Bioautografi kontak pada mikroba uji (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp*). Hasil pengujian menunjukkan fraksi aktif pada fraksi 1, fraksi 2 dan fraksi 3 dimana fraksi-fraksi tersebut mampu menghambat semua pertumbuhan mikroba uji yang ditandai dengan adanya zona hambat bening pada area sekitar noda pada lempeng yang diinokulasi pada medium. Hasil uji KLT-Bioautografi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengujian KLT-Bioautografi fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F).

Fraksi	Rf	Mikroba uji							Senyawa	Penampakan bercak
		SA	ST	PA	EC	SE	SM	Vsp		
I	0,14	+	+	+	+	+	+	+	Steroid	Hijau kebiruan
	0,71	-	-	-	-	-	-	-		
II	0,14	+	+	+	+	+	+	+	Steroid	Hijau
	0,28	+	+	+	+	+	+	+	Terpenoid	Biru
	0,57	-	-	-	-	-	-	-		
	0,74	-	-	-	-	-	-	-		
III	0,28	-	-	-	-	-	-	-	Alkaloid	Jingga latar kuning
	0,42	-	-	-	-	-	-	-		
	0,57	+	+	+	-	-	+	+		
	0,64	+	+	+	-	-	+	+		

Keterangan:

SA : *Staphylococcus aureus*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi*

EC : *Echerichia coli*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

Vsp : *Vibrio sp*

SM : *Streptococcus mutans*

+ : Menghambat Pertumbuhan Bakteri

- : Tidak Menghambat Pertumbuhan Bakteri

5. Hasil Uji Potensi Antimikroba

Pengujian konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) dapat dilihat pada tabel 5, tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 5. Hasil uji KHM dan KBM fraksi 1 korteks kayu jati (*Tectona grandis L.F*) terhadap bakteri uji

Bakteri Uji	KHM (mm)				KBM (mm)				Kontrol DMSO
	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	
SA	10,3	9,2	8,83	8,2	9,8	8,9	8,5	8,2	-
SE	11,83	10,86	9,4	8,66	11,63	10,86	9,4	8,5	-
PA	11,73	10,33	9,94	9,25	11,3	10,26	9,53	9,16	-
ST	11,2	9,83	9,16	8,96	11,1	10,3	9,16	8,6	-
SM	11,23	10,42	9,5	-	11,83	10,53	9,5	-	-
EC	9,06	8,33	-	-	9,4	8,33	-	-	-
Vsp	10,45	9,9	-	-	10,83	10,2	-	-	-

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi*

EC : *Echerichia coli*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

Vsp : *Vibrio sp*

SM : *Streptococcus mutans*

+ : Menghambat Pertumbuhan Bakteri

- : Tidak Menghambat Pertumbuhan Bakteri

Tabel 6. Hasil uji KHM dan KBM fraksi 2 korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) terhadap bakteri uji.

Bakteri Uji	KHM (mm)				KBM (mm)				Kontrol DMSO
	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	
SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE	10,3	9,6	-	-	9,4	9,36	-	-	-
PA	11,06	10	9,6	-	11,06	10	9,6	-	-
ST	11,2	10,43	9,8	-	10,23	9,3	9,13	-	-
SM	11,13	10,36	9,93	-	10,43	10,16	10,06	-	-
EC	11,2	9,8	-	-	10,33	9,63	-	-	-
Vsp	10,63	9,73	-	-	10,3	9,63	-	-	-

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi*

EC : *Echerichia coli*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

Vsp : *Vibrio sp*

SM : *Streptococcus mutans*

+ : Menghambat Pertumbuhan Bakteri

- : Tidak Menghambat Pertumbuhan Bakteri

Tabel 7. Hasil uji KHM dan KBM fraksi 3 korteks kayu jati (*Tectona grandis L.F.*) terhadap bakteri uji

Bakteri Uji	KHM (mm)				KBM (mm)				Kontrol DMSO
	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	1000 ppm	750 ppm	500 ppm	250 ppm	
SA	10,63	9,9	8,43	-	10,06	9,4	8,43	-	-
SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA	12,16	11,26	10,1	9,3	11,73	11,16	9,6	9,2	-
ST	11,5	10,03	9,63	8,02	10,73	10,06	9,26	8,3	-
SM	13,13	10,7	9,53	-	13,13	10,7	9,53	-	-
EC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vsp	10,73	-	-	-	10,66	-	-	-	-

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi*

EC : *Echerichia coli*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

Vsp : *Vibrio sp*

SM : *Streptococcus mutans*

+ : Menghambat Pertumbuhan Bakteri

- : Tidak Menghambat Pertumbuhan Bakteri

B. Pembahasan

Korteks kayu jati merupakan salah satu jenis tanaman tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi beberapa macam penyakit. Tumbuhan jati secara empiris banyak digunakan sebagai obat kolesterol, obat kegemukan, borok, dan radang tenggorokan sedangkan menurut literatur bunga jati dapat digunakan sebagai obat bronchitis, melancarkan serta membersihkan kantung kencing. Bagian buah jati dapat digunakan sebagai obat diuretik. Adapun ekstrak daunnya dapat menghambat kerja bakteri tuberkolosa. Bagian kulit batangnya juga digunakan untuk menyembuhkan bronkitis (Sumarna, Y. 2015: 8).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F) dimana waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00- 11.00, dipilih tanaman yang sudah tua dan memiliki batang yang kokoh. Setelah itu korteks dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung karena ditakutkan adanya senyawa kimia yang rusak akibat terkena sinar matahari langsung. Kemudian korteks yang telah kering kemudian dibuat serbuk untuk memperluas permukaan sehingga pada saat ekstraksi, kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal. Pengerinan dilakukan agar reaksi enzimatis tidak berjalan dan mencegah pertumbuhan mikroba pada simplisia. Setelah didapatkan serbuk simplisia korteks kayu jati, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode refluksi. Sampel yang telah kering lalu direfluks dengan menggunakan pelarut etil asetat dimana pelarut ini bersifat nonpolar sehingga dapat menarik komponen yang bersifat nonpolar. Selain itu, etil asetat diharapkan dapat menarik seluruh zat aktif yang terkandung di dalam korteks kayu jati.

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode refluks. Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Serbuk simplisia korteks kayu jati yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak (kondensor), dengan adanya pemanasan cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian seterusnya. Ekstraksi ini dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi dilakukan selama 4 jam. Larutnya kandungan kimia simplisia saat proses refluks, umumnya akan terjadi apabila pelarut menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel. Di dalam rongga sel inilah terdapat senyawa aktif yang dapat larut di dalam pelarut. Perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel menyebabkan larutan dengan konsentrasi tinggi didesak ke luar ke konsentrasi rendah. Apabila telah terjadi kesetimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel, maka proses refluks akan berhenti. Oleh karena itu, pada metode refluks disertai pula dengan pemanasan agar terjadi perputaran pelarut dan mempercepat pengeluaran zat aktif sehingga proses ekstraksi akan terjadi secara optimal.

Metode refluks menggunakan pemanasan, untuk dapat mempercepat pelarutan senyawa yang terkandung di dalamnya karena tekstur korteks yang keras maka diperlukan adanya pemanasan untuk membantu penyarian simplisia. Proses refluks dilakukan menggunakan wadah yang terbuat dari kaca untuk menghindari terjadinya reaksi kimia antara pelarut maupun senyawa kimia yang tersari dengan wadahnya, karena sifat kaca yang lebih stabil (tidak mudah bereaksi) dibandingkan plastik maupun logam. Selama proses refluks, dibantu dengan pemanasan untuk mempercepat penyarian senyawa yang terdapat dalam simplisia, kemudian

menggunakan kondensor untuk mendinginkan kembali pelarut yang menguap karena pemanasan menjadi butir-butir air sehingga pelarut jatuh dan kembali menyari simplisia. Hal ini terjadi terus menerus hingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara diluar dan di dalam sel. Wadah selalu ditutup untuk menghindari kemungkinan terjadinya proses oksidasi oleh udara luar, juga dilakukan di dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya (sinar matahari) terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil.

Hasil maserasi kemudian disaring dan dilakukan pemekatan. Pemekatan berarti peningkatan jumlah *partial solute* (senyawa terlarut) hingga terbentuk ekstrak yang pekat dan kental, sehingga tidak terdapat lagi pelarut dalam ekstrak. Pemekatan dilakukan dengan bantuan *rotary evaporator* atau dengan hanya diangin-anginkan. *Rotary evaporator* digunakan agar proses pemekatan menjadi lebih cepat serta pelarut yang digunakan dapat diperoleh kembali sehingga lebih efisien. Ekstrak yang diperoleh kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia dalam ekstrak. Hasil ekstraksi berupa ekstrak kental berwarna kuning pekat

Hasil refluks yang didapatkan yakni berupa ekstrak kental etil asetat korteks kayu jati. Ekstrak kental etil asetat ini kemudian dicari profil KLTnya dengan cara menotol di lempeng silika kemudian dielusi dengan pelarut etil asetat dan n-heksan. Digunakan eluen etil asetat dan n-heksan karena memberikan penampakan noda dan pemisahan yang baik pada kromatogramnya dibandingkan dengan menggunakan eluen yang lain.

Ekstrak kemudian difraksinasi menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV). Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan pemisahan senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan alat vakum. Pemilihan metode ini karena prosesnya cepat

dan mudah. Sebelum difraksinasi, dilakukan preparasi alat dan bahan. Kromatografi cair vakum menggunakan silika gel 60 (63-200 μm). Kolom kromatografi dikemas dalam keadaan kering dan dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan maksimum. Perbandingan eluen pelarut kemudian dituangkan ke permukaan penjerap, dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksinya. Eluen pelarut dibuat dengan perbandingan yang berbeda-beda, dimulai dari pelarut yang kepolarannya rendah hingga pelarut yang lebih polar. Dari hasil fraksinasi, diperoleh 15 fraksi yang kemudian di KLT dengan fase gerak n-heksan : etil asetat 3:1. Karena eluen n-heksan : etil asetat yang memberikan penampakan noda yang baik pemisahannya pada kromatogram. Kromatogram fraksi yang memiliki warna bercak dan nilai Rf yang sama digabungkan sehingga diperoleh 4 gabungan fraksi, di mana fraksi I merupakan gabungan hasil fraksinasi 1,2,dan 3, kemudian pada fraksi II terdiri dari gabungan hasil fraksinasi 4,5,6,7, dan 8, pada fraksi III merupakan gabungan hasil fraksinasi 9,10,11, dan 12, kemudian fraksi IV terdiri dari gabungan hasil fraksinasi 13,14, dan 15.

Pengujian dilakukan terhadap mikroba *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp*. Adapun pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Staphylococcus aureus* bersifat patogenik penyebab infeksi kulit, borok, dan keracunan makanan sedangkan *Streptococcus mutans* dapat menyebabkan karies pada gigi. *Escherichia coli* dan *Salmonella thypi* bersifat patogenik penyebab utama diare kronik, tifoid dan infeksi saluran kemih. *Pseudomonas aeruginosa* yang bersifat invasif dan toksigenik penyebab infeksi kulit dan mata. *Vibrio sp* merupakan bakteri penghasil enterotoksin penyebab penyakit

kolera. *Staphylococcus epidermidis* dapat menyebabkan infeksi pada kulit, gatal dan jerawat.

Keempat gabungan fraksi yang diperoleh pada saat fraksinasi kemudian dilakukan pengujian KLT-Bioautografi dimana pengujian ini berfungsi untuk mengetahui komponen kimia apa yang memberikan aktivitas antimikroba. Metode yang digunakan dalam KLT-Bioautografi adalah metode kontak yaitu dengan cara menempelkan lempeng KLT pada medium yang telah disuspensikan dengan mikroba uji selama 15-30 menit untuk memberikan waktu sampel untuk bekerja.

Hasil KLT-Bioautografi menunjukkan bahwa fraksi gabungan I dan II dapat menghambat semua mikroba uji. Sedangkan pada gabungan fraksi III hanya dapat menghambat bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp.* Kemudian pada gabungan fraksi IV tidak memberikan efek penghambatan pada bakteri uji.

Tiga gabungan fraksi yang menghambat pada saat uji KLT-Bioautografi yaitu fraksi I, fraksi II, dan fraksi III kemudian dilakukan pengujian KHM dimana pada ketiga gabungan fraksi korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F) menunjukkan adanya area jernih pada medium agar sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi penghambatan pada mikroba *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp.*

Kemudian dari hasil uji KHM yang dilakukan, dilanjutkan pada uji KBM sebagai uji penegasan untuk memastikan penghambatan pada uji KHM. Dan dari hasil pengujian yang dilakukan diantara ketiga fraksi tersebut didapatkan hasil bahwa fraksi aktif yaitu fraksi gabungan I memiliki kemampuan daya hambat lebih banyak

pada bakteri dibandingkan dengan fraksi gabungan II dan III. Hal ini dapat dilihat dari luasnya zona bening yang terbentuk dan banyaknya bakteri yang dihambat, dimana fraksi gabungan II dan III memiliki kemampuan hambat lebih kecil yang ditandai terbentuknya zona bening yang lebih kecil dan hanya dapat menghambat beberapa bakteri uji saja. Dari hasil pengujian ini kemudian diketahui bahwa fraksi gabungan I, II, dan III etil asetat korteks kayu jati hanya dapat menghambat bakteri uji, hal ini dapat dilihat pada tabel hasil pengujian potensi antibakteri korteks kayu jati.

Pengujian potensi antimikroba didapatkan 3 fraksi aktif, kemudian dilakukan identifikasi komponen senyawa dimana pada fraksi I menunjukkan adanya kandungan senyawa steroid karena ditandai dengan penampakan noda berwarna hijau kebiruan pada pereaksi Liebermen-Burchard. Pada fraksi II mengandung senyawa steroid dan terpenoid yang ditandai dengan adanya warna hijau dan mesah pada pereaksi Liebermann-Burchard kemudian pada fraksi III mengandung senyawa golongan alkaloid dan fenol, hal ini ditandai dengan adanya noda jingga latar kuning pada pereaksi Dragendorf, sedangkan senyawa fenol ditandai dengan adanya noda berwarna hitam hijau pada pereaksi Besi (III) Klorida (FeCl_3).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) memberikan daya hambat yang baik terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dan *Vibrio sp.*
2. Konsentrasi fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) yang paling baik memberikan aktivitas antibakteri pada bakteri uji adalah fraksi 1 dengan konsentrasi 1000 ppm dan 750 ppm.
3. Komponen kimia aktif yang memiliki aktivitas antimikroba pada fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) adalah golongan senyawa alkaloid, fenol, terpenoid dan steroid.
4. Pada uji KHM dan KBM fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) diketahui bahwa fraksi etil asetat korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

B. Saran

1. Sebaiknya manusia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah swt berikan termasuk korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.) karena memiliki manfaat sebagai antibakteri dan manusia juga harus lebih memperhatikan ciptaan Allah swt termasuk korteks kayu jati yang kemungkinan memiliki manfaat lain selain sebagai antibakteri.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa antibakteri pada sampel korteks kayu jati (*Tectona grandis L.F*) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antibakteri.



DAFTAR PUSTAKA


- Apiristiani, D. Astuti P. *Isolasi Komponen Akif Antibakteri Ekstrak Kloroform Daun Buah Mimba (Azadirachta indica A. Juss) Dengan Bioautografi*. Yogyakarta : Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada (UGM). 2005.
- Ar-Rumaikhon, Sulaiman bin A. *Fiqih Pengobatan Islam: Kajian komprehensif Seputar Berbagai Aspek Pengobatan dalam Perspektif Islam*. Solo: penerjemah, Tim Al-Qowam; Editor, Amir Ghozali, Lc&Effendy Abu Ahmad, Al-Qowam. 2008.
- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press. 2007.
- Backer. C.A V brink R.C.B. *Flora Of Java*. The Natherlands. 1968.
- Darwis, D. *Teknik dasar Laboratorium dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati*. Padang: FMIPA Universitas Andalas. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV.Penerbit Diponegoro. 2005.
- Departemen Kesehatan RI. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Dirjen POM. 1986.
- Departemen Kesehatan R.I. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Depkes R.I. 2000.
- Diallo, A., M. Gbeassor., A. Vovor., G. K. Ekl., and K. Aklikokou. *Effect of Tectona grandis Leaves on Phenylhydrazine-Induced Anemia in Rats*. Fitother. 2008.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia IV*. Jakarta: Depkes RI. 1995.
- Djide. M. N, Satini, Syahrudin kadir. *Analisis Mikrobiologi farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbit Unhas (Lephas). 2006.
- Dwiatmaka, Y. *Identifikasi Simplek dan Toksisitas Akut Secara BST Ekstrak Kulit Batang Pule (Alstonia scholaris)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 2001.

- Enda, Winda Agus. *Uji efek antidiare ekstrak etanol kulit batang salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp) terhadap mencit jantan*. Medan: Fakultas farmasi universitas sumatera utara. 2009.
- Garrity, G. M. Bell dan Lilbum. *Taxonomic Outline of The Procaryotes Bergey's Manual of Systemic Bacteriology. 2th Editton*. United States of America: Springer, New York Berlin Hendeiberg. 2004.
- Ghaisas, M., K. Navghare., A. Takawale., V. Zope., M. Tanwar., and A. Desphande. *Effect of Tectona grandis on Dexamethazone Induced Insulin Resistance in Mice*. J Ethnopharmacol. 2009.
- Goswami, D. V., S. A. Nirmal., M. J. Patil., N.S. Dighe., R. B. Laware., and S. R. Pattan. *PHCOG REV: An Overview of Tectona grandis Chemistry and Pharmacological Profile*. Phcog ref. 2009.
- Handa, Sukhdev Swami. *Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants*. Trisete: International Centre For Science And High Technology. 2008.
- Hariana, arief. *Tumbuhan obat dan Khasiatnya Seri I*. Jakarta: Penyebar Swadaya. 2004.
- Hartati, R., S. A. Gana., dan K. Ruslan. *Telaah flavonoid dan Asam Fenolat Daun Jati (Tectona grandis L. f., verbenaceae), (Skripsi)*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2005.
- Harborne, J. B. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan Edisi I*. Bandung: ITB Press. 1987.
- Hendrik. *Habbatus Sauda': Tibbun Nabawiy untuk Mencegah & Mengobati Berbagai Penyakit*. Solo: Pustaka Iltizam. 2009.
- Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia III*. Jakarta: Badan Litbang Kehutanan. 1987.
- Heinrich, Michael, dkk. *Farmakognosi dan Fitoterapi*. Alih bahasa, Winny R. Syarif dkk., Editor edisi bahasa Indonesia, Amlia H. Hadinata., Jakarta: EGC. 2010.


- Jawestz, Melnick, and Adelberg. *Mikrobiologi Kedokteran Edisi 1*. Jakarta: Salemba Medika. 2001.
- Khare, C.P. *Indian Medicinal Plants*. New Delhi: India Springer. 2007.
- Lenny, S. *Isolasi dan Uji Bioaktifitas Kandungan Kimia Pudding Merah dengan Metode Uji Brine Shrimp*. Medan: USU Repository. 2006.
- Mahmudah, Rifa'atul. *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Larut Etil Asetat Sabut Kelapa (Cocos nucifera L.) dengan metode KLT Bioautografi*, (Skripsi Sarjana). Makassar: Fakultas ilmu kesehatan UIN alauddin Makassar. 2011.
- Muntaha, Ismail. *Sehat Cara Al-Quran*. Jakarta: Al Maghfirah. 2012.
- Nayeem, N., and M. D. Karverkar. *Analgesic and Anti Inflammatoory Activity of The Methanolic Extract of Frontal Leaves of Tectona grandis*. Internet Journal Pharmacol 8. 2010.
- Padmawinata, K. *Cara Kromatografi Preparatif*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 1995.
- Pelezar, Michael J. dan Chan, E. C. S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan Hadioetomo, Ratna Sari dkk., Jakarta: UI Press. 2008.
- Rohman, A. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Sandermann, W. V., and M. H. Simatupang. *On the Chemistry and Biochemistry of Teak Wood (Tectona grandis L. f.)*. Jg. Heft mai. 190-199. 1966.
- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. *Natural Products Isolation 2nd Edition*. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 2006.
- Shihab, M Ouraish. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Sutrisno. R B. *Pereaksi K.L.T (Kromatografi Lapis Tipis)*. Jakarta: Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. 1998.
- Sumarna, Y. *Budi Daya Jati.cet 1*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2015.
- Svehla, G. *Vogel: Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro*. Jakarta: PT Kalman Media Pustaka. 1990.

- Syahracham, Agus, dkk. *Mikrobiologi Kedokteran, Edisi Revisi*. Jakarta: Binapura Aksara. 1994.
- Syamsuni, H. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Trubus. *100 Plant Herbal Indonesia 11. Vol 11*. Bogor : P.T. Trubus Swadaya. 2009.
- Underwood, A. L. dan R. A. Day, JR. *Analisis Kimia Kuantitatif* Edisi Keenam. Terjemahan dari *Quantitative Analysis Chemistry* Sixth Edition oleh Is Sopyan. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2002.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Edisi V*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.




Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi Korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F)

Lampiran 2. Skema kerja fraksinasi sampel Korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F)



Lampiran 3. Skema kerja KLT-Bioautografi fraksi etil asetat Korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F)



Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

ST : *Salmonella thypi*

SE : *Staphylococcus epidermidis*


SM : *Streptococcus mutans*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

EC : *Echerichia coli*

V_{sp} : *Vibrio sp*

Lampiran 4. Skema kerja Uji potensi antimikroba fraksi Etil Asetat Korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F)



Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

ST : *Salmonella thypi*

SE : *Staphylococcus epidermidis*


SM : *Streptococcus mutans*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

EC : *Echerichia coli*

Vsp : *Vibrio sp*

Lampiran 5. Skema kerja Identifikasi senyawa kimia korteks kayu jati (*Tectona grandis L.F*)




Lampiran 6. Gambar Penelitian



Gambar 1: Batang pohon jati



Gambar 2: Sampel Korteks kayu jati




Gambar 3: Alat Refluks



Gambar 4: Ekstrak Konsteks Kayu Jati

Hasil Identifikasi Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)



A M A K A S S A R B

Gambar 5: Profil Ekstrak Etil Asetat, N-Heksan: Etil Asetat (3:1)

Keterangan :

A : Profil Ekstrak Etil Asetat UV 366 nm,

B : Profil Ekstrak Etil Asetat UV 254 nm

Proses Fraksinasi Ekstrak Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)



Gambar 6: Alat KCV



A

B


Gambar 7: Profil KCV N-Heksan:Etil Asetat (3:1)

Keterangan :

A : Profil KCV UV 366 nm

B : Profil KCV UV 254 nm

Hasil Identifikasi Profil KLT Fraksi Gabungan Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)



A


B

Gambar 8: Fraksi 1 N-Heksan:Etil Asetat (3:1)

Keterangan :

A : Penampakan Noda Pada UV 366 nm

B : Penampakan Noda Pada UV 254 nm



A


B

Gambar 9: Fraksi 2 N-Heksan:Etil Asetat (2:1)

Keterangan :

A : Penampakan Noda Pada UV 366 nm

B : Penampakan Noda Pada UV 254 nm




Gambar 10: Fraksi 3 n-Butanol : etil asetat (2:1)

Keterangan :

A : Penampakan Noda Pada UV 366 nm

B : Penampakan Noda Pada UV 254 nm




Gambar 11: Fraksi 4 n-Butanol : atil asetat (3:1)

Keterangan :

A : Penampakan Noda Pada UV 366 nm

B : Penampakan Noda Pada UV 254 nm

Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi gabungan korteks kayu jati (*Tectona grandis* L.F.)



Gambar 12: KLT Bioautograff


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 13: KLT Bioautografi Bakteri *Echerichiu coli*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 14: KLT Bioautografi Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 15: KLT Bioautografi Bakteri *Staphylococcus aureus*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 16: KLT Bioautografi Bakteri *Staphylococcus epidermidis*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 16: KLT Bioautografi Bakteri *Streptococcus mutans*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 16: KLT Bioautografi Bakteri *Salmonella typhi*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4



Gambar 17: KLT Bioautografi Bakteri *Vibrio sp*

Keterangan :


A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Fraksi 4

Hasil Uji Potensi Antimikroba Fraksi Gabungan Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F)




Gambar 18: Bakteri *Echerichia coli*

Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Control



Gambar 19: Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Control



Gambar 20: Bakteri *Staphylococcus aureus*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Control




Gambar 21: Bakteri *Staphylococcus epidermidis*

Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Control



Gambar 22: Bakteri *Streptococcus mutans*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Control



Gambar 23: Bakteri *Salmonella thypi*


Keterangan :

A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Control



Gambar 24: Bakteri *Vibrio sp*

Keterangan :


A : Fraksi 1

B : Fraksi 2

C : Fraksi 3

D : Control


Hasil Identifikasi Komponen Kimia Fraksi Aktif Korteks Kayu Jati (*Tectona grandis* L.F.)



Gambar 25: Uji Identifikasi Kandungan Senyawa Aktif Fraksi 1

Keterangan:


- A : Sebelum ditetesi pereaksi
- B : Penampakan noda pada pereaksi AlCl_3 (-)
- C : Penampakan noda pada pereaksi Liebermann Buchard (+ Steroid)
- D : Penampakan noda pada pereaksi KOH (-)
- E : Penampakan noda pada pereaksi H_2SO_3 (-)
- F : Penampakan noda pada pereaksi FeCl_3 (-)
- G : Penampakan noda pada pereaksi Dragendorff (-)



Gambar 26: Uji Identifikasi Kandungan Senyawa Aktif Fraksi 2

Keterangan:

- A : Sebelum ditetesi pereaksi
- B : Penampakan noda pada pereaksi AlCl_3 (-)
- C : Penampakan noda pada pereaksi Liebermann Buchard (+) Steroid dan Terpenoid
- D : Penampakan noda pada pereaksi KOH (-)
- E : Penampakan noda pada pereaksi H_2SO_3 (-)
- F : Penampakan noda pada pereaksi FeCl_3 (-)
- G : Penampakan noda pada pereaksi Dragendorff (-)



Gambar 27: Uji Identifikasi Kandungan Senyawa Aktif Fraksi 3

Keterangan:

A : Sebelum ditetesi pereaksi

B : Penampakan noda pada pereaksi AlCl_3 (-)

C : Penampakan noda pada pereaksi Lieberman Buchard (-)

D : Penampakan noda pada pereaksi KOH (-)

E : Penampakan noda pada pereaksi H_2SO_3 (-)

F : Penampakan noda pada pereaksi FeCl_3 (+) Fenol

G : Penampakan noda pada pereaksi Dragendorff (+) Alkaloid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Reza Harsal lahir di daerah Enrekang 22 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 bulan September tahun 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. Sadar dan Harma.

Mengawali pendidikannya di SDN 79 Gura (Enrekang). Setelah tamat SD, lanjut ke MTsN Baraka (Enrekang), dan setelah tamat penulis melanjutkan pendidikannya ke SMAN 1 Baraka (Enrekang).

Sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi. Mulai menikmati menjadi seorang mahasiswa farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R