

UJI EFEK ANTIDIARE EKSTRAK ETANOL DAUN KACANG GUDE

(Cajanus cajan(L.) Millsp) PADA MENCIT (Mus musculus)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh
MIFTAH ULFAH SHALEH
NIM 70100112096

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAH ULFAH SHALEH
NIM : 70100112096
Tempat/Tgl. Lahir : Cabenge, Soppeng / 24 Mei 1994
Jurusan : Farmasi
Alamat : Jl. Abd. Dg. Sirua No.28
Judul : Uji Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) Pada Mencit (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, Oktober 2016

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,

MIFTAH ULFAH SHALEH
NIM. 70100112096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L) Millsp) pada Mencit (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Miftah Ulfah Shaleh, NIM 70100112096, mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 November 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 24 November 2016 M
24 Shafar 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Abdul Karim S.Farm., M.Si. (.....)

Penguji I : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji II : Drs. Nurkhalis Gaffar, M.Ag (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada-Nya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salam dan shalawat senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad saw., keluarga, dan sahabat beliau yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Semoga kita semua menjadi umatnya yang taat.

Skripsi dengan judul “Uji Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L) Millsp) pada Mencit (*Mus musculus*)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari betapa banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, motivasi, dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Drs. M Suale Abbas., M.Pd dan Ibunda Rosnaini Haddaini dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doanya.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan Kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. selaku Wakil Dekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan (bidang mahasiswa) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Abdul Karim, S.Farm., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan bantuan, arahan, dan motivasi dalam proses penelitian dan mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini.
7. Drs. Nurkhalis Gaffar., M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 Farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan selama proses penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis, Farmasi angkatan 2012 “ISOHIDRIS” khususnya Yus, Ikram, Novi, Isti, Ugha, Hamida, Kia, dan Imma. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang kalian berikan.

11. Teman-teman TK, SD, SMP, dan SMA, khususnya Lara, Kifly, Ilyas, dan Idham.
Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan.
12. Keluarga besar jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan, kakak-kakak angkatan 2005 (Halogen), 2006 (Anestesi), 2007 (Injeksi), 2008 (Emulsi), 2009 (Hidrogenasi), 2010 (Corrigensia), 2011 (Effervescent) dan adik-adik angkatan 2013 (Farbion), 2014 (Galenika) dan 2015 (Pulvis).
13. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang farmasi pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Samata-Gowa, Oktober 2016
Penyusun,

MIFTAH ULFAH SHALEH
NIM. 70100112096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1. Definisi Operasional	3
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
1. Bagi Ilmu Pengetahuan	4
2. Bagi Masyarakat	4
F. Kegunaan Penelitian	4
G. Kajian Pustaka	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Tanaman Kacang Gude.....	7
1. Klasifikasi	7
2. Sinonim	8
3. Nama Daerah	8

4. Morfologi Tanaman	8
5. Syarat Tumbuh	9
6. Khasiat.....	9
7. Kandungan Kimia.....	10
B. Uraian Hewan Uji Mencit.....	10
1. Klasifikasi.....	10
2. Data Biologis	10
C. Uraian Ekstraksi dan Maserasi.....	13
D. Uraian Diare.....	15
1. Defenisi Diare.....	15
2. Patofisiologi Diare.....	15
3. Klasifikasi Diare.....	17
4. Penanganan dan Terapi Diare.....	21
E. Uraian Minyak Jarak.....	22
F. Uraian Loperamid	23
G. Tinjauan Islam	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel.....	35
1. Populasi	35
2. Sampel	35
C. Instrumen Penelitian	36
1. Alat yang Digunakan.....	36
2. Bahan yang Digunakan	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
1. Penyiapan Sampel	36

2. Ekstraksi Sampel	36
3. Pembuatan larutan Na-CMC 1 %	37
4. Pembuatan Suspensi Loperamid HCl.....	37
5. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude	37
E. Penyiapan Hewan Uji	38
1. Pemilihan Hewan Uji	38
2. Pentiapan Hewan Uji	38
F. Perlakuan Hewan Uji	38
G. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50
RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Pengamatan efek antidiare pada mencit.....	40
2. Mulai terjadinya diare	65
3. Analisis varians waktu awal terjadinya diare	67
4. Lama berlangsungnya diare	68
5. Analisis varians lama berlangsungnya diare	70
6. Frekuensi diare	71
7. Analisis varians frekuensi diare	73
8. Konversi dosis hewan dengan manusia.....	74
9. Jumlah maksimum larutan sediaan uji untuk hewan.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Kacang Gude.....	7
2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Kacang Gude.....	50
3. Skema kerja pengujian ekstrak Daun Kacang Gude.....	51
4. Daun Kacang Gude	52
5. Proses Rotavapor.....	52
6. Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ekstraksi Daun Kacang Gude (<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp).....	50
2. Pengujian Ekstrak Pada Mencit.....	51
3. Kacang Gude (<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp)	52
4. Proses Rotavapor.....	52
5. Perhitungan Dosis	54
6. Data Analisis	56



ABSTRAK

Nama Penyusun : Miftah Ulfah Shaleh
NIM : 70100112096
Judul Skripsi : Uji Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) pada Mencit (*Mus musculus*)

Secara tradisional, daun kacang gude telah digunakan oleh masyarakat untuk mengobati diare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antidiare ekstrak etanol daun kacang gude terhadap mencit jantan. Ekstrak etanol daun kacang gude dibuat dengan cara maserasi. Pengujian efek antidiare dilakukan dengan metode proteksi diare yang diinduksi oleh *Oleum ricini*. Digunakan sampel berupa 15 ekor mencit yang dibagi secara acak menjadi lima kelompok yaitu kelompok 1 diberi Na-CMC 1%, kelompok 2 diberi Loperamid HCl, kelompok 3, 4 dan 5 diberi ekstrak etanol daun kacang gude 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB secara oral. Dilakukan pengamatan terhadap waktu awal terjadinya diare, lama berlangsungnya diare, serta frekuensi diare setiap 30 menit selama 5 jam. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB memberikan efek sebagai antidiare pada mencit (*Mus musculus*).

Kata kunci : Antidiare, Daun kacang gude, Oleum ricini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Miftah Ulfah Shaleh

NIM : 70100112096

Title Of Thesis : Test The Effects Of Ethanol Extracts Of Leaves

Antidiarrhoeal Gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) in Mice (*Mus musculus*)

Traditionally, leaves nuts gude has been used by the public to treat diarrhea. This research aims to know the effect of ethanol extracts of leaves Antidiarrhoeal gude against murine males. Ethanol extracts of leaves gude made by means of maceration. Antidiarrhoeal effects of testing done by the method of protection of diarrhea induced by *Oleum ricini*. Use the sample form 15 tail mice which are divided randomly into five groups, group 1 was given the Na-CMC 1%, group 2 is given Loperamid HCl, group 3, 4 and 5 were given ethanol extracts of leaves gude kgBB, 50 mg/100 mg/kgBB, and 200 mg/kgBB orally. Carried out observations on the early time of occurrence of diarrhea, long the diarrhea, as well as the frequency of diarrhea every 30 seconds for 5 minutes. From the results obtained that the ethanol extracts of leaves gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) 100 mg/dose of kgBB and 200 mg/kgBB give effect as an Antidiarrhoeal at mice (*Mus musculus*).

Keywords: Antidiarrhoeal, Leaves nuts gude, *Oleum ricini*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare seringkali dianggap sebagai penyakit yang sepele, padahal tingkat global dan nasional menunjukkan fakta yang sebaliknya. Menurut catatan WHO, diare membunuh dua juta anak di dunia setiap tahun (Amiruddin, 2007: 2).

Penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang seperti di Indonesia, karena masih sering timbul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB), dan disertai dengan kematian yang tinggi, terutama di Indonesia Bagian Timur. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007, menunjukkan bahwa penyakit diare merupakan penyebab utama kematian pada balita (Kemenkes RI, 2011: 39).

Pada diare hebat seringkali disertai muntah-muntah, tubuh kehilangan banyak air dengan garam-garamnya, terutama natrium dan kalium, sehingga mengakibatkan tubuh kekeringan (dehidrasi), kekurangan kalium (hipokalemia), dan adakalanya asidosis (darah menjadi asam), yang tidak jarang berakhir dengan syok dan kematian (Tjay, 2002: 273). Obat-obat yang digunakan dalam pengobatan diare dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu, antimotilitas, adsorben, antisekresi, antibiotik, enzim, dan mikroflora usus (Sukandar, 2008: 349).

Pemakaian bahan alam terutama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk tujuan pengobatan dan pencegahan penyakit telah lama dikenal sejak dulu kala.

Bahan alam atau lebih dikenal dengan obat tradisional umumnya digunakan berdasarkan pengalaman karena itu perlu diadakan pendekatan secara formal guna memberikan data akurat tentang manfaat dan keamanan penggunaan dari bahan alam tersebut (Ma'rifin, 1993: 1).

Salah satu bahan alam yang digunakan sebagai obat antidiare adalah daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Soppeng. Tumbuhan ini menjadi tumbuhan budidaya oleh masyarakat buahnya menjadi sumber pendapatan keluarga. Selain itu, masyarakat juga secara empiris mempercayai dan sering menggunakan daun kacang gude sebagai obat tradisional untuk mengatasi gangguan diare.

Bagian tumbuhan yang digunakan untuk diare adalah daunnya, dimana kandungan kimia yang terdapat pada daun kacang gude adalah flavonoida, saponin, dan polifenol (Dalimartha, 1999: 66).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti akan menguji efek antidiare ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) pada mencit (*Mus musculus*), dengan tujuan untuk mengetahui secara ilmiah penggunaan daun kacang gude sebagai antidiare dan diharapkan akan terus dilakukan pengembangan obat tradisional daun kacang gude sehingga dapat digunakan sebagai obat herbal terstandar untuk pengobatan diare.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) memiliki efek antidiare pada mencit (*Mus musculus*)?
2. Pada konsentrasi berapa ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) dapat memberikan efek antidiare pada mencit (*Mus musculus*)?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui efek antidiare ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) terhadap mencit (*Mus musculus*).
- 2) Untuk mengetahui konsentrasi berapa ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) dapat memberi efek antidiare pada mencit (*Mus musculus*).

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diupakan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- b. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu.

- c. Hewan coba atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan ditenakkan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik.
- d. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut.
- e. Diare merupakan gejala terjadinya pengeluaran feses dengan kandungan air yang tinggi, disertai dengan peningkatan volume dan frekuensi pengeluaran feses yang tinggi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi uji efek antidiare ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) pada mencit (*Mus musculus*).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan sumbangan informasi untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional.

2. Bagi masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional, terkhusus bagi tanaman daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) sebagai obat antidiare.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) sebagai antidiare.

G. Kajian Pustaka

Dalam penelitian untuk menguji suatu senyawa memiliki efek antidiare biasanya dengan melihat mulai terjadinya diare, lama terjadinya diare, dan frekuensi diare.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh R.N. Okigbo & O.D. Omodamiro 2006. Antimicrobial Effect of Leaf Extracts of Pigeon Pea (*Cajanus cajan* L.) Millsp.) on Some Human Pathogens. Berdasarkan jurnal tersebut, dikatakan bahwa Pigeon pea, (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) telah banyak digunakan di negara-negara tropis untuk makanan. Dalam pengobatan rakyat di Nigeria, praktisi medis herbal menggunakan rebusan daun untuk pengobatan tipus, demam, diare, malaria, serta sakit perut.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan E.U. Etuk, M.O. Ugwah dkk, 2009. Ethnobotanical survey and preliminary evaluation of medical plants with antidiarrhoea properties in Sokoto state, Nigeria. Mengatakan bahwa, tanaman yang digunakan sebagai antidiare adalah (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.).

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan Cheryl Lans,2007. Comparison of plants used for skin and stomach problems in Trinidad and Tobago with Asian

ethnomedicine. Dalam jurnal tersebut, metode yang digunakan yaitu metode sampling dimana bertujuan untuk mengidentifikasi responden yang berpengetahuan di Trinidad dan Tobago. Dalam penelitian ini, ada tiga puluh responden, dimana dua puluh diantaranya diwawancarai sekali, dan sepuluh responden diwawancarai tiga atau empat kali. Hasil dari wawancara didapatkan bahwa tanaman yang digunakan dalam masalah perut adalah *Ambrosia cumanenesis*, *Aristolochia rugosa/trilobata*, *Capraria biflora*, *Dorstenia contrajerva*, *Cajanus cajan*, *Momordica charantia*, *Punica granatum*, *Brownea latifolia*, and *Cocos nucifera*.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan Linda P Suherman dkk, 2013. Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Mindi (*Melia azedarach Linn*) pada Mencit *Swiss Webster* Jantan. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode transit intestinal dan metode proteksi diare yang diinduksi oleh *Oleum Ricini*. Dari hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun mindi memiliki efek antidiare dan dosis 590 mg/kgBB menunjukkan efek terbaik pada pengujian antidiare dengan metode proteksi diare yang diinduksi oleh *Oleum Ricini* dan metode transit intestinal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman (Krishna, 2010: 315)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Rosidae
Bangsa	: Fabales
Famili	: Fabaceae
Genus	: <i>Cajanus</i>
Spesies	: <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp



Gambar 1. Tanaman kacang gude

2. Sinonim

Cajanus cajan (L.) Millsp., *C. Indicus spreng* (Dalimartha, 1999: 65)

3. Nama Daerah

Sumatera: kacang bali (Melayu), ritik lias (Batak Karo). Jawa: kacang hiris (Sunda), kacang gude, gude, kacang kayu (Jawa), kacang kayu (Madura). Bali: kekace, undis. Nusa tenggara: lebuy, legui (Sasak), kacang iris, kacang turis (Timor). Sulawesi: binatangung (Makasar), kance (Bugis). Maluku: Puwe jai (Halmahera), fou hate (Ternate, tidore) (Dalimartha, 1999: 65).

4. Morfologi Tanaman

Tanaman ini tergolong tanaman perdu tegak dengan batang berkayu; tinggi tanaman berkisar antara 0,5-5 merupakan tanaman tahunan dengan daur hidup 0,5-5 tahun. Diameter batang bisa mencapai 15 cm, sistem percabangan tegak dan menyebar dengan sudut cabang 30° - 45° . Perakaran cukup dalam kurang lebih 2 meter. Daunnya berselang seling; beranak 3 daun; ukuran daun berkisar antara 3-13,7 cm x 1,3-5,7 cm ; berbentuk oval, elips, dan delta. Bunganya tersusun dalam tandan semu, daun mahkotanya berwarna kuning atau coklat muda dengan bendera berwarna merah jingga dibagian punggungnya. Polongnya berbentuk sabit dan lurus, biji berbentuk bundar atau oval berwarna putih, coklat muda, coklat sampai hitam, polos atau kadang-kadang berbintik-bintik. Polong dan daun mudanya dapat digunakan sebagai bahan sayuran. Di pedesaan, tanaman ini banyak digunakan sebagai pagar hidup di pekarangan, di pematang sawah (Purwanto, 2007 : 57).

5. Syarat Tumbuh

Di Indonesia, kacang gude tumbuh pada daerah dengan ketinggian hingga 1.800 mdpl. Tanaman ini dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang memiliki dreinase yang baik. Keasaman (pH) yang dikehendaki berkisar antara 4,5-7,0. Namun, pH ideal bagi tanaman kacang gude adalah pH yang mendekati netral (7,0).

Kacang gude termasuk tanaman hari pendek. Suhu optimal bagi pertumbuhannya berkisar antara 18⁰ C - 29⁰ C. Tetapi, pada kelembapan dan kesuburan tanah yang cukup, kacang gude dapat tumbuh pada suhu rata-rata diatas 35⁰ C.

Tanaman ini menghendaki curah hujan sekitar 600 mm – 1.000 mm/th. Hasil produksi yang tinggi akan diperoleh bila curah hujan terjadi selama 2 bulan pertama pada masa pertumbuhannya, diikuti oleh periode kering selama pembungaan dan panen. Kacang gude toleran terhadap kekeringan. Pada kondisi kering, hasil optimal dapat dicapai pada curah hujan rata-rata 380 mm/th, jika kelembapan tanahnya cukup (Fachruddin, 2000: 54)

6. Khasiat

Daun kacang gude berkhasiat untuk mengatasi sakit kuning, sakit di dalam mulut, batuk, diare, serta gangguan perut. Sedangkan akar berkhasiat untuk mengatasi cacingan, batuk berdahak serta luka. Adapun biji kacang gude sendiri berkhasiat untuk memar (Dalimartha, 1999: 66).

7. Kandungan kimia

Daun gude mengandung flavaniod, saponin, dan polifenol. Sedangkan batang mengandung flavanoid, saponin, serta tanin (Dalimartha, 1999: 66).

B. Uraian Hewan Uji Mencit

1. Klasifikasi (Malole, 1989: 94).

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub-filum	: Vertebrata
Class	: Mamalia
Orde	: Rodentia
Sub-ordo	: Myomorpha
Familia	: Muridae
Sub-familia	: Murinae
Genus	: <i>Mus</i>
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Data biologis (Smith, 1988: 11-12)

Lama hidup	: 1-2 bulan, bisa sampai 3 tahun
Lama produksi ekonomis	: 9 bulan
Lama bunting	: 19-21 hari
Kawin sesudah beranak	: 1 sampai 24 jam
Umur disapih	: 21 hari
Umur dewasa	: 35 hari

Umur dikawinkan	: 8 minggu (jantan dan betina)
Siklus kelamin	: poliesterus
Siklus esterus (berahi)	: 4-5 hari
Lama esterus	: 12-14 jam
Perkawinan	: pada waktu estrus
Ovulasi	: dekat akhir periode estrus, spontan
Fertilisasi	: 2 jam sesudah kawin
Segmentasi ovum menjadi blastosel	: 2,5-4,0 hari
Implantasi	: 4-5
Berat dewasa	: 20-40 g jantan; 18-35 betina
Berat lahir	: 0,5-1,0 g
Jumlah anak	: rata-rata 6, bisa 15
Suhu (rektal)	: 35 ⁰ -39 ⁰ C (rata-rata 37,4 ⁰ C)
Pernapasan	: 140-180/menit, turun menjadi 80 dengan anastesi, naik sampai 230 dalam stress
Denyut jantung	: 600-650/menit, turun menjadi 350 dengan anastesi, naik sampai 750 dalam stress
Tekanan darah	: 130-160 sistol; 102-110 diastol, turun menjadi 110 sistol, 30 diastol dengan

	anastesi
Konsumsi oksigen	: 1,38-4,48 ml/g/jam
Sel darah merah	: 7,7-12,5 x 10 ⁶ /mm ³
Sel darah putih	: 5,0-12,6 x 10 ³ /mm ³
Neutrofil	: 12-30 %
Limfosit	: 55-5 %
Monosit	: 1-12 %
Eosinofil	: 0,2-4,0 %
PCV	: 41-48 %
Trombosit	: 150-400 x 10 ³ /mm ³
Hb	: 13-16 g/100 ml
Protein plasma	: 4,0-6,8 g/100 ml
ALT (SGPT)	: 2,1-23,8 IU/liter
ASG (SGOT)	: 23,2-48,4 IU/liter
Kolesterol serum	: 26,0-82,4 mg/100 ml
Air kencing	: 25-50 ml/kg/hari
Susu	: air 75%, lemak 10-12%, protein 10%, gula 3%
Putting susu	: 10 putting, 3 pasang di daerah dada, 2 pasang di daerah perut
Plasenta	: diskoidal hemokorial

Uterus	: 2 kornu, bermuara sebelum serviks
Perkawinan kelompok	: 4 betina 1 jantan
Kromosom	: $2n=40$
Aktivitas	: nokturnal (malam)
Gigi	: $\frac{1003}{1033}$ gigi seri tumbuh terus
Kecepatan tumbuh	: 1 g/hari
Imunitas pasif	: terutama melalui usus hingga umur 17 hari, juga melalui kantung kuning telur

C. Uraian Ekstraksi dan Maserasi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian-bagian tanaman, hewan atau beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Komponen kimia yang terdapat pada tanaman, hewan, dan beberapa jenis ikan pada umumnya mengandung senyawa-senyawa yang mudah larut dalam pelarut organik. Pelarut organik yang paling umum digunakan untuk mengekstraksi adalah methanol, etanol, kloroform, heksan, eter, aseton, benzen, dan etil asetat. (Dirjen POM, 1986: 9).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyaring simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari. Ekstrak kering harus mudah di gerus menjadi serbuk (Ditjen 1979).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan

menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara normal yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan diluar sel mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone,1987).

Pembuatan ekstrak dari sampel biasanya menggunakan metode maserasi yang merupakan cara penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Remaserasi adalah cairan penyari dibagi dua seluruh serbuk simplisia di maserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah di endapkan dan diperas, dimaserasi lagi dengan cairan penyari kedua.

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin dan lain-lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan yang mudah diusahakan dan peralatan yang digunakan juga sederhana. Sedangkan kerugiannya adalah pengerjaan lama dan penyariannya kurang sempurna.

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat yang halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari kemudian ditutup dan biarkan selama 5 hari terlindung dari

cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Pengadukan ini bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel.

Setelah 5 hari, sari dikerai dan ampas diperas. Ampas kemudian ditambah cairan penyari secukupnya kemudian diaduk dan dikerai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana kemudian ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, guna mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan yang ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lain-lain. Setelah itu endapan dipisahkan (Dirjen, 1986: 10-14).

D. Uraian Diare

1. Defenisi Diare

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya (normal 100-200 ml per jam tinja), dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair (setengah padat), dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat (Sulaiman, dkk 1990: 21). Dalam definisi lain diare adalah buang air besar encer atau cairan lebih dari tiga kali sehari (Mansjoer, 2001).

2. Patofisiologi Diare

Proses terjadinya diare dipengaruhi dua hal pokok, konsistensi feses dan motilitas usus, umumnya terjadi akibat pengaruh keduanya. Gangguan proses mekanik dan enzimatik, disertai gangguan mukosa, yang akan mempengaruhi

pertukaran air dan elektrolit sehingga mempengaruhi konsistensi feses yang terbentuk. Peristaltik saluran cerna yang teratur akan mengakibatkan proses cerna secara enzimatik berjalan baik. Sedangkan peningkatan motilitas berakibat terganggunya proses cerna secara enzimatik, yang akan mempengaruhi pola defekasi (Mansjoer,2001).

Terdapat empat mekanisme patofisiologi yang mengganggu keseimbangan air dan elektrolit yang mengakibatkan terjadinya diare (Sukandar,dkk 2008), yaitu :

- a. Perubahan transport ion aktif yang disebabkan oleh penurunan absorpsi natrium atau peningkatan sekresi klorida.
- b. Perubahan motilitas usus.
- c. Peningkatan osmolaritas luminal.
- d. Peningkatan tekanan hidrostaltik jaringan

Mekanisme tersebut sebagai dasar penggolompokan diare secara klinik (Sukandar,dkk 2008), yaitu:

- a. Secretory diarrhea, terjadi ketika senyawa yang strukturnya mirip (contoh: Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) atau toksin bakteri) meningkatkan sekresi atau menurunkan absorpsi air dan elektrolit dalam jumlah besar.
- b. Osmotik diarrhea, disebabkan oleh absorpsi zat-zat yang mempertahankan cairan intestinal.

- c. Eksudative diarrhea, disebabkan oleh penyakit infeksi saluran pencernaan yang mnegeuarkan mukus protein atau darah ke dalam saluran pencernaan.
- d. Motilitas usus dapat berubah dengan mengurangi waktu kontak di usus halus, pengosongan usus besar yang prematur dan pertumbuhan bakteri yang berlebihan

3. Klasifikasi Diare

Banyak macam klasifikasi diare, diantaranya Mellinkoff yang membaginya menurut gangguan faal dan Moses yang membaginya menurut etiologinya (Hadi, 2002: 40).

Klasifikasi diare berdasarkan gangguan faal, yaitu sebagai berikut:

- a. Dorongan di dalam usus normal yang terlalu cepat, yang dapat disebabkan oleh rangsangan saraf yang abnormal yang biasanya terdapat pada *psychogenic diarrhea* atau keracunan *mecholyl* dan pengaruh zat kimia terhadap motilitas yang abnormal misalnya pada sindroma karsinoid, penyakit *Addison's*, dan *Thirotoksikosis*. Selain itu, biasa juga disebabkan oleh iritasi pada intestin misalnya pada pemakaian oleum ricini, kolitis ulserativa, perikolil abses, amebiasis, uremik kolitis, dan lain-lain serta biasa juga oleh hilangnya simpanan dikolon misalnya pada destruksi sphincterani, ileostomi, dan lain-lain (Hadi, 2002: 40).
- b. Gangguan pencernaan makanan yang dapat disebabkan oleh hilangnya fungsi reservoir dari lambung misalnya pada postgastrektomi yang menimbulkan sindroma dumping, penyakit pankreas, insufisiensi sepanjang intestin, serta

kemungkinan adanya sekresi abnormal dari HCl misalnya pada sindroma Zollinger Ellison (Hadi, 2002: 40).

- c. Absorpsi abnormal pada pencernaan makanan, misalnya pada penyakit hati, penyakit pada intestin, dan obstruksi mesentrik (pada karsinomatosis atau pada TBC) (Hadi, 2002: 40).

Sedangkan klasifikasi diare berdasarkan etiologinya atau penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Infeksi, misalnya pada infeksi oleh parasit (*amebiasis, balantidiasis, helmintiasis*), infeksi oleh bakterial (*basiler disentri, para cholera El Tor, salmonellois, tuberculous, enterokolitis escheria coli, staphylococcus enterokolitis*), dan infeksi oleh enteroviral (*virus gastroenteritis*) (Hadi, 2002: 40-41).
- b. Keracunan makanan, misalnya karena toksin bakteri (*botulisme, enterotoksin staphylococcus*) atau karena toksin yang dikeluarkan oleh makanan itu sendiri (Hadi, 2002: 41).
- c. Obat-obatan, misalnya post antibiotik diare yang dapat terjadi pada penderita yang dirawat di rumah sakit dan mendapati terapi dengan antibiotika yang lama sehingga bakteri sudah resisten terhadap antibiotika. Diare bisa juga timbul secara sekunder karena dosis berlebihan dari quinidin, colchicin, digitalis, reserpin, laktasif, dan obat-obatan lain lagi (Hadi, 2002: 41).
- d. Diare yang etiologinya atau penyebabnya tidak pasti, misalnya *pseudomembranous enterocolitis* (Hadi, 2002: 41)

- e. Diare psikogenik (Hadi, 2002: 41).
- f. Keadaan lain yang berhubungan dengan diare kronis, misalnya pada sindroma Zollinger Ellison, karsinoma dari pankreas dengan steatore, pankreatitis kronis dengan steatore, tropical sprue, cirrhosis hepatis dengan steatore, intestinal amyloidosis, diabetes mellitus dengan neuropati dan steatore, fistula gastrojejunokolik, gastroileostomi (*iatrogenic*), reseksi gaster dengan atau tanpa vagotomi, enteritis regionalis, tuberculosis enteritis, ileokolitis, kolitis ulserativa, divertikulitis dari kolon, pellagra, penyakit Addison's, hiperthyroidi, alkoholisme, uremi, dan lain-lain (Hadi. 2002: 41-42).

Selain itu, ada pula pembagian diare berdasarkan mula dan lamanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Diare akut

Diare akut adalah diare yang jelas mulainya dan kemudian dapat sembuh kembali dengan normal dalam waktu yang relatif singkat, dalam beberapa jam sampai 7 atau 14 hari (Sulaiman, dkk 1990: 21; Mansjoer, dkk 2001: 500).

Infeksi merupakan penyebab utama diare akut, baik oleh bakteri, parasit, maupun oleh virus. Penyebab lain dapat menimbulkan diare akut adalah toksin dan obat, nutrisi enteral diikuti puasa yang berlangsung lama, kemoterapi, impaksi fekal (*overflow diarrhea*), atau berbagai kondisi lain (Mansjoer dkk, 2001: 500).

Diare akibat infeksi terutama ditularkan secara oral. Hal ini disebabkan oleh masukan makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja ditambah dengan ekskresi

yang buruk, makanan yang tidak matang, bahkan yang disajikan tanpa dimasak. Penularannya adalah transmisi dari orang ke orang melalui aerosolisasi (norwalk, rotavirus), tangan yang terkontaminasi (*clostridium difficile*), atau melalui aktivitas seksual. Faktor penentu terjadinya diare akut adalah faktor penyebab (agent) dan faktor pejamu (host). Faktor pejamu adalah kemampuan pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme, yaitu faktor daya tahan tubuh atau lingkungan lumen saluran cerna, seperti keasaman lambung, motilitas usus. Faktor penyebab yang mempengaruhi pathogenesis antara lain daya penetrasi yang merusak mukosa, kemampuan memproduksi toksin yang mempengaruhi sekresi cairan di usus, serta daya lekat kuman yang nantinya akan membentuk koloni-koloni yang dapat menginduksi diare (Mansjoer dkk, 2001: 501).

b. Diare kronik

Diare kronik berarti diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare (ini berlaku pada bayi dan anak) atau yang berlangsung lebih dari tiga minggu sejak awal diare (ini berlaku pada orang dewasa). Batasan waktu tersebut semata-mata suatu kesepakatan, karena banyaknya usulan untuk menentukan batas waktu diare kronik (Sulaiman dkk, 1990: 21; Mansjoer dkk, 2001: 504).

Diare kronik memiliki penyebab yang bervariasi dan tidak seluruhnya diketahui. Untuk menentukan penyebabnya, banyak sarjana yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya, ada yang membagi diare kronik berdasarkan atas etiologi, atau berdasarkan atas lokasi anatomi. Kesulitan lainnya adalah banyak macam bentuk

diare yang penyebabnya dapat menimbulkan kelainan tidak hanya di satu tempat saluran cerna saja. Sebagai contoh adalah diare yang disebabkan oleh infeksi, dapat menyebabkan kelainan sebagian besar dari saluran cerna yaitu menyebabkan kelainan di usus halus dan usus besar. Kemungkinan lainnya yaitu timbulnya faktor yang dapat menyertai dan mempengaruhinya, misalnya kelainan endokrin, faktor defisiensi, faktor konstitusi, dan faktor nerologis, yang dapat mempengaruhi kondisi penderita (Mansjoer dkk, 2001: 504; Hadi, 2002: 43).

4. Penanganan dan terapi diare

Terapi diare harus disesuaikan dengan penyebabnya. Diare perjalanan dan diare musim panas akut merupakan penyakit yang sembuh sendiri (self limiting disease) dan tidak memerlukan penanganan dengan obat-obat khusus (Mutschler 1991,5: 542).

Penanganan teraupetik yang terpenting adalah penggantian cairan dan elektrolit secukupnya. Pada umumnya cukup diberikan limun yang mengandung gula secara oral dengan penambahan garam dapur atau diberikan larutan glukosa-elektrolit yang diminum (20 g glukosa, 3,5 g NaCl, 2,5 g NaHCO₃, 1,5 g KCl, air ditambahkan hingga 1000 ml). Pada kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar, perlu diberi substitusi secara parenteral (Mutschler 1991, 5: 542).

Secara umum, prinsip pengobatan diare yakni, temukan penyebab dan obati penyebabnya (pengobatan kuasatif), tekan peristaltik, dan pengobatan dampak

diare (nyeri perut, dehidrasi, dan lain-lain) (Sutedjo,2008: 212). Adapun kelompok obat yang sering digunakan pada diare, adalah :

- a. Kemoterapeutika; untuk terapi kausal, yakni memberantas bakteri penyebab diare, seperti antibiotika, sulfonamide, kinolon dan furazolidon (Tan, 2002: 285).
- b. Obstipansia; untuk terapi simptomatis yang dapat menghentikan diare dengan beberapa cara, yaitu :
 - 1) Zat-zat penekan peristaltik, misalnya candu dan alkaloidnya, derivat-derivat petidin (difenoksilat dan loperamida) dan antikolinergika (atropin, ekstrak belladonna). Zat-zat ini akan memberikan lebih banyak waktu untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus (Tan, 2002: 285).
 - 2) Adstringensia, misalnya asam samak (tannin) dan tannalbumin, garam-garam bismuth, dan alumunium. Zat-zat ini mampu menciutkan selaput lender (Tan, 2002: 285).
 - 3) Adsorbensia, misalnya carbo adsorbens yang pada permukaannya dapat menyerap (adsorpsi) zat-zat beracun (toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau ada kalanya berasal dari makanan itu sendiri (udang, ikan). Selain itu, zat-zat lendir yang menutupi selaput lender usus dan luka-lukanya dengan suatu lapisan pelindung atau biasa disebut mucilagines, contohnya seperti kaolin, peksin (suatu karbohidrat yang terdapat antara lain dalam buah apel), dan garam-garam bismuth serta alumunium (Tan, 2002: 285).

- c. Spasmolitika, misalnya papaverin dan oksifenonium. Zat-zat ini dapat melepaskan kejang-kejang otot yang sering kali mengakibatkan nyeri perut pada diare (Tan, 2002: 285).

E. Uraian Minyak Jarak

Minyak jarak (*castor oil-oleum ricini*) adalah minyak lemak yang diperoleh dengan cara memeras biji *Ricinus communis*, L. dari suku *Euphorbiaceae* (Wiryowidagdo, 2007: 204), suatu trigliserida asam risinoleat dan asam lemak tidak jenuh (Ganiswarna, 2007: 526).

Minyak jarak medicinal adalah cairan tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, berbau lemah, dan rasa sedikit menggigit, serta viskositasnya tinggi. Minyak jarak mengandung 46% - 53% minyak lemak yang terdiri atas 80% gliserida asam-asam risinoleat, isoresinoleat, stearat, dihidroksi stearat, dan palmitat; 20% protein, zat toksik risin, dan $\pm 0,2\%$ alkaloid piridin beracun risinin, serta enzim lipase (Wiryowidagdo, 2007: 205).

Minyak kastor diubah dalam usus halus menjadi asam risinoleat yang sangat iritatif terhadap usus dan segera meningkatkan peristaltik (Mycek, dkk 2001: 248). Di dalam usus halus minyak jarak atau oleum ricini dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam risinoleat. Asam risinoleat inilah yang merupakan bahan aktif (Ganiswarna, 2007: 526), yang memiliki efek stimulasi terhadap usus halus. Setelah 2-8 jam timbul defekasi yang cair (Tan, 2002: 287). Obat ini merupakan

bahan induksi diare pada penelitian diare secara eksperimental pada tikus (Ganiswarna, 2007: 526).

Minyak jarak juga digunakan sebagai purgatif. Daya kerja sebagai purgatif disebabkan oleh kandungan asam risinoleat bebas sebagai hasil hidrolisis gliserida oleh enzim lipase. Dengan membentuk garam alkali, senyawa ini merangsang pembebasan prostaglandin atau histamin yang menstimulasi peristalsis (Wiryowidagdo, 2007: 205), dengan mengiritasi ujung-ujung syaraf sensoris pada mukosa usus (Sutedjo, 2008: 212).

F. Uraian Loperamid

Loperamid merupakan derivat defenoksilat dan haloperidol, suatu antipsikotikum dengan khasiat obstipasi yang 2-3 kali lebih kuat terapi tanpa efek khasiat terhadap sistem saraf pusat, sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan. Lagipula zat ini mampu menormalkan keseimbangan resorpsi-sekresi dari sel-sel mukosa, yaitu memulihkan sel-sel yang berada dalam keadaan hipersekresi ke keadaan resorpsi normal kembali. Mulai kerjanya lebih cepat, juga bertahan lebih lama (Tan, 2002: 278).

Seperti defenoksilat, obat ini memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus (Ganiswarna, 2007). Obat ini memiliki efek seperti opioid pada usus, mengaktifkan reseptor opioid presinaptik di dalam sistem saraf enterik untuk menghambat pelepasan asetilkolin dan menurunkan peristaltik (Mycek, 2001: 248).

Efek samping yang sering dijumpai ialah kolik abdomen, sedangkan toleransi terhadap efek konstipasi jarang sekali terjadi. Pada sukarelawan yang mendapatkan dosis besar loperamid, kadar puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 4 jam sesudah makan obat. Masa laten yang lama ini disebabkan oleh penghambatan motilitas saluran cerna dan obat mengalami sirkulasi enterohepatik. Waktu paruhnya adalah 7-14 jam. Loperamid tidak diserap dengan baik melalui pemberian oral dan pentrasinya ke dalam otak tidak baik; sifat-sifat ini menunjang selektivitas kerja loperamid. Sebagian besar obat diekskresinya bersama tinja. Kemungkinan disalahgunakannya obat ini lebih kecil dari pada defenoksilat karena tidak menimbulkan euphoria seperti morfin dan kelarutannya rendah (Ganiswarna, 2007: 221-222).

Dosis: pada diare akut dan kronis: permulaan 2 tablet dari 2 mg, lalu setiap 2 jam 1 tablet sampai maksimal tablet seharinya. Anak-anak sampai tahun 2-3 dd 0,1 setiap kg bobot badan, anak-anak 8-12 tahun: pertama kali 2mg, maksimal 8-12 mg sehari. Tidak boleh diberikan pada anak-anak dibawah usia 2 tahun, karena fungsi hatinya belum berkembang dengan sempurna untuk dapat menguraikan obat ini (Tan, 2002: 278).

G. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat

Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang memberi motivasi agar manusia belajar meneliti tentang alam semesta dan isinya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk ciptaan-Nya yang lain, karena tidak ada yang diciptakan oleh

Allah swt. dengan sia-sia. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. yang terdapat dalam QS. Al-‘Alaq/96: 1-5 berikut.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah yang Maha Mulia. Yang Mengajar (manusia) dengan pena. Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Departemen Agama RI, 2008: 597)

Kata *iqra'* terambil dari kata kerja *qara'a* yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian kata tersebut, Anda telah menghimpunnya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya, dalam kamus ditemukan aneka ragam arti kata tersebut. Antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun (Shihab, 2009: 454).

Ayat di atas tidak menyebutkan objek bacaan dan Jibril ketika itu tidak juga membaca satu teks tertulis dan karena itu dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Nabi saw. bertanya: *ma aqra'* apakah saya harus baca? (Shihab, 2009: 454).

Beraneka ragam pendapat para ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa itu wahyu-wahyu Al-Quran sehingga perintah itu dalam arti bacalah wahyu-wahyu Al-Quran ketika dia turun nanti. Ada

juga yang berpendapat objeknya adalah *ismi Rabbika* sambil menilai huruf *ba'* yang menyertai kata *ismi* adalah sisipan sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu atau berzikirlah. Tapi jika demikian mengapa Nabi saw. menjawab: “Saya tidak dapat membaca”. Seandainya yang dimaksud adalah perintah berzikir tentu beliau tidak menjawab demikian karena jauh sebelum datang wahyu beliau telah senantiasa melakukannya (Shihab, 2009: 455).

Huruf *ba'* pada kata *bismi* ada juga yang memahaminya sebagai berfungsi penyertaan atau *mulabasah* sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti “bacalah disertai dengan nama Tuhanmu” (Shihab, 2009: 455).

Kata *Rabb* seakar dengan kata *tarbiyah*/pendidikan. Kata ini memiliki arti yang berbeda-beda namun pada akhirnya arti-arti itu mengacu pada pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan, serta perbaikan. Kata *rabb* maupun *tarbiyah* berasal dari kata *raba-yarbu* yang dari segi pengertian kebahasaan adalah kelebihan (Shihab, 2009: 456-457).

Kata *Rabb* apabila berdiri sendiri maka yang dimaksud adalah “Tuhan” yang tentunya antara lain karena Dia-lah yang melakukan *tarbiyah* (pendidikan) yang pada hakikatnya adalah pengembangan, peningkatan, serta perbaikan makhluk ciptaan-Nya (Shihab, 2009: 457).

Kata *khalafa* dari segi pengertian kebahasaan memiliki sekian banyak arti, antara lain menciptakan (dari tiada), menciptakan (tanpa satu contoh terlebih dahulu), mengukur, memperhalus, mengatur, membuat, dan sebagainya. Kata ini biasanya

memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaan-Nya (Shihab, 2009: 458).

Setelah memerintahkan membaca dengan meningkatkan motivasinya, yakni dengan nama Allah, kini ayat ketiga memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah atas manfaat membaca itu. Allah berfirman: “*Bacalah berulang-ulang dan Tuhan Pemelihara dan Pendidik-mu Maha Pemurah sehingga akan melimpahkan aneka karunia*” (Shihab, 2009: 460).

Ayat ketiga di atas mengulangi perintah membaca. Ulama berpendapat tentang tujuan pengulangan itu. Ada yang menyatakan bahwa perintah pertama ditujukan kepada pribadi Muhammad saw., sedang yang kedua kepada umatnya, atau yang pertama untuk membaca dalam shalat, sedang yang kedua di luar shalat. Pendapat ketiga menyatakan yang pertama perintah belajar, sedang yang kedua adalah perintah mengajar orang lain. Ada lagi yang menyatakan bahwa perintah kedua berfungsi mengukuhkan guna menanamkan rasa “percaya diri” kepada Nabi Muhammad saw., tentang kemampuan beliau membaca karena tadinya beliau tidak pernah membaca (Shihab, 2009: 460).

Kata *al-akram* biasa diterjemahkan dengan yang mahal/paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari kata *karama* yang antara lain berarti: memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia, dan sifat kebangsawanan (Shihab, 2009: 461).

“Bacalah, wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu akan menganugerahkan dengan sifat kemurahan-Nya pengetahuan tentang apa yang tidak engkau ketahui. Bacalah dan ulangi bacaan tersebut walaupun objek bacaannya sama, niscaya Tuhanmu akan memberikan pandangan serta pengertian baru yang tadinya belum engkau peroleh pada bacaan pertama dalam objek tersebut.” “Bacalah dan ulangi bacaan, Tuhanmu akan memberikan manfaat kepadamu, manfaat yang tidak terhingga karena Dia Akram, memiliki segala macam kesempurnaan.” (Shihab, 2009: 462).

Disini kita dapat melihat perbedaan antara perintah membaca pada ayat pertama dan perintah membaca pada ayat ketiga, yakni pertama menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca (dalam segala pengertian), yaitu membaca demi karena Allah, sedang perintah yang kedua menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut (Shihab, 2009:462).

Dalam ayat ketiga ini, Allah menjanjikan bahwa pada saat seseorang membaca dengan ikhlas karena Allah, Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru walaupun yang dibacanya itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat jelas. Kegiatan “membaca” ayat Al-Quran menimbulkan penafsiran-penafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah ada. Demikian juga, kegiatan “membaca” alam raya ini telah menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasia-rahasia alam, walaupun objek bacaannya itu-itu juga. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh generasi terdahulu dan alam raya yang mereka huni, adalah

sama tidak berbeda, namun pemahaman mereka serta penemuan rahasianya terus berkembang (Shihab, 2009: 463).

Allah swt. memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw., Sang utusan Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barangsiapa menyelidiki seluk-beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya di sekitarnya, akan mengenali kebijakan, ilmu, dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004). Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran/3: 190-191 berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama RI, 2008: 75)

Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah Yang Maha Hidup Lagi Qayyum (Maha Menguasai dan Maha Mengelola Sesuatu). Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja

langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi dan porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda ke-Mahakuasaan Allah bagi *ulul albab*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang ke-Esaan dan ke-Kuasaan Allah swt. (Shihab, 2009).

Ulul albab yang disebutkan pada ayat adalah orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: *“Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Maha Suci Engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka maka peliharalah kami dari siksa neraka”* (Shihab, 2009).

Di atas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedang objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada *qalbu*, sedang pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir (Shihab, 2009).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencari, memahami, menemukan, dan meneliti alam semesta dan isinya akan dianugerahi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap daun tanaman kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) dengan harapan daun tanaman ini dapat digunakan sebagai antidiare sehingga penemuan di bidang obat-obatan dapat semakin berkembang.

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt. yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan di bumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya dibutuhkan ilmu pengetahuan, dengan itu manusia sebagai khalifah dapat mengambil manfaat dari ciptaan Allah swt. terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Quran Surah Thaahaa/20: 53 berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Departemen Agama RI, 2008: 316)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagai mana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dan kata *azwaj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nenas, palem, dan lain-lain (Shihab, 2006).

Dalam buku Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, menjelaskan bahwa “Dan yang menurunkan air dari langit, kemudian Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”. Maksudnya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan, ada yang masam, manis, pahit, dan yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan (Shafiyyurrahman, 2001).

Dari ayat di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt. memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan salah satunya adalah daun tanaman kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya adalah dalam pemanfaatannya sebagai antidiare.

Allah menciptakan bumi yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan yang baik, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Tumbuhan menghasilkan zat-zat seperti vitamin, minyak, dan masih banyak lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat suatu penyakit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan pula obat untuknya."

Hadis ini menegaskan adanya obat bagi setiap macam penyakit. Ini berarti bahwa manusia apabila ingin mencari pengobatan, pasti akan menemukan. Selain itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang ingin mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya (Abdel, 2012).

Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Adil yang menciptakan suatu penyakit beserta obatnya. Hal itu akan diketahui manusia dengan adanya ilmu. Ilmu pengetahuanlah yang akan menuntun manusia untuk menemukan obat-obatan dari suatu penyakit. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, maka tidak akan pernah tahu bahwa Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ada berbagai obat yang telah tersedia di alam dan seringkali disebut tanaman (herbal) (Farooqi, 2005).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, baik itu penyakit yang

muncul pada zaman nabi maupun sesudah nabi. Segala jenis penyakit pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bisa sembuh dengan izin Allah swt. (Hawari, 1997).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit memiliki obat dan obat yang diberikan harus sesuai dengan penyakitnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berusaha dan mencari tahu, meneliti obat untuk memperoleh pengobatan yang sesuai. Namun, tidak lupa bahwa kesembuhan dari suatu penyakit hanya karena izin Allah swt.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara satu variable dengan variable lainnya dalam kondisi penelitian yang terkontrol, untuk menjelaskan hubungan ini, penelitian harus melakukan control dan pengukuran dengan sangat cermat terhadap variable-variabel penelitiannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Farmakologi Farmasi, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan Juli.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi : Tanaman Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L) Millsp) dari Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sampel : Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L) Millsp) yang diambil di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel diambil pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Adapun alat-alat yang digunakan, corong pisah, eksikator (*Lion Star*[®]), gelas ukur 10 ml (*Pirex Iwaki*[®]), gelas ukur 100 ml (*Pirex Iwaki*[®]) kain putih, kandang mencit, kipas angin (*Sekai*[®]), lap halus, lap kasar, lumpang, neraca analitik (*Kren*[®]), oven (*Memmert*[®]), pipet tetes, sendok tanduk, silika gel, spatel, spoit 1 ml, toples, dan wadah.

2. Bahan yang digunakan

Bahan penelitian berupa dauh kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) yang diperoleh dan dikumpulkan dari Desa Jampu Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, Aquadest, sediaan obat loperamid sebagai pembanding, etanol 70%, Na-CMC 1%, dan Oleum ricini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

Daun kacang gude yang telah dikumpulkan kemudian dicuci bersih, lalu dikeringkan di udara terbuka terlindung dari cahaya matahari langsung. Setelah kering, daun tersebut dihaluskan hingga diperoleh serbuk simplisia.

2. Ekstraksi Sampel

Sebanyak 500 g serbuk simplisia daun kacang gude dimasukkan kedalam wadah maserasi kemudian ditambahkan pelarut etanol 70% sampai terendam

seluruhnya (± 2 cm di atas permukaan sampel). Disimpan ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Setelah 3 x 24 jam disaring, dipisahkan antara filtrat dan ampas. Selanjutnya dengan dengan cara yang sama ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol 70%. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat yang diperoleh kemudian di rotavapor dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol yang kental. Setelah itu, ekstrak etanol dibebaskan dengan penambahan air ke dalam ekstrak lalu diuapkan. Ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

3. Pembuatan Larutan Koloidal Na-CMC 1% b/v

Sebanyak 100 ml aquadest dipanaskan pada suhu 70°C dimasukkan Na-CMC sebanyak 1 gram sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk elektrik hingga terbentuk larutan koloid yang homogen.

4. Pembuatan Suspensi Loperamid HCl

Suspensi loperamid dibuat dengan menggerus didalam lumpang tablet Loperamid dosis 2mg/tablet sebanyak 20 tablet. Kemudian ditimbang serbuk Loperamid sebanyak 7,5 mg, kemudian ditambahkan 10 ml larutan koloidal Na-CMC 1% b/v sedikit lalu digerus hingga homogen.

5. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude

Suspensi ekstrak dibuat masing-masing 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB. Untuk membuat suspensi ekstrak etanol 50 mg/kgBB yaitu dengan cara

ditimbang ekstrak sebanyak 7,5 mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml larutan koloidal Na-CMC 1% b/v sedikit lalu digerus hingga homogen.

Untuk membuat suspensi ekstrak etanol 100 mg/kgBB yaitu dengan cara ditimbang ekstrak sebanyak 30 mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml larutan koloidal Na-CMC 1% b/v sedikit lalu digerus hingga homogen. Adapun untuk membuat suspensi ekstrak etanol 200 mg/kgBB yaitu dengan cara ditimbang ekstrak sebanyak 60 mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml larutan koloidal Na-CMC 1% b/v sedikit lalu digerus hingga homogen.

E. Penyiapan Hewan Uji

1. Pemilihan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian adalah mencit (*Mus musculus*) yang dewasa dan sehat dengan berat rata-rata 30 g.

2. Penyiapan Hewan Uji

Mencit yang digunakan dalam penelitian sebanyak 15 ekor, dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok percobaan. Kelompok 1 sebagai control negatif, kelompok 2 sebagai pembanding, kelompok 3, 4, dan 5 sebagai perlakuan.

F. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Parameter yang digunakan yaitu saat mulai terjadi diare, lama terjadinya diare, dan frekuensi feses. Konsentrasi yang digunakan yaitu 50mg/kgBB, 100mg/kgBB, dan 200mg/kgBB. Sebagai pembanding suspensi Loperamid HCl dan kontrol suspensi Na-CMC 1% b/v.

Urutan perlakuan sebagai berikut :

- a) Mencit diadaptasi dengan lingkungan penelitian selama satu minggu.
- b) Satu jam sebelum penelitian mencit dipuasakan, selanjutnya dikelompokkan menjadi 5 kelompok masing-masing 3 ekor.
- c) Satu jam setelah dipuasakan, masing-masing kelompok diberi perlakuan, yaitu kelompok I diberi suspensi Na-CMC 1% sebagai kontrol, kelompok II diberikan suspensi Loperamid HCl sebagai pembanding, Kelompok III diberikan suspensi ekstrak etanol daun kacang gude konsentrasi 50 mg/kgBB, kelompok IV diberikan suspensi ekstrak etanol daun kacang gude konsentrasi 100 mg/kgBB, dan kelompok V diberikan suspensi ekstrak etanol daun kacang gude konsentrasi 200 mg/kgBB. Semua perlakuan diberikan secara oral.
- d) Satu jam setelah pemberian perlakuan, semua mencit diberi Oleum ricini secara oral kemudian diamati mulai terjadi diare, lama terjadinya diare, dan frekuensi feses tiap 30 menit selama 5 jam.


Cara pengamatan parameter:

- a) Diare ditandai dengan buang air besar dimana frekuensinya meningkat dari keadaan normal dan konsistensi feses yang lebih lembek atau cair.
- b) Saat mulai terjadinya diare, caranya dengan mencatat waktu mula-mula terjadinya diare (dalam menit) setelah pemberian oleum ricini.
- c) Lama terjadinya diare, caranya dengan mencatat selisih waktu terakhir terjadinya diare dengan waktu mula-mula terjadinya diare dalam menit.

d) Frekuensi diare, caranya dengan menghitung berapa kali terjadi diare selama pengamatan.

G. Analisis Data

Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan metode ANOVA menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.



BAB IV

HASIL DAN PENGAMATAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan terhadap waktu mulai terjadinya diare, lama terjadinya diare, dan frekuensi diare, dari masing-masing mencit pada setiap kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengamatan efek antidiare ekstrak etanol daun kacang gude pada mencit.

Sampel Uji	Replikasi	Mulai Terjadinya Diare (Menit)	Lama Terjadinya Diare (Menit)	Frekuensi Diare (Kali)
Na-CMC 1%	I	15	257	17
	II	20	263	14
	III	35	234	17
	Rata-Rata	23,3	251,3	16
Loperamid HCl	I	62	85	4
	II	55	15	2
	III	57	50	3
	Rata-Rata	58	50	3
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 50mg	I	35	239	12
	II	39	231	6
	III	27	244	9
	Rata-Rata	33,6	238	9
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 100mg	I	45	174	5
	II	42	194	7
	III	34	190	9
	Rata-Rata	40,3	186	7
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 200mg	I	50	133	9
	II	47	128	4
	III	49	132	2
	Rata-Rata	48,6	131	5

B. Pembahasan

Daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) merupakan salah satu tanaman yang dipercaya secara empiris oleh masyarakat Soppeng sebagai tanaman obat tradisional untuk mengatasi diare. Kandungan yang terkandung dalam daun kacang gude yaitu flavanoid, saponin, dan polifenol.

Penyarian bahan aktif dilakukan dengan cara maserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 x 24 jam, metode maserasi merupakan metode dengan cara dingin untuk mengekstraksi simplisia termasuk kandungan yang tidak tahan pemanasan sehingga dapat menghasilkan komponen kimia yang optimal. Kemudian ampasnya diekstraksi kembali menggunakan pelarut yang sama, sehingga diperoleh ekstrak etanol 70%. Digunakan pelarut etanol 70% karena pelarut etanol 70% mempunyai sifat semi polar yang dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Setelah itu ekstrak diupkan hingga diperoleh ekstrak daun kacang gude.

Pada penelitian ini, mencit mula-mula dipuasakan selama satu jam untuk memberikan ruang yang cukup dalam lambung untuk pemberian perlakuan. Kemudian setelah dipuasakan mencit diberikan perlakuan kelompok Na-CMC 1%, kelompok Loperamid HCl, kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 50mg/kgBB, kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 100mg/kgBB, kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 200mg/kgBB. Variasi dosis 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB yang digunakan bertujuan untuk mengetahui dosis pemberian yang tepat terhadap penurunan diare. Satu jam kemudian semua kelompok perlakuan diinduksi

dengan Oleum Ricini. Digunakan Oleum Ricini karena pada Oleum Ricini memiliki efek pencahar yang disebabkan oleh kandungan trigliserida asam risinolat yang dihidrolisis di dalam usus halus oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam risinoleat. Asam risinoleat inilah yang akan menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta mempercepat transit di usus. Kemudian setelah pemberian Oleum Ricini, dilakukan pengamatan waktu terjadinya diare, lama berlangsungnya diare, frekuensi diare, dengan interval waktu 30 menit selama 5 jam. Diare ditandai dengan feses berbentuk cair atau setengah cair, dapat pula disertai dengan frekuensi defekasi yang meningkat. Penentuan efek antidiare dari ekstrak etanol daun kacang gude dilakukan dengan cara mengamati saat mulai terjadinya diare, lama berlangsungnya diare, dan frekuensi diare.

Dari hasil penentuan saat mulai terjadinya diare, diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing kelompok perlakuan yaitu: kelompok kontrol Na-CMC mulai terjadinya diare pada menit ke-23,3; kelompok kontrol Loperamid HCl mulai terjadinya diare pada menit ke-58 ; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 50 mg/kgBB mulai terjadinya diare pada menit ke-33,6; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 100 mg/kgBB mulai terjadinya diare pada menit ke-40,3; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 200 mg/kgBB mulai terjadinya diare pada menit ke-48,6. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin cepat terjadinya diare maka efek antidiare akan semakin lemah.

Berdasarkan analisis keseragaman menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), diperoleh hasil bahwa nilai F hitung $>$ F tabel yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh berbeda nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu awal diare antar kelompok perlakuan.

Dari hasil penentuan lama terjadinya diare, diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing kelompok perlakuan yaitu: kelompok Na-CMC 1% mempunyai nilai rata-rata lama terjadinya diare 251,3 menit; kelompok kontrol Loperamid HCl mempunyai nilai rata-rata lama terjadinya diare 50 menit; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 50 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata lama terjadinya diare 238 menit; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 100 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata lama terjadinya diare 186 menit; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude dosis 200 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata lama terjadinya diare 131 menit. Dari hasil pengamatan menunjukkan dengan semakin lama terjadi diare maka semakin lemah efek antidare yang diberikan.

Berdasarkan analisis keseragaman menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), diperoleh hasil bahwa nilai F hitung $>$ F tabel yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh berbeda nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan lama berlangsungnya diare antar kelompok perlakuan

Dari hasil penentuan frekuensi diare, diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing kelompok perlakuan yaitu: kelompok Na-CMC 1% mempunyai nilai rata-rata frekuensi diare sebanyak 16 kali; kelompok Loperamid HCl mempunyai nilai rata-

rata frekuensi diare sebanyak 3 kali; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 50 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata frekuensi diare sebanyak 9 kali; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 100 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata frekuensi diare sebanyak 7 kali; kelompok ekstrak etanol daun kacang gude 200 mg/kgBB mempunyai nilai rata-rata frekuensi diare sebanyak 5 kali. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan dengan semakin tinggi frekuensi diare maka efek antidiare akan semakin lemah.

Berdasarkan analisis keseragaman menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), diperoleh hasil bahwa nilai F hitung $>$ F tabel yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh berbeda nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi diare antar kelompok perlakuan

Hasil penelitian ini ekstrak etanol daun kacang gude dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB memberikan efek sebagai antidiare, untuk digunakan dalam mengobati diare yang terjadi pada hewan mencit yang menggunakan minyak jarak sebagai penginduksi terjadinya diare. Sedangkan ekstrak etanol daun kacang gude 50 mg/kgBB lebih lemah dibandingkan dengan pembanding Loperamid HCl.

Berdasarkan uji statistik One way ANOVA didapatkan bahwa waktu awal terjadinya diare antar tiap perlakuan diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu awal diare antar kelompok perlakuan. Pada waktu lama berlangsungnya diare antar tiap perlakuan diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,005$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan lama

berlangsungnya diare antar tiap kelompok perlakuan. Untuk frekuensi terjadinya diare antar tiap perlakuan diperoleh nilai $p=0,001$ ($p<0,005$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi diare antar kelompok perlakuan.

Adanya aktivitas antidiare pada daun kacang gude karena mengandung flavanoid. Mekanisme flavanoid dalam menghentikan diare yang diinduksi oleh Oleum Ricini adalah dengan menghambat motilitas usus sehingga mengurangi sekresi cairan dan elektrolit (Di Carlo, et.al., 1993: 1054). Aktivitas flavanoid yang lain adalah dengan menghambat pelepasan asetilkolin di saluran cerna (Lutterodt, 1989: 235). Penghambatan pelepasan asetilkolin nikotinic yang memperantarai terjadinya kontraksi otot polos dan teraktivasinya reseptor asetilkolin muskarinik (khususnya Ach-M₃) yang mengatur motilitas gastrointestinal dan kontraksi otot polos (Ikawati, 2008: 78).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) memiliki efek antidiare pada mencit (*Mus musculus*).
2. Berdasarkan analisis statistik efek antidiare dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB memberikan efek sebagai antidiare pada mencit (*Mus musculus*).

B. Saran

Perlu dilakukan uji toksisitas daun kacang gude (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) sehingga dapat diketahui keamanannya bila digunakan sebagai antidiare.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdel, Daem al-Kaheel. *Rahasia Medis dalam Al-Qur'an dan Hadis: Operasi Tanpa Luka*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Amiruddin. *Current Issue Kematian Anak Akibat Diare*. Makasar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Epidemiologi Universitas Hasanuddin, 2007.
- Dalimartha, Setiawan. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Trubus Agriwidya, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.
- Direktorat Jendral POM. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.
- Di Carlo, G., dkk. *Inhibition of Intestinal Motility and Secretory by Flavanoids in Mice and Rats: Structure Activity Relationships*: Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1993.
- Dizaye, K., Maulood, I.M, Gallaly. *Effect of Bemiparin and heparin on blood pressure, renal and liver function test and platelet indices of salt-loaded uniphrectomized rats*. Iraqi journal of veterinary sciences, 2000.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Farmakope Indonesia. Edisi III*. Departemen Kesehatan. Jakarta : Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 1979.
- Fachruddin, Lisdiana. *Budi Daya Kacang-Kacangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Farooqi, M.I.H. *Terapi Herbal Cara Islam; Manfaat Tumbuhan Menurut Al-Qur'an dan Sunah Nabi*. Jakarta: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2005.
- Ganiswarna, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 4th. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995.
- Hadi, Sujono. *Gastroenterologi*. Bandung: PT.Alumni, 2002.
- Harbone, J. B. *Metode Fitokimia*. Bandung. Penerbit ITB. 1987.
- Hawari, D. *Doa dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis*. Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

- Ikawati, Z. *Pengantar Farmakologi Molekuler*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Kementrian Kesehatan RI. *Buletin Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Diare di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2011.
- Krishna, K.R. *Agroecosystems of South India: Nutrient Dynamics, Ecology and Productivity*. Florida USA: Brown Walker Press, 2010.
- Lutterodt, G.D. *Inhibition of Gastrointestinal Release Of Acetylcholine by Quercetin as a Possible Mode of Action of Psidium guajara leaf Extracts in the Treatment of Acute Diarrhoea Disease*: Journal Ethnopharmacology, 1989.
- Malole, M.B.M., dkk. *Penggunaan hewan-hewan coba di laboratorium*, Bogor: Ditelaah oleh: Masduki Partaredja. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor, 1989.
- Ma' rifin, H. *Peran Farmakologi Dalam Pengembangan Obat Tradisional: Risalah Simposium Penelitian Tumbuhan III*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, 1993.
- Mansjoer, A., dkk. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jilid I. Jakarta: Media Aesculapius Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001.
- Mutschler, E. *Dinamika Obat: Buku Ajar Farmakologi dan Toksikologi*. Edisi 5th. Terjemahan Matilda Bww dan Anna Setiadi Ranti. Bandung: Perbit ITB, 1991.
- Mycek, Mary J., dkk. *Farmakologi Ulasan Bergambar*. Edisi 2nd. Alih Bahasa: Azwar Agoues. Jakarta: Widya Medika, 2001.
- Purwanto, Imam. *Mengenal Lebih Dekat Leguminosae*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Rahardja dan Tjay, TH. *Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*. Edisi 5th. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Shafiyurrahman, Al Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001.


- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*. Lentera Hati: Jakarta, 2006.
- _____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*. Lentera Hati: Jakarta. 2009.
- Smith, John B., dkk. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan Di Daerah Tropis*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Sukandar, E.Y., dkk. *ISO Farmakoterapi*. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan, 2008.
- Sulaiman, A., dkk. *Gastroenterologi Hepatologi*. Jakarta: CV. Agung Seto, 1990.
- Sutedjo, AY. *Mengenal Obat-obatan Secara Mudah dan Aplikasinya dalam Perawatan*. Yogyakarta: Amara Books, 2008.
- Wiryowidagdo, Sumali. *Kimia dan Farmakologi Bahan Alam*. Edisi 2nd. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Anggota Ikapi, 2007.
- Yahya, Harun. *Al-Quran dan Sains*. Bandung: Dzikra, 2004.

LAMPIRAN

Lampiran I. Ekstraksi Daun Kacang Gude (*Cajanus cajan* (L). Millsp)



Gambar 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Kacang Gude

Lampiran II. Pengujian Ekstrak Pada Mencit**Gambar 3.** Skema kerja pengujian ekstrak daun kacang gude

Lampiran III. Kacang Gude (Cajanus cajan (L.) Millsp)



Gambar 4. Daun Kacang Gude

Lampiran IV. Proses Rotavapor



Gambar 5. Proses Rotavapor



Gambar 6. Ektrak Etanol Daun Kacang Gude

Lampiran V. Perhitungan Dosis

A. Perhitungan Na-CMC 1%

Volume pemberian untuk mencit 30 gram

$$= \frac{30}{30} \text{ gram} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ ml}$$

B. Perhitungan Loperamid HCl

Dosis Lazim Loperamid pada manusia = 2 mg

Konversi dari manusia 70 kg ke mencit 20 g = 2 mg x 0,0026 mg

$$= 0,0052 \text{ mg}$$

Dosis yang dibutuhkan untuk mencit 30 g = $\frac{30}{20} \times 0,0052 \text{ mg}$

$$= 0,0078 \text{ mg}$$

Jumlah suspensi yang dibuat = 10 ml

Maka Loperamid yang dibutuhkan = 0,0078 mg x 10 ml

$$= 0,078 \text{ mg}$$

Loperamid yang diperoleh dari tablet = 2 mg/tablet

Berat rata-rata = $\frac{\text{Berat 20 tablet}}{20}$

$$= \frac{3,8524 \text{ g}}{20}$$

$$= 0,19262 \text{ g}$$

$$= 192,62 \text{ mg}$$

Maka jumlah tablet yang setara dengan 0,078 mg loperamid yaitu :

$$\frac{0,078 \text{ mg}}{2 \text{ mg}} \times 192,62 \text{ mg} = 7,51218 \text{ mg} = 7,5 \text{ mg}$$

Jadi ditimbang sebanyak 7,5 mg tablet loperamid dan dilarutkan dalam 10 ml Na-
CMC 1%.

C. Perhitungan Ekstrak Daun Kacang Gude

Dosis ekstrak yang digunakan dalam penelitian adalah 50mg/kgBB, 100mg/kgBB,
dan 200mg/kgBB

1. Ekstrak etanol daun kacang gude 50 mg/kgBB

$$30 \text{ g} / 1000 \text{ gBB} \times 50 \text{ mg} = 1,5 \text{ mg}$$

$$1,5 \text{ mg} \times 10 \text{ ml} = 7,5 \text{ mg}$$

2. Ekstrak etanol daun kacang gude 100 mg/kgBB

$$30 \text{ g} / 1000 \text{ gBB} \times 100 \text{ mg} = 3 \text{ mg}$$

$$3 \text{ mg} \times 10 \text{ ml} = 30 \text{ mg}$$

3. Ekstrak etanol daun kacang gude 200 mg/kgBB

$$30 \text{ g} / 1000 \text{ gBB} \times 200 \text{ mg} = 6 \text{ mg}$$

$$6 \text{ mg} \times 10 \text{ ml} = 60 \text{ mg}$$

Lampiran VI. Data Analisis

A. Mulai terjadinya diare

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95 % Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
1	3	23.3333	10.40833	6.00925	-2.5224	49.1891	15.00	35.00
2	3	58.0000	3.60555	2.08167	49.0433	66.9567	55.00	62.00
3	3	33.6667	6.11010	3.52767	18.4883	48.8450	27.00	39.00
4	3	40.3333	5.68624	3.28295	26.2079	54.4587	34.00	45.00
5	3	48.6667	1.52753	.88192	44.8721	52.4612	47.00	50.00
Total	15	40.8000	13.43875	3.46987	33.3579	48.2421	15.00	62.00

Test of Homogeneity of Variances

Levence Statistic	df1	df2	Sig.
2.741	4	10	.089

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2141.733	4	535.433	13.847	.000
Within Groups	386.667	10	38.667		
Total	2528.400	14			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD

(I) Sampel	(J) Sampel	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-34.66667*	5.07718	.000	-51.3761	-17.9572
	3	-10.33333	5.07718	.317	-27.0428	6.3761
	4	-17.00000*	5.07718	.046	-33.7094	-2906
	5	-25.33333*	5.07718	.004	-442.0428	-8.6239
2	1	34.66667*	5.07718	.000	17.9572	51.3761
	3	24.33333*	5.07718	.005	7.6239	41.0428
	4	17.66667*	5.07718	.037	.9572	34.3761
	5	9.33333	5.07718	.405	-7.3761	26.0428
3	1	10.33333	5.07718	.317	-6.3761	27.0428
	2	-24.33333*	5.07718	.005	-41.0428	-7.6239
	4	-6.66667	5.07718	.690	-23.3761	10.0428
	5	-15.00000	5.07718	.084	-31.7094	1.7094
4	1	17.00000*	5.07718	.046	.2906	33.7094
	2	-17.66667*	5.07718	.037	-34.3761	-.9572
	3	6.66667	5.07718	.690	-10.0428	23.3761
	5	-8.33333	5.07718	.506	-25.0428	8.3761
5	1	25.33333*	5.07718	.004	8.6239	42.0428
	2	-9.33333	5.07718	.405	-26.0428	7.3761
	3	15.00000	5.07718	.084	-1.7094	31.7094
	4	8.33333	5.07718	.506	-8.3761	25.0428

*The mean difference is significant at the 0.05 level.

Homogeneous Subsets

Tukey HSD^a

Sampel	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Na-CMC 1%	3	23.3333		
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 50 mg/kgBB	3	33.6667	33.6667	
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 100 mg/kgBB	3		40.3333	
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 200 mg/kgBB	3		48.6667	48.6667
Loperamid HCl	3			58.0000
Sig.		.317	.084	.405

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- a. Used Harmonic Mean Sampel Size = 3.000.

B. Lama Berlangsungnya Diare

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95 % Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
1	3	251.3333	15.30795	8.83805	213.3063	289.3604	234.00	263.00
2	3	50.0000	35.00000	20.20726	-36.9448	136.9448	15.00	85.00
3	3	238.0000	6.55744	3.78594	221.7104	254.2896	231.00	244.00
4	3	186.0000	10.58301	6.11010	159.7104	212.2896	174.00	194.00
5	3	131.0000	2.64575	1.52753	124.4276	137.5724	128.00	132.00
Total	15	171.2667	78.13310	20.17388	127.9980	214.5353	15.00	263.00

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.208	4	10	.141

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	82224.267	4	20556.067	63.392	.000
Within Groups	3242.667	10	324.267		
Total	85466.933	14			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD

(I) Sampel	(J) Sampel	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	201.33333*	14.70299	.000	152.9446	249.7221
	3	13.33333	14.70299	.888	-35.0554	61.7221
	4	65.33333*	14.70299	.009	16.9446	113.7221
	5	120.33333*	14.70299	.000	71.9446	168.7221
2	1	-201.33333*	14.70299	.000	-249.7221	-152.9446
	3	-188.00000*	14.70299	.000	-236.3887	-139.6113
	4	-136.00000*	14.70299	.000	-184.3887	-87.6113
	5	-81.00000*	14.70299	.002	-129.3887	-32.6113
3	1	-13.33333	14.70299	.888	-61.7221	35.0554
	2	188.00000*	14.70299	.000	139.6113	236.3887
	4	52.00000*	14.70299	.034	3.6113	100.3887
	5	107.00000*	14.70299	.000	58.6113	155.3887
4	1	-65.33333*	14.70299	.009	-113.7221	-16.9446
	2	136.00000*	14.70299	.000	87.6113	184.3887
	3	-52.00000*	14.70299	.034	-100.3887	-3.6113
	5	55.00000*	14.70299	.025	6.6113	103.3887
5	1	-120.33333*	14.70299	.000	-168.7221	-71.9446
	2	81.00000*	14.70299	.002	32.6113	129.3887
	3	-107.00000*	14.70299	.000	-155.3887	-58.6113
	4	-55.00000*	14.70299	.025	-103.3887	-6.6113

*The mean difference is significant at the 0.05 level.

Homogeneous Subsets

Tukey HSD^a

Sampel	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	
Loperamid HCl	3	50.0000			
Ekstrak Etanol Daun	3		131.0000		
Kacang Gude 200 mg/kgBB					
Ekstrak Etanol Daun	3			186.0000	
Kacang Gude 100 mg/kgBB					
Ekstrak Etanol Daun	3				238.0000
Kacang Gude 50 mg/kgBB					
Na-CMC	3				251.3333
Sig.		1.000	1.000	1.000	.888

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Used Harmonic Mean Sampel Size = 3.000.

C. Frekuensi Diare

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95 % Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
1	3	16.0000	1.73205	1.00000	11.6973	20.3027	14.00	17.00
2	3	3.0000	1.00000	.57735	.5159	5.4841	2.00	4.00
3	3	9.0000	3.00000	1.73205	1.5476	16.4524	6.00	12.00
4	3	7.0000	2.00000	1.15470	2.0317	11.9683	5.00	9.00
5	3	5.0000	3.60555	2.08167	-3.9567	13.9567	2.00	9.00
Total	15	8.0000	5.07093	1.30931	5.1918	10.8082	2.00	17.00

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.182	4	10	.376

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	300.000	4	75.000	12.500	.001
Within Groups	60.000	10	6.000		
Total	360.000	14			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD

(I) Sampel	(J) Sampel	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	13.00000*	2.00000	.001	6.4178	19.5822
	3	7.00000*	2.00000	.036	.4178	13.5822
	4	9.00000*	2.00000	.008	2.4178	15.5822
	5	11.00000*	2.00000	.002	4.4178	17.5822
2	1	-13.00000*	2.00000	.001	-19.5822	-6.4178
	3	-6.00000	2.00000	.078	-12.5822	.5822
	4	-4.00000	2.00000	.332	-10.5822	2.5822
	5	-2.00000	2.00000	.850	-8.5822	4.5822
3	1	-7.00000*	2.00000	.036	-13.5822	-.4178
	2	6.00000	2.00000	.078	-.5822	12.5822
	4	2.00000	2.00000	.850	-4.5822	8.5822
	5	4.00000	2.00000	.332	-2.5822	10.5822
4	1	-9.00000*	2.00000	.008	-15.5822	-2.4178
	2	4.00000	2.00000	.332	-2.5822	10.5822
	3	-2.00000	2.00000	.850	-8.5822	4.5822
	5	2.00000	2.00000	.850	-4.5822	8.5822
5	1	-11.00000*	2.00000	.002	-17.5822	-4.4178
	2	2.00000	2.00000	.850	-4.5822	8.5822
	3	-4.00000	2.00000	.332	10.5822	2.5822
	4	-2.00000	2.00000	.850	-8.5822	4.5822

*The mean difference is significant at the 0.05 level.

Homogeneous Subsets

Tukey HSD^a

Sampel	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Loperamid HCl	3	3.0000	
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 200 mg/kgBB	3	5.0000	
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 100 mg/kgBB	3	7.0000	
Ekstrak Etanol Daun Kacang Gude 50 mg/kgBB	3	9.0000	
Na-CMC	3		16.0000
Sig.		.078	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

- a. Used Harmonic Mean Sampel Size = 3.000.

Lampiran VII. Analisis Statistik menggunakan metode rancangan acak lengkap

A. Mulai terjadinya diare

Tabel 2. Mulai terjadinya diare

Sampel Uji	Waktu awal terjadinya diare			Jumlah	Rata-Rata (Menit)
	I	II	III		
Na-CMC 1%	15	20	35	70	23,3
Loperamid HCl	62	55	57	174	58
Ekstrak Etanol 50 mg/kgBB	35	39	27	101	33,8
Ekstrak Etanol 100 mg/kgBB	45	42	34	121	40,3
Ekstrak Etanol 200 mg/kgBB	50	47	49	146	48,6
Jumlah	207	203	202	612	204

$$\begin{aligned}
 \text{a. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\
 &= \frac{(612)^2}{5 \times 3} \\
 &= \frac{374.544}{15} \\
 &= 24.969,6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum (Y_{ij})^2 - \text{FK} \\
 &= [(15)^2 + (20)^2 + \dots + (39)^2 - 24.969,6] \\
 &= 27.498 - 24.696,6 \\
 &= 2.528,4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{\sum Y_{ij}^2}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{FK} \\
 &= \frac{(70)^2 + (174)^2 + \dots + (146)^2}{3} - 24.696,6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{81.334}{3} - 24.696,6 \\
 &= 27.111,33 - 24.696,6 \\
 &= 2.141,73
 \end{aligned}$$

- d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP
- $$\begin{aligned}
 &= 2.528,4 - 2.141,73 \\
 &= 386,67
 \end{aligned}$$
- e. Derajat Bebas Total (DBT) = (Banyaknya perlakuan x Jumlah replikasi) - 1
- $$\begin{aligned}
 &= (5 \times 3) - 1 \\
 &= 15 - 1 \\
 &= 14
 \end{aligned}$$
- f. Derajat Bebas Perlakuan = Banyaknya Perlakuan – 1
- $$\begin{aligned}
 &= 5 - 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$
- g. Derajat Bebas Galat Perlakuan = Derajat Bebas Total – Derajat Bebas Perlakuan
- $$\begin{aligned}
 &= 14 - 4 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$
- h. Kuadrat Tengah Perlakuan = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$
- $$\begin{aligned}
 &= \frac{2.141,73}{4} \\
 &= 535,4325
 \end{aligned}$$
- i. Kuadrat Tengah Galat = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$
- $$\begin{aligned}
 &= \frac{386,67}{10}
 \end{aligned}$$

$$= 38,667$$

$$j. \text{ F Hitung Perlakuan (FH)} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat tengah Galat}}$$

$$= \frac{535,4325}{38,667}$$

$$= 13,847$$

Tabel 3. Analisis varians waktu awal terjadinya diare

Sumber Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	2.141,73	535,4325	13,847*	3,48	5,99
Galat	10	386,67	38,667			
Total	14	2.528,4				

Keterangan :

* = Signifikan

Ns = Non Signifikan

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5%. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap sampel yang memberi efek.

M A K A S S A R

B. Lama Berlangsungnya Diare

Tabel 4. Lama berlangsungnya diare

Sampel Uji	Frekuensi diare			Jumlah	Rata-Rata (Menit)
	I	II	III		
Na-CMC 1%	257	263	234	754	251,3
Loperamid HCl	85	15	50	150	50
Ekstrak Etanol 50 mg/kgBB	239	231	244	714	238
Ekstrak Etanol 100 mg/kgBB	174	194	190	558	186
Ekstrak Etanol 200 mg/kgBB	113	128	132	393	131
Jumlah	888	831	850	2.569	856,3

$$\begin{aligned}
 \text{a. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\
 &= \frac{(2.569)^2}{5 \times 3} \\
 &= \frac{6.599.761}{15}
 \end{aligned}$$

$$= 439.984,0667$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum (Y_{ij})^2 - \text{FK} \\
 &= [(257)^2 + (263)^2 + \dots + (132)^2 - \\
 &\quad 439.984,0667] \\
 &= 525.451 - 439.984,0667 \\
 &= 85.466,9333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{Y_{ij}^2}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{FK} \\
 &= \frac{(754)^2 + (150)^2 + \dots + (393)^2}{3} - 439.984,0667
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1.566.670}{3} - 439.984,0667 \\
 &= 522.223,3333 - 439.984,0667 \\
 &= 82.239,26663
 \end{aligned}$$

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP

$$\begin{aligned}
 &= 85.466,9333 - 82.239,26663 \\
 &= 3.227,66667
 \end{aligned}$$

e. Derajat Bebas Total (DBT) = (Banyaknya perlakuan x Jumlah replikasi) - 1

$$\begin{aligned}
 &= (5 \times 3) - 1 \\
 &= 15 - 1 \\
 &= 14
 \end{aligned}$$

f. Derajat Bebas Perlakuan = Banyaknya Perlakuan – 1

$$\begin{aligned}
 &= 5 - 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

g. Derajat Bebas Galat Perlakuan = Derajat Bebas Total – Derajat Bebas Perlakuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$= 14 - 4$$

$$= 10$$

h. Kuadrat Tengah Perlakuan = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{82.239,26663}{4}
 \end{aligned}$$

$$= 20.559,81666$$

i. Kuadrat Tengah Galat = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3.227,66667}{10}
 \end{aligned}$$

$$= 322,766667$$

$$j. \text{ F Hitung Perlakuan (FH)} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat tengah Galat}}$$

$$= \frac{20.559,81666}{322,766667}$$

$$= 63,69869866$$

Tabel 5. Analisis varians lama berlangsungnya diare diare

Sumber Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	82.239,26663	20.559,8166	63,69869866*	3,48	5,99
Galat	10	3.227,66667	322,766667			
Total	14	85.466,9333				

Keterangan :

* = Signifikan

Ns = Non Signifikan

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5%. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap sampel yang memberi efek.

M A K A S S A R

C. Frekuensi diare

Tabel 6. Frekuensi diare

Sampel Uji	Frekuensi diare			Jumlah	Rata-Rata (Menit)
	I	II	III		
Na-CMC 1%	17	14	17	48	16
Loperamid HCl	4	2	3	9	3
Ekstrak Etanol 50 mg/kgBB	12	6	9	27	9
Ekstrak Etanol 100 mg/kgBB	5	7	9	21	7
Ekstrak Etanol 200 mg/kgBB	9	4	2	15	5
Jumlah	47	33	40	120	40

$$\begin{aligned}
 \text{a. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\
 &= \frac{(120)^2}{5 \times 3} \\
 &= \frac{14.400}{15} \\
 &= 960
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum (Y_{ij})^2 - \text{FK} \\
 &= [(17)^2 + (14)^2 + \dots + (2)^2 - 960] \\
 &= 1.320 - 960 \\
 &= 360
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{\sum Y_{ij}^2}{\text{Jumlah replikasi}} - \text{FK} \\
 &= \frac{(48)^2 + (9)^2 + \dots + (15)^2}{3} - 960 \\
 &= \frac{3.780}{3} - 960
 \end{aligned}$$

$$= 1.260 - 960$$

$$= 300$$

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP

$$= 360 - 300$$

$$= 60$$

e. Derajat Bebas Total (DBT) = (Banyaknya perlakuan x Jumlah replikasi) - 1

$$= (5 \times 3) - 1$$

$$= 15 - 1$$

$$= 14$$

f. Derajat Bebas Perlakuan = Banyaknya Perlakuan – 1

$$= 5 - 1$$

$$= 4$$

g. Derajat Bebas Galat Perlakuan = Derajat Bebas Total – Derajat Bebas Perlakuan

$$= 14 - 4$$

$$= 10$$

h. Kuadrat Tengah Perlakuan = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$

$$= \frac{300}{4}$$

$$= 75$$

i. Kuadrat Tengah Galat = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$

$$= \frac{60}{10}$$

$$= 6$$

$$\begin{aligned}
 \text{j. F Hitung Perlakuan (FH)} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat tengah Galat}} \\
 &= \frac{75}{6} \\
 &= 12,5
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Analisis varians frekuensi diare

Sumber Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	300	75	12,5*	3,48	5,99
Galat	10	18	1,8			
Total	14	318	76,8			

Keterangan :

* = Signifikan

Ns = Non Signifikan

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5%. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap sampel yang memberi efek.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran VIII. Tabel konversi dosis hewan dengan manusia

Tabel 8. Tabel konversi dosis hewan dengan manusia

	Mencit 20 g	Tikus 200 g	Marmut 400 g	Kelinci 1,2 kg	Kera 4 kg	Anjing 12 kg	Manusia 70 kg
Mencit 20 g	1,0	7,0	12,25	27,8	64,1	124,2	387,9
Tikus 200 g	0,14	1,0	1,74	3,9	9,2	17,8	56,0
Marmut 400 g	0,08	0,57	1,0	2,25	5,2	10,2	31,5
Kelinci 1,2 kg	0,04	0,25	0,44	1,0	2,4	4,5	14,2
Kera 4 kg	0,016	0,11	0,19	0,42	1,0	1,9	6,1
Anjing 12 kg	0,008	0,06	0,10	0,22	0,52	1,0	3,1
Manusia 70 kg	0,0026	0,018	0,031	0,07	0,16	0,32	1,0

(Sumber: Dizaye. 2000)

Lampiran IX. Tabel maksimum larutan sediaan uji untuk hewan

Tabel 9. Jumlah maksimum larutan sediaan uji untuk hewan

Jenis hewan uji	Volume maksimum (ml) sesuai jalur pemberian				
	i.v	i.m	i.p	s.c	p.o
Mencit (20-30 g)	0,5	0,05	1,0	0,5-1,0	1,0
Tikus (200 g)	1,0	0,1	2-5	2-5	5,0
Hamster (50 g)	-	0,1	1-2	2,5	2,5
Marmut (250 g)	-	0,25	2-5	5,0	10,0
Kelinci (2,5 kg)	5-10	0,5	10,20	5-10	20,0
Kucing (3 kg)	5-10	1,0	10-20	5-10	50,0
Anjing (5 kg)	10-20	5,0	20-50	10,0	100,0

(Sumber: Dizaye. 2000)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Miftah Ulfah Shaleh yang biasa dipanggil Miftah, anak Tunggal dari bapak Drs. M. Sualeh Abbas. M,Pd dan ibu Rosnaini Haddaini lahir di Cabbenge, Soppeng pada tanggal 24 Mei 1994. Riwayat pendidikannya, ia memulai pendidikannya di SD Negeri 007 Sidodadi Kab. Polewali Mandar, kemudian melanjutkannya di SMPN 1 Wonomulyo. Setelah lulus dari sekolah menengah iapun melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Wonomulyo. Dan sejak september 2012 telah tercatat sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Negeri di Makassar, yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R