

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK KULIT BUAH JERUK NIPIS
(*Citrus aurantifolia*) SEBAGAI INSEKTISIDA HAYATI
TERHADAP NYAMUK *Aedes aegypti***



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**MUSDALIFAH
NIM : 70200112053**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang disusun oleh **Musdalifah NIM 70200112053** ini telah kami periksa dan setuju untuk diajukan pada **Ujian Skripsi** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata, November 2016

1965
Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Susilawati S.Si., M.Kes

Syarfaini, SKM., M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

NIP: 19790525 200901 1 019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan sebuah Skripsi Kesehatan Lingkungan yang berjudul Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dengan Metode Semprot. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Salawat serta salam kita curahkan kepada teladan kita, baginda Muhammad saw., juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua keluarga, terkhusus kepada Ayahanda tercinta H. Muhammad Amin dan Ibunda yang kusayangi Hj. Nurbaya yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Serta kepada saudara-saudaraku, Harianto dan Mahir, S.Pd yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan semangat.

Tidak lupa pula, penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Hi selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep N.s., M.Kes selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku ketua jurusan yang telah membantu dalam proses pendidikan di jurusan ini.
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Syarfaini, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas menyediakan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muh Saleh Jastam, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. Syahrudin Usman., M.Pd selaku Penguji Agama yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
7. Para dosen pada konsentrasi Kesehatan Lingkungan Syahrul Basri, SKM., M.Kes, Munawir Amansyah SKM., M.Kes, Sri Novianti Bahar, SKM., M.Kes, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan.

8. Teman-teman seperjuangan Kesmas Angkatan 2012 (Achilles), khususnya Kesmas B '012 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
9. Keluarga kecilku di Peminatan Kesehatan Lingkungan yang selalu menyemangati menemani dan membantu selama penelitian.
10. Sahabatku tercinta sekaligus teman seperjuanganku selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Kak Susi, Dewi, Ummi Aliah, Kak Indah dan Kak Sukma), atas kebersamaan dan dukungannya dalam suka maupun duka.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.

Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, penulis tidak mampu untuk membalasnya. Maka dari itu peneliti hanya dapat menyerahkan semua itu kepada Allah swt., semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat suatu ganjaran/pahala.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhirnya, harapan dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin*

Samata-Gowa, 2016

Penulis

Musdalifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1 - 12
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13 - 45
A. Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	13
B. Pengendalian Vektor	23
C. Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>).....	28
D. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam	33
E. Insektisida	36
F. Kerangka Teori.....	44
G. Kerangka Konsep	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46- 59
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46

B. Pendekatan Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Parameter Penelitian.....	49
F. Alur Penelitian	50
G. Bahan dan Alat Penelitian.....	51
H. Prosedur Penelitian.....	53
I. Validasi dan Relibialitas Instrumen	58
J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59 - 74
A. Hasil Penelitian	59
B. Analisis Data	62
C. Pembahasan.....	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	xiii-xv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sintesa Pemanfaatan Tanaman sebagai Insektisida Hayati	8
Tabel 3.1	Rincian Jumlah Sampel yang Digunakan	48
Tabel 4.1	Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban Udara	59
Tabel 4.2	Data Jumlah Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> yang Pingsan dan Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan Berbagai Konsentrasi pada Menit Ke-20	60
Tabel 4.5	Data Total Kematian Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan Berbagai Konsentrasi pada Jam Ke-24	60
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>One Way Anova</i> Kematian Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>).....	62
Tabel 4.7	Hasil Analisa probit LC_{50} Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) terhadap Kematian Rata-Rata Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	15
Gambar 2.2	Ciri-Ciri Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	16
Gambar 2.3	Siklus Hidup Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	17
Gambar 2.4	Masa Hidup Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	21
Gambar 2.5	Tanaman Buah Jeruk Nipis.....	28
Gambar 2.6	Skema Kerangka Teori.....	44
Gambar 2.7	Skema Kerangka Konsep.....	45
Gambar 3.1	Desain Penelitian	48
Gambar 3.2	Diagram Alur Penelitian.....	50
Gambar 4.1	Persentase Kematian Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan Berbagai Konsentrasi.....	61
Gambar 4.2	<i>Means Plots</i> Kematian Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>).....	63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SINGKATAN

- DBD : Demam Berdarah Dengue
WHO : World Health Organization
LC : Lethal Concentration



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi
Lampiran 2 : Analisis Data
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 4 : Persuratan
Lampiran 5 : Riwayat Hidup Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Musdalifah
NIM : 7020011205
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Skripsi : Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Pencegahan penyebaran penyakit DBD dapat dilakukan dengan memutus mata rantai penularan melalui pengendalian vektor. Insektisida hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan terbukti berpotensi untuk mengendalikan vektor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti* dan untuk mengetahui estimasi nilai *Lethal Concentration* (LC₅₀) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan *Post Test Only Control Group Design*. Sampel dalam penelitian ini adalah nyamuk betina *Aedes aegypti* umur 2-5 hari sebanyak 300 ekor yang dibagi ke dalam empat *barrel* uji yang masing-masing berisi 25 ekor nyamuk dengan perlakuan (0%, 15%, 30% dan 60%) serta ulangan sebanyak 3 kali dengan waktu pajanan selama 20 menit. Perhitungan total kematian nyamuk dilakukan pada jam ke-24 setelah perlakuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata kematian nyamuk pada konsentrasi 15% yaitu sebesar 25%, konsentrasi 30% yaitu sebesar 45%, dan konsentrasi 60% yaitu sebesar 62%. Hasil uji anova diperoleh bahwa *p-value* = 0,004 ($p = <0,05$) sehingga dapat dinyatakan ada perbedaan yang signifikan pada jumlah nyamuk yang mati antar kelompok konsentrasi yang dibandingkan. Dan hasil uji probit diperoleh bahwa estimasi nilai *Lethal Concentration* (LC₅₀) pada ekstrak kulit jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yaitu pada konsentrasi 40,087%.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menemukan formulasi insektisida dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis di masyarakat.

Kata Kunci : Kulit Jeruk Nipis, Insektisida Hayati, Nyamuk *Aedes aegypti*

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Aswin. D, dkk. 2010. Uji Potensi Ekstrak Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Pengusir (*Repellent*) Kecoak (*Periplaneta americana*). *Jurnal*. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- Boekoesoe, L. 2013. Kajian Faktor Lingkungan terhadap Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Studi Kasus di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Laporan Akhir Hibah Disertasi Doktor*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Diana, L. 2012. Efektivitas Minyak Atsiri Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Mortalitas larva *Aedes aegypti* Instar III. *Artikel*. Aceh: Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda.
- Esebara. Chinelo A. 2014. Determination of Saponin Content of Various Parts of Six *Citrus Spesies*. *Journal. Nigeria: Department of Botany Nnamdi Azikiwe University*.
- Gassing, Q. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press
- Hoedojo, R. dan Zulhasril. 2008. *Pengendalian Vektor* (Parasitologi Kedokteran Edisi Ke IV). Jakarta.
- Ikhsan, N. 2014. Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Kematian Larva *Aedes* sp. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Kandita, R. Tiara. 2015. Uji Efektivitas Ekstrak Buah Leuca (*Solanum nigrum. L*) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Anopheles aconitus*. *Jurnal*. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Karina, A. 2012. *Jeruk Nipis (Khasiat dan Manfaat)*. Surabaya: Stomata.
- Kartika, dkk. 2014. Pemanfaatan Limonen dari Kulit Jeruk Nipis dalam Pembuatan Lilin Aromatik Penolak Serangga. *Jurnal*. FPTK UPI
- Kementerian Agama RI. 2014. *al-Qur'an Te.rjemahan dan Tajwid*. Bandung: Sygma
- Kementerian Kehatan RI. 2010. *Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2009*. Jakarta
- Kementerian Kehatan RI. 2015. *Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014*. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Buletin Jendela Epidemiologi Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor.*
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian Vektor.* Jakarta: Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Profil Kesehatan Indonesia 2013.* Jakarta: Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014.* Jakarta: Kementerian Kesehatan
- Manaf, S, dkk. 2012. Uji Efektivitas Minyak Atsiri Daun Kacapiring (*Gardenia augusta*) sebagai Bahan Aktif Repellen Elektrik Cair terhadap Nyamuk *Aedes Aegypti*. *Jurnal.* Bengkulu: Fakultas MIPA Universitas Bengkulu.
- Mirnawaty, dkk. 2012. Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Langsung (*Lansium domesticum*) sebagai Anti Nyamuk Elektrik terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal.* Palu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
- Murdani, R. 2014. Keefektivan Daya Bunuh Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Kematian Larva Nyamuk *Aedes aegypti* Instar III. *Jurnal.* Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Thayyarah, N. 2013. *Sains dalam al-Qur'an.* Jakarta: Zaman.
- Naria, E. 2015. Insektisida Nabati untuk Rumah Tangga. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Nirma. 2015. Efektivitas Larvasida Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dalam Membunuh Jentik Nyamuk *Aedes sp* (Studi di Daerah Epidemi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Antang Kecamatan Manggala). *Skripsi.* Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta
- Sampan. F. Elis Suryani, dkk. 2013. Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Duku (*Lansium domesticum corr*) sebagai Anti Nyamuk Elektrik terhadap Daya Bunuh Nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal.* Gorontalo: Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolaragaan Universitas Negeri Gorontalo.
- Sari, M. 2012. Uji Efektivitas Aromaterapi Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Jumlah Bakteri Udara. *Jurnal.* Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.

- Setiawan, S.2015. *Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji Merah (Psidium guajava Linn) sebagai Insektisida Aedes Aegypti dalam Sediaan Anti Nyamuk Elektrik. Skripsi. Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati
- Sucipto, C. 2011. *Vektor Penyakit Tropis*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Palgunadi, B. *Aedes aegypti* sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue. *Artikel*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Utomo, M, dkk. 2010. Pengaruh Jumlah Air yang Di Tambahkan pada Kemasan Serbuk Bunga Sukun (*Artocarpus communis*) sebagai Pengganti Isi Ulang (*Refill*) Obat Nyamuk Elektrik Terhadap Lama Waktu Efektif Daya Bunuh Nyamuk Anopheles aconitus lapangan. *Jurnal*. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Wibawa. R. Ratwita. 2012. Potensi Ekstrak Biji Mahkota Dewa (*phaleria Macrocarpa*) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dengan Metode Semprot. *Skripsi*. Jember : Fakultas Kedokteran.
- World Health Organization. 1996. *Report of the WHO Informal Consultation on the Evaluation and Testing of Insecticides*. WHOPEPES. Geneva.
- World Health Organization. 2006. *Pesticides and their Application*. WHOPEPES. Geneva
- World Health Organization. 2009. *Guidelines for Efficacy Testing of Household Insecticide Products*. WHOPEPES. Geneva.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan juta kasus penularan penyakit pada manusia melalui serangga yang dikenal dengan *arthropod borne disease* atau *vector borne disease* telah menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat secara global, karena penyebarannya berlangsung secara luas dan cepat (Sucipto, 2011).

Penyakit-penyakit yang umumnya ditularkan melalui vektor merupakan penyakit endemis pada daerah tertentu antara lain, Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari *genus Aedes*. *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* merupakan vektor utama penularan penyakit DBD (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Penyakit DBD hampir ditemukan di seluruh belahan dunia terutama di Negara tropik dan subtropik baik secara endemik maupun epidemik dengan *outbreak* yang berkaitan dengan datangnya musim penghujan (Ndione, dkk dalam Anggraini, dkk, 2012).

Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah kasus DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, *World Health Organization* (WHO) mencatat Negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebanyak 1.418.808 kasus. (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Secara nasional, tren jumlah penderita Demam Berdarah *Dengue* (DBD) yang telah dilaporkan selama kurun waktu 2010-2014 bersifat *fluktuatif*. Berdasarkan data dari Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, bahwa pada tahun 2010 Indonesia menempati urutan tertinggi kasus DBD di ASEAN dengan jumlah kasus sebanyak 156.086 kasus. Dan Tahun 2011 kasus DBD turun menjadi 65.725 kasus. Kemudian tahun 2012 meningkat kembali menjadi 90.245 kasus dan pada tahun 2013 jumlah kasus semakin meningkat yaitu sebanyak 112.511 kasus. Serta pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan kasus menjadi 100.347 kasus. Selain itu, adapun rata-rata jumlah kasus bulanan dari tahun 2010-2014, bulan Januari merupakan bulan dengan laporan kasus DBD tertinggi dari pada bulan lainnya, hal ini diakibatkan karena telah terjadi musim penghujan di bulan tahun sebelumnya sehingga tempat perkembangbiakan nyamuk bertambah banyak dan mengakibatkan populasi nyamuk meningkat (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Insiden Rate (IR) DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebesar 60,30 per 100.000 penduduk dengan CFR 22,46 %. Angka IR tertinggi adalah Kota Palopo sebesar 182,84 per 100.000 penduduk, Kabupaten Bulukumba sebesar 151,40 per 100.000 penduduk, Kota Pare-Pare sebesar 142,01 per 100.000 penduduk dan terendah di Kabupaten Selayar sebesar 3,14 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Toraja Utara sebesar 12,14 per 100.000 penduduk. Pada akhir bulan Maret tahun 2014 Sulawesi Selatan tercatat menempati urutan ke-10 tertinggi jumlah kasus DBD di Indonesia yaitu sebanyak 2.904 kasus. (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Pencegahan penyebaran penyakit DBD, dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun sampai saat ini cara yang paling efektif adalah dengan memutus mata rantai

penularan melalui pengendalian vektornya dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kontak antara nyamuk dengan manusia (Sucipto, 2011).

Pengendalian secara mekanik dan biologi adalah pengendalian vektor yang lebih ramah terhadap lingkungan dari pada menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Di tengah masyarakat yang terancam serangan penyakit vektor nyamuk, tentunya semakin banyak pula produsen anti nyamuk yang menawarkan produk unggulannya. Tetapi produk yang dikeluarkan sebagian besar obat anti nyamuk mengandung bahan kimia sintetis dengan konsentrasi tinggi, yang mana selain dapat membunuh nyamuk, bahan kimia tersebut juga dapat mengganggu kesehatan manusia (Utomo, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh *Indonesian Pharmaceutical Watch* (IPhW) pada tahun 2001, bahwa semua obat anti nyamuk yang beredar dipasaran dalam negeri, baik berupa obat semprot, elektrik, bakar maupun cair mengandung senyawa kimia berbahaya bagi kesehatan yaitu: *diklorvos*, *propoxuran* dan beberapa jenis *pyrethroid* berupa *d-allethrin*, *transflutrin*, *bioallethrin*, *pallethrin*, *d-phenothrin*, serta *esbiothrin*. Bahaya dari senyawa kimia tersebut telah dibuktikan oleh lembaga-lembaga kesehatan internasional. Dan akibat dari senyawa kimia tersebut akan terbukti ketika terakumulasi dalam tubuh atau konsentrasi melebihi ambang batas toleransi tubuh (Sobat Bumi *dalam* Lumowa, 2013).

Insektisida hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan terbukti berpotensi untuk mengendalikan vektor, baik untuk pemberantasan larva maupun nyamuk dewasa. Selain itu, jenis insektisida ini bersifat mudah terurai (*bio-degradable*) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, dan relatif aman bagi alam serta bagi manusia dan binatang ternak karena residu cepat menghilang. Daya bunuh insektisida hayati

berasal dari zat toksik yang dikandungnya. Zat tersebut dapat bersifat racun kontak, racun pernafasan serta racun perut pada hewan berbadan lunak (Utomo, 2010).

Lebih dari 2400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 255 famili dilaporkan mengandung bahan insektisida (Kardinan, 2001 dalam Murdani, 2014). Salah satunya yaitu tanaman jeruk nipis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina Murdani (2014) didapatkan bahwa ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) efektif dalam mematikan larva nyamuk *Aedes aegypti*. Adapun senyawa dari tumbuhan yg memiliki fungsi insektisida diantaranya golongan *saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid* dan *minyak atsiri* (Kardinan, 2000 dalam Naria, 2015).

Jeruk merupakan tanaman buah yang dibudidayakan terbesar kedua di dunia setelah anggur dan dilaporkan mengandung bahan insektisida, salah satunya adalah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Jeruk nipis merupakan salah satu tanaman perdu yang memiliki banyak manfaat, baik untuk penambah cita rasa pada makanan maupun untuk pengobatan seperti buah dan daun yang paling banyak dimanfaatkan, sedangkan kulit buah biasanya akan menjadi limbah. Namun, telah terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kulit buah juga dapat dimanfaatkan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2014), tentang ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai larvasida terhadap kematian larva *Aedes* spp. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hubungan yang bermakna, yang artinya ekstrak kulit buah jeruk nipis efektif sebagai insektisida, hal ini disebabkan karena pada kulit buah jeruk nipis terkandung beberapa senyawa kimia seperti flavonoid, saponin dan minyak atsiri khususnya d-limonen di mana senyawa ini terbukti tidak disukai oleh serangga bahkan memiliki sifat toksin bagi serangga khususnya nyamuk.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kini penelitian tentang pemanfaatan bagian tanaman sebagai insektisida hayati pun semakin maju seperti biji dan kulit yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagaimana penelitian tentang pemanfaatan biji yang dilakukan oleh Wibawa R. (2012) dengan hasil penelitian bahwa Ekstrak Biji Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa*) memiliki potensi sebagai insektisida terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dengan metode semprot pada LC₅₀ diperoleh hasil dengan konsentrasi 12,9%. Selain itu, penelitian tentang pemanfaatan kulit buah juga dilakukan oleh Fina Elis, dkk (2013) dengan hasil penelitian bahwa ekstrak kulit buah duku (*Lansium domesticum corr*) sebagai anti nyamuk elektrik konsentarsi 35% efektif dalam membunuh nyamuk *Aedes aegypti*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian sebelumnya tentang insektisida hayati khususnya pada pemanfaatan kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Jadi, penelitian yang akan dilakukan adalah “Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*”.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) efektif sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*?

Atas dasar uraian pokok masalah di atas, maka dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Pada konsentrasi berapa dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang efektif sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti* ?

2. Berapa *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak diketahuinya konsentrasi yang efektif dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.
- b. Tidak diketahuinya *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Diketahuinya konsentrasi yang efektif dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.
- b. Diketahuinya *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas ekstrak adalah keberhasilan ekstrak kulit buah jeruk nipis sebagai insektisida dalam mematikan nyamuk *Aedes aegypti* yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antara konsentrasi dengan jumlah kematian.
- b. Ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) adalah kulit buah jeruk nipis yang telah diekstraksi dengan cara maserasi dengan pelarut etanol 96%.

- c. Insektisida yang dipakai dalam penelitian ini adalah insektisida formulasi semprot.
- d. Nyamuk *Aedes aegypti* adalah nyamuk *Aedes aegypti* betina yang berumur 2-5 hari setelah menjadi nyamuk dewasa, karena pada umur tersebut ketahanan tubuh nyamuk masih kuat dan sudah produktif.
- e. Konsentrasi ekstrak adalah konsentrasi ekstrak untuk perlakuan dalam penelitian ini yaitu: 15%, 30%, dan 60%.
- f. Jumlah kematian nyamuk adalah banyaknya nyamuk *Aedes aegypti* yang mati setelah perlakuan.
- g. LC_{50} (*Lethal Concentration 50*) adalah konsentrasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida, menyebabkan kematian pada 50% nyamuk uji.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu kesehatan lingkungan.
- b. Masalah penelitian dibatasi pada efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti* dengan metode semprot. (*residual contac*).
- c. Nyamuk yang diteliti adalah nyamuk *Aedes aegypti* betina berumur 2-5 hari yang diperoleh dari hasil pemeliharaan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- d. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental *post test only control group design*.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Pemanfaatan Tanaman Sebagai Insektisida Hayati/Botani

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Nur Ikhsan Alban (2014)	Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) terhadap Kematian Larva <i>Aedes sp.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsentrasi ekstrak - Lama pajanan - <i>Lethal Concentration</i> (LC) 50 dan 90 	Kuantitatif pendekatan eksperimen <i>post test only control group design</i>	Larva <i>Aedes sp</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada hubungan antara peningkatan konsentrasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan jumlah kematian larva <i>Aedes sp.</i> 2. Ada hubungan antara lama pajanan ekstrak kulit buah jeruk nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan jumlah kematian larva <i>Aedes sp.</i> Semakin lama larva <i>Aedes sp</i> terpajan ekstrak kulit buah jeruk nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dengan konsentrasi tertentu semakin meningkat pula persentase kematian larva <i>Aedes sp</i> 3. Estimasi nilai <i>Lethal Concentration</i> 50% (LC₅₀) yaitu pada konsentrasi dengan interval konsentrasi 0,115% dengan interval konsentrasi antara 0,044% dan 0,173% sedangkan nilai <i>Lethal Concentration</i> 90% (LC₉₀) yaitu pada konsentrasi dengan interval konsentrasi 0,386% dengan interval konsentrasi antara 0,305% dan 0,486% .

2	Nirma (2015)	Efektivitas Larvasida Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) dalam Membunuh Jentik Nyamuk <i>Aedes sp</i> (Studi di Daerah Epidemi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Antang Kecamatan Manggala	- Lama pajanan	Kuantitati pendekatan <i>quasi eksperimen</i> rancangan <i>before and after intervention design</i>	30 tempat perindukan nyamuk <i>Aedes sp</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah sebesar 11,758 dengan sig 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah larva sebelum dan setelah pemberian ekstrak kulit buah jeruk nipis maka H_a diterima, atau terdapat perbedaan jumlah larva sebelum dan setelah pemberian ekstrak kulit buah jeruk nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>).
3	Riska Ratwita Wibawa (2012)	Potensi Ekstrak Biji Mahkota Dewa (<i>Phaleria macrocarpa</i>) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dengan Metode Semprot	-Konsentrasi -LC 50	Eksperimen <i>post test only control group design</i>	Nyamuk <i>Ae. Aegypti</i>	1. Ekstrak biji mahkota dewa (<i>Phaleria macrocarpa</i>) memiliki potensi sebagai insektisida terhadap nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dengan metode semprot. 2. Potensi ekstrak biji mahkota dewa terhadap nyamuk <i>Aedes aegypti</i> pada LC50 diperoleh hasil dengan konsentrasi 12,9%
4	Kartika, dkk	Pemanfaatan Limonen dari Kulit Jeruk Nipis dalam Pembuatan Lilin Aromatik Penolak Serangga	- Konsentrasi - Lama - Perlakuan	Eksperimen	Kecoa	1. Pada 30 menit pertama 50% kecoa yang diujikan meninggalkan area yang sudah diberi lilin aromatik dengan penambahan atsiri dari limbah kulit jeruk nipis 0.3%. 2. Pada 30 menit pertama 100% kecoa yang diujikan meninggalkan area yang sudah diberi lilin aromatik dengan penambahan atsiri dari limbah kulit jeruk nipis 0.4%. 3. Pada 10 menit pertama semua kecoa yang diujikan meninggalkan area yang sudah diberi lilin aromatik dengan

						penambahan atsiri dari limbah kulit jeruk nipis 0.5%
5	Reisyah Tiara, Dkk (2015)	Uji Efektivitas Ekstrak Buah Leuca (<i>Solanum Nigrum L</i>) sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk <i>Ae. Aegypti</i> dan <i>Anopheles Aconitus</i>	Konsentrasi Ekstrak LC 50 dan LC 90	Eksperimen pendekatan <i>post test only control group design</i>	Nyamuk <i>Ae. Aegypti</i> dan <i>Anopheles Aconitus</i>	<p>1. Ekstrak buah Leunca (<i>Solanum nigrum L.</i>) memiliki efek insektisida terhadap nyamuk <i>Aedes aegypti</i> pada kelompok perlakuan dengan konsentrasi 80%, dilihat dari hasil yang signifikan pada uji Oneway Anova yaitu dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dan didapatkan LC50 pada konsentrasi 91,128(gr/100ml pelarut) dan LC90 pada konsentrasi 785,398 (gr/100ml pelarut).</p> <p>2. Ekstrak buah Leunca (<i>Solanum nigrum L.</i>) memiliki efek insektisida terhadap nyamuk <i>Anopheles aconitus</i> pada kelompok perlakuan dengan konsentrasi 40%, dilihat dari hasil yang signifikan pada uji Oneway Anova yaitu dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dan didapatkan LC 50 pada konsentrasi 24,767 (gr/100ml pelarut) dan LC90 pada konsentrasi 169,04 (gr/100ml pelarut)</p>
6	Fina Elis Suryani Sanpan (2013)	Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Duku (<i>Lansium domesticum corr</i>) sebagai Anti Nyamuk Elektrik terhadap Daya Bunuh Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	- Konsentrasi ekstrak	Eksperimen pendekatan <i>post test only control group design</i>	Nyamuk <i>Ae.aegypti</i>	Berdasarkan hasil uji Anova di peroleh nilai $p < \alpha 0,05$ ($p = 0,000 < \alpha 0,05$), berarti terdapat pengaruh daya bunuh ekstrak kulit buah duku (<i>Lansium domesticum corr</i>) dalam membunuh nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dengan konsentrasi berbeda

7	Mirawati, dkk. (2013)	Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Langsat (<i>Lansium domesticum</i>) Sebagai Anti Nyamuk Elektrik Terhadap Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	- Konsentrasi ekstrak	Penelitian Eksperimen	Nyamuk <i>Ae.aegypti</i>	Anti nyamuk elektrik yang dibuat dari ekstrak kulit buah langsung dengan beberapa konsentrasi mampu untuk nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dan konsentrasi ekstrak kulit langsung yang paling efektif membunuh nyamuk <i>Aedes aegypti</i> adalah 25% dibandingkan dengan konsentrasi yang lain.
---	-----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.
- 2) Untuk mengetahui *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida alternatif, aman, dan ramah lingkungan dalam upaya pengendalian nyamuk *Aedes aegypti*.

b. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini diharapkan bukan hanya berkembang sebagai bahan informasi di bidang akademik saja, namun juga bisa berkembang secara aplikatif di masyarakat yaitu bisa menjadi insektisida yang ekonomis dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk *Aedes aegypti*

Allah swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ini. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah swt. pasti memiliki tujuan dan fungsi masing-masing agar umat manusia mengambil pelajaran dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah swt. Dan dalam pertumbuhannya sebuah tumbuhan ataupun binatang mengalami proses perkembangan yang sangat rumit, yang tidak mudah untuk dipahami secara sederhana, salah satunya nyamuk. (Nirma, 2015). Nyamuk merupakan serangga yang perannya selalu dilihat dari sisi negatif saja seperti pembawa penyakit, pengganggu dan lainnya. Namun Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:26

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
 وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”.(Kementerian Agama RI, 2014:5)

Sesungguhnya Allah swt. tidak enggan membuat perumpamaan atau contoh yang dapat mengesankan, yaitu contoh berupa nyamuk atau yang melebihinya, yakni lebih rendah atau besar dari itu, dan yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar dan tepat oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah kebenaran sempurna yang bersumber dari Allah swt. (Shihab, 2009).

Nabi Muhammad saw. bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ . ﴿رواه الترمذی﴾

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding (seluas) sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir meski hanya satu tetes air". (HR. At-Tirmidzi: 940).

Dua dalil tersebut (al-Qur'an dan Hadis) menunjukkan betapa pentingnya seekor nyamuk (*ba'udhoh*) sehingga dijadikan sebagai suatu perumpamaan. Dan sains modern mengungkap banyak hal tentang nyamuk yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya oleh nalar manusia. Selain itu, nyamuk dapat menularkan beberapa penyakit berbahaya seperti Malaria, Kaki Gajah dan Demam Berdarah Dengue (DBD). (Thayyarah, 2013).

Aedes aegypti merupakan nyamuk yang dapat berperan sebagai vektor berbagai macam penyakit diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD). Walaupun beberapa spesies dari *Aedes sp.* dapat pula berperan sebagai vektor, akan tetapi *Aedes*

aegypti tetap merupakan vektor utama dalam penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (Soegijanto, 2003 dalam Palgunadi, 2011).

1. Taksonomi

Adapun kedudukan nyamuk *Aedes aegypti* dalam klasifikasi hewan (*taxonomi*) menurut Bagus Uda Palgunadi, 2011 adalah sebagai berikut :


Kerajaan : *Animalia*
 Phylum : *Arthropoda*
 Class : *Hexapoda (Insecta)*
 Sub Class : *Pterygota*
 Divisi : *Endopterygota*
 Ordo : *Diptera*
 Sub Ordo : *Nematocera*
 Family : *Culicidae*
 Sub Family : *Culicinae*
 Genus : *Aedes*
 Spesies : *Ae. aegypti*
 Nama Binomial : *Aedes aegypti*



Gambar 2.1. *Aedes aegypti*
 (Sumber : Wikipedia,2013)

2. Morfologi

Nyamuk *Aedes aegypti* dikenal juga sebagai *Tiger Mosquito* atau *Black White Mosquito*, karena tubuhnya mempunyai ciri khas berupa adanya garis-garis dan bercak putih keperakan di atas dasar warna hitam. Dua garis melengkung berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral serta dua buah garis putih sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam. (James MT and Harwood RF, 1969 dalam Palgunadi, 2011).




Gambar 2.2. Ciri-Ciri Nyamuk *Aedes aegypti*
(Sumber : <http://hewantumbuh.blogspot.co.id>)

Adapun corak putih pada dorsal dada (punggung) *Aedes aegypti* berbentuk siku yang berhadapan (*lyre-shaped*), sedangkan corak putih pada nyamuk *Aedes albopictus* berbentuk lurus di tengah-tengah punggung (*median stripe*) (Sigit, 2006 dalam Boekoesoe, 2013). Mulut nyamuk termasuk tipe menusuk dan menghisap (*rasping-sucking*), mempunyai enam stilet yaitu gabungan antara mandibula, maxilla yang bergerak naik turun menusuk jaringan sampai menemukan pembuluh darah kapiler dan mengeluarkan ludah yang berfungsi sebagai cairan racun dan antikoagulan. (Sembel DT, 2009 dalam Palgunadi, 2011).

Nyamuk *Aedes* betina mempunyai abdomen yang berujung lancip dan mempunyai cerci yang panjang. (Neva FA and Brown HW, 1994 dalam Palgunadi, 2011).

3. Siklus Hidup

Aedes aegypti mengalami metamorfosis lengkap/metamorfosis sempurna (*Holometabola*) yaitu dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva (beberapa instar), pupa dan dewasa.



Gambar 2.3. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*
(Sumber : <http://katayaabadi.com/Blog%20Posts/new-post-3.html>)

Telur *Aedes aegypti* tidak mempunyai pelampung dan diletakkan satu persatu di atas permukaan air. Ukuran panjangnya 0,7 mm, dibungkus dalam kulit yang berlapis dan mempunyai saluran berupa corong. (Neva FA and Brown HW, 1994 dalam Palgunadi, 2011). Telur nyamuk *Aedes aegypti* berwarna hitam dan menempel pada dinding penampungan air. Apabila wadah air mengering, telur bisa bertahan hidup selama beberapa minggu bahkan bulan. Ketika wadah berisi air lagi maka telur akan menetas menjadi jentik (larva). (Sigit, 2006 dalam Boekoesoe, 2013). Telur nyamuk *Aedes aegypti* di dalam air dengan suhu 20-40 °C akan menetas menjadi larva dalam waktu 1-2 hari. (Hamzah, 2004 dalam Boekoesoe, 2013).

Jentik (*larva*) nyamuk *Aedes aegypti* dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit (*ecdysis*), Jentik (*larva*) yang terbentuk berturut-turut disebut larva instar I, II, III, dan IV. Larva instar I tubuhnya sangat kecil, transparan, panjangnya 1-2 mm, duri-duri (*spinae*) pada dada (*thorax*) belum begitu jelas, dan corong pernapasan (*siphon*) belum menghitam. Larva instar II

bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, dan corong pernapasan sudah berwarna hitam. Larva instar III lebih besar sedikit dari instar II. Larva instar IV telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala (*chepalo*), dada (*toraks*), dan perut (*abdomen*). (Hamzah, 2004 dalam Litnje Boekoesoe, 2013).

Larva menggantungkan dirinya pada permukaan air untuk mendapatkan oksigen di udara. Larva menyaring mikroorganisme dan partikel-partikel lainnya dalam air. (Harwood RF and James MT, 1979 dalam Palgunadi, 2011). Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: temperatur, keadaan air, dan kandungan zat makanan yang ada di habitat perkembangbiakan. Pada kondisi optimum larva berkembang menjadi pupa dalam waktu 6-8 hari,

Pupa nyamuk *Aedes aegypti* bentuk tubuhnya bengkok dengan bagian kepala-dada (*cephalotoraks*) lebih besar dibandingkan dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca “koma”. Pada bagian punggung (*dorsal*) dada terdapat alat bernapas seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh tersebut berjumbai panjang dan bulu dinomor 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. Waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. Stadium pupa ini adalah stadium tidak makan. Bila terganggu dia akan bergerak naik turun di dalam wadah air. Dalam waktu kurang lebih 2 hari, pupa akan muncul menjadi nyamuk dewasa. Jadi total siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* bisa diselesaikan dalam waktu 9-12 hari. (Sigit, 2006 dalam Litnje Boekoesoe, 2013)

4. Binomik Nyamuk *Aedes aegypti*

Binomik adalah perilaku nyamuk yang meliputi, tempat bertelur, (*habitat places*), kebiasaan menggigit (*host preference*), tempat istirahat (*resting places*), dan jangkauan terbang.

a. Tempat bertelur (*habitat places*)

Nyamuk *Aedes aegypti* dewasa akan bertelur di air jernih dan bersih, tidak terkontaminasi bahan kimia dan material organik. Nyamuk *Aedes aegypti* menyukai air bersih sebagai tempatnya bertelur yakni air yang tidak kontak langsung dengan tanah, tertampung dalam suatu wadah, tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan berwarna gelap. (Hamzah, 2004 dalam Boekoesoe, 2013). Jumlah telur yang dikeluarkan setiap sekali adalah sekitar 100-400 butir (Brown, 1969 dalam Sucipto, 2011). Jenis tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/wc, dan ember.
- 2) Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, vas bunga, perangkat semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain)
- 3) Tempat penampungan air alamiah seperti: lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, dan potongan bambu. (Kemenkes RI, 2013)

b. Kebiasaan Menggigit (*host preference*)

Nyamuk *Aedes aegypti* betina menggigit dan menghisap darah untuk merangsang hormon yang diperlukan untuk ovulasi, sedangkan nyamuk jantan tidak

menghisap darah tetapi hidup dengan menghisap madu dan sari-sari tumbuhan sebagai makanannya. (Yuniarsih E., 2010). Nyamuk *Aedes aegypti* bersifat *antropofilik* yaitu lebih memilih darah manusia daripada hewan. Nyamuk *Aedes aegypti* memiliki aktivitas menggigit umumnya pada pukul 08.00-12.00 dan sebelum matahari terbenam pukul 15.00-17.00. Nyamuk betina menggigit di dalam rumah, dan hanya kadang di luar rumah. (Hamzah, 2004 dalam Boekoesoe, 2013). Nyamuk betina mempunyai kebiasaan menghisap darah berulang kali (*multiple bites*) dalam satu *siklus gonotropik*, untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Dengan demikian nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit (Depkes RI, 2005 dalam Sucipto, 2011).


c. Tempat Istirahat (*Resting places*)

Nyamuk *Aedes aegypti* sebelum menggigit, nyamuk akan beristirahat untuk dapat mengenali mangsanya, sesudah menggigit tubuh nyamuk akan lebih berat sehingga nyamuk akan beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Nyamuk betina membutuhkan waktu 2-3 hari untuk beristirahat dan mematangkan telurnya. Nyamuk *Aedes aegypti* mempunyai kebiasaan istirahat terutama di dalam rumah, di tempat yang gelap, lembab dan pada benda-benda yang bergantung. (Hamzah, 2014 dalam Boekoesoe, 2013).

d. Jangkauan Terbang dan Masa Hidup

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter namun secara pasif misalnya karena angin atau terbawa domestik masyarakat dapat berpindah lebih jauh. (Hamzah, 2014 dalam Boekoesoe, 2013). Umur nyamuk betina bisa mencapai 8-15 hari, sedangkan nyamuk jantan 3-6 hari. (Sucipto, 2011). Umur nyamuk jantan lebih pendek dari nyamuk betina. (Christopher, 1960 dalam Sucipto,

2011). Sedangkan umur nyamuk *Aedes aegypti* di alam bebas biasanya sekitar 10 hari. Umur 10 hari tersebut cukup untuk mengembangbiakkan *virus dengue* di dalam tubuh nyamuk tersebut. Di dalam laboratorium dengan suhu ruangan 28 °C kelembaban udara 80% dan nyamuk diberi makan larutan gula 10% serta darah mencit, umur nyamuk dapat mencapai 2 bulan. (sungkar 2005 dalam Sucipto, 2011). Suhu rata-rata untuk perkembangan nyamuk adalah 25-27 °C. Pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali kurang dari 10 °C atau lebih dari 40 °C. Sedangkan pada kelembaban kurang dari 60% umur nyamuk menjadi pendek. (Depkes RI, 2004 dalam Sucipto, 2011).



Gambar 2.4. Masa Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*
(Sumber: Kemenkes RI, 2013)

5. Penyebaran

Negara Afrika, yaitu di sub-sahara yang menjadi daerah asal nyamuk *Aedes*, dan sampai sekarang terdapat *Aedes aegypti* yang alamiah. Sifat nyamuk adalah nyamuk malam, tidak suka menggigit manusia, dan silvatik (hidup di hutan, pohon dan kebun). Telur diletakkan di sembarang tempat. Namun pada jaman perbudakan nyamuk tersebut ikut pindah ke daerah hunian manusia karena ada perubahan lingkungan maka sifatnya jadi berubah. Sifat nyamuk menjadi nyamuk siang dan suka menggigit manusia dan bertelur pada tempat penampungan air buatan manusia. (Harnington et al., 2000 dalam Sucipto, 2011).

Nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk dapat hidup dan berkembangbiak sampai ketinggian ± 1000 m dari permukaan laut. Di atas ketinggian 1000 m *Aedes aegypti* tidak dapat berkembangbiak karena pada ketinggian tersebut suhu udara terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan bagi kehidupan nyamuk tersebut. (Sungkar, 2005 dalam Sucipto, 2011).

Nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di seluruh Indonesia terutama di kota pelabuhan dan pusat-pusat penduduk yang padat. Kepadatan *Aedes aegypti* tertinggi di daerah dataran rendah. Hal ini disebabkan karena penduduk di daerah dataran rendah lebih padat dibandingkan dataran tinggi. (Suroso, 2000 dalam Sucipto, 2011). Pada musim hujan, kelembaban udara meningkat dan tempat penampungan air bertambah banyak karena terisi air hujan. Maka dari itu populasi *Aedes aegypti* meningkat. Bertambahnya populasi nyamuk tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). (Sucipto, 2011).

6. Peran Nyamuk *Aedes aegypti* sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Nyamuk *Aedes aegypti* dapat mengandung virus Demam Berdarah Dengue (DBD) bila telah menghisap darah penderita. Virus tersebut akan masuk ke dalam intestinum nyamuk. Replikasi virus terjadi dalam *hemocoelum* dan akhirnya akan menuju ke dalam kelenjar air liur serta siap ditularkan. Fase ini disebut sebagai *extrinsic incubation periode* yang memerlukan waktu selama 7-14 hari. (Soewondo ES, 1998 dalam Palgunadi, 2011).

Pada biakan sel mamalia, *virus dengue* dapat menimbulkan *Cyto Pathogenic Effect (CPE)* yang tergantung pada jenis sel yang digunakan. Pada sel vetebrata dapat

terjadi *vacuolisasi* dan *proliferasi membrane intraseluler* sedangkan pada sel nyamuk sering CPE tidak terjadi sehingga infeksiya bersifat persisten. Dengan demikian dapat dianalogikan dengan keberadaan virus pada tubuh nyamuk *Aedes* di alam, dimana virus ini dapat berada dalam tubuh nyamuk dan bereplikasi tanpa menimbulkan kematian pada nyamuk karena tidak terbentuknya CPE (Soegijanto S, 2003 dalam Palgunadi, 2011)

Pengaruh lingkungan yaitu suhu udara dan kelembaban nisbi udara juga berpengaruh bagi viabilitas nyamuk *Aedes* maupun *virus dengue*. Suhu yang relatif rendah atau relatif tinggi, serta kelembaban nisbi udara yang rendah dapat mengurangi viabilitas *virus dengue* yang hidup dalam tubuh nyamuk maupun mengurangi viabilitas nyamuk itu sendiri. Sehingga pada waktu musim kemarau penularan penyakit Demam Berdarah Dengue sangat rendah dibandingkan dengan pada waktu musim hujan. (Yotopranoto S dkk.,1998 dalam Palgunadi, 2011).

Banyak peneliti telah melaporkan adanya *transovarial transmission virus dengue* yang ada di dalam tubuh nyamuk betina *Aedes aegypti* ke dalam telur-telurnya. Dengan dibuktikan adanya *transovarial transmission virus dengue* dalam tubuh nyamuk *Aedes aegypti* maka diduga kuat bahwa nyamuk ini di alam memegang peranan penting yang bermakna dalam mempertahankan *virus dengue*. (Soegijanto S, 2003 dalam Palgunadi, 2011).

B. Pengendalian Vektor

Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan/menekan populasi atau *densitas* vektor dengan maksud untuk mencegah penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh

vektor. (Arif Sumantri, 2013). Dari beberapa upaya pengendalian vektor, sampai saat ini upaya yang paling banyak digunakan dan dianggap lebih praktis oleh masyarakat adalah upaya pemberantasan vektor/binatang pembawa penyakit dengan cara membunuh baik dengan cara kimia maupun mekanik. Dalam syariat islam dibangun di atas pondasi *jalbul mashalih* (menciptakan dan mendatangkan kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menghapus semua bahaya dan kerusakan). Semua yang merusak dan mengganggu boleh dihilangkan sesuai dengan tingkatan kerusakan dan gangguan yang timbul. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan (HR. Ibu Majah)

Masalah membunuh serangga yang sering ada di dalam rumah seperti kecoak, dan sejenisnya pernah ditanyakan kepada Syaikh Bin Baz rahimahullah dan beliau menjawab: “*serangga-serangga tersebut apabila menimbulkan gangguan, maka boleh dibunuh namun tidak boleh dilakukan dengan menggunakan api (dibakar)*.” Dalam sebuah hadist telah dijelaskan hukum membunuh binatang secara sengaja, salah satunya yaitu, binatang yang boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan adalah setiap hewan atau binatang yang memiliki tabiat yang membahayakan dan menyakitkan manusia maka boleh dibunuh baik di tanah suci maupun di tempat yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya :

“Lima hewan yang semuanya jahat, boleh dibunuh walau di tanah suci; burung gagak, burung rajawali, anjing yang suka melukai, kalajengking dan tikus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad saw. Telah memberitahukan bahwa bahwa sifat pengganggu melekat pada hewan-hewan tersebut. Dalam bahasa rasulullah, binatang-binatang pengganggu itu disebut *fawasiq*. Nabi Muhammad saw. Pun mengizinkan untuk membunuhnya. Demikian juga serangga diperbolehkan membunuhnya di tanah suci dan di luar tanah suci apabila binatang-binatang tersebut menimbulkan gangguan seperti kecoak, nyamuk dan lain yang menimbulkan gangguan (*Majmû' Fatâwa wa Maqâlât Mutanawwi'ah* 5/301-302).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 374/Menkes/Per/III/2010, tentang Pengendalian Vektor bahwa pengendalian vektor dilakukan dengan menggunakan metode Pengendalian Vektor Terpadu. Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) atau *Integrated Vector Control/IVC* merupakan salah satu program dari upaya penanggulangan penularan Penyakit Berbasis Nyamuk (PBN) dan merupakan suatu pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan, rasionalitas, efektivitas serta dengan pertimbangan kesinambungan. selain itu, mengingat keberadaan vektor dipengaruhi oleh lingkungan fisik, biologis dan sosial budaya, maka pengendaliannya tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor (LSM, dunia usaha/swasta serta masyarakat) dan lintas program. Jadi, konsep pengendalian vektor terpadu adalah pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen dan pertimbangan terhadap penularan dan pengendalian penyakit. pengendalian vector terpadu merupakan

kegiatan terpadu dalam pengendalian vektor sesuai dengan langkah kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian sebagai berikut:

1. Metode pengendalian fisik dan mekanis adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Contohnya: modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan (3M, penanaman bakau, pengaliran/drainase dll.), pemasangan kelambu, memakai baju lengan panjang, penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk (*cattle barrier*), dan pemasangan kawat kasa.
2. Metode pengendalian dengan menggunakan agen biotic. Contohnya: predator pemakan jentik, bakteri, virus, fungi serta manipulasi gen (penggunaan jantang mandul).
3. Metode pengendalian secara kimia. Contohnya: *surface spray*, kelambu berinsektisida, larvasida, *space spray* (pengkabutan panas/fogging dan dingin/ULV), serta penggunaan insektida rumah tangga (*reppellent*, anti nyamuk bakar, *liquid vaporizer*, *paper vaporizer*, mat, *aerosol* dan lain-lain).

Menurut Hoedoyo dan Zulhasril, 2008 secara garis besar pengendalian vektor terbagi 2 yaitu:

1. Pengendalian alami

Berbagai faktor ekologi berperan dalam pengendalian vektor secara alami seperti:

- a. Adanya gunung, laut, danau dan sungai yang merupakan rintangan bagi penyebaran serangga.

- b. Ketidakmampuan beberapa spesies serangga untuk mempertahankan hidup di ketinggian tertentu dari permukaan laut.
- c. Perubahan iklim, (musim, curah hujan, angin), suhu udara serta kelembaban udara yang dapat menimbulkan gangguan pada beberapa spesies serangga.

2. Pengendalian buatan

- a. Pengelolaan lingkungan, pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan, yaitu dengan memodifikasi atau manipulasi lingkungan. Misalnya pembersihan dan pemeliharaan sarana fisik tempat istirahat serangga atau pemberantasan sarang nyamuk seperti, 3M (menguras, menutup, dan mengubur) Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ كَرِيالِنَّظَافَةً مِّمُّ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظَّفُوا
أَفَنِيَّتِكُمْ (رواه الترمذی)

Artinya :

“Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu”. (H.R. At-Tirmizi:2723)

- b. Fisik, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan pemanas, pembeku, serta penggunaan alat listrik lain untuk penyinaran cahaya dan pengadaan angin yang dapat membunuh atau mengganggu kehidupan serangga.
- c. Kimia, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan insektisida. Insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga. Menurut Ridad (1999), ada beberapa istilah yang berhubungan dengan insektisida seperti: *ovisida*, yaitu insektisida untuk

membunuh stadium telur, *larvasida*, yaitu insektisida untuk membunuh stadium larva, dan *adultisida*, yaitu insektisida untuk membunuh stadium dewasa.

- d. Mekanik, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan alat yang langsung dapat membunuh, menangkap, menyisir, atau menghalau serangga. Misalnya menggunakan baju pelindung dan memasang kawat kasa dijendela merupakan salah satu cara untuk menghindarkan hubungan antara manusia dengan vektor.
- e. Biologi, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan makhluk lain yang merupakan musuh alami nyamuk. Beberapa parasit dari golongan nematoda, bakteri, protozoa, jamur, virus yang dapat digunakan sebagai pengendali larva nyamuk.
- f. Genetik, pengendalian ini dapat dilakukan dengan mengganti dari populasi vektor menjadi non vektor (lebih banyak ke arah perubahan reproduksi).

C. Tinjauan Umum Tentang Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Nama latin jeruk nipis adalah *Citrus aurantifolia*. Orang inggris menyebutnya dengan Lime, sedangkan orang arab menyebutnya dengan *Limah*. Dan orang Indonesia menyebutnya dengan *Jeruk nipis*. Jeruk nipis diduga berasal dari daerah Indo Cina, Myanmar, atau India utara.



Gambar 2.5. Tanaman Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)
(Sumber : jualanekatanaman.wordpress.com dan manfaatbagus.com)

Tanaman *Citrus aurantifolia* (Citstn), Swingle dikenal di pulau Sumatera dengan nama Kelangsa (Aceh), di pulau Jawa dikenal dengan nama jeruk nipis (Sunda) dan jeruk pecel (Jawa), di pulau Kalimantan dikenal dengan nama lemau nepi, di pulau Sulawesi dengan nama lemo apel, lemo kapasa (Bugis) dan lemo kadasa (Makassar), di Maluku dengan nama puhatem nepi (Buru), ahusi hisni, auphisis (Seram), intan, lemonepis, ausinepsis, usinepese (Ambon) dan wanabeudu (Halmahera) sedangkan di Nusa Tenggara disebut jeruk alit, kapulungan lemo (Bali), dangacete (Bima), mudutelong (Flores), mudakenelo (Solor) dan delomakii (Rote).

1. Taksonomi dan Morfologi Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tingginya sekitar 0,5-3,5 meter. Tumbuhan ini pohonya tegak. Tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara, tumbuhan jeruk nipis sudah tersebar luas di daerah tropis hingga ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. (Karina, 2012).

Kedudukan tanaman jeruk nipis menurut Karina, 2012 dalam sistematika tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
 Divisi : *Magnoliophyta*
 Kelas : *Magnoliopsida*
 Ordo : *Sapindales*
 Famili : *Rutaceae*
 Genus : *Citrus*
 Spesies : *C. aurantifolia*
 Nama Binomial : *Citrus aurantifolia*.

a. Morfologi Batang Jeruk Nipis

Tanaman citrus memiliki batang yang tergolong dalam batang berkayu (*lignosus*), yaitu batang yang biasanya keras dan kuat, karena sebagian besar terdiri dari kayu. Batangnya berbentuk bulat (*teres*), berduri (*spinosus*) pendek, kaku dan juga tajam. Selain itu, arah tumbuh batangnya mengangguk (*nutans*), dimana batangnya tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya membengkok kembali ke bawah (Purwanto, 2011 *dalam* Diana, 2013).

b. Morfologi Daun Jeruk Nipis

Daun jeruk nipis berwarna hijau dan berwarna segar, tangkai daun bersayap sempit. Daun jeruk nipis bentuknya bulat telur, memiliki tangkai daun bersayap dan ujung daun agak tumpul. Warna daun pada permukaan bawah umumnya hijau muda, sedangkan dibagian permukaan atas berwarna hijau tua mengkilap. Panjang daun berkisar 2,5–9 cm dan lebar 2,5 cm (Purwanto, 2011 *dalam* Diana, 2013).

c. Morfologi Bunga Jeruk Nipis

Bunga pada jeruk nipis muncul dari ujung-ujung ranting dan pucuk daun yang baru merekah. Bunga jeruk berbentuk bintang berwarna putih, banyaknya bunga pertandan berkisar 1-10 kuntum. Bunganya sempurna dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari. Daun kelopaknya berbentuk cawan dan memiliki mahkota bunga sebanyak 6 helai (Purwanto, 2011 *dalam* Diana, 2013).

d. Morfologi Buah Jeruk Nipis

Buah jeruk nipis berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 2,5-5 cm. Buah jeruk nipis berkulit tipis tanpa benjolan dan permukaan licin. Kulit buahnya memiliki 3 lapisan. Lapisan luar yang kaku mengandung banyak kelenjar minyak astiri yang mula-mula berwarna hijau dan akan menjadi kuning jika matang.

Lapisan tengah yang bersifat seperti spon terdiri atas jaringan bunga karang yang biasanya berwarna putih. Lapisan dalam yang bersekat-sekat, hingga terbentuk beberapa ruangan. Buah jeruk nipis rasanya asam dan sedikit dingin. Berat buah jeruk nipis sekitar 50-70 gram per butir. Buah jeruk nipis untuk berkembang memerlukan waktu 5-6 bulan sejak muncul bunga sampai buah siap dipanen (Purwanto, 2011 dalam Diana, 2013).

2. Manfaat dan Kandungan Kimia Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Beberapa genus citrus memiliki banyak manfaat karena zat yang dikandungnya dimana, di dalam hadis Rasulullah saw. pernah menyinggung tentang salah satu dari genus citrus (limau), yaitu : Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "*Perumpamaan seorang mukmin yang membaca al-Qur'an seperti limau, baunya harum dan rasanya enak*"(HR. Muslim 2/194). Menurut Ibnu Al-Qayyim, pada buah limau terdapat banyak manfaat mulai dari kulit, daging, rasa asam, dan bijinya. Kulit limau dapat mengharumkan udara karena kulit limau mengandung minyak esensial sebagaimana yang digunakan untuk ekspektorat. (Thayyarah, 2013). Begitupun dengan jeruk nipis yang merupakan salah satu genus citrus, juga memiliki banyak manfaat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Merin Awu Sari (2012), bahwa aromaterapi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah bakteri udara di ruang ICU Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya: asam sitrat, asam amino (*triptofan, lisin*), minyak atsiri (*sitral, limonen, felandren, lemon kamfer, kadinen, gerani-lasetat, linali-lasetat, aktilaldehid, nonilaldehid*), damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang

vitamin B1 dan C. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid yaitu hesperidin (*hesperetin 7-rutinosida*), *tangeretin*, *naringin*, *eriocitrin*, *eriocitroside*.(CCRC, 2014). Berdasarkan beberapa penelitian, bahwa *saponin*, *flavonoid* dan Minyak Atsiri merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan aktif pembuatan insektisida hayati.

Flavonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun/*aleopati*, merupakan persenyawaan dari gula yang terikat dengan flavon. Flavonoid mempunyai sifat khas yaitu bau yang sangat tajam, rasanya pahit, dapat larut dalam air dan pelarut organik, serta mudah terurai pada temperatur tinggi (Haditomo, 2010 *dalam* Ikhsan, 2014). Flavonoid merupakan golongan *fenol* dan banyak ditemukan di dalam tumbuhan. Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat insektisida. Flavonoid menyerang bagian syaraf pada beberapa organ vital serangga sehingga timbul suatu perlemahan syaraf, seperti pernapasan dan menimbulkan kematian (Dinata, 2009 *dalam* Setiawan, 2015).

Saponin termasuk ke dalam senyawa terpenoid. Aktivitas saponin ini di dalam tubuh serangga adalah mengikat sterol bebas dalam saluran pencernaan makanan dimana sterol itu sendiri adalah zat yang berfungsi sebagai prekursor hormon ekdison, sehingga dengan menurunnya jumlah sterol bebas dalam tubuh serangga akan mengakibatkan terganggunya proses pergantian kulit (*moulting*) pada serangga. Selain itu, saponin bersifat bisa menghancurkan butir darah merah, bersifat racun bagi hewan berdarah dingin. (Gunawan, 2004 *dalam* Sampan, 2013).

Minyak Atsiri adalah senyawa yang memberikan bau khas tumbuhan, dari bau tersebut, minyak atsiri memiliki kemampuan untuk mempengaruhi saraf serangga

(terutama hidung). Minyak Atsiri hanya ditemukan pada tumbuhan yang memiliki sel glandula (Dinata, 2009 dalam Satri Setiawan, 2015).

D. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam

Nabi Muhammad saw. datang membawa kebenaran-kebenaran ilmiah di tengah bangsa yang terbelakang dan tak berilmu yaitu berupa kalam Allah swt. (al-Qur'an). Kemukjizatan al-Qur'an tampak dengan jelas, seperti banyaknya para ilmuwan di berbagai bidang berhasil menyingkap mukjizat ilmiah yang termuat di dalam al-Qur'an khususnya tentang ciptaan-Nya, baik itu benda hidup maupun tak hidup, proses penciptaan hingga berbagai macam faedah dari ciptaannya telah dibuktikan secara empiris, baik dalam bidang sains hingga kesehatan. Contohnya penciptaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang telah diungkapkan fungsi dan manfaatnya di dalam al-Qur'an, kini telah dibuktikan secara ilmiah, yaitu dalam bidang pengobatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Syu'ara/26:7-9.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.”(Kementerian Kesehatan RI, 2014:367).

Berdasarkan ayat tersebut kata *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009). Menurut Savitri (2008) tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup (Ikhsan, 2014). Jadi, betapa banyak ragam tumbuhan bermanfaat yang telah Allah swt. ciptakan di dunia ini, seperti buah-buahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16:11.

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Kementerian Agama RI, 2014:268)

Pada dalil sebelumnya telah dijelaskan manfaat tumbuhan secara umum, sedangkan pada dalil di atas menyebut beberapa yang paling bermanfaat, bahwa *Dia* yakni Allah swt., *menumbuhkan bagi kamu dengannya*, yakni dengan air hujan itu, *tanaman-tanaman*; dari yang cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan *zaitun*, salah satu pohon paling panjang usianya, demikian juga *kurma*, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga *anggur* yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, *dan dari segala macam atau berbagai buah-buahan* (2009:543) dan salah satunya adalah buah jeruk nipis. Buah

jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) merupakan jenis buah yang banyak dimanfaatkan dalam bidang tataboga/bahan penambah cita rasa pada makanan serta air perasan buah jeruk nipis juga memiliki manfaat dalam bidang pengobatan. Selain itu, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kulit buah jeruk nipis juga memiliki banyak manfaat salah satunya adalah sebagai insektisida alami. Dengan demikian, semua tanaman/tumbuhan yang Allah swt. ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Āli-‘Imrān /3: 190-191.

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Kementerian Agama RI, 2014: 109-110).

Sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaan-Nya juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya pada tubuh dan cara berfikir, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna, dan sebagainya merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaan-Nya. Dan

yang dimaksud dengan *Ulul albab* adalah orang-orang yang mau memikirkan tentang kejadian-kejadian langit dan bumi beserta rahasia-rahasia dan manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya yang menunjukkan pada ilmu yang sempurna, hikmah yang tertinggi dan kemampuan yang utuh. Jadi berdasarkan firman Allah swt. di atas telah dijelaskan bahwa semua yang Allah ciptakaan di dunia ini, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang berfikir.

E. Tinjauan Umum Tentang Insektisida

1. Pengertian Insektisida

Secara harfiah insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan serangga hama. Pengertian secara luas yaitu semua bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, menolak atau mengurangi serangga. Insektisida dapat berbentuk padat, larutan dan gas. Insektisida digunakan untuk mengendalikan serangga dengan cara mengganggu atau merusak sistem di dalam tubuh serangga. (Sucipto, 2011)

2. Cara Masuk (*Mode Of Entry*) dan Cara Kerja (*Mode Of Action*) Insektisida dalam Tubuh Serangga

Insektisida masuk ke dalam tubuh serangga (*mode of entry*) melalui pernafasan, termakan dan kontak langsung. Menurut cara masuknya ke dalam tubuh serangga, maka insektisida digolongkan menjadi racun kontak, racun pernafasan dan racun perut.

- a. Sebagai racun kontak, insektisida diaplikasikan langsung menembus integumen serangga (*kutikula*), trakhea atau kelenjar sensorik dan organ lain yang berhubungan dengan *kutikula*.

- b. Sebagai racun perut, insektisida masuk ke dalam tubuh serangga melalui sistem pencernaan, sehingga bahan aktif harus tertelan dan termakan oleh serangga.
- c. Sebagai racun pernafasan, insektisida masuk ke dalam tubuh serangga melalui lubang pernafasan (*spirakel*).

Cara kerja insektisida memberikan pengaruh terhadap serangga berdasarkan aktivitas insektisida di dalam tubuh serangga. Titik tangkap spesifik (bagian serangga yang dipengaruhi insektisida), yaitu enzim dan potein. Beberapa insektisida dapat mempengaruhi lebih dari satu titik tangkap pada serangga.

Menurut Sigit (2006), cara kerja insektisida yang digunakan dalam pengendalian hama pemukiman dibagi dalam 5 yaitu: mengganggu sistem saraf, menghambat produksi energi, mempengaruhi sistem endokrin, menghambat produksi kutikula, dan menghambat keseimbangan air. (Sucipto, 2011).

3. Jenis-jenis Insektisida

a. Insektisida Anorganik/Inorganik

Insektisida anorganik/inorganik merupakan insektisida yang dalam struktur kimianya tidak mengandung atom karbon. Umumnya berbentuk kristal putih seperti garam dapur, stabil, tidak menguap dan tidak larut dalam air. Belerang adalah bahan inorganik tertua yang digunakan sebagai insektisida pada nenek moyang pra sejarah (1000 SM). Senyawa inorganik yang sering digunakan adalah jenis borat. Borat adalah senyawa kimia yang mengandung unsur boron yang secara alamiah yang diperoleh dari deposit boraks. Kelebihan asam borat adalah toksisitas akut terhadap manusia dan binatang rendah, tidak terserap oleh kulit, tidak berbau, non repelen serta sangat toksik terhadap serangga. Adapun kekurangan dari asam borat adalah dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang terluka dan mata, juga harus diperhatikan pada

saat aplikasi di sekitar penderita asma karena dapat memperparah penderita. (Sucipto, 2011).

b. Insektisida Sintetik

Insektisida sintetik adalah jenis insektisida yang mana bahan zat aktifnya berasal dari bahan kimia sintetik untuk mengendalikan atau membunuh serangga. Seperti *Organophosfat*, *Carbamate*, *Temefos*, *Piretroid* dan jenis insektisida lainnya dengan formulasi yang berbeda-beda.

Penggunaan insektisida sintetis ini pada kurun waktu 40 tahun terakhir semakin meningkat baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Namun penggunaan insektisida sintetis ini dapat menimbulkan pengaruh yang tidak diharapkan. Insektisida sintetis bersifat toksik pada manusia dan di alam sukar terdegradasi sehingga residunya dapat mencemari tanah, air dan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. (Irawati, 2010 dalam Sampan, 2013).

Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa *malathion* yang merupakan bahan aktif racun *Organofosfat*, dalam jangka panjang dapat menyebabkan keracunan yang ditandai dengan sakit dada, batuk, dan sukar bernafas, pengeluaran keringat, dan pengeluaran air liur yang berlebihan, kelemahan anggota badan, sakit kepala, sakit perut serta pandangan menjadi kabur. Adapun tingkat keracunan ini tergantung pada jenis, jumlah dan bahan campuran yang digunakan. (Soemardi, 2013 dalam Sampan, 2013). Adapun kelebihan dari insektida sintetis sampai saat ini, pengaplikasiannya efektif untuk daerah endemik/KLB penyakit bawaan vektor seperti DBD dan Malaria.

c. Insektisida Nabati/Hayati

Insektisida nabati atau insektisida botani (hayati) adalah bahan alami yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kelompok metabolik sekunder yang

mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti *alkaloid*, *fenolik*, dan zat kimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang terinfeksi organisme pengganggu tidak berpengaruh terhadap fotosintesa, pertumbuhan atau aspek fisiologi tanaman lainnya, namun berpengaruh terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). sistem yang terpegaruh pada OPT adalah sistem saraf/otot, keseimbangan hormone, reproduksi, perilaku, sistem pernapasan, dll. (Departemen Pertanian, 1994 dalam Naria, 2015). Senyawa bioaktif ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan serangga yang terdapat di lingkungan rumah. (Naria, 2015).

Senyawa bioaktif yang terdapat pada tanaman dapat dimanfaatkan seperti layaknya insektisida sintetik. Perbedaannya adalah bahan aktif pada insektisida nabati disintesa oleh tumbuhan dan jenisnya dapat lebih dari satu macam (campuran). Bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, biji, kulit, batang, dan sebagainya dapat digunakan dalam bentuk utuh, bubuk maupun ekstraksi (dengan air dan senyawa pelarut organik). Bila senyawa atau ekstrak ini digunakan di alam, maka tidak mengganggu organisme lain yang bukan sasaran.

Insektisida nabati merupakan bahan alami, bersifat mudah terurai di alam (*Biodegradable*) sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia maupun ternak karena residunya mudah hilang. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan yang diduga berfungsi sebagai insektisida diantaranya adalah golongan, *saponin*, *tanin*, *flavonoid*, *alkaloid*, *steroid*, dan *minyak atsiri* (Kardianan, 2000 dalam Naria, 2015).

Penggunaan insektisida nabati di Indonesia lebih populer di bidang pertanian daripada penggunaan di rumah tangga. Padahal, di dalam rumah dapat hidup berbagai

binatang yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan manusia, yang perlu untuk dikendalikan. Penggunaan insektisida hayati di rumah tangga merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan. Penggunaan insektisida nabati/hayati di rumah tangga memiliki keunggulan antara lain:

- 1) Insektisida nabati tidak atau hanya sedikit meninggalkan residu pada komponen lingkungan dan bahan makanan, sehingga dianggap lebih aman daripada insektisida sintetis/kimia.
- 2) Zat pestisidik dalam insektisida nabati lebih cepat terurai di alam sehingga tidak menimbulkan resistensi pada sasaran.
- 3) Dapat dibuat sendiri dengan cara yang sederhana.
- 4) Bahan pembuat insektisida nabati dapat disediakan di sekitar rumah.
- 5) Secara ekonomi tentunya akan mengurangi biaya pembelian insektisida.

Selain keuntungannya, tentunya kita tidak dapat mengesampingkan beberapa kelemahan dari pemakaian insektisida nabati di rumah. Kelemahan tersebut antara lain:

- 1) Frekuensi penggunaan insektisida nabati lebih tinggi dibandingkan dengan insektisida sintetis. Tingginya frekuensi penggunaan insektisida ini adalah karena sifatnya yang mudah terurai di lingkungan sehingga harus lebih sering diaplikasikan.
- 2) Insektisida nabati memiliki bahan aktif yang kompleks (*multiple active ingredient*) dan kadang kala tidak semua bahan aktif dapat dideteksi.
- 3) Tanaman insektisida nabati yang sama, tetapi tumbuh di tempat yang berbeda, umur tanaman berbeda, iklim berbeda, jenis tanah berbeda dan waktu panen yang berbeda mengakibatkan bahan aktifnya menjadi sangat bervariasi.

4. Formulasi Insektisida

Formulasi insektisida adalah proses “pengolahan” bahan teknis untuk memperbaiki berbagai aspek seperti: efektivitas, kemudahan aplikasi, keamanan serta biaya. Komponen formulasi secara mendasar terdiri dari : bahan aktif. Bahan aktif adalah bahan utama yang secara biologis bersifat sebagai insektisida. Kadar bahan aktif untuk formulasi cair dinyatakan dalam g/l, sedangkan formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cair dan padat dinyatakan dalam persen bobot. Sebagai ilustrasi Indro 25EC berarti kadar bahan aktif insektisidanya adalah 25 gram/liter, sedangkan Dira 10WP kadar bahan aktifnya 10% atau 100g/kg. Pelarut (*solvent*), pelarut adalah bahan yang digunakan untuk melarutkan bahan aktifnya. Umumnya pelarut insektisida berupa minyak, talk dan air. Pengencer (*diluents*), pelarut harus dibedakan dengan pengencer. Pengencer adalah bahan yang digunakan untuk mengencerkan formulasi sehingga siap untuk diaplikasikan. Contoh pengencer adalah air dan solar. *Sulfaktan*, bahan aktif terdapat dalam suatu formulasi untuk memperbaiki sifat-sifat seperti kebasahan, penyebaran, dispensibilitas, dan pembentukan emulsi. Dan *Sinergis*, bahan kimia meskipun tidak harus mempunyai sifat insektisida namun dapat meningkatkan potensi insektisida dari bahan yang ditambahkan. Pemilihan jenis formulasi sangat berperan penting dalam keberhasilan pengendalian serangga. Pemilihan formulasi menjadi sangat penting pada pengendalian *low impact*. Pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan formulasi adalah: perilaku hama, ketersediaan alat, bahaya drift-kontaminasi lingkungan, keamanan operator dan organisme bukan sasaran, kemungkinan kontaminasi terhadap makanan, bercak, jenis/tipe permukaan serta biaya. (Sucipto,2011)

5. Resistensi

Resistensi adalah kemampuan individu serangga untuk bertahan hidup terhadap suatu dosis insektisida yang dalam keadaan normal dapat membunuh spesies serangga tersebut. Resistensi merupakan suatu fenomena evolusi yang disebabkan oleh seleksi serangga yang diberi perlakuan insektisida secara terus-menerus. Status resistensi atau kerentanan insektisida (*insecticide susceptibility*) terhadap serangga, diukur menggunakan prosedur standar tes kerentanan, yaitu metode standar yang tepat untuk mengukur resistensi insektisida khususnya di lapangan. Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil *Letal Concentratio* (LC50) atau (LC100) adalah:

Kematian 99-100% = *susceptible*/rentan/peka

Kematian 80-90% = toleran

Kematian <80% = resisten

Penggunaan insektisida pada pengendalian populasi nyamuk menyebabkan tekanan seleksi atas individu nyamuk yang memiliki kemampuan untuk tetap hidup bila kontak dengan insektisida dengan mekanisme berbeda. (Sucipto, 2011). Mekanisme resistensi dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu (1) biokimiawi dan (2) perilaku (*behavioural resistance*).

a. Mekanisme biokimiawi

Berkaitan dengan fungsi enzimatik di dalam tubuh vektor yang mampu mengurai molekul insektisida menjadi molekul-molekul lain yang tidak toksik (*detoksifikasi*). Molekul insektisida harus berinteraksi dengan molekul target dalam tubuh vektor sehingga mampu menimbulkan keracunan terhadap sistem kehidupan vektor untuk dapat menimbulkan kematian. *Detoksifikasi* insektisida terjadi dalam


tubuh spesies vektor karena meningkatnya populasi yang mengandung enzim yang mampu mengurai molekul insektisida. Tipe resistensi dengan mekanisme biokimiawi ini sering disebut sebagai *resistensi enzimatik*.

b. Resistensi perilaku (*behavioural resistance*).

Individu dari populasi mempunyai struktur eksoskelet sedemikian rupa sehingga insektisida tidak mampu masuk dalam tubuh vektor. Secara alami vektor menghindari kontak dengan insektisida, sehingga insektisida tidak sampai kepada “targetnya”.(Kementerian Kesehatan RI, 2012).


Beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme resisten insektisida pada nyamuk, antara lain: *Faktor genetik*, faktor ini tergantung pada keberadaan gen resisten yang mampu mengkode pembentukan enzim tertentu dalam tubuh nyamuk. Enzim ini akan menetralkan keberadaan insektisida (misalnya enzim esterase). *Faktor biologis*, yaitu kecepatan regenerasi nyamuk. Kemampuan beradaptasi terhadap tekanan alam seperti pemberian insektisida dan didukung kecepatan regenerasi yang tinggi menyebabkan nyamuk cepat menurunkan regenerasi yang resisten. *Faktor operasional* meliputi bahan kimia yang digunakan, cara aplikasi, frekuensi dosis dan lama pemakaian. (Panut Dj, 2008 dalam Boekoesoe, 2013).

F. Kerangka Teori



Gambar 2.6. Skema Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep



Gambar 2.7. Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan pengujian statistik. Sedangkan metode eksperimen merupakan metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat.


2. Lokasi Penelitian

Pembuatan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan pelaksanaan uji efektivitas dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen murni (*true experiment*) dengan rancangan *Posttest Only Control Group Design*, yaitu merupakan desain penelitian yang tidak menggunakan pretes terhadap sampel sebelum perlakuan. Dalam desain ini terdapat dua kelompok masing-masing dipilih secara acak (*randomization*), kelompok-kelompok tersebut dianggap sama sebelum dilakukan

perlakuan. Desain penelitian ini mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. (Riyanto, 2011 *dalam* Ikhsan, 2014). Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1: Desain Penelitian

Keterangan :

S = Sampel (nyamuk *Aedes aegypti*)

R = Randomisasi (dipilih secara acak)

X = Perlakuan (ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan konsentrasi 15%, 30% dan 60%.

C = Kontrol (Etanol sebagai kontrol negatif atau 0%)

O = Observasi (pengamatan)

Di dalam penelitian ini, menggunakan 4 kelompok perlakuan yang terdiri dari 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol (kontrol negatif) dengan 3 kali ulangan (replikasi).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nyamuk *Aedes aegypti* betina yang dipelihara di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Sampel

a. Kriteria Inklusi

- 1) Nyamuk *Aedes aegypti* betina berumur 2-5 hari (Pedoman Uji Hayati Insektisida Rumah Tangga).
- 2) Nyamuk bergerak aktif.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Nyamuk mati sebelum perlakuan
- 2) Nyamuk berasal dari alam bebas

3. Besar Sampel

Tabel 3.2
Rincian Jumlah Sampel yang Digunakan

Perlakuan	Jumlah Nyamuk x Jumlah Pengulangan	Total
Kontrol (-) : 0%	25 nyamuk x 3	75 nyamuk
Perlakuan I : 15%	25 nyamuk x 3	75 nyamuk
Perlakuan II : 30%	25 nyamuk x 3	75 nyamuk
Perlakuan III : 60%	25 nyamuk x 3	75 nyamuk
Jumlah total nyamuk yang digunakan		300 nyamuk

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung sesuai dengan prosedur yang terencana meliputi melihat dan mencatat jumlah ataupun aktivitas tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengamati dan mencatat jumlah kematian nyamuk *Aedes aegypti* setelah terpapar

dengan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan berbagai konsentrasi yang berbeda dan dengan batas lama pemajanan yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen, baik berupa gambar maupun tulisan, serta menganalisa dokumen-dokumen yang ada, untuk mendukung penyusunan penelitian.

E. Parameter Penelitian

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kematian nyamuk *Aedes aegypti* betina umur 2-5 hari setelah dipaparkan dengan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan berbagai konsentrasi dalam persen (%) dan kematian nyamuk dalam kelompok kontrol. Kematian nyamuk ditandai dengan nyamuk yang tidak bergerak/ tidak memiliki respon terhadap rangsangan. Pengamatan dilakukan sampai jam ke 24 setelah perlakuan sesuai dengan standar WHO, yaitu mengenai standar penelitian pada serangga. (Soemardini, dkk, 2013 *dalam* Sampan F, 2013).

F. Alur Penelitian

Untuk memperjelas proses penelitian, maka disajikan dalam diagram alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.2. Diagram Alur Penelitian

G. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan Penelitian

- a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak
 - 1) Kulit buah jeruk nipis
 - 2) Etanol 96%
 - 3) Es batu
- b. Bahan yang digunakan untuk pengenceran larutan uji
 - 1) Ekstrak kental kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*)
 - 2) Etanol 96%
- c. Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan nyamuk dan perlakuan
 - 1) Air
 - 2) Larutan gula
 - 3) Pellet ikan
 - 4) Nyamuk betina berumur 2-5 hari

2. Alat Penelitian

- a. Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak
 - 1) Pisau
 - 2) Oven
 - 3) Blender
 - 4) Neraca analitik merek Kern
 - 5) Toples kaca (wadah simplisia)
 - 6) Corong
 - 7) Kertas saring
 - 8) *Rotavapor* merek Heidolph

- 9) Tempat Penyimpanan Ekstrak
 - 10) Aluminium foil
 - 11) Silica gel
- b. Alat yang digunakan pemeliharaan dan persiapan nyamuk
- 1) Kandang
 - 2) Wadah (telur dan jentik nyamuk)
 - 3) Pipet tetes
 - 4) Aspirator
- c. Alat yang digunakan untuk pengenceran larutan uji
- 1) Timbangan analitik
 - 2) Lumpang dan Alu
 - 3) Gelas ukur
 - 4) Batang pengaduk
 - 5) Pipet tetes
- d. Alat yang digunakan untuk perlakuan uji efektivitas
- 1) Kandang nyamuk (*barrel uji*) ukuran 30x30x30 cm³
 - 2) Sprayer
 - 3) Label
 - 4) *Hygrometer*
 - 5) *Thermometer*
 - 6) Kapas
 - 7) Karet
 - 8) Kain kasa
 - 9) *Paper cup*

- 10) Aspirator
- 11) Pinset
- 12) Baki
- 13) Baskom
- 14) Lembar observasi

H. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

a. Pembuatan Ekstrak

Kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang akan diekstraksi diperoleh dari warung atau rumah makan yang telah dimanfaatkan sebelumnya untuk keperluan makanan. Setelah itu kulit buah jeruk nipis tersebut dicuci dengan air bersih yang mengalir, lalu dikeringkan dengan oven dengan suhu 30-45⁰C. Kemudian diserbukkan dan disimpan dalam wadah bersih dan tertutup rapat.

Kulit buah jeruk nipis yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 1000 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 96% secukupnya (hingga terlarut). Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama 3 × 24 jam. Filtrat etanol diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan *rotavapor* sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Kemudian dibebaskan etanol sampai diperoleh ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).

b. Pemeliharaan Nyamuk

Nyamuk betina *Aedes aegypti* yang diperoleh dari Laboratorium Entomologi Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 30 ekor ditempatkan ke dalam kandang pemeliharaan dan diberi makan darah sebagai protein tinggi yang dibutuhkan nyamuk untuk mematangkan telurnya. Di dalam kandang di masukkan ovitrap sebagai tempat nyamuk meletakkan telurnya, kemudian telur yang telah diletakkan oleh nyamuk betina dipindahkan ke dalam wadah pemeliharaan larva hingga menjadi pupa dan menetas, selama pemeliharaan, larva diberi makan berupa pellet ikan/*fish food*.

Setelah menetas, nyamuk diberi makan berupa larutan gula, dan memisahkan antara nyamuk jantan dan betina, semua nyamuk betina dipindahkan ke dalam kandang lain dengan menggunakan aspirator dan diberi makan berupa larutan gula, selain itu umur nyamuk harus dikontrol, karena nyamuk yang di gunakan untuk penelitian ini adalah nyamuk betina umur 2-5 hari.

c. Persiapan Larutan Uji

Larutan stok ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) akan diencerkan dengan menggunakan rumus pengenceran sebagai berikut:

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

Keterangan:

V_1 = volume larutan yang akan diencerkan (ml)

M_1 = konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis yang tersedia (%)

V_2 = volume larutan yang diinginkan (ml)

M_2 = konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis yang dibuat (%)

Penelitian ini akan menggunakan 3 konsentrasi yaitu, 15%, 30%, dan 60% setelah ketiga konsentrasi tersebut didapat, maka selanjutnya akan diencerkan dengan

menggunakan pelarut etanol 96% dan dimasukkan ke dalam masing-masing botol *sprayer* (alat semprot) yang telah disediakan.

Cara pembuatan larutan stok pada masing-masing konsentrasi sebagai berikut:

- 1) Untuk membuat larutan stok dengan konsentrasi 60%, perhitungannya :

$$V_1.M_1 = V_2.M_2$$

$$50 \times M_1 = 100 \times 60$$

$$50 M_1 = 6000$$

$$M_1 = 6000/50$$

$$M_1 = 30 \text{ gram}$$

Konsentrasi 60% adalah 30 gram ekstrak dilarutkan ke dalam 50 ml etanol yang mana merupakan larutan stok.

- 2) Untuk membuat larutan dengan konsentrasi 30%, perhitungannya :

$$V_1.M_1 = V_2.M_2$$

$$V_1 \times 30 = 20 \times 60$$

$$30V_1 = 1200$$

$$V_1 = 1200/30$$

$$V_1 = 40 \text{ ml}$$

Konsentrasi 30% adalah 20 ml ekstrak yang diambil dari larutan stok 60% dilarutkan kembali ke dalam 20 ml etanol. Jadi volume larutan uji konsentrasi 30% adalah 40 ml.

- 3) Untuk membuat larutan dengan konsentrasi 15%, perhitungannya:

$$V_1.M_1 = V_2.M_2$$

$$V_1 \times 15 = 15 \times 30$$

$$15V_1 = 4500$$

$$V_1 = 4500/15$$

$$V_1 = 30 \text{ ml}$$

Konsentrasi 15% adalah 15 ml ekstrak yang diambil dari larutan konsentrasi 30% dilarutkan kembali ke dalam 15 ml etanol. Jadi volume larutan uji konsentrasi 15% adalah 30 ml.

2. Tahap Penelitian

- a. Siapkan 4 buah *barrel* uji yang berbentuk bujur sangkar berukuran 30 cm³.
- b. Nyamuk *Aedes aegypti* yang diperoleh dari hasil pemeliharaan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan dimasukkan ke dalam *paper cup* dengan menggunakan aspirator. Masing-masing *paper cup* yang telah disediakan berisi 25 ekor nyamuk *Aedes aegypti* yang diambil secara acak. Jadi jumlah nyamuk dalam penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 300 nyamuk *Aedes aegypti*.
- c. Nyamuk *Aedes aegypti* yang terdapat pada masing-masing *paper cup* kenyang sukrosa kemudian dipindahkan ke dalam masing-masing *barrel* uji, menunggu selama 3 menit dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan pencatatan temperatur dan kelembaban udara ruang sebelum dilakukan perlakuan.
- d. Ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan konsentrasi-konsentrasi tertentu dipersiapkan.
- e. Pada saat akan digunakan, siapkan 4 buah botol sprayer untuk masing-masing konsentrasi dan kontrol negatif.
- f. Semprotkan ke dalam masing-masing *barrel* uji. Penyemprotan dilakukan pada dinding-dinding *barrel* uji.
 - 1) *Barrel* uji 1 disemprot dengan menggunakan etanol 96% maksimal 10 semprot (sebagai kontrol negatif).

- 2) *Barrel* uji 2-4 disemprot dengan menggunakan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) 15%, 30% dan 60% maksimal 10 semprot.
- g. Amati nyamuk dalam *barrel* uji selama 20 menit.
- h. Setelah 20 menit dipapar, semua nyamuk yang mati atau yang tidak dipindahkan ke dalam masing-masing *paper cup* dengan menggunakan pinset dan aspirator bagi nyamuk yang masih hidup, di dalam *paper cup* telah disediakan larutan gula 10% (10 g gula + 100 ml air) di atas kapas sebagai makanan nyamuk. Setelah itu, nyamuk disimpan selama 24 jam.
- i. Setelah disimpan di Laboratorium selama 24 jam. Hitung dan catat jumlah nyamuk yang mati. Kematian nyamuk dapat diamati secara fisik dengan tanda-tanda antara lain: nyamuk tidak bergerak sama sekali walaupun telah mendapat rangsangan berupa sentuhan maupun hembusan angin serta tubuh nyamuk telah menunjukkan kekakuan.
- j. Apabila jumlah kematian nyamuk pada kontrol negatif kurang dari 5%, maka hal tersebut dapat diabaikan, namun apabila lebih dari 20% maka uji harus diulang. Sedangkan apabila kematian nyamuk pada kelompok kontrol negatif antara 5-20%, maka untuk menghitung persentase kematian nyamuk pada masing-masing dosis dilakukan dengan menggunakan formula/rumus Abbot sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ kematian perlakuan} - \% \text{ kematian kontrol}}{100 \% - \% \text{ kematian kontrol}} \times 100$$

- k. Perlakuan terhadap sampel uji dilakukan sebanyak 3 kali replikasi.

I. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validasi instrumen merupakan tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (instrumen penelitian) dalam melakukan fungsi ukurnya. Seperti,

- a. Menggunakan kriteria standar dalam menilai kematian nyamuk
- b. Perlakuan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur
- c. Menggunakan alat ukur yang sama dan valid

2. Reliabilitas

Reliabilitas data dijaga dengan melakukan replikasi pengujian sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap kelompok uji.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah diperoleh data jumlah nyamuk *Aedes aegypti* yang mati, maka dilakukan pengimputan, pengolahan dan analisis data dengan menggunakan uji statistik komputer (SPSS 17). Hasil pengolahan dan uji statistik yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Adapun uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Anova

Uji Anova (*One Way Anova*) dimaksudkan untuk melihat hubungan/pengaruh ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

2. Analisis Probit

Analisis Probit dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan *Lethal Concentration* (LC_{50}) daya bunuh dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 10 April sampai 31 Oktober 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembuatan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) mulai pada tanggal 10 April sampai 28 Mei 2016.
2. Uji efektivitas insektisida dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap nyamuk *Aedes aegypti* mulai tanggal 07 Juni-31 Oktober 2016.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada penyajian tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban Ruangan

Pengulangan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
I	30	71
II	30	71
III	30	71
Rata-Rata	30	71

Sumber : Data primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa rata-rata suhu ruangan pada waktu penelitian adalah 30 °C dan rata-rata kelembaban ruangan adalah 72%.

Tabel 4.2. Data Jumlah Nyamuk *Aedes aegypti* yang Pingsan dan Mati setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan Berbagai Konsentrasi pada Menit Ke-20

Konsentrasi Ekstraksi(%)	Jumlah Nyamuk Uji	Jumlah Nyamuk yang Pingsan dan Mati pada Ulangan Ke-						Total		Rata-rata	
		I		II		III		M	D	M	D
		M	D	M	D	M	D				
Kontrol (-)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	25	6	0	9	2	13	4	28	6	9	2
30	25	9	3	9	5	10	2	28	10	9	3
60	25	12	3	16	6	21	3	49	12	16	4

Sumber: Data Primer, 2016

*M = *Moribund* (pingsan)

*D = *Dead* (mati)

Berdasarkan data pada tabel 4.2. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah nyamuk uji yang pingsan dan mati pada ulangan I, II, dan III dalam waktu 20 menit setelah perlakuan, pada kontrol negatif yaitu 0 atau tidak ditemukan adanya nyamuk uji yang pingsan dan mati. Konsentrasi 15%, pingsan yaitu 9 ekor dan mati yaitu 2 ekor. Konsentrasi 30%, pingsan 9 ekor dan mati 3 ekor. Dan pada konsentrasi 60%, pingsan 16 ekor dan mati 4 ekor.


Tabel 4.3. Data Total Kematian Nyamuk *Aedes aegypti* setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan Berbagai Konsentrasi pada Jam Ke 24

Konsentrasi Ekstrak (%)	Jumlah Nyamuk Uji	Jumlah Nyamuk yang Mati pada Ulangan Ke-			Total	Rata-Rata	
		I	II	III		n	%
		Kontrol (-)	25	0	0	0	0
15	25	1	8	10	19	6	25
30	25	9	14	11	34	11	45
60	25	15	21	11	47	15	62

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah nyamuk *Aedes aegypti* yang mati pada ulangan I, II, dan III, dalam waktu 0-24 jam setelah perlakuan. Pada kontrol negatif yaitu 0 atau tidak ditemukan adanya nyamuk yang mati. Sedangkan pada konsentrasi 15% yaitu 6 ekor atau dapat mematikan nyamuk uji sebesar 25%. Konsentrasi 30% yaitu 11 ekor atau dapat mematikan nyamuk uji sebesar 45%. Dan pada konsentrasi 60% yaitu 15 ekor atau dapat mematikan nyamuk uji sebesar 62%.

Gambar 4.1. Persentase Kematian Nyamuk *Aedes aegypti* setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan Berbagai Konsentrasi



Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan gambar 4.1. menunjukkan bahwa dari ketiga kelompok konsentrasi dalam penelitian ini, konsentrasi 60% merupakan konsentrasi dengan persentase kematian nyamuk *Aedes aegypti* tertinggi yaitu sebesar 62%.

B. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data *Statistic Product and Service Solution (SPSS) for Window Release 17.0*. Analisis pertama yang dilakukan adalah apakah hasil data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak.

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada hasil perhitungan jumlah kematian nyamuk pada konsentrasi 15%, 30% dan 60% diperoleh hasil bahwa pada konsentrasi 15% nilai $p = 0,407$. Konsentrasi 30% dan 60% masing-masing nilai $p = 0,780$. Jadi nilai signifikan pada ketiga kelompok konsentrasi yaitu ($p\text{-value} > 0,05$) yang artinya bahwa semua kelompok data terdistribusi normal. Karena semua data terdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan tahapan analisis data menggunakan *Uji One-Way Anova*.

1. One Way Anova

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan/pengaruh ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. Hasil analisis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji One Way Anova Kematian Nyamuk *Aedes aegypti* setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)


	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	408.667	3	136.222	10.091	.004
Within Groups	108.000	8	13.500		
Total	516.667	11			

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diperoleh nilai *sig.* (signifikan) dari hasil jumlah kematian nyamuk *Aedes aegypti* setelah disemprotkan dengan ekstrak kulit

buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yaitu $p\text{-value} = 0,004$ ($p < 0,05$), maka H_a diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan/perbedaan yang signifikan.

Gambar 4.2 Means Plots Kematian Nyamuk *Aedes aegypti* setelah Disemprotkan dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)



Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan gambar 4.2. menunjukkan bahwa persentase kematian nyamuk berbanding lurus dengan konsentrasi, yang artinya semakin tinggi konsentrasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) maka persentase kematian nyamuk *Aedes aegypti* juga semakin tinggi.

2. Analisis Probit

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui *Lethal Concentration* (LC_{50}) dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). LC_{50} merupakan konsentrasi dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang dapat mematikan nyamuk sebesar 50% dari jumlah sampel penelitian (25 nyamuk untuk setiap perlakuan) dalam waktu 24 jam.

Tabel 4.5 Hasil Analisa probit LC₅₀ Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Kematian Rata-Rata Nyamuk *Aedes aegypti*

<i>Lethal Concentration</i>	Konsentrasi (%)	<i>Range</i>
LC ₅₀	40,087	25,534<LC<129,661

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa estimasi nilai LC₅₀ ekstrak kulit jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) diperoleh pada konsentrasi 40,087%.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. Pada penelitian ini digunakan ekstrak kulit buah jeruk nipis yang telah diekstraksi dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%, yang dimaksudkan agar didapatkan kandungan *flavonoid*, *saponin* dan minyak atsiri khususnya senyawa *d-limonene* yang terkandung dalam kulit buah jeruk nipis yang diduga memiliki efek insektisida terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.

Pelarut etanol 96% yang digunakan dalam pembuatan ekstrak kulit buah jeruk nipis adalah pelarut yang lebih selektif, sifat toksin yang rendah dari pada pelarut lainnya. Etanol 96% bersifat semipolar sehingga dapat melarutkan zat kimia yang bersifat polar maupun non polar. (Ardianto, 2008 dalam Haditomo, 2010). Selain itu, penggunaan etanol 96% bertujuan untuk menarik zat-zat aktif yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 kelompok konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yaitu 15%, 30% dan 60% dan disertai dengan adanya kontrol negatif (etanol 96%). Sampel penelitian adalah nyamuk *Aedes aegypti*

sebanyak 300 ekor yang dibagi ke dalam empat kandang pengamatan yang masing-masing berisi 25 ekor nyamuk serta dilakukan 3 kali pengulangan.

Umur nyamuk merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan nyamuk terhadap pajanan senyawa kimia, sehingga pemilihan umur nyamuk adalah kegiatan yang penting dalam penelitian. Kisaran umur nyamuk *Aedes aegypti* yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentang umur 2-5 hari sesuai dengan Pedoman Uji Insektisida Hayati. Karena rentang umur 2-5 hari merupakan rentang umur terbaik dari nyamuk dimana ketahanan tubuh nyamuk masih kuat dan sudah produktif. Pada umur di bawah 2 hari, keadaan fisik nyamuk masih lemah sehingga akan mempermudah kematian pada nyamuk, sedangkan pada umur di atas 5 hari ketahanan tubuh nyamuk semakin menurun yang akan mengakibatkan meningkatnya resiko kematian.

Jenis kelamin nyamuk berkaitan dengan peran nyamuk dalam menularkan penyakit *arthropod-born viral disease* pada manusia. Seluruh penyakit *arthropod-born viral disease* yang ditularkan oleh nyamuk pada manusia, ditularkan oleh nyamuk betina. Hal ini disebabkan perilaku nyamuk yang menusuk dan menghisap darah manusia untuk mematangkan telurnya, sementara nyamuk jantan hanya menghisap sari tumbuhan. Jenis kelamin nyamuk juga berkaitan dengan ketahanan tubuh antara nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nyamuk betina berumur lebih lama dibandingkan dengan nyamuk jantan, nyamuk jantan biasanya hanya dapat bertahan hidup selama 6 sampai 7 hari. Sementara nyamuk betina dapat bertahan hidup sampai 2 minggu (Soedarto, 1992 dalam Wibawa, R, 2012). Jadi dalam penelitian ini nyamuk yang digunakan untuk uji efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) adalah nyamuk betina *Aedes aegypti* umur 2-5 hari.

Jarak penyemprotan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nyamuk dapat mati hanya dengan semprotan air saja, jadi metode penyemprotan dalam penelitian ini dilakukan secara mendatar dan tidak ada nyamuk *Aedes aegypti* yang berada dalam garis lurus arah penyemprotan (Wibawa, R, 2012)..

Lama waktu kontak antara nyamuk *Aedes aegypti* dengan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berpengaruh pada efek pajanan. Aplikasi waktu pajanan yang efektif adalah kurang dari satu jam, karena lebih dari itu insektisida akan terbawa oleh angin. Waktu kontak yang terlalu singkat juga akan mengurangi lama interaksi antara senyawa kimia dengan nyamuk sasaran sehingga akan menurunkan jumlah nyamuk yang mati. Sedangkan waktu kontak yang terlalu lama akan meningkatkan lama interaksi antara senyawa kimia dengan nyamuk sasaran sehingga akan meningkatkan jumlah nyamuk yang mati (Boewono, 2003 dalam Wibawa, R, 2012). Berdasarkan penelitian sebelumnya, jadi waktu pajanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 menit.

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran suhu dan kelembaban udara ruangan dengan menggunakan *thermometer* dan *hygrometer*. Pengukuran suhu dan kelembaban juga merupakan salah satu faktor penting atau disebut juga dengan variabel kontrol karena suhu dan kelembaban ruangan sangat mempengaruhi pertumbuhan nyamuk. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh rata-rata hasil pengukuran suhu ruangan yaitu 30⁰C dan kelembaban ruangan yaitu 71%. Hal ini masih sesuai dengan kriteria Depkes, 2004, yaitu pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali apabila suhu ruangan kurang dari 10⁰C atau lebih dari 40⁰C. Sedangkan pada kelembaban kurang dari 60% umur nyamuk menjadi pendek (Sucipto, 2011).

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh rata-rata persentase kematian nyamuk *Aedes aegypti* setelah disemprotkan dengan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) pada konsentrasi 15% persentase kematian yaitu sebesar 25%, konsentrasi 30% persentase kematian yaitu sebesar 45%, dan konsentrasi 60% persentase kematian yaitu sebesar 62%. Jadi persentase terendah kematian nyamuk yaitu pada konsentrasi 15% dan persentase tertinggi kematian nyamuk yaitu pada konsentrasi 60%. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kandita, R (2015) yang berjudul : “Uji Efektivitas Ekstrak Buah Leuca (*Solanum nigrum l*) sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Anopheles aconitus*”. Hasil penelitian terhadap nyamuk *Aedes aegypti* menunjukkan bahwa pada konsentrasi 20% menyebabkan kematian nyamuk *Aedes aegypti* sebesar 36%, konsentrasi 40% sebesar 50%, konsentrasi 60% sebesar 63% dan konsentrasi 80% sebesar 92%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kandita menunjukkan adanya kesamaan dengan hasil yang didapat pada penelitian ini. Dimana persentase kematian nyamuk berbanding lurus dengan konsentrasi yaitu semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka persentase kematian juga akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi pula kandungan bahan aktif yang ada pada ekstrak, jadi dapat disimpulkan bahwa daya toksisitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) hampir sama dengan daya toksisitas ekstrak buah leuca (*Solanum nigrum l*).

Berdasarkan analisis data dari hasil uji *one way anova* dalam penelitian ini diperoleh nilai *p-value* = 0,004 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan atau dapat dinyatakan bahwa ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) efektif sebagai

insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2014) yang berjudul “Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Kematian Larva *Aedes sp*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara peningkatan konsentrasi ekstrak kulit buah jeruk nipis dengan jumlah kematian larva *Aedes sp*. Penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun dengan ekstrak yang lain juga dilakukan oleh Wibawa, R (2012) yang berjudul “Potensi Ekstrak Biji Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa*) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk *Aedes aegypti* dengan metode semprot. Hasil penelitian menunjukkan $p = 0.003$ ($p < 0,05$), maka ekstrak biji mahkota dewa (*Phaleria macrocarpa*) memiliki potensi sebagai insektisida.

Toksisitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap nyamuk *Aedes aegypti* yaitu dengan menggunakan nilai LC (*lethal concentration*). Nilai LC yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah LC_{50} . *Lethal Concentration* (LC_{50}) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% nyamuk uji. Pemilihan istilah *Lethal Concentration* (LC) lebih dipilih daripada istilah *Lethal Dose* (LD) karena pada penelitian ini sulit untuk menentukan dosis, selain itu zat yang digunakan dalam uji toksisitas berbentuk cair dan dilakukan secara *invitro*. Estimasi nilai *Lethal Concentration* (LC_{50}) dianalisis setelah pengamatan jam ke 24. Berdasarkan hasil uji analisis probit dalam penelitian ini, diperoleh bahwa ekstrak kulit jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) memiliki estimasi nilai *Lethal Concentration* (LC_{50}) pada konsentrasi 40,087% yang dapat menyebabkan kematian 50% nyamuk *Aedes aegypti*.

Kemampuan ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati disebabkan karena adanya beberapa bahan aktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut sehingga dapat menyebabkan kematian pada nyamuk *Aedes*

aegypti. Hal ini sesuai dengan pengertian insektisida hayati bahwa insektisida hayati adalah bahan alami yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kelompok metabolik sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan serangga pengganggu yang terdapat di lingkungan rumah. Beberapa senyawa bioaktif yang diduga terkandung pada ekstrak kulit buah jeruk nipis diantaranya, *flavonoid*, *saponin* dan *d-limonene* yang terbukti bersifat racun kontak dan racun pernafasan pada serangga khususnya nyamuk *Aedes aegypti* (Naria, 2015). Dengan demikian penggunaan metode semprot merupakan metode yang paling tepat dalam penelitian ini karena dapat mencakup ketiga sifat toksin dari senyawa-senyawa tersebut. Selain itu, bila senyawa atau ekstrak ini digunakan di alam maka tidak akan mengganggu organisme yang bukan sasaran.

Flavonoid merupakan golongan *fenol* dan banyak ditemukan di dalam tumbuhan. Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat insektisida. *Flavonoid* menyerang bagian syaraf pada beberapa organ vital serangga sehingga timbul suatu perlemahan syaraf, seperti pernafasan dan menimbulkan kematian (Dinata, 2009 dalam Setiawan, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chinelo A. Ezeabara tahun 2014 yang bertujuan untuk melihat kandungan *saponin* pada bagian-bagian dari beberapa spesies jeruk (*Citrus*) menunjukkan bahwa spesies jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) pada bagian kulit positif mengandung senyawa *saponin*. *Saponin* merupakan senyawa yang termasuk ke dalam senyawa *terpenoid*. Aktivitas *saponin* ini di dalam tubuh serangga adalah mengikat sterol bebas dalam saluran pencernaan makanan dimana sterol itu sendiri adalah zat yang berfungsi sebagai *prekursor hormon ecdison*, sehingga dengan menurunnya jumlah sterol bebas dalam tubuh

serangga akan mengakibatkan terganggunya proses pergantian kulit (*moulting*) pada serangga. Selain itu, *saponin* bersifat bisa menghancurkan butir darah merah dan bersifat racun bagi hewan berdarah dingin. (Gunawan, 2004 dalam Sampan, 2013).

Hasil uji kromatografi pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika, dkk tahun 2014 menunjukkan bahwa kandungan senyawa *d-limonene* yang diperoleh dengan ekstraksi limbah kulit jeruk nipis dengan cara destilasi sebanyak 62.34%. *d-limonene* adalah nama latin dari ekstrak kulit jeruk dan merupakan senyawa yang beraroma tajam/menyengat sehingga dapat mengganggu *saraf sensorik, perifer dan olfaktori sistem* pada serangga. Sifat senyawa ini adalah mudah menguap sehingga pemanfaatannya tidak terlalu maksimal (Baskoro,2011).

Pemanfaatan senyawa-senyawa di atas relatif aman bagi lingkungan, manusia dan hewan ternak karena merupakan bahan alami yang sifatnya mudah terurai di lingkungan (*Biodegradable*) sehingga residunya cepat menghilang. Dan karena sifatnya yang mudah terurai, jenis insektisida ini tidak akan cepat menimbulkan resistensi. Secara umum fungsi dan efektivitas insektisida berbanding lurus yang artinya semakin tinggi dosis/konsentrasi insektisida maka semakin tinggi pula peluang dalam mengendalikan serangga. Meskipun belum ada penelitian yang secara langsung meneliti dan menjelaskan dampak penggunaan insektisida hayati terhadap kesehatan manusia, namun pengaplikasian di lingkungan harus tetap bijak dan terkendali, karena semua bahan kimia baik sintetik maupun nabati pasti akan memberikan pengaruh terutama bagi kesehatan manusia, namun keunggulan dari insektisida hayati daripada insektisida sintetis dari segi keamanan dan kesehatan adalah insektisida hayati mudah terurai di alam, sehingga meskipun dosis yang digunakan tinggi, maka akan tetap bisa terurai di alam, selain itu senyawa insektisida ini juga tidak akan mengganggu

organisme lain yang bukan sasaran. sedangkan sifat insektisida sintetik adalah tidak bisa terurai di alam sehingga akan mencemari lingkungan dan mempengaruhi organisme lain. Sehingga dengan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaan insektisida, untuk saat ini, penggunaan insektisida hayati merupakan suatu alternatif pengendalian serangga rumah tangga secara aman, dan membantu meminimalkan risiko lingkungan. Jadi penelitian dan pengaplikasian insektisida hayati di masyarakat harus tetap dikembangkan terutama insektisida rumah tangga karena di Indonesia penggunaan insektisida hayati lebih populer di bidang pertanian.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah membuktikan pernyataan-pernyataan al-Qur'an sesuai dengan fakta. Dalam al-Qur'an Allah swt. telah menjelaskan bahwa segala ciptaan yang ada dimuka bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan memiliki manfaat masing-masing. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Lukman/31:10:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ
فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.” (Kementerian Agama RI, 2014:411).

Berdasarkan firman Allah swt. di atas telah dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan langit tanpa tiang, gunung-gunung dipermukaan, segala macam jenis binatang yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dan ayat di atas juga menjelaskan bahwa segala macam tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di

muka bumi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009). Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Shaad 38/27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (Kementerian Agama RI, 2014:455)

Berdasarkan kedua firman Allah swt. di atas telah dijelaskan bahwa segala yang di langit dan di bumi, semuanya diciptakan berdasarkan tujuan yang luhur yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia yang telah dibuktikan dalam banyak bidang sains modern, dan masih banyak lagi manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang harus dicari dan ketahui, di mana dalam al-Qur'an Allah swt. telah memerintahkan untuk menjadi orang yang memperhatikan ciptaanya dan memikirkan faedahnya, niscaya akan banyak keajaiban-keajaiban yang menunjukkan dan membuktikan kekuasaan Allah swt. dengan demikian, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat di atas sejalan dengan penelitian ini yang membuktikan manfaat tumbuhan melalui suatu penelitian ilmiah, yaitu pemanfaatan tumbuhan (kulit buah jeruk nipis) sebagai insektisida hayati rumah tangga yang lebih ramah lingkungan dalam mengendalikan nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan vektor

utama penularan beberapa penyakit seperti DBD, Zika, dan masih banyak lagi penyakit yang dapat ditularkan melalui vektor *Aedes aegypti*.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tidak dilakukannya pengukuran suhu dan kelembaban selama nyamuk uji disimpan selama 24 jam setelah perlakuan.
2. Tidak dilakukannya pemisahan tempat *holding* antara nyamuk yang pingsan dan nyamuk yang sudah mati.
3. Tidak dilakukannya uji kromatografi pada ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebelum perlakuan. Uji kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan molekul yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya senyawa-senyawa yang dibutuhkan pada bagian tanaman yang diteliti.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rata-rata kematian nyamuk *Aedes aegypti* terendah terdapat pada konsentrasi 15% yaitu 6 ekor (25%), dan kematian tertinggi terdapat pada konsentrasi 60% yaitu 15 ekor (62%).
2. Hasil uji *anova* diperoleh bahwa $p\text{-value} = 0,004$ ($p < 0,05$), maka H_a diterima, yang dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kematian nyamuk *Aedes aegypti* atau ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifoli*) efektif sebagai insektisida hayati terhadap nyamuk *Aedes aegypti*.
3. Konsentrasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifoli*) yang dapat mematikan 50% nyamuk uji (LC_{50}) yaitu pada konsentrasi 40,087%.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui waktu kematian tercepat dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida dalam mematikan nyamuk *Aedes aegypti*.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan formulasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai insektisida hayati pada ruang yang lebih luas ataupun pada ruang terbuka.

A

N

A


L

I

S

I

S



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

T


A

A. Analisis Data Uji Normalitas

Tests of Normality ^b							
	Konsentrasi Ekstrak	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Jumlah Nyamuk Yang Mati	Kons. 15%	.304	3	.	.907	3	.407
	Kons. 30%	.219	3	.	.987	3	.780
	Kons. 60%	.219	3	.	.987	3	.780


a. Lilliefors Significance Correction

b. Jumlah Nyamuk Yang Mati is constant when Konsentrasi Ekstrak = Kontrol negatif (0%). It has been omitted.



Histogram


for K= Kons. 15%



Mean =6.33
Std. Dev. =4.726
N=3


Histogram

for K= Kons. 60%




Mean =15.67
Std. Dev. =5.033
N=3


Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati




Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati




Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati




Detrended Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati




Detrended Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati



Detrended Normal Q-Q Plot of Jumlah Nyamuk Yang Mati





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


B. Analisis Data Uji One Way Anova

Descriptives								
Jumlah Nyamuk Yang Mati								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min.	Max.
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontrol negatif (0%)	3	.00	.000	.000	.00	.00	0	0
Kons. 15%	3	6.33	4.726	2.728	-5.41	18.07	1	10
Kons. 30%	3	11.33	2.517	1.453	5.08	17.58	9	14
Kons. 60%	3	15.67	5.033	2.906	3.16	28.17	11	21
Total	12	8.33	6.853	1.978	3.98	12.69	0	21

Test of Homogeneity of Variances			
Jumlah Nyamuk Yang Mati			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.068	3	8	.091

ANOVA					
Jumlah Nyamuk Yang Mati					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	408.667	3	136.222	10.091	.004
Within Groups	108.000	8	13.500		
Total	516.667	11			

Means Plots



C. Analisis Data Uji Probit

Data Information		
		N of Cases
Valid		3
Rejected	Missing	0
	LOG Transform Cannot be Done	0
	Number of Responses > Number of Subjects	0
Control Group		1

Convergence Information		
	Number of Iterations	Optimal Solution Found
PROBIT	10	Yes

Parameter Estimates							
	Parameter	Estimate	Std. Error	Z	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
PROBIT ^a	Konsentrasi	1.587	.619	-2.563	.010	.373	2.801
	Intercept	-2.544	.936	-2.719	.007	-3.480	-1.608

a. PROBIT model: $PROBIT(p) = \text{Intercept} + BX$ (Covariates X are transformed using the base 10.000 logarithm.)

Chi-Square Tests				
		Chi-Square	df ^a	Sig.
PROBIT	Pearson Goodness-of-Fit Test	.058	1	.810 ^b


Cell Counts and Residuals							
	Number	Konsentrasi	Number of Subjects	Observed Responses	Expected Responses	Residual	Probability
PROBIT	1	1.176	25	6	6.226	-.226	.249
	2	1.477	25	11	10.521	.479	.421
	3	1.778	25	15	15.238	-.238	.610

Confidence Limits							
	Probability	95% Confidence Limits for Konsentrasi			95% Confidence Limits for log(Konsentrasi) ^a		
		Estimate	Lower Bound	Upper Bound	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
PROBIT	.010	1.371	.000	5.502	.137	-4.281	.740
	.020	2.037	.000	6.921	.309	-3.553	.840
	.030	2.618	.001	8.014	.418	-3.092	.904
	.040	3.161	.002	8.953	.500	-2.745	.952
	.050	3.686	.003	9.803	.567	-2.464	.991
	.060	4.201	.006	10.594	.623	-2.224	1.025
	.070	4.711	.010	11.345	.673	-2.014	1.055
	.080	5.220	.015	12.066	.718	-1.826	1.082
	.090	5.730	.022	12.767	.758	-1.655	1.106
	.100	6.244	.032	13.452	.795	-1.498	1.129
	.150	8.911	.141	16.790	.950	-.851	1.225
	.200	11.821	.457	20.220	1.073	-.340	1.306
	.250	15.065	1.235	24.054	1.178	.092	1.381
	.300	18.730	2.946	28.780	1.273	.469	1.459
	.350	22.917	6.309	35.522	1.360	.800	1.550
	.400	27.753	11.890	47.408	1.443	1.075	1.676
	.450	33.402	18.889	72.833	1.524	1.276	1.862
	.500	40.082	25.534	129.661	1.603	1.407	2.113
	.550	48.097	31.417	253.595	1.682	1.497	2.404
	.600	57.886	37.026	525.201	1.763	1.569	2.720
	.650	70.101	42.845	1141.504	1.846	1.632	3.057
	.700	85.774	49.290	2622.539	1.933	1.693	3.419
	.750	106.641	56.837	6491.966	2.028	1.755	3.812
	.800	135.903	66.190	17924.873	2.133	1.821	4.253
.850	180.291	78.658	58852.525	2.256	1.896	4.770	
.900	257.286	97.285	263872.506	2.410	1.988	5.421	
.910	280.362	102.356	379323.112	2.448	2.010	5.579	
.920	307.782	108.146	562748.254	2.488	2.034	5.750	
.930	341.038	114.869	868471.086	2.533	2.060	5.939	
.940	382.443	122.847	1410276.581	2.583	2.089	6.149	
.950	435.837	132.595	2452093.307	2.639	2.123	6.390	
.960	508.167	145.000	4697828.857	2.706	2.161	6.672	

	.970	613.739	161.798	1.045E7	2.788	2.209	7.019
	.980	788.785	187.089	3.027E7	2.897	2.272	7.481
	.990	1171.430	235.014	1.619E8	3.069	2.371	8.209

a. Logarithm base = 10.

Probit Transformed Responses



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

D

O

K

U


M

E

N

T

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

A. *Gambar Proses Pembuatan Ekstrak*



Gambar 1. Kulit Jeruk Nipis yang Telah Dikeringkan



Gambar 2. Penyaringan Larutan Simplisia dan Rotavapor Ekstrak dengan Cara Maserasi

B. Gambar Proses Pembiakan Nyamuk



Gambar 3. Telur, Larva dan Pupa Nyamuk Aedes aegypti




Gambar 4. Nyamuk Dewasa Aedes aegypti

C. Gambar Proses Pengenceran Larutan Uji (Ekstrak Kulit Jeruk Nipis)




Gambar 5. Ekstrak Kental Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) yang Telah Ditimbang sebanyak 30 gram




Gambar 6. Pengenceran Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

D. Gambar Proses Perlakuan Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk Aedes aegypti



Gambar 7. Penyemprotan Nyamuk Aedes aegypti dengan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia)



Gambar 8. Holding Nyamuk dan Perhitungan Jumlah Nyamuk Yang Mati

P

E


R

S

U

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 2548/S.01.P/P2T/03/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.00.9/2286/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUSDALIFAH
Nomor Pokok : 70200112053
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK KULIT BUAH JERUK NIPIS (CITRUS AURANTIFOLIA) SEBAGAI ANTI NYAMUK ELEKTRIK TERHADAP KEMATIAN NYAMUK AEDES AEGYPTI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 30 April 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Maret 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Peninggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. 0411-8221400 Samata-Gowa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-6705/Un.06.2/FKIK/PP.00.9/II/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Laboratorium Kompetensi Kesehatan Lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar menerapkan bahwa:

Nama : Musdalifah
Nim : 70200112053
Tempat, Tanggal Lahir : Waji, 12 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mustafa, Dg. Bunga III, Kel. Romang Polong
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Kesling
Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*

Benar telah melakukan penelitian di Laboratorium Kompetensi Kesehatan Lingkungan pada tanggal 07 Juni-31 Oktober 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Samata-Gowa 4 November 2016

Mengetahui,
Kepala Laboratorium



Muh. Saleh Jastam, SKM., M.Kes

NIM. 97505 2005 02 1008



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Telp.(0411) 841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut:

Nama : Musdalifah
Nim : 70200112053
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian :

"Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*"

Benar bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M A K A S S A R

Samata-Gowa, 01 Juni 2016

Mengetahu,
Ketua Jurusan Farmasi


Haeria, S. Si, M. Si



**LABORATORIUM ENTOMOLOGI-PARASITOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS**

Sekretariat : Laboratorium Parasitologi Lt.4 Fakultas Kedokteran UNHAS
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamaburea, Makassar 90245
Telp. 0411-6164712, Fax. 0411-586297

SURAT KETERANGAN

No: 001 /Ento/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Laboratorium Entomologi-Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Musdalifah
NIM : 70200112053
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Alamat : Samata
Judul Penelitian : Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Hayati terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*

Benar telah memperoleh nyamuk dewasa *Aedes Aegypti* di Laboratorium Entomologi Fakultas Kedokteran UNHAS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 November 2016
Kepala Laboratorium Entomologi-Parasitologi



Dr. Isra Wahid, Ph.D
NIP. 196812271998021001

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Musdalifah, lahir di Desa Waji, Kabupaten Bone pada tanggal 12 Agustus 1994. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan keluarga H. Muhammad Amin dengan Hj. Nurbaya. Penulis mulai masuk jenjang pendidikan pada tahun 2000 di SD Negeri 67 Waji dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Tellu Siattinge dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat dari SMA penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan lulus sebagai Mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R