

GAMBARAN FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI RUMAH

BERSALIN MATTIROBAJI GOWA

TAHUN 2012



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan

Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

NUR ISLAMIAH

70400010046

JURUSAN KEBIDANAN

FAKULTAS ILMUKESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2013

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2011

Penyusun

Nur Islamiah

Nim: 70400010046



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2013.



Makassar, Agustus 2013

Pembimbing

dr. Rini Fitriani, M.Kes
Nip : 150 408 649

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY
ISLAMIC STATE UNIVERSITY OF ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC STUDY, AUGUST 2013

Nur Islamiah, 70400010046

Preceptor : dr. Rini Fitriani, M.Kes

“THE DESCRIPTION ABOUT FACTORS OF HYPERTENSION RISK ON PREGNANT WOMAN IN MATTIROBAJI GOWA HOSPITAL AT 2012”

Hypertension in pregnancy is caused by blood pressure 140/90 mmHg or more after the 20th week pregnancy on women who is normotensif before, or there is ascension on systolic pressure 30 mmHg or diastolic pressure 15 mmHg beyond normal limit. Hypertension is one of medical problem which is usually suffered during pregnancy and it could make complication is occurred on 2-3% pregnancy. Hypertension in pregnancy cause morbidity on pregnant woman (including convulsion, eclamsia, brain hemorrhage, lungs edema, renal failure, blood clotting), and fetus morbidity (including fetus growth is blocked in uterus).

This research is purposed to know about the description of factors on hypertension risk in pregnant woman and its variable are age, parity, and obesity. This research is made on August 20-25, 2013 use descriptive method. The population is 303 people, and from 120 people who have inclusion criteria, there are 32 people who got hypertension in pregnancy, by purposive sampling technique.

The result of this research based on the age, show that the pregnant woman attain the age of 20-35 years old get hypertension at most, it is 22 people (9,01%) and the pregnant woman who get malnutrition at least is attain the age < 20 years old, it just 5 person (2, 04 %). Based on the parity, the most pregnant woman who got hypertension is on primiparous mother, it is 16 sample (6,6 %) and the least pregnant woman who had malnutrition is multiparous mother, 11 person (4, 50%). Based on obesity, the pregnant woman who get hypertension with normal obesity is 11 person (34, 4 %), while the obesity on over weight grade is 9 person (28, 1%).

Increase the counseling is needed for pregnant woman to make them be aware to always check up, whether themselves or their pregnancy, and always keep their health.

Bibliography : 23 literatures (2002-2008)

Key Words : description about the factors of hypertension risk on pregnant woman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Gambaran Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di RB Mattirobaji Gowa Tahun 2012”**

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menghadapi banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian ini. Namun hal ini dapat teratasi dengan kerja keras dengan bimbingan dan dorongan, semangat bantuan serta doa dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Drs. Qanaah dan Hj. Syukriah yang selama ini mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang serta memberikan fasilitas yang cukup memadai, segala pengorbanan dan doa ayahanda dan ibunda yang tulus dan ikhlas, serta motivasi yang diberikan tanpa pamrih, saudara – saudaraku Maskurniawan,ST, Laila Qadrianti, Spd, Rezky Amaliah, S.Sos, Nur Muamalah< Chaerul Mukminin, beserta seluruh keluarga besarku terimakasih untuk semua bantuan, doa restunya yang tak

berujung, segala pengertian dan nasehat yang tak pernah berhenti serta segala motivasi dan pengorbanan tiada akhir sehingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. M.S selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Sitti Saleha, S. Si.T, SKM., M.Keb, selaku ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. dr. A. Tihardimanto, S.Ked selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. Dr. Firdaus Muhammad, MA selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. , selaku Direktur RB Mattiro Baji Gowa beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis untuk penyelesaian karya tulis ilmiah.

9. Kepada teman – teman Asrama III Putri Gappembar atas dukungan, bantuan, dan motivasinya, serta kebersamaan selama ini .
10. Kepada seluruh teman-teman jurusan Kebidanan Angkatan 010 atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan demi mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2013

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Hipertensi Dalam Kehamilan	
1. Pengertian.....	
2. Sebab Terjadinya Hipertensi dalam Kehamilan.....	

B. Jenis Hipertensi Dalam Kehamilan

- 1. Hipertensi Kronik.....
 - 2. Preeklampsia.....
 - 3. Eklampsia.....
 - 4. Hipertensi Gestasional.....
 - 5. Faktor Risiko Hipertensi.....
 - 6. Umur.....
 - 7. Paritas.....
 - 8. Obesitas.....
- C. Tinjauan Islam tentang Hipertensi dalam Kehamilan.....
- D. Kerangka Konsep.....

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....
- C. Populasi dan Sampel.....
- D. Tehnik Pengambilan Sampel.....
- E. Pengumpulan Data.....
- F. Pengolahan Data.....
- G. Analisa Data.....

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian.....
- B. Pembahasan.....

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hipertensi dalam kehamilan adalah adanya tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih setelah kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya normotensif, atau kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg dan atau tekanan diastolik 15 mmHg di atas nilai normal. Pre-eklampsia dalam kehamilan adalah apabila dijumpai tekanan darah 140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu (akhir triwulan kedua sampai triwulan ketiga) atau bisa lebih awal terjadi. Sedangkan pengertian eklampsia adalah apabila ditemukan kejang-kejang pada penderita pre-eklampsia, yang juga dapat disertai koma. Pre-eklampsia adalah salah satu kasus gangguan kehamilan yang bisa menjadi penyebab kematian ibu. Kelainan ini terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang akan berdampak pada ibu dan bayi. Kasus pre-eklampsia dan eklampsia terjadi pada 6-8% wanita hamil di Indonesia (Ben-zion, 1994)

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang kerap kali muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3 % kehamilan. Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan morbiditas/kesakitan pada ibu (termasuk kejang eklampsia, perdarahan otak, edema paru (cairan di dalam paru), gagal ginjal akut, dan penggumpalan/pengentalan darah di dalam pembuluh darah) serta morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan janin terhambat di dalam rahim, kematian janin di dalam rahim, solusio plasenta/plasenta terlepas dari tempat

melekatnya di rahim, dan kelahiran prematur). Selain itu, hipertensi pada kehamilan juga masih merupakan sumber utama penyebab kematian pada ibu (Prawihardjo, 2009).

Angka Kematian Ibu (AKI) Berdasarkan data resmi Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 yaitu 270 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2005 yaitu 262 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2010 yaitu 255 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Profil Kesehatan Indonesia (2012), walaupun sudah terjadi penurunan AKI di Indonesia, namun angka tersebut masih menempatkan Indonesia pada peringkat 12 dari 18 negara ASEAN dan SEARO (*South East Asia Region*, yaitu: Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Maladewa, Myanmar, Nepal, Timor Leste, dan lain-lain).

Negara- negara didunia memberikan perhatian cukup besar terhadap AKI sehingga menempatkan kesehatan ibu diantara delapan tujuan yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai sebelum 2015, AKI di Indonesia harus mencapai 125 per 100.000 kelahiran hidup. Komitmen yang ditanda tangani 189 negara pada September 2000, pada prinsipnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia (Yustina, 2007).

Salah satu kasus dari komplikasi kehamilan sebagai penyumbang AKI di Indonesia adalah hipertensi dalam kehamilan. Menurut Cunningham, dkk (1995) kehamilan dapat menyebabkan hipertensi pada wanita yang sebelumnya dalam keadaan normal atau memperburuk hipertensi pada wanita yang sebelumnya telah menderita hipertensi. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering

ditemukan dan merupakan salah satu dari tiga besar, selain pendarahan dan infeksi, yang terus menjadi penyebab utama sebagian besar kematian ibu di Amerika Serikat. Menurut Bobak (2004), hipertensi diperkirakan menjadi komplikasi sekitar 7% sampai 10% seluruh kehamilan.

Lebih lanjut data kejadian hipertensi pada kehamilan juga diungkapkan oleh WHO yang dikutip oleh Khan dan rekan dalam Boestari (1998) bahwa secara sistematis, 16% kematian ibu di negara-negara maju di seluruh dunia disebabkan karena hipertensi. Persentase ini lebih besar dari tiga penyebab utama lainnya yaitu perdarahan 13 %, aborsi 8 %, dan sepsis 2 %. Di Amerika Serikat pada tahun 1991-1997, Berg dan rekan dalam Cuningham (1995) melaporkan bahwa hampir 16 % dari 3.201 kematian ibu berasal dari komplikasi hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan.

Profil Kesehatan Indonesia (2009) diketahui bahwa eklampsia (24%) adalah persentase tertinggi kedua penyebab kematian ibu setelah perdarahan (28%). Kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak terkontrol saat persalinan. Hipertensi ini dapat terjadi karena kehamilan dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun, ada juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil.

Zweifel dalam Manuaba (2007) mengungkapkan bahwa cukup banyak teori tentang bagaimana hipertensi pada kehamilan dapat terjadi sehingga disebut sebagai "*disease of theory*". Beberapa landasan teori yang dikemukakan yaitu teori genetik, teori immunologis, teori iskemia region uteroplacental, teori kerusakan endotel

pembuluh darah, teori radikal bebas, teori trombosit dan teori diet. Ditinjau dari teori yang telah disebutkan di atas, maka teori diet merupakan salah satu faktor risiko yang dapat dikendalikan dengan melakukan upaya pencegahan oleh ibu hamil.

Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa kehamilan dengan hipertensi terbesar terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 5 orang (6,94%) dan hipertensi pada ibu hamil terkecil terdapat pada umur 20-35 tahun yaitu 3 orang (4,27%). Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan hipertensi terbesar terdapat pada paritas multigravida yaitu 6 orang (8,33%) dan ibu hamil dengan hipertensi terkecil terdapat pada paritas primigravida yaitu 4 orang (5,56%).

Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 320 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2006 menjadi 315 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2007 menjadi 275 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2008 sebesar 260 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Propsi, 2009). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Langkat pada tahun 2010 yaitu 238 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di Indonesia masih disebabkan oleh trias klasik (hipertensi pada kehamilan, preeklamsi, dan eklamsi), dan non medis (status gizi, faktor ekonomi, sosial budaya). Sedangkan Data yang di peroleh dari rekam medik Rumah Bersalin Mattirobaji tahun 2008 – 2009 terdapat 53 orang ibu hamil yang menderita hipertensi, sementara itu pada tahun 2010 – 2011 terdapat 73 ibu hamil yang menderita hipertensi, sedangkan di

tahun 2012 periode Januari-Desember terdapat 94 orang ibu hamil yang mengalami hipertensi. (Rekam Medik RB Mattirobaji).

Penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai gambaran kejadian hipertensi, karena di lihat dari bahaya yang akan muncul pada ibu hamil yang mengalami hipertensi adalah terjadinya preeklampsia kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) baik pada ibu, janin maupun bayi yang dilahirkan. Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Bersalin Mattirobaji Gowa dengan alasan karena Rumah Bersalin ini merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang mendapatkan banyak kunjungan oleh masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran faktor resiko hipertensi pada Ibu Hamil di RB Mattirobaji berdasarkan paritas ibu?
2. Bagaimana gambaran faktor resiko hipertensi Pada Ibu Hamil di RB Mattirobaji berdasarkan umur ibu?
3. Bagaimana gambaran faktor resiko kejadian hipertensi pada ibu hamil RB Mattirobaji berdasarkan obesitas?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran faktor resiko hipertensi Pada Ibu Hamil di RB MATTIROBAJI Makassar tahun 2013.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh Gambaran faktor resiko Hipertensi pada ibu Hamil berdasarkan paritas ibu.
- b. Untuk memperoleh gamabaran faktor resiko hipertensi pada ibu hamil berdasarkan usia ibu.
- c. Untuk memperoleh faktor resiko kejadian hipertensi pada ibu hamil berdasarkan obesitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hipertensi Dalam Kehamilan

Hipertensi dalam kehamilan (HDK), adalah suatu keadaan yang di temukan sebagai komplikasi medic pada wanita hamil dan sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin. Secara umum HDK dapat didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah sistolik 140mmHg keatas dan tekanan darah sistolik > 90 mmHg yang diukur paling kurang 6 jam pada saat yang berbeda. Hingga saat ini hipertensi dalam kehamilan masih merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janinnya. Upaya pencegahan terhadap penyakit ini dengan sendirinya akan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas tersebut. Untuk itu diperlukan bukan hanya pengetahuan mengenai patofsiologi tetapi juga cara-cara deteksi dini dan cara intervensi terhadap perubahan yang terjadi dalam proses penyakit tersebut.

Perlu dibedakan antara prediksi dan deteksi dini penyakit. Prediksi lebih awal dari deteksi dini yakni sebelum tanda atau gejala penyakit ditemukan. Deteksi dini berusaha menemukan kelainan awal penyakit yang bila dibiarkan akan berlanjut, namun batas antara prediksi dan deteksi dini kadang-kadang tidak jelas. Gejala-gejala preeklampsia baru menjadi nyata pada usia kehamilan yang lanjut (trimester ketiga). Namun sebenarnya kelainan sudah terjadi jauh lebih dini yakni pada usia kehamilan antara 8 dan 18 minggu. Tes yang ideal untuk deteksi dini preeklampsia harus sederhana, mudah dikerjakan, tidak memakan waktu

lama, non invasif, sensitivitasnya tinggi dan mempunyai nilai prediksi positif yang tinggi.

Sebab Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan

Penyebab Hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui dengan jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satupun teori tersebut yang dianggap mutlak benar.

Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah :

1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis relative mengalami vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan “remodeling arteri spiralis”, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta.

2. Teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel

a) Iskemia plasenta dan pembentukan oksidan/radikal bebas

Sebagaimana dijelaskan pada teori invasi trofoblas, pada hipertensi dalam kehamilan terjadi kegagalan “remodeling arteri spiralis”, dengan akibat plasenta mengalami iskemia. Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan menghasilkan oksidan (disebut juga radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah

senyawa penerima electron atau atom/molekul yang mempunyai electron yang tidak berpasangan. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Sebenarnya produksi oksidan pada manusia adalah suatu proses normal, karena oksidan memang dibutuhkan untuk perlindungan tubuh. Adanya radikal hidroksil dalam darah, maka dulu hipertensi dalam kehamilan disebut “toxaemia”. Radikal hidroksil akan merusak membrane sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak. Peroksida lemak selain akan merusak membrane sel, juga akan merusak nucleus, dan protein sel endotel. Produksi oksidan (radikal bebas) dalam tubuh yang bersifat toksis, selalu diimbangi dengan produksi anti oksidan.

b) Peroksida lemak sebagai oksidan pada hipertensi dalam kehamilan

Pada hipertensi dalam kehamilan telah terbukti bahwa kadar oksidan, khususnya peroksida lemak meningkat, sedangkan antioksidan, missal vitamin E pada hipertensi dalam kehamilan menurun, sehingga terjadi dominasi kadar oksidan peroksida lemak yang relative tinggi. Perksidan lemak sebagai oksidan/radikal bebas yang sangat toksis ini akan beredar disuruh tubuh daam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel. Membran sel endotel lebih mudah mengalami kerusakan oleh

peroksida lemak, karena letaknya langsung berhubungan dengan aliran darah dan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat rentan terhadap oksidan radikal hidroksil, yang akan berubah menjadi peroksida lemak.

c) Disfungsi sel endotel

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel, yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur sel endotel. Keadaan ini disebut disfungsi endotel.

3. Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin

Pada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua menjadi lunak, dan gembur sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi.

4. Teori adaptasi kardiovaskular

Pada hipertensi dalam kehamilan kehilangan daya refrakter terhadap bahan vasokonstriktor, dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang sehingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan-bahan vasopresor pada hipertensi

dalam kehamilan sudah terjadi pada trimester I (pertama). Peningkatan kepekaan pada kehamilan yang akan menjadi hipertensi dalam kehamilan, sudah dapat ditemukan pada kehamilan dua puluh minggu. Fakta ini dapat dipakai sebagai prediksi akan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

5. Teori defisiensi gizi

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Penelitian yang penting yang pernah dilakukan di Inggris ialah penelitian tentang pengaruh diet pada preeklampsia beberapa waktu sebelum pecahnya Perang Dunia ke II. Suasana serba sulit mendapat gizi yang cukup dalam persiapan perang menimbulkan kenaikan insiden hipertensi dalam kehamilan. Penelitian terakhir membuktikan bahwa konsumsi minyak ikan, termaksud minyak hati halibut dapat mengurangi risiko preeklampsia.

6. Teori inflamasi

Teori ini berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris trofoblas di dalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi juga masih dalam batas normal. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklampsia, dimana ada preeklampsia terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas juga meningkat. Makin banyak

sel trofoblas plasenta, misalnya pada plasenta besar, pada hamil ganda, maka reaksi stress oksidatif kan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofobls juga makin meningkat. Keadaan ini menimbulkan beban reaksi inflamasi dalam darah ibu menjadi juh lebih besar, dibanding reaksi inflamsi pada kehamilan normal. Respons inflamasi ini akan mengaktifasi sel endotel, dan sel-sel makrofag/granulosit, yang lebih besar pula, sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala pada preeklampsia pada ibu.

B. Jenis Hipertensi dalam Kehamilan

a. Hipertensi kronik

Hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan.

b. Pre Eklampsia

Pre eklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi , oedema dan proteuria yang timbul karena kehamilan (Wiknjosastro, 2007)

c. Eklampsia

Menurut Wiknjosastro, (2007), istilah eklampsia berasal dari bahasa Yunani dan berarti “halilintar” dipakai karena seolah-olah gejala eklampsia timbul dengan tiba-tiba tanpa didahului oleh tanda-tanda lain. Pada umumnya kejang didahului makin memburuknya preeclampsia dan terjadinya gejala-gejala nyeri kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri di epigastrium dan hiperrefleksia.

Jenis – jenis Eklampsia

1. Eklampsia gravidarum (Eklampsia antepartum)

adalah tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria (protein dalam air kencing) atau edema (penimbunan cairan), yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan.

2. Eklampsia parturientum (Eklampsia intrapartum)

intrapartum eklampsia adalah pengembangan kejang atau koma pada wanita hamil menderita tekanan darah tinggi. Intrapartum berarti bahwa itu terjadi selama pengiriman bayi. Eklampsia adalah kondisi serius yang memerlukan pengobatan medis yang mendesak. Eklampsia dapat dikaitkan dengan peningkatan moderat serta signifikan pada tekanan darah. Tekanan darah dapat kembali normal setelah melahirkan atau mungkin bertahan untuk jangka waktu tertentu.

3. Eklampsia puerperale (Eklampsia post partum)

pengembangan kejang atau koma pada wanita hamil menderita tekanan darah tinggi. Postpartum berarti bahwa segera setelah melahirkan. Eklampsia adalah kondisi serius yang memerlukan pengobatan medis yang mendesak. Eklampsia dapat dikaitkan dengan peningkatan moderat serta signifikan pada tekanan darah.

d. Hipertensi Gestasional

Hipertensi gestasional (*transient hypertensi*) adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pascapersalin, kehamilan dengan preeklamsi tetapi tanpa proteinuria.

Faktor Risiko hipertensi pada ibu hamil

1. Umur

Hipertensi erat kaitannya dengan umur, semakin tua seseorang semakin besar risiko terserang hipertensi. Umur lebih dari 40 tahun mempunyai resiko terkena hipertensi. Risiko tinggi bila ibu berumur <20 tahun dan > 35 tahun sedangkan risiko rendah bila umur ibu 20 – 35 tahun. Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40 % dengan kematian sekitar 50% diatas umur 60 tahun. Arteri kehilangan elastisitasnya atau kelenturannya dan tekanan darah seiring bertambahnya usia, kebanyakan orang hipertensinya meningkat ketika berumur lima puluhan dan enam puluhan.

2. Paritas

Kira-kira 85% preeklamsi terjadi pada kehamilan pertama. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari kejadian preeklamsi dan risiko meningkat lagi pada grandemultigravida (Bobak, 2005). Risiko tinggi bila frekuensi kehamilan > 4 kali sedangkan risiko rendah bila < 4 kali. Selain itu primitua, lama perkawinan ≥ 4 tahun juga dapat berisiko tinggi timbul preeklamsi (Rochjati, 2003)

3. Obesitas

Obesitas atau kegemukan dimana berat badan mencapai indeks massa tubuh > 25 (berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m) juga

merupakan salah satu faktor risiko terhadap timbulnya hipertensi. Obesitas merupakan ciri dari populasi penderita hipertensi. Curah jantung dan sirkulasi volume darah penderita hipertensi yang obesitas lebih tinggi dari penderita hipertensi yang tidak obesitas. Pada obesitas tahanan perifer berkurang atau normal, sedangkan aktivitas saraf simpatis meninggi dengan aktivitas renin plasma yang rendah.

4. Riwayat Keluarga

Menurut Nurkhalida, orang-orang dengan sejarah keluarga yang mempunyai hipertensi lebih sering menderita hipertensi. Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga mempertinggi risiko terkena hipertensi terutama pada hipertensi primer. Keluarga yang memiliki hipertensi dan penyakit jantung meningkatkan risiko hipertensi 2-5 kali lipat.

Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya menderita hipertensi. Menurut Sheps, hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika seorang dari orang tua kita mempunyai hipertensi maka sepanjang hidup kita mempunyai 25% kemungkinan mendapatkannya pula. Jika kedua orang tua kita mempunyai hipertensi, kemungkinan kita mendapatkan penyakit tersebut 60%.

5. Genetik

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar

monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial) apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala.

6. Kebiasaan Merokok

Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain dari lamanya, risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok. Nikotin dalam tembakau merupakan penyebab meningkatnya tekanan darah segera setelah isapan pertama. Seperti zat-zat kimia lain dalam asap rokok, nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat kecil didalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Hanya dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai otak.

Otak bereaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi. Setelah merokok dua batang saja maka baik tekanan sistolik maupun diastolik akan meningkat 10 mmHg. Tekanan darah akan tetap pada ketinggian ini sampai 30 menit setelah berhenti mengisap rokok. Sementara efek nikotin perlahan-lahan

menghilang, tekanan darah juga akan menurun dengan perlahan. Namun pada perokok berat tekanan darah akan berada pada level tinggi sepanjang hari.

7. Konsumsi Asin/Garam.

Secara umum masyarakat sering menghubungkan antara konsumsi garam dengan hipertensi. Garam merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme timbulnya hipertensi. Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi melalui peningkatan volume plasma (cairan tubuh) dan tekanan darah. Keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik (sistem peredaran) yang normal. Pada hipertensi esensial mekanisme ini terganggu, di samping ada faktor lain yang berpengaruh.

Reaksi orang terhadap natrium berbeda-beda. Pada beberapa orang, baik yang sehat maupun yang mempunyai hipertensi, walaupun mereka mengkonsumsi natrium tanpa batas, pengaruhnya terhadap tekanan darah sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Pada kelompok lain, terlalu banyak natrium menyebabkan kenaikan darah yang juga memicu terjadinya hipertensi.

Garam merupakan faktor yang sangat penting dalam patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan prevalensi hipertensi yang rendah, sedangkan jika asupan

garam antara 5-15 gram perhari prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20 %. Pengaruh asupan terhadap timbulnya hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah.

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena menarik cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Pada manusia yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang ditemukan tekanan darah rata-rata rendah, sedangkan asupan garam sekitar 7-8 gram tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 mg/hari.

8. Konsumsi Lemak Jenuh.

Kebiasaan konsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan peningkatan berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak jenuh juga meningkatkan risiko aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah.

9. Penggunaan Jelantah.

Jelantah adalah minyak goreng yang sudah lebih dari satu kali dipakai untuk menggoreng, dan minyak goreng ini merupakan minyak yang telah rusak. Bahan dasar minyak goreng bisa bermacam-macam seperti kelapa, sawit, kedelai, jagung dan lain-lain. Meskipun beragam, secara kimia isi

kandungannya sebetulnya tidak jauh berbeda, yakni terdiri dari beraneka asam lemak jenuh (ALJ) dan asam lemak tidak jenuh (ALTJ). Dalam jumlah kecil terdapat lesitin, cephalin, fosfatida, sterol, asam lemak bebas, lilin, pigmen larut lemak, karbohidrat dan protein. Hal yang menyebabkan berbeda adalah komposisinya, minyak sawit mengandung sekitar 45,5% ALJ yang didominasi oleh lemak palmitat dan 54,1% ALTJ yang didominasi asam lemak oleat sering juga disebut omega-9. Minyak kelapa mengandung 80% ALJ dan 20% ALTJ, sementara minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari hampir 90% komposisinya adalah ALTJ.

Penggunaan minyak goreng sebagai media penggorengan bisa menjadi rusak karena minyak goreng tidak tahan terhadap panas. Minyak goreng yang tinggi kandungan ALTJ-nya pun memiliki nilai tambah hanya pada gorengan pertama saja, selebihnya minyak tersebut menjadi rusak. Bahan makanan kaya omega-3 yang diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol darah, akan tidak berkasiat bila dipanaskan dan diberi kesempatan untuk dingin kemudian dipakai untuk menggoreng kembali, karena komposisi ikatan rangkapnya telah rusak.

10. Kebiasaan Konsumsi Minum Minuman Beralkohol.

Alkohol juga dihubungkan dengan hipertensi. Peminum alkohol berat cenderung hipertensi meskipun mekanisme timbulnya hipertensi belum diketahui secara pasti. Orang-orang yang minum alkohol terlalu sering atau yang terlalu banyak memiliki tekanan yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak minum atau minum sedikit.

Menurut Ali Khomsan, konsumsi alkohol harus diwaspadai karena survei menunjukkan bahwa 10 % kasus hipertensi berkaitan dengan konsumsi alkohol. Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun diduga, peningkatan kadar kortisol dan peningkatan volume sel darah merah serta kekentalan darah merah berperan dalam menaikkan tekanan darah.

11. Stres.

Hubungan antara stres dengan hipertensi dalam kehamilan diduga melalui aktivitas saraf simpatis, yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Apabila stress menjadi berkepanjangan dapat berakibat tekanan darah menjadi tetap tinggi. Hal ini secara pasti belum terbukti, akan tetapi pada binatang percobaan yang diberikan pemaparan terhadap stress ternyata membuat binatang tersebut menjadi hipertensi.

Penatalaksanaan

Pencegahan

- Dianjurkan untuk mentaati peraturan pemeriksaan antenatal yang teratur dan jika perlu dikonsultasikan kepada dokter ahli. Perawatan antenatal ditujukan untuk pengendalian tekanan darah dan deteksi dini tanda – tanda perawatan pre eklamsi.

Ibu hamil harus diperiksa sedikitnya 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 28 minggu dan kemudian seminggu sekali sampai melahirkan

- Dianjurkan untuk cukup istirahat, tidak emosi dan menghindari aktivitas yang terlalu berat
- Mencegah penambahan berat badan yang agresif
Dianjurkan untuk diet tinggi protein, rendah hidrat arang, rendah lemak dan rendah garam.

Penanganan

Tujuan utama penanganan adalah :

- Untuk mencegah terjadinya pre- eklamsi dan eklamsi
- Hendaknya janin lahir hidup
- Trauma pada janin seminimal mungkin
- Pengawasan terhadap janin yaitu dengan melakukan pemeriksaan USG
- Pemeriksaan obat – obatan
 - * Anti hipertensi : serpasil, katapres, captropil, dsb.
 - * Pemberian obat fenobarbital.

C. Tinjauan Islam dalam kehamilan

Banyak keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Salah satu nikmat yang sangat indah bagi wanita adalah merasakan apa yang disebut dengan KEHAMILAN. Kehamilan merupakan anugerah dan pengalaman hidup yang sangat menakjubkan bagi wanita. Lebih mengagumkan lagi, banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah janjikan kepada para wanita hamil.

Di dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa kehamilan mengalami perkembangan dan perubahan mulai dari yang masih ringan dan terus bertambah berat, sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. Al a'raf (7):189, berbunyi:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

هُوَ الَّذِي

حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّ تَأْنَقَلَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنُكُونَنَّ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, tuhan seraya berkata: “sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya perubahan beban yang dialami oleh seorang perempuan karena adanya gangguan janin di dalam perutnya. Kandungan yang setiap saat bertambah besar yang menyebabkan bertambahnya beban yang ditanggung oleh ibu hamil di mana ayat ini juga mengandung nilai tanggungjawab yang berat bagi ibu yang hamil dan nilai kepasrahan terhadap takdir Allah SWT. Sehingga menyadarkan untuk selalu senantiasa berdoa kepadanya agar kelak melahirkan anak yang sempurna. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia mengalami perkembangan melalui beberapa proses, yaitu dari diri yang satu kemudian tercipta manusia kedua, manusia pertama selanjutnya mencampuri manusia kedua (istri) sehingga hamil, elanjutnya melahirkan manusia ketiga dan seterusnya manusia berkembang biak. Proses kehamilan seperti disebutkan pada ayat tersebut mengalami proses atau tahapan mulai dari rasa ringan kemudian terasa berat dan akhirnya melahirkan.

Ayat ini juga mengandung nilai kekhilafan bahwa dalam proses kejadian manusia dengan beberapa tahapan mengisyaratkan bahwa manusia harus memelihara

keberlangsungan hidup dan berkembang biaknya agar kedudukannya sebagai khalifa yang bertugas memakmurkan bumi Allah dapat berjalan dengan baik.

Demikian pula di dalam surah Luqman (31):14 tentang kondisi yang lemah bagi ibu yang mengandung, berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ وَلِيَ الْإِلَهِ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Ayat diatas juga menegaskan kewajiban anak untuk bersyukur atas kelahirannya melalui perjuangan seorang ibu yang dibantu oleh bapak karena itu, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak sebagai tand kesyukuran kepada Allah SWT. Betapa besar jasa ibu terhadap anak yaitu mulai dari beban mengandung dalam keadaan lemah dan bahkan beban tersebut senantiasa bertambah dari saat kesaat. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan ditengah malam ketika pada saat manusia lain tertidur nyenyak.

Ayat ini mengandung nilai kebaktian terhadap kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita. Setiap anak berkewajiban berbakti kepada ibunya. Seperti dalam Surah Al-Ahqaf 46:15 Tentang perjuangan yang menyusahkan bagi ibu yang hamil, berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا غَبَلَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ

صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mengsyukuri nikmat Engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ayat ini mengisyaratkan bahwa proses kehamilan dan penyapihan berlangsung selama 30 bulan dan 9 bulan. Disisi lain, ayat ini juga menekankan betapa pentingnya ibu kandung memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dimulai dari masa kehamilan dan seterusnya. Para bidan bertugas membantu ibu hamil agar tetap memberikan perhatian dan pemeliharaan terhadap kandungannya. Kemudian ayat ini mengandung nilai tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Di dalam islam, pendidikan berawal dari pra kelahiran artinya, perilaku orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak-anaknya termasuk pada masa kehamilannya.


Hikmah Dari Ayat Tersebut

Kita sebagai anak harus mengabdikan kepada kedua orangtua terutamanya kepada ibu yang telah mengandung kita selama sembilan dalam keadaan lemah dan beban tersebut senantiasa bertambah dari saat ke saat lalu ibu melahirkan dengan susah payah kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat anusia lain tertidur nyenyak. Ayat ini juga mengandung nilai ketauhidan bahwa dalam proses kejadian manusia merupakan bagian dari tand-tanda kekuasaan Allah

SWT. Karena itu, setiap orang harus menyakini bahwa Dialah yang maha pencipta dan pemelihara atas seluruh makhluk-Nya termasuk manusia.

Kehamilan adalah adanya perubahan beban yang di alami oleh seorang perempuan karena adanya gangguan janin di dalam perutnya. Yang di mana perempuan hamil setelah melahirkan dia mempunyai kewajiban untuk menyusui, memelihara serta mendidiknya menjadi seorang muslimah yang soleh dan soleha. Kewajiban anak harus patuh dan bersyukur atas kelahirannya melalui perjuangan seorang ibu yang dibantu oleh bapak. Karena itu berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT.

D. Kerangka Konsep



Keterangan :

 = Variabel Independen

 = Variabel yang diteliti

 = Variabel Dependen

Definisi operasional dan Kriteria Objektif

1. Umur ibu

a. Definisi operasional Umur ibu adalah Lamanya hidup ibu mulai dari lahir sampai ketika terdiagnosa pre-eklampsia yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir seperti yang tercantum dalam status pasien.

b. kriteria objektif:

1) Risiko tinggi : Bila umur ibu <20 tahun dan >35 tahun.

2) Risiko rendah : Bila umur ibu 20-35 tahun.

2. paritas

a. Definisi Operasional

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu Jumlah kehamilan yang berakhir dengan kelahiran bayi atau bayi telah mencapai titik mampu bertahan hidup.

b. kriteria Objektif

1. Normal : bila frekuensi kehamilan 1 – 4 kali

2. risiko tinggi : bila frekuensi kehamilan > 4 kali

3. Risiko rendah : bila frekuensi kehamilan < 4 kali

3. Obesitas

a. Definisi Operasional

Obesitas adalah adanya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, biasanya disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan garam yang kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai jenis penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner,

reumatik dan berbagai jenis keganasan (kanker) dan gangguan kesehatan lain.

b. Kriteria Objektif

Kriteria Kenaikan Berat Normal Badan Pada Ibu Hamil:

1. Ibu hamil yang sebelumnya memiliki berat badan *underweight* dengan indeks massa tubuh (BMI) kurang dari 18,5 maka peningkatan berat badan dikatakan normal bila bobotnya bertambah 13 sampai 18 kg.
2. Ibu hamil yang sebelumnya memiliki berat badan normal dengan indeks massa tubuh (BMI) antara 18,5 dan 24,9 maka peningkatan berat badan dikatakan normal jika bertambah 11 hingga 16 kg.
3. Pada ibu *overweight* dengan indeks massa tubuh (BMI) antara 25 dan 29,9 maka peningkatan berat badan dikatakan normal bila ibu hamil bobotnya bertambah 7 sampai 11 kg.
4. Ibu yang mengalami obesitas sebelum hamil dengan indeks massa tubuh (BMI) lebih dari 30 maka peningkatan berat badan dikatakan normal bila pada saat hamil bobotnya bertambah 5 sampai 9 kg.

Kriteria obesitas Pada Ibu Hamil:

IMT kategori obesitas (di atas 30). Total kenaikan berat badan: 5,5-10 kg per minggu hingga akhir kehamilan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian dimana didalamnya tidak ada analisis hubungan antar variabel, tidak ada variable bebas dan terikat, bersifat umum (Aziz, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kejadian Hipertensi pada ibu hamil di RB Mattirobaji Gowa Tahun 2013 periode januari-juni.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Bersalin Mattiro Baji yang bertempat di jalan Syamsuddin Tunru No. 115 Sungguminasa, Kabupaten Gowa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini adalah karena Rumah Bersalin Mattiro Baji merupakan salah satu Rumah Bersalin yang mempergunakan pelayanan Kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah.

2. Waktu penelitian

Penelitian akan direncanakan pada bulan Agustus 2013

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditentukan untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004), Semua ibu hamil

yang datang memeriksakan kehamilannya di RB Mattirobaji Gowa pada Tahun 2013 periode januari-juni.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2007). Semua ibu hamil dengan kehamilan Hipertensi yang tercatat dalam medical record RB Mttirobaji Gowa, berdasarkan kriteria yang di tetapkan.

D. Teknik Pengambilan sampel

Penarikan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan memilih sampel diantara populasi, dengan menentukan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik (Budiarto E, 2005). Kriteria yang ditetapkan adalah semua Ibu yang mengalami kehamilan dengan hipertensi yang memiliki data lengkap seperti umur ibu, paritas, dan obesitas.

E. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Data tersebut diambil pada saat pengambilan data awal ke RB Mattirobaji Gowa Tahun 2012, pengambilan data diawali ke bagian antenatal untuk mendapatkan jumlah kehamilan ibu yang hipertensi dengan terlebih dahulu penulis memasukkan surat izin untuk pengambilan data awal.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator dan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi dan persentase.

G. Analisis Data

Data dianalisis dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus distribusi sebagai berikut (Notoatmojo, 2003).


$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : persentase yang dicari

f : jumlah pengamatan

n : jumlah sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa pada tanggal 20 Juli sampai 26-30 Agustus 2013. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa selama tahun 2013 periode Januari - Juni jumlah populasi ibu yang memeriksakan kehamilannya adalah sebanyak 303 orang. Dari ke-303 orang tersebut, yang memiliki data rekam medik lengkap dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 120 orang. Dari 120 orang yang mengalami hipertensi pada kehamilan sebanyak 32 orang. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 orang yang memeriksakan kehamilannya di *Antenatal Care*.

Hasil penelitian ini secara lengkap disajikan dalam bentuk table distribusi dan frekuensi sebagai berikut :

Tabel 1

Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Hipertensi Pada Kehamilan Berdasarkan umur

Hipertensi pada kehamilan Berdasarkan Umur	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 tahun	6	18,9
20-35 tahun	26	81,3
> 35 tahun	-	-
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2012 Periode Januari-Desember

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang mengalami hipertensi pada kehamilan berdasarkan umur <20 tahun adalah 6 orang (18,7%), umur 20-35 tahun terdapat 23 orang (81,3%), dan pada umur >35 tahun tidak terdapat sampel.

Berdasarkan Tabel 1 Berdasarkan indikator hipertensi pada kehamilan terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3%) dan hipertensi pada kehamilan paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7%).

Tabel 2

Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Hipertensi Pada Kehamilan Berdasarkan Paritas

Hipertensi pada Kehamilan berdasarkan Paritas	Frekuensi	Persentase (%)
Primipara	18	56,2
Multipara	14	43,8
Grandemultipara	-	-
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2012 Periode Januari-Desember

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang hipertensi pada kehamilan berdasarkan paritas terdapat pada Primipara 18 orang (56,2 %), Multipara terdapat 14 orang (43,8 %), dan tidak terdapat sampel pada Grandemultipara.

Berdasarkan tabel 5.4 Berdasarkan indikator Paritas, ibu hamil dengan hipertensi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 18 sampel (56,2%) dan status gizi kurang juga paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 14 orang (43,8%).

Tabel 3

Tabel Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Dengan Hipertensi pada Kehamilan

Berdasarkan Obesitas

Hipertensi Pada Kehamilan Berdasarkan Obesitas	Frekuensi	Persentase (%)
Over Weight	11	34,4
Normal	9	28,1
Jumlah	32	100

Sumber Data : Rekam Medik ANC Tahun 2012 Periode Januari-Desember

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang hipertensi dalam kehamilan ibu yang tingkat obesitasnya over weight adalah sebanyak 11 orang (34,4 %), pada tingkat obesitas kategori normal terdapat 9 orang (28,1 %).

B. Pembahasan

1. Umur

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang hipertensi dalam kehamilan kurang berdasarkan umur <20 tahun adalah 6 orang (18,7%), umur 20-35 tahun terdapat 26 orang (81,3%), dan pada umur >35 tahun tidak terdapat sampel.

Berdasarkan indicator Umur, kehamilan dengan hipertensi terbanyak didapatkan pada umur 20-35 tahun yaitu 26 orang (81,3%) dan hipertensi pada ibu hamil paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 6 orang (18,7%).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa kehamilan dengan hipertensi terbesar terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 5 orang (6,94%) dan hipertensi pada ibu hamil terkecil terdapat pada umur 20-35 tahun yaitu 3 orang (4,27%). Menurut peneliti, berbanding terbalik dengan teori yang dimana terdapat ibu hamil dengan hipertensi

terbanyak umur 20-35 tahun, disebabkan karena yang memiliki umur 20-35 tahun terbanyak memiliki status pendidikan rendah sehingga mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kesehatannya.

Menurut Wibowo dan Basuki (2006), usia seseorang ibu berkaitan dengan perkembangan alat-alat produksinya. Usia reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 20-35 tahun. Kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya. Sedangkan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun berkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit.

2. Paritas

Penelitian menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang terkena hipertensi dalam kehamilan berdasarkan paritas terdapat pada Primipara 18 orang (56,2 %), Multipara terdapat 11 orang (43,8 %), dan tidak terdapat sampel pada Grandemultipara. Berdasarkan indikator paritas, ibu hamil dengan hipertensi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 18 orang (56,2%) dan ibu hamil dengan hipertensi paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 11 orang (43,8%).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2011) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan hipertensi terbesar terdapat pada paritas multigravida yaitu 6 orang (8,33%) dan ibu hamil dengan hipertensi terkecil terdapat pada paritas primigravida yaitu 4 orang (5,56%).

Dimana menurut peneliti, hal ini disebabkan karena pada ibu primipara kekhawatirannya lebih tinggi karena baru mengalami kehamilan sehingga lebih memperhatikan kesehatannya, sedangkan pada multipara sudah pernah mengalami kehamilan sebelumnya sehingga ibu tidak merasa khawatir terhadap kehamilannya. Dan ibu yang pernah hamil sebelumnya berasumsi bahwa kehamilan selanjutnya sama dengan kehamilan sekarang.

3. Obesitas

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 ibu yang hipertensi dalam kehamilan kurang ibu yang tingkat obesitasnya over weight adalah sebanyak 11 orang (34,4 %), pada tingkat obesitas kategori normal terdapat 9 orang (28,1 %). Dari hasil penyeelidikan epidemiologi terbukti bahwa obesitas merupakan ciri khas pada populasi hipertensi (soeparman, 2004). Obesitas mempunyai hubungan yang erat dengan hipertensi dan mengakibatkan insiden hipertensi ketika berat badan bertambah.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator Umur ibu hamil dengan hipertensi terbesar terdapat umur 20-35 tahun yaitu 22 orang (9,01%) dan status gizi kurang paling sedikit terdapat pada umur < 20 tahun yaitu 5 orang (2,04%).
2. Berdasarkan indikator Paritas, ibu hamil dengan hipertensi terbanyak yaitu pada ibu primipara yaitu 16 sampel (6,6%) dan status gizi kurang juga paling sedikit terdapat pada ibu multipara yaitu 11 orang (4,50%).
3. Berdasarkan indikator Obesitas, ibu hamil dengan hipertensi ibu yang tingkat obesitasnya normal adalah sebanyak 11 orang (34,4 %), pada tingkat obesitas kategori over weight terdapat 9 orang (28,1 %).

D. Saran

1. Diharapkan untuk ibu hamil selalu memeriksakan kehamilannya untuk mengetahui perkembangan ibu dan janinnya agar terhindar dari masalah hipertensi. Selain itu, agar para ibu selalu mengingat bahwa anak adalah titipan dari Allah Swt sehingga sebaiknya memperhatikan dan peduli kepada keadaan anak dalam hal ini menyangkut memperhatikan asupan makanan yang baik selama hamil.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bias menjadi sumber informasi bagi Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa agar lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya memeriksakan diri dan menjaga kesehatan selama masa kehamilan sehingga kesehatan dapat terkontrol.

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan atau panduan khususnya kepada mahasiswi kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin.



MASTER TABEL
GAMBARAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI RB
MATTIROBAJI GOWA
TAHUN 2012

NO	RESPONDEN	UMUR			PARITAS		
		< 20 THN	20-35 THN	> 35 THN	PRIMI	MULTI	GRA
1	NY "N"	√			√		
2	NY "R"	√			√		
3	NY "M"	√			√		
4	NY "S"			√		√	
5	NY "S"		√		√		
6	NY "K"		√			√	
7	NY "M"		√			√	
8	NY "J"			√		√	
9	NY "K"					√	
10	NY "R"					√	
11	NY "W"					√	
12	NY "J"				√		
13	NY "I"		√		√		
14	NY "N"		√			√	
15	NY "N"		√		√		


16	NY "H"		√			√	
17	NY "A"		√			√	
18	NY "M"		√			√	
19	NY "S"		√			√	
20	NY "N"		√			√	
21	NY "S"		√		√		
22	NY "R"		√			√	
23	NY "R"		√			√	
24	NY "W"		√		√		
25	NY "R"		√			√	
26	NY "I"		√			√	
27	NY "D"		√		√		
28	NY "E"		√			√	
29	NY "H"		√			√	
30	NY "S"		√			√	
31	NY "E"		√		√		
32	NY "H"	√			√		
33	NY "S"		√			√	
34	NY "I"			√	√		
35	NY "M"		√			√	
36	NY "H"		√			√	
37	NY "M"		√		√		
38	NY "I"		√		√		
39	NY "F"		√			√	

40	NY "H"		√			√	
41	NY "K"			√		√	
42	NY "K"		√			√	
43	NY "R"		√		√		
44	NY "S"		√			√	
45	NY "S"		√			√	
46	NY "S"		√		√		
47	NY "H"		√		√		
48	NY "A"		√			√	
49	NY "S"		√			√	
50	NY "E"		√		√		
51	NY "A"	√			√		
52	NY "P"		√		√		
53	NY "F"		√		√		
54	NY "S"		√			√	
55	NY "R"		√			√	
56	NY "I"		√			√	
57	NY "S"		√		√		
58	NY "O"		√			√	
59	NY "N"		√			√	
60	NY "R"		√			√	
61	NY "N"		√			√	
62	NY "E"		√			√	
63	NY "K"		√			√	

64	NY "H"	√			√		
65	NY "R"		√		√		
66	NY "S"		√			√	
67	NY "S"		√			√	
68	NY "D"		√		√		
69	NY "R"	√			√		
70	NY "N"		√		√		
71	NY "S"		√		√		
72	NY "U"		√			√	
73	NY "N"		√			√	
74	NY "H"		√			√	
75	NY "M"		√		√		
76	NY "H"		√		√		
77	NY "H"		√			√	
78	NY "N"		√			√	
79	NY "B"		√		√		
80	NY "H"			√		√	
81	NY "I"		√			√	
82	NY "E"	√			√		
83	NY "N"		√		√		
84	NY "R"		√			√	
85	NY "I"		√			√	
86	NY "N"		√		√		
87	NY "H"		√			√	

88	NY "H"		√			√	
89	NY "A"		√		√		
90	NY "A"		√			√	
91	NY "N"		√		√		
92	NY "A"		√			√	
93	NY "H"		√		√		
94	NY "D"	√			√		
95	NY "H"		√		√		
96	NY "K"		√		√		
97	NY "H"			√	√		
98	NY "S"		√			√	
99	NY "D"		√			√	
100	NY "S"		√			√	
101	NY "F"		√			√	
102	NY "R"		√			√	
103	NY "S"	√			√		
104	NY "J"		√		√		
105	NY "H"		√			√	
106	NY "P"		√			√	
107	NY "N"			√		√	
108	NY "S"		√			√	
109	NY "H"		√			√	
110	NY "A"		√			√	
111	NY "F"		√			√	

112	NY "H"		√			√	
113	NY "S"			√		√	
114	NY "R"		√		√		
115	NY "W"		√			√	
116	NY "S"		√			√	
117	NY "H"		√			√	
118	NY "S"		√			√	
119	NY "H"		√			√	
120	NY "K"		√			√	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R