

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI BERIMBANG DENGAN
STATUS GIZI BALITA DI DESA BULOGADING**

KEC. BONTONOMPO KAB. GOWA

TAHUN 2015



Karya Tulis Ilmiah

(KTI)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan
Ahli Madya Kebidanan Prodi Kebidanan Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:
NURFANNY
70400112038

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

ABSTRAK

Nama : Nurfanny
Nim : 70400112038
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Berimbang Dengan Status Gizi Balita Di Desa bulogading kec. Bontonompo Kab. Gowa Tahun 2015.
Pembimbing : Andi Tihardimanto

Anak balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi (Paath, 2007 :66). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2007 prevalensi nasional gizi buruk pada anak balita mencapai 5,4% dan gizi kurang 13%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Berimbang Dengan Status Gizi Balita Di Desa bulogading kec. Bontonompo Kab. Gowa Tahun 2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional yang merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada suatu saat. pada penelitian ini populasinya adalah seluruh ibu yang mempunyai balita di wilayah bulogading dengan jumlah 156 orang dan Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Accidental Sampling selama 18 kali di 3 posyandu.. Instrumen penelitian menggunakan koesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *univariat* yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Hasil penelitian didapatkan Tingkat pengetahuan ibu adalah kurang dengan jumlah 95 responden, Status gizi balita pada penelitian ini adalah baik dengan jumlah 76 balita dan Setelah dilakukan analisa menggunakan uji Korelasi *Chi Square*, ternyata diperoleh hasil bahwa nilai $P = 0.597 > d = 0,05$ dengan $n = 112$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita.

Kata Kunci: Hubungan, Pengetahuan, Status gizi balita

Name : Nurfanny
Nim : 70400112038
Title : **Relationship of Knowledge Level About Nutrition Balanced Mother With Toddler In the village of Nutritional Status bulogading excl. Bontonompo Kab. Gowa 2015.**
Supervisor : **Andi Tihardimanto**

Children under five are the age group most often suffer from malnutrition (Paath, 2007: 66). While based on Health Research (Riskesdes) 2007 national prevalence of malnutrition in children under five at 5.4% and 13% malnutrition. The purpose of this study was to determine the relationship Knowledge Level About Nutrition Balanced Mother With Toddler In the village of Nutritional Status bulogading excl. Bontonompo Kab. Gowa 2015.

This type of research is analytic survey research with cross sectional approach which is a type of research that emphasizes the time measurement / observation of independent and dependent variable data only once in a while. in this study population are all mothers who have children in the region bulogading the number 156 and the sampling is done by Accidental Sampling over 18 times in 3 Posyandu .. The research instrument used questioner. Analysis of the data used in this research is the analysis of univariate which explain or describe the characteristics of each study variable. The results, level of knowledge of mothers is less than the number of 95 respondents, the nutritional status of infants in this study were either the number 76 toddlers and After Correlation analysis using Chi Square test, it showed that the value of $P = 0.597 > d = 0,05$ with $n = 112$. Thus H_a H_o accepted and rejected it means there is no relationship between the level of knowledge of mothers with infant nutritional status.

Keywords: relationships, knowledge, nutritional status

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan umum pengetahuan sikap dan tindakan.....	9
1. Pengetahuan.....	9
2. Sikap.....	14
B. Tinjauan umum tentang perilaku kesehatan.....	17
1. Pengertian perilaku.....	17
2. Perilaku Kesehatan.....	17
3. Perilaku hidup sehat.....	17
4. Pola hidup sehat.....	17
C. Tinjauan umum tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).....	18
1. Pengertian PHBS.....	18
2. Ruang lingkup PHBS.....	18
3. Manfaat PHBS.....	19

4. Peran tenaga kesehatan.....	19
D. Tinjauan umum tentang PHBS dalam rumah tangga.....	20
1. Pengertian PHBS dalam rumah tangga.....	20
2. Tujuan PHBS dalam rumah tangga.....	20
3. Sasaran PHBS dalam rumah tangga.....	21
4. Manfaat PHBS dalam rumah tangga.....	21
5. Peran anggota rumah tangga dalam ber-PHBS.....	22
6. Sepuluh indikator PHBS dalam rumah tangga.....	22
E. Tinjauan Integrasi Islam Tentang Pola Hidup Bersih.....	46
F. Kerangka Teori.....	50
G. Kerangka Konsep.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis penelitian.....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C. Populasi.....	52
D. Sampel.....	53
E. Defenisi Operasional.....	54
F. Instrument Penelitian.....	56
G. Teknik Pengumpulan Data.....	56
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
KUESIONER	
MASTER TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data dari survai demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007. Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 34/100 kelahiran hidup sedangkan Angka Kematian Balita (AKBAL) pada tahun 2007 sebesar 44/1000 kelahiran hidup (muliadi 2009). Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2007 prevalensi nasional gizi buruk pada anak balita mencapai 5,4% dan gizi kurang 13%.

Anak balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi (Paath, 2007 :66), yaitu kelompok yang dibawah lima tahun (1-5 tahun). Karena anak balita baruburada dalam masa transisi dari makanan bayi ke dalam makanan orang dewasa dan anak balita belum dapat mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam memilih makanan, dipihak lain ibunya dudah tidak memperhatikan lagi makanan anak balita (<http://www.fkussula>)

Di Indonesia, cakupan pelayanan kesehatan anak balita menurut provinsi tahun 2013 yakni terjadi penurunan dari kondisi pada tahun 2012 dimana terdapat 7 provinsi yang memiliki capaian kurang dari target 81%, pada tahun 2013 tampak hanya 4 provinsi yang memiliki capaian melebihi target 83%, yaitu DKI Jakarta, Bali, Di Yogyakarta, dan Jawa Tengah. DKI

Jakarta memiliki tercapaian tertinggi yaitu 93,80% di ikuti oleh bali 87,89% dan Di Yogyakarta sebesar 85,4% sedang provinsi dengan capaian terendah adalah papua sebesar 8,43%, di ikuti oleh kepulauan riau sebesar 25,23% dan Sulawesi tengah sebesar 38,60%. Di provinsi Sulawesi selatan sendiri cakupan pelayanan kesehatan anak balita yakni 67,34% dan ini belum mencapai target yang direncanakan yakni 83%. (kemenkes RI, 2014 dalam profil kesehatan cakupan pelayanan kesehatan anak balita).

Menurut Riskesdas (2013), terdapat 19,6% balita kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% berstatus gizi kurang. Sebesar 4,5% balita dengan gizi lebih. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4%) dan tahun 2010 (17,9%), prevensi kekurangan gizi pada tahun 2013 terlihat meningkat. Balita kekurangan gizi tahun 2010 terdiri dari 13,0% balita berstatus gizi kurang dan 4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010, dan 5,7% tahun 2013. Untuk mencapai sasaran MDGS tahun 2015 yaitu 15,5% maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan 4,1% dalam periode 2013 sampe 2015.

Di Indonesia telah dilaksanakan pendidikan gizi untuk berbagai kelompok anak didik, hanya mungkin beberapa kelompok kelompok masih harus menggiatkan dan mengefisienkan pendidikan gizi tersebut. Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah sangat sadar gizi, sehingga berbagai kegiatan penyuluhan gizi dan perbaikan gizi

masyarakat dapat dilaksanakan dengan tidak menjumpai hambatan yang berarti dari pihak masyarakat dan kelompok anak didik lainnya (Sediaoetama, 2010).

Pendidikan kesehatan menurut Nyswander (1997) yang dikutip oleh Machfoedz dan suryani (2007) adalah suatu proses perubahan pada dari manusia yang ada hubungannya dengan tercapainya tujuan kesehatan perorangan. Pendidikan kesehatan gizi diperlukan untuk membentuk perilaku positif dalam memelihara, mempertahankan, ataupun meningkatkan keadaan gizi yang baik untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Perilaku dan kebiasaan makan balita sangat dipengaruhi oleh orang tua dan orang terdekatnya. Perilaku makan yang tidak sehat akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan gizi yang tidak sesuai sehingga akan menimbulkan permasalahan gizi dan kesehatan pada anak. Saat ini, permasalahan gizi pada balita merupakan masalah ganda, yaitu masalah ditemukannya masalah gizi kurang dan ditambah dengan ditemukannya masalah kelebihan zat gizi. Masalah yang berkaitan dengan pola makan dan pemenuhan kebutuhan gizi pada anak diantaranya adalah anemia, karies gigi, dan sulit makan (Sulistyoningsih, 2012).

Berdasarkan pemantauan status gizi di wilayah Bontonompo, kejadian gizi buruk yang tertinggi di desa bulogading dari total balita 156 balita, jumlah gizi buruk 4 orang (2,56%), gizi kurang 60 orang (38,46%), gizi baik 89 (57,05%). Gizi lebih 3 orang (1,92%).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “apakah ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dengan status gizi balita di desa Bulogading Kec. Bntonompo Kab. Gowa .

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Berimbang Dengan Status Gizi Balita Di Desa bulogading kec. Bntonompo Kab. Gowa Tahun 2015.

2. Tujuan khusus

- a. Menentukan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Berimbang Di Desa bulogading kec. Bntonompo Kab. Gowa Tahun 2015.
- b. Mengetahui Status Gizi Balita Di Desa bulogading kec. Bntonompo Kab. Gowa Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh bangku kuliah.

2. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambah wawasan serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat institusi

Sebagai padoman atau acuan bagi institusi pendidikan kebidanan untuk penulisan karya tuylis ilmiah berikutnya.

E. Hipotesa

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita di desa Bulogading Kec. Bontonompo tahun 2015.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah dan ini setelah melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya. Dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Dipandang dari sudut

filsafat. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk istimologepi (Rifkaputrika, 2013).

Tujuan pendidikan gizi untuk balita adalah agar ibu yang memiliki balita dapat memahami kebutuhan gizi balita agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal. Materi yang perlu disampaikan kepada ibu hamil meliputi: pembentukan pola makan pada balita, kebutuhan gizi balita dan anak, permasalahan gizi pada balita anak-anak, mengatasi kesulitan makan pada balita dan anak, menyusun untuk balita dan anak, menilai kecukupan makan balita dan anak berdasarkan grafik pertumbuhan.

2. Gizi Seimbang

a. Pengertian

Gizi seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal (Almatsier, 2010)

Pola menu 4 sehat 5 sempurna adalah menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pola menu ini diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1950 oleh bapak ilmu gizi Prof. DR. Dr.

Poorwo Soerdarmo melalui Lembaga Makanan Rakyat Depkes rangka melancarkan gerakan “sadar gizi (Sulistyoningi 2012).Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31:

﴿يَبْنَىِٔ ءَآءَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid[534], makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

[534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

[535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Makanan pokok berperan sebagai sumber utama energi berasal dari koarbohidrat, lauk sebagai sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber mineral dan vitamin. Buah merupakan sumber utama vitamin C karena pada umumnya dimakan dalam keadaan mentah. Sebagai akibat pemasakan, vitamin C pada sayur sebagian rusak. Karena menu ini terdiri atas empat macam makanan dan ternyata sehat, dalam slogan yang mudah dimengerti disebut “4

sehat". Karena susu mengandung protein bernilai biologi tinggi dan zat-zat gizi esensial lain dalam bentuk yang mudah dicerna dan diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai unsur kelima bagi golongan manusia yang dibutuhkan relatif lebih banyak protein, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Didalam surah Al-Ma'idah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan apa yang halal, disini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan, denhan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadapnya adalah mu'munun, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. Al-baqarah [2]:68, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang, walaupun halal. Ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu memutuskan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik, yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.

1) golongan makanan pokok

Diantara makanan pokok, jenis padi-padian seperti beras, jagung, dan gandum mempunyai kadar protein lebih tinggi (7-11%) daripada umbi-umbian, dan sagu (1-2%), bila menggunakan umbi-umbian sebagai makanan pokok, harus disertai makanan lauk dalam jumlah lebih besar daripada bila menggunakan padi-padian. Padi-padian merupakan sumber

karbohidrat kompleks, tiamin, riboflavin, niasin, protein, zat besi, magnesium, dan serat. Porsi makanan pokok yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 300-500 gram beras atau sebanyak 3-5 piring nasi sehari, sebagian dari beras dapat diganti dengan makanan pokok lainnya.

a) golongan lauk

Lauk sebaiknya terdiri dari campuran lauk hewani dan nabati, seperti daging, ayam, ikan, udang, dan telur mengandung protein dengan nilai biologi lebih tinggi daripada lauk nabati. Daging merah, hati, limpa, kuning telur, dan ginjal merupakan sumber zat besi yang mudah diabsorpsi. Ikan terutama bila dimakan dengan tulangnya (ikan teri), disamping itu merupakan sumber kalsium, ikan dan telur lebih murah, daripada daging ayam.

Porsi lauk hewani yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 100 gram atau 2 potong ikan/daging/ayam sehari, sedangkan porsi lauk nabati sebanyak 100-150 gram atau 4-6 potong tempe sehari. Tempe dapat diganti dengan tahu atau kacang-kacangan kering.

a) golongan sayuran

Sayuran merupakan sumber vitamin A, vitamin C, asam folat, magnesium, kalium dan serat, serta tidak mengandung lemak dan kolesterol. Sayuran daun berwarna hijau, dan sayuran berwarna jingga/oranye seperti wartel dan tomat mengandung lebih banyak provitamin A berupa beta-karoten daripada sayuran tidak berwarna. Sayuran berwarna hijau disamping itu kaya akan kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C. Contoh sayuran berwarna hijau adalah bayam, kangkung, daun singkong, daun kacang, daun katuk, dan daun cangan seperti buncis dan kacang panjang kaya akan vitamin. porsi sayuran dalam bentuk tercampur yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 150-200 gram atau 1½-2 mangkok sehari (Hariyani 2012)..

b) Golongan Buah

Buah berwarna kuning seperti mangga, pepaya dan pisang raja kaya akan provitamin A, sedangkan buah-buahan yang kecut seperti jeruk, gandum, jambu biji, dan rambutan kaya akan vitamin C. karena buah-buahan pada umumnya dimakan dalam bentuk mentah, buah-buahan merupakan sumber utama vitamin C. secara keseluruhan buah-buahan merupakan sumber vitamin A, vitamin C, kalium, dan serat, buah-buahan tidak mengandung natrium, lemak (kecuali alpukat), dan kolesterol. Porsi buah yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 200-300 gram atau 2-3 potong sehari berupa pepaya atau buah lain.

1) Susu dan hasil olah susu

Susu merupakan makan alami yang hamper sempurna. Sebagiaian besar zat gizi esensial ada dalam susu, yaitu protein bernilai biologi tinggi, kalsium, fosfor, vitamin A, dan tiamin (vitamin B1). Susu merupakan sumber kalsium paling baik, karena disamping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu membantu absorpsi susu di dalam saluran cerna. Akan tetapi susu sedikit sekali mengandung zat besi dan vitamin C (Hariyani 2012).

Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dianjurkan paling kurang minum satu gelas susu sehari, atau hasil olahnya berupa yogurt, yakult, dan keju dalam jumlah yang ekivalens susu diperoleh dalam bentuk segar, bubuk, dan susu kental. Porsi susu yang dianjurkan untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui adalah sebanyak 1-2 gelas sehari.

2) Konsep Dasar Gizi Seimbang

Dalam PUGS susunan merupakan makanan yang dianjurkan adalah yang menjamin keseimbangan zat-zat gizi. Hal ini dapat dicapai dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan tiap hari. Tiap makanan dapat saling melengkapi dalam zat-zat gizi yang dikandungnya. Pengelompokan bahan makanan sederhana, yaitu didasarkan pada tiga fungsi utama zat-zat gizi, yaitu sebagai:

- a) sumber energi/tenaga
- b) sumber zat pembangun
- c) sumber zat pengatur

untuk mencapai gizi seimbang hendaknya susunan makanan sehari terdiri dari campuran ketiga kelompok bahan makanan tersebut.

Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon (C), Hidrogen (H) dan oksigen (O), dan pada umumnya unsur Hidrogen (H) dan Oksigen (O) dalam komposisi menghasilkan H₂O. Didalam tubuh karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (Sediaoetama 2010).

Klasifikasi karbohidrat yang terpenting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Sesungguhnya semua jenis karbohidrat terdiri atas karbohidrat sederhana atau gula sederhana, karbohidrat kompleks mempunyai lebih atau dua unit gula sederhana didalam satu molekul

3. Fungsi karbohidrat dalam tubuh

a. Sumber energi

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk diseluruh dunia, karena banyak di dapat di dalam alam dan harganya relatif murah.

b. Melindungi protein

Akar tidak dibakar sebagai menghasilkan energi, kebutuhan akan energi merupakan prioritas pertama, bila berkarbohidrat yang

dikonsumsi tidak mencukupi untuk kebutuhan enersi tubuh dan jika tidak cukup terdapat lemak di dalam makanan atau cadangan lemak yang disimpan di dalam tubuh, maka protein akan menggantikan fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi.

c. Mengatur metabolisme lemak

Karbohidrat mencegah terjadinya oksida lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat,aseton, dan asam beta-hidroksi-butirat.

d. Membantu pengeluaran feses

Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan member bentuk pada feses.

e. Di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksin tertentu.

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena yang paling hubungannya dengan proses-proses kehidupan, protein terbentuk dari unsur-unsur organic yang hampir sama dengan karbohidrat dan lemak yaitu terdiri dari unsur karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), akan tetapi ditambah dengan unsure yang lain yaitu nitrogen (N).

4. Struktur protein

- a. Struktur protein dapat dilihat sebagai hirarki, yaitu berupa struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuartener.

1) Struktur primer

Susunan linier asam amino dalam protein merupakan susunan primer. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein, dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier.

2) Struktur sekunder

Struktur sekunder adalah struktur protein yang merupakan polipeptida terlipat-lipat, berbentuk tiga dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan.

3) Struktur tersier

Bentuk penyusunan bagian terbesar rantai cabang disebut struktur tersier, yaitu susunan dari struktur sekunder yang satu dengan struktur yang lain.

4) Struktur kuartener

Struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier.

Lemak adalah sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hydrogen (H), dan oksigen (O), yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu (zat pelarut lemak), seperti petroleum benzene, ether (Syarfaini 2012).

Klasifikasi lemak

a) lemak netral (triglycerida)

Sebagian besar lemak dan minyak di alam terdiri atas 98-99% triglyceride. Triglyceride adalah suatu ester gliserol. Triglycerida terbentuk dari tiga asam lemak dan gliserol. Apabila terdapat satu asam lemak dalam ikatan dengan gliserol maka dinamakan monogliserida. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi. Lemak tersimpan didalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta pelepasannya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen-komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan energi, karbondioksida (CO₂), dan air (H₂O).

b) lemak non gliserida

Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol. Jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul dengan non gliserol. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sphingomyelin, steroid, kolestrol dan malam.

Didalam surah Al-Baqarah ayat 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

5. Status Gizi Balita

Keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan menggunakan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik dan lebih. Status gizi juga merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam tubuh variabel tertentu, atau perwujudan dari nutrire dalam bentuk variabel tertentu (Almatrsier, 2010).

a) Pertumbuhan balita dan akan usia sekolah

Balita atau anak yang dikenal dengan anak prasekolah adalah yang berusia 1-5 tahun, sedangkan usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun, selama usia sekolah, pertumbuhan terjadi walau tidak dengan kecepatan pertumbuhan sebelumnya pada masa bayi atau remaja nantinya. Rata-rata tiap tahun seorang anak pada usia sekolah adalah berkisar 3-3,5 kg untuk berat dan sekitar 6cm untuk ketinggian (behman 2007). Anak-anak pada periode ini tetap mempunyai dorongan pertumbuhan yang biasanya bertepatan

dengan periode peningkatan masukan dan nafsu makan. Ketika memasuki periode pertumbuhan yang lebih lambat, masukan dan nafsu makan seorang anak juga akan berkurang. Adanya variasi dalam hal nafsu makan dan asupan makanan pada anak balita harus dipahami oleh para orang tua agar dapat memberikan respon yang baik terhadap setiap kondisi yang terjadi pada anak.

b) Perkembangan Balita

1. Perkembangan fisiologik

Kekuatan otot, koordinasi motorik dan stamina anak balita dan anak usia sekolah meningkat secara progresif. Anak-anak mampu melakukan gerakan-gerakan dengan pola yang lebih kompleks, sehingga memacu mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti olahraga, gimnastik, dan aktivitas lainnya. Selama awal periode balita dan anak usia sekolah, presentasi lemak tubuh mencapai minimum 16% pada perempuan dan 13% pada laki-laki. Presentase lemak tubuh kemudian meningkat sebagai persiapan menghadapi dorongan pertumbuhan remaja. Peningkatan presentase lemak tubuh di masa pubertas terjadi lebih dini dan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki (19% pada perempuan dan 14% pada laki-laki). Memasuki pertengahan pada usia sekolah, laki-laki memiliki masa tubuh yang lebih tipis per sentimeter per tinggi badan dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan komposisi tubuh ini akan lebih tampak nyata pada masa

remaja. Peningkatan lemak tubuh pada balita dan anak sekolah merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Pertumbuhan ini pada umumnya tidak permanen; dan para orang tua juga harus berhati-hati agar tidak terlalu mempermasalahkan ukuran dan berat badan. Anak laki-laki pada usia ini mulai menaruh perhatian terhadap perkembangan otot tetapi sebenarnya peningkatan masa otot akan mulai terjadi ketika memasuki usia pertengahan remaja.

b. Perkembangan kognitif

Pencapaian perkembangan yang paling pokok pada pertengahan balita dan anak sekolah adalah kemampuan diri, pengetahuan tentang siapa yang akan dikerjakan dan kemampuan untuk melakukannya. Selama usia balita dan usia anak sekolah, anak-anak bergerak dari periode perkembangan praoperasional ke arah satu tindakan nyata. Tingkatan ini ditandai dengan kemampuan untuk mengarah kepada berbagai aspek situasi pada saat yang bersamaan; mampu memiliki alasan yang lebih rasional dalam hal sebab-akibat; mampu menggolongkan atau menggolongkan kembali dan menggeneralisasikan, serta mengurangi egosentrisme, yang memungkinkan seorang anak melihat pandangan orang lain

Karakteristik kognitif yang dimiliki balita dan anak usia sekolah sebagai berikut:

1. Anak sudah mampu member perhatian pada beberapa aspek.

2. Anak mulai memiliki alasan rasional dan sistematis.

3. Anak mulai mengembangkan rasa percaya diri sendiri, semakin independen dan mempelajari perannya dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.

4. Egosentris anak mulai berkurang, anak mulai dapat menerima pendapat orang lain.

5. Terkait dengan pola makan, anak mulai menyadari pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan, meyakini pentingnya waktu makan, serta mulai timbul konflik dalam pemilihan waktu makan.

6. Pengaruh lingkungan terhadap anak mulai meningkat.

7. Hubungan peer meningkat sangat penting, dan anak mulai memisahkan diri dari keluarganya sendiri dengan menghabiskan waktu malamnya di rumah teman atau relasinya.

c. Perilaku makan balita

Perilaku dan kebiasaan orang tua dalam hal makanan yang dipengaruhi oleh faktor budaya akan mempengaruhi sikap suka dan tidak suka seorang anak terhadap makanan. Orang tua dan saudara kandung yang lebih tua memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku anak yang berhubungan dengan makanan dan pilihan makanan selama usia sekolah. Orang tua masih tetap memegang peranan penting sebagai model atau contoh bagi anak-anaknya dalam hal perilaku makan yang sehat. Orang tua bertanggung jawab terhadap

masalah makanan di rumah, jenis-jenis makanan apa yang tersedia dan kapan makanan tersebut disajikan juga harus memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang penting kepada anak-anak sehingga mereka mampu menentukan makanan yang sehat disaat mereka jauh dari rumah.

Satu keluarga sebaiknya berusaha untuk makan bersama. Makan bersama dalam satu keluarga dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menjalin komunikasi antara anggota keluarga, ketika diwaktu lain mereka disibukkan oleh aktivitas luar. Sebuah studi yang dilakukan terhadap sekelompok anak usia 9-14 tahun menunjukkan terdapat hubungan yang positif diantara kegiatan makan malam bersama dalam keluarga dengan kualitas diet anak secara menyeluruh. Presentase jumlah anak yang makan malam bersama keluarga menurun dengan bertambahnya umur anak dengan presentase tertinggi pada kelompok anak berusia 9 tahun.

Pola makan anak juga dipengaruhi oleh media massa dan lingkungan (guru,teman sebaya). Anak-anak ingi mencoba makanan-makanan yang diiklankan di media televise. Pengaruh teman sebaya juga menjadi lebih besar kerana anak usia sekolah lebih banyak mennghabiskan waktu dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. Peningkatan dengan pengaruh teman sebaya berdampak terhadap perilaku perihal pola dan jenis makanan pilihan mereka. Anak secara tiba-tiba meminta suatu jenis makanan baru atau

menolak makanan pilihan mereka dahulu, akibat rekomendasi dari teman-teman sebayanya. Pengaruh guru juga besar terhadap sikap seorang anak terhadap jenis pola makan. Apa yang dipelajari didalam kelas tentang kesehatan dan makanan bergizi harus ditunjang dengan makanan yang tersedia do kafetaria sekolah.

d. Zat Gizi Balita

Kebutuhan masing-masing zat gizi untuk kelompok balita dan anak dapat dilihat pada anangka kecukupan Gizi yang dianjurkan. Zat gizi esensial, kebutuhan cairan juga harus diperhatikan karena penting bagi anak untuk mencegah dehidrasi selama bergerak dan berolah-raga, karena anak-anak berisiko stres akibat dehidrasi dan panas. Anak-anak berkeringat dan semakin kepanasan saat bergerak. Beberapa jenis olahraga seperti sepak bola dan hoki, membutuhkan pertahanan khusus, yang mencegah tubuh lemas. Anak-anak yang melakukan jenis olahraga tersebut harus minum air sebelum, selama dan sesudah latihan, dan anak-anak bisa tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan air. Sebaiknya tidak memberikan softdrinks dan jus buah yang tidak diencerkan kepada anak-anak karena pemberian karbohidrat tinggi dapat menyebabkan kram perut, mual dan diare.

e. Beberapa Masalah Gizi dan Kesehatan Pada Balita

Permasalahan gizi pada balita dan anak merupakan masalah ganda, yaitu masih ditemukannya masalah gizi kurang dan ditambah

dengan ditemukannya masalah kelebihan zat gizi, seperti energi, lemak, dan garam. Asupan gizi balita dan anak sekolah dasar di beberapa wilayah Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini terungkap dari hasil penelitian terhadap 440 anak berusia 5-6 tahun di Jakarta dan Solo. Sepanjang masa kanak-kanak, beberapa anak masih mengalami anemia karena defisiensi zat besi. Dan karies pada gigi, terutama pada anak-anak yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula. Berikut ini uraikan beberapa masalah gizi dan upaya pencegahannya.

6. Defisiensi Zat Gizi Besi

Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia karena defisiensi zat gizi besi yang ditandai dengan kadar hemoglobin dalam darah di bawah normal. Kategori anemia pada anak usia 5-8 tahun adalah jika kadar hemoglobin (Hb) $<11,5\text{g/dl}$ hematokrit $<34,5\%$, sedangkan untuk anak usia 8-12 tahun dikatakan anemia jika nilai Hb $<11,9\text{ g/dl}$ atau hematokrit $< 35,4\%$. Survei kesehatan rumah tangga tahun 2009 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada anak usia sekolah dan remaja sekitar 26,5%. Data menurut Depkes RI tahun 2009 menunjukkan bahwa prevalensi anemia gizi besi pada kelompok usia balita adalah 47,0%.

a) Hal yang dapat menyebabkan anak mengalami anemia zat besi diantaranya adalah:

1. Anak-anak diberikan susu sapi dalam jumlah berlebih sehingga membuat anak kekenyangan dan tidak

mengonsumsi makanan lain. Hal ini menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan sumber zat besi yang rendah, padahal susu sapi memiliki kandungan zat besi yang tinggi, juga menghambat penyerapan zat besi.

2. Anak-anak menderita penyakit saluran pencernaan yang menyebabkan terganggunya penyerapan zat besi.
3. Anak-anak diberiakan diet vegetarian, sehingga anak hanya mendapatkan sumber zat besi dari nabati yang memiliki nilai cerna zat besi lebih rendah dibandingkan hewani.

b. Karies Gigi

Satu dari lima anak usia 2-4 tahun mengalami kerusakan pada gigi susu maupun gigi tetap, dan hampir 1 diantara 2 anak berusia antara 6-8 tahun mengalami kerusakan pada gigi primernya. Makanan “sticky” (lengket) yang berisi karbohidrat seperti kismis dan permen karet, merupakan penyebab karies yang kuat. Lemak dan protein dapat merupakan pelindung terhadap lapisan enamel. Resiko terjadinya karies gigi dapat diperkecil dengan memilih makanan ringan yang merupakan kombinasi antara karbohidrat, protein dan lemak. Kumur-kumur sesudah makan, atau lebih baik lagi menggosok gigi secara teratur juga menurunkan kemungkinan terjadinya lubang atau karies gigi.

c. Balita dan Anak Sulit Makan

Sulit makan merupakan ciri khas anak prasekolah dan juga anak sekolah, kerana pertumbuhan mereka lebih lambat dibandingkan pada saat mereka bayi. Anak usia 3 tahun tidak bisa diharapkan makan sebanyak saat mereka bayi ataupun dipaksa mengikuti pola makan orang dewasa. Nafsu makan anak bergantung juga dengan aktivitas dan kondisi kesehatan mereka. Hal-hal ini yang menjadi penyebab anak sulit makan diantaranya adalah:

- 1) Anak mengalami infeksi, seperti tuberculosis menahun, influenza, bronchitis, disentri, campak, atau penyakit yang disebabkan oleh virus.
- 2) Anak terlalu aktif sehingga mengalami kelelahan, jika hal ini terjadi jangan memaksa anak untuk makan, biarkan anak beristirahat terlebih dahulu.
- 3) Anak telah merasa kenyang tetapi tetap dipaksa untuk menghabiskan porsi makannya. Jika ini terus dibiarkan terjadi maka anak menganggap musuh terhadap makanan.
- 4) waktu makan yang tidak menyenangkan.

Anak sedang terganggu secara emosional, mencari perhatian, atau terlalu mendapat perhatian berlebihan.

d. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sulit makan pada anak prasekolah


- 1) makanan dihidangkan dengan porsi yang tidak terlalu banyak.

- 2) Tidak memaksa anak untuk mencoba makanan baru jika anak tidak menghendakinya. Jenis makan baru hendaknya
- 3) dihidangkan dengan makanan yang disukai anak.
- 3) Hidangkan makanan yang bervariasi baik bentuk, rasa dan cara penyajian. Pilih alat-alat makan yang disukai anak.
- 4) Tidak memarahi atau member hukuman ketika anak tidak menghabiskan makanan, dan berikan penghargaan/pujian ketika anak berhasil makan dengan baik.
- 5) memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar makan sendiri sesegera mungkin.
- 6) mulai anak usia 2 tahun anak sudah mulai dibiasakan bersama-sama keluarga.

KERANGKA KONSEP

1. Kerangka konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah di uraikan maka untuk meneliti hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dengan status gizi balita di dapatkan kerangka konsep sebagai berikut :



Keterangan :

: Variabel Independen

: Variabel Dependen

2. Defenisi Operasional dan kriteria Objektif

1. Variabel independen (variabel bebas)

Yaitu variabel yang nilainya menentukan variabel lain, suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel dependen. Variabel bebas biasanya dimanipulasi diamati dan di ukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain (nursalam 2012), variabel independen pada

penelitian ini adalah pengetahuan ibu adalah tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang.

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah dan ini setelah melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Kriteria objektif pengetahuan menurut Atikunto (2010)

- a. Baik apabila hasil jawaban benarnya 76-100%
- b. Cukup apabila hasil jawaban benarnya 56-75%
- c. Kurang apabila hasil jawaban benarnya dibawah 56%

2. Variabel dependen (variabel terikat)

Yaitu variabel yang nilainya yang di tentukan oleh variabel lain, variabel respon akan muncul, sebagai akibat dari manipulasi variabel-variabel lain (Nursalam 2012), variabel dependen pada penelitian ini adalah status gizi balita.

Status gizi balita adalah keadaan gizi yang terdapat pada seorang balita dan ditentukan melalui pengukuran secara antropometri yang meliputi BB dan TB.

Criteria objektif status gizi balita menurut yayah K .Husain (1997) yaitu:

- b. Gizi baik apabila hasil $(TB/BB^2) \times 100 = >90\%$
- c. Gizi cukup apabila hasil $(TB/BB^2) \times 100 = 75-90\%$
- d. Gizi kurang apabila hasil $(TB/BB^2) \times 100 = <75\%$

Variable yang di teliti	Definisi Opresional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
1.tingkat pengatahuan	Segala sesuatu yang diketahui oleh ibu balita tentang gizi seimbang, seperti: a.pengertian b.faktor-faktor pendukung gizi seimbang pada balita c.ciri-ciri balita dengan gizi seimbang dan kurang gizi d.penanganan balita	Kuesione r	Pengatahu an baik Pengetahu an cukup pengetahu an kurang	Ordinal
2.Status gizi berimbang	dengan kurang gizi status gizi adalah keadaan gizi yang terdapat pada balita	Antropo metri	Gizi baik Gizi cukup Gizi kurang Gizi	Ordinal

HIPOTESA

Hipotesa adalah jawaban atau kesimpulan sementara dari hasil yang diinginkan setelah melakukan penelitian. Jenis- jenis Hipotesa menurut Riduwan (2005) terbagi atas dua yaitu :

- 1). H_A : Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. H_a diterima apabila nilai $P \leq d$ (d = tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05)
- 2). H_o : Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. H_o diterima apabila nilai $P \leq d$ (d = tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional yang merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada suatu saat. Dalam penelitian ini, variabel independen (pengetahuan ibu tentang gizi berimbang) dependen (status gizi balita) di kumpul dalam waktu bersamaan dengan menggunakan kuesioner dan observasi.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa bulogading kec. Bontonompo kab. Gowa pada tahun 2015.

C. Populasi dan Sampel, Sampling

1. populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Notoatmodjo 2011) pada penelitian ini populasinya adalah seluruh ibuyang mempunyai balita di wilaya bulogading dengan jumlah 156 orang.
2. sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang di teliti yang di anggap mewakili populasi (Notoatmodjo 2011).

a. Besaran Sampel

Besaran sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan rumus penentuan sampel Notoatmodjo (2012) :

$$n = \frac{N (\sum N p_i (1-p_i))}{N^2 D + \sum N p_i (1-p_i)}$$

Keterangan :

n = besar sampel

N = besar populasi

d = tingkat kepercayaan atau ketepatan yang di inginkan/ nilai presisi 95% dengan tingkat kesalahan 5% sehingga $d = 0,05$.

Jadi jika dimasukkan dalam rumus yaitu :

$$n = \frac{156 (\sum 156 \times 0,5 (1-0,5))}{15,4 + 39} \quad n = \frac{156 (78 \times 0,5)}{15,4 + 39}$$

n= 112

Jadi besaran sampel pada penelitian ini berjumlah 112.

b. Teknik Pengambilan sampel

Sampel dari populasi di wilayah desa bulogading dalam hal ini diambil dengan tehnik purposive sampling. Purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan criteria tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan criteria inklusi dan eksklusi

1). Kriteria inklusi adalah criteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel Notoatmodjo (2012). Criteria inklusi pada penelitian ini yaitu:

- a). ibu yang mempunyai balita di desa bulogading.
- b). ibu balita yang bersedia menjadi responden untuk diteliti dengan caramenandatangani lembar persetujuan.

2). Criteria eksklusi adalah cirri-ciri anggota populasi yang tidak dapat di jadikan sampel Notoatmodjo (2012). Criteria pada penelitian ini yaitu:

- a). ibu balita yang tidak dapat berkomunikasi.
- b). ibu balita yang sedang beraktivitas atau bekerja dan tidak bisa di ganggu.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari instansi tempat penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di desa bulogading kec.Bontonompo kab.Gowa.

E. Sebelum melaksanakan analisa data beberapa tahapan harus dilakukan terlebih dahulu guna mendapatkan data yang valid sehingga saat menganalisa data tidak mendapat kendala.

a. Prasyarat analisis

1. Uji Normalitas

Menguji hipotesis dengan statistic parametris (t-test untuk satu sampel, korelasi dan regresi, dan analisi varian) mensyaratkan data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Sebaran data yang normal adalah sabaran data variabel yang dianalisis adalah simetris sehingga luas di bawah lengkungan kurve normal rata-rata ke kanan dan ke kiri masing-masing 50%.

2. Uji linearitas dan kebarartian

UJI linearitas dan kebarartian diperlukan sebelum analisis regresi.

b. Analisa Data

1) Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel baik variabel independen maupun variabel dependen. Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti disertai dengan penjelasan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan

P = Persentasi kasus

f = Frekuensi variabel penelitian

n = Jumlah sampel (Notoatmodjo, 2010)

2) Analisis bivariat

Uji statistik yang di gunakan adalah *Chi-Square* dengan menggunakan komputer program SPSS dan Microsoft Excel.

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variable independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik yaitu menggunakan rumus *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan (α) = 0,05.

Rumus Chi-Square yang digunakan adalah:

$$\chi^2_{ij} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

χ^2 = Chi-square

O = nilai observasi

E = nilai yang diharapkan

Σ = jumlah data

i = baris

j = kolom

Penilaian :

1) Apabila $\chi^2_{\text{statistik}} > \chi^2_{\text{kritis}}$, maka H_0 ditolak atau H_a

diterima, artinya ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Apabila $\chi^2_{\text{statistik}} \leq \chi^2_{\text{kritis}}$, maka H_0 diterima dan H_a

ditolak, artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

F. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

1. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Langkah-langkah pengolahan data menurut Notoatmodjo (2012), adalah sebagai berikut :

a. *Editing* (Penyunting Data)

Hasil angket atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Secara umum *editing* adalah kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner.

b. *Coding*

Coding adalah proses yang dilakukan setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pemberian kode (*coding*), yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi dua angka atau bilangan. *Coding* sangat berguna untuk memasukkannya data (*data entry*).

c. *Data entry*

Data entry yaitu mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode sesuai jawaban masing-masing pertanyaan. *Data entry* dilakukan setelah peneliti melakukan *coding* (membuat kode).

d. Pembersihan data (*data cleaning*)

Pembersihan data dilakukan apabila semua data dari sumber atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan saat melakukan pemberian kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.

e. Tabulasi

Tabulasi yaitu membuat table-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti.

e. Teknik Analisis

Teknik Analisis merupakan statistika yang membahas cara - cara meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan suatu data dengan tujuan agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna.

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *univariat* yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel. Kemudian analisis data berikutnya adalah *analisis bivariat* yaitu menganalisis hubungan variable-variabel yang akan diteliti. Uji yang dilakukan dalam hal ini adalah *Chi Square* untuk melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan kadar glukosa urin ibu hamil (Notoatmodjo, 2012).

F. ETIKA PENELITIAN

Menurut Hidayat (2010), etika dalam penelitian ini yang harus diperhatikan antar lain adalah sebagai berikut :

1. *Informed consent*

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan *Informed consent* diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikn lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subyek mengerti maksud dan tujuan penelti, mengetahui dampaknya. Apabila responden bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut.

2. *Anonimity* (Tanpa Nama)

Etika merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subyek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Confidentiality merupakan bagian dari etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah desa bulogading kec. Bontonompo Kab. Gowa, mulai tanggal 3 oktober sampai tanggal 30 november, dimana sampel diperoleh sejumlah 112 balita di 3 dusun. Metode penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan rancangan cross sectional. Ini merupakan suatu rancangan yang mengkaji dinamika hubungan independen (tingkat pengetahuan) dengan variable dependen (status gizi) yang diambil dalam waktu bersamaan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling selama 18 kali di 3 posyandu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung melalui kuesioner terhadap ibu balita, sedangkan untuk mengetahui status gizi balita dilakukan dengan cara mengukur berat badan dengan tinggi badan kemudian menghitung Z-skornya yang di bandingkan dengan standar deviasi menurut WHO-NCHS.

1. Analisa univariat

a. Pendidikan responden

Tabel 4.1

Distribusi Responden Menurut Kelompok Pendidikan di Wilayah Desa
Bulogading Kec. Bontonompo Kab. Gowa

Pendidikan Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
1. SD	78	69.64
2. SMP	12	10.75
3. SMA	22	19.64
Total	112	100.00

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 112 responden terdapat 78 responden (69.64%) yang memiliki pendidikan terakhir SD, dan SMP terdapat 12 responden (10.75%) sedangkan SMA terdapat 22 responden (19.64%) sehingga dapat disimpulkan bahwa riwayat pendidikan responden pada penelitian ini adalah mayoritas SD.

b. Tingkat pengetahuan responden

Tabel 4.2

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	1	0.89
Cukup	16	14.28
Kurang	95	84.82
Total	112	100.00

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 112 responden terdapat 1 responden (0.89%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, terdapat 16 responden (14.28%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan terdapat 95 responden (84.82%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden pada penelitian ini adalah kurang yaitu 95 responden (84.82%)

c. Status gizi balita

Tabel 4.4

Status Gizi Balita	Frekuensi	Persentase
Baik	76	67.85
Cukup	35	31.25
Kurang	1	0.89
Total	112	100.00

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 112 responden terdapat 79 responden (67.85%) yang memiliki balita yang berstatus gizi baik dan 35 responden (31.25%) memiliki balita yang berstatus gizi cukup sedangkan 1 responden (0.89%) yang memiliki balita berstatus gizi kurang. Sehingga dapat di simpulkan bahwa status gizi balita adalah baik yaitu sebanyak 76 balita (67.85%)

2. Analisa Bivariat

a. Tingkat pengetahuan responden

Tabel 4.2

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	1	0.89
Cukup	16	14.28
Kurang	95	84.82
Total	112	100.00

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 112 responden terdapat 1 responden (0.89%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, terdapat 16 responden (14.28%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan terdapat 95 responden (84.82%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden pada penelitian ini adalah kurang yaitu 95 responden (84.82%)

b. Status gizi balita

Tabel 4.4

Status Gizi Balita	Frekuensi	Persentase
Baik	76	67.85
Cukup	35	31.25
Kurang	1	0.89
Total	112	100.00

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 112 responden terdapat 79 responden (67.85%) yang memiliki balita yang berstatus gizi baik dan 35 responden (31.25%) memiliki balita yang berstatus gizi cukup sedangkan 1 responden (0.89%) yang memiliki balita berstatus gizi kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status gizi balita adalah baik yaitu sebanyak 76 balita (67.85%)

a. Hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi balita

Tingkat Pengetahuan	StatusGizi			Total
	Kurang %	Cukup %	Baik %	%
Kurang	1	28	66	95
Cukup	0	6	10	16
Baik	0	1	0	1
Total	1	35	76	112

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.770 ^a	4	0.597
Likelihood Ratio	3.029	4	0.553
Linear-by-Linear Association	1,022	4	0.312
N of Valid Cases	112	1	

B

Berdasarkan tabel ini bahwa tingkat pengetahuan kurang yaitu 95 responden yang memiliki status gizi balita kurang 1, cukup 28, dan baik 66. Tingkat pengetahuan cukup yaitu 16 responden yang memiliki status gizi balita kurang 0, cukup 6, dan baik 10. Sedangkan tingkat pengetahuan baik yaitu 1 responden yang memiliki status gizi kurang 0, cukup 1, dan baik 0. Kemudian, Setelah menganalisa hasil tabel pengetahuan dan status gizi diatas dengan menggunakan uji Korelasi *Chi Square*, ternyata diperoleh hasil bahwa nilai $P = 0.597 > d = 0,05$ dengan $n = 112$.

B. Pembahasan

a. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah dan ini setelah melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalu panca indera manusia. Yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh malalui mata dan telinga.

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan

membatasi lingkup pandangannya. Dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yakni:

- 1) Tahu (*Know*), Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, 'tahu' ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.
- 2) Memahami (*Comprehension*), Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
- 3) Aplikasi (*Application*), Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya dapat menggunakan

rumus statistik dalam perhitungan dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah (*problem solving cycle*) dalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan.

- 4) Analisis (*Analysis*) yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
- 5) Sintesis (*Synthesis*), Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.
- 6) Evaluasi (*Evaluation*), Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo (2007)).

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan mulai upaya pengajaran dan pelatihan orang tua yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendidik anak-anaknya secara baik, sedangkan orang tua yang berpendidikan rendah kurang mampu mendidik dan mengasuh anak-anaknya, guna pencapaian status kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun itu semua tidak lepas dari tanggung jawab orang tua dalam memberikan segala yang baik baik bagi anak-anaknya, terutama kesehatan yang optimal. Sebagaimana Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Depag RI, 2005).

Ibu merupakan pendidik pertama dalam keluarga, untuk itu ibunperlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan ibu di samping merupakan modal utama untuk menunjang perekonomian rumah tangga juga berperan dalam pola penyusunan makanan untuk rumah tangga.

Salah satu penyebab munculnya gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kurangnya kemampuan untuk menerapkan informasi gizi dalam kehidupan sehari-hari (soehardjo, 2003). Pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam bahan makanan, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang harganya tidak terlalu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi (Sjahmien Moehdji,2009).

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dari 112 orang responden yang ibunya memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 22 (19.64%) dan ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 12 (10.75%) dan ibu yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 78 (69.64%).

c. Status Gizi

Gizi adalah Ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya (penghasil energi, pembangun, memelihara dan mengatur proses kehidupan).(Sunita Al Matsier, 2005).

Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu ghidza yang berarti makanan. Di satu sisi ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di sisi lain berkaitan dengan tubuh manusia. Sedangkan pengertian makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi / unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh dan berguna bila dimasukkan dalam tubuh. (Sunita AlMatsier, 2005).

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang di tentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. (Suyatno, 2009:5).

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diet (Beck, 2009: 1).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi

Faktor *External*

Faktor eksternal yang mempengaruhi status gizi antara lain:

1. Pendapatan

Masalah gizi karena kemiskinan indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga, yang hubungannya dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut (Santoso, 2010).

2. Pendidikan

Pendidikan gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua atau masyarakat untuk mewujudkan dengan status gizi yang baik (Suliha, 2010).

3. Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga (Suliha 2010).

Faktor *Internal*

Faktor *Internal* yang mempengaruhi status gizi antara lain :

1. Usia

Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi anak balita (Suliha 2010).

2. Kondisi Fisik

Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan dan yang lanjut usia, semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk, adalah sangat rawan, karena pada periode hidup ini kebutuhan zat gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat (Suliha 2010).

3. Infeksi

Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan (Suliha 2010).

Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi secara langsung menurut Supriasa (2001) dapat dilakukan dengan:

a. *Antropometri*

Antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Sedangkan *antropometri* gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dan tingkat umur dan tingkat gizi. *Antropometri* secara umum digunakan untuk melihat keseimbangan asupan protein dan energi.

b. Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi berdasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi, seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

c. Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

d. Biofisik

Penilaian status gizi secara *biofisik* adalah metode penentuan status gizi dengan melibatkan kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan.

Penilaian status gizi secara tidak langsung menurut Supariasa, IDN (2005) dapat dilakukan dengan:

1. Survey Konsumsi Makanan

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat dan gizi yang dikonsumsi. Kesalahan dalam *survey* makanan bisa disebabkan oleh perkiraan yang tidak tepat dalam menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi balita, kecenderungan untuk mengurangi makanan yang banyak dikonsumsi dan menambah makanan yang sedikit dikonsumsi (*The Flat Slope Syndrome*), membesar-besarkan konsumsi makanan yang bernilai sosial tinggi, keinginan melaporkan konsumsi vitamin dan mineral tambahan kesalahan dalam mencatat (*food record*).

- 2) Statistik Vital

Yaitu dengan menganalisis data beberapa statistik kesebatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian karena penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

- 3) Faktor Ekologi

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi antara beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari 112 responden ibu yang memiliki anak balita yang status gizinya baik sebanyak 76 (67.85%) dan ibu yang memiliki anak balita yang berstatus gizi cukup sebanyak 35 (31.25%) dan ibu yang memiliki balita yang berstatus gizi kurang sebanyak 1 (0.89).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai hubungan pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dengan status gizi balita di desa bulogading kec. Bontonompo kab. Gowa tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan ibu adalah kurang dengan jumlah 95 responden
- b. Status gizi balita pada penelitian ini adalah baik dengan jumlah 76 balita.
- c. Setelah dilakukan analisa menggunakan uji Korelasi *Chi Square*, ternyata diperoleh hasil bahwa nilai $P = .597 > d = 0,05$ dengan $n = 112$. Dengan demikian artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita.

B. IMPLIKASI

- a. Di harapkan kepada para ibu bahwa banyak berkomunikasi kepada warga agarawasannya semakin luas
- b. Di harapkan kepada para ibu bahwa makan makanan bergizi perlu bagi balita agar balita tetap sehat
- c. Di harapkan kepada para ibu bahwa mencari tahu tentang pola makan yang sehat di posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Quran dan terjemahannya. Kementerian Agama RI. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2005.
- Almatsier, Sunita. Prinsip Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Arinotang, Irianto. “Model Multilevel Pertumbuhan Anak Usia 0-24 Bulan dan Variabel Yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* (2012): h. 10-141.
- Beck, M.E. 2009. Ilmu Gizi dan Diet, Hubungannya dengan Penyakit-Penyakit untuk Perawat & Dokter. Yogyakarta : Andi.
- Dwi Astuti Fardhiansih dan Sulistyawati Fitria. “ Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Prasekolah dan Sekolah Dasar Di Kecamatan Godean”. Yogyakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 2013.
- Hariani Lilliek, Eko Budi Minarno. Gizi dan Kesehatan” Perspektif Al-Qur’an dan Sains. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Ibrahim Irviani Anwar. Gizi Dalam Daur Kehidupan Manusia. Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012
- Kristianti, Devi. Dkk., Hubungan Antara Karakteristik Pekerjaan Ibu Dengan Status Gizi Anak Usia 4 – 6 tahun Di TK Salomo Pontianak. (Pontianak, 2011).h 11.
- Kusharto, Suhardjo. Prinsip-prinsip ilmu gizi. Yogyakarta: 2013.
- Nurhidayati elys eka. ”Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Gizi Seimbang Tentang KEP (KURANG ENERGI PROTEIN) Pada Balita Di Puskesmas Banjarejo Kota Madiun. Keperawatan akper karanganyar, 2011.
- Nainggolan, Julita. “Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Gizi Ibu Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Indah Bandar Lampung”. *Skripsi*. Lampung : Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2010.
- Notoatmodjo soekidjo. Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi. Kampus Depok: 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: 2012.

Notoatmodjo Soekidjo. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta:2014.

Kholid Ahmad. Promosi Kesehatan. Semarang: 2012.

Rahmawati,Eva Selviana “Hubungan Antara Pengetahuan IbuTentang C....
Seimbang dengan Status Gizi Balita (1-5tahun) Di Desa Sumurgeneng
Wilaya Kerja Puskesmas Jenu-Tuban. Stikes NU Tuban, 2011.

Syarfaini.Dasar-dasar ilmu gizi.Makassar, universitasAlauddin.Press 2012.

Sediaoetama,Djaeni,Achmad. ilmu gizi. Jakarta, Dian rakyat, 2010.

Sulistyoningsih, Hariani. Gizi untuk Kesehatan Ibu dan Anak.Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2011.

Suliha, 2010. Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan, Penerbit Buku
Kedokteran. Jakarta: EGC

Suyatno. 2009. Survei Konsumsi Sebagai Indikator Status Gizi. Yogyakarta:
Universitas Diponegoro

Santoso, Singgih. 2010. Statistik Multivariat, Jakarta : PT Gramedia.



KUENSIONER TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI
SEIMBANG
DENGAN STATUS GIZI BALITA

1. Identitas responden

Nama ibu balita :
Jumlah balita :
Jenis kelamin balita :
Berat badan balita :
Tinggi badan balita :
Tanggal lahir/umur balita :
Alamat :

2. Petunjuk Soal

- a. Diisi sendiri oleh responden
- b. Hanya boleh memilih satu jawaban
- c. Jawablah pertanyaan ini dengan tanda (√) telah disediakan
- d. Jawaban benar-benar sesuai dengan yang saudara ketahui
- e. Jika ingin memperbaiki yang salah, gunakan (=) kemudian beri (√) yang telah di sediakan
- f. Mohan lembar data ini dikembalikan kepada peneliti setelah diisi lengkap

3. Soal Responden tentang pengetahuan gizi berimbang
SOAL

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1	Gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh		
2	Gizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh		
3	Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur, buah dan susu		
4	Pola makan yang sehat untuk balita adalah 3 kali dalam sehari		
5	Penyebab terjadinya gizi buruk adalah kurangnya makanan bergizi dan seimbang yang dikonsumsi balita		
6	Ciri-ciri balita yang terkena gizi buruk adalah rambut berwana merah, perut buncit, kulit keriput wajah seperti orang tua		
7	Balita harus dibawa setiap bulan secara rutin ke posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya		
8	Penyeluhan di posyandu penting untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pada balita		
9	Balita harus di imunisasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit		
10	Gizi buruk dapat menurunkan tingkat kecerdasan pada balita		

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
11	Gizi baik dapat di ukur dengan umur dan berat badan yang sesuai.		
12	Walaupun tinggi badan balita kurang tidak masalah yang penting berat badannya bertambah.		
13	Makanan tidak mempengaruhi status gizi seseorang.		
14	Makanan seimbang adalah makanan yang mengandung nasi, ikan atau daging-dagingan dan sayur-sayuran.		
15	Gizi yang baik bisa dilihat dari berat badan balita		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R