

**EVALUASI INTERAKSI OBAT SEBAGAI *DRUG RELATED PROBLEMS*
(*DRPs*) PADA PASIEN RAWAT INAP INFEKSI SALURAN PERNAFASAN
AKUT (ISPA) DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NURWAHIDAH AMIR
NIM. 70100112077

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahidah Amir
NIM : 70100112077
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 2 Maret 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Korban 40.000 NO.26 Makassar
Judul : Evaluasi Interaksi Obat Sebagai *Drug Related Problems (DRPs)* Pada Pasien Rawat Inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 23 November 2016

Penyusun,

Nurwahidah Amir

NIM. 70100112077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Interaksi Obat Sebagai Drug Related Problems (DRPs) Pada Pasien Rawat Inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar” yang disusun oleh Nurwahidah Amir, NIM: 70100112077, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 November 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Samata, 23 November 2016 M

24 Safar 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing I : Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt (.....)

Pembimbing II: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt (.....)

Penguji I : Hurria, S.Farm., M.Sc., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Azman Arsyad, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatu

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **MEMET AMIR** dan Ibunda **MASTURI** yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat saudaratercinta Muhammad NurTaufiq Amir, Ahmad Auliah Amir dan Masnaeni Amir serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih

sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.si., selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. NurHidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan (bidang akademik), Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Waki IDekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.pd., selaku Wakil Dekan (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberi banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si, Apt. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Hurria, S.Farm.,M.sc., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Azman Arsyad., M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada seluruh Dokter dan Staf Poliklinik Asy-Syifaa UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis,teman-teman seperjuangan “**ISOHIDRIS 2012**” kakak-kakak angkatan 2005-2011, dan adik-adik angkatan 2013-2015 Farmasi UIN Alauddin Makassar.
12. Kepada seluruh Dokter ,Staf dan Pegawai di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Satu dari banyak terima kasihku adalah karena kalian sempat hadir dan memberikan warna dalam hidupku serta selalu membuat penulis tersenyum, terima kasih atas do'a, semangat dan persaudaraan yang di bina selama ini. Semoga tidak akan pudar oleh jarak dan waktu.Serta semua pihak yang telah berjasa yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gowa, 23 November 2016
Penyusun

NURWAHIDAH AMIR
NIM. 70100112077



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Definisi Drug Related Problems.....	17
B. Infeksi Saluran Pernafasan Akut.....	26
C. Obat Infeksi Saluran Pernafasan.....	28
D. Bakteri.....	33
E. Morfologi Bakteri.....	34
F. Pusat Kesehatan Masyarakat.....	35
G. Rekam Medik.....	42
H. Tinjauan Islam mengenai riset dan pengobatan.....	44

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	48
	B. Lokasi Penelitian	48
	C. Pendekatan Penelitian	48
	D. Populasi dan Sampel	48
	E. Kriteria Subjek	49
	F. Metode Pengumpulan Data	49
	G. Variabel Penelitian.....	50
	H. Penyiapan Sampel.....	50
	I. Instrumen Penelitian	52
	J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	K. Hasil Penelitian	56
	L. Pembahasan.....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Hasil SPSS 20.0.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Nurwahidah Amir
NIM : 70100112077
Judul : Evaluasi Interaksi Obat Sebagai *Drug Related Problem (DRP's)* Pada Pasien Rawat Inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Negara sedang berkembang merupakan penyebab kematian tersering. *Drug Related Problems (DRPs)* merupakan kejadian yang tak diharapkan, berupa pengalaman pasien yang melibatkan terapi obat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui presentase kejadian dari masing-masing DRPs yang meliputi obat salah, ketidaktepatan dosis yaitu dosis kurang dan dosis lebih, serta potensial interaksi obat dalam terapi pengobatan infeksi saluran pernafasan akut pada pasien rawat inap puskesmas jumpandang baru Makassar tahun 2015.

Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif dan pengambilan data rekam medik secara retrospektif. Dari 81 kasus pasien ISPA rawat inap yang masuk kriteria inklusi, yaitu pasien yang tercatat menderita infeksi saluran pernafasan akut meliputi sinusitis dan faringitis, serta pasien menjalani perawatan rawat inap yang tercatat mendapatkan terapi pengobatan di puskesmas jumpandang baru Makassar tahun 2015. Pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis kejadian *drug related problems* dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan buku standar secara deskriptif.

Hasil penelitian dari 81 kasus pasien yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan kejadian DRPs kategori interaksi obat sebanyak 51 kasus (62,96%), dosis kurang sebanyak 40 kasus (49,38%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (32,10%) dan tidak ditemukannya kategori DRPs obat salah dari total obat yang dianalisis.

Kata Kunci : *ISPA, Drug Related Problems, Rawat Inap, Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.*

ABSTRACT

Nama : Nurwahidah Amir

NIM : 70100112077

Judul : Drug Interaction of *Drug Related Problems (DRP's)* Evaluation In Patients Acute Respiratory Infections At Puskesmas Jumpangang Baru Makassar

The “Acute Respiratory Infection (ARI)” in many developing countries is often the cause of death. *Drug Related Problems (DRPs)* is an unexpected event, which is an experiences of patients with the drug’s therapy. The purpose of this research is to know the presentase of events from each of DRPs categories, which the appropriate drugs, incorrect doses which are the under doses or overdoses, also potential the drug interactions in medical therapy of acute respiratory infection in inpatient puskesmas jumpandang baru Makassar in 2015.

This research is non-experimental descriptive research design and medical record data retrieval in retrospective. Of the 81 cases of patients of ARI hospitalization, the number of patients who enter the criteria of inclusion of which recorded suffering from acute respiratory tract infections including sinusitis and pharyngitis, as well as patients undergoing inpatient treatment recorded get therapy treatment at the Puskesmas Jumpangang Baru Makassar in 2015. The data used technique purposive of sampling. Analysis of the *drug related problems* carried out by comparing the results of research with standards in a book descriptive.

The results of the research are, from the 81 cases of the potential the interaction of a drugs are 51 events (62,96%), the incorrect doses which is the under doses are 40 events (49,38%), the over doses are 26 events (32,10%), and not finding appropriate drugs of drugs DRPs category total drugs analyzed.

Keywords : *ISPA, Drug Related Problems, in patient, Puskesmas Jumpangang Baru Makassar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi pada saluran napas merupakan penyakit umum yang terjadi pada masyarakat. Infeksi saluran napas berdasarkan wilayah infeksiya terbagi menjadi infeksi saluran napas atas dan infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas atas meliputi *rhinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglottitis, tonsillitis, otitis*. Sedangkan infeksi saluran napas bawah meliputi infeksi pada bronkhus, alveoli seperti *bronkhitis, bronkiolitis, pneumonia*. Infeksi saluran napas atas bila tidak diatasi dengan baik dapat berkembang menyebabkan infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas atas yang paling banyak terjadi serta perlunya penanganan dengan baik karena dampak komplikasinya yang membahayakan adalah *otitis, sinusitis, dan faringitis* (WHO, 20014: 5)

Tingginya prevalensi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta dampak yang ditimbulkannya membawa akibat pada tingginya konsumsi obat bebas (seperti anti influenza, obat batuk, multivitamin) dan antibiotika. Dalam kenyataan antibiotika banyak direspkan untuk mengatasi infeksi ini. Peresepan antibiotika yang berlebihan tersebut terdapat pada infeksi saluran napas khususnya infeksi saluran napas atas akut, meskipun sebagian besar penyebab dari penyakit ini adalah virus. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan yang berlebihan para klinisi terhadap antibiotika

terutama untuk mencegah infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri, yang sebetulnya tidak bias dicegah (Depkes RI, 2010: 9)

Dari data yang diperoleh, antibiotika yang paling sering diresepkan oleh dokter untuk pasien yang menderita infeksi adalah Amoksisilin, Ciprofloxasin, Cotrimoksazol, Co-amoksiklav, dan Eritromisin. Antibiotika yang efektif dan aman telah berkembang begitu pesat sehingga dapat mengurangi mortalitas akibat penyakit infeksi secara drastis. Namun keberhasilan tersebut terganggu dengan banyaknya bakteri yang kebal terhadap antibiotika. Hal ini disebabkan adanya penggunaan obat yang tidak rasional, penggunaan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik itu berupa penggunaan yang tidak tuntas ataupun penggunaan tanpa dasar pemeriksaan yang jelas semuanya perlu dibahas dalam satu subjek yaitu masalah terkait obat atau biasa dikenal sebagai *Drug Related Problems* (DRPs).

Drug Related Problems (DRPs) atau masalah terkait obat adalah bagian dari asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) yang menggambarkan suatu keadaan, dimana profesional kesehatan (apoteker) menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. *Drug Related Problems* (DRPs) DRPs muncul berdasarkan 3 level primer, yaitu: resep obat, pasien dan tingkat pengaturan obat. Secara keseluruhan interaksi obat merupakan DRPs yang paling sering dilaporkan. Akibat yang tidak dikehendaki dari peristiwa interaksi obat ada 2 kemungkinan yakni meningkatnya efek toksik atau efek samping obat, atau berkurangnya efek klinik yang diharapkan (Qauliyah 2010:55) Pasien yang menerima obat dalam jumlah lebih kecil dibandingkan dosisterapinya dapat menjadi

masalah karena menyebabkan tidak efektifnya terapi. Terdapat juga pasien yang menerima obat dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dosis terapinya. Hal tersebut tentu berbahaya karena dapat terjadipeningkatan resiko efek toksik dan bisa membahayakan pasien. Perubahan dari dosis tersebut masuk dalam kategori *Drug Related Problems (DRPs)*. Pemberian obat yang tidak tepat dengan kondisi pasien, mengakibatkan dampak negatif baik dari segi kesehatan karena akan memperburuk kondisi pasien dan segi ekonomi juga pemborosan. Penyebab DRPs kategori ini antaralain indikasi medis yang tidak tepat, serta pasien menerima obat yang tidak efektif atau kontraindikasi dengan kondisi pasien (Qauliyah, 2010 : 56)

Drug Related Problems (DRPs) ada dua yaitu DRPs aktual dan potensial. Keduanya memiliki perbedaan, tetapi pada kenyataannya problem yang muncul tidak selalu terjadi dengan segera dalam prakteknya. DRPs aktual adalah suatu masalah yang telah terjadi dan farmasis wajib mengambil tindakan untuk memeperbaikinya. Contoh: pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi. Sedangkan DRPs potensial adalah suatu kemungkinan besar kira-kira terjadi pada pasien karena resiko yang sedang berkembang jika farmasis tidak turun tangan. Contoh: Pemberian obat tidak tepat dan besaran obat lebih (Henry, 2010 : 67)

Di antara jenis-jenis DRPs yang sering dialami oleh pasien rawat inap salah satunya adalah interaksi obat. Suatu penelitian di puskesmas rawat inap yang ada di Makassar menemukan angka kejadian interaksi obat mencapai 38 kasus dari total 164 kasus DRPs yang teridentifikasi atau sebesar 23,17%. Banyak interaksi obat tidak

berakibat apa-apa dan banyak interaksi yang potensial merugikan hanya terjadi pada sebagian kecil pasien. Obat-obat yang memerlukan kontrol dosis yang ketat adalah obat-obat yang dapat meningkatkan risikonya dengan adanya interaksi dengan obat yang lain (Koh *et al.*, 2013)

Interaksi Obat, interaksi obat adalah peristiwa dimana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Efek obat dapat bertambah kuat atau berkurang karena interaksi ini akibat yang dikehendaki dari interaksi ini ada dua kemungkinan yakni meningkatkan efek toksik atau efek samping atau berkurangnya efek klinik yang diharapkan interaksi obat dapat terjadi sebagai berikut :

1. Obat Makanan

Interaksi obat makanan perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pemantauan terapi obat. Ada 2 jenis yang mungkin terjadi :

- a. Perubahan parameter farmakokinetik (absorpsi dan eliminasi).

Misalnya : obat antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu karena akan membentuk ikatan sehingga obat tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitas.

- b. Perubahan dalam efikasi terapi obat (misalnya, makanan protein tinggi meningkatkan kecepatan metabolisme teophyllin). Sebagai tambahan, banyak obat diberikan pada saat lambung kosong. Sebaliknya, terapi

obat dapat mengubah absorpsi secara merugikan dan penggunaan suatu bahan gizi (Stockley and Lee, 2013)

2. Obat Uji Laboratorium

Interaksi obat uji laboratorium terjadi apabila obat mempengaruhi akurasi uji diagnostic. Interaksi ini dapat terjadi melalui gangguan kimia. Misalnya, laksatif antrakuinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien apoteker harus mengevaluasi status kesehatan pasien apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostic (Stockley and Lee, 2013)

3. Obat Penyakit

Interaksi obat penyakit juga merupakan masalah yang perlu dipantau. Apoteker harus mengevaluasi pengaruh efek merugikan suatu obat pada kondisi medik pasien. Dalam pustaka medik, interaksi obat penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolute dan relative. Misalnya, penggunaan kloramfenikol dapat menyebabkan anemia aplastik dan penggunaan antibiotik aminoglikosida dapat menyebabkan nefrotoksik (Stockley and Lee, 2013)

4. Obat-Obat

Interaksi antara obat-obat merupakan masalah yang perlu dihindari. Semua obat termasuk obat non resep harus dikaji untuk interaksi obat. Apoteker perlu mengetahui interaksi obat-obat yang secara klinik signifikan. Suatu interaksi

dianggap signifikan secara klinik jika hal itu mempunyai kemungkinan menyebabkan kerugian atau bahaya pada pasien. Interaksi antar obat dapat berakibat merugikan atau menguntungkan. Interaksi obat dianggap penting secara klinik bila berakibat meningkatkan toksisitas atau mengurangi efektivitas obat yang berinteraksi, terutama bila menyangkut obat dengan batas keamanan yang sempit (Stockley and Lee, 2013)

Mekanisme interaksi obat yakni :

a. Interaksi farmasetik (inkompatibilitas)

Inkompatibilitas ini terjadi di luar tubuh (sebelum obat diberikan) antara obat yang tidak dapat dicampur (inkompatibel). Pencampuran obat demikian menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik atau kimiawi yang hasilnya mungkin terlihat sebagai pembentukan endapan, perubahan warna dan lain-lain. Interaksi ini biasanya berakibat inaktivasi obat. Bagi tenaga kesehatan, interaksi farmasetik yang penting adalah interaksi antara obat suntik dan interaksi antara obat suntik dengan cairan infuse (Fradgley, 2013)

b. Interaksi Farmakokinetik

Interaksi farmakokinetik terjadi bila salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat kedua sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun. Akibatnya terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Interaksi farmakokinetik tidak dapat diestrapolasikan ke obat lain yang segolongan dengan obat yang berinteraksi,

sekalipun struktur kimianya mirip, karena antara obat segolongan terdapat variasi sifat fisika kimia yang menyebabkan variasi sifat-sifat farmakokinetiknya. Misalnya, penggunaan ketokonazol dan parasetamol secara bersamaan, menyebabkan inhibisi metabolisme parasetamol oleh ketokonazol sehingga kadar parasetamol meningkat (Fradgley, 2013)

c. Interaksi Farmakodinamik

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek yang adiptif, sinergistik atau antagonistik. Interaksi farmakodinamik merupakan sebagian besar dari interaksi obat yang penting dalam klinik. Berbeda dengan interaksi farmakokinetik, interaksi farmakokinetik sering kali dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang segolongan dengan obat yang berinteraksi, karena penggolongan obat memang berdasarkan persamaan efek farmakodinamiknya. Misalnya, penggunaan warfarin dan aspirin dapat meningkatkan terjadinya perdarahan (Fradgley, 2013)

Pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota merupakan tulang punggung dalam program pengendalian ISPA. Tingginya angka kasus penderita ISPA menunjukkan hasil pengobatan yang belum optimal di beberapa pelayanan kesehatan (Kementrian Kesehatan RI,2011:29). Di Makassar, berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Makassar menyebutkan, jumlah penderita ISPA di kota Makassar dari Januari hingga

Juli sebanyak 2.881 pasien terbanyak di Puskesmas 55% dan Rumah Sakit sekitar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Puskesmas masih merupakan pilihan masyarakat untuk mencari pengobatan. (Dinas Kesehatan,2013:58). Oleh sebabnya, puskesmas memiliki peran yang paling strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia (Kementrian Kesehatan RI,2014:3).

Puskesmas Jumpandang Baru adalah salah satu Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan yang menjalankan pelayanan kesehatan wajib dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan mandiri. Puskesmas ini terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan luas wilayah kerja 4,67 km², dimana puskesmas ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk penelitian kesehatan, dengan pelayanan sebagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah sehingga banyak dijadikan tujuan untuk pelayanan kesehatan pasien seperti pasien infeksi saluran pernafasan akut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian evaluasi *drug related problems (DRPs)* pada pasien infeksi saluran pernafasan akut agar pasien mendapatkan obat yang rasional sesuai kebutuhan klinis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui presentase kejadian DRPs kategori interaksi obat dan dosis obat pada rekam medik pasien infeksi saluran pernafasan akut. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang terbaik maka dilakukan pengujian, sebagaimana Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda



Artinya :

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizing Allah Subhanahu wa Ta’ala.”(HR.Muslim)

Dari ayat tersebut dapat diambil hikmah yang memberi motivasi kepada para peneliti selanjutnya dan para peneliti untuk selalu giat dalam menuntut ilmu dan diharapkan ilmunya nanti dapat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa setiap pasien yang dirawat, dengan meniatkan profesi kefarmasian sebagai ibadah dan ladang amal sehingga dapat lebih menghargai nyawa manusia. Sehubungan dengan penelitian ini, ditujukan untuk penegakkan diagnosis sedini mungkin pada pasien infeksi saluran pernapasan akut akan sangat bermanfaat agar dapat diberikan terapi yang tepat dan meminimalkan komplikasi yang mungkin bisa terjadi, dengan harapan prognosis dari penyakit akan lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gambaran penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar?
2. Apakah penggunaan antibiotik meliputi ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis, ketepatan indikasi dan interaksi obat pada pasien Infeksi Saluran

Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar telah sesuai dengan acuan dalam *Pharmacotherapy Handbook* Edisi 9?

C. Definisi Operasional

- a. Antibiotika adalah golongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri (Ruth. 2012).
- b. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di dalam suatu komunitas
- c. *Drug Related Problems* (DRPs) merupakan kejadian atau keadaan yang berpotensi bertentangan dengan hasil kesehatan yang diinginkan (Nasrudin, 2010 : 56)
- d. Evaluasi bertujuan antara lain untuk menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan strategi nasional untuk memberikan arah kebijakan angka jangka panjang (Stranas, 2313 : 18)
- e. Infeksi pada Saluran Nafas Akut (ISPA) merupakan penyakit yang terjadi pada masyarakat. Adapun penyebab terjadinya infeksi pada saluran nafas adalah mikroorganisme, faktor lingkungan, perilaku masyarakat yang kurang baik terhadap kesehatan diri maupun publik, serta kurangnya gizi dan nutrisi (MIMS, 2013 : 41)
- f. *Medicines Guideline* adalah pedoman obat yang direkomendasikan untuk praktek bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam mengatur,

meresepkan, dan dalam pengambilan keputusan tentang penentuan penggunaan obat-obatan

- g. Pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis (Permatasari. 2012:16).
- h. Penelitian retrospektif adalah sebuah studi yang didasarkan pada catatan medis, mencari mundur sampai waktu peristiwanya terjadi di masa lalu.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes, 2014 : 3)
- j. Pharmaceutical Care adalah paradigma baru pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efisien demi mencapai peningkatan kualitas hidup manusia (Permenkes, 2014 : 15)
- k. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes, 2008 :2)
- l. Variabel Bebas adalah variable yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati

- m. Variabel Terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variable bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian non eksperimental dengan dengan pengambilan data dari data sekunder (rekam medik) secara deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif kemudian dilakukan analisis statistik parameterik dan *cross sectional* dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20.0.

E. Kajian pustaka

Siti Fauziah, *Evaluasi Drug Related Problems (DRPs) pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada anak di Instalasi Rawat Inap RSUD DR.Moewardi Surakarta Periode Januari – Desember 2012*. ISPA adalah Infeksi pada saluran napas merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat. Infeksi saluran napas berdasarkan wilayah infeksiya terbagi menjadi infeksi saluran napas atas dan infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas atas meliputi *rhinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglottitis, tonsillitis, otitis*. Penelitian dilakukan di ruang medic RSUD DR.Moewardi Surakarta Hasil penelitian dari 100 kasus pasien anak yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan kejadian DRPs kategori interaksi obat sebanyak 51 kasus (43,59%), dosis kurang sebanyak 40 kasus (34,19%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (22,22%), dan tidak ditemukannya kategori DRPs obat salah dari total obat yang dianalisis.

MM Woro Endah Tyashapsari, *Penggunaan Obat Pada pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang*. 2012.

Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung koroner, kejadian stroke, gagal ginjal kronik, dan gagal jantung kongestif. Menurut pengamatan WHO selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi yang dirawat di berbagai rumah sakit di Semarang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Evaluasi penggunaan obat dilihat dari tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis dibandingkan dengan standar pelayanan medik RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2005 dan the JNC 7 Report tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah kaptopril (73%).

Istikomah, *Pengamatan Pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut dengan Multidrug Resistant (ISPA-MDR) di Poliklinik Paru RSUP Persahabatan* 2010. Multiresisten atau resisten ganda merupakan masalah terbesar terhadap pencegahan dan pemberantasan ISPA dunia. Ada beberapa penyebab terjadinya resistensi terhadap obat infeksi saluran pernafasan akut yaitu : (1) penggunaan obat yang tidak kuat (2) pemberian obat yang tidak teratur (3) Evaluasi dan cakupan yang tidak adekuat (4) Penyediaan obat yang tidak regular (5) Program yang belum jalan serta kurangnya tata organisasi di program. Penelitian dilakukan di poliklinik paru bagian pulmonology FKUI RS Persahabatan mulai Juli – Oktober 2008. Pengambilan data secara retrospektif melalui rekam medis MDR ISPA. Kesimpulan hasil pengobatan yang dilakukan pada 93 pasien yang diobati didapatkan

hasil pengobatan lengkap 11 (11,8%), pengobatan selesai 6 (6,5%) dan sembuh 2 (2,1%) sedangkan yang masih diobati terdapat 16 orang (15,9%).

Butel Janet S, *Penggunaan Obat Pada pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang*. 2012. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung koroner, kejadian stroke, gagal ginjal kronik, dan gagal jantung kongestif. Menurut pengamatan WHO selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi yang dirawat di berbagai rumah sakit di Semarang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Evaluasi penggunaan obat dilihat dari tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis dibandingkan dengan standar pelayanan medic RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2005 dan the JNC 7 Report tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah kaptopril (73%).

Mukund Uplekar, dkk. *WHO's new End TB Strategy – review 2015*. Pada 19 Mei, WHA menyetujui *Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015* oleh WHO. Hasil yang didapatkan dalam 2 dekade terakhir mengalami sedikit peningkatan. Strategi DOTS atau *Directly Observed Treatment, Short-course* tahun 1995 aksesnya telah diperluas menjadi perawatan *High-quality Tuberculosis*. Strategi untuk menghentikan TB tahun 2006 diperuntukkan untuk semua bentuk TB termasuk TB dengan HIV dan multidrug resisten tuberculosis (MDR), yang mencakup komunitas, ketelibatan semua tenaga kesehatan, penguatan system kesehatan dan membantu perkembangan penelitian. WHO telah mengeluarkan

beberapa guideline dasar dan akan membuat lebih lagi untuk membantu implementasi nasional tentang intervensi baru yang diusulkan dibawah *The End TB strategy*.

Yunita Palinggi, *Hubungan Motivasi Keluarga dengan Kepatuhan Berobat pada pasien TB Paru Rawat Jalan di RSUD A. Makassar Pare-pare*. 2013. Hasil prevalensi pada survey kesehatan rumah tangga (SKRT) 2004, diperkirakan prevalensi penyakit TB Paru berdasarkan pemeriksaan mikroskopik basil tahan Asam (BTA) positif sebesar 104 per 100.000 penduduk. Tahun 1999 WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru TB paru, 262 basil tahan asam (BTA) positif, dengan kematian sekitar 140.000. secara kasar diperkirakan setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru TB Paru BTA Positif. Penelitian dilakukan di RS A. Makassar Pare-Pare dengan metode penelitian *Cross sectional* dan jenis penelitian adalah deskriptif korelasional. Berdasarkan uji korelasi statistik SPSS didapatkan $= 0,029 < 0,05$ artinya adanya hubungan antara Motivasi Kepatuhan berobat pada pasien TB Paru rawat jalan di RSUD A. Makassar Parepare.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran penggunaan obat antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
2. Mengetahui masalah terkait obat penggunaan antibiotik meliputi ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis, ketepatan indikasi dan interaksi obat pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang

Baru Makassar berdasarkan acuan terapi dalam *Pharmacotherapy Handbook* Edisi 9.

G. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui gambaran penggunaan obat antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar periode Januari – Desember 2015
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi pemilihan obat yang tepat, ketepatan pemberian dosis obat dan ketepatan indikasi serta interaksi obat yang tidak diinginkan pada penggunaan antibiotik terhadap pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

H. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan obat antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Sehingga meningkatkan efektivitas terapi rasional yang dapat meningkatkan mutu dan membantu dalam pengelolaan asuhan kefarmasian yang sesuai dengan acuan standar terapi dalam *Pharmacotherapy Handbook* Edisi 9

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Drug Related Problems (DRPs)*

1. Definisi

Drug Related Problems (DRPs) merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien akibat terapi obat potensial mengganggu keberhasilan terapi yang diharapkan. Presentasi kematian akibat kejadian DRPs di seluruh dunia cukup banyak. Sebuah penelitian di Inggris yang dilakukan pada salah satu unit perawatan umum menemukan 8,8% kejadian DRPs pada 93% pasien darurat. Dapat dilihat juga dari catatan sejarah bahwa di Amerika pada tahun 1997 terjadi 140 ribu kematian dan 1 juta pasien yang dirawat di rumah sakit akibat adanya DRPs dari obat yang diresepkan (Irianto, 2013 : 208)

Suatu kejadian dapat disebut DRPs bila memenuhi komponen berikut:

- a. Kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien

Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosis, penyakit, ketidakmampuan (disability), atau sindrom dapat merupakan efek dan kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultural atau ekonomi.

- b. Ada hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat.

Bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi obat maupun preventif.

Drug Related Problems (DRPs) atau masalah terkait obat adalah bagian dari asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) yang menggambarkan suatu keadaan,

dimana profesional kesehatan (apoteker) menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Ada 8 jenis *Drug Related Problems* (DRPs), yaitu : (Hepler, 2011 : 45)

1. Indikasi yang tidak ditangani (*Untreated Indication*)

Ada indikasi penyakit/keluhan pasien yang belum ditangani dalam resep tersebut, misalnya pasien mengeluh nyeri di persendian, sedang dalam resep tersebut tidak ada obat untuk mengatasi masalah nyeri tersebut.

2. Pilihan Obat yang Kurang Tepat (*Improper Drug Selection*)

Pemilihan obat dalam resep kurang tepat (salah obat) dan beresiko, misalnya pasien demam dikasih antibiotik rifampisin, ini jelas pemilihan obat salah.atau obat yang dipilih memiliki kontraindikasi atau perhatian (caution) terhadap pasien.

3. Penggunaan Obat Tanpa Indikasi (*Drug Use Without Indication*)

Obat yang ada dalam resep, tidak sesuai dengan indikasi keluhan penyakit pasien.

4. Dosis Terlalu Kecil (*Sub-Therapeutic Dosage*)

Dosis obat yang diberikan dalam dosis tersebut terlalu kecil, sehingga efek terapi tidak memadai untuk mengobati penyakit pasien.

5. Dosis Terlalu Besar (*Over Dosage*)

Dosis yang diberikan dalam resep terlalu besar, diatas dosis maksimum, hal ini dapat berakibat fatal.

6. Reaksi Obat Yang Tidak Dikehendaki (*Adverse Drug Reactions*)

Obat yang diberikan memberikan efek samping yang memberatkan kondisi pasien, misalnya captopril menyebabkan batuk yang mengganggu (efek samping ini tidak selalu terjadi, karena sensitifitas setiap orang berbeda-beda).

7. Interaksi Obat (*Drug Interactions*)

Obat-obatan dalam resep saling berinteraksi seperti warfarin dan vitamin K bersifat antagonis, atau obat dengan makanan semisal susu dan tetrasiklin membentuk khelat/kompleks yang tidak bisa diabsorpsi.

8. Gagal Menerima Obat (*Failure to receive medication*)

Obat tidak diterima pasien bisa disebabkan tidak mempunyai kemampuan ekonomi, atau tidak percaya dan tidak mau mengkonsumsi obat-obatan. atau bisa juga disebabkan obat tidak tersedia di apotek sehingga pasien tidak dapat memperoleh obat. (Hepler, 2011 : 45)

2. Jenis DRPs

Jenis-jenis DRPs dan penyebabnya menurut standar disajikan sebagai berikut:

- a. Tepat obat yang tidak perlu
 - 1) Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi
 - 2) Pasien yang keracunan karena obat atau hasil pengobatan
 - 3) Pengobatan pada pasien mengkonsumsi obat, alkohol dan rokok
 - 4) Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati dengan *non drug therapy*
 - 5) Pasien dengan *multiple drugs* untuk kondisi dimana hanya *single drug therapy* dapat digunakan

b. Reaksi obat yang merugikan:

- 1) Pasien dengan faktor resiko yang berbahaya bila obat digunakan
- 2) Ketersediaan dari obat dapat menyebabkan interaksi dengan obat lain atau makanan
- 3) Hasil laboratorium dapat berubah karena gangguan obat lain
- 4) Efek dari obat dapat diubah oleh substansi makanan pasien

c. Salah obat

- 1) Pasien dimana obatnya tidak efektif
- 2) Pasien alergi
- 3) Pasien dengan faktor resiko pada kontraindikasi penggunaan obat
- 4) Pasien menerima obat efektif terapi tidak aman
- 5) Pasien menerima obat efektif tetapi harga lebih mahal

d. Dosis terlalu rendah

- 1) Pasien menerima kombinasi produk yang tidak perlu dimana obat tunggal dapat memberikan pengobatan yang tepat
- 2) Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menimbulkan respon
- 3) Pemberian obat tidak tepat, frekuensi dan besaran obat kurang

e. Kepatuhan

- 1) Pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat (penulisan obat, pemberian, pemakaian)

- 2) Pasien tidak mematuhi (ketaatan) rekomendasi yang diberikan untuk pengobatan
 - 3) Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya mahal
 - 4) Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan secara konsisten karena merasa sudah sehat
- f. Dosis terlalu tinggi
- 1) Dosis terlalu tinggi
 - 2) Dosis obat meningkat terlalu cepat
 - 3) Pemberian obat tidak tepat, frekuensi dan besaran obat lebih
- g. Terapi obat tambahan
- 1) Pasien dengan kondisi terbaru membutuhkan terapi obat yang baru
 - 2) Pasien yang kronik membutuhkan lanjutan terapi obat
 - 3) Pasien dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan kombinasi terapi untuk mencapai efek sinergis (Henry.2010:68)

Sebagai pengembangan tugas pelayanan kefarmasian, seorang farmasis memiliki tanggung jawab terhadap adanya DRPs yaitu dalam hal:

1. Mengidentifikasi DRPs aktual dan potensial yang terjadi
2. Mengatasi DRPs yang terjadi
3. Mencegah terjadinya DRPs yang potensial terjadi (Henry, 2010: 76)

Drug Related Problems (DRPs) ada dua yaitu DRPs aktual dan potensial. Keduanya memiliki perbedaan, tetapi pada kenyataannya problem yang muncul tidak selalu terjadidengan segera dalam prakteknya. DRPs aktual adalah suatu masalah yang telah terjadi dan farmasis wajib mengambil tindakan untuk memeperbaikinya. Sedangkan DRPs potensial adalah suatu kemungkinan besar kira-kira terjadi pada pasien karena resiko yang sedang berkembang jika farmasis tidak turun tangan (Henry, 2010 : 67)

Di antara jenis-jenis DRPs yang sering dialami oleh pasien rawat inap salah satunya adalah interaksi obat. Suatu penelitian di puskesmas rawat inap yang ada di Makassar menemukan angka kejadian interaksi obat mencapai 38 kasus dari total 164 kasus DRPs yang teridentifikasi atau sebesar 23,17%. Banyak interaksi obat tidak berakibat apa-apa dan banyak interaksi yang potensial merugikan hanya terjadi pada sebagian kecil pasien. Obat-obat yang memerlukan kontrol dosis yang ketat adalah obat-obat yang dapat meningkatkan resikonya dengan adanya interaksi dengan obat yang lain (Koh *et al.*, 2013)

3. Interaksi Obat

a. Definisi

Interaksi obat merupakan *Drug Related Problem (DRP)* yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi *outcome* terapi pasien (Stockley *and* Lee, 2013).

Definisi mengenai interaksi obat ini bervariasi. Beberapa definisi

membatasi arti interaksi obat hanya sebagai *Adverse Drug Reactions* atau reaksi yang tidak diinginkan, tidak termasuk reaksi yang menguntungkan. Definisi lain mengatakan bahwa interaksi obat hanya sebagai fenomena interaksi yang meliputi interaksi obat dengan makanan, substansi endogen, lingkungan dan kimia industri serta tes laboratorium. Interaksi obat dapat terjadi ketika efek suatu obat berubah dengan adanya obat lain, makanan, minuman atau agen kimia yang berhubungan dengan lingkungan (Stockley and Lee, 2013).

b. Mekanisme

Ada beberapa keadaan di mana obat berinteraksi dengan mekanisme yang unik, namun mekanisme interaksi tertentu sering dijumpai. Mekanisme tersebut dapat dibagi menjadi interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetika obat dan interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamik obat. Beberapa interaksi obat yang dikenal merupakan kombinasi lebih dari satu mekanisme (Fradgley, 2013).

1). Interaksi Farmakokinetik

Yaitu interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat lain. Dengan demikian interaksi ini meningkatkan atau mengurangi jumlah obat yang tersedia dalam tubuh untuk menimbulkan efek farmakologiknya (Fradgley, 2013).

2). Interaksi Farmakodinamik

Interaksi farmakodinamik terjadi antara obat-obat yang mempunyaikhasiat atau efek samping yang serupa atau berlawanan. Interaksi inidisebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama, atau terjadi antaraobat-obat yang bekerja pada sistem fisiologik yang sama. Interaksi inibiasanya dapat diperkirakan dari pengetahuan tentang farmakologi obat-obat yang berinteraksi(Fradgley,2013).

Menurut Stockley *and* Lee (2013) kemungkinan efek yang dapatterjadi pada interaksi farmakodinamik antara lain:

- a. Sinergisme atau penambahan efek satu atau lebih obat,
- b. Efek antagonisme satu atau lebih obat,
- c. Penggantian efek satu atau lebih obat.

Interaksi farmakodinamik yang paling umum terjadi adalahsinergi sementara dua obat yang bekerja pada sistem, organ, sel atauenzim yang samadengan efek farmakologi yang sama. Sebaliknya,antagonisme terjadi bila obat yang berinteraksi memiliki efek farmakologiyang berlawanan.Hal inimengakibatkan pengurangan hasil yangdiinginkan dari satu atau lebih obat (Fradgley, 2013).

c. *Clinical Significance*

Clinical significance adalah derajat di mana obat yang berinteraksi akanmengubah kondisi pasien.*Clinical significance* dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Level signifikansi menurut Tatro 2010

Tabel Signifikansi Interaksi

Nilai	Keparahan	Dokumentasi
1.	Mayor	<i>Suspected, Probable, Established</i>
2.	Moderat	<i>Suspected, Probable, Established</i>
3.	Minor	<i>Suspected, Probable, Established</i>
4.	Mayor atau Moderat	<i>Possible</i>
5.	Minor	<i>Possible</i>

(Tatro, 2010)

Terdapat 5 macam dokumentasi interaksi, yaitu *established* (interaksi obat sangat mantap terjadi), *probable* (interaksi obat dapat terjadi), *suspected* (interaksi obat diduga terjadi), *possible* (interaksi obat belum pasti terjadi), *unlikely* (kemungkinan besar interaksi obat tidak terjadi). Derajat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi minor (dapat diatasi dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ), mayor (efek fatal, dapat menyebabkan kematian) (Tatro, 2010)).

Level signifikansi interaksi 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa interaksi obat kemungkinan terjadi. Level signifikansi interaksi 4 dan 5 interaksi belum pasti terjadi dan belum diperlukan antisipasi untuk efek yang terjadi (Tatro, 2010).

B. Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Infeksi Saluran Pernafasan akut atau sering disebut sebagai ISPA adalah terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Infeksi yang terjadi lebih sering disebabkan oleh virus meski bakteri juga bisa menyebabkan kondisi ini. Kondisi ini menyebabkan fungsi pernapasan menjadi terganggu. Jika tidak segera ditangani, ISPA dapat menyebar ke seluruh sistem pernapasan tubuh. Tubuh tidak bisa mendapatkan cukup oksigen karena infeksi yang terjadi dan kondisi ini bisa berakibat fatal, bahkan mungkin mematikan. Obat dikatakan rasional jika penggunaannya tepat, efektif, aman dan ekonomis.

1. Otitis Media

Otitis media merupakan inflamasi pada telinga bagian tengah dan terbagi menjadi Otitis Media Akut, Otitis Media Efusi, dan Otitis Media Kronik. Infeksi ini banyak menjadi problem pada bayi dan anak-anak. Otitis media mempunyai puncak insiden pada anak usia 6 bulan – 3 tahun dan diduga penyebabnya adalah obstruksi tuba *Eustachius* dan sebab sekunder yaitu menurunnya imunokompetensi pada anak. Disfungsi tuba *Eustachius* berkaitan dengan adanya infeksi saluran napas dan alergi. Beberapa anak yang memiliki kecenderungan otitis akan mengalami 3-4 kali episode otitis pertahun atau otitis media yang terus menerus selama >3 bulan Otitis media kronik (F.H. Kayser *et al*, 2011: 56)

2. Sinusitis

Sinusitis merupakan inflamasi pada mukosa sinus paranasal. Peradangan ini banyak dijumpai pada anak-anak dan dewasa yang biasanya didahului oleh infeksi saluran napas atas. Sinusitis dibedakan menjadi **sinusitis akut** yaitu infeksi pada sinus paranasal sampai dengan selama 30 hari baik dengan gejala yang menetap maupun berat. Gejala yang menetap yang dimaksud adalah gejala seperti adanya keluaran dari hidung, batuk di siang hari yang akan bertambah parah pada malam hari yang bertahan selama 10-14 hari, yang dimaksud dengan gejala yang berat adalah disamping adanya sekret yang purulen juga disertai demam (biasanya sampai 39°C) selama 3-4 hari. Sinusitis berikutnya adalah **sinusitis subakut** dengan gejala yang menetap selama 30-90 hari. Sinusitis berulang adalah sinusitis yang terjadi minimal sebanyak 3 episode dalam kurun waktu 6 bulan atau 4 episode dalam 12 bulan. **Sinusitis kronik** didiagnosis bila gejala sinusitis terus berlanjut hingga lebih dari 6 minggu (F.H. Kayser *et al*, 2011: 56).

3. Faringitis

Faringitis adalah peradangan pada mukosa faring dan sering meluas ke jaringan sekitarnya. Faringitis biasanya timbul bersama-sama dengan tonsillitis, rhinitis dan laryngitis. Faringitis banyak di derita anak-anak usia 5-15 tahun di daerah dengan iklim panas. Faringitis dijumpai pula pada dewasa yang masih memiliki anak usia seko atau bekerja di lingkungan anak-anak (F.H. Kayser *et al*, 2011:58)

C. Obat Infeksi Saluran Pernapasan

a) Penisilin

Penisilin merupakan derivat B-laktam tertua yang memiliki aksi bakterisidal dengan mekanisme kerja menghambat sintesis dinding sel bakteri. Masalah resistensi akibat penisilinase mendorong lahirnya terobosan dengan ditemukannya derivat penisilin seperti metisilin, fenoksimetilpenisilin yang dijumpai di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Penisilin V (Daniel, 2012: 116)

Spektrum aktivitas dari fenoksimetilpenisilin meliputi terhadap *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumonia* serta aksi yang kurang kuat terhadap *Enterococcus faecalis*. Aktivitas terhadap bakteri Gram negatif sama sekali tidak dimiliki. Antibiotika ini diabsorpsi sekitar 60-73%, didistribusikan hingga ke cairan ASI sehingga waspada pemberian pada ibu menyusui. Antibiotika ini memiliki waktu paruh 30 menit, namun memanjang pada pasien dengan gagal ginjal berat maupun terminal, sehingga interval pemberian 250 mg setiap 6 jam.

Terobosan lain terhadap penisilin adalah dengan lahirnya derivat penisilin yang berspektrum luas seperti golongan aminopenisilin (amoksisilin) yang mencakup *E. Coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumonia*, *Haemophilus influenza*, *Neisseria gonorrhoeae*. Penambahan gugus B-laktamase inhibitor seperti klavulanat memperluas cakupan hingga *Staphylococcus aureus*, *Bacteroides catarrhalis*. Sehingga saat ini amoksisilin klavulanat merupakan

alternative bagi pasien yang tidak dapat mentoleransi alternative lain setelah resisten dengan amoksisilin (Daniel,2012: 118)

b) Cefotaksim

Cefotaksim pada generasi tiga memiliki aktivitas yang paling luas di antara generasinya yaitu mencakup pula *Pseudomonas aeruginosa*, *B.Fragilis* meskipun lemah. Cefalosporin yang memiliki aktivitas yang kuat terhadap *Pseudomonas aeruginosa* adalah ceflazidime setara dengan cephalosporin generasi keempat, namun aksinya terhadap bakteri Gram positif lemah, sehingga sebaiknya agen ini disimpan untuk mengatasi infeksi nosokomial yang melibatkan pseudomonas. Spektrum aktivitas generasi keempat sangat kuat terhadap bakteri Gram positif maupun negatif, bahkan terhadap *Pseudomonas aeruginosa* sekalipun, namun terhadap *B.fragilis*.

Mekanisme kerja golongan cephalosporin sama seperti B-laktam lain yaitu berikatan dengan penicillin protein binding (PPB) yang terletak di dalam maupun permukaan membrane sel sehingga dinding sel bakteri tidak terbentuk yang berdampak pada kematian bakteri (Daniel, 2012: 121)

c) Makrolida

Eritromisin merupakan prototipe golongan ini sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1992. Komponen lain golongan makrolida merupakan derivat sintetik dari eritromisin yang struktur tambahannya bervariasi antara 14-16 cincin lakton. Derivat makrolida tersebut terdiri dari spiramisin, moidekamisin, roksitromisin, azitromisin dan klaritromisin.

Aktivitas antimikroba golongan makrolida secara umum meliputi Gram positif coccus seperti *Staphylococcus aureus*, coagulase-negatif *Staphylococci*, *Streptococci B-hemolitik* dan *Streptococcus sp. Lain*, *enterococci*, *H.Influenzae*, *Naisseria sp*, *Bordetella sp*, *Corynebacterium sp*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Rickettsia* dan *Legionella sp*. Azitromisin memiliki aktivitas yang lebih potensi terhadap Gram negatif, volume distribusi yang lebih luas serta waktu paruh yang lebih panjang. Klaritromisin memiliki fitur farmakokinetika yang mengikat (waktu paruh plasma lebih panjang, penetrasi ke jaringan lebih besar) serta peningkatan aktivitas terhadap *H. Influenzae*, *Legionella pneumophila*. Sedangkan roksitromisin memiliki aktivitas setara dengan aritromisin, namun profil farmakokinetiknya mengalami peningkatan sehingga lebih dipilih untuk infeksi saluran pernapasan (Daniel, 2012: 123)

Hampir semua komponen baru golongan makrolida memiliki tolerabilitas, profil keamanan lebih baik dibandingkan dengan eritromisin. Lebih jauh lagi derivat baru tersebut bias diberikan satu atau dua kali sehari, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien (Daniel, 2012:123)

d) Tetrasiklin

Tetrasiklin merupakan agen antimicrobial hasil biosintesis yang memiliki spectrum aktivitas luas. Mekanisme kerjanya yaitu blockade terikatnya asam amino ke ribosom bakteri (sub unit 30S). Aksi yang ditimbulkannya adalah bakterostatik yang luas terhadap gram positif, gram negatif, *Chlamydia*, *mycoplasma*, bahkan *rickettsia*.

Generasi pertama meliputi tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Generasi kedua merupakan penyempurnaan dari sebelumnya yaitu terdiri dari doksisisiklin, minosiklin. Generasi kedua memiliki karakteristik farmakokinetik yang lebih baik yaitu antara lain memiliki volume distribusi yang lebih luas karena profil lipofiliknya. Selain itu bioavailabilitas lebih besar, demikian pula waktu paruh eliminasi lebih panjang (> 15 jam). Doksisisiklin dan minosiklin tetap aktif terhadap stafilokokus yang resisten terhadap tetrasiklin, bahkan terhadap bakteri anaerob seperti *Acinetobacter sp*, *Enterococcus* yang resisten terhadap Vankomisin sekalipun tetap efektif (Daniel, 2012: 125)

e) Quinolon

Golongan quinolon merupakan antimikrobal oral memberikan pengaruh yang dramatis dalam terapi infeksi. Dari prototype awal yaitu asam naklisidat berkembang menjadi asam pipemidat, asam oksolinat, cinoksacin, norflaksacin. Generasi awal mempunyai peran dalam terapi gram negatif infeksi saluran kencing. Generasi berikutnya yaitu generasi kedua dari pefloksasin, enoksasin, ciprofloksasin, sparfloksasin, lomefloksasin, fleroksasin dengan spectrum aktivitas yang lebih luas untuk terapi infeksi community acquired maupun infeksi nosokomial. Lebih jauh lagi ciprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin tersedia sebagai preparat parenteral yang memungkinkan penggunaannya secara luas baik tunggal maupun kombinasi dengan agen lain (Daniel, 2012: 126)

Mekanisme kerja golongan quinolon secara umum adalah dengan menghambat DNA-*gyrase*. Aktivitas antimikroba secara umum meliputi,

Enterobacteriaceae, *P.aeruginosa*, *Staphylococci*, *Enterococci*, *Streptococci*.Aktivitas terhadap bakteri anaerob pada generasi kedua tidak dimiliki.Demikian pula dengan generasi ketiga quinolon seperti levofloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin. Aktivitas terhadap anaerob seperti *B.fragilis*, anaerob lain dan Gram positif baru muncul pada generasi keempat yaitu trovafloksasin. Modifikasi struktur quinolon menghasilkan aktivitas terhadap mycobacteria sehingga digunakan untuk terapi TB yang resisten, lepra, prostatitis kronik, infeksi kutaneus kronik pada pasien diabetes.

Profil farmakokinetik quinolon sangat mengesankan terutama bioavailabilitas yang tinggi, waktu paruh eliminasi yang panjang. Sebagai contoh ciprofloksasin memiliki bioavailabilitas berkisar 50-70%, waktu paruh 3-4 jam, serta konsentrasi puncak sebesar 1,51-2,91 mg/L setelah pemberian dosis 500 mg. Sedangkan ofloksasin memiliki bioavailabilitas 95-100%, waktu paruh 5-8 jam, serta konsentrasi puncak 2-3mg/L paska pemberian dosis 400 mg. Perbedaan diantara quinolon di samping pada spectrum aktivitasnya, juga pada profil tolerabilitas, ineraksinya dengan teofilin, antasida, H2-Bloker, antikolinergik, serta profil keamanan secara umum.

Resistensi merupakan masalah yang menghadang golongan quinolon di seluruh dunia karena penggunaan yang luas. Spesies yang dilaporkan banyak yang resisten adalah *P.aeruginosa*, beberapa *Streptococci*, *Acinetobacter sp*, *Proteus vulgaris*, *Setratia sp*(Daniel,2012:128)

f) Sulfonamida

Sulfonamida merupakan salah satu antimikroba tertua yang masih digunakan. Preparat sulfonamide yang paling banyak digunakan adalah Sulfametoksazol yang dikombinasikan dengan trimetoprim yang lebih dikenal dengan nama Kotrimoksazol. Mekanisme kerja sulfametoksazol adalah dengan menghambat sintesis asam folat, sedangkan trimetoprim menghambat reduksi asam dihydrofolat menjadi tetrahydrofolat sehingga menghambat enzim pada alur sintesis asam folat. Kombinasi yang bersifat sinergis ini menyebabkan pemakaian yang luas pada terapi infeksi community-acquired seperti sinusitis, otitis media akut, infeksi saluran kencing (Daniel, 2012:129)

Aktivitas antimikroba yang dimiliki kotrimoksazol meliputi kuman gram negatif seperti *E. coli*, *Klebsiella*, *Salmonella* serta Gram positif seperti *S. Pneumoniae*, *Pneumocystis carinii*, serta parasit seperti *Nocardia sp* (Daniel, 2012: 128)

D. Bakteri

Streptococcus pneumonia

Klasifikasi *Streptococcus pneumonia* (Syahrurachman, 2013 : 241)

Kingdom : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Family : Streptococcus

Genus : Streptococcus

Spesies : *Streptococcus pneumoniae*

E. Morfologi

a. Bentuk

Secara mikroskopik Nampak sebagai kokus berbentuk lanset, biasanya berpasangan dan berselubung. Pneumokokus tipe III berbentuk bulat, baik yang berasal dari eksudat maupun dari perbenihan. Rantainya panjang terdapat bila ditanam dalam perbenihan yang hanya sedikit mengandung magnesium. Kuman ini positif Gram dan pada perbenihan tua dapat nampak sebagai negatif Gram, tidak membentuk spora, tidak bergerak (tidak berflagel). Selubung terutama dibuat oleh jenis yang virulen (Aslam, 2010 : 135)

b. Sifat biokimia

Infeksi pada manusia yang khas ialah menyebabkan penyakit pneumonia lobaris. Selain itu dapat pula menimbulkan sinusitis, otitis, media, osteomielitis, arthritis, peritonitis, ulserasi kornea dan meningitis. Dari pneumonia lobaris dapat terjadi komplikasi berupa septicemia, empiema, endokarditis, perikarditis, meningitis dan arthritis (Thomas, 2013 : 242)

F. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

1. Puskesmas secara Umum

Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja suatu

puskesmas adalah suatu kecamatan (target penduduk 30.000 jiwa). Apabila pada satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas. Puskesmas termasuk fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama seperti halnya praktek dokter, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Berdasarkan Kepmenkes No.128 tahun 2009, visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Indikator pencapaian kecamatan sehat dilihat dari lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk kecamatan. Pemerintah telah membuat standar pelayanan kefarmasian di puskesmas untuk menjamin pelayanan kefarmasian di puskesmas. DOEN dan pedoman pengobatan dasar di puskesmas disusun untuk mencapai keberhasilan terapi (Departemen Kesehatan RI.2010:45)

Klasifikasi Puskesmas (Kepmenkes No.128 tahun 2009)

Dalam suatu kecamatan dapat terdiri beberapa puskesmas. Puskesmas utama juga memiliki unit bantuan dalam melakukan pelayanannya yaitu puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu yaitu puskesmas yang unit pelayanannya lebih sederhana serta berfungsi menunjang dan membantu kegiatan puskesmas yang ruang lingkungannya lebih besar. Ruang lingkup dari puskesmas pembantu adalah 2-3 kelurahan (2500 jiwa untuk luar Jawa dan Bali) atau 10.000 jiwa (untuk Jawa dan Bali)

Upaya Kesehatan Puskesmas (Kepmenkes No.128 tahun 2009)

Puskesmas memiliki kewajiban menjalankan beberapa upaya kesehatan .Upaya kesehatan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat Indonesia dalam upaya memicu Indonesia Sehat.Upaya kesehatan masih menjadi komitmen nasional, regional dan global untuk dijalankan pada pelayanan kesehatan di puskesmas. Upaya kesehatan tersebut adalah:

- a. Upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
- b. Upaya promosi kesehatan
- c. Upaya kesehatan lingkungan
- d. Upaya perbaikan gizi
- e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Selain upaya kesehatan yang wajib, puskesmas juga dapat menjalankan upaya pengembangannya.Upaya kesehatan pengembangan ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan masyarakat di sekitar puskesmas serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Berikut adalah upaya kesehatan pengembangan yang telah ada:

- a. Upaya kesehatan sekolah
- b. Upaya kesehatan kerja
- c. Upaya kesehatan gigi dan mulut
- d. Upaya kesehatan jiwa
- e. Upaya kesehatan mata
- f. Upaya kesehatan usia lanjut

Setiap puskesmas di Kota Makassar dipimpin oleh kepala puskesmas yang merupakan seorang dokter. Kepala puskesmas kecamatan di Kota Makassar bersifat struktural sehingga tidak berkewajiban melakukan pelayanan pengobatan di puskesmas. Kepala puskesmas kelurahan bersifat fungsional sehingga selain melakukan fungsi pelayanan pengobatan di puskesmas. Oleh karena itu, pada puskesmas kecamatan terdapat lebih banyak dokter dibandingkan tingkat kelurahan.

Pengadaan obat untuk seluruh puskesmas di Kota Makassar dilakukan oleh Dinkes Kota Makassar. Oleh karena itu, terdapat keseragaman bentuk sediaan obat dari dinkes ke puskesmas dilakukan berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari setiap puskesmas setiap puskesmas mengajukan permintaan obat berdasarkan rata-rata pemakaian obat pada bulan sebelumnya. Puskesmas tidak diperbolehkan melakukan pengadaan obat secara mandiri.

Pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinkes Kota Makassar merujuk kepada DOEN, daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), dan permintaan puskesmas. Untuk pengadaan obat diluar DOEN dilakukan berdasarkan pertimbangan permintaan puskesmas. Selanjutnya, pengadaan obat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Dinkes Makassar. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pengadaan obat adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan Askes (Asuransi Kesehatan)

Puskesmas dapat membagi ruang-ruang pelayanan pengobatan pasien sebagai berikut:

- a. Poli gigi : melayani pengobatan terkait penyakit gigi dan gusi
- b. Poli umum : melayani pengobatan penyakit selain penyakit gigi dan gusi untuk pasien berusia 5 – 55 tahun
- c. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) : melayani pemeriksaan kehamilan, penggunaan KB ataupun melayani pengobatan bagi ibu hamil
- d. Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sehat) : melayani pengobatan bagi anak berusia dibawah 5 tahun
- e. Poli lansia (lanjut usia) : melayani pengobatan pasien berusia >55tahun
- f. Pengendalian Penyakit Menular (P2M) : melayani pemberian obat bagi pasien-pasien yang tercatat sebagai penderita penyakit TBC dan kusta

Umumnya poli umum memiliki jumlah pasien terbanyak bila dibandingkan dengan poli lainnya.

Pelayanan Informasi Obat (PIO) di puskesmas adalah setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi, dan penggunaan terapi dari obat. Sasaran informasi obat antara lain: 1. Dokter, Dalam proses penggunaan obat, pada tahap penetapan pilihan obat serta regimennya untuk seorang penderita tertentu,

dokter memerlukan informasi dari apoteker agar ia dapat membuat keputusan yang rasional. Informasi itu antara lain : Farmakokinetik, Farmakodinamik, Dosis, Kontra Indikasi maupun Efek Samping. 2. Perawat adalah professional kesehatan yang paling banyak berhubungan dengan pasien. Informasi yang dibutuhkan perawat antara lain : Cara pemberian obat khususnya sediaan-sediaan parental, aturan pakai, interaksi obat, baik interaksi obat dengan obat lain maupun obat dengan makanan atau minuman, efek samping. 3. Pasien Informasi yang dibutuhkan antara lain: Cara pemakaian atau aturan pakai, jangka waktu terapi, pengaruh makanan pada obat, dan cara penyimpanan obat.

2. Uraian Puskesmas Jumpandang Baru

1) Keadaan Geografi

Puskesmas Jumpandang Baru terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan luas wilayah kerja 4,76 km². dari sejumlah 5 kelurahan terdapat 21 ORW dan 150 ORT. Seluruh wilayah tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat kecuali kelurahan Lakkang dimana untuk sampai ke wilayah tersebut harus melewati sungai dengan menggunakan perahu. Pemanfaatan potensi lahan dan alih fungsi terjadi sedemikian rupa yang akan membawa perubahan terhadap kondisi dan perkembangan sosial dan keamanan masyarakat.

2) Keadaan Demografi

Kependudukan merupakan permasalahan yang dihadapi dewasa ini, bukan hanya menyangkut jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan arus urbanisasi

dengan segala dampak sosial ekonomi, dan keamanan menjadi keharusan untuk mengendalikan angka kelahiran dan kematian. Pertumbuhan mengenai kependudukan mencakup masalah pertumbuhan penduduk dan struktur penduduk menurut kelompok umur.

3) Derajat Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui pengadaan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Menurut konsep H.I. Bloom bahwa tingkat derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetic, perilaku masyarakat, dan lingkungan baik lingkungan fisik, biologis dan sosial budaya. Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan suatu wilayah adalah dengan melihat angka kematian dan kesakitan.

Pada penyakit pada semua golongan umur di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2008 dan 2009 masing-masing adalah 19.785 dan 26.566 orang ini menunjukkan adanya peningkatan angka prevalensi. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. 10 jenis macam penyakit utama puskesmas Jumpandang Baru tahun 2011

No (1)	Penyakit (2)	Jumlah (3)
1	ISPA	5670
2	Penyakit rongga mulut	3574
3	Common Cold	3449
4	Batuk	2260
5	Demam	1920
6	Kulit dan alergi	1831

7	Diare	1434
8	Cephalgia	1001
9	Dispepsia	969
10	Kecelakaan	667
Jumlah		22769

Tabel 8 Kegiatan Jamkesmas Bidang Kesehatan tahun 2011

No	Kegiatan	Satuan	Jumlah
A	Pelayanan kesehatan keluarga		
1	Jumlah sasaran gakin	Jiwa	9483
2	Jumlah gakin yang memiliki jamkesmas	Jiwa	6477
3	Jumlah gakin yang berkunjung	Jiwa	1150
4	Jumlah kunjungan anggota gakin	Jiwa	4993
B	Pelayanan kesehatan		
1	Jumlah sasaran ibu hamil gakin	Jiwa	260
2	Jumlah bumil yang mendapat ANC	Jiwa	-
3	Jumlah Bumil Gkin yang ditolong bidan	Jiwa	100
4	Jumlah Bugas Gakin	Jiwa	99
5	Jumlah ibu melahirkan/ibu nidas gakin yang mendapat pelayanan kesehatan	Jiwa	432
6	Jumlah ibu melahirkan/ibu nidas gakin yang dirujuk ke puskesmas perawatan/rumah sakit	Jiwa	13
7	Jumlah ibu melahirkan/ibu nifas gakin yang dirujuk ke rumah sakit	Jiwa	21
C	Revitalisasi Posyandu		
1	Jumlah penemuan TB paru	Jiwa	72
2	Jumlah penderita TB paru diobati	Jiwa	58
3	Jumlah TB paru sembuh	Jiwa	29
4	Jumlah penderita klinis malaria yang diperiksa	Jiwa	3
5	Jumlah penderita malaria follow up	Jiwa	-

M A K A S S A R

4) Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu perhatian utama.

Puskesmas jumpandang baru merupakan puskesmas dengan Perawatan Rawat Inap (PRI) dan memiliki 1 Pustu yang terletak di kelurahan Lakkang.

5) Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Jumpandang Baru

Program kegiatan yang direncanakan selama 2 minggu di Puseksmas Jumpandang Baru telah dilaksanakan dan mendapat bantuan dari para petugas ouskesmas serta melibatkan masyarakat yang datang ke puskesmas dan posyandu untuk berobat. Program-program tersebut meliputi:

- a) Mengikuti kegiatan poliklinik
- b) Mengikuti kegiatan UGD dan kamar obat
- c) Mengikuti kegiatan kamar bersalin dan ruang ANC
- d) Mengikuti kegiatan Imunisasi
- e) Memberikan penyuluhan KB dan diabetes mellitus
- f) Peninjauan sarana pelayanan HIV, TB dan Narkoba
- g) Diskusi dan peninjauan P3M (Program Penyakit Menular)
- h) Kunjungan Posyandu

G. Rekam Medik

Setiap rumah sakit dipersyaratkan mengadakan dan memelihara rekaman medik yang memadai dari setiap penderita, baik untuk penderita rawat tinggal maupun penderita rawat jalan. Rekam medik itu harus secara akurat didokumentasikan, segera tersedia, dapat digunakan, mudah ditelusuri kembali dan lengkap informasi

1. Definisi

Definisi rekam medik menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik adalah: berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seseorang penderita selama dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap

2. Fungsi

Kegunaan rekam :

- a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita
- b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap professional yang berkontribusi pada perawatan penderita.
- c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan penderita dan penanganan/pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit.
- d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang diberikan kepada penderita.
- e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan praktisi yang bertanggung jawab.
- f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan

H. Tinjauan Islam mengenai riset dan pengobatan

1. Riset dalam Tinjauan Islam

Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu (sains). Al-Qur'an dan al-Sunnah mengajak

kaum Muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat.

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah SWT menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari kesalahan mereka.

Menurut Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Dari Jabir; bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya, jika benar obat yang digunakan dapat melawan penyakit yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh”(H.R. Imam Muslim) (Mahmud M. Mahir Hasan, 2007 : 13-14).

Dalam lafazh Hadist lain, Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً لِمَنْ عِلِمَهُ مِنْ عِلْمِهِ جَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali Dia menurunkan obat penyembuhannya; obat penyakit diketahui bagi yang mengetahuinya, dan tidak diketahui bagi orang jahil (H.R. Ahmad dan As-Sahihah).

Allah SWT telah memberitahukan kepada manusia, bahwa obat itu tidak banyak diketahui oleh semua orang. Oleh karenanya, yang diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui orang yang tidak mengetahuinya. Selain itu, hal ini tidak menafikan tawakal kepada Allah bagi yang menyakini, bahwa kesembuhan tersebut berasal dari Allah dan atas kekuasaan-Nya. Obat tidak dapat menyembuhkan secara zatnya, tetapi berdasarkan kekuasaan Allah SWT. Sesungguhnya, sebuah obat dapat menjadi penyakit bilamana Allah menghendakinya. Hal ini berdasarkan isyarat yang terkandung dalam pernyataan Nabidi atas “Dengan seizin Allah”. Poros dari semua itu adalah takdir dan kehendak Allah SWT, sehingga berobat tidak menafikan tawakal. Demikian pula dengan berbagai macam usaha menghindari berbagai hal yang membahayakan, do'a meminta kesembuhan, menghindari mudarat, dan sebagainya (Ya'qub, 2009: 96)

2. Pengobatan dalam Islam

Peradaban islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ Ayat 26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah SWT. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadist Abu Zubair, dari Zabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:


مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Azza wa jalla [HR. Bukhari]

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan penyakit jasmani (Faiz, 1991: 324). Penyakit jasmani sering muncul karena dipengaruhi oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan dalam makanan atau malas mengonsumsi zat-zat yang gizi seperti vitamin dan sebagainya.

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah SWT.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian secara deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif, yaitu mengambil data catatan medis pasien di masa lampau dimulai dari dependent variable kemudian di cari independent variable sehingga didapatkan persentase kasus (Tjokronegoro, 2013).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di bagian rekam medik Puskesmas Jumpang Baru Makassar Periode januari – Desember 2015

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan uji statistic parameterik dan *cross sectional* dengan pendekatan *chi square* yaitu berdasarkan penentuan mean dan standar deviasi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah semua pasien dengan diagnosis Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpang Baru Makassar Periode Januari – Desember 2015.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) rawat inap di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi Periode Januari – Desember 2015.

E. Kriteria Subjek

Subjek penelitian yang dilakukan yaitu sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

1. Kriteria inklusi
 - a. Pasien yang didiagnosa infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
 - b. Pasien yang mengkonsumsi antibiotic dan terapi dengan obat lain
2. Kriteria eksklusi
 - a. Pasien yang menggunakan obat yang tidak sesuai kegunaan.
 - b. Pasien yang tidak tepat pengobatannya.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berkas catata nmedik yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan secara *purposive sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan pada kriteria yang diinginkan peneliti yaitu berupa data pasien yang diambil dari rekam medis yang lengkap dan resep pada pasien yang dirawat di Puskesmas Jumpandang Baru periode Januari – Desember 2015. Kriteria sampel adalah pasien infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) rawat inap di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar sebagai data retrospektif. Variabel bebas adalah

identitas pasien, penggunaan obat infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), presentase kesembuhan pasien. Variabel terikat adalah pasien dengan diagnosis infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), rekam medik. Analisa data menggunakan uji *Chi square* untuk melihat hubungan antara kedua variabel. Analisa data dilakukan dengan menggunakan data retrospektif.

G. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat
 - a. Pasien dengan diagnosis Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
 - b. Rekam medik
2. Variabel Bebas
 - a. Identitas pasien
 - b. Kesesuaian Penggunaan Obat Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

H. *Penyiapan Sampel*

1. Pengambilan dan pengelompokan sampel

Pengambilan sampel data berdasarkan dari rekam medic pada pasien yang menerima perawatan periode Januari – desember 2015 di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

2. Pengumpulan data

Mengumpulkan semua rekam medic pasien diagnose Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) terhitung tanggal di Puskesmas Jumpandang Baru. Data dari rekam medik dicatat dalam lembar pengumpulan, meliputi:

- a. Nama Puskesmas

- b. Umur
 - c. Jenis kelamin
 - d. Gejala/keluhan
 - e. Diagnosis
 - f. Dosis
 - g. Hasil pengobatan
3. Besar Sampel

Sampel penelitian diambil dari populasi terjangkau dan telah diseleksi berdasarkan kriteria sampel. Jumlah sampel yang memenuhi persyaratan minimal untuk data di analisis statistik disesuaikan dengan tujuan, rancangan penelitian dan tingkat penelitian yang dikehendaki.

Untuk menetapkan jumlah sampel digunakan teknik *purposive sampling* dengan rumus (Notoatmodjo, 2012):

$$n = \frac{Z^2 a/2 \times p (1 - p) N}{d^2(N - 1) + Z^2 a/2 \times p (1 - p)}$$

$$n = \frac{1,96 \times 0,55 (1 - 0,55) 133}{(0,05)^2(133 - 1) + 1,96 \times 0,55 (1 - 0,55)}$$

$$n = \frac{1,96 \times 33}{0,33 + 0,4851}$$

$$n = \frac{64,7}{0,8}$$

$$n = 80,8 \rightarrow 81$$

Dimana :

n = besar sampel

$Z^2 \cdot a/2$ = nilai 2 pada derajat kepercayaan $1 - a/2$ (1,96)

p = proporsihal yang diteliti (0,55)

d = tingkat kepercayaan atau ketepatan yang dipilih 5% (0,05)

N = jumlah populasi (133)

Dari perhitungan rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 81 pasien.

I. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa rekam medik yang berisi identitas responden meliputi : identitas pasien, diagnose penyakit, catatan terapi pengobatan, jenis obat, dosis, frekuensi, durasi, kombinasi, lama pemberian, dan cara pemberian. Data diolah secara manual dan disajikan dalam bentuk table statistik deskriptif.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini akan diawali dengan studi kepustakaan, konsultasi dengan pembimbing, pengurusan izin penelitian. Pengurusan izin penelitian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian pada pihak Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya surat

permohonan izin penelitian ditujukan ke pihak Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dimulaidari pengambilan dan pengelompok kansampel. Pengambilan sampel berdasarkan dari catatan rekam medic pasienrawatinap di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.Setelah pengambilan sampel, dilakukan pengelompok kanpasien yang menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan:

- a. Profil pasien meliputi umur, berat badan, jenisk elamin.
- b. Profil pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), lama pemberian terapi, dosis terapi, efek samping, dosisobatdan ketepatan pemberian obat.

3. Pengolahan Data

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu harus diolah dengan tujuan mengubah data menjadi informasi.Dalampenelitian ini proses pengolahan data melalui empat langkah yaitu :

- a. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan (Hidayat, 2009:107).

b. Coding

Coding adalah kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2009:108).

c. Entri data

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam master tabel atau data base computer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi (Hidayat, 2009:108).

d. Melakukan teknik analisis

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitianakan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis (Hidayat, 2009:108).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Analisis univariat

Analisa ini dilakukan terhadap tiap variable dari hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variable yaitu Data diolah secara deskriptif yang meliputi : karakteristik pasien (usia, jenis kelamin, kategori pengobatan) dan Analisis obat salah (riwayat alergi dengan obat tertentu atau menerima obat ketika ada kontraindikasi) Analisis ketidaktepatan dosis (dosis kurang

dan dosis lebih) dan Analisis interaksi obat menjadi bentuk data tabel persentase.

5. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang disajikan dalam tabulasi silang dengan analisis statistik uji *Chi Square* derajat kemaknaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika hasil uji statistik diperoleh nilai $p < 0,05$ maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel dan jika nilai $p > 0,05$ maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Data dianalisis menggunakan bantuan *software SPSS* versi 20.0 dan tahap kepercayaan yang dipilih adalah 95%.

- 1) Hubungan antara jenis kelamin dengan ketidaktepatan pemilihan obat
- 2) Hubungan klasifikasi isk dengan ketidaktepatan pemilihan obat
- 3) Hubungan antara usia dengan ketidaktepatan dosis
- 4) Hubungan antara lama pengobatan dengan ketidaktepatan indikasi
- 5) Hubungan antara jumlah jenis obat dalam resep dengan banyaknya interaksi

6) Pembahasan Hasil

Pembahasan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian berdasarkan pustaka dan data rekam medik yang telah dianalisis.

7) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil keseluruhan data rekam medik pasien dengan diagnosis ISPA yang dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2015 diperoleh 81 kasus pasien yang masuk kriteria inklusi. Analisis hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian yaitu karakteristik pasien, karakteristik obat dan identifikasi *drug related problems*.

Karakteristik berdasarkan diagnosa penyakit

Tabel 1. Diagnosis pasien rawat inap penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015

	Diagnosis			Total
	faringitis	ISPA	Sinusitis	
Gender Laki-Laki	24	8	0	32
Perempuan	32	15	2	49
Total	56	23	2	81

Karakteristik Obat

Obat yang digunakan

Tabel 2. Distribusi obat yang digunakan pasien anak penyakit infeksi pernafasan Akut di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015

Kelas Terapi	Obat yang digunakan	Jumlah (n=100)
Antibiotik	Amoksisilin	10

	Ampisilin	23
	Cefadroxil	43
	Ciprofloxacin	5
	Klorampenikol	2
	Metronidazole	2
Analgetik-antipiretik	Ibuprofen	2
	Paracetamol	70
Antihistamin	Cetirizine	4
Kortikosteroid	Dexamethasone	10
	Metilprednisolon	34
	Prednisolone	34
Ekspektoran	Ambroxol	10
	Glyceryl Guaiacolate	5
Bronkodilator	Salbutamol	1
Antikonvulsan	Diazepam	2
	phenobarbital	2
H2-Blocker	Ranitidin	2
Total		271

Tabel 3. Presentase Jumlah Interaksi Obat Berdasarkan Signifikansinya pada pasien rawat inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015

Level Signifikan		jumlah Kasus		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
2		1	3	4
4		26	5	31
5		5	10	15
	Tidak Ada Keterangan	0	1	1
Total		32	19	51

Tabel 4. Presentase Drug Related Problems Kategori Interaksi Obat pada pasien rawat inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015

Level Signifikan	Tingkat Keparahan	Dokumentasi	Obat yang berinteraksi	Interaksi	Pengawasan	Jml
1 (Tatro, 2001)	- Moderat	- Established	- Fenobarbital	- Dexametason dapat Dexametason menstimulus metabolisme kedua darifenobarbital yaitu menginduksi efek dari hati, sehingga fenobarbital akan menurunkan efek deksametason (Tatro, 2001)	- Jika terjadi, sebaiknya hindari kombinasi fenobarbital- dexametason atau monitoring secara hati-hati bila perlu hentikan terapi (Tatro, 2001)	- 2
2 (Tatro, 2001)	-	-	-	-	-	-
3 (Tatro, 2001)	- Mayor	- <i>Possible</i>	- Ampisilin- kloramfenikol	- Kombinasi terapi ampisilin- kloramfenikol dapat meningkatkan resistensi H. Influenzae kloramfenikol dapat mengurangi efek penisilin (Tatro, 2001)	- Tidak ada penanganan saat terjadi interaksi tetapi memerlukan monitoring. Kombinasi ampisilin- kloramfenikol juga memiliki efek sinergis (Tatro, 2001)	1
4 (Tatro, 2001)	Moderat	<i>Possible</i>	Parasetamol - Fenobarbital	Parasetamol dapat menurunkan	Dilakukan monitoring saja saat parasetamol-	9
	Moderat		Kloramfenikol			4

			- phenobarbital	terapi efek fenobarbital (Tatro, 2001) Kloramfenikol meningkatkan kadar fenobarbital dengan menurunkan metabolisme (Tatro, 2001)	penobarbital di berikan (Tatro, 2001) Dimonitoring kadar antibiotic dalam level plasma. Jika terjadi efek samping karena interaksi sebaiknya dosis phenobarbital diturunkan saat dikombinasi dengan kloramfenikol (Tatro, 2001)	
5 (Tatro, 2001)	Minor	<i>Unlikely</i>	Kloramfenikol – parasetamol	Penggunaan secara bersamaan antara parasetamol- kloramfenikol dapat mempengaruhi aksi farmakokinetik dari kloramfenikol (Tatro, 2001).	Tidak perlu dilakukan monitoring karena jarang sekali ditemukannya interaksi (Tatro, 2001)	15
Tidak ada keterangan	-	-	FEnobarbital – metronidazole	FEnobarbital dapat meningkatkan metabolisme dari metronidazole dan kegagalan terapi (Sokley, 2003)	Monitoring efek kedua obat saat dikombinasi (Stokley, 2003)	1
Total						51

Keterangan :

Level signifikansi

- 1 = mayor, suspected (efeknya dapat mengakibatkan kematian atau menyebabkan kerusakan permanen, efeknya bisa muncul dan ada data yang tersedia).
- 2 = moderat, suspected (bisa menunggu status klinik pasien, terapi tambahan, rawat inap di RS atau perpanjangan rawat inap di RS mungkin dibutuhkan, (efeknya bisa muncul dan ada data yang tersedia). Established (terbukti terjadi dalam klinik trial)
- 3 = minor, suspected (efeknya ringan, tidak mengganggu hasil terapi, efeknya bisa muncul dan ada data yang tersedia).
- 4 = mayor/moderat, possible (efeknya mungkin muncul tetapi data yang ada terbatas).
- 5 = minor, possible/unlikely (efeknya mungkin muncul tetapi data yang ada terbatas atau diragukan, tidak ada data tentang klinisnya).

Tabel 5. Presentase Kejadian DRPs pada pasien rawat inap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015\

Jenis DRPs	Varian	(n) kasus	n (%)	Total (%)
Interaksi Obat	Berpotensi	51	62,96	81 (100%)
	Tidak	30	37,40	
Dosis	Tepat	15	18,51	81 (100%)
	Lebih	26	32,10	
	Kurang	40	49,38	

B. Pembahasan

Tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa sebaran diagnosis ISPA terbanyak di rawat inap Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2015 yaitu faringitis sebanyak 56%. Hal ini karena Streptococci hemolitik Grup A (*Streptococcus pyogenes*) banyak dijumpai pada kasus faringitis sebanyak 5-20% pada faringitis dewasa (Depkes, 2009). Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 58 kasus yang masuk kedalam kriteria klasifikasi seperti diagnosis sinusitis dan faringitis, sedangkan 23

kasus yang didiagnosis mengalami ISPA tetapi pada rekam medik tidak jelas jenis penyakit ISPA apa yang diderita pasien, tidak bias diklasifikasikan untuk dianalisis.

Berdasarkan tabel 2 dari hasil analisis penggunaan terapi obat lain pada pengobatan ISPA, didapatkan penggunaan obat terbesar adalah analgetik-antipiretik yaitu parasetamol sebanyak 70 obat (97,8%). Analgetik-antipiretik digunakan untuk pengobatan simptomatik. Parasetamol dapat mengobati panas yang dapat terjadi karena adanya infeksi pada pasien, sehingga tubuh mengalami gangguan metabolisme yang mengakibatkan suhu tubuh meningkat (Tjay danRaharja, 2007).Penggunaan parasetamol lebih disukai karena kurang mengiritasi lambung dibandingkan dengan asetosal (IONI, 2008).

Jenis antibiotik yang diresepkan untuk penyakit infeksi saluran pernafasan akut berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya adalah amoksisilin, ampisilin, cefadroxil, ciprofloxacin, klorampenikol, metronidazole. Dilihat pada tabel 2, bahwa antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan penisilin yaitu ampisilin sebanyak 43 obat (45,3%). Aktif terhadap kuman positif dan beberapa kuman negatif seperti E.coli, H.influenzae, Salmonella, semua kuman tersebut dapat dihambat oleh ampisilin sehingga ampisilin banyak digunakan untuk mengatasi infeksi saluran nafas (Tjay dan Raharja, 2007).

Ranitidin merupakan antagonis reseptor H₂ untuk mengatasi tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin-H₂ (IONI, 2008). Ranitidin daya menghambatnya terhadap sekresi asam lebih kuat dari pada simetidin, tetapi lebih ringan

dibandingkan penghambat pompa proton seperti omeprazol. Obat ini tidak merintangi perombakan oksidatif dari obat-obat lain, sehingga tidak mengakibatkan interaksi yang tidak diinginkan (Tjay dan Raharja, 2007).

Drug Related Problems (DRPs)

Kategori DRPs pada penelitian ini meliputi kategori obat salah, ketidaktepatan dosis meliputi dosis kurang dan dosis lebih serta potensial interaksi obat. Penelitian ini didasarkan pada data rekam medik yang diambil dari 81 pasien dengan jumlah obat yang digunakan sebanyak 271 obat. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 58 kasus yang masuk kedalam kriteria klasifikasi seperti sinusitis dan faringitis, sedangkan 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA, tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis, karena tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien.

1. Presentase Kejadian DRPs.

a. Obat Salah

Berdasarkan hasil penelitian terapi pengobatan, dari 58 kasus yang masuk ke dalam klasifikasi sinusitis dan faringitis, tidak ditemukan kategori DRPs obat salah dari total obat yang dianalisis. Obat salahnya yaitu obat kontraindikasi dengan pasien, obat tidak efektif, pasien alergi, dan pasien menerima obat efektif tetapi tidak aman (Cipolle et al., 1998). Sedangkan 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, sehingga tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis.

b. Dosis Kurang

Menurut Cipolle *et al.*, (1998), penyebab tidak efektifnya terapi obat pada pasien antara lain pasien menerima obat dalam jumlah dosis kecil terapi dibanding dari dosis lazim yang meliputi besaran, frekuensi dan durasi. Dosis kurang dapat menyebabkan waktu pengobatan menjadi lebih lama dan biaya pengobatan menjadi mahal.

Berdasarkan hasil penelitian dari 58 kasus klasifikasi sinusitis dan faringitis, sebanyak 40 kasus (49,38%) DRPs dosis kurangnya terbagi menjadi besaran kurang sebanyak 34 kasus (85%) dan tidak ditemukan adanya durasi kurang dalam penelitian DRPs kategori dosis kurang dari total obat yang dianalisis. Sedangkan untuk 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, sehingga tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis.

Meningkatnya efek samping obat dan bahkan kematian disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional., selain itu penggunaan terlalu singkat atau terlalu lama pada jenis antibiotik juga akan menimbulkan resistensi (Refdanita *et al.*, 2004).

c. Dosis Lebih

Pemberian dosis yang melebihi standar pemberian pada pasien dapat meningkatkan resiko efek toksik yang membahayakan bagi pasien (Cipolle *at al.*,

1998). *Drug related problems* kategori dosis lebih adalah pasien yang menerima obat dengan durasi, frekuensi dan durasi melebihi dosis lazim. Kejadian DRPs kategori dosis lebih sebanyak 26 kasus (32,10%) dari total obat yang dianalisis pada 58 kasus klasifikasi sinusitis dan faringitis. Sedangkan untuk 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, sehingga tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis.

Kategori DRPs dosis lebih dibagi menjadi besaran lebih sebanyak 26 kasus (32,10%), berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 kasus (25%) penggunaan metronidazole dan 6 kasus pada penggunaan klorampenikol pada besaran lebih, penggunaan metronidazole dosis tinggi atau karena penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan neuropati pettier yang merupakan efek samping yang sering yang dapat terjadi pada sistem saraf, sedangkan penggunaan klorampenikol dapat menyebabkan efek samping hematologi yang berat jika diberikan secara sistemik, pemberian dosis tinggi pada neonatus dapat menyebabkan sindrom dengan metabolisme hati yang belum matang (IONI, 2008).

Untuk obat-obatan yang bersifat *symptoms* (yang menghilangkan gejalanya bukan penyebabnya) pengurangan dosis atau frekuensinya dapat dilakukan untuk meminimalkan efek samping yang merugikan dengan menyesuaikan dengan kondisi pasien (WHO, 2010).

d. Interaksi Obat

Identifikasi *drug related problems* untuk kategori interaksi obat didasarkan pada pemakaian obat yang bersamaan dalam 1 hari. Interaksi obat terjadi bila dua atau lebih obat berinteraksi sehingga toksisitasnya dan keefektifitasnya berubah dari satu atau dua obat (Fradgley, 2003).

Pada penelitian ini, interaksi obat dianalisis dengan buku standar yaitu *Drug Interaction* (Stockley et al, 2009) dan *Drug Interaction Facts* (Tatro, 2001) yang kemudian ditemukan adanya beberapa interaksi obat pada pasien ISPA.

1) Interaksi obat berdasarkan tingkat signifikansinya

Level signifikan digunakan untuk melihat jumlah interaksi obat dengan obat lain. Jumlah dan macam obat berdasarkan level signifikansinya dapat dilihat pada tabel 3.

Data mengenai klasifikasi interaksi berdasarkan level signifikansinya ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk menentukan prioritas penanganan interaksi yang terjadi secara klinik. Level signifikan interaksi 1,2, dan 3 merupakan interaksi yang seharusnya diprioritaskan untuk dicegah dan diatasi, sedangkan interaksi dengan level signifikan 4 dan 5 jarang terjadi tetapi cukup diperlukan monitoring terjadinya interaksi.

Berdasarkan label 4 dari hasil penelitian interaksi obat yang paling banyak terjadi yaitu pada penggunaan kombinasi obat ampisilin-klorampenikol sebanyak 18

kasus (35,29%), Menurut Tatro (2001), interaksi yang terjadi antara ampisilin-klorampenikol termasuk level 4 dengan tingkat keparahan mayor dan terdokumentasi possible, artinya interaksi obat belum pasti terjadi, tetapi jika terjadi interaksi berefek fatal dan dapat menyebabkan kematian, tidak ada penanganan saat terjadi interaksi tetapi memerlukan monitoring.

Banyaknya jumlah obat yang diberikan pada masing-masing pasien mengakibatkan potensial kemungkinan terjadinya interaksi obat yang cukup besar selama terapi.

2) Interaksi obat yang belum diketahui level signifikannya

Level signifikan yang belum diketahui interaksi yang terjadi dikarenakan belum terdapat monografi interaksi obat dalam Drug Interaction Fact oleh Tatro tahun 2001. Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya obat yang dilaporkan ketika buku tersebut disusun, terjadinya interaksi kombinasi obat yang baru didapatkan dari Stockley tahun 2009.

2. Presentase kasus kejadian DRPs

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebanyak 81 kasus kejadian DRPs yang terjadi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2015. Angka kejadian DRPs terbanyak adalah pada potensial interaksi obat yaitu 51 kasus (62,96%), dosis kurang sebesar 40 kasus (49,38%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (32,10%), dan tidak temukan kasus pada DRPs kategori obat salah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada 81 sampel pasien rawat inap penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Jumpandang Baruta tahun 2015 ditemukan DRPs kategori interaksi obat sebanyak 51 kasus (62,96%), dosis kurang sebanyak 40 kasus (49,38%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (32,10%), dan tidak ditemukannya DRPs kategori obat salah dari total obat yang dianalisis.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian DRPs aktual yang merupakan terjadinya problem yang berkaitan dengan terapi obat yang sedang diberikan pasien.
2. Perlu adanya penelitian DRPs secara prospektif yaitu karakteristik pasien dipantau atau ditindak lanjuti untuk jangka waktu tertentu sehingga penelitian dapat langsung mengkonfirmasi kepada dokter.

KEPUSTAKAAN

- Departemen Agama Republik Indonesia..*Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta : PT. Syamil. 2005
- Adiguna, Parjan. 2011. 45. *Drug Related Problems Pharmaceutical Care*. Yogyakarta : Genius Publisher.
- Aslam, Geo F., Butel, Janet S., Morse, Stephen A. 2011. 135. *Mikrobiologi Kedokteran*, 1st ed. Jakarta : Salemba Medika.
- Bunga, Sari. 2012. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Makassar*. Makassar : STIKES Nani Hasanuddin Makassar.
- Choerunnisa N, Tjiptaningrum A, Basuki W. 2013. *Proportion Of positive IgM Anti Streptococcus pneumonia 09 Examination Using Tubex With Positive Widal Examination In Clinical Patient Of Acute Respiratory Infections In Dr. H. Abdul Moeloek Hospital Bandar Lampung*. Lampung : Medical Faculty of Lampung University.
- Daniel, K Onion. 2012. 118 – 129. *Kedokteran Internasional*. Jakarta : Indeks.
- Dahlan, sopiyudin M. 2011. *Besar Sampel dan cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Medika.
- Departemen Farmakologi dan Terapi FKUI. 2007. *Farmakologi dan Terapi*. Ed. 5. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia. Edisi IV*. Departemen Kesehatan. Jakarta : Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Pharmaceutical care untuk penyakit infeksi pernafasan*. Departemen Kesehatan. Jakarta : Handbook.
- Fauziah, Sitti. Dkk. 2010. 6. *Drug Related Problems*. Jakarta : Indeks.
- F.H. Kayser *et al*. 2011. 56 – 58. *Pedoman Pemberantasan Penyakit ISPA*. Jakarta : Thieme.

- Fradgley. 2013. *The Evaluation of Drug Interaction*. Western CT State University.
- Hidayat M. 2009. 107 – 108. *Metodologi Penelitian Pengolahan Data dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Henry F. Dkk. 2010. 68 – 76. *Jenis-Jenis Drug Related Problems*. Jakarta : Indeks.
- Hepler F. Dkk. 2011. 45. *Jenis-Jenis Drug Related Problems*. Jakarta : Indeks.
- Irianto, Koes. 2013. 208. *Drug Related Problems*. Jakarta : Panduan Medis dan Klinis.
- Kohet al, Morse AS. 2013. *Medical Drug Interaction. International Edition. 22nd ed.* New York: McGraw-Hill.
- Locke, Thomas. 2013. 242. Dkk. *Microbiology and Infectious Diseases*. Jakarta : Indeks.
- Mims, Pte Ltd. 2013. *MIMS Petunjuk Konsultasi*. Jakarta : PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Tentang Penggunaan Antibiotik*. Jakarta
- Pharmaceutical Care Network Europe Foundation. 2006. *Classification for Drug Related Problems*. The Netherlands: PCNE
- Playfair, J.H.L. Dkk. 2012. *At a Glance Immunology Edisi Kesembilan*. Jakarta : Erlangga.
- Qauliyah, Asta. 2010. 55 – 56. *Pharmaceutical Care and Drug Related Problem*. Available from: <http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-pharmacy-drug-related-problem-dan-pharmaceutical-care/> (Accessed: 2015 December 12).
- Sarwono, Sudoyo. 2011. *Mengenal SPSS Statistics 21 Aplikasi Untuk Riset Eksperimen*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Siagian, M, Suriadi. 2010. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Gramedia.
- Stockley and Lee JF. 2009. *Stockley's Drug Interaction Eight Edition*. London: Pharmaceutical Press.
- Syahrurachman, Agus, Dkk. 2013. 241. *Mikrobiologi Kedokteran edisi revisi*. Binarupa Aksara.
- Tatro K. 2001. *Drug Interaction* [Internet]. [cited 2015Des2]. Available from: <http://textbookofpharmacy.net/InteractionDrug.html>

Tjokronegoro. 2013. *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*. Jakarta : Balai penerbit FKUI.

Wardani, Sri. 2012. *Penyakit Infeksi Tropik Pada Anak*. Penerbit Buku Kedokteran : EGC.

World Health Organization. 2014. *The Acute Respiratory Infection Strategy*. Geneva : Spanyol.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diagnosis pasien rawat inap penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di puskesmas jumpandang baru tahun 2015

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
gender * diagnosis	81	100.0%	0	.0%	81	100.0%

gender * diagnosis Crosstabulation

			diagnosis			Total
			faringitis	ISPA	Sinusitis	
gender	Laki-Laki	Count	24	8	0	32
		% within gender	75.0%	25.0%	.0%	100.0%
	Perempuan	Count	32	15	2	49
		% within gender	65.3%	30.6%	4.1%	100.0%
Total		Count	56	23	2	81
		% within gender	69.1%	28.4%	2.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.784 ^a	2	.410
Likelihood Ratio	2.489	2	.288
Linear-by-Linear Association	1.336	1	.248
N of Valid Cases	81		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.784 ^a	2	.410
Likelihood Ratio	2.489	2	.288
Linear-by-Linear Association	1.336	1	.248
N of Valid Cases	81		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.

Diagnosis pasien rawat inap penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di puskesmas jumpandang baru tahun 2015

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelas Terapi * jumlah pasien yang menggunakan obat tersebut	291	100.0%	0	.0%	291	100.0%

Kelas Terapi * jumlah pasien yang menggunakan obat tersebut Crosstabulation

			jumlah pasien yang menggunakan obat tersebut																		
			Amoksilin	Ampisilin	Cefadroxil	Ciprofloxacin	klorampenikol	Metronidazole	ibuprofen	Paracetamol	Cetirizine	Dexametason e	Metilprednisol on	Prednisolon	Ambroxol	Glyceryl Guaiacolate	Salbutamol	Diazepam	Phenobarbital	Ranitidin	Total
Kelas Terapi	Antibiotik	Count	10	43	4	1	22	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		% within Kelas Terapi	10.5%	45.3%	4.2%	1.1%	23.2%	15.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%
	Analgetik-Antipiretik	Count	0	0	0	0	0	0	2	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.2%	97.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%
	Antihistamin	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%
	Kortikosteroid	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	0	15
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	66.7%	26.7%	6.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%
	Ekspektoran	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	27
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	92.6%	7.4%	.0%	.0%	.0%	.0%
	Bronkodilator	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	.0%	.0%	.0%
	Antikonvulsan	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	0	39
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	61.5%	38.5%	.0%
	H2-Blocker	Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		% within Kelas Terapi	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Total	Count	Count	10	43	4	1	22	15	2	90	20	10	4	1	25	2	1	24	15	2	291
		% within Kelas Terapi	3.4%	14.8%	1.4%	.3%	7.6%	5.2%	.7%	30.9%	6.9%	3.4%	1.4%	.3%	8.6%	.7%	.3%	8.2%	5.2%	.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2037.000 ^a	119	.000
Likelihood Ratio	937.052	119	.000
Linear-by-Linear Association	259.080	1	.000
N of Valid Cases	291		

a. 128 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00.

Persentase jumlah interaksi obat berdasarkan signifikansinya pada pasien rawat inap infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di puskesmas jumpandang baru tahun 2015

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Level Signifikan * jumlah Kasus	51	96.2%	2	3.8%	53	100.0%

Level Signifikan * jumlah Kasus Crosstabulation

	jumlah Kasus		Total
	Laki-Laki	Perempuan	

Level Signifikan	2	Count	1	3	4
		% within Level Signifikan	25.0%	75.0%	100.0%
	4	Count	26	5	31
		% within Level Signifikan	83.9%	16.1%	100.0%
	5	Count	5	10	15
		% within Level Signifikan	33.3%	66.7%	100.0%
Tidak Ada Keterangan	Count	0	1	1	
	% within Level Signifikan	.0%	100.0%	100.0%	
Total	Count	32	19	51	
	% within Level Signifikan	62.7%	37.3%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.592 ^a	3	.001
Likelihood Ratio	16.365	3	.001
Linear-by-Linear Association	.880	1	.348
N of Valid Cases	51		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .37.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURWAHIDAH AMIR dilahirkan di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 02 Maret 1994, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Memet Amir dan Masturi. Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah TK Aisyah Busthanul Athfal Tallo Makassar, dan melanjutkan sekolah dasarnya di SDN Pongtiku 1 Makassar dan menamatkannya pada tahun 2006. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 10 Makassar pada tahun 2006-2009. Kemudian menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar Jurusan Farmasi tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R