

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
HIPERTENSI STADIUM 1 DAN STADIUM 2 PADA LANSIA DESA
BORIMATANGKASA DUSUN BONTOSUNGGU KEC.BAJENG BARAT**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUKMAWATI
70300112079

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan inayah-Nya penulisan proposal ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “Faktor –fakto yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec. Bajeng Barat.Selesainya proposal Ini berkat bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua atas nama **INDOTANG** selaku ibu, **AMBO UPE** selaku bapak saya yang telah membimbing dan selalu memberi saya dukungan selama hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc, P.hd** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan


3. **Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes**, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes**, selaku Pembimbing I dan **Patimah, S.Kep, Ns., M.Kes**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arah guna penyempurnaan penulisan proposal ini.
5. **Hasnah,S.Sit, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku penguji I dan **Prof.Dr.Rahim Yunus, M.Ag**, selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan serta arah guna penyempurnaan penulisan proposal ini.
6. Sahabat – sahabat seperjuangan yaitu **Nur fitra, Saharia Miranti, Nurfadilah Salam, Marwah, Kiki Hardyanti, Zulfi Yunita, Muh,Dhinul Al Musyawir, Muh. Saddang** yang telah memberikan support dan dukungan yang diberikan selama penyusunan proposal ini.
7. Teman-teman Keperawatan 2012 atas segala support dan dukungan yang diberikan selama penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan proposal ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Aaamiin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, September 2016



Abstrak

Nama : Sukmawati

Nim : 70300112079

Judul : faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia desa borimatangkasa dusun bontosunggu kec.bajeng barat

Penyakit hipertensi merupakan *the silent disease* karena orang tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Hipertensi merupakan penyebab terbesar dari kejadian stroke, baik tekanan darah sistolik maupun diastoliknya.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitik* dengan pendekatan *cross sectional study* untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec. Bajeng Barat.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan asupan garam ($p = 0,323$), kebiasaan konsumsi makanan berlemak ($p = 0,515$), umur ($p = 0,101$), aktifitas fisik ($p = 0,567$), dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

Tidak terdapat hubungan antara kebiasaan asupan garam dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia, tidak terdapat hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia, tidak terdapat hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia, tidak terdapat hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

Berdasarkan hasil analisis bivariat dari keempat variabel yang diteliti tidak terdapat hubungan yang signifikan karena didapatkan nilai keseluruhannya adalah $p\text{ value} > 0,05$. Dan berdasarkan analisis multivariat dari keempat variabel konsumsi asupan garam yang mempunyai kekuatan hubungan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi makanan berlemak, umur dan aktifitas fisik.

Kata Kunci: hipertensi stadium 1 dan stadium 2, lansia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Hipotesis.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif.....	5
G. Kajian Pustaka.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Hipertensi.....	12
B. Tinjauan umum tentang Proses Menua.....	25
C. Kerangka Konsep.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Populasi, Sampel Dan Metode Pengumpulan Data.....	33
1. Populasi.....	33
2. Sampel Penelitian.....	34

3. Metode Pengambilan Sampel	34
D. Teknik Pengambilan Sampel	35
E. Pengumpulan Data	35
F. Instrument Penelitian	36
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisa Data	37
H. Pertimbangan Etik	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil penelitian.....	42
1. Karakteristik Responden	42
2. Analisis Univariat	43
3. Analisis Bivariat	45
4. Analisis Multivariat	48
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 klasifikasi Hipertensi	13
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur	42
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan hipertensi	43
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan konsumsi asupan garam	43
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan konsumsi makanan berlemak	44
Tabel 4.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur	44
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan aktifitas fisik	45
Tabel 4.7 Hasil uji chisquere hubungan asupan garam dengan hipertensi pada lansia	45
Tabel 4.8 Hasil uji chisquere hubungan makanan berlemak dengan hipertensi pada lansia	46
Tabel 4.9 Hasil uji chisquere hubungan umur dengan hipertensi pada lansia	47
Tabel 4.10 Hasil uji chisquere hubungan aktifitas fisik dengan hipertensi pada lansia	48
Tabel 4. 12 Hasil uji regresi logistik linear	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konsep..... 31



BAB I

PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*

Kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penderita yang datang ke berbagai pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Shaleh menyatakan bahwa pelayanan kesehatan pada masa ini sudah merupakan pusat industri jasa kesehatan dimana setiap rumah sakit bertanggung jawab terhadap penerima jasa kesehatan. Keberadaan dan mutu pelayanan yang diberikan ditentukan oleh nilai-nilai dan harapan dari penerima jasa pelayanan, dimana kepuasan pasien sebagai konsumen masih tetap menjadi tolak ukur utama keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan, (Saleh, 2014).

Penyakit hipertensi merupakan *the silent disease* karena orang tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Hipertensi merupakan penyebab terbesar dari kejadian stroke, baik tekanan darah sistolik maupun diastoliknya (Rudianto, 2013).

Penyakit darah tinggi atau hipertensi telah menjadi penyakit yang umum diderita oleh banyak masyarakat Indonesia (Ira Haryani, 2014). Di Indonesia, ancaman hipertensi tidak boleh diabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kian hari penderita hipertensi di Indonesia semakin meningkat. Namun sayangnya dari jumlah total penderita hipertensi tersebut, baru sekitar 50% yang terdeteksi. Dan diantara penderita tersebut hanya setengahnya yang berobat secara teratur (Suraioka, 2012).

Menurut WHO dan *the internasional society of hypertension* (ISH) tahun 2012, saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi di seluruh dunia, dan tiga juta

di antaranya meninggal setiap tahunnya, 7 dari setiap 10 penderita tersebut tidak mendapatkan pengobatan secara akurat. (Kemenkes RI, 2012).

Menurut catatan badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) tahun 2011, ada 1 milyar orang di dunia menderita hipertensi dan dua per tiga di antaranya berada negara berkembang yang berpenghasilan rendah-sedang. Prevelensi hipertensi di perkirakan akan terus meningkat, dan di prediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. hipertensi dikenal sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan telah menyebabkan 30% dari kematian di seluruh dunia dan prevalensinya sebesar 37,4%.

Bahaya penderita hipertensi di perkirakan sebanyak 15 juta bangsa Indonesia tetapi hanya 4% yang terkontrol berarti mereka yang menderita hipertensi dan tahu mereka menderita hipertensi. Lebih di kemukakan 50% penderita tidak menyadari dirinya sebagai penderita hipertensi karena itu mereka cenderung menderita hipertensi yang lebih karena tidak berubah dan menghindari faktor resiko (Abidin & Nawi 2011).

Dari berbagai survei di dapatkan dalam 10 tahun terakhir prevelensi hipertensi meningkat secara bermakna. Hipertensi merupakan penyumbang kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) yang meningkat dari 41,7% menjadi 60% survei terakhir di Indonesia menunjukkan PTM mendominasi 10 urutan teratas penyebab kematian pada semua kelompok umur, dengan stroke yang merupakan komplikasi hipertensi sebagai penyebab kematian nomor satu. (Kementrian Kesehatan, 2013).

Dari 33 propinsi di Indonesia terdapat 8 propinsi yang kasus penderitanya hipertensi melebihi rata-rata nasional yaitu: Sulawesi Selatan (27%), Sumatera Barat (26%), Jawa Timur (25%), Sumatera Utara (24%), Sumatera Selatan (24%),

Riau 23%, dan Kalimantan Timur 22%. Sedangkan dalam perbandingan kota di Indonesia kasus hipertensi cenderung tinggi pada daerah urban seperti: Jobadetek, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar yang mencapai 30-34%. (Dewi, 2013).

Data Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan jumlah kasus baru di kota Makassar pada tahun 2010 sebanyak 13.803 kasus. Tahun 2011 kasus hipertensi meningkat menjadi 25.332 kasus. (Rini Anggraeny. dkk, 2013).

Berdasarkan observasi langsung didapatkan data di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec Bajeng Barat bahwa jumlah lansia yang mengalami hipertensi pada tahun 2014 berjumlah 77 orang, pada tahun 2015 sebanyak 83 orang dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah lansia sekitar 98 orang.

Dari data yang di dapatkan maka peneliti tertarik untuk meleksanakan penelitian tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat ?

3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : “Adakah faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia. “

4. Tujuan

a. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan asupan garam dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.
3. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.
4. Untuk mengetahui hubungan antara kurangnya aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.
5. Untuk mengetahui variabel yang paling berhubungan dengan keempat variabel diatas dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi institusi pelayanan kesehatan.

Manfaat penelitian ini bagi institusi pelayanan kesehatan adalah sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pelayanan keperawatan dalam penatalaksanaan hipertensi pada lansia serta memberikan informasi kepada institusi pelayanan kesehatan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

b. Bagi institusi pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan adalah sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang hipertensi pada lansia.

c. Bagi masyarakat.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk menambah informasi bagi masyarakat tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia sehingga masyarakat mampu melakukan upaya pencegahan hipertensi.

6. *Definisi Operasional*

1. Hipertensi

Yang dimaksud dengan hipertensi dalam penelitian ini adalah kondisi responden yang memiliki tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg atau keduanya dengan menggunakan alat ukur spignomanometer. Dikatakan hipertensi apabila pernah melakukan pengukuran tekanan darah dan hasilnya tetap tinggi setelah diperiksa 3 kali dalam waktu yang berbeda.

Kriteria objektif

a. Skor 1 : hipertensi stadium I (140 / 90 – 159/99 mmHg)

b. Skor 2 : hipertensi Stadium II ($\geq 160/100$ mmHg)

2. Konsumsi asupan garam

Yang dimaksud dengan konsumsi asupan garam dalam penelitian ini adalah frekuensi konsumsi asupan garam oleh responden selama satu hari, satu minggu, dan satu bulan, alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner tabel *Food Frekuensi Questioner* (FFQ).

Kriteria objektif

- a. Kurang : Jika mempunyai total skor dari frekuensi konsumsi semua jenis bahan makanan asin yang biasa dikonsumsi oleh responden dibawah rata-rata skor frekuensi konsumsi semua responden.

Skor 1 : 4 – 6 kali / minggu

Skor 2 : 1 – 3 kali / minggu

- b. Lebih : Jika mempunyai total skor dari frekuensi konsumsi semua jenis bahan makanan asin yang biasa dikonsumsi oleh responden di atas rata-rata skor frekuensi konsumsi semua responden

Skor 1 : 4 – 5 kali/hari

Skor 2 : 6 – 7 kali /hari

3. Konsumsi makanan berlemak

Yang dimaksud dengan konsumsi makanan berlemak dalam penelitian ini adalah frekuensi konsumsi jenis makanan lemak oleh responden selama satu hari, satu minggu, dan satu bulan, alat yang digunakan yaitu kuesioner tabel *Food Frekuensi Questioner* (FFQ).

Kriteria objektif

- a. Kurang : Jika mempunyai total skor dari frekuensi konsumsi semua jenis bahan makanan berlemak yang biasa dikonsumsi oleh responden dibawah rata-rata skor frekuensi konsumsi semua responden.

Skor 1 : 4 – 6 kali / minggu

Skor 2 : 1 – 3 kali / minggu

b. Lebih : Jika mempunyai total skor dari frekuensi konsumsi semua jenis bahan makanan berlemak yang biasa dikonsumsi oleh responden di atas rata-rata skor frekuensi konsumsi semua responden.

Skor 1 : 4 – 5 kali/hari

Skor 2 : 6 – 7 kali /hari

4. Kurangnya aktifitas fisik

Adalah Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi

Kriteria Objektif

- Baik bila skor yang diperoleh ≥ 5
- Buruk bila skor yang diperoleh ≤ 5

7. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Djauhar, Dkk 2013 Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke (15,4 %) dan tuberkulosis (7,5 %), yakni mencapai 6,8 % dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hipertensi ditemukan sebanyak 60-70% pada populasi berusia di atas 65 tahun. Kelompok usia lanjut di wilayah Puskesmas Gribig berjumlah 11.736 orang, sedangkan jumlah usia lanjut di Desa Klumpit adalah 2.284 orang. Hipertensi pada lansia menempati urutan kedua pada daftar penyebab kematian. Data 10 besar penyakit menunjukkan hipertensi juga berada pada urutan kedua setelah ISPA.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Talumewo Merlisa C, dkk 2013 Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hipertensi merupakan penyebab kematian utama ketiga di Indonesia untuk semua umur, yaitu mencapai 17-21% dari proporsi penduduk dan kebanyakan tidak terdeteksi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan desain case control study. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada bulan Juli – Oktober 2014. Populasi kelompok kasus dalam penelitian ini adalah seluruh pasien berusia 40-65 tahun yang didiagnosis pertama kali oleh dokter menderita hipertensi bulan April-Juni 2014 di wilayah kerja Puskesmas Airmadidi. Pengambilan sampel berdasarkan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebesar 52 kelompok kasus dan 52 kelompok kontrol dan dilakukan matching berdasarkan jenis kelamin, umur dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Data diambil melalui kuesioner dan wawancara langsung. Analisis data dilakukan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan CI 95%, tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Hasil uji statistik menunjukkan faktor risiko kebiasaan merokok mempunyai hubungan yang bermakna dengan hipertensi ($p = 0,001$; OR = 4,36; CI = 1,71–11,06), faktor risiko konsumsi alkohol menunjukkan hubungan yang bermakna dengan hipertensi ($p = 0,046$; OR = 4,54; CI = 0,91-22,5) begitu juga dengan riwayat keluarga menunjukkan hubungan yang bermakna dengan hipertensi ($p =$

0,000; OR = 17,71; CI = 5,5-56,5). Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Margaret Elisabeth Manik 2011. Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan karena merupakan penyakit The Silent Killer (sering kali dijumpai tanpa gejala). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi secara nasional mencapai 31,70%. Menurut hasil penelitian Yulia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Sering (2011) dengan menggunakan desain penelitian cross sectional, ditemukan prevalensi rate hipertensi lansia sebesar 35,58%. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah stroke dan tuberkulosis, dengan PMR (Proportional Mortality Rate) mencapai 6,70% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hipertensi terkait dengan beberapa faktor yaitu pendidikan, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik. Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Parsoburan tahun 2011 dilakukan penelitian survei analitik melalui pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua lansia yang berkunjung di tiga posyandu lansia pada Agustus 2011 yang berjumlah 105 orang (total sampling). Analisis data dilakukan dengan univariat dan bivariat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh point prevalence rate hipertensi 30,50%, proporsi responden hipertensi tertinggi pada kelompok umur ≥ 60 tahun (31,70%), jenis kelamin perempuan (31,60%), pendidikan SD (54,50%), pensiunan/ tidak bekerja (33,30%), ada riwayat keluarga (70,60%), obesitas

(34,40%), aktivitas fisik tidak cukup (47,60%), dan merokok (32,40%). Hasil analisis bivariat terdapat 3 variabel yang mempunyai hubungan signifikan dengan hipertensi lansia yaitu pendidikan ($p=0,016$), riwayat keluarga ($p=0,000$; $RP=3,106$), dan aktivitas fisik ($p=0,002$; $RP=2,500$). Kepada petugas posyandu lansia agar terus menggalakkan kegiatan senam lansia setiap minggunya sehingga risiko terjadinya hipertensi pada lansia dapat dihindari, dan agar lebih memberdayakan kader posyandu guna penyuluhan yang lebih baik kepada lansia tentang faktor-faktor risiko hipertensi.

4. Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan Irawati program study s-1 ilmu keperawatan Sekolah tinggi ilmu kesehatan Mega Resky Makassar 2010 dengan judul *“Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Penyakit Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2010*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan faktor stress dengan terjadinya penyakit hipertensi, ada hubungan faktor obesitas dengan terjadinya penyakit hipertensi dan tidak ada hubungan faktor merokok dengan terjadinya penyakit hipertensi pada lansia.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Rinawang Frilyan Sarasaty untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kelompok lansia. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa peminatan gizi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN pada bulan Februari 2011 di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan yang diteliti adalah para lansia di wilayah tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya akan lakukan yaitu Dalam penelitian sebelumnya dia menggunakan jenis penelitian observasional analitik dan survey analitik dengan desain case control study, kemudian jumlah sampel yang digunakan 104 – 105, dimana sampel yang 104 dibagi dua, 52 kelompok kasus dan 52 kelompok kontrol, Dalam analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi – square.

Sedangkan penelitian yang saya akan lakukan yaitu jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain *cross sectional study*, kemudian jumlah sampel 30, dalam analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan Uji chi - Square.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A *Tinjauan Umum Tentang Hipertensi*

1. Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah gejala peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Di katakan tekanan darah tinggi jika tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih. Atau tekanan diastolk mencapai 90 mmHg atau lebih atau keduanya (Khasanah. 2012)

Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang banyak di derita bukan hanya oleh usia lanjut saja, bahkan saat ini sudah menyerang orang dewasa muda. Bahkan di ketahui bahwa 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab kematiannya. Itulah sebabnya hipertensi di juluki sebagai “Pembunuh Diam-Diam” (*silent killer*) (Zauhani, Zainal. 2012).

Hipertensi merupakan penyebab terbesar dari kejadian stroke, baik tekanan darah sistolik maupun diastoliknya (Rudianto, 2013). Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, adalah salah satu jenis penyakit pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Usia merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Lebih banyak dijumpai bahwa penderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi pada usia senja (Deni Damayanti, 2013).

Dari definisi-definisi diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan darah yang tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap penyakit-penyakit yang

berhubungan dengan kardiovaskuler seperti stroke, gaga ginjal, serangan jantung dan kerusakan ginjal (Sutanto 2010).

Dikatakan hipertensi jika pada 2 kali atau lebih kunjungan yang berbeda waktu didapatkan tekanan darah rata-rata dari 2 atau lebih pengukuran setiap kunjungan diastolik 90 mmHg atau sistolik 140 mmHg atau lebih. Pengukuran yang pertama kali belum dapat memastikan adanya hipertensi akan tetapi dapat merupakan petunjuk untuk dilakukan observasi lebih lanjut.

2. Klasifikasi Hipertensi

WHO mengklasifikasikan hipertensi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Hipertensi Menurut WHO :

Klasifikasi	Sistolik(mmHg)	Diastolik(mmHg)
Normaltensi	<140	<90
Hipertensi ringan	140 – 180	90 – 105
Hipertensi perbatasan	140 – 160	90 – 95
Hipertensi sedang dan berat	>180	>105
Hipertensi sistolik terisolasi	>140	<90
Hipertensi sistolik perbatasan	140 – 160	<90

3. Jenis Hipertensi

Hipertensi menurut penyebabnya dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Hipertensi esensial atau primer adalah hipertensi yang tidak/belum diketahui penyebabnya, sekitar 90% penderita hipertensi adalah hipertensi primer.

b. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, antara lain : kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme) dan lain-lain (Bruner & Suddart 2001).

4. Patofisiologi Hipertensi

Mekanisme yang mengontrol konstiksi dan relaksasi pembuluh darah terletak dipusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepineprin mengakibatkan konstiksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal,

menyebabkan pelepasan rennin. Renin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi.

Sebagai pertimbangan gerontologis dimana terjadi perubahan struktural dan fungsional pada system pembuluh perifer bertanggungjawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup) mengakibatkan penurunan curang jantung dan peningkatan tahanan perifer (Rohaendi, 2008).

5. Penyebab Hipertensi

Karena tekanan darah bergantung pada kecepatan denyut jantung, volume sekuncup dan TPR, maka peningkatan salah satu dari ketiga variabel yang tidak dikompensasi dapat menyebabkan hipertensi.

- a. Peningkatan kecepatan denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan abnormal saraf atau hormon pada nodus SA. Peningkatan denyut jantung yang berlangsung kronik sering menyertai keadaan hipertiroidisme. Namun,

peningkatan kecepatan denyut jantung biasanya dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup atau TPR, sehingga tidak menimbulkan hipertensi.

- b. Peningkatan volume sekuncup yang berlangsung lama dapat terjadi apabila terdapat peningkatan volume plasma yang berkepanjangan akibat gangguan penanganan air dan garam oleh ginjal atau konsumsi garam yang berlebihan. Peningkatan pelepasan renin atau aldosteron atau penurunan aliran darah ginjal dapat mengubah penanganan air dan garam oleh ginjal. Peningkatan volume plasma akan menyebabkan peningkatan diastolik akhir sehingga terjadi peningkatan volume diastolik akhir sehingga terjadi peningkatan volume sekuncup dan tekanan darah.
- c. Peningkatan TPR yang berlangsung lama dapat terjadi peningkatan rangsangan syaraf atau hormon pada artriol atau responsif yang berlebihan dari artriol atau responsivitas yang berlebihan dari artriol terhadap rangsangan yang normal.

6. Faktor-Faktor Penyebab Hipertensi

a. Umur

Faktor umur sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya umur maka risiko hipertensi menjadi lebih tinggi. Insiden hipertensi yang makin meningkat dengan bertambahnya umur, disebabkan oleh perubahan alamiah dalam tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan hormon. Hipertensi pada umur kurang dari 35 tahun akan menaikkan insiden penyakit arteri koroner dan kematian prematur.

Semakin bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40 % dengan kematian sekitar 50% di atas umur 60 tahun. Arteri kehilangan elastisitas atau kelenturan serta tekanan darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Peningkatan kasus hipertensi akan berkembang pada umur lima puluhan dan enam puluhan.

Kenaikkan tekanan darah seiring bertambahnya usia merupakan keadaan biasa. Namun apabila perubahan ini terlalu mencolok dan disertai faktor-faktor lain maka memicu terjadinya hipertensi dengan komplikasinya.

b. Jenis kelamin

Faktor jenis kelamin berpengaruh pada terjadinya penyakit tidak menular tertentu seperti hipertensi, di mana pria lebih banyak menderita hipertensi. dibandingkan wanita dengan rasio sekitar 2,29 mmHg untuk peningkatan darah sistolik. pria mempunyai tekanan darah sistolik dan diastolik yang tinggi dibanding wanita pada semua suku. Badan survei dari komunitas hipertensi mengskrining satu juta penduduk Amerika pada tahun 1973-1975 menemukan rata-rata tekanan diastolik lebih tinggi pada pria dibanding wanita pada semua usia. Sedangkan survei dari badan kesehatan nasional dan penelitian nutrisi melaporkan hipertensi lebih mempengaruhi wanita dibanding pria.⁴ Menurut laporan Sugiri di Jawa Tengah didapatkan angka prevalensi 6% pada pria dan 11% pada wanita. Di daerah perkotaan Semarang didapatkan 7,5% pada pria dan 10,9% pada wanita, dan di daerah perkotaan Jakarta didapatkan 14,6% pada pria dan 13,7% pada wanita.

Wanita dipengaruhi oleh beberapa hormon termasuk hormon estrogen yang melindungi wanita dari hipertensi dan komplikasinya termasuk penebalan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Wanita usia produktif sekitar 30-40 tahun, kasus serangan jantung jarang terjadi, tetapi meningkat pada pria. Arif Mansjoer mengemukakan bahwa pria dan wanita menopause memiliki pengaruh sama pada terjadinya hipertensi. Ahli lain berpendapat bahwa wanita menopause mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih reaktif terhadap konsumsi garam, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Terapi hormon yang digunakan oleh wanita menopause dapat pula menyebabkan peningkatan tekanan darah.

c. Konsumsi garam

Garam dapur merupakan faktor yang sangat berperan dalam patogenesis hipertensi. Garam dapur mengandung 40% natrium dan 60% klorida. Konsumsi 3-7 gram natrium perhari, akan diabsorpsi terutama di usus halus. Pada orang sehat volume cairan ekstraseluler umumnya berubah-ubah sesuai sirkulasi efektifnya dan berbanding secara proporsional dengan natrium tubuh total. Volume sirkulasi efektif adalah bagian dari volume cairan ekstraseluler pada ruang vaskular yang melakukan perfusi aktif pada jaringan. Natrium diabsorpsi secara aktif, kemudian dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring dan dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium yang jumlahnya mencapai 90-99 % dari yang dikonsumsi, dikeluarkan melalui urin. Pengeluaran urin ini diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan kelenjar adrenal.

Sumber natrium yang juga perlu diwaspadai selain garam dapur adalah penyedap masakan atau *monosodium glutamat* (MSG). Pada saat ini budaya penggunaan MSG sudah sampai pada taraf sangat mengkhawatirkan, di mana semakin mempertinggi risiko terjadinya hipertensi.

d. Merokok

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Menghisap rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi.

Karbon monoksida dalam asap rokok akan menggantikan ikatan oksigen dalam darah. Hal tersebut mengakibatkan tekanan darah meningkat karena jantung dipaksa memompa untuk memasukkan oksigen yang cukup ke dalam organ dan jaringan tubuh lainnya.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Menurut tafsir Al-Misbah karya M. quraish shihab Pada air anggur yang di olah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian di

biarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk di teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak adapun lainnya seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan.

e. Kurangnya aktifitas fisik

Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras usaha otot jantung dalam memompa darah, makin besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding arteri sehingga meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kurangnya aktifitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan risiko hipertensi meningkat.

Studi epidemiologi membuktikan bahwa olahraga secara teratur memiliki efek antihipertensi dengan menurunkan tekanan darah sekitar 6-15 mmHg pada penderita hipertensi.³⁹ Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan hipertensi, karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah. Olahraga juga dikaitkan dengan peran obesitas pada hipertensi.

f. Mengonsumsi lemak tinggi

Kebiasaan mengonsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan peningkatan berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak

jenuh juga meningkatkan risiko aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah.

Kandungan bahan kimia dalam minyak goreng terdiri dari beraneka asam lemak jenuh (ALJ) dan asam lemak tidak jenuh (ALTJ). Minyak goreng yang tinggi kandungan ALTJ-nya hanya memiliki nilai tambah gorengan pertama saja. Penggunaan minyak goreng lebih dari satu kali pakai dapat merusak ikatan kimia pada minyak, dan hal tersebut dapat meningkatkan pembentukan kolesterol yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan aterosklerosis dan hal yang memicu terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Dalam kaitannya ini dapat di baca firman Allah dalam Al-Qur'an Pada Surat Al-Maidah (5): 87 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Maidah (5): 87).

La ta'tadu maknanya jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf ta' bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah ini menunjukkan bahwa fitra manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitra dan pada dasarnya berat atau risih melakukannya inilah yang di nyatakan dalam kata *ta'tadu*.

Pada ayat di atas di jelaskan Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Allah SWT melarang kita dalam memakan-makanan seperti saat memakan makanan enak terlebih lagi saat sangat lapar, kita sering kali makan yang berlebihan. Padahal biasanya makanan itu banyak mengandung lemak. bukan hanya itu karbohidrat dan protein dalam tubuh juga biasanya akan di ubah menjadi lemak yang akan di simpan sebagai cadangan energy dan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan obesitas.

g. Kebiasaan Minum-minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah telah dibuktikan. Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun, diduga peningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel darah merah serta kekentalan darah berperan dalam menaikkan tekanan darah. Alkohol hanya mengandung energi tanpa mengandung zat gizi lain, kebiasaan minum alkohol dapat mengakibatkan kurang gizi, penyakit gangguan hati, kerusakan saraf otak dan jaringan serta dapat mengakibatkan hipertensi apabila konsumsi terlalu banyak. Dalam kaitannya ini dapat di baca firman Allah dalam Al-Qur'an Pada Surat Al-Baqarah (2): 219 yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahannya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

" yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir,

Orang-orang yang minum alkohol terlalu sering atau terlalu banyak, akan cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi dari pada individu yang tidak mengkonsumsi alkohol. Berlebihan mengkonsumsi alkohol (>2gelas bir/wine/whiskey/hari) merupakan faktor risiko hipertensi.

Diperkirakan konsumsi alkohol berlebihan menjadi penyebab sekitar 5-20% dari semua kasus hipertensi. Mengkonsumsi tiga gelas atau lebih minuman beralkohol per hari meningkatkan risiko mendapat hipertensi sebesar dua kali. Bagaimana dan mengapa alkohol meningkatkan tekanan darah belum diketahui dengan jelas. Namun sudah menjadi kenyataan bahwa dalam jangka panjang, minum-minuman beralkohol berlebihan akan merusak jantung dan organ-organ lain.

7. Manifestasi klinik

Menurut Martha (2012), Hipertensi sulit disadari oleh seseorang karena hipertensi tidak memiliki gejala khusus. gejala-gejala yang mungkin diamati antara lain yaitu:

- a. Gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala.
- b. Sering gelisah.
- c. Wajah merah.
- d. Tengukuk terasa pegal.
- e. Mudah marah.
- f. Telinga berdengung.
- g. Sukar tidur.

- h. Sesak nafas.
- i. Rasa berat di tengkuk.
- j. Mudah lelah.
- k. Mata berkunang-kunang.
- l. Mimisan.

8. Penatalaksanaan Hipertensi

Untuk mengobati penyakit hipertensi dengan cara *non farmakologi* antara lain yaitu dengan memodifikasi gaya hidup cukup efektif dapat menurunkan resiko kardiovaskuler dengan biaya sedikit dan resiko minimal: (Depkes 2007).

- a. Menurunkan berat badan bila terdapat kelebihan.
- b. Membatasi alkohol.
- c. Meningkatkan aktifitas fisik aerobik.
- d. Mengurangi asupan natrium.
- e. Mempertahankan asupan kalium yang adekuat (90 mmol/hari).
- f. Mempertahankan asupan kalium dan magnesium yang adekuat.
- g. Berhenti merokok dan mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol dalam makanan.

Adapun pengobatan dengan farmakologi adalah dengan menggunakan obat golongan diuretik, penyekat beta, antagonis kalsium dan penghambat enzim konvensi angiotensi (penghambat ACE) merupakan obat anti hipertensi yang sering di gunakan pada pengobatan.

B. Tinjauan Umum tentang Proses Menua

Menua (menjadi tua) merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Ini merupakan proses yang terus-menerus berlanjut secara alami. Ini dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk hidup. (Bandiyah S, 2009)

Menua merupakan proses yang dapat dilihat sebagai sebuah kejadian yang berkesinambungan dari lahir sampai meninggal. (Sarjono S, 2008).

1. Batasan-Batasan Lanjut Usia

a. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO, ada empat tahap, yakni:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*) 45-49 tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun.
- 3) Lanjut usia tua (*Old*) 75-90 tahun.
- 4) Usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun..

b. Menurut Hurlock (1979) perbedaan lanjut usia terbagi dalam dua tahap usia, yakni:

- 1) *Early old age* (usia 60-70 tahun)
- 2) *Advanced old age* (usia 70 tahun keatas)

2. Perubahan-Perubahan Fisik Yang Terjadi Pada Lansia

a. Kulit

- 1) Garis-garis diwajah seperti kehilangan lemak subkutan, penipisan dermal, penurunan kolagen dan elastin dan penurunan penggantian sel sebanyak 50 %.

- 2) Lambatnya penyembuhan luka akibat penurunan laju penggantian sel.
- 3) Penurunan elastisitas kulit (dapat terlihat hampir transparan).
- 4) Bintik-bintik coklat pada kulit akibat proliferasi melanosit terlokalisasi.
- 5) Membran mukosa kering dan penurunan keluaran kelenjar keringat yang aktif.
- 6) Kesulitan mengatur suhu tubuh karena penurunan ukuran, jumlah dan fungsi kelenjar keringat serta kehilangan lemak subkutan.

b. Rambut

- 1) Penurunan pigmen yang menyebabkan rambut berwarna abu-abu atau putih.
- 2) Penipisan seiring dengan penurunan jumlah melanosit.
- 3) Rambut pubik rontok akibat perubahan hormonal.
- 4) Rambut wajah meningkat pada wanita paska menopause dan menurun pada pria.

c. Penglihatan

- 1) Kelopak mata kendur dan berkerut akibat penurunan elastisitas dengan mata tampak jauh kedalam disoket mata.
- 2) Konjungtiva menipis dan kuning, kemungkinan pinguekulus (bantalan lemak).
- 3) Penurunan produksi air mata akibat kehilangan jaringan lemak dalam apparatus lakrimal.
- 4) Kornea rata dan kehilangan kilauan.
- 5) Pemudaran atau pigmentasi yang tidak teratur pada iris.
- 6) Pupil mengecil yang membutuhkan pencahayaan tiga kali lebih terang agar dapat melihat dengan jelas.
- 7) Penipisan dan kekakuan sklera, penguningan akibat deposit lemak.

- 8) Degenerasi vitreous, yang memperlihatkan kekeruhan dan mengapungnya debris.
- 9) Pelebaran lensa, kehilangan transparansi dan elastisitas yang mengurangi akomodasi.
- 10) Gangguan penglihatan warna akibat perburukan sel kerucut retina.
- 11) Penurunan reabsorpsi cairan intraocular yang menyebabkan glaukoma.

d. Pendengaran

- 1) Atrofi organ korti dan saraf auditorius (presbikusis sensorik).
- 2) Ketidakmampuan membedakan konsonan bernada tinggi.
- 3) Perubahan struktural degeneratif dalam keseluruhan sistem pendengaran.

e. Sistem Pernapasan

- 1) Pembesaran hidung akibat pertumbuhan kartilago yang terus menerus.
- 2) Atrofi umum tonsil.
- 3) Deviasi trakea akibat perubahan di tulang belakang yang menua.
- 4) Kekakuan paru, penurunan jumlah dan ukuran alveolus.
- 5) Kifosis.
- 6) Degenerasi atau atrofi otot pernapasan.
- 7) Penurunan kapasitas difusi.
- 8) Penurunan kekuatan otot inspirasi dan ekspirasi, penurunan kapasitas vital.
- 9) Penurunan saturasi oksigen sebesar 5%.
- 10) Penurunan cairan respiratorik sekitar 30%, peninggian resiko infeksi paru dan sumbat mukus.

f. Sistem Kardiovaskuler

- 1) Ukuran jantung agak mengecil.
- 2) Kehilangan kekuatan kontraktil dan efisiensi jantung.
- 3) Penurunan curah jantung sekitar 30% sampai 35% pada usia 70 tahun.
- 4) Penebalan katup jantung yang menyebabkan penutupan yang tidak sempurna (murmur sistolik).
- 5) Peningkatan ketebalan dinding ventrikel kiri sekitar 20% antara usia 30 dan 80 tahun.
- 6) Dilatasi dan peregangan vena.
- 7) Penurunan sebesar 35% dalam aliran darah arteri koroner antara usia 20 dan 60 tahun.
- 8) Penurunan kemampuan berespons terhadap stress fisik dan emosional.

g. Sistem Gastrointestinal

- 1) Penurunan elastisitas mukosa.
- 2) Penurunan sekresi GI, yang mengganggu digesti dan absorpsi.
- 3) Penurunan motilitas, dinding usus dan tonus sfingter anal dan kekuatan dinding abdomen.
- 4) Perubahan hati: penurunan berat badan, kapasitas regeneratif, dan aliran darah
- 5) Penurunan enzim hati yang terlibat dalam oksidasi dan reduksi yang menyebabkan metabolisme obat dan detoksifikasi zat kurang efisien.

h. Sistem Ginjal

- 1) Penurunan laju filtrasi glomerulus.
- 2) Penurunan aliran darah ginjal sekitar 53% sekunder akibat penurunan curah jantung dan perubahan aterosklerotik.

- 3) Penurunan ukuran dan jumlah nefron yang berfungsi.
- 4) Penurunan ukuran dan kapasitas kandung kemih.
- 5) Pelemahan otot kandung kemih yang menyebabkan pengosongan yang tidak sempurna dan retensi urin kronis.
- 6) Penurunan ukuran ginjal.
- 7) Penurunan kemampuan untuk berespon terhadap berbagai asupan natrium.
- i. Sistem reproduksi pria
 - 1) Penurunan produksi testotestosterone yang mengakibatkan penurunan libido serta atrofi dan pelunakan testis.
 - 2) Penurunan produksi sperma sekitar 48%-69% antara usia 60 dan 80 tahun.
 - 3) Pembesaran kelenjar prostat dengan penurunan sekresi.
 - 4) Penurunan volume dan viskositas cairan semen.
 - 5) Reaksi fisiologis lebih lambat dan lemah selama senggama dengan pemajangan periode refraktori.
- j. Sistem Reproduksi Wanita

penurunan kadar estrogen dan progesteron (sekitar usia 50 tahun) karena:

 - 1) Berhentinya Ovulasi, atrofi, penebalan dan penurunan ukuran ovarium.
 - 2) Rontoknya rambut pubik dan labiya mayora datar.
 - 3) Penyusutan jaringan vulva, terbatasnya introitus dan hilangnya elastisitas jaringan.
 - 4) Atrofi Vagina, lapisan mukosa tipis dan kering, lingkungan Ph vagina lebih basa.
 - 5) Penyusutan uterus.

- 6) Payudara menggantung, atrofi kelenjar, jaringan penyokong dan lemak.
- 7) Puting rata dan penurunan ukuran.

k. Sistem Saraf

- 1) Perubahan degeneratif pada saraf-saraf pusat dan sistem saraf perifer.
- 2) Transmisi saraf lebih lambat.
- 3) Penurunan jumlah sel-sel otak sekitar 1% pertahun setelah usia 50 tahun.
- 4) Hipotalamus kurang efektif dalam mengatur suhu tubuh.
- 5) Hilangnya neuron dalam korteks serebral sebanyak 20%.
- 6) Reflex kornea lebih lambat.
- 7) Peningkatan ambang batas nyeri.

l. Sistem Imun

- 1) Penurunan mulainya maturitas seksual dan berlanjut seiring dengan usia.
- 2) Kehilangan kemampuan mengenali dan menghancurkan sel-sel mutan yang meningkatkan insiden kanker.
- 3) Penurunan respon antibody yang mengakibatkan kerentanan terhadap infeksi yang sangat besar.
- 4) Atrofi Tonsilar dan limfadenopati.
- 5) Banyak sumsum pembentuk darah yang aktif digantikan oleh sumsum tulang berlemak yang mengakibatkan ketidakmampuan meningkatkan produksi eritrosit semudah sebelumnya sebagai respon terhadap stimulus.
- 6) Penurunan absorpsi vitamin B12, yang mengakibatkan penurunan massa eritrosit dan penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit.

m. Sistem Muskuloskeletal

- 1) Peningkatan jaringan adiposa.
- 2) Penurunan massa tubuh yang tidak berlemak dan kandungan mineral tubuh.
- 3) Penurunan tinggi akibat penurunan kelengkungan tulang belakang dan penyempitan ruang intervertebra.
- 4) Penurunan pembentukan kolagen dan massa otot.
- 5) Penurunan viskositas cairan sinovial, lebih banyak membran sinovial yang fibrotik.

n. Sistem Endokrin


- 1) Penurunan kemampuan mentoleransi stress.
- 2) Konsentrasi glukosa darah meningkat dan tetap naik lebih lama dibandingkan orang yang lebih mudah.
- 3) Penurunan produksi progesteron.
- 4) Penurunan kadar estrogen dan peningkatan kadar *follicle-stimulating hormone* selama menopause yang menyebabkan trombosis dan osteoporosis.
- 5) Penurunan kadar aldosteron serum sebanyak 50%. Penurunan laju sekresi kortisol sebanyak 25%. (Jaime L dan Liz chaeffer, 2008).

C. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah konsep yang dipakai sebagai landasan berfikir dalam kegiatan ilmu (Nursalam, 2009). Kerangka konseptual dalam penelitian tentang "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan kejadian Hipertensi pada lansia adalah sebagai berikut:

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan

 : Variabel independen yang di teliti

 : Variabel yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitik* dengan pendekatan *cross sectional study*, yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali, pada suatu saat penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec. Bajeng Barat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec. Bajeng Barat Waktu penelitian dilaksanakan bulan 13 – 20 Agustus 2016.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *deskriptif Analitik* bersifat kuantitatif.

C. *Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel*

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat

mewakili populasinya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 orang yaitu lansia yang terdaftar sebagai penduduk di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec Bajeng Barat.

2. Sampel Penelitian

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

$$n = \frac{33}{1 + 33(0,05^2)}$$

$$n = \frac{33}{1 + 33(0,0025)}$$

$$n = \frac{33}{1 + 0,082}$$

$$n = \frac{33}{1,082}$$

$$n = 30,4 \text{ dibulatkan menjadi } 30$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

d = Tingkat kesalahan 0,05%

Dari rumus diatas diperoleh jumlah sampel yaitu sebanyak 30 lansia. Pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling*.

3. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atau sampling adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari populasi, sehingga digunakan sebagai wakil yang sah atau dapat mewakili bagi populasi tersebut (Sugiarto, Siagan, Sunaryanto & Oetomo, 2003).

a. Kriteria inklusi

Merupakan kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili sampel dalam penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah:

- 1) Lansia yang memiliki riwayat hipertensi.
- 2) Lansia yang berusia 45 – 49 tahun.
- 3) Bersedia mengisi kuesioner.
- 4) Ada pada saat penelitian dilaksanakan.

b. Kriteria eksklusif

Merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ada gangguan kejiwaan
- 2) Tidak ada pada saat penelitian dilaksanakan
- 3) Lanjut usia yang tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurung waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi (Hidayat, 2008).

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu pada lansia di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec Bajeng Barat.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar observasi berisi identitas responden.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan merupakan sumber data dari observasi dan pengamatan langsung yang dilakukan di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec Bajeng Barat. Dengan menggunakan lembar kuesioner dari *Skala Gutman* yaitu dengan skor 1 untuk jawaban tidak sedangkan 2 untuk jawaban ya. Variabel aktifitas fisik dan kebiasaan minuman alkohol terdiri dari masing – masing 4 pertanyaan dinilai berdasarkan baik dan buruk. Di kategorikan baik apabila nilai dari jawaban ≥ 5 dan dikategorikan buruk apabila ≤ 5 dari standar pertanyaan. (Ana Huswatun 2013).

Menurut Nursalam (2012), instrument yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Data karakteristik responden diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden, yang isinya menekankan pada informasi karakteristik yaitu; nama, usia, jenis kelamin dan lain-lain.

2. Pengukuran Observasi

Pengukuran observasi dilakukan melalui lembar kuesioner.

3. Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan dari penelitian ini adalah skala gutman.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi lembar observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian dan konsistensi dari setiap jawaban atau data.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban (pengkodean).

c. Tabulasi Data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisa data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan menggunakan program SPSS 20. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data Univariat dan Bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Rumus statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *uji regresi linear* untuk mengetahui apakah ada faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

H. *Pertimbangan Etik*

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etik dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Peneliti menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang akan diberikan tidak menyakiti responden. Jika responden merasa ada ketidaknyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti harus berhati-hati memperhitungkan resiko dan keuntungan yang akan berakibat pada subjek pada setiap tindakan dalam penelitian.

2. Prinsip Menghargai Hak-Hak Subjek

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak tanpa adanya paksaan ataupun sanksi yang akan berakibat kepada subjek

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

c. Informed consent

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden. Meskipun intervensi senam kaki diberikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Peneliti berlaku adil terhadap pemberian intervensi tersebut.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya dengan kode responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut.

Selain itu, semua data terkait informasi responden disimpan oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan umum Desa Borimatangkasa Sebelah utara adalah Desa Bone, sebelah Timur adalah Kelurahan Tubajeng, Desa Tanabangka, sebelah Selatan adalah Desa Gentungan, dan Sebelah barat adalah Desa Manjalling dan Desa Kalemandalle. Dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Desa Borimatangkasa sebesar 2706 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.358 jiwa dan perempuan 1.348 jiwa.

Visi Desa adalah “Terbangunnya Desa yang maju dan makmur di dukung oleh pertanian yang unggul, sumber daya manusia yang sehat dan trampil, dan pelayanan masyarakat Desa secara cepat dan tepat, sarana dan transportasi yang memadai”. Dimana Desa Borimatangkasa merupakan Desa yang maju di bidang pertanian, penduduknya mayoritas petani didukung oleh kelompok tani, kelompok P3A, Gapoktan.

Misi Desa adalah “Berdasarkan hasil visi maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Borimatangkasa terdapat 5 bidang program pembangunan yang ditetapkan dalam kurung waktu 2016 – 2021 yaitu :

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan (formal dan nonformal) yang bermutu dan terjangkau.

3. Bidang Kesehatan

peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

4. Bidang Kelembagaan
peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan desa
5. Bidang Sarana dan Prasarana
peningkatan sarana dan prasarana pedesaan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai faktor- faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2016. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami hipertensi dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian desain *Cross Sectional Studi* atau penelitian dengan pengambilan data satu waktu.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1

**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur di Desa Borimatangkasa
Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat**

Umur	Jumlah (f)	Persentase (%)
45-47 tahun	13	43,3
48-49 tahun	17	56,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi umur menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden (43,3%) yang berumur 45-47 tahun dan sebanyak 17 responden (56,7%) yang berumur 48-49 tahun.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Hipertensi di Desa
Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat

Hipertensi	Jumlah (f)	Persentase (%)
Stadium 1	23	76,6
Stadium 2	7	23,4
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 distribusi Hipertensi menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (76,6%) yang stadium 1, dan sebanyak 7 responden (23,4%) yang stadium 2.

2. Analisis Univariat

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Garam di Desa
Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat

Konsumsi Garam	Jumlah (f)	Persentase (%)
Kurang	4	13,3
Lebih	26	86,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi konsumsi garam menunjukkan bahwa sebanyak 4 responden (13,3%) konsumsi garamnya kurang dan sebanyak 26 responden (86,7%) yang konsumsi garamnya lebih.

Tabel 4.4

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Makanan Berlemak
di Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat**

Konsumsi Makanan	Jumlah (f)	Persentase (%)
Berlemak		
Kurang	19	63,3
Lebih	11	36,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 distribusi konsumsi makanan berlemak menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden (63,3%) kurang mengkonsumsi makanan berlemak dan sebanyak 11 responden (36,7%) yang lebih konsumsi makanan berlemak.

Tabel 4.5

**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur di Desa Borimatangkasa
Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat**

Umur	Jumlah (f)	Persentase (%)
45-47 tahun	13	43,3
48-49 tahun	17	56,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 distribusi umur menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden (43,3%) yang berumur 45-47 tahun dan sebanyak 17 responden (56,7%) yang berumur 48-49 tahun.

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Aktifitas Fisik di Desa
Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat

Aktifitas Fisik	Jumlah (f)	Persentase (%)
Baik	6	20
Buruk	24	80
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi aktivitas fisik menunjukkan bahwa sebanyak 6 responden (20%) yang tergolong baik dan sebanyak 24 responden (80%) yang tergolong buruk.

3. Analisis Bivariat

Tabel 4.7
Hasil Distribusi Frekuensi Hubungan Asupan Garam Dengan Hipertensi
Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

	Asupan Garam				Total	P
	Kurang		Lebih			
	F	%	F	%		
Hipertensi						
Stadium 1	4	100	19	73,1	23	0,323
Stadium 2	0	0	7	26,9	7	
Jumlah	4	100	26	100	30	

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis hubungan antara Umur dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang asupan garam kurang terdapat 4 responden (100%) yang hipertensi stadium 1, dan tidak terdapat responden yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang asupan garam lebih

terdapat 19 responden (73,1%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 7 responden (26,9%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* sebesar 0,323 ($> 0,05$) hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan garam dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia.

Tabel 4.8
Hasil Distribusi Frekuensi Hubungan Konsumsi Makanan Berlemak Dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

	Konsumsi Makanan Berlemak				Total	<i>P</i>
	Kurang		Lebih			
	F	%	F	%		
Hipertensi						
Stadium 1	15	78,9	8	72,3	23	0,515
Stadium 2	4	21,1	3	27,3	7	
Jumlah	19	100	11	100	30	

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang konsumsi makanan berlemaknya kurang terdapat 15 responden (78,9%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 4 responden (21,1%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang konsumsi makanan berlemaknya lebih terdapat 8 responden (72,3%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 3 responden (27,3%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* sebesar 0,515 ($> 0,05$) hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia.

Tabel 4.9
Hasil Distribusi Frekuensi Hubungan Umur Dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

	Umur				Total	<i>P</i>
	45-47		48-49			
	F	%	F	%		
Hipertensi						
Stadium 1	15	88,2	8	61,6	23	0,101
Stadium 2	2	11,8	5	38,4	7	
Jumlah	17	100	13	100	30	

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis hubungan antara Umur dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang umurnya 45-47 terdapat 15 responden (88,2%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 2 responden (11,8%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang umurnya 48-49 terdapat 8 responden (61,6%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 5 responden (38,4%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* sebesar 0,101 ($> 0,05$) hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia.

Tabel 4.10
Hasil Distribusi Frekuensi Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

	Aktivitas Fisik				Total	<i>P</i>
	Baik		Buruk			
	F	%	F	%		
Hipertensi						
Stadium 1	5	83,3	18	75	23	0,567
Stadium 2	1	16,7	6	25	7	
Jumlah	6	100	24	100	30	

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang aktivitas fisiknya baik terdapat 5 responden (83,3%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 1 responden (16,7%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang aktivitas fisiknya buruk terdapat 18 responden (75%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 6 responden (25%) yang hipertensi stadium 2.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* sebesar 0,567 ($> 0,05$) hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi Stadium 1 dan 2 pada lansia.

4. Analisis Multivariat

Pada uji multivariat ini dilakukan dengan menggunakan uji *regresi linear* dimana variabel yang memenuhi syarat nilai signifikansi setelah di uji hubungan dengan variabel orientasi realita dibawah 0,25.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi linear

Model		Excluded Variables ^a				
		Beta In	T	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
2	Konsumsi Makanan Berlemak	.067 ^b	.349	.730	.068	.976
3	Konsumsi Makanan Berlemak	.051 ^c	.269	.790	.052	.991
	Aktivitas fisik	.126 ^c	.663	.513	.127	.962
4	Konsumsi Makanan Berlemak	.071 ^d	.376	.710	.071	1.000
	Aktivitas fisik	.079 ^d	.418	.679	.079	1.000
	Konsumsi asupan Garam	.216 ^d	1.173	.251	.216	1.000

Sumber : Data Primer, Agustus 2016

Pada tabel ini menjelaskan bahwa variabel yang lebih berhubungan terhadap kejadian hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia adalah konsumsi asupan garam dengan *significancy* 0,216.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan menggunakan kuisisioner. Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisisioner, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari Desa Borimatangkasa. Dalam rancangan penelitian ini peneliti melakukan observasi pada lansia dalam hal ini lansia yang termasuk dalam kriteria inklusi. Setelah itu peneliti kemudian membagikan kuesioner pada tiap lansia. Sebelum kuesioner diisi, peneliti menginformasikan tentang tujuan penelitian dan sifat keikutsertaan responden dalam penelitian, cara pengisian kuesioner, dan sebelum responden mengisi seluruh pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian,

responden terlebih dahulu menandatangani lembar persetujuan penelitian (*informed consent*).

Setelah data hasil penelitian terkumpul, kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan entri data ke dalam master tabel. Data kemudian diolah menggunakan program SPSS. Dari hasil pengolahan disajikan kedalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

1. Hubungan Konsumsi Asupan Garam dengan Kejadian Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

Berdasarkan table 4.9 hasil analisis hubungan antara Umur dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang asupan garam kurang terdapat 4 responden (100%) yang hipertensi stadium 1, dan tidak terdapat responden yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang asupan garam lebih terdapat 19 responden (73,1%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 7 responden (26,9%) yang hipertensi stadium 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara konsumsi asupan garam dengan kejadian hipertensi pada lansia yang menunjukkan nilai p value 0,323 ($> \alpha$ 0,05).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martati (2013) tidak terdapat hubungan antara konsumsi garam dengan hipertensi. Hal ini disebabkan karena hipertensi pada kelompok yang memiliki kebiasaan mengonsumsi garam ≤ 3 kali dalam seminggu dan ≥ 3 kali dalam seminggu adalah 1,240 ($p = 0,074$), artinya kebiasaan mengonsumsi garam bukan sebagai faktor resiko terjadinya hipertensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Djauhar (2013) dengan nilai p value 0,324 ($p > 0,05$)., Tidak adanya hubungan asupan garam dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia pada penelitian ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia adalah pola makanannya. Pola makan dapat diartikan suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan kegiatan makan secara sehat. Pola makan juga ikut menentukan kesehatan bagi tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Maria, dkk. (2012) hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara asupan natrium dengan hipertensi, hasilnya menunjukkan nilai $p = 0,625 (>0,05)$.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berasumsi bahwa dari penelitian ini, pada saat penelitian ini berlangsung di masyarakat Desa Borimatangkasa banyak yang mengkonsumsi asupan garam khususnya pada responden yang pada penelitian ini terdapat 26 responden yang termasuk lebih dalam mengkonsumsi asupan garam dan terdapat 4 responden yang kurang mengkonsumsi asupan garam. Dan pada saat diolah dengan menggunakan SPSS pada hasil analisis uji bivariat didapatkan nilai p value 0,261. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan anatara konsumsi asupan garam dengan hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia. Tetapi setelah dilakukan hasil analisis multivariat diadapatkan nilai p value 0,216.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Borimatangkasa terdapat masyarakat yang mengkonsumsi garam, sebanyak 26 responden yang aktif

mengonsumsi garam dan 4 yang kurang mengonsumsi garam . Dimana dapat dilihat bahwa 26 responden yang aktif mengonsumsi asupan garam 6 – 7 kali / hari, sedangkan 4 responden yang kurang aktif mengonsumsi asupan garam 4 – 6 kali / minggu. Jadi hasil olah data SPSS yang didapatkan $p = 0,216$. Dengan dapat disimpulkan terdapat hubungan antara konsumsi asupan garam dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia.

2. Hubungan Konsumsi Makanan Berlemak dengan Kejadian Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang konsumsi makanan berlemaknya kurang terdapat 8 responden (72,8%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 3 responden (27,2%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang konsumsi makanan berlemaknya lebih terdapat 8 responden (72,3%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 3 responden (27,3%) yang hipertensi stadium 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan hipertensi pada lansia yang menunjukkan nilai p value 0,515 ($> \alpha 0,05$).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014), hasil uji Chi Square menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi pada lanjut usia dengan nilai p value 0,658 ($p > 0,05$). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adiningsih (2012) dengan nilai p value 0,528 ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hipertensi pada lansia. Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kejadian hipertensi lebih tinggi pada responden yang kurang mengonsumsi makanan berlemak dibandingkan yang lebih banyak mengonsumsi makanan berlemak.

Tidak adanya hubungan konsumsi makanan berlemak dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia pada penelitian ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia adalah masalah kekurangan gizinya atau asupan makanannya yang kurang, terutama kurang mengonsumsi lauk hewani. Gizi merupakan peranan penting dalam kesehatan lansia. masalah kekurangan gizi sering dialami oleh lansia sebagai akibat dari menurunnya nafsu makan karena penyakit yang diseritanya, hal ini juga terjadi karena ktivitas pada kelompok ini sudah berkurang sementara asupan makannya tidak dkurangi atau bahkan berlebihan. Asupan gizi yang sangat diperlukan bagi lansia sehat mempertahankan kualitas hidupnya. Sementara untuk lansia yang sakit, asupan gizi diperlukan untuk proses penyembuhan dan mencegah agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut dari penyakit yang dideritanya seperti hipertensi (Resny, 2016). Berdasarkan hasil uji chi square antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi($p=0,008$) Ramayulis (2010).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berasumsi bahwa dari penelitian ini ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia.Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa konsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah karena banyaknya lemak yang

menempel pada pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat meningkat. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarima Di Desa Kabongan Kidul Kabupaten Rembang. Hasil menyatakan bahwa konsumsi lemak bukan merupakan faktor risiko hipertensi.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Borimatangkasa terdapat masyarakat yang mengkonsumsi makanan berlemak, sebanyak 11 responden yang aktif mengkonsumsi makanan berlemak dan 19 yang kurang mengkonsumsi makanan berlemak. Dimana dapat dilihat bahwa 11 responden tersebut yang aktif mengkonsumsi makanan berlemak 6 – 7 kali / hari, sedangkan 11 responden yang kurang aktif mengkonsumsi makanan berlemak 4 – 6 kali / minggu. Hasil kategori umur didapatkan nilai p value 0,071 artinya mendekati nilai signifikansi uji *chi shi square* ($<0,05$)

Pada penelitian ini responden yang diteliti menunjukkan bahwa proporsi kejadian hipertensi lebih tinggi pada responden yang kurang mengkonsumsi makanan berlemak dibandingkan responden yang mengkonsumsi lebih makanan berlemak. Sehingga pada saat dilakukan uji spss didapatkan nilai p value $< 0,05$.

2. Hubungan Umur dengan Kejadian Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis hubungan antara Umur dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang umurnya 45-47 terdapat 15 responden (88,2%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 2 responden (11,8%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang

umurnya 48-49 terdapat 8 responden (61,6%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 5 responden (38,4%) yang hipertensi stadium 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi pada lansia yang menunjukkan nilai p value 0,101 ($> 0,05$).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitaningtyas (2014) bahwa tidak adanya hubungan antara umur dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pada penelitian ini bisa terjadi karena faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia seperti asupan makanan lansia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kiki,2016), bahwa tidak ada hubungannya antara umur dengan tingkat hipertensi pada lansia dengan nilai p value 0,342 ($>0,05$). Tidak adanya hubungan umur dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia, pada penelitian ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia adalah stress. Faktor stres seperti kurang tidur dapat memicu masalah hipertensi dan dapat turun lagi pada saat tidur. Stres tidak menyebabkan hipertensi yang menetap, tetapi stress berat dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah yang bersifat sementara yang sangat tinggi. Jika periode stres sering terjadi maka akan mengalami kerusakan pada pembuluh darah dan menyebabkan hipertensi (Melissa, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti berasumsi bahwa dari penelitian ini tidak adanyahubungan antara umur dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia. Hal ini bisa terjadi karena ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah pada lansia seperti stres. Tetapi pada penelitian ini

setelah dilakukan uji multivariat, hasil kategori umur didapatkan nilai p value 0,102 artinya mendekati nilai signifikansi uji *chi shi square* ($<0,05$).

3. Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi Stadium 1 dan 2 Pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.11 hasil analisis hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia diketahui bahwa dari 30 responden yang aktivitas fisiknya baik terdapat 5 responden (83,3%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 1 responden (16,7%) yang hipertensi stadium 2. Sedangkan yang aktivitas fisiknya buruk terdapat 18 responden (75%) yang hipertensi stadium 1, dan terdapat 6 responden (25%) yang hipertensi stadium 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia yang menunjukkan nilai p value 0,567 ($>0,05$)

Berdasarkan hasil uji *chi square* antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi ($p=0,024$). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki intensitas aktifitas fisik yang sedang. Hal ini kemungkinan karena sebagian besar responden telah berusia lanjut, sehingga sudah tidak mampu melakukan aktifitas fisik yang berat. Selain itu, sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga, yang digantikan oleh anak mereka untuk melakukan pekerjaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudartinah (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian

hipertensi. Namun walaupun tidak terdapat hubungan namun didapatkan hasil responden yang memiliki aktivitas ringan beresiko 1,843 untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan responden yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi.

Hal ini sesuai yang penelitian yang dilakukan oleh Sarasaty (2011) yang mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia. Berdasarkan pengukuran tekanan darah diastoliknya, lansia yang memiliki aktivitas fisik ringan juga cenderung mengalami hipertensi dari pada lansia yang memiliki aktifitas fisik sedang. Terdapat 43,2% subjek yang termasuk dalam kategori aktivitas fisik ringan yang menderita hipertensi. Lansia yang aktifitas fisiknya sedang tekanan darahnya cenderung dalam kategori normal, 100% subjek yang aktifitas fisiknya sedang tekanan darahnya termasuk dalam kategori normal. Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji *Rank Spearman* diperoleh nilai p sebesar 0,321 ($p > 0,05$), maka H_0 diterima sehingga tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah diastolik pada lansia di Kelurahan Makamahaji. Secara statistik hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik dan diastolik lansia pada penelitian ini tidak terdapat hubungan. Banyak faktor-faktor lain yang secara langsung dapat mempengaruhi tekanan darah pada lansia salah satunya yaitu status gizi lansia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti berasumsi bahwa dari hasil penelitian ini, kebiasaan olahraga tidak didapatkan hasil yang signifikan. Setelah dianalisis secara bersama-sama kebiasaan olahraga tidak terbukti sebagai faktor risiko hipertensi, Hal ini karena pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa

responden yang melakukan aktivitas fisik pada hipertensi stadium 1 adalah 5 responden dan yang tidak melakukan aktivitas fisik 18 responden. Sedangkan pada hipertensi stadium 2 yang melakukan aktivitas fisik 1 responden dan yang tidak melakukan aktivitas fisik 6 responden. Hal ini merupakan alasan mengapa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi stadium 1 dan 2 pada lansia, dan setelah dilakukan *uji spss chi square* didapatkan nilai $p= 0,567 (<0,05)$.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan sampel yang sedikit dan lebih banyak responden yang digunakan dengan karakteristik wanita dibandingkan dengan yang laki – laki. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak dan untuk penelitian yang mengenai hubungan antara merokok dan mengkonsumsi alkohol lebih terkhusus kepada responden dengan karakteristik laki – laki agar lebih signifikan. Selain itu pada penelitian ini mungkin terdapat beberapa variabel yang diteliti dan dikontrol seperti konsumsi obatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan asupan garam dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,323 ($p > 0,05$).
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,515 ($p > 0,05$).
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,101 ($p > 0,05$).
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan *p value* 0,567 ($p > 0,05$).
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara mengkonsumsi asupan garam dengan kejadian hipertensi stadium 1 dan stadium 2 pada lansia dengan *p value* 0,216, ($p < 0,25$).

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan penelitian, diantaranya adalah jumlah buku-buku kepustakaan yang masih sedikit terkait judul penelitian dan jumlah sampel yang cenderung homogeny serta waktu yang terbatas. Oleh sebab itu peneliti menyarankan:

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pembelajaran dan pemahaman di institusi pelayanan kesehatan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi ilmu keperawatan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi.

3. Bagi Masyarakat di Wilayah Desa Borimatangkasa Dusun Bontosunggu Kec.Bajeng Barat Kab.Gowa. Berdasarkan data- data yang didapatkan dari penelitian ini maka disarankan kepada masyarakat di Wilayah Desa Borimatangkasa perlunya pencegahan terjadinya hipertensi sedini mungkin terutama masyarakat yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya penyakit hipertensi melalui perbaikan pola hidup, perlunya pemeriksaan tekanan darah, pengobatan secara rutin, dan menjalani pola hidup yang sehat.

Penelitian seperti kohort, yang dapat mengetahui sebab akibat antara faktor yang diteliti dengan kejadian hipertensi pada lansia, dan untuk penelitian selanjutnya bias menggunakan sampel yang lebih besar dan bisa meneliti faktor lain yang menyebabkan hipertensi diantaranya stress, pola makan, status gizinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding. U.w. dan nawi, Arsin,A.A.”Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Di RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011.
<http://118.97.33.150/jurnal/files/09179210095ebledlelea316c2cfab06.pdf>. di akses tanggal 23 november 2015
- Brunner & Suddarth. 2001. *Keperawatan Medical Bedah*. Volume 2. Penerbit buku kedokteran. EGC. Jakarta.
- Bandiyah, S. *Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2009.
- Damayanti, Deni. *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal Untuk Penyakit* 2013
- Djauhar, Arif. “Faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di pusling desa klumpit upt puskesmas gribig kabupaten kudas. 2013
- Frilyan, Rinawang S. “Faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kelompok lanjut usia di kelurahan sawah baru kecamatan ciputat, kota tangerang selatan. 2011
- Irawati. “faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit hipertensi pada lansia di puskesmas gattareng kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. 2010
- Manik, Margaret Elisabeth, “Faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada Lansia Di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Parsoburan Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar 2011
- Kementerian agama RI al-qur’an dan terjemahan. Jakarta. WALI. 2012
- Kementerian Kesehatan Republic Indonesia.. *penyakit tidak menular* .Bulletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan 2012
- Martha, karnia. *Panduan cerdas mengatasi hipertensi*. Jogjakarta: araska, 2012.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*; Jakarta : Salemba Medika, 2008.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan; pedoman skripsi, tesis, dan instrumen penelitian keperawatan*. Edisi 1. Salemba Medika. Jakarta.

- Nursalam, *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*, Edisi 3, Salemba Medika 2012
- Rini anggraeny, Wahiduddin I, Rismayanti.. Faktor risiko aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol terhadap kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja puskesmas pattingalloang kota Makassar 2013.
- Saleh, P. A., Amir, M. Y., & Palutturi, S. 2014 “*Hubungan Faktor Sosial Dan Psikologis Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di RS Bhayangkara Makassar*”. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*. Diakses online <http://222.124.222.229/bitstream/handle/123456789/9862/Primasanty%20Amalia%20Saleh%20K11110111.pdf?sequence=1> (13 Juni 2015).
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Dan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Haryani, Ira. *Menu Ampuh Atasi Hipertensi*. Yogyakarta: Notebook. . 2014
- Suraioka I.P.. *Penyakit Degenerative*. Yogyakarta: Numedmedika. 2012
- Talumewo, Merlisa C. “faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada pasien di wilayah kerja puskesmas airmadidi kabupaten minahasa utara. 2013
- WHO.. *Hypertension Fact Sheet. Departement Of Sustainable Development And Healthy Environments*. 2011. Di ambil pada 27 desember 2015 dari http://www.searo.who.int/linkfiles/non_communicable_desease_hypertension-fs.pdf
- Fitrina, 2014. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Usia Lanjut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebun Sikolos Kecamatan Padang Panjang Barat*.
- Yashinta (2015) *Hubungan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Laki- Laki Usia 35-65 Tahun di Kota Padang*.
- Emmelia (2014) *Hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada lansia di desa kapoya kecamatan tareran kabupaten minahasa selatan*.
- Martati (2013) *Hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada lansia di desa kapoya kecamatan tareran kabupaten minahasa selatan*.
- Novitaningtyas (2014) *Faktor- faktor yang berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Kelompok Lanjut Usia di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Petang I Kabupaten Badung .*

Sarasty (2011) *Hubungan karakteristik (Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan) dan Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah Pada Lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan kartasura Kabupaten Sukaharjo.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DOKUMENTASI



Gambar 1 Dan 2. Pengukuran Tekanan Darah

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pengukuran Tekanan Darah



Gambar 2. Pengisian Kuesioner

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pengukuran Tekanan Darah



Gambar 2. Pengisian Kuesioner

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pengukuran Tekanan Darah



Gambar 2. Pengisian Kuesioner

LEMBAR KUESIONER

FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA


Isilah tanda silang (x) pada kotak yang telah disediakan !

A. Identitas

Petunjuk pengisian

Isilah data berikut ini dengan benar :

1. Tanggal pengisian kuesioner :
2. Nama :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat :
7. TD :
 - a. Sistol : mmHg
 - b. Diastol : mmHg



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Komsumsi Garam

FOOD FREQUENSY QUESIONER

No	Bahan makanan yang dikomsumsi	4 – 5 x / hari	6 – 7 x / hari	4-6 x/ minggu	1-3x/minggu
	Garam				

C. Komsumsi Makanan Berlemak

FOOD FREQUENSY QUESIONER

No	Bahan makanan yang dikomsumsi	4 – 5 x/hari	6 – 7 x/hari	4-6 x/ minggu	1-3x/minggu
	Santan				

D. Kurangnya Aktifitas Fisik

1. Apakah anda seorang atlet/olahragawan?

- Ya (sebutkan pada bidang olahraga apa)
- Tidak

2. Apakah anda suka berolahraga?

- Ya
- Tidak

3. Apakah anda berolahraga seminggu 3 kali ?

- Ya
- Tidak

4. Apakah durasi anda berolahraga < 30 menit ?

- Ya
- Tidak

LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Bapak dan Ibu calon responden

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sukmawati

NIM : 70300112079

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia “.

Penelitian tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak dan Ibu sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang Bapak dan Ibu berikan merupakan tanggung jawab kami untuk menjaganya. Jika Bapak dan Ibu bersedia ataupun menolak untuk menjadi responden, maka tidak ada ancaman bagi Bapak dan Ibu ataupun keluarga. Jika selama menjadi responden Bapak dan Ibu merasa dirugikan maka Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk mengundurkan diri dan tidak berpartisipasi pada penelitian ini.

Demikian surat permintaan ini kami buat, jika Bapak dan Ibu telah menyetujui permintaan kami untuk menjadi responden, maka kami sebagai peneliti sangat mengharapkan kesediaanya untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden dan mengisi kuisioner.

Atas perhatian dan persetujuan dari Bapak dan Ibu responden kami mengucapkan terimakasih.

Peneliti

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Sukmawati, dengan judul “faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia ” Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Borimatangkasa, 2016

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN)
M A K A S S A R

MASTER TABEL PENELITIAN

No	Inisial	Hipertensi	Konsumsi Asupan Garam	Konsumsi Makanan Berlemak	Umur	Kurangnya Aktifitas Fisik
1	Ny ^{''} RO	1	2	1	1	1
2	Ny ^{''} HS	1	2	1	1	2
3	Ny ^{''} NA	1	2	2	2	2
4	Ny ^{''} FA	1	1	1	1	2
5	Ny ^{''} AS	2	2	2	1	2
6	Ny ^{''} RA	1	2	1	1	2
7	Ny ^{''} BU	1	2	1	1	2
8	Ny ^{''} RA	1	2	1	1	2
9	Ny ^{''} WE	1	1	1	1	2
10	Ny ^{''} IW	1	2	1	2	2
11	Ny ^{''} DR	2	2	2	2	2
12	Ny ^{''} NZ	1	1	2	1	2
13	Ny ^{''} MA	1	2	2	2	2
14	Ny ^{''} ZA	2	2	1	2	2
15	Ny ^{''} MR	2	2	1	1	2
16	Ny ^{''} SR	1	2	1	1	2
17	Ny ^{''} SU	1	2	2	1	2
18	Ny ^{''} HE	1	2	2	1	2
19	Ny ^{''} IJ	1	2	1	2	2
20	Tn ^{''} JU	1	2	2	2	1
21	Tn ^{''} KA	1	2	1	2	1
22	Tn ^{''} IR	1	2	2	2	2
23	Tn ^{''} BM	1	1	1	1	2
24	Tn ^{''} HO	2	2	1	2	2
25	Tn ^{''} SU	2	2	1	2	2
26	Tn ^{''} RA	1	2	1	1	1

27	Tn'' KA	1	2	1	1	2
28	Tn'' ZU	1	2	2	1	1
29	Tn'' TI	1	2	1	2	2
30	Tn'' HS	2	2	2	2	1

keterangan :

1.hipertensi

skor 1 = hipertensi stadium 1 (140/90 - 159/99 mmHg)

skor 2 = hipertensi stadium 2 (\geq 160/100 mmHg)

2. konsumsi asupan garam

a.kurang : skor 1 = 4- 6 kali / minggu

skor 2 = 1 - 3 kali / minggu

b. lebih : skor 1 = 4-5 kali / hari

skor 2 = 6 - 7 kali / hari

3.konsumsi makanan berlemak

a.kurang : skor 1 = 4- 6 kali / minggu

skor 2 = 1 - 3 kali / minggu

b. lebih : skor 1 = 4-5 kali / hari

skor 2 = 6 - 7 kali / hari

4. umur

skor 1 = 45 - 47

skor 2 = 48 - 49

5. kurangnya aktifitas fisik

baik bila skor yang diperoleh \geq 5

buruk bila skor yang diperoleh \leq 5

ANALISIS BIVARIAT

Nonparametric Correlations

Correlations

		Konsumsi asupanGa ram	Konsumsi MakananB erlemak	Umur	Aktivitasfi sik	Hiperte nsi	
Spearman's rho	KonsumsiasupanG aram	Correlation	1.000	.095	.343	-.196	.216
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.	.618	.064	.299	.251
		N	30	30	30	30	30
	KonsumsiMakanan Berlemak	Correlation	.095	1.000	.172	-.138	.071
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.618	.	.363	.466	.710
		N	30	30	30	30	30
	Umur	Correlation	.343	.172	1.000	-.067	.313
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.064	.363	.	.724	.092
		N	30	30	30	30	30
Aktivitasfisik	Correlation	-.196	-.138	-.067	1.000	.079	
	Coefficient						
	Sig. (2-tailed)	.299	.466	.724	.	.679	
	N	30	30	30	30	30	
Hipertensi	Correlation	.216	.071	.313	.079	1.000	
	Coefficient						
	Sig. (2-tailed)	.251	.710	.092	.679	.	
	N	30	30	30	30	30	

UJI MULTIVARIAT

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aktivitasfisik, KonsumsiMakananBerlemak, KonsumsiasupanGaram ^b		Enter
2		KonsumsiMakananBerlemak	Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= .100).
3		Aktivitasfisik	Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= .100).
4		KonsumsiasupanGaram	Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: Hipertensi

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.258 ^a	.066	-.041	.439
2	.249 ^b	.062	-.007	.432
3	.216 ^c	.047	.013	.427
4	.000 ^d	.000	.000	.430

a. Predictors: (Constant), Aktivitasfisik, KonsumsiMakananBerlemak, KonsumsiasupanGaram

b. Predictors: (Constant), Aktivitasfisik, KonsumsiasupanGaram

c. Predictors: (Constant), KonsumsiasupanGaram

d. Predictor: (constant)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.357	3	.119	.617	.610 ^b
	Residual	5.010	26	.193		
	Total	5.367	29			
2	Regression	.333	2	.167	.894	.421 ^c
	Residual	5.033	27	.186		
	Total	5.367	29			
3	Regression	.251	1	.251	1.375	.251 ^d
	Residual	5.115	28	.183		
	Total	5.367	29			
4	Regression	.000	0	.000		. ^e
	Residual	5.367	29	.185		
	Total	5.367	29			

a. Dependent Variable: Hipertensi

b. Predictors: (Constant), Aktivitasfisik, KonsumsiMakananBerlemak, KonsumsiasupanGaram

c. Predictors: (Constant), Aktivitasfisik, KonsumsiasupanGaram

d. Predictors: (Constant), KonsumsiasupanGaram

e. Predictor: (constant)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.348	.684		.509	.615
	KonsumsiasupanGaram	.294	.241	.236	1.220	.233
	KonsumsiMakananBerlemak	.059	.168	.067	.349	.730
	Aktivitasfisik	.142	.206	.134	.690	.496
2	(Constant)	.433	.628		.690	.496
	KonsumsiasupanGaram	.300	.236	.241	1.269	.215
	Aktivitasfisik	.133	.201	.126	.663	.513
3	(Constant)	.731	.436		1.678	.105
	KonsumsiasupanGaram	.269	.230	.216	1.173	.251
4	(Constant)	1.233	.079		15.703	.000

a. Dependent Variable: Hipertensi

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
2	KonsumsiMakananBerlemak	.067 ^b	.349	.730	.068	.976
3	KonsumsiMakananBerlemak	.051 ^c	.269	.790	.052	.991
	Aktivitasfisik	.126 ^c	.663	.513	.127	.962
4	KonsumsiMakananBerlemak	.071 ^d	.376	.710	.071	1.000
	Aktivitasfisik	.079 ^d	.418	.679	.079	1.000
	KonsumsiasupanGaram	.216 ^d	1.173	.251	.216	1.000

a. Dependent Variable: Hipertensi

b. Predictors in the Model: (Constant), Aktivitasfisik, KonsumsiasupanGaram

c. Predictors in the Model: (Constant), KonsumsiasupanGaram

d. Predictor: (constant)



UJI NORMALITAS DATA UMUR, HIPERTENSI, KONSUMSI GARAM, KONSUMSI MAKANAN BERLEMAK DAN AKTIFITAS FISIK,.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Jenis Kelamin	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Pendidikan	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Hipertensi	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Konsumsi Garam	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Konsumsi Makanan Berlemak	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Aktivitas Fisik	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebiasaan Minuman Alkohol	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Umur	Mean	1.43	.092	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.25	
		Upper Bound	1.62	
	5% Trimmed Mean		1.43	
	Median		1.00	
	Variance		.254	
	Std. Deviation		.504	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		.283	.427

Jenis Kelamin	Kurtosis	-2.062-	.833
	Mean	1.63	.089
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.45
		Upper Bound	1.82
	5% Trimmed Mean	1.65	
	Median	2.00	
	Variance	.240	
	Std. Deviation	.490	
	Minimum	1	
	Maximum	2	
	Range	1	
	Interquartile Range	1	
	Skewness	-.583-	.427
	Kurtosis	-1.784-	.833
	Mean	1.93	.159
Pendidikan	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.61
		Upper Bound	2.26
	5% Trimmed Mean	1.93	
	Median	2.00	
	Variance	.754	
	Std. Deviation	.868	
	Minimum	1	
	Maximum	3	
	Range	2	
	Interquartile Range	2	
	Skewness	.134	.427
	Kurtosis	-1.692-	.833
	Mean	1.23	.079
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.07
		Upper Bound	1.39
Hipertensi	5% Trimmed Mean	1.20	
	Median	1.00	
	Variance	.185	
	Std. Deviation	.430	
	Minimum	1	
	Maximum	2	
	Range	1	
	Interquartile Range	0	
	Skewness	1.328	.427
	Kurtosis	-.257-	.833

Konsumsi Garam	Mean		1.87	.063
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.74	
		Upper Bound	2.00	
	5% Trimmed Mean		1.91	
	Median		2.00	
	Variance		.120	
	Std. Deviation		.346	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-2.273-	.427
	Kurtosis		3.386	.833
	Mean		1.37	.089
Konsumsi Makanan Berlemak	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.18	
		Upper Bound	1.55	
	5% Trimmed Mean		1.35	
	Median		1.00	
	Variance		.240	
	Std. Deviation		.490	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		.583	.427
	Kurtosis		-1.784-	.833
	Mean		3.57	.114
	Merokok	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3.33
		Upper Bound	3.80	
5% Trimmed Mean			3.63	
Median			4.00	
Variance			.392	
Std. Deviation			.626	
Minimum			2	
Maximum			4	
Range			2	
Interquartile Range			1	
Skewness			-1.172-	.427

Kurtosis

.431

.833

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Aktivitas Fisik	Mean		1.80	.074
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.65	
		Upper Bound	1.95	
	5% Trimmed Mean		1.83	
	Median		2.00	
	Variance		.166	
	Std. Deviation		.407	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-1.580-	.427
	Kurtosis		.527	.833
	Kebiasaan Minuman Alkohol	Mean		1.93
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	1.84	
		Upper Bound	2.03	
5% Trimmed Mean			1.98	
Median			2.00	
Variance			.064	
Std. Deviation			.254	
Minimum			1	
Maximum			2	
Range			1	
Interquartile Range			0	
Skewness			-3.660-	.427
Kurtosis			12.207	.833

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur	.372	30	.000	.632	30	.000
Jenis Kelamin	.406	30	.000	.612	30	.000
Pendidikan	.259	30	.000	.774	30	.000
Hipertensi	.473	30	.000	.526	30	.000
Konsumsi Garam	.517	30	.000	.404	30	.000
Konsumsi Makanan Berlemak	.406	30	.000	.612	30	.000
Merokok	.389	30	.000	.681	30	.000


a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Aktivitas Fisik	.488	30	.000	.492	30	.000
Kebiasaan Minuman Alkohol	.537	30	.000	.275	30	.000

a. Lilliefors Significance Correction


Histogram




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Histogram





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UJI CHI SQUARE T-TESTS

KONSUMSI GARAM

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hipertensi * Konsumsi Garam	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Hipertensi * Konsumsi Garam Crosstabulation

		Konsumsi Garam		Total	
		kurang	lebih		
Hipertensi	hipertensi stadium 1	Count	4	19	23
		Expected Count	3.1	19.9	23.0
hipertensi stadium 2	Count	0	7	7	
	Expected Count	.9	6.1	7.0	
Total	Count	4	26	30	
	Expected Count	4.0	26.0	30.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.405 ^a	1	.236		
Continuity Correction ^b	.303	1	.582		
Likelihood Ratio	2.307	1	.129		
Fisher's Exact Test				.548	.323
Linear-by-Linear Association	1.358	1	.244		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93.

b. Computed only for a 2x2 table

KONSUMSI MAKANAN BERLEMAK

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hipertensi * Konsumsi Makanan Berlemak	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Hipertensi * Konsumsi Makanan Berlemak Crosstabulation

		Konsumsi Makanan Berlemak		Total	
		kurang	lebih		
Hipertensi	hipertensi stadium 1	Count	15	8	23
		Expected Count	14.6	8.4	23.0
Hipertensi	hipertensi stadium 2	Count	4	3	7
		Expected Count	4.4	2.6	7.0
Total		Count	19	11	30
		Expected Count	19.0	11.0	30.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.151 ^a	1	.698		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.149	1	.700		
Fisher's Exact Test				1.000	.515
Linear-by-Linear Association	.146	1	.703		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.57.

b. Computed only for a 2x2 table

UMUR

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hipertensi * Umur	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Hipertensi * Umur Crosstabulation

		Umur		Total
		45-47	48-49	
Hipertensi stadium 1	Count	15	8	23
	Expected Count	13.0	10.0	23.0
Hipertensi stadium 2	Count	2	5	7
	Expected Count	4.0	3.0	7.0
Total	Count	17	13	30
	Expected Count	17.0	13.0	30.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.935 ^a	1	.087		
Continuity Correction ^b	1.632	1	.201		
Likelihood Ratio	2.958	1	.085		
Fisher's Exact Test				.190	.101
Linear-by-Linear Association	2.837	1	.092		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.03.

b. Computed only for a 2x2 table

AKTIVITAS FISIK

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hipertensi * Aktivitas Fisik	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Hipertensi * Aktivitas Fisik Crosstabulation

		Aktivitas Fisik		Total	
		baik	buruk		
Hipertensi	hipertensi stadium 1	Count	5	18	23
		Expected Count	4.6	18.4	23.0
	Hipertensi stadium 2	Count	1	6	7
		Expected Count	1.4	5.6	7.0
Total		Count	6	24	30
		Expected Count	6.0	24.0	30.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.186 ^a	1	.666		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.198	1	.657		
Fisher's Exact Test				1.000	.567
Linear-by-Linear Association	.180	1	.671		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

b. Computed only for a 2x2 table

UJI MULTIVARIAT

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Included in Analysis		30	100.0
Selected Cases	Missing Cases	0	.0
	Total	30	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		30	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	0
stadium 2: > 160/100 mmHg	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding
			(1)
Aktivitas fisik	baik	6	1.000
	buruk	24	.000
Konsumsi Makanan Berlemak	kurang	19	1.000
	lebih	11	.000
Umur	45-47 tahun	17	1.000
	48-49 tahun	13	.000
Konsumsi asupan Garam	kurang	4	1.000
	lebih	26	.000

Classification Table^{a,b}

	Observed	Predicted		
		Hipertensi		Percentage Correct
		stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	stadium 2: > 160/100 mmHg	
Step 0	stadium 1: 140/90-159/99 Hipertensi mmHg	23	0	100.0
	stadium 2: > 160/100 mmHg	7	0	.0
	Overall Percentage			76.7

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	4.624	4	.328
	Block	4.624	4	.328
	Model	4.624	4	.328
Step 2 ^a	Step	-.035	1	.852
	Block	4.589	3	.204
	Model	4.589	3	.204
Step 3 ^a	Step	-.479	1	.489
	Block	4.111	2	.128
	Model	4.111	2	.128
Step 4 ^a	Step	-1.153	1	.283
	Block	2.958	1	.085
	Model	2.958	1	.085

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	27.972 ^a	.143	.216
2	28.007 ^a	.142	.214
3	28.486 ^a	.128	.193
4	29.638 ^b	.094	.142

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

b. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Hipertensi = stadium 1: 140/90-159/99 mmHg		Hipertensi = stadium 2: > 160/100 mmHg		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
	Step 1	3	3.000	0	
2	3	2.842	0	.158	3
3	1	.907	0	.093	1
4	6	5.831	1	1.169	7
5	2	2.420	1	.580	3
6	2	2.251	1	.749	3
7	3	3.554	3	2.446	6
8	3	2.194	1	1.806	4
Step 2	1	4.000	0	.000	4
2	3	2.743	0	.257	3
3	8	8.257	2	1.743	10
4	2	2.257	1	.743	3
5	6	5.743	4	4.257	10
Step 3	1	4.000	0	.000	4
2	11	11.000	2	2.000	13
3	8	8.000	5	5.000	13
Step 4	1	15.000	2	2.000	17

2	8	8.000	5	5.000	13
---	---	-------	---	-------	----

Classification Table^a

	Observed	Predicted			
		Hipertensi		Percentage Correct	
		stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	stadium 2: > 160/100 mmHg		
Step 1	Hipertensi	stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	23	0	100.0
		stadium 2: > 160/100 mmHg	7	0	.0
	Overall Percentage				76.7
Step 2	Hipertensi	stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	23	0	100.0
		stadium 2: > 160/100 mmHg	7	0	.0
	Overall Percentage				76.7
Step 3	Hipertensi	stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	23	0	100.0
		stadium 2: > 160/100 mmHg	7	0	.0
	Overall Percentage				76.7
Step 4	Hipertensi	stadium 1: 140/90-159/99 mmHg	23	0	100.0
		stadium 2: > 160/100 mmHg	7	0	.0
	Overall Percentage				76.7

a. The cut value is .500



Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	konsumsiasupangaram(1)	-19.642	20087.051	.000	1	.999	.000	.
	konsumsimakananberlemak(1)	-.179	.959	.035	1	.852	.836	.128 5.482
)							
	umur(1)	-1.233	.974	1.605	1	.205	.291	.043 1.964
	aktivitasfisik(1)	-.848	1.252	.459	1	.498	.428	.037 4.983
Constant	-.195	.835	.055	1	.815	.823		
Step 2 ^a	konsumsiasupangaram(1)	-19.647	20096.485	.000	1	.999	.000	.

	umur(1)	-1.256	.966	1.690	1	.194	.285	.043	1.892
	aktivitasfisik(1)	-.812	1.234	.433	1	.511	.444	.040	4.984
	Constant	-.299	.621	.232	1	.630	.741		
	konsumsiasupangaram(1)	-19.498	20096.485	.000	1	.999	.000	.000	
Step 3 ^a	umur(1)	-1.235	.957	1.665	1	.197	.291	.045	1.898
	Constant	-.470	.570	.680	1	.410	.625		
Step 4 ^a	umur(1)	-1.545	.944	2.677	1	.102	.213	.034	1.358
	Constant	-.470	.570	.680	1	.410s	.625		

a. Variable(s) entered on step 1: konsumsiasupangaram, konsumsimakananberlemak, umur, aktivitasfisik.

Model if Term Removed

Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
konsumsiasupangaram	-14.629	1.286	1	.257
konsumsimakananberlemak	-14.004	.035	1	.852
umur	-14.853	1.733	1	.188
aktivitasfisik	-14.240	.508	1	.476
konsumsiasupangaram	-14.649	1.291	1	.256
umur	-14.921	1.834	1	.176
aktivitasfisik	-14.243	.479	1	.489
konsumsiasupangaram	-14.819	1.153	1	.283
umur	-15.145	1.804	1	.179
umur	-16.298	2.958	1	.085

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 2 ^a Variables konsumsimakananberlemak(1)	.035	1	.852
Overall Statistics	.035	1	.852
konsumsimakananberlemak(1)	.005	1	.942
Step 3 ^b Variables aktivitasfisik(1)	.447	1	.504
Overall Statistics	.480	2	.787
konsumsiasupangaram(1)	.697	1	.404
Step 4 ^c Variables konsumsimakananberlemak(1)	.010	1	.922
aktivitasfisik(1)	.320	1	.572

Overall Statistics	1.215	3	.749
--------------------	-------	---	------

- a. Variable(s) removed on step 2: konsumsimakananberlemak.
- b. Variable(s) removed on step 3: aktivitasfisik.
- c. Variable(s) removed on step 4: konsumsiasupangaram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sukmawati Lahir di Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone, 17 Oktober 1994. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ambo Upe dan Indotang. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SD Inpres 377 Sanrego pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan lanjutan pertama di SMP Negeri 3 Kahu dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan lagi ke pendidikan lanjutan atas di SMA Negeri 1 Kahu dan selesai tahun 2012. Teraftar sebagai mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2012 melalui jalur UMM.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi yakni:

1. Pengurus HMJ periode 2013-2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R