

UJI POTENSI TABIR SURYA EKSTRAK KULIT BUAH JERUK NIPIS
(Citrus aurantifolia) SECARA IN VITRO



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

RIF'ATUL ADILAH YASIN

NIM. 70100113002

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rif'atul Adilah Yasin
NIM : 70100113002
Tempat/Tanggal Lahir : Bau-Bau, 11 Desember 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : BTN Graha Garaganti Blok D No. 5 Samata, Gowa
Judul : Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis
(*Citrus aurantifolia*) Secara *In Vitro*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Gowa, 21 Agustus 2017
Penyusun,


RIF'ATUL ADILAH YASIN
NIM. 70100113002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Secara *In Vitro***” yang disusun oleh **Rif'atul Adilah Yasin**, NIM: **70100113002**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa'idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqa'idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S. Si., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S. Si., M. Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf, S. Si., M. Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Khaerani, S. Farm, M.Farm.Klin., Apt.	(.....)
Penguji II	: Nurkhalis A. Gaffar, S.Ag., M.Hum.	(.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui karya sederhana ini yang begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya. Teristimewa penulis mempersembahkan tulisan ini kepada ayahanda tercinta Muh. Yasin S.H dan ibunda tersayang Nurjannah, terima kasih atas curahan kasih sayang serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Selesaiannya penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt Pembimbing Akademik Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Afrisusnawati Rauf S.Si., M.Si., Apt. Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. Penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

11. Bapak Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum. Penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan “2013 (FARBION)” yang telah banyak membantu. Dan sahabat-sahabat saya yang setia membantu, mendoakan dan memberi semangat penuh untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 21 Agustus 2017
Penyusun



RIF'ATUL ADILAH YASIN
NIM. 70100113002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Anatomi dan Fisiologi Kulit.....	8
1. Struktur kulit	8
2. Warna kulit.....	12
3. Eritema dan pigmentasi.....	14

B. Sinar ultraviolet (UV)	16
C. Tabir Surya.....	17
1. Klasifikasi Tabir Surya	17
2. Mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit dari sinar ultraviolet	18
3. Metode penentuan potensi tabir surya	18
D. Spektrofotometer UV-Vis	21
E. Ekstraksi.....	23
1. Definisi ekstraksi.....	23
2. Jenis-jenis ekstraksi.....	22
3. Ekstraksi senyawa flavonoid.....	27
F. Uraian Jeruk Nipis.....	27
1. Taksonomi Tanaman.....	27
2. Morfologi	28
3. Jenis-jenis tanaman	28
4. Kegunaan Tanaman.....	29
5. Kandungan kimia	29
G. Tinjauan Islam.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37

B.	Pendekatan Penelitian	37
C.	Populasi dan Sampel	37
	1. Populasi	37
	2. Sampel	38
D.	Metode Pengumpulan Data	38
	1. Pengolahan Sampel	38
	2. Ekstraksi Sampel	38
E.	Alat dan Bahan	39
	1. Alat	39
	2. Bahan	39
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
	1. Teknik Pengolahan Data	39
	2. Analisis Data	40
G.	Validasi dan Reliabilitas Instrumen	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	43
	1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Jeruk Nipis	43
	2. Nilai Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis	43
B.	Pembahasan	45
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	49

KEPUSTAKAAN	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	54
2. Skema Analisis Data	55
3. Gambar Sampel.....	56
4. Hasil Pengukuran Persen Transmisi dan SPF.....	57
5. Daftar Riwayat Hidup	72



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tipe kulit berdasarkan respon kulit terhadap paparan sinar	15
2. Penggolongan potensi tabir surya	17
3. Faktor efektifitas dan fluks eritema dan pigmentasi pada panjang gelombang 290 – 375 nm	19
4. Kandungan gizi buah jeruk nipis (100 gram)	29
5. Nilai Persen Transmisi Eritema Kulit Buah Jeruk Nipis	41
6. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Kulit Buah Jeruk Nipis	42
7. Nilai Rata - Rata SPF	42
8. Transmisi Replikasi I 100 ppm	55
9. Transmisi Replikasi II 100 ppm	55
10. Transmisi Replikasi III 100 ppm	56
11. Transmisi Replikasi I 150 ppm	57
12. Transmisi Replikasi II 150 ppm	57
13. Transmisi Replikasi III 150 ppm	58
14. Transmisi Replikasi I 200 ppm	59
15. Transmisi Replikasi II 200 ppm	59
16. Transmisi Replikasi III 200 ppm	60
17. Transmisi Replikasi I 250 ppm	61
18. Transmisi Replikasi II 250 ppm	61

19. Transmisi Replikasi III 250 ppm	62
20. Transmisi Replikasi I 300 ppm	63
21. Transmisi Replikasi II 300 ppm	63
22. Transmisi Replikasi III 300 ppm	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Kulit Manusia	8
2. Spektrum Elektromagnetik	17
3. Buah Jeruk Nipis	56



ABSTRAK

Nama Penyusun : Rif'atul Adilah Yasin
Nim : 70100113002
Judul Skripsi : Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) secara *In Vitro*

Penelitian uji potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis secara *in vitro* bertujuan untuk menentukan potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Uji potensi tabir surya ditentukan berdasarkan metode perhitungan nilai persen Transmisi eritema (%Te) dan persen Transmisi pigmentasi (%Tp) serta nilai Sun Protecting Factor (SPF). Dari pengujian tersebut diperoleh hasil dimana nilai rata - rata %Te pada konsentrasi 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm, berturut - turut adalah 8,37 %, 2,29 %, 1,71 %, 1,50 % dan 0,19 % . Nilai rata - rata transmisi pigmentasi %Tp pada konsentrasi 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm berturut - turut adalah 21,62 %, 12,68 %, 11,16 %, 7,75 % dan 5,08 % . Pada penentuan nilai SPF, diperoleh nilai rata - rata SPF konsentrasi ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm berturut - turut sebesar 4,44; 9,25; 11,08; 13,79; 40,15. Konsentrasi ekstrak 100 ppm termasuk dalam kategori *regular suntan* untuk eritema dan kategori *total block* untuk pigmentasi memiliki SPF *minimal*. Konsentrasi 150, 200, dan 250 ppm termasuk dalam kategori *extra protection* untuk eritema dan *total block* untuk pigmentasi memiliki SPF *maksimal* dan 300 termasuk dalam kategori *total block* untuk eritema dan pigmentasi memiliki SPF *ultra*.

Kata kunci: Kulit Buah Jeruk Nipis, Tabir Surya, Transmisi Eritema dan Pigmentasi, SPF

ABSTRACT

Name : Rif'atul Adilah Yasin
Nim : 70100113002
Title : "Determination of potential sunscreen of lime peel extract (*Citrus aurantifolia*) with in vitro methode"

Potential sunscreen test of lemon peel extract in vitro aims to determine the potential of sunscreen extract of lime peel by using UV-Vis spectrophotometry. The sunscreen potential test is determined by the percent value calculation method of erythema transmission (% Te) and percent Transmission of pigmentation (% Tp) and Sun Protecting Factor (SPF) value. The result showed that the mean value of % Te at concentration 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm and 300 ppm respectively were 8.37%, 2.29%, 1.71%, 1.50% and 0.19%. The mean value of pigmentation transmission % Tp at concentration 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm and 300 ppm respectively were 21.62%, 12.68%, 11.16%, 7.75% and 5.08%. In the determination of SPF values, the mean values of SPF concentration of 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm and 300 ppm respectively were 4.44; 9.25; 11.08; 13.79; 40.15. The concentration of 100 ppm extract is included in the regular category of suntan for erythema and the total block category for pigmentation has a minimal SPF. Concentrations of 150, 200, and 250 ppm are included in the category of extra protection for erythema and the total block for pigmentation has a maximum SPF and 300 are included in the total block category for erythema and pigmentation having an ultra SPF.

Keywords: Lime Peel, Sunscreen, Erythema Transmission and Pigmentation Transmission, SPF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matahari merupakan sumber cahaya dan energi pada manusia. Dibalik manfaatnya, matahari memiliki radiasi sinar UV yang dapat membahayakan kulit kita, khususnya pada daerah khatulistiwa. Radiasi sinar UV terdiri dari 3 yang dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya yaitu UV A, UV B, dan UV C (De Polo, K. F, 2000 didalam Anggraini, 2013).

Suatu produk yang dapat melindungi kulit manusia dari sinar UV adalah sediaan tabir surya. Tabir surya terbagi menjadi dua yaitu tabir surya fisik yang bekerja dengan memantulkan radiasi sinar UV tersebut atau UV *blocker* dan tabir surya kimia yang bekerja dengan menyerap radiasi sinar UV atau UV *absorbent* (Shai A, 2009 didalam Anggraini, 2013).

Tabir surya adalah sediaan kosmetik yang dirancang untuk dapat mengurangi efek yang berbahaya dari terpaparnya kulit pada sinar ultraviolet. Secara umum, tabir surya memiliki mekanisme kerja yaitu partikel dari radiasi sinar UV dinamakan foton bertemu dengan sepasang elektron pada molekul tabir surya (Bonda, 2009).

Penetapan potensi tabir surya yang baik dapat ditinjau dari kemampuannya dalam menyerap atau memantulkan sinar ultraviolet dengan penentuan nilai SPF serta persentase eritema dan pigmentasinya. SPF (*Sun Protecting Factor*) merupakan indikator universal yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV protektor, semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya maka semakin efektif untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV. Untuk melihat potensi suatu produk tabir surya dalam menyerap sinar ultraviolet

maka dapat ditentukan dengan menentukan nilai SPF dan mengukur persen transmisi eritema (%Te) dan persentase transmisi pigmentasi (%Tp) sediaan tersebut. Sehingga suatu sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai *sunblock*, proteksi ekstra, *suntan*, atau *fast tanning* (Balsam, 1972: 285).

Baru-baru ini, pengembangan tabir surya menuju pada penggunaan bahan alam karena lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa bahan alam lebih aman digunakan dan dampak negatifnya lebih sedikit daripada bahan kimia. Oleh karena itu penggunaan bahan alam yang dapat menurunkan radiasi sinar matahari dan meningkatkan perlindungan terhadap efek negatif radiasi sinar matahari pada kulit menjadi fokus dalam beberapa penelitian (Setiawan, 2010: 2). Ekstrak atau sari kental suatu bahan alam yang akan diolah menjadi produk seharusnya juga memenuhi ketentuan standar yang berlaku tentang jenis pelarut yang digunakan, kadar air, kadar abu total, dan kadar abu tidak larut asam. Semua aspek mutu di atas harus diuji dengan menggunakan metode pengujian yang telah ditetapkan Badan POM.

Menurut penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanolik kulit buah jeruk nipis mempunyai aktivitas antioksidan dengan IC_{50} sebesar 54,458 $\mu\text{g/mL}$ (Khasanah, 2014) dan untuk daun jeruk nipis memiliki aktivitas antioksidan dengan IC_{50} 93,41 ppm (Fajarwati, 2013). Dalam kulit jeruk manis (ponkan) terkandung zat antioksidan sebanyak 66,84-68,91 %. Makin kecil nilai IC_{50} makin tinggi aktivitas penangkapan radikal bebasnya. Antioksidan dapat bekerja dengan cara mengatasi efek-efek kerusakan pada kulit manusia yang diakibatkan oleh radikal bebas yang merupakan faktor utama pada proses penuaan (aging) dan kerusakan jaringan kulit. Hasil KLT menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanolik kulit buah

jeruk nipis adalah golongan flavonoid dan vitamin C (Khasanah, 2014). Adanya kandungan flavonoid dari ekstrak kulit jeruk nipis dapat dijadikan acuan untuk menetapkan potensi tabir suryanya, karena senyawa flavonoid memiliki gugus benzen aromatis terkonjugasi yang mampu menyerap sinar UV-A atau UV-B yang dapat menyebabkan efek buruk terhadap kulit. Menurut Baumann dalam jurnal Widyastuti Antioksidan yang diberikan secara topikal tidak memberikan kapasitas yang cukup untuk dapat diserap kedalam kulit, konsekuensinya, aktivitas antioksidan topikal tidak dapat melindungi kulit lebih baik dari serangan radiasi sinar ultraviolet sendiri tapi harus mempunyai nilai minimal *Sun Protective Factor* (SPF) atau kapasitas sebagai tabir surya (Widyastuti, 2015: 69).

Berdasarkan uraian tersebut, kulit buah jeruk nipis berpotensi sebagai tabir surya. Namun belum ada penelitian ilmiah yang menguji aktivitas dan potensi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas dan potensi sebagai tabir surya dan menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berpotensi sebagai tabir surya?
2. Berapa nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*)?
3. Apa saja kategori tabir surya dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Potensi tabir surya adalah ukuran kemampuan suatu sediaan untuk menyerap, menghamburkan dan memantulkan sinar ultraviolet yang mengenai kulit yang diklasifikasikan dalam golongan *sunblock (total block)*, *extra protection* (proteksi ultra), *suntan (regular suntan)*, dan *fast tanning*.
- b. Tabir surya merupakan sediaan yang mengandung bahan aktif yang dapat menyerap, menghamburkan atau memantulkan sinar ultraviolet yang mengenai kulit.
- c. Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat pajanan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis meningkat hingga 38 % di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukaan yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan jumlah melanin.
- d. SPF (*Sun Protection Factor*) merupakan suatu ukuran seberapa kuat tabir surya yang akan dipakai dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. *Sun Protection Factor* (SPF) didefinisikan sebagai perbandingan Dosis Eritema Minimum (DEM) pada kulit manusia terlindungi tabir surya dengan DEM tanpa perlindungan. Nilai SPF dapat ditentukan melalui perbandingan energi dari sinar yang dipaparkan untuk dapat menimbulkan eritema dan dapat juga melalui waktu yang diperlukan sampai timbul eritema.
- e. Persentase transmisi eritema/pigmentasi adalah perbandingan jumlah energi sinar UV yang diteruskan oleh sediaan tabir surya pada spektrum eritema/pigmentasi

dengan jumlah faktor keefektifan eritema pada tiap panjang gelombang dalam rentang 292,5–372,5 nm.

- f. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan uji terhadap potensi dan aktivitas ekstrak kulit buah jeruk nipis sebagai tabir surya dan menetapkan nilai SPF-nya dan menentukan jenis tabir suryanya berdasarkan data analisis yang diperoleh.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ismiyyatun Khasanah, Maria Ulfah, Sumantri mengenai *uji aktivitas antioksidan ekstrak etanolik kulit buah jeruk nipis (citrus aurantifolia) dengan metode dpph (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil)* tahun 2014 yaitu telah dilakukan uji aktifitas antioksidan ekstrak kulit buah jeruk nipis yang diekstrak dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%, lalu dianalisis kandungan flavonoid dan vitamin C. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan radikal bebas DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanolik kulit buah jeruk nipis mempunyai aktivitas antioksidan dengan IC_{50} sebesar 54,458 $\mu\text{g/mL}$ dan 4,768 $\mu\text{g/mL}$ untuk vitamin C. Hasil uji statistik aktivitas antioksidan menunjukkan tidak signifikan. Hasil KLT menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanolik kulit buah jeruk nipis adalah golongan flavonoid dan vitamin C.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Israyani mengenai *Penentuan Potensi Tabir Surya Ekstrak Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm f.)* tahun 2014 yang

bertujuan untuk mengetahui potensi tabir surya ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.). dengan menentukan nilai SPF, persen transmisi eritema (%Te), dan persen transmisi pigmentasi (%Tp) dari ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Konsentrasi ekstrak klika anak dara yang digunakan yaitu 300 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai SPF ekstrak = 2,991, nilai %Te = 22,655%, dan nilai %Tp = 26,837%. Dari nilai yang didapat, ekstrak klika anak dara memiliki potensi tabir surya perlindungan minimal dan nilai dari %Te dan %Tp ekstrak dikatakan tidak dapat mencegah kulit agar tidak terjadi kemerahan/eritema, tetapi dapat memberikan perlindungan penuh terhadap pigmentasi atau penggelapan kulit.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan menguji potensi dan aktivitas tabir surya dari ekstrak kulit buah jeruk nipis ini. Selain itu, penulis juga menentukan nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) ekstrak kulit buah jeruk nipis.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).
- b. Untuk mengetahui nilai *Sun Protecting Factor* serta nilai persen transmisi eritema dan pigmentasi dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).

- c. Untuk mengetahui kategori tabir surya dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).

2. Manfaat Penelitian

- a. Diketahui potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis.
- b. Diperoleh data ilmiah mengenai nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) serta nilai persen transmisi eritema dan pigmentasi ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai tabir surya.
- c. Diketahui kategori tabir surya dari ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).




BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Anatomi dan Fisiologi Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti keratinasi, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar *ultraviolet* matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar (Tranggono, 2007: 11).



Gambar 1. Struktur kulit (Kusantanti, 2008: 59)

1. Struktur kulit

Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu bagian epidermis (kulit luar) dengan kelengkapannya (kelenjar, rambut, kuku) dan bagian jaringan ikat, yaitu dermis/korium (kulit jangat). Epidermis dan dermis/korium bersama-sama disebut kutis. Dibawah kutis terdapat subkutis (jaringan ikat dalam) yang langsung terdapat

dibawah korium (tanpa batas yang jelas) dan yang menghubungkan kutis dengan lapisan dibawahnya (Mutschler, 1991: 577).

a. Epidermis

Epidermis terdiri dari beberapa jenis lapisan epitel pipih bertanduk dengan ketebalan 40 μm sampai 1,6 mm. Epidermis yang paling lemah yaitu di kelopak mata dan yang paling kuat adalah pada bagian yang paling banyak digunakan yaitu telapak tangan dan kaki. Epidermis mendapat pasokan makanan dari korium yang berhubungan dengannya melalui papilla berbentuk bulat dan melalui kelenjar dan folikel rambut. Pada daerah berambut, permukaan epidermis mempunyai daerah kulit lekuk (*felderhaut*) tempat terdapat celah yang berisi rambut. Pada permukaan yang tak berambut (telapak tangan dan kaki) tak terdapat daerah lekukan rombik seperti pada kulit lekuk, tetapi terdapat lipatan, kira-kira lebarnya 0,5 mm kulit lipatan polanya (lekukan, lengkung dan spiral) ditentukan secara genetik dan karena itu digunakan untuk identifikasi seseorang (sidik jari) (Mutschler, 1991: 578).

Secara histologi bagian epidermis dari luar ke dalam dibedakan atas (Tranggono, 2007: 12):

1) Lapisan tanduk (stratum corneum)

Lapisan tanduk (stratum corneum), terdiri atas beberapa lapis sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air, dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit akan melepaskan diri untuk

bergenerasi. Permukaan stratum corneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembab tipis yang bersifat asam disebut mantel asam kulit.

2) Lapisan jernih (stratum lucidum)

Lapisan jernih (stratum lucidum), terletak tepat dibawah stratum corneum, merupakan lapisan tipis jernih, mengandung eleidin, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Antara stratum lucidum dan stratum granulosum terdapat lapisan keratin tipis yang disebut rein's barrier (Szakall) yang tidak bisa ditembus (impermeable).

3) Lapisan berbutir-butir (stratum granulosum)

Lapisan berbutir-butir (stratum granulosum), tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Stoughton menemukan bahwa di dalam butir keratohyalin itu terdapat bahan logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit.

4) Lapisan malpighi (stratum spinosum)

Lapisan malpighi (stratum spinosum) memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfe masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malpighi ini.

5) Lapisan basal (stratum germinativum)

Lapisan basal (stratum germinativum) adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam stratum germinativum juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya pada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya. Satu sel

melanosit melayani sekitar 36 sel keratinosit. Kesatuan ini diberi nama unit melanin epidermal.

b. Dermis/Korium

Dermis atau korium adalah bagian kulit yang terletak di bawah epidermis dan keduanya dipisahkan oleh membran basal. Dermis memiliki ketebalan sekitar 15 sampai 40 kali dari ketebalan epidermis. Dermis terdiri dari tiga lapisan antara lain (Mutschler, 1991: 579):

1) Lapisan papillari

Terdiri dari komponen serat yang tipis dan kaya akan pembuluh kapiler, ujung syaraf sensorik, dan sitoplasma. Stratum papillary kaya akan fibril halus, sel (hisiosit, mastiosit) dan kapiler. Di dalam papilla ditemukan pula serabut syaraf dengan perlengkapan akhirnya yaitu reseptor. Stratum reticular yang miskin sel terdiri atas kumpulan serabut kolagen yang kuat yang berjaln satu sama lain, dan diantaranya terdapat serabut elastis yang tersusun juga dalam jaringan jala dan memberikan keelastikan kepada kulit.

2) Lapisan subpapillari

Lapisan yang melandasi epidermis, mengandung komponen yang sama dengan lapisan papillari.

3) Lapisan retikular

Merupakan lapisan dengan jumlah terbesar dari dermis dan memilki jaringan ikat padat yang terdiri dari komponen serat. Bagian yang lebih bawah berhubungan dengan jaringan lemak subkutan. Terdapat pembuluh darah dan syaraf di beberapa bagian.

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007: 13).

c. Hipodermis

Hipodermis merupakan lembaran lemak yang mengandung jaringan adiposa yang membentuk agregat dengan jaringan kolagen dan membentuk ikatan lentur antara struktur kulit dengan permukaan tubuh (Martini, 2001).

2. Warna kulit

Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, cokelat, kemerahan, atau hitam. Warna kulit terutama ditentukan oleh:

- a. Oxyhemoglobin yang berwarna merah.
- b. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan.
- c. Melanin yang berwarna cokelat.
- d. Keratohyalin yang memberikan penampakan opaque pada kulit.
- e. Lapisan-lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan (Kusantati, 2008: 68).

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008: 69).

Melanin adalah pigmen alamiah kulit yang memberikan warna cokelat. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino dan dengan oksidasi tirosin diubah menjadi butiran-butiran melanin yang berwarna coklat, serta untuk proses ini perlu

adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau dibawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran dan distribusi pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan-lapisan benih (Kusantati, 2008: 82).

Pembentukan melanosom di dalam melanosit melalui 4 fase (Tranggono, 2007: 28) yaitu :

- 1) Fase I permulaan pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase, diliputi membran dan berbentuk vesikula bulat.
- 2) Fase II disebut pramelanosom, pembentukan belum sempurna belum terlihat adanya pembentukan melanin.
- 3) Fase III mulai nampak adanya deposit melanin di dalam membran vesikula. Disini mulai terjadi melanisasi melanosom.
- 4) Fase IV deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partikel-partikel padat dan berbentuk sama. Proses melanisasi melanosom terjadi di fase III dan fase IV sebelum melanosom dieksresikan ke keratinosit.

Pembentukan melanin di dalam melanosit sangat kompleks. Ada 2 macam pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi (Tranggono, 2007: 29):

- a) Eumelanin memberikan warna gelap, terutama hitam, cokelat dan variasinya, serta mengandung nitrogen.
- b) Feomelanin memberikan warna cerah, kuning sampai merah, mengandung nitrogen dan sulfur.

3. Eritema dan pigmentasi

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat pajanan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis meningkat hingga 38 % di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukaan yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan jumlah melanin (Yuliasuti, 2002: 1).

Radiasi sinar UV-B yang memiliki panjang gelombang 290-320 nm menembus dengan baik stratum corneum dan epidermis yang cukup parah dan menyebabkan iritasi pada kulit sehingga disebut daerah eritema. Radiasi sinar UV-A memiliki panjang gelombang 320-400 nm menyebabkan warna coklat (tanning) pada kulit tanpa terjadi inflamasi sehingga disebut daerah pigmentasi. Meskipun sinar UV-A memiliki energi yang lebih rendah daripada sinar UV-B, tetapi kenyataannya mereka dapat menembus lebih jauh ke dalam hipodermis, menyebabkan elastosis (kekurangan dengan struktural dan elastisitas kulit) dan kerusakan kulit lainnya, yang berpotensi mengarah ke kanker kulit (Setiawan, 2010: 118).

Kulit yang terpapar sinar matahari selama antara 6-20 jam akan menghasilkan eritema yang cepat atau lambat menimbulkan pencoklatan kulit (tanning). Tanning cepat tampak jelas 1 jam setelah kulit terpapar matahari dan kemudian akan hilang kembali dalam waktu 4 jam. Di sini tidak tampak adanya pembentukan melanosom baru. Tanning lambat terjadi 48-72 jam setelah kulit terpapar sinar UV-A. Hal ini disebabkan oleh pembentukan melanosom-melanosom baru secara perlahan, dan baru terlihat dalam waktu 72 jam (Tranggono, 2007: 30).

Pada orang berkulit terang paparan energi sinar UV-B sebesar 20-27 mJ/cm² akan menimbulkan eritema yang dikenal sebagai DEM atau dosis eritema minimal (Pathak, 1993 : 1689-1715).

Radiasi UV mencapai permukaan bumi dapat dibagi menjadi UVB (290-320 nm) dan UV-A (320- 400 nm). UV-A dapat dibagi lagi menjadi UV-A I (340-400 nm) atau UV-A jauh dan UV-A II (320-340 nm) atau UV-A dekat. Faktor perlindungan matahari (SPF) didefinisikan sebagai dosis radiasi UV diperlukan untuk menghasilkan 1 dosis eritema minimal (MED) pada kulit dilindungi setelah penerapan 2 mg/cm² produk dibagi dengan radiasi UV untuk menghasilkan 1 MED pada kulit yang tidak terlindungi. A "kedap air" produk mempertahankan tingkat SPF setelah 40 menit perendaman air. A "sangat kedap air" atau "tahan air" produk diuji setelah 80 menit perendaman air. Jika tingkat SPF berkurang dengan perendaman, mungkin tercantum tingkat SPF yang terpisah (Barel, 2009: 311).

Tabel 1. Tipe kulit berdasarkan respon kulit terhadap paparan sinar (Pathak M.A, 1982 : 285).

Tipe kulit	Warna kulit konstitutif	Sensitifitas terhadap sinar UV	Riwayat eritema/pigmentasi
I	Putih	Sangat sensitive	Mudah eritema, tidak pernah pigmentasi
II	Putih	Sangat sensitive	Mudah eritema, pigmentasi minimal.
III	Putih	Sensitif	Eritema sedang, pigmentasi sedang
IV	Coklat muda	Sensitif sedang	Eritema minimal, mudah mengalami pigmentasi dan pigmentasi sedang
V	Coklat	Sensitif minimal	Jarang eritema, coklat tua
VI	Coklat tua atau hitam	Tidak sensitive	Tidak pernah terbakar, coklat tua atau hitam.


Pada manusia, respon eritema cepat biasanya hanya terjadi pada orang yang mempunyai kulit tipe I dan II, tetapi respon eritema lambat dapat terjadi pada setiap orang yang terpapar sinar UV-B. Pada orang berkulit tipe III dan IV respon ini mulai tampak setelah 3-12 jam dan mencapai puncaknya 20-24 jam setelah paparan UV-B yang ditandai dengan eritema, diikuti juga dengan gatal dan nyeri pada daerah yang terpapar sinar surya (Pathak, 1982: 1689).

B. Sinar ultraviolet (UV)

Sinar matahari terdiri dari berbagai spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda, dari inframerah yang terlihat hingga spektrum *ultraviolet*. Panjang gelombang sinar ultraviolet dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400-315 nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna coklat pada kulit tanpa menimbulkan kemerahan dalam bentuk leuko yang terdapat pada lapisan atas.
2. Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315-280 nm dengan efektivitas tertinggi 297,5 nm, merupakan daerah eritemogenik, dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin awal.
3. Ultraviolet C (UV C) yaitu sinar dengan panjang gelombang di bawah 280 nm, dapat merusak jaringan kulit, tetapi sebagian besar telah tersaring oleh lapisan ozon dalam atmosfer.

Skematis posisi spektrum gelombang cahaya tampak, sinar infra merah, sinar ultraungu (*ultra violet*) dibandingkan radiasi cahaya dan atau gelombang elektromagnetis lainnya, termasuk gelombang-gelombang TV, Radio, dan Radar dapat dilihat pada Gambar. 2 di bawah ini :



Gambar 2. Spektrum Elektromagnetik (Bismo, 2006: 3-6)

C. Tabir Surya

Tabir surya merupakan salah satu contoh sediaan kosmetik pelindung yang berperan untuk melindungi kulit utamanya dari bahaya sinar matahari khususnya sinar ultraviolet (UV).

1. Klasifikasi Tabir Surya

Penggolongan tabir surya didasarkan pada persen transmisi sinar UV, bisa dilihat pada tabel di bawah ini (Balsam, 1972: 285) :

Tabel 2. Penggolongan potensi tabir surya

Klasifikasi produk	Persen transmisi sinar ultraviolet (%)	
	<i>Erythematil range</i>	<i>Tanning range</i>
<i>Total block</i>	<1,0	3-40
<i>Extra protection</i>	1-6	42-86
<i>Regular suntan</i>	6-12	45-86
<i>Fast tanning</i>	10-18	45-86

Berdasarkan mekanisme kerjanya, bahan aktif tabir surya dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pemblok fisik (memantulkan radiasi matahari) serta mekanisme penyerap kimia (menyerap radiasi matahari). Tabir surya fisik mekanisme kerjanya memantulkan radiasi sinar ultraviolet, kemampuannya berdasarkan ukuran partikel dan ketebalan lapisan, bisa menembus lapisan dermis hingga subkutan atau hipodermis dan efektif pada spektrum radiasi UV-A, UV-B dan sinar tampak,

sedangkan tabir surya kimia, mekanisme kerjanya mengabsorpsi radiasi sinar ultraviolet dan mengubahnya menjadi bentuk energi panas, dapat mengabsorpsi hampir 95% radiasi sinar UV-B yang dapat menyebabkan *sunburn* (eritema & kerut) (Lavi, 2012: 6).

2. Mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit dari sinar ultraviolet

Berikut akan dibahas mekanisme proteksi tabir surya:

- a. Molekul bahan kimia tabir surya yang menyerap energi dari sinar UV, kemudian mengalami eksitasi dari ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi.
- b. Sewaktu molekul yang tereksitasi kembali ke kedudukan yang lebih rendah akan melepaskan energi yang lebih rendah dari energi semula yang diserap untuk menyebabkan eksitasi.
- c. Maka sinar UV dari energi yang lebih tinggi setelah diserap energinya oleh bahan kimia maka akan mempunyai energi yang lebih rendah.
- d. Sinar UV dengan energi yang lebih rendah akan kurang atau tidak menyebabkan efek sunburn pada kulit (FDA, 2003 didalam Lavi, 2012: 6).

3. Metode penentuan potensi tabir surya

Ada beberapa cara untuk menentukan kekuatan suatu preparat tabir surya yaitu:

- a. Metode SPF (*Sun Protecting Factor*)

Nilai SPF dihitung dengan terlebih dahulu menghitung luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut : (Chairns, 2008).

$$[AUC] = (A_a + A_b) / 2 \times dP_{a-b}$$

Dimana :

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan menggunakan rumus berikut (Chairns, 2008 ; Lowe, 2000):

$$\log \text{SPF} = \text{AUC}/(\lambda_n - \lambda_1)$$

λ_n = panjang gelombang terbesar

λ_1 = panjang gelombang terkecil

Menurut FDA, sediaan yang digunakan pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm² yang setara dengan 2 mg/ml (Lowe, 2000).

Menurut FDA (*Food Drug Administration*) pembagian tingkat kemampuan tabir surya (Damogalad, 2013: 42) sebagai berikut :

- 1) Minimal, bila SPF antara 2-4
- 2) Sedang, bila SPF antara 4-6
- 3) Ekstra, bila SPF antara 6-8
- 4) Maksimal, bila SPF antara 8-15
- 5) Ultra, bila SPF lebih dari 15

b. Berdasarkan persen transmisi eritema (%Te) dan pigmentasi (%Tp)

Persen transmisi eritema adalah persen total fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir surya. Transmisi eritema bahan tabir surya atau fluks eritema bahan tabir surya dapat ditentukan secara spektrofotometri dengan mengukur intensitas sinar yang diteruskan oleh bahan tabir surya pada panjang gelombang eritomatogenik kemudian dikalikan dengan fluks eritema/fluks pigmentasi yang terdapat pada tabel.

Tabel 3. Faktor efektifitas dan fluks eritema dan pigmentasi pada panjang gelombang 290 – 375 nm (Balsam,1972: 286).

Panjang gelombang (nm)	Intensitas rata-rata ($\mu\text{Watt}/\text{cm}^2$)	Faktor efektifitas <i>tanning</i>	Fluks <i>tanning</i> ($\mu\text{Watt}/\text{cm}^2$)
290 – 295	1,7	0,6500	0,1105
295 – 300	7,0	0,9600	0,6720
300 – 305	20,0	0,5000	1,0000
305 – 310	36,5	0,0550	0,2008
310 – 315	62,0	0,0220	0,1364
315 – 320	90,0	0,0125	0,1125
Total erythematous range, 290-320 nm			2,2332 (76,5%)
320 – 325	130,0	0,0083	0,1079
325 – 330	170,0	0,0060	0,1020
330 – 335	208,0	0,0045	0,0936
335 – 340	228,0	0,0035	0,0798
340 – 345	239,0	0,0028	0,0669
345 – 350	248,0	0,0023	0,0570
350 – 355	257,0	0,0019	0,0448
355 – 360	268,0	0,0016	0,0456
360 – 365	274,0	0,0013	0,0356
365 – 370	282,0	0,0011	0,0310
370 – 375	289,0	0,0008	0,0260
Total tanning range, 320 – 375 nm			0,6942 (23,7%)
Total tanning fluks, 290 – 375 nm			2,9264 (100%)

Semakin kecil suatu % transmisi eritema dan pigmentasi suatu sediaan berarti semakin sedikit sinar UV yang diteruskan sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan tersebut memiliki aktifitas yang besar sebagai tabir matahari.

Menurut Cumpelik (1972) persentase transmisi eritema/pigmentasi adalah perbandingan jumlah energi sinar UV yang diteruskan oleh sediaan tabir surya pada spektrum eritema/pigmentasi dengan jumlah faktor keefektifan eritema pada tiap panjang gelombang dalam rentang 292,5–372,5 nm. Sediaan tabir surya dapat

dikategorikan sebagai *Sunblock* (sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-A) apabila memiliki persentase transmisi eritema <1% dan persentase transmisi pigmentasi 3–40%. Jika persentase transmisi eritema 6–18% dan persentase transmisi pigmentasi 45–86% dikategorikan sebagai *Suntan* atau dapat dikatakan suatu bahan yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A (Soeratri. 2005: 117 didalam Syahrani. 2015: 21).

Menurut Cumpelik (1972) dalam penentuan persentase transmisi eritema dan persentase transmisi pigmentasi dilakukan dengan mengamati nilai serapan sampel pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm. Dari nilai serapan yang diperoleh dihitung nilai untuk 1g/L (A) dan persen transmisi (T) dengan rumus:

$$A = - \log T$$

Nilai transmisi eritema dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas eritema (Fe) pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm. Sedangkan, nilai transmisi pigmentasi dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas pigmentasi (Fp) pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm. Selanjutnya nilai persen transmisi eritema dan pigmentasi dihitung berdasarkan rumus % transmisi eritema yaitu:

- 1) % transmisi eritema $\frac{\sum T.Fe}{\sum Fe}$
- 2) % transmisi pigmentasi $\frac{\sum T.Fp}{\sum Fp}$ (Soeratri. 2005: 118 didalam Syahrani. 2015: 21-22).

D. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis adalah ilmu yang mempelajari teknik pengukuran interaksi materi berupa molekul dengan energi atau sinar berupa sinar tampak atau ultraviolet yang dapat menyebabkan eksitasi elektron dalam orbital molekul tersebut dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi sebagai fungsi panjang

gelombang. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, sementara sinar tampak (Visible) mempunyai panjang gelombang 400-800 nm. Sesuai dengan namanya, spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara spektrofotometer UV dan Visible. Spektrofotometer UV-Vis menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda yakni sumber cahaya UV dan sumber cahaya Visible. Spektrofotometer UV-Vis merupakan spektrofotometer berkas ganda sedangkan pada spektrofotometer Visible ataupun UV termasuk spektrofotometer berkas tunggal. Pada spektrofotometer berkas ganda blanko dan sampel dimasukkan atau disinari secara bersamaan, sedangkan spektrofotometer berkas tunggal blanko dimasukkan atau disinari secara terpisah (Harold, 2003 : 394 didalam Syahrani, 2015: 25).

Ketika cahaya mengenai sampel, sebagian akan diserap, sebagian akan dihamburkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Pada spektrofotometri, cahaya datang atau cahaya masuk atau cahaya yang mengenai permukaan zat dan cahaya setelah melewati zat tidak dapat diukur, yang dapat diukur adalah I_t/I_0 atau I_0/I_t (perbandingan cahaya datang dengan cahaya setelah melewati materi (sampel). Dimana I_0 merupakan intensitas cahaya datang dan I_t atau I_1 adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel (Khopkar, 2007).

Spektrum yang dikeluarkan oleh spektrofotometer UV-Vis berupa pita yang lebar dan biasanya hanya memperlihatkan beberapa puncak saja. Puncak dilaporkan sebagai panjang gelombang saat terjadi maksimum. Pita melebar dari UV-Vis disebabkan karena energi yang dimiliki selain menyebabkan transisi elektronik terjadi pula rotasi dan vibrasi elektron dalam molekul (Harold, 2003: 396 didalam Syahrani, 2015: 25).

E. Ekstraksi

1. Definisi ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian atau penarikan komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut dengan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 1986: 4).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Dirjen POM, 1979: 9).

2. Jenis-jenis ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara dingin dan secara panas. Ekstraksi secara dingin yaitu dengan metode maserasi, perkolasi dan soxhletasi, sedangkan ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air (Sudjadi, 1988: 60) :

a. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dengan dalam sel.

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian.

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama, dan penyariannya kurang sempurna.

b. Perkolasi (Dirjen POM, 1986: 16–22).

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, daya kapiler, dan daya geseran (friksi). Cara perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena:

- 1) Aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi.
- 2) Ruang di antara serbuk-serbuk simplisia terbentuk saluran tempat mengalirnya cairan penyari, karena kecilnya saluran kapiler tersebut maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi.

c. Soxhletasi (Dirjen POM, 1986: 26)

Pada proses isolasi menggunakan metode soxhletasi. Pada metode soxhletasi ini bahan yang akan diekstraksi berada pada sebuah kantung ekstraksi (kertas, karton, dan sebagainya). Di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (perkolator). Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan di antara labu suling

dan suatu aliran balik dan dihubungkan dengan melalui pipa pipet. Labu tersebut berisi pelarut, yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu, dengan demikian zat yang terekstraksi tertimbulk melalui penguapan kontinu dari bahan pelarut murni.

Pada cara ini orang membutuhkan bahan pelarut yang sangat sedikit juga ekstrak secara terus-menerus diperbaharui artinya dimasukkan bahan pelarut bebas bahan aktif (pembaharuan terus-menerus dari perbedaan konsentrasi). Keburukannya tentu saja disebabkan bahwa dibutuhkan suatu ekstraksi beberapa jam pada umumnya dan dengan demikian kebutuhan energinya tinggi (listrik), selanjutnya ekstrak dipanaskan dalam bagian tengah alat, yang langsung berhubungan dengan labu, darinya bahan pelarut diuapkan. Pemanasan yang bergantung dari lama ekstraksi, terutama dari titik didih bahan yang digunakan dapat bekerja negatif terhadap bahan tumbuhan yang peka terhadap suhu (glikosida, alkaloida).

Adapun cara kerja soxhletasi yaitu pertama-tama yang harus dilakukan adalah serbuk sampel dibungkus dengan kertas saring atau tempat tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam alat soxhlet. Pelarut etanol ditambahkan dari bagian atas sampai tumpah ke dalam labu. Ditambahkan pelarut lagi kira-kira sampai setengahnya. Labu yang sudah berisi pelarut tersebut dipanaskan pada suhu tertentu sampai mendidih. Pada proses ini uap pelarut akan naik dan bersentuhan dengan kondensor. Di mana uap akan terkondensasi dan menetes di atas sampel dan selanjutnya merendam sampel tersebut. Selama proses ini serbuk sampel akan

terekstraksi. Apabila ekstrak sudah sampai pada batas “pipa u” maka ekstrak akan turun ke labu dan akan mendidih kembali. Proses ini akan berjalan kontinu sampai semua ekstrak terekstraksi.

d. Refluks (Sudjadi, 1988: 65–67)

Sampel yang biasanya diekstraksi dengan metode refluks adalah yang mempunyai komponen kimia yang tahan terhadap pemanasan dan mempunyai tekstur yang keras seperti akar, batang, buah/biji dan herba. Sampel atau bahan yang akan diekstraksi ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan diisi dengan cairan penyari yang sesuai misalnya metanol sampai serbuk simplisia terendam kurang lebih 2 cm di atas permukaan simplisia, atau 2/3 volume labu, kemudian labu alas bulat dipasang kuat pada statif dan ditempatkan di atas penangas atau heating mantel lalu dipasang kondensor pada labu alas bulat yang dikuatkan dengan klem dan statif. Aliran air dan pemanas dijalankan sesuai dengan suhu pelarut yang digunakan. Setelah 4 jam dilakukan penyaringan, filtrat ditampung di dalam wadah penampung dan ampasnya ditambah lagi dengan pelarut dan dikerjakan seperti semula. Ekstraksi dilakukan 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan dengan rotavapor.

e. Destilasi Uap Air (Dirjen POM, 1986: 28)

Destilasi uap dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang mengandung komponen yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Pada pemanasan biasa kemungkinan akan terjadi kerusakan zat aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut maka penyarian dilakukan dengan destilasi uap.

Dengan adanya uap air yang masuk, maka tekanan kesetimbangan uap zat kandungan akan diturunkan menjadi sama dengan tekanan bagian di dalam suatu

sistem sehingga produk akan terdestilasi dan terbawa oleh uap air yang mengalir. Destilasi uap bukan semata-mata suatu proses penguapan pada titik didihnya, tetapi suatu perpindahan massa ke suatu media yang bergerak. Uap jenuh akan membasahi permukaan bahan, melunakkan jaringan dan menembus ke dalam dan zat aktif akan pindah ke rongga uap air yang aktif dan selanjutnya akan pindah ke ruang uap yang bergerak melalui antar fasa. Proses ini disebut hidrodifusi.

3. Ekstraksi senyawa flavonoid

Isolasi flavonoid umumnya dilakukan dengan metode ekstraksi, yaitu maserasi atau soxhletasi menggunakan pelarut yang melarutkan flavonoid. Pada proses ekstraksinya, untuk tujuan skrining maupun isolasi, umumnya menggunakan pelarut etanol atau metanol. Aglikon flavonoid adalah polifenol dan karena itu mempunyai sifat fisika kimia senyawa fenol, yaitu bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam basa. Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil, flavonoid merupakan senyawa polar. Flavonoid umumnya larut dalam pelarut polar seperti Etanol (EtOH), Metanol (MeOH), Butanol (BuOH), Aseton, Dimetilsulfosida (DMSO), Dimetilformamida (DMF), air, dan lain-lain (Sjahid, 2010: 7).

F. Uraian Jeruk Nipis

1. Taksonomi Tanaman

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Rutales
Famili	: Rutaceae
Genus	: <i>Citrus</i>

Spesies : *Citrus urantifolia* (Tjirosoepomo, 2013: 290-293)

2. Morfologi

Tanaman jeruk nipis berbentuk perdu, rindang (rimbun), dan memiliki banyak percabangan. Cabang dan ranting berduri. Tinggi tanaman berkisar antara 150 cm – 350 cm. Perakaran tanaman cukup kuat, cukup dalam, dan dapat tumbuh dengan baik pada segala jenis tanah. Daun berbentuk bulat panjang dan tumpul pada bagian ujung. Tangkai daun agak bersayap. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua mengilap, sedangkan bagian bawah berwarna hijau muda. Kedudukan daun pada ranting pada umumnya mendatar (Rukmana, 2003: 14)

Jeruk nipis bisa berproduksi secara optimal setelah berumur enam tahun. Setiap 1 hektar (ha) lahan jeruk nipis bisa memproduksi sebanyak 3-4 ton buah jeruk nipis sekali panen. Panen biasanya bisa dilakukan setiap lima belas hari sekali (Warta Agro, 2014 didalam Agnes, 2015: 1)

Kulit buah jeruk nipis mempunyai tiga lapisan yaitu:

- a. Lapisan luar yang kaku menjangat dan mengandung banyak kelenjar minyak atsiri, yang mula-mula berwarna hijau, tetapi jika buah masak warnanya berubah menjadi kuning atau jingga. Lapisan ini disebut flavedo.
- b. Lapisan tengah yang bersifat seperti sepon, terdiri atas jaringan bunga karang yang biasa berwarna putih, dinamakan albedo.
- c. Lapisan dalam yang bersekat-sekat, hingga terbentuk beberapa ruangan. Dalam ruangan-ruangan ini terdapat gelembung-gelembung yang berair, dan bijinya terdapat bebas, diantara gelembung-gelembung ini (Tjirosoepomo, 2013).

3. Jenis-jenis tanaman

Ada 2 jenis jeruk nipis yang di kenal di Indonesia :

1. Jeruk Nipis Berbiji

Jeruk nipis biasa disebut juga jeruk nipis berbiji atau jeruk nipis tradisional. Buah berbentuk bundar seperti bola atau bulat lonjong dan berukuran kecil (panjang 3,5 cm – 5,0 cm). Ujung buah tidak berputing, rata, atau agak menjorok kedalam. Buah muda berwarna hijau dan setelah masak berubah menjadi kuning kehijau-hijauan, banyak mengandung air, sangat asam, beraroma sedap yang khas, memiliki kandungan asam sitrat tinggi (8,7%), dan berbiji banyak. Pada umumnya, buah jeruk nipis biasa tumbuh satu per satu pada cabang atau ranting.

2. Jeruk Nipis Nonbiji

Buah jeruk nipis tanpa biji berbentuk bulat seperti jeruk nipis berbiji dan berukuran sebesar telur ayam atau sebanding dengan lemon tea. Buah masak berwarna kuning mulus dengan daging buah berwarna kuning atau kuning kehijau-hijauan. Kulit buah tipis dan berwarna kuning bersih. Buah banyak mengandung air, tidak berbiji, dan beraroma harum. Buah jeruk nipis tanpa biji satu per satu pada tangkai, tidak bergerombol (Rukmana, 2013: 15-16).

4. Kegunaan Tanaman

Buah jeruk nipis berkhasiat untuk menurunkan panas/demam (antipiritik), antibatuk (antitussive), menghilangkan rasa sakit (analgetic), dan pencahar (laxant). Jeruk nipis menurut catatan kuno sejak zaman nenek moyang, bermanfaat untuk obat, menjaga kesehatan dan juga untuk perawatan kesehatan (Karina, 2012: vi).

5. Kandungan kimia

Pada umumnya masyarakat sudah banyak mengetahui akan kandungan vitamin Cnya yang cukup besar. Namun ternyata masih banyak lagi kandungan-kandungan dari buah ini seperti halnya mineral yang dikandungnya. Buah jeruk nipis

mengandung beberapa zat yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain, asam sitrun, glukosa, lemak, minyak atsiri, vitamin C, kalsium, fosfor, belerang, dan asam amino (Karina, 2012: 13).

Tabel 4. Kandungan gizi buah jeruk nipis (100 gram).

No.	Kandungan Gizi	Jumlah
1.	Kalori	37,00 kal
2.	Protein	0,80 g
3.	Lemak	0,10 g
4.	Karbohidrat	12,30 g
5.	Fosfor	22 mg
6.	Zat besi	0,60 mg
7.	Kalsium	40 mg
8.	Vitamin A	0,00SI
9.	Vitamin B1	0,04 mg
10.	Vitamin C	27,00 mg
11.	Air	86,00 g
12.	Bdd	76,00 %

(Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI. 1981 didalam Rukmana, 2013: 12)

G. Tinjauan Islam

Di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw, sebagai utusan Allah, memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barang siapa menyelidiki seluk-beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya di sekitarnya, akan mengenali kebijakan, Ilmu dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004; 15).

Hadis yang membahas tentang ilmu yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya :

“Siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu Allah. Maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk ke surga” (HR. Tirmidzi).

Dari hadis diatas dapat menjelaskan bahwa ketika seseorang mempunyai niat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka segala jalan untuk menggapai ilmu akan dimudahkan. Sekaligus memberikan motivasi kepada setiap orang yang giat mencari ilmu, maka ketika ia dengan tulus dan ikhlas bepergian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka bersama dengan itu pula Allah melapangkan baginya jalan menuju kebahagiaan dan kemudahan. Suatu hal yang sangat penting untuk diyakini dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang yang mencari ilmu maka Allah akan benar-benar membantu dan memudahkan persoalan setiap muslim yang dengan sungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Begitupun dengan penelitian, apabila kita bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran karena-Nya niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya dan memudahkan persoalan yang dihadapi.

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah swt. tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk diantaranya adalah tanaman buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. Al-an'am/6: 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^ق انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^ج إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Dia yang telah menurunkan air dari langit, lalu Kami mengeluarkan disebabkan olehnya segala macam tumbuhan-tumbuhan, lalu Kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan darinya butir yang saling bertumpuk; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2012: 203).

Ayat ini merupakan bukti-bukti kemahakusaan Allah swt. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuhan-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya berasal dari satu biji atau benih (Shihab, 2009: 573).

Selanjutnya Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir, yaitu bahwa: Dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase di waktu

pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman (Shihab, 2009: 574).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab al-Muntahab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuhan-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Adapun dalam ayat ini yang ditutup dengan *liqaumin yu'minun* bagi kaum yang beriman, ia ditutup demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman. Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada Allah pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat. Atau, dapat juga penutup itu dipahami sebagai mengisyaratkan bahwa yang tidak mengetahui dengan dalam atau bahkan yang tidak mengetahui walau sepintas tentang bukti-bukti tersebut bukanlah orang yang beriman (Shihab, 2009: 574-575).

Dalam surah lain, Allah swt. juga menerangkan tentang tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana dalam firman-Nya QS. An-Nahl/16: 11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengannya tanaman-tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan dari segala buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Kementrian Agama RI, 2012: 403).

Dia, yakni Allah swt., menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman, dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan (Shihab, 2009: 543).

Dari penjelasan ayat-ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia yang memiliki iman kepada Allah swt., hendaknya memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diciptakan-Nya karena tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia di muka bumi ini, diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Allah swt., menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di bumi dengan begitu banyak manfaatnya masing-masing, seperti buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Allah swt., menciptakan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan, karena di dalam itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya. Hal inilah mendorong manusia yang beriman dan berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, seperti buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) ini, dengan adanya kandungan senyawa-senyawa aktif di dalamnya, ternyata dapat digunakan

sebagai bahan untuk sediaan tabir surya yang bisa melindungi kulit atau menjaganya dari dampak buruk sinar matahari.

Dalam surah lain Allah juga menerangkan tentang matahari sebagaimana dalam firman-Nya QS. Asy-Syams/ 91 : 1

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari” (Kementrian Agama RI, 2012: 595).

Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah demi sejumlah makhluk ciptaan-Nya yang begitu besar yang menunjukkan betapa sempurnanya keesaan dan kekuasaan-Nya bahwa orang yang menyucikan dirinya dengan keimanan dan ketaatan akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan, dan bahwa orang yang mencelakakan dirinya dengan bersikap ingkar dan berbuat maksiat akan memperoleh kerugian. Setelah itu, Allah memperlihatkan bencana yang terjadi pada bangsa Tsamud, kaum Nabi Shalih, sebagai salah satu contoh yang dapat dijadikan pelajaran oleh setiap pembangkang dan pendusta. Dikisahkan, misalnya, bahwa ketika kaum Tsamud itu mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka dan menyembelih unta, Allah membinasakan mereka semua. Allah tak akan pernah khawatir terhadap akibat pembinasaaan dan apa yang ditimpakan-Nya kepada mereka, karena Dia memang tidak akan ditanya tentang apa yang telah diperbuat. Dia telah menurunkan kepada mereka apa yang berhak mereka terima. Aku bersumpah demi matahari: cahaya, terbit dan panasnya (Shihab, 2009: 932).

Manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat, potensi, dan kecenderungan ganda, yakni positif ke arah baik atau negatif ke arah buruk. Jika ingin berbahagia,

maka dia harus mengembangkan diri ke arah yang baik. Begitupun dengan kulit kita apabila kulit terpapar sinar matahari secara berlebihan maka akan menyebabkan efek negatif atau buruk terhadap kulit, salah satu contohnya yaitu dapat menyebabkan flek hitam yang mengakibatkan terjadinya kanker kulit.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui potensi tabir surya pada ekstrak kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta di Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksperimental.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Tanaman buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berasal dari daerah Desa Bissua Kec. Pallangga, Kab. Gowa.

2. Sampel

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berasal dari daerah Desa Bissua Kec. Pallangga, Kab. Gowa.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengolahan Sampel

Sampel buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berwarna hijau tua dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel, kemudian dikupas lalu dipisahkan kulit dan dirajang kecil-kecil. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering sampai kering. Tujuannya adalah simplisia tidak mudah rusak dan tidak terjadi kerusakan dekomposisi kandungan senyawa dalam tanaman kulit buah jeruk nipis. Simplisia yang sudah kering dirajang kecil-kecil.

2. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi, metode maserasi digunakan karena kulit buah jeruk nipis mengandung senyawa yang tidak tahan terhadap panas, yaitu flavonoid (Gupita, 2012). Diambil simplisia lalu ditimbang sebanyak 650 gr kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi. Kemudian dituangi pelarut etanol 70% sebanyak 3 liter, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserakai dengan bugner dan ampas ditambah cairan penyari, diaduk dan diserakai kembali sehingga diperoleh seluruh sari. Kemudian sari ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan (Depkes RI. 1979). Sari kemudian dipekatkan dan diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 60° C selama 4 jam sampai diperoleh ekstrak kental. Dilakukan remaserasi, ditambahkan

pelarut etanol 70% sebanyak 2 liter hingga simplisia terendam seluruhnya kemudian diaduk. Wadah maserasi ditutup dan didiamkan. Proses ekstraksi terus berlanjut hingga diperoleh filtrat yang jernih, kemudian dipekatkan hingga didapatkan ekstrak yang kental.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah maserasi, cawan porselin, gelas ukur, kuvet, labu tentukur, mikro pipet, neraca analitik, pipet tetes, spektrofotometer UV-Vis, dan deksikator vakum.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air suling, kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), pelarut etanol 70 %.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat dari absorbansi yang diukur untuk penentuan potensi tabir surya. Pada penelitian ini potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis ditentukan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema dan transmisi pigmentasi.

Ditimbang dengan seksama ekstrak kulit buah jeruk nipis kemudian dilarutkan dengan pelarut dan dimasukkan ke dalam labu tentukur, diperoleh suatu konsentrasi (Larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga diperoleh 6 konsentrasi yaitu 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm. Diamati nilai transmisi

dan serapannya pada panjang gelombang 290-400 nm dengan perubahan setiap kali pengamatan.

2. Analisis Data

- a. Nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) dihitung terlebih dahulu luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\{AUC\} = \frac{Aa + Ab}{2} \times dPa-b$$

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan menggunakan rumus berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\log SPF = AUC / \lambda n - \lambda 1$$

λn = panjang gelombang terbesar (dengan $A > 0,05$ untuk ekstrak dengan $A > 0,01$ untuk sediaan

$\lambda 1$ = panjang gelombang terkecil (290 nm)

Untuk memperoleh nilai SPF pada rentan panjang gelombang UV A dan UV B, terlebih dahulu ditentukan rata-rata nilai A pada interval aktivitas eritemogeniknya adalah interval panjang gelombang yang dapat diserap oleh bahan tabir surya yang dapat menyebabkan eritema yang dapat ditunjukkan dengan absorbansi sebesar 0,05

pada sampel tanpa pengencer. Sediaan yang digunakan pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm^2 yang setara dengan 2 mg/ml .

b. Nilai Persen Eritema

Dari data pengamatan nilai transmittan pada berbagai panjang gelombang dapat dihitung persen transmisi eritema dengan cara sebagai berikut :

1. Nilai transmisi eritema adalah T_{Fe} . Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang (panjang gelombang $292,5 - 372,5 \text{ nm}$).
2. Banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir matahari (E_e) dihitung dengan rumus : $E_e = \sum T_{Fe}$
3. Kemudian % transmisi eritema dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ transmisi eritema} = \frac{E_e}{\sum T_{Fe}}$$

Dimana :

T = Nilai transmisi

T_{Fe} = Fluks eritema

$E_e = \sum T_{Fe}$ = banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh ekstrak panjang gelombang $292,5 - 317,5 \text{ nm}$

c. Persen Transmisi Pigmentasi

Nilai persen transmisi pigmentasi dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Nilai transmisi pigmentasi adalah T_{Fp} . Perhitungan nilai transmisi pigmentasi tiap panjang gelombang (panjang gelombang $322,5 - 372,5 \text{ nm}$).

2. Banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh bahan tabir surya (E_p) dihitung dengan rumus $E_p = \Sigma T.F_p$
3. Kemudian % transmisi pigmentasi dihitung dengan rumus: % transmisi pigmentasi = $\frac{E_p}{\Sigma F_p}$

Dimana :

T = nilai transmisi

F_p = fluks pigmentasi

$E_p = \Sigma T.F_p$ = banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh ekstrak pada panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm

ΣF_p = Jumlah total energi sinar UV yang menyebabkan pigmentasi

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

Alat yang digunakan dalam menentukan Transmisi Eritema dan Pigmentasi serta nilai SPF adalah spektrofotometer UV-Vis. Reliabilitas dijaga dengan melakukan replikasi 3 kali pada tiap pengujian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Jeruk Nipis

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa buah jeruk nipis, kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu dikupas kulitnya, selanjutnya dilakukan perajangan, kemudian dikeringkan hingga diperoleh 650 gram simplisia kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang dimaserasi menggunakan larutan penyari etanol 70% sebanyak 3000 ml dan dilakukan remaserasi sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 8 gram.

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ gr}}{650 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 0,0123 \% \end{aligned}$$

2. Nilai Potensi Tabir Surya Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis

a. Nilai Transmisi Eritema dan Pigmentasi

1. Persen Transmisi Eritema (%Te)

Tabel 5. Nilai Persen Transmisi Eritema Kulit Buah Jeruk Nipis

Replikasi	Persen Transmisi Eritema				
	100 ppm	150 ppm	200 ppm	250 ppm	300 ppm
I	8,38 %	2,29 %	1,71 %	1,50 %	0,19 %
II	8,38 %	2,29 %	1,71 %	1,50 %	0,19 %
III	8,36 %	2,28 %	1,70 %	1,49 %	0,19 %
%Te Rata-rata	8,37 %	2,29 %	1,71 %	1,50 %	0,19 %

Kategori Tabir Surya	<i>Regular Suntan</i>	<i>Extra Protection</i>	<i>Extra Protection</i>	<i>Extra Protection</i>	<i>Total Block</i>
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

2. Persen Transmisi Pigmentasi (%Tp)

Tabel 6. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Kulit Buah Jeruk Nipis

Replikasi	Persen Tranmisi Pigmentasi				
	100 ppm	150 ppm	200 ppm	250 ppm	300 ppm
I	21,61 %	12,71 %	11,17 %	7,76 %	5,08 %
II	21,63 %	12,65 %	11,16 %	7,74 %	5,09 %
III	21,62 %	12,68 %	11,16 %	7,74 %	5,08 %
%Tp Rata-rata	21,62 %	12,68 %	11,16 %	7,75 %	5,08 %
Kategori Tabir Surya	<i>Total Block</i>	<i>Total Block</i>	<i>Total Block</i>	<i>Total Block</i>	<i>Total Block</i>

3. Nilai Rata - Rata SPF

Tabel 7. Nilai Rata - Rata SPF

Replikasi	Persen Nilai SPF				
	100 ppm	150 ppm	200 ppm	250 ppm	300 ppm
I	4,45	9,25	11,07	13,75	40,10
II	4,44	9,26	11,09	13,79	40,16
III	4,44	9,25	11,09	13,84	40,21
Rata-rata nilai SPF	4,44	9,25	11,08	13,79	40,15
Kategori Tabir Surya	<i>Sedang</i>	<i>Maksimal</i>	<i>Maksimal</i>	<i>Maksimal</i>	<i>Ultra</i>

B. Pembahasan

Tabir surya adalah sediaan kosmetik yang dirancang untuk dapat mengurangi efek yang berbahaya dari terpaparnya kulit pada sinar ultraviolet. Secara umum, tabir surya memiliki mekanisme kerja yaitu partikel dari radiasi sinar UV dinamakan foton bertemu dengan sepasang elektron pada molekul tabir surya (Bonda, 2009). Tabir surya dapat dibuat dalam berbagai bentuk sediaan seperti : krim, losio dan salep. Contoh sediaan yang beredar yaitu vaseline SPF 30 memakai ekstrak Lidah Buaya (*Aloe vera*).

Sinar UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar ultraviolet A (UV-A), UV-B, dan UV-C, yang ketiganya mempunyai panjang gelombang dan efek radiasi yang berbeda. Sinar UV-A dengan panjang gelombang 320–400 nm mempunyai efek radiasi, berupa pigmentasi yang menyebabkan kulit berwarna coklat dan kemerahan. Sinar UV-B dengan panjang gelombang 290-320 nm memiliki efek radiasi, yang menyebabkan eritema (kemerahan) hingga dapat menyebabkan kanker kulit bila terlalu lama terkena radiasi ini. Sedangkan sinar UV-C dengan panjang gelombang 200-290 nm tertahan pada lapisan atmosfer paling atas dari bumi dan tidak sempat masuk ke bumi karena adanya lapisan ozon (Tranggono dkk, 2007: 83). Sehingga dalam penelitian ini, potensi tabir surya diukur dari panjang gelombang 290-400 (UV A dan UV B).

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi, metode maserasi digunakan karena kulit jeruk nipis mengandung senyawa yang tidak tahan terhadap panas, yaitu flavonoid (Gupita, 2012). Ditimbang sebanyak 650 gram kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan 3 liter pelarut etanol 70%, hingga simplisia terendam seluruhnya kemudian diaduk, flavonoid merupakan

senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil. Oleh karena itu, umumnya flavonoid larut dalam pelarut polar seperti etanol. Etanol berfungsi sebagai pembebas flavonoid dari bentuk garamnya (Harborne, 1987). Proses maserasi dilakukan sebanyak 3 x 24 jam dengan tiga kali pengadukan.

Setelah dilakukan maserasi, dipisahkan dan diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 60° C selama 4 jam setelah itu hasil dari rotary evaporator tersebut dimasukkan kedalam desikator vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Digunakan rotary evaporator untuk memisahkan kandungan air yang terdapat dalam hasil maserasi tersebut dan digunakan desikator vakum untuk mempercepat diperolehnya ekstrak kental. Setelah diperoleh ekstrak kental dibuat larutan stok 1000 ppm. Ditimbang ekstrak sebanyak 20 mg dan dicampur dengan etanol p.a 20 ml. Setelah itu dibuat pengenceran 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm. Digunakan etanol p.a karena menurut Christian (1980) memiliki kemurnian sangat tinggi (>99,5%) dan biasanya digunakan untuk keperluan laboratorium.

Penentuan potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis dilakukan secara *In vitro* dengan metode spektrofotometer pada rentang panjang gelombang sinar ultraviolet. Alat spektrofotometri UV-Vis yang digunakan telah tervalidasi. Penentuan efektivitas tabir surya ini didasarkan pada Persen Transmisi Eritema dan Pigmentasi serta dengan menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*).

Pengujian potensi tabir surya ekstrak kulit buah jeruk nipis dilakukan dengan menghitung nilai transmisi eritema (%Te) dan transmisi Pigmentasi (%Tp) serta nilai SPF ekstrak. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil dimana nilai rata - rata %Te pada konsentrasi (100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm) dan blanko etanol p.a, berturut - turut adalah 8,37 %, 2,29 %, 1,71%, 1,50 % dan 0,19 % Nilai rata - rata

transmisi pigmentasi (%Tp) pada konsentrasi (100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm) berturut - turut adalah 21,62 %, 12,68 %, 11,16 %, 7,75 % dan 5,08 %. Pada penentuan nilai SPF, diperoleh nilai rata-rata SPF konsentrasi (100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm) berturut - turut sebesar 4,4; 9,2; 11; 13,7; 40,15.

Berdasarkan nilai Transmisi Eritema dan Pigmentasi, dapat dinyatakan bahwa konsentrasi ekstrak 100 ppm termasuk dalam kategori *regular suntan* untuk eritema yang didasarkan pada nilai persen (%Te) ekstrak sebesar 8,37 % karena berada pada range (6-12 %). Sementara persen Transmisi Pigmentasi berada dalam kategori *total block* yang didasarkan pada nilai (%Tp) ekstrak sebesar 21,62 % karena berada pada range (3-40 %). Konsentrasi 150, 200, dan 250 ppm termasuk dalam kategori *extra protection* untuk eritema dengan range (1-6 %) berdasarkan hasil pengukuran rata-rata nilai transmisi yang menunjukkan (%Te) ekstrak sebesar 2,29 % pada konsentrasi 150 ppm, 1,71 % pada konsentrasi 200 ppm, dan 1,50 % pada konsentrasi 250 ppm. Sementara pada pigmentasi, konsentrasi 150, 200, dan 250 ppm termasuk dalam kategori *total block* untuk pigmentasi dengan range (3-40 %) berdasarkan hasil pengukuran rata-rata nilai transmisi yang menunjukkan (%Tp) ekstrak sebesar 12,68 % pada konsentrasi 150 ppm, 11,16 % pada konsentrasi 200 ppm, dan 7,75 % pada konsentrasi 250 ppm. Sedangkan pada konsentrasi 300 ppm termasuk dalam kategori *total block* untuk eritema dengan range (<1 %) dengan ekstrak sebesar 0,19 % dan pigmentasi dengan range (3-40 %) dengan ekstrak sebesar 5,08 %.

Berdasarkan pengukuran rata-rata nilai SPF menunjukkan bahwa ekstrak memiliki nilai SPF yang rendah, yakni 4,4 pada konsentrasi 100 ppm termasuk

dalam kategori *minimal* dengan range 2-4. Dan SPF 9,2 pada konsentrasi 150 ppm, 11 pada konsentrasi 200 ppm, 13,7 pada konsentrasi 250 ppm sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *maksimal* dengan range 8-15 dan SPF 40,15 pada konsentrasi 300 ppm termasuk dalam kategori *ultra* dengan range lebih dari 15.

Dari hasil yang didapat yang termasuk dalam kategori *suntan* yaitu pada konsentrasi 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm. Dalam hal ini salah satu contohnya pada konsentrasi 100 ppm menyerap sedikit sinar UV B dan memiliki waktu yang singkat untuk menyerap sinar matahari sehingga dapat masih dapat menyebabkan eritema dan menyerap sinar UV A sehingga menyebabkan kecoklatan pada kulit namun bersifat sementara. Dan pada konsentrasi 300 ppm termasuk dalam kategori *sunblock* dimana mampu memantulkan sinar UV A dan UV B, dan memiliki waktu yang sangat lama untuk menghalangi sinar UV masuk kedalam kulit.

Faktor yang mempengaruhi penentuan nilai SPF yaitu perbedaan konsentrasi dari tabir surya. Faktor ini dapat menambah atau mengurangi penyerapan UV pada setiap tabir surya (More et. al, 2013)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak kulit buah jeruk nipis memiliki potensi sebagai tabir surya.
2. Ekstrak kulit buah jeruk nipis diperoleh hasil nilai SPF konsentrasi 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm berturut - turut sebesar 4,4; 9,2; 11,08; 13,7; 40,15.
3. Ekstrak kulit buah jeruk nipis konsentrasi ekstrak 100 ppm termasuk dalam kategori *regular suntan* untuk eritema dan kategori *total block* untuk pigmentasi memiliki SPF *sedang*. Konsentrasi 150, 200, dan 250 ppm termasuk dalam kategori *extra protection* untuk eritema dan *total block* untuk pigmentasi memiliki SPF *maksimal* dan 300 termasuk dalam kategori *total block* untuk eritema dan pigmentasi memiliki SPF *ultra*.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat formula ekstrak kulit buah jeruk nipis ini dalam bentuk sediaan.

KEPUSTAKAAN

- Agnes Lumban Gaol, Lia. Jurnal: *Respons Pertumbuhan Setek Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle) pada Berbagai Bahan Tanam dan Konsentrasi IBA (Indole Butyric Acid)*. Medan: USU. 2015
- Anggraini, Triani Dian. Jurnal: *Uji Stabilitas Fisik dan Penentuan Nilai SPF Secara In Vitro dari Krim Tabir Surya yang Mengandung Butil Metoksidibenzoilmetan dan Oktil Metoksisinamat dengan Penambahan Titanium Dioksida*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2013.
- Balsam, M.S., Edward Sagarin. *Cosmetics: Science and Technology*. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 1972.
- Barel, Andre. *Handbook of Cosmetic Science and technology third edition*. New York: Informa Healthcare. 2009.
- Bismo, Setijo. *Teknologi Radiasi Sinar Ultra-Ungu (UV) dalam Rancang Bangun Proses Oksidasi Lanjut untuk Pencegahan Pencemaran Air dan Fasa Gas*. Depok: Departemen Teknik Kimia, Universitas Indonesia. 2006.
- Bonda, Craig. *Sunscreen Photostability 101*. Happi. 2009.
- Chairns D. *Intisari Kimia Farmasi Ed. 2*. Terjemahan dari *Essentials of Pharmaceutical Chemistry, Second Edition* oleh Simanjuntak J. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2008.
- Colipa, *guidelines: International Sun Protection Factor Test Method*. 2006.
- Cumpelik, Boris. *Analytical Producers and evaluation of sunscreens*. Washington DC: Official Analytical Chemist-Society of cosmetic chemists. 1972.
- Damogalad, V. Hosea Jaya Edy dan Hamidah Sri Supriadi. *Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus L Merr) dan Uji In Vitro Nilai Sun Protecting Factor (SPF)*. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT Vol. 2 No. 2. Manado: Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT. 2013.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Edisi 2. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1986.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI. 1979.

- Dutra, EA Olivera D.A, *Determination of Sun Protecting Factor (SPF) of Sunscreen by Ultraviolet Spectrophotometry. Brazilian Journal Of Pharmaceutical Sciences*. M.I. 2004.
- Fajarwati, Nilam. *Uji Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dengan Menggunakan Metode DPPH (1,1Dhipenyl -2-Picrylhydrazyl)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013.
- Gupita, C. N. dan A. Rahayuni. *Pengaruh Berbagai pH Sari Buah dan Suhu Pasteurisasi Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Tingkat Penerimaan Sari Kulit Buah Manggis*. Journal of Nutrition College. 2012.
- Harold, Hart., Leslei E, Hart D. *Organic Chemistry, A Short Course, Eleven edition*. Houghton Mifflin Company. 2003.
- Israyani. *Skripsi: Penentuan Potensi Tabir Surya Ekstrak Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm f.)*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi, UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Karina, Anna. *Khasiat dan Manfaat Jeruk Nipis*. Surabaya: CV. Penerbit Stomata, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2012.
- Khasanah, Ismiyyatun. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanolik Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil)*. Journal of Nutrition College. 2014.
- Khopkar S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik. Terjemahan dari Basic Concepts Of Analytical Chemistry* oleh Saptoraharjo. Jakarta: UI-Press. 2007.
- Kusantati, Herni. *Tata Kecantikan Kulit*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Lavi, Novita. *Sunscreen For Travellers*. Denpasar: Departement Pharmacy Faculty of Medicine, University of Udayana. 2012.
- Lowe NJ, Shaath NA. *Sunscreen Development, Evaluation, and Regulatory Spect*. New York: Marcel Dekker. 2000.
- Martini, F. H. *Foundamentals of Anatomy & Physiology 5th ed*. New Jersey: Prentice Hall. 2001.

- More BH, Sakharwade SN, Thembrune SV, Sakarkar DM. *Evaluation of Sunscreen Activity of Cream Containing Leaves Extract of Butea monosperma for Topical Application*. India: Sudhakar Rao Naik Institute of Pharmacy. 2013
- Mutschler, Ernts. *Dinamika Obat*. Mathilda B. Widiyanto, penerjemah. Bandung: Penerbit ITB. 1991.
- Pathak, M.A. *Sunscreens : Topical and Systemic Approaching for Protection For Human Skin Against Harmful Effect Of Solar Radiation*. J Am Acad Dermatol. 1982.
- Rukmana, Rahmat. *Jeruk Nipis Prospek Agribisnis, Budi Daya, dan Pascapanen*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
- Setiawan, Tri. *Uji Stabilitas Fisik Dan Penentuan Nilai SPF Krim Tabir Surya Yang Mengandung Ekstrak Daun Teh Hijau (Camellia Sinensis L.), Oktal Metoksisinamat, Dan Titanium Dioksida*. Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an Vol. 6*. Jakarta: Penerbit lentera hati. 2009.
- Sjahid, Landyyun Rahmawan. *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Dari Daun Dewandaru (Eugenia uniflora L.)*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Soeratri, Widji, dkk. *Penentuan Stabilitas Sediaan Krim Tabir Surya Dari Bahan Ekstrak Rimpang Kencur (Kaempferia galanga L.)*. Jakarta: Fakultas farmasi, Universitas Ailangga. Berkala penelitian Hayati 10. 2005.
- Syahrani. *Formulasi dan Uji Potensi Krim Tabir Surya Dengan Bahan Aktif Ekstrak Etanol Kulit Nanas (Ananas comosus (L.) Merr)*. Makassar: Fakultas Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2015.
- Sudjadi. *Metode Pemisahan*. Edisi I. Yogyakarta: Pkanisius. 1988.
- Tjirosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2013.
- Tjirosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2013.
- Tori. *Keutamaan Ilmu Ulama Perspektif Hadis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Tranggono, Retno I dan Fatmas Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Widyastuti. *Pengujian Aktivitas Antioksidan dan Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga Super Merah (hylocereus costaricensis (F.A.C. Weber) Britton & Rose)*. Bukittinggi: Akademi Farmasi Imam Bonjol. 2015.


Yahya, Harun. *Alqur'an dan Sains*. Bandung: Penerbit Dzirka. 2004.


Yuliasuti, Ike. *Pemodelan dan Sintesis Senyawa Penyerap Sinar UV 3,4 Dimetoksi heksilsinamat Berdasarkan Pendekatan Kimia Komputasi*. Yogyakarta: FMIPA UGM. 2002.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel



Lampiran 2. Skema Analisis Data

Lampiran 3. Gambar Sampel

Gambar 3. Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)



Lampiran 4. Hasil pengukuran persen transmisi dan SPF

A. Pengukuran persen transmisi Eritema dan Pigmentasi

1. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentsi konsentrasi 100 ppm

a. Data transmisi replikasi 1

Tabel 8. Data Transmisi Replikasi I 100 ppm

Panjang gelombang (nm)	Erythematous Flux/ Tanning Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0,1105	9,844	1,0878	%Te = 8,3762
297.5	0,672	9,081	6,1024	
302.5	1	8,246	8,246	
307.5	0,2008	7,518	1,5096	
312.5	0,1364	7,052	0,9619	
317.5	0,1125	7,094	0,7981	
Jumlah	2,2332		18,706	
322.5	0,1079	7,718	0,8328	%Tp = 21,613
327.5	0,102	8,815	0,8991	
332.5	0,0936	11	1,0296	
337.5	0,0798	14,422	1,1509	
342.5	0,0669	18,718	1,2522	
347.5	0,057	24,115	1,3746	
352.5	0,0488	32,423	1,5822	
357.5	0,0456	41,253	1,8811	
362.5	0,0356	48,791	1,737	
367.5	0,031	54,991	1,7047	
372.5	0,026	59,994	1,5598	
Jumlah	0.6942		15,004	

b. Data transmisi replikasi 2

Tabel 9. Data Transmisi Replikasi II 100 ppm

Panjang gelombang (nm)	Erythematous Flux/ Tanning Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0,11	9,852	1,0886	%Te = 8,383
297.5	0,67	9,087	6,1065	
302.5	1	8,257	8,257	
307.5	0,2	7,506	1,5072	

312.5	0,14	7,053	0,962	
317.5	0,11	7,099	0,7986	
Jumlah	2,23		18,72	
322.5	0,11	7,71	0,8319	%Tp = 21,626
327.5	0,1	8,828	0,9005	
332.5	0,09	11,018	1,0313	
337.5	0,08	14,45	1,1531	
342.5	0,07	18,749	1,2543	
347.5	0,06	24,179	1,3782	
352.5	0,05	32,387	1,5805	
357.5	0,05	41,252	1,8811	
362.5	0,04	48,803	1,7374	
367.5	0,03	54,946	1,7033	
372.5	0,03	60,043	1,5611	
Jumlah	0,69		15,013	

c. Data transmisi replikasi 3

Tabel 10. Data Transmisi Replikasi III 100 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ Tanning Fe/Fp (E-vitons)	% T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	9,827	1,0859	%Te = 8,36
297.5	0.672	9,064	6,091	
302.5	1	8,23	8,23	
307.5	0.2008	7,495	1,505	
312.5	0.1364	7,042	0,9605	
317.5	0.1125	7,091	0,7977	
Jumlah	2.2332		18,67	
322.5	0.1079	7,694	0,8302	%Tp = 21,62
327.5	0.102	8,827	0,9004	
332.5	0.0936	11,055	1,0347	
337.5	0.0798	14,512	1,1581	
342.5	0.0669	18,792	1,2572	
347.5	0.057	24,138	1,3759	
352.5	0.0488	32,341	1,5782	
357.5	0.0456	41,207	1,879	
362.5	0.0356	48,72	1,7344	
367.5	0.031	54,835	1,6999	
372.5	0.026	59,918	1,5579	
Jumlah	0.6942		15,006	

2. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentsi konsentrasi 150 ppm

a. Data transmisi replikasi 1

Tabel 11. Data Transmisi Replikasi I 150 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythematous Flux/Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,981	0,3294	%Te = 2,291
297.5	0.672	2,616	1,758	
302.5	1	2,223	2,223	
307.5	0.2008	1,899	0,3813	
312.5	0.1364	1,692	0,2308	
317.5	0.1125	1,722	0,1937	
Jumlah	2.2332		5,1162	
322.5	0.1079	1,961	0,2116	%Tp = 12,71
327.5	0.102	2,44	0,2489	
332.5	0.0936	3,461	0,3239	
337.5	0.0798	5,359	0,4276	
342.5	0.0669	8,068	0,5397	
347.5	0.057	12,195	0,6951	
352.5	0.0488	19,543	0,9537	
357.5	0.0456	28,865	1,3162	
362.5	0.0356	37,713	1,3426	
367.5	0.031	45,527	1,4113	
372.5	0.026	52,049	1,3533	
Jumlah	0.6942		8,8241	

b. Data transmisi replikasi 2

Tabel 12. Data Transmisi Replikasi II 150 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythematous Flux/Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,969	0,3281	%Te = 2,287
297.5	0.672	2,618	1,7593	
302.5	1	2,216	2,216	
307.5	0.2008	1,888	0,3791	
312.5	0.1364	1,695	0,2312	
317.5	0.1125	1,714	0,1928	
Jumlah	2.2332		5,1065	
322.5	0.1079	1,956	0,2111	%Tp =

327.5	0.102	2,429	0,2478	12,65
332.5	0.0936	3,468	0,3246	
337.5	0.0798	5,33	0,4253	
342.5	0.0669	8,054	0,5388	
347.5	0.057	12,171	0,6937	
352.5	0.0488	19,545	0,9538	
357.5	0.0456	28,806	1,3136	
362.5	0.0356	37,493	1,3348	
367.5	0.031	45,01	1,3953	
372.5	0.026	51,649	1,3429	
Jumlah	0.6942		8,7816	

c. Data transmisi replikasi 3

Tabel 13. Data Transmisi Replikasi III 150 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,954	0,3264	%Te = 2,279
297.5	0.672	2,595	1,7438	
302.5	1	2,218	2,218	
307.5	0.2008	1,879	0,3773	
312.5	0.1364	1,69	0,2305	
317.5	0.1125	1,714	0,1928	
Jumlah	2.2332		5,0889	
322.5	0.1079	1,932	0,2085	%Tp = 12,68
327.5	0.102	2,401	0,2449	
332.5	0.0936	3,45	0,3229	
337.5	0.0798	5,314	0,4241	
342.5	0.0669	8,037	0,5377	
347.5	0.057	12,151	0,6926	
352.5	0.0488	19,45	0,9492	
357.5	0.0456	28,821	1,3142	
362.5	0.0356	37,773	1,3447	
367.5	0.031	45,589	1,4133	
372.5	0.026	51,917	1,3498	
Jumlah	0.6942		8,8018	

3. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentasi konsentrasi 200 ppm

a. Data transmisi replikasi 1

Tabel 14. Data Transmisi Replikasi I 200 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,217	0,245	%Te = 1,712
297.5	0.672	1,959	1,3164	
302.5	1	1,667	1,667	
307.5	0.2008	1,399	0,2809	
312.5	0.1364	1,247	0,1701	
317.5	0.1125	1,272	0,1431	
Jumlah	2.2332		3,8225	
322.5	0.1079	1,473	0,1589	%Tp = 11,17
327.5	0.102	1,853	0,189	
332.5	0.0936	2,688	0,2516	
337.5	0.0798	4,267	0,3405	
342.5	0.0669	6,63	0,4435	
347.5	0.057	10,293	0,5867	
352.5	0.0488	16,969	0,8281	
357.5	0.0456	25,718	1,1727	
362.5	0.0356	34,307	1,2213	
367.5	0.031	41,982	1,3014	
372.5	0.026	48,356	1,2573	
Jumlah	0.6942		7,7511	

b. Data transmisi replikasi 2

Tabel 15. Data Transmisi Replikasi II 200 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,214	0,2446	%Te = 1,707
297.5	0.672	1,955	1,3138	
302.5	1	1,657	1,657	
307.5	0.2008	1,395	0,2801	
312.5	0.1364	1,256	0,1713	
317.5	0.1125	1,285	0,1446	
Jumlah	2.2332		3,8114	
322.5	0.1079	1,48	0,1597	%Tp = 11,16
327.5	0.102	1,853	0,189	
332.5	0.0936	2,692	0,252	
337.5	0.0798	4,282	0,3417	

342.5	0.0669	6,616	0,4426
347.5	0.057	10,33	0,5888
352.5	0.0488	17,03	0,831
357.5	0.0456	25,71	1,1723
362.5	0.0356	34,22	1,2183
367.5	0.031	41,95	1,3005
372.5	0.026	48,24	1,2543
Jumlah	0.6942		7,7501

c. Data transmisi replikasi 3

Tabel 16. Data Transmisi Replikasi III 200 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	2,208	0,244	%Te = 1,703
297.5	0.672	1,954	1,3131	
302.5	1	1,651	1,651	
307.5	0.2008	1,408	0,2827	
312.5	0.1364	1,244	0,1697	
317.5	0.1125	1,267	0,1425	
Jumlah	2.2332		3,803	
322.5	0.1079	1,473	0,1589	%Tp = 11,16
327.5	0.102	1,839	0,1876	
332.5	0.0936	2,705	0,2532	
337.5	0.0798	4,272	0,3409	
342.5	0.0669	6,61	0,4422	
347.5	0.057	10,26	0,5848	
352.5	0.0488	16,955	0,8274	
357.5	0.0456	25,684	1,1712	
362.5	0.0356	34,278	1,2203	
367.5	0.031	41,985	1,3015	
372.5	0.026	48,364	1,2575	
Jumlah	0.6942		7,7455	

4. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentasi konsentrasi 250 ppm

a. Data transmisi replikasi 1

Tabel 17. Data Transmisi Replikasi I 250 ppm

Panjang gelombang	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i>	%T	Ee	%Te/%Tp
-------------------	--------------------------------	----	----	---------

(nm)	Fe/Fp (E-vitons)			
292.5	0.1105	1,691	0,1869	%Te = 1,50
297.5	0.672	1,495	1,0046	
302.5	1	1,488	1,488	
307.5	0.2008	1,482	0,2976	
312.5	0.1364	1,494	0,2038	
317.5	0.1125	1,552	0,1746	
Jumlah	2.2332		3,3555	
322.5	0.1079	1,62	0,1748	%Tp = 7,76
327.5	0.102	1,723	0,1757	
332.5	0.0936	1,995	0,1867	
337.5	0.0798	2,696	0,2151	
342.5	0.0669	3,791	0,2536	
347.5	0.057	5,649	0,322	
352.5	0.0488	9,9	0,4831	
357.5	0.0456	16,471	0,7511	
362.5	0.0356	23,987	0,8539	
367.5	0.031	31,558	0,9783	
372.5	0.026	38,12	0,9911	
Jumlah	0.6942		5,3856	

b. Data transmisi replikasi 2

Tabel 18. Data Transmisi Replikasi II 250 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythematous Flux/Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	1,69	0,1867	%Te = 1,50
297.5	0.672	1,493	1,0033	
302.5	1	1,483	1,483	
307.5	0.2008	1,473	0,2958	
312.5	0.1364	1,484	0,2024	
317.5	0.1125	1,54	0,1733	
Jumlah	2.2332		3,3445	
322.5	0.1079	1,595	0,1721	%Tp = 7,74
327.5	0.102	1,722	0,1756	
332.5	0.0936	1,997	0,1869	
337.5	0.0798	2,683	0,2141	
342.5	0.0669	3,735	0,2499	
347.5	0.057	5,677	0,3236	
352.5	0.0488	9,875	0,4819	
357.5	0.0456	16,461	0,7506	

362.5	0.0356	23,963	0,8531
367.5	0.031	31,459	0,9752
372.5	0.026	38,093	0,9904
Jumlah	0.6942		5,3735

c. Data transmisi replikasi 3

Tabel 19. Data Transmisi Replikasi III 250 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ <i>Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	1,679	0,1855	%Te = 1,49
297.5	0.672	1,486	0,9986	
302.5	1	1,474	1,474	
307.5	0.2008	1,472	0,2956	
312.5	0.1364	1,471	0,2006	
317.5	0.1125	1,53	0,1721	
Jumlah	2.2332		3,3265	
322.5	0.1079	1,591	0,1717	%Tp = 7,74
327.5	0.102	1,709	0,1743	
332.5	0.0936	1,984	0,1857	
337.5	0.0798	2,664	0,2126	
342.5	0.0669	3,738	0,2501	
347.5	0.057	5,673	0,3234	
352.5	0.0488	9,879	0,4821	
357.5	0.0456	16,461	0,7506	
362.5	0.0356	23,981	0,8537	
367.5	0.031	31,509	0,9768	
372.5	0.026	38,08	0,9901	
Jumlah	0.6942		5,371	

5. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentasi konsentrasi 300 ppm

a. Data transmisi replikasi 1

Tabel 20. Data Transmisi Replikasi I 300 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ <i>Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0,301	0,0333	%Te = 0,19
297.5	0.672	0,232	0,1559	
302.5	1	0,179	0,179	

307.5	0.2008	0,156	0,0313	
312.5	0.1364	0,134	0,0183	
317.5	0.1125	0,131	0,0147	
Jumlah	2.2332		0,4325	
322.5	0.1079	0,176	0,019	%Tp = 5,08
327.5	0.102	0,23	0,0235	
332.5	0.0936	0,357	0,0334	
337.5	0.0798	0,757	0,0604	
342.5	0.0669	1,378	0,0922	
347.5	0.057	2,71	0,1545	
352.5	0.0488	6,013	0,2934	
357.5	0.0456	11,738	0,5353	
362.5	0.0356	18,71	0,6661	
367.5	0.031	25,91	0,8032	
372.5	0.026	32,625	0,8483	
Jumlah	0.6942		3,5292	

b. Data transmisi replikasi 2

Tabel 21. Data Transmisi Replikasi II 300 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythematous Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0,298	0,0329	%Te = 0,19
297.5	0.672	0,23	0,1546	
302.5	1	0,177	0,177	
307.5	0.2008	0,142	0,0285	
312.5	0.1364	0,136	0,0186	
317.5	0.1125	0,139	0,0156	
Jumlah	2.2332		0,4272	
322.5	0.1079	0,163	0,0176	%Tp = 5,09
327.5	0.102	0,215	0,0219	
332.5	0.0936	0,375	0,0351	
337.5	0.0798	0,728	0,0581	
342.5	0.0669	1,392	0,0931	
347.5	0.057	2,715	0,1548	
352.5	0.0488	6,017	0,2936	
357.5	0.0456	11,76	0,5363	
362.5	0.0356	18,734	0,6669	
367.5	0.031	25,969	0,805	
372.5	0.026	32,657	0,8491	
Jumlah	0.6942		3,5315	

c. Data transmisi replikasi 3

Tabel 22. Data Transmisi Replikasi III 300 ppm

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythematous Flux/Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0,297	0,0328	%Te = 0,19
297.5	0.672	0,229	0,1539	
302.5	1	0,178	0,178	
307.5	0.2008	0,152	0,0305	
312.5	0.1364	0,139	0,019	
317.5	0.1125	0,138	0,0155	
Jumlah	2.2332		0,4297	
322.5	0.1079	0,164	0,0177	%Tp = 5,08
327.5	0.102	0,232	0,0237	
332.5	0.0936	0,362	0,0339	
337.5	0.0798	0,742	0,0592	
342.5	0.0669	1,381	0,0924	
347.5	0.057	2,74	0,1562	
352.5	0.0488	6,009	0,2932	
357.5	0.0456	11,745	0,5356	
362.5	0.0356	18,675	0,6648	
367.5	0.031	25,858	0,8016	
372.5	0.026	32,597	0,8475	
Jumlah	0.6942		3,5258	

B. PERHITUNGAN

1. Contoh perhitungan nilai transmisi (replikasi 1)

$$\text{Persen eritema (\%Te)} = \frac{\sum(TxFe)}{\sum Fe}$$

$$\text{Persen pigmentasi (\%Tp)} = \frac{\sum(TxFe)}{\sum Fp}$$

Ket. T x Fe : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu

panjang gelombang 292,5 - 317,5 nm

Fe : Fluks eritema

T x Fp : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu panjang gelombang 322,5 - 372,5 nm

Fp : Fluks pigmentasi

$$\begin{aligned} \text{Persen eritema (\% Te)} &= \frac{\Sigma(TxFe)}{\Sigma Fe} \\ &= \frac{18,706}{2,2332} \\ &= 8,376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persen eritema (\% Tp)} &= \frac{\Sigma(TxFe)}{\Sigma Fp} \\ &= \frac{15,004}{0,6942} \\ &= 21,61 \end{aligned}$$

2. Rata - rata konsentrasi Persen Transmisi Pigmentasi dan Eritema

a. 100 ppm

$$\begin{aligned} \text{Eritema} &= \frac{8,376 \% + 8,383 \% + 8,360 \%}{3} \\ &= 8,37 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pigmentasi} &= \frac{21,62 \% + 21,63 \% + 21,62 \%}{3} \\ &= 21,62 \% \end{aligned}$$

b. 150 ppm

$$\begin{aligned} \text{Eritema} &= \frac{2,291 \% + 2,287 \% + 2,279 \%}{3} \\ &= 2,29 \% \end{aligned}$$

$$\text{Pigmentasi} = \frac{12,71 \% + 12,65 \% + 12,68 \%}{3}$$

$$= 12,68 \%$$

c. 200 ppm

$$\text{Eritema} = \frac{1,712 \% + 1,707 \% + 1,703 \%}{3}$$

$$= 1,71 \%$$

$$\text{Pigmentasi} = \frac{11,17 \% + 11,16 \% + 11,16 \%}{3}$$

$$= 11,16 \%$$

d. 250 ppm

$$\text{Eritema} = \frac{1,50 \% + 1,50 \% + 1,49 \%}{3}$$

$$= 1,50 \%$$

$$\text{Pigmentasi} = \frac{7,76 \% + 7,74 \% + 7,74 \%}{3}$$


$$= 7,75 \%$$

e. 300 ppm

$$\text{Eritema} = \frac{0,19 \% + 0,19 \% + 0,19 \%}{3}$$

$$= 0,19 \%$$

$$\text{Pigmentasi} = \frac{5,08 \% + 5,09 \% + 5,08 \%}{3}$$



$$= 5,08 \%$$

3. Contoh perhitungan nilai SPF (konsentrasi 100 ppm replikasi 1)

$$(AUC) = (Aa+Ab)/2 \times Dp_{b-a}$$

$$AUC = L_1+L_2+L_3+\dots+L_n$$

$$\text{Log SPF} = AUC/(\lambda_n - \lambda_1)$$

Ket. Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPb-a = Selisih panjang gelombang a dan b

λ_n = Panjang gelombang terbesar (dengan $A > 0,05$ untuk ekstrak, dengan $A > 0,01$ untuk sediaan)

λ_1 = Panjang gelombang terkecil (290 nm).

$$L1 = \frac{0,995+1,022}{2} \times (295 - 290) = 5,0425$$

$$L2 = \frac{1,022+1,062}{2} \times (300 - 295) = 5,21$$

$$L3 = \frac{1,062+1,104}{2} \times (305 - 300) = 5,415$$

$$L4 = \frac{1,104+1,14}{2} \times (310 - 305) = 5,61$$

$$L5 = \frac{1,14+1,155}{2} \times (315 - 310) = 5,7375$$

$$L6 = \frac{1,155+1,135}{2} \times (320 - 315) = 5,725$$

$$L7 = \frac{1,135+1,087}{2} \times (325 - 320) = 5,555$$

$$L8 = \frac{1,087+1,011}{2} \times (330 - 325) = 5,245$$

$$L9 = \frac{1,011+0,902}{2} \times (335 - 330) = 4,7825$$

$$L10 = \frac{0,902+0,787}{2} \times (340 - 335) = 4,2225$$

$$L11 = \frac{0,787+0,672}{2} \times (345 - 340) = 3,6475$$

$$L12 = \frac{0,672+0,551}{2} \times (350 - 345) = 3,0575$$

$$L13 = \frac{0,551+0,431}{2} \times (355 - 350) = 2,455$$

$$L14 = \frac{0,431+0,343}{2} \times (360 - 355) = 1,935$$

$$L15 = \frac{0,343+0,283}{2} \times (365 - 360) = 1,565$$

$$L16 = \frac{0,283+0,239}{2} \times (370 - 365) = 1,305$$

$$L17 = \frac{0,239+0,204}{2} \times (375 - 370) = 1,1075$$

$$L18 = \frac{0,204+0,176}{2} \times (380 - 375) = 0,95$$

$$L19 = \frac{0,176+0,152}{2} \times (385 - 380) = 0,82$$

$$L20 = \frac{0,152+0,132}{2} \times (390 - 385) = 0,71$$

$$L21 = \frac{0,132+0,116}{2} \times (395 - 390) = 0,62$$

$$L22 = \frac{0,116+0,103}{2} \times (400 - 395) = 0,5475$$

$$\text{Log SPF} = \frac{71,265}{400-290}$$

$$= \frac{71,265}{110}$$

$$= 0,648$$

$$\text{SPF} = 4,44$$



4. Rata - rata nilai SPF

$$\text{a. 100 ppm} = \frac{4,45 + 4,44 + 4,44}{3}$$

$$= 4,44$$

$$\text{b. 150 ppm} = \frac{9,25 + 9,26 + 9,25}{3}$$

$$= 9,25$$

$$\text{c. 200 ppm} = \frac{11,07 + 11,09 + 11,09}{3}$$


$$= 11,08$$

$$\text{d. 250 ppm} = \frac{13,75 + 13,79 + 13,84}{3}$$

$$= 13,79$$

$$\text{e. 300 ppm} = \frac{40,096 + 40,161 + 40,207}{3}$$

$$= 40,156$$



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rif'atul Adilah Yasin lahir di Bau-Bau provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 11 Desember 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Ayahanda Muh. Yasin, S.H dan Ibunda Nurjannah. Memulai karir dipendidikan SD Pada tahun 2001 di SDN 2 Nganganaumala Bau-Bau dan tamat pada tahun 2007 di SDN 3 Baruga.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Raha pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010 di SMPN 2 Kolaka, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kolaka pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013 di SMAN 1 Sinjai. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang diberi nama angkatan "FAR13ION".



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R