

**PENGARUH LATIHAN BULUTANGKIS TERHADAP PERUBAHAN  
TINGKAT KEBUGARAN FISIK (VO2 MAX, TEKANAN DARAH, DAN  
KADAR HEMOGLOBIN) MAHASISWA UKM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2015**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Oleh  
**SYAMSIR ABDUL FATTAH**  
**NIM. 70300111082**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsir Abdul Fattah  
NIM : 70300111082  
Tempat/Tgl. Lahir : Selayar, 15 januari 1993  
Jurusan : Ilmu Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Griya JannahKec. Pallangga  
Judul : Pengaruh Latihan Bulutangkis terhadap Perubahan Tingkat Kebugaran Fisik (Vo2 Max, Tekanan Darah, dan Kadar Hemoglobin) pada Mahasiswa UKM bulutangkis UIN Alauddin Makassar Tahun 2015


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2015

Penyusun,

**Syamsir Abd Fattah**  
NIM:70300111082

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung. Dzat yang telah menganugerahkan secura rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Latihan Bulutangkis terhadap Perubahan Tingkat Kebugaran Fisik (Vo2 Max, Tekanan Darah, dan Kadar Hemoglobin) pada Mahasiswa UKM bulutangkis UIN Alauddin Makassar Tahun 2015”. skripsi ini selain membahas secara konsep juga membahas terhadap pandangan islam. Sehingga, tentunya dengan sistem ini dapat membantu para pembaca yang budiman agar dapat mengintegrasikan disiplin ilmu kesehatan dengan Islam. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan sejak awal sampai terselesainya penelitian ini, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Ag. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin

- Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin. M,Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan.
  3. Wakil Dekan I bidang akademik, Wakil Dekan II bidang administrasi umum, dan Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  4. DR. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas kepada kami selaku anak didiknya dan bimbingan yang tiada henti bagi peneliti dari Ibu selaku pembimbing akademik.
  5. Muh. Anwar Hafid.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini agar cepat selesai.
  6. dr. Najamuddin, S.Ked., M.Kes selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
  7. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes dan Drs.H. Syamsul Bahri, M.Si selaku penguji I dan penguji II atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penelitian serta telah banyak memberikan masukan baik,

kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan daripada skripsi ini. Ucapan terima kasih sekali lagi penulis haturkan.

8. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang membantu dan mengajar serta mendidik penulis hingga penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda **Syamsuddin** dan Ibundaku **Rosmayani** sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini.
10. Pihak UKM Bulutangkis yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti selama dalam melakukan penelitian.
11. Terima kasih kepada kawan-kawanku Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kawan-kawan seperjuangan Jurusan Keperawatan OKSIGENASI khususnya keperawatan A, beserta kawan-kawan jejaring sosial (Facebook dan BBM), yang selalu memberikan *support* kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.



Makassar, Juli 2015  
Penulis

**Syamsir Abd Fattah**  
NIM:70300111082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1- 10</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11-36</b>
A. Tinjauan umum tentang Kebugaran Jasmani .....	11
1. Definisi Kebugaran Jasmani.....	11
2. Manfaat Latihan Kebugaran Jasmani.....	12
3. Komponen Kebugaran Jasmani.....	13
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebugaran Jasmani .....	18
B. Tinjauan umum tentang Bulutangkis .....	38-47
1. Definisi.....	38

2. Perlengkapan Bulu Tangkis .....	38
3. Ukuran Lapangan Bulutangkis.....	39
4. Teknik dasar permainan bulutangkis.....	39
5. Variasi teknik pukulan .....	43
6. Jenis Permainan .....	44
C. Hubungan Aktivitas latihan fisik terhadap tingkat kebugaran .....	44
D. Kerangka Pikir.....	48
E. Kerangka Kerja .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>50-54</b>
A. Desain penelitian.....	50
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	50
C. Populasi dan sampel.....	50
D. Teknik Sampel .....	50
E. Sumber dan metode pengumpulan data .....	51
F. Instrumen penelitian.....	52
G. Etika penelitian.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55-79</b>
A. Deskriptif hasil penelitian .....	55
B. Pembahasan.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80-82</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan darah .....	27
Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan tingkat VO2 max .....	56
Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Tekanan darah .....	57
Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan kadar Hemoglobin .....	58
Tabel 4.4 Standar Deviasi dan Nilai Rata-rata variabel <i>pre test</i> dan <i>post test</i> .....	63
Tabel 4.5 Uji normalitas .....	63
Tabel 4.6 perubahan terhadap tingkat VO2 max .....	64
Tabel 4.7 perubahan terhadap tekanan darah sistol .....	65
Tabel 4.8 perubahan terhadap tekanan darah diastol .....	66
Tabel 4.9 perubahan terhadap kadar hemoglobin .....	67
Tabel 4.10 pengaruh latihan bulutangkis terhadap tingkat kebugaran .....	68


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lapangan Bulutangkis .....	39
Gambar 3.1 Kerangka Pikir .....	48



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik perubahan tingkat VO <sub>2</sub> max .....	59
Grafik 4.2 Grafik perubahan sistol .....	60
Grafik 4.3 Grafik perubahan diastol .....	61
Grafik 4.7 Grafik perubahan kadar Hb .....	62



## ABSTRAK

Nama : Syamsir Abdul Fattah  
NIM : 70300111082  
Judul) : Pengaruh latihan bulutangkis terhadap tingkat kebugaran (vo2 max, tekanan darah dan kadar hemoglobin) pada mahasiswa ukm bulutangkis uin alauddin makassar tahun 2015

---

---

Latihan olahraga seperti halnya latihan bulutangkis merupakan suatu aktivitas aerobik, yang bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya tahan jantung, paru, peredaran darah, otot-otot, dan sendi-sendi serta melibatkan kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan daya tahan kardiorespirasi sehingga dapat mempengaruhi aktivitas fisiologis seperti VO<sub>2</sub> max, tekanan darah dan Kadar Hb.

Desain penelitian menggunakan jenis penelitian *Pra Eksperiment* dengan rancangan *One- Group pre-post test*. Populasi diambil dari semua anggota UKM Olahraga UIN Alauddin, sedangkan sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel adalah 15.

Data hasil penelitian diuji normalitas digunakan uji normalitas *Shapiro-Wilk* dengan  $p$  value  $>0,05$  untuk semua variabel, kemudian dilakukan uji kebermaknaan dengan menggunakan *paired t test* nilai  $p$  value VO<sub>2</sub> max sebesar  $0,002 < 0,05$  penilaian kadar VO<sub>2</sub> max menggunakan *YMCA step test.*, nilai  $p$  value tekanan darah sistol  $0,004 < 0,05$ , sedangkan nilai  $p$  value tekanan darah diastolik  $0,002 < 0,05$  adapun nilai  $p$  value kadar Hemoglobin  $0,000 < 0,05$  maka disimpulkan bahwa latihan bulutangkis selama 3 minggu dengan jumlah latihan 12 kali berpengaruh pada tingkat kebugaran tubuh yaitu VO<sub>2</sub> max, tekanan darah serta kadar Hemoglobin pada anggota UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis menyarankan kepada mahasiswa agar ditengah padatnya aktivitas kuliah untuk selalu menjaga kebugaran tubuh salah satunya dengan latihan bulutangkis secara teratur.

**Kata kunci:** Latihan Bulutangkis, VO<sub>2</sub> max, tekanan darah, kadar Hemoglobin

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Menurut Virra (2013), menyatakan bahwa ketahanan kardiorespirasi adalah salah satu unsur kesegaran jasmani yang menggambarkan kemampuan sistem respirasi dan sirkulasi dalam menyediakan oksigen untuk kerja otot selama melakukan aktivitas fisik. Ketahanan kardiorespirasi pada laki-laki mencapai puncaknya pada umur 18-25 tahun bersamaan dengan puncak massa otot. Latihan olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur dengan intensitas latihan ringan sampai sedang dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran tubuh dan kekebalan tubuh (Siti, 2013).

Nilai daya tahan kardiorespirasi yang dicerminkan oleh nilai prediksi kapasitas  $VO_2max$  yang merupakan indikator tingkat kebugaran jasmani. Banyak organisasi resmi menggunakan volume pemakaian oksigen sebagai tolak ukur kebugaran. Ukuran kemampuan kerja *cardio-respiratory vascular* sering disebut juga volume oksigen maksimum atau disingkat  $VO_2max$  (Yohandika, 2013).

Kebugaran secara total mencakup empat aspek, yaitu kebugaran fisik, emosional, sosial dan intelektual (Howell & Howell, 1991 dalam Sarwono, 2008). Bagian penting dari kualitas hidup sehat paripurna adalah kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani, dua istilah yang dipakai silih berganti yang merupakan kata lain dari *physical fitness*. Jasmani dikatakan sehat dinamis bila seluruh organ tubuh mampu menjalankan fungsinya secara normal dalam keadaan seseorang aktif bergerak dan tidak memiliki kelainan.

Menurut McGowan, 2001 dalam Enggel 2013 bahwa latihan itu sama baiknya dengan obat-obatan tekanan darah dan tidak memiliki efek samping yang merugikan. Dengan kita berolahraga maka jantung dan tekanan darah dapat bekerja dengan baik karena

jantung merupakan organ vital yang memasok kebutuhan darah di seluruh tubuh. Dengan meningkatnya aktivitas fisik seseorang maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan semakin besar. Kebutuhan ini akan dipenuhi oleh jantung dengan meningkatkan aliran darahnya. Hal ini juga direspon pembuluh darah dengan melebarkan diameter pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga akan berdampak pada tekanan darah individu tersebut (Rai, 2012 dalam Enggel 2013).

Dalam melakukan aktivitas dapat dipastikan gerakan nafas menjadi dalam dengan kata lain ventilasinya besar. Pada setiap orang yang melakukan latihan cukup lama, kebutuhan akan oksigen untuk mempertahankan metabolisme akan meningkat, demikian pula kebutuhan terhadap udara. Peningkatan ventilasi saat berlatih ini sangat nyata, misal pada saat istirahat hanya menghirup udara 5 sampai 10 liter udara setiap menitnya, tetapi saat berlatih menghirup 150 liter udara bahkan sampai 200 liter udara setiap menitnya (Sudarno, 1992 dalam saiful 2013).

Saat beraktifitas organ penting pernafasan yaitu paru perlu mendapatkan oksigen yang segar untuk memenuhi metabolisme dalam tubuh. Melalui fungsi ini maka oksigen maka di bawa dari paru-paru ke seluruh jaringan sel darah dalam tubuh dan membawa kembali karbondioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk di keluarkan dari tubuh, dan yang tidak kalah penting proses ini adalah senyawa yang membawa oksigen yaitu Hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah, sehingga bila kadar Hemoglobin rendah, oksigen yang di bawa sel darah merah juga sedikit (saiful,2013).

Menurut Bart Crum, 1994, Rusli lutan, 2003 dalam Ma'ruful kahri, 2012 menyatakan bahwa Permasalahan utama yang dihadapi pendidikan jasmani saat ini, adalah terjadinya perubahan nilai-nilai budaya, *a change in movement culture*. Artinya terjadi perubahan (pergeseran) budaya, dari budaya gerak menjadi budaya diam. Pergeseran

budaya tersebut dipicu oleh dampak globalisasi ekonomi, teknologi komunikasi dan transportasi serba otomatis sehingga anak-anak cenderung menghilangkan aktivitas fisik dalam berbagai kegiatannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak waktu dihabiskan duduk di depan televisi, video, *play-station*, internet, facebook dan lain sebagainya. Pergi kesekolah/kampus menggunakan kendaraan sebagai transportasi, pergi ke mall menggunakan lift dan eskalator ketimbang naik anak tangga.

Menurut G. Petersen, 2004 dalam ma'ruful kahri, 2012 selaku perwakilan WHO Indonesia menyatakan "Sekarang ini masyarakat dunia banyak yang tidak aktif bergerak, sehingga kebugaran jasmani sangat rendah". Dampak dari rendahnya kebugaran jasmani menimbulkan penyakit hipokinetik seperti cardiovascular, kencing manis, obesitas dan jantung. Sekarang ini penyakit jantung tidak lagi menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Apabila hal ini dapat dicegah lebih awal, maka akan mengurangi angka kematian sebesar 2 juta orang atau 5479 orang meninggal dunia akibat penyakit hipokinetik setiap tahunnya. Kasus ini merupakan satu dari sepuluh penyebab kematian di dunia.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Fu dan Fung (2004); Chin Ming-kai (2008) dalam ma'ruful kahri, 2012 menyatakan "*A study conducted reported that 80 % of Chinese living in Beijing, Shanghai, and Hong Kong were sedentary*". Fu dan Fung menyatakan bahwa 80 % orang Cina yang tinggal di Beijing, Shanghai, dan Hongkong berperilaku duduk terus menerus". Perilaku semacam ini tidak saja terjadi di Cina dan Hongkong, tetapi juga di Eropa. Perihal ini Janz et al., (2001), Tybor, (2005); Janssen et al (2005); Chin Ming-kai (2008:9) dalam ma'ruful kahri, 2012 menyatakan sebanyak 130,000 orang anak pelajar dari 34 negara Eropa aktivitas fisik menurun karena waktu yang digunakan lebih banyak menonton televisi.

Pada masa sekarang untuk pertandingan bulutangkis diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Seorang pemain harus matang dalam pukulan-pukulannya, harus mengerti taktik dan strategi, dapat membaca kekuatan lawan, tidak hanya kematangan dalam pukulannya, dan dimana letak kelemahannya, tetapi harus pula tahu kondisi fisik lawannya. Permainan bulutangkis apabila kedua pemain hampir sama, maka kalah atau menang ditentukan oleh kondisi mental dan fisiknya.

Seorang atlet bulutangkis sangat penting memiliki derajat kondisi fisik prima, sebab peningkatan kondisi fisik bertujuan menunjang aktivitas olahraga dalam rangka mencapai prestasi prima (suharno, 1993:38 dalam sigit, 2007). Permainan bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang populer dan banyak digemari masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Permainan bersifat individual, dapat dimainkan satu orang lawan satu orang atau dua orang lawan dua orang. Dapat dimainkan oleh putera, puteri, dapat pula dimainkan pasangan campuran putera puteri. Bulutangkis merupakan permainan yang banyak menggunakan kemampuan fisik dengan gerakan yang cepat dan pukulan keras yang dilakukan dalam waktu beberapa detik diantara reli-reli panjang (Boby, 2013).

Kemampuan fisik salah satu komponen yang paling dominan dalam pencapaian prestasi olahraga bulutangkis. Prestasi bulutangkis tidak akan terlepas dari unsur-unsur taktik, tehnik dan kualitas kondisi fisik. Pebulutangkis sangat membutuhkan kualitas kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kecepatan, agilitas, dan kordinasi gerak yang baik (sigit, 2007).

Dengan semakin banyaknya jenis olahraga yang ditawarkan, maka semakin mudah pula bagi masyarakat untuk memilih dan melakukan olahraga yang disenangi. Namun, amat disayangkan karena hanya 26,2% dari masyarakat Indonesia yang berusia 10-30 tahun yang melakukan olahraga (Alim Abdul & Cerika Rismayanthi, 2011). Bulutangkis sendiri

berdasarkan pengamatan peneliti selama ini merupakan jenis olahraga yang banyak digemari oleh mahasiswa karena jenis olahraga ini permainannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan jenis olahraga lainnya, sehingga penulis merasakan perlunya melakukan pendekatan secara ilmiah untuk membuktikan pengaruh bulutangkis terhadap kesehatan, terutama tingkat kebugaran tubuh dengan melakukan penelitian terhadap mahasiswa, mengingat mahasiswa dituntut untuk selalu giat dengan aktivitas tinggi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut mahasiswa untuk selalu bugar, tak terlepas dari hal tersebut peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh profesi perawat yang memerlukan kebugaran dalam menjalankan profesinya karena profesi perawat mendampingi pasien selama 24 jam yang menuntut perawat tersebut dalam kondisi sehat, sehingga dengan berolahraga dapat meningkatkan kebugarannya salah satunya melalui olahraga bulutangkis.

Penelitian Syaifuddin (2013) yang dilakukan di yayasan LKK Ngesti Rahayu Sidoarjo mengemukakan bahwa olahraga bulutangkis sebagai solusi mengurangi frustrasi kerja bagi pekerja. Berdasarkan penelitian ini menyebutkan bahwa olahraga merupakan kegiatan untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, Rohani dan sosial. Sedangkan menurut Widodo (2014) bahwa selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga bulutangkis dapat pula dijadikan sebagai pengisi waktu luang disela rutinitas pekerjaannya yang padat bagi para pekerja. Kebugaran fisik sangat penting bagi perawat untuk melakukan pekerjaannya. Saat beban kerja meningkat diperlukan kebugaran yang baik pula. Hal tersebut didukung oleh Kurniawati (2012) menyatakan bahwa perawat di bangsal rawat inap RS Islam Fatimah Cilacap tergolong dalam tingkat kelelahan yang tinggi dengan persentase tingkat kelelahan 63,8%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab munculnya kelelahan kerja dan kurangnya cara mengatasinya. Dalam

penelitian tersebut kelelahan kerja timbul karena belum mengetahui cara agar tidak terjadi kelelahan. Salah satu cara mencegah kelelahan agar produktivitas meningkat yaitu dengan memperbaiki kebugaran fisik. Salah satu cara meningkatkan kebugaran yaitu dengan berolahraga.

Dari uraian latar belakang diatas, Maka dari itu kami ingin melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran fisik (VO2 max), tekanan darah, dan kadar hemoglobin).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian :“Bagaimana Pengaruh Latihan Bulutangkis Terhadap Perubahan Tingkat Kebugaran Fisik (Vo2 Max, Tekanan Darah, Dan Kadar Hemoglobin ?”

### **C. Hipotesis**

Menurut Tiro (2011), hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji. Berdasarkan defenisi tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Alternatif (Ha): Ada pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin).
2. Hipotesis Nol (Ho): Tidak ada pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin).

### **D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Defenisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Defenisi operasional memerikan batasan atau arti suatu variabel dengan merici hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Sarwono, 2006).

1. Perubahan : Dimana suatu keadaan yang mencerminkan proses dari sebelum melakukan latihan bulutangkis sampai pada saat setelah melakukan latihan bulutangkis. Perubahan yang ditinjau adalah tingkat kebugaran fisik (VO2 max), tekanan darah, dan kadar hemoglobin).
2. VO2 Max: Tingkat kebugaran VO2 max diukur dengan *YMCA step test* dengan kriteria nilai khusus untuk laki-laki dengan rentang umur 18-25 tahun dalam pengujian ini mengukur tingkat daya jantung mengembalikannya dalam keadaan normal setelah pemberian beban dimana pengujian ini dilakukan dengan cara naik turun bangku setinggi 30.5 cm dan menggunakan metronome 96 beats dan menggunakan *stopwatch* yang dilakukan selama 3 menit, sehingga mendapatkan nilai denyut nadi 1 menit *recovery* pada saat setelah naik turun tangga *YMCA step test* dan nilai tersebut dikonversikan kedalam tabel *YMCA step test*.

**Kriteria objektif:**

Sangat baik	:	50 – 76
Baik	:	79 – 84
Diatas rata – rata	:	88 – 93
Rata – Rata	:	95 – 100
Dibawah Rata – Rata	:	102 – 107
Kurang	:	111 – 119
Sangat Kurang	:	124 – 157

3. Tekanan Darah: Hasil pengukuran sistolik dan diastolik pada saat sebelum melakukan latihan bulutangkis dan pada saat setelah melakukan latihan bulutangkis selama 3 minggu diukur dengan alat tensimeter digital dengan merk yaitu *Omron*.

**Kriteria Objektif :**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Sistolik (mmHg)</b>	<b>Diastolik (mmHg)</b>
Normal	<120	<80
Pre Hipertensi	120 – 139	80 – 89
Stadium I	140 – 159	90 – 99
Stadium II	≥160	≥100

Sumber (Joint Nasional Committee VII, 2015)

4. Kadar Hemoglobin: Hasil pengukuran kadar hemoglobin sebelum melakukan latihan bulutangkis dan pada saat setelah melakukan latihan bulutangkis diukur dengan alat ukur Hb digital dengan merk alat yaitu *Easy Touch*. Nilai HB didapatkan 1 menit *recovery* pada saat setelah naik turun tangga YMCA *step test* dan nilai tersebut dilihat pada monitor alat ukur HB digital.

**Kriteria objektif:**

Dewasa laki-laki : 14-18 mg/dl

Dewasa wanita : 12-16 mg/dl

**E. Kajian Pustaka**

Sigit (2008) "the influence of circuit training on vo2 max and badminton Skill of sport trainer education students of sport science Faculty of yogyakarta state university", berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dengan frekuensi latihan 3 kali/minggu sebanyak 12 kali latihan di dapatkan hasil latihan sirkuit dengan beban 75%-80% berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan aerobik (VO2 Max) sebesar 18,99 %. Teridentifikasi dari 12 sampel Mahasiswa PKO FIK UNY untuk usia 20 s/d 22 tahun secara keseluruhan setelah melakukan latihan sirkuit (*circuit training*) daya tahan aerobik (VO2 Max) sebanyak 6 mahasiswa

dalam klasifikasi Bagus (43 s/d 52) dan sebanyak 6 mahasiswa dalam klasifikasi Tinggi (> 53).

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin) dalam waktu 3 minggu.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin) sebelum dilakukannya latihan bulutangkis.
- b. Mengetahui tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin) sesudah dilakukannya latihan bulutangkis.
- c. Mengetahui pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin).

#### **G. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia kesehatan dengan adanya data-data yang menunjukkan pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin).

##### 2. Bagi Institusi Pendidikan


Memberikan informasi atau kontribusi pada mahasiswa jurusan keperawatan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan hemoglobin).

3. Bagi Profesi Keperawatan

untuk memberi informasi yang berkaitan dengan perubahan tingkat kebugaran (VO2 max, tekanan darah, dan kadar hemoglobin) sesuai tinjauan aspek keperawatan itu sendiri

4. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberi informasi bagi masyarakat bahwa fitnes itu dapat memberi pengaruh yang sangat positif terhadap perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Kebugaran Jasmani*

##### 1. Defenisi Kebugaran Jasmani

Istilah kebugaran jasmani merupakan terjemahan dari istilah *phisycal fitnes*. Dalam bahasa Indonesia istilah tersebut adalah kebugaran jasmani, kesegaran jasmani, dan kemampuan jasmani. (Nurhasan, 2005).

Menurut Nurhasan, (2005) kebugaran jasmani merupakan kondisi tubuh seseorang yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Kesegaran jasmani juga diartikan bahwa kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas dan kesiagaan tanpa mengalami kelelahan yang begitu berarti dan masih cukup energi untuk beraktivitas pada waktu senggang dan menghadapi hal-hal yang bersifat darurat.

Menurut Fox, 1981 dalam Heri, (2006) Ketahanan kardiorespirasi adalah kemampuan jantung, paru, dan sistem sirkulasi untuk menyediakan oksigen dan bahan makanan ke otot selama kerja otot berlangsung.

Sedangkan menurut Yohandika, 2013 bahwa seseorang dinyatakan fit untuk suatu tugas atau aktivitas bila ia mampu mengatasi tugas tersebut cukup efisien dan tanpa kelelahan yang berlebihan, dan dapat pulih dengan segera.

Istilah kebugaran jasmani berasal dari kata dalam bahasa Inggris *physical fitness*. Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek fisik dari kebugaran secara menyeluruh (*total fitness*). Pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang menjalankan hidup secara produktif dan dapat menyesuaikan diri pada setiap pembebanan fisik yang layak (Sutarman, 1975 dalam Heri, 2006). Ahli-ahli

pendidikan jasmani dalam Satropanoelar, 1992 dalam Yohandika 2013 menyatakan bahwa, kebugaran jasmani adalah kapasitas fungsional total seseorang untuk melakukan suatu kerja tertentu dengan hasil baik atau memuaskan dan tanpa kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani bercirikan semua bagian tubuh dapat berfungsi secara efisien saat tubuh menyesuaikan diri dengan tuntutan sekitar.

## 2. Manfaat Latihan Kebugaran Jasmani

Mendapatkan kebugaran jasmani sangat bermanfaat untuk setiap orang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, namun untuk mendapatkannya harus melalui aktivitas atau latihan yang menunjang terhadap peningkatan kondisi fisiknya. Dengan demikian setiap orang di dorong untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya melalui latihan kebugaran jasmani.

Beberapa manfaat latihan kebugaran jasmani adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan tubuh
- b. Meningkatkan semangat dalam melakukan aktivitas
- c. Mencegah cedera lebih parah saat melakukan aktivitas fisik
- d. Meningkatkan keterampilan gerak
- e. Meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi kerja jantung ke paru-paru
- f. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik diri

Tingkat kebugaran jasmani seseorang terkait erat dengan tingkat kesehatan jasmani yang disandangnya. Artinya, seseorang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani baik tentunya juga memiliki tingkat kesehatan jasmani yang baik pula. Adapun batasan sehat meliputi kesehatan badan, rohani dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan. Oleh karena itu, pengertian sehat bersifat menyeluruh yang menyangkut segala aspek manusia sebagai makhluk

totalitas sistem psiko-fisik-sosio yang kompleks. Artinya, manusia merupakan suatu kebulatan antara jiwa, raga, dan lingkungan. Untuk itu, pengertian sehat pada seseorang adalah kesehatan yang sempurna yang mencakup sehat jasmani, rohani, dan sosialnya (Heri, 2006).

Menurut Heri, 2006 menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam menentukan derajat kesehatan seseorang, karena manusia sebagai satu totalitas sistem psiko-fisiksosio yang kompleks. Sebab derajat sehat akan menentukan tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja. Sebagai contoh, seseorang yang sedang sakit jantung akan memiliki produktivitas kerja atau prestasi kerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisinya sebelum sakit jantung. Namun, seseorang yang sakit panu umumnya prestasi kerjanya tidak akan terpengaruh oleh penyakit panunya. Padahal seseorang yang sakit panu juga termasuk tidak sehat.

Oleh karena itu, para ahli fisiologi memandang kesehatan seseorang adalah dari kondisi normalnya proses fisiologi dalam tubuh seseorang. Artinya, bahwa pengertian sehat adalah suatu keadaan normalnya fungsi peralatan tubuh (Sutarman, 1976 dalam Heri, 2006)

### 3. Komponen kebugaran jasmani

Heri, (2006) mengelompokkan kebugaran jasmani menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan (1) kesehatan (*health-related physical fitness*), dan (2) yang berhubungan dengan keterampilan (*skill-related physical fitness*), Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan terdiri atas ketahanan kardiorespirasi, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas. Untuk komposisi tubuh menunjukkan tingkat kepadatan tubuh yang meliputi unsur-unsur berat badan, tinggi badan, dan lemak tubuh. Pada kekuatan

otot menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Jenis kontraksi otot dapat bersifat statis maupun dinamis, di mana kontraksi statis (isometrik) resistensinya tidak bergerak, sedangkan yang resistensinya bergerak atau berpindah posisi disebut kontraksi dinamis (isotonis) (Travers, 1974 dalam Heri, 2006). Daya tahan otot adalah kesanggupan dan kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mempertahankan kerjanya dalam waktu lama. Daya tahan otot dikelompokkan menjadi daya tahan statis dan dinamis (Sutarman, 1975 dalam heri, 2006). Selanjutnya fleksibilitas adalah kualitas yang memungkinkan luas amplitude persendian bergerak secara maksimal sesuai dengan luas rentang gerak *{range of movement}*. Adapun faktor-faktor yang ikut menentukan tingkat fleksibilitas seseorang antara lain adalah sistem tulang-persendian, otot, ligamenta, tendon, jaringan ikat dan kulit (Fox, 1987 dalam Heri, 2006)

Menurut Yohandika (2013) bahwa kesegaran jasmani meliputi beberapa komponen, komponen-komponen tersebut dapat digolongkan dalam dua aspek yaitu kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan.

Menurut Nurhasan, (2005), adalah sebagai berikut:

1. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan

- a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Artinya bahwa otot digerakkan untuk mendorong, mengangkat, dan menarik tahanan dari beban. Besarnya tenaga yang digunakan oleh otot atau sekelompok otot tenaga satu komponen kesegaran jasmani yang perlu bagi setiap orang dari segala usia, agar mampu memenuhi tuntutan aktivitas geraknya, atau bisa disebut kekuatan otot.

b. Kelentukan (*flexibility*)

Kelentukan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakanya (*range of movement*). Tanpa ruang gerak sendi yang luas, seseorang tidak dapat melakukan gerakan dengan efektif dan efisien. Dengan kelentukan yang baik akan mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan pada saat melakukan suatu gerakan.

c. Komposisi tubuh

Komposisi tubuh dapat didefinisikan sebagai prosentase relatif dari lemak tubuh dan masa tubuh. Komposisi tubuh dinyatakan dengan:

1. Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter.
2. Persentase lemak tubuh adalah perbandingan antara berat lemak tubuh dan berat badan yang diperoleh melalui rumus tertentu berdasarkan pengukuran ketebalan lemak dengan menggunakan alat *skinfold caliper*

d. Daya tahan (*endurance*)

Daya tahan otot disebut dengan *strength endurance* adalah kemampuan otot dalam melakukan kontraksi yang berturut-turut dalam waktu yang lama.. Daya tahan dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu:

- 1) Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung dan paru-paru adalah kesanggupan jantung (sistem peredaran darah) dan paru-paru (sistem pernapasan) untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktifitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan.
- 2) Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus pada tingkat intensitas submaksimal.

## 2. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan

### a. Kecepatan (*speed*)

Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu sangat cepat/pendek, dan kecepatan dipengaruhi oleh waktu reaksi (Khairul, 2013). Kecepatan merupakan kemampuan berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain.

### b. Daya (*power*)

Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat (Khairul, 2013). Daya merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau pengerahan otot secara maksimum dengan kecepatan maksimum. Kemampuan seseorang yang memiliki bukan hanya dapat melakukan gerakan dengan kuat, tetapi juga mampu melakukan gerakan dengan cepat.

### c. Kelincahan (*agility*)

Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran jasmani yang sangat penting pula. Kelincahan merupakan kemampuan bergerak dengan berubah-ubah arah secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan.

### d. Keseimbangan (*balance*)

Keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh pada bidang tumpuan pada saat berdiri (*static balance*) atau pada saat melakukan gerakan (*dynamic static*)

### e. Koordinasi (*coordination*)

Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak dengan tepat dan efisien.

f. Kecepatan reaksi (*reaction speed*)

Kecepatan reaksi merupakan waktu yang diperlukan dari saat diterimanya stimulus atau rangsangan sampai awal munculnya respon atau reaksi. Stimulus yang dapat diterima melalui organ penglihatan, pendengaran, gabungan, keduanya dan sentuhan (kinestetik).

Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani perlu diadakan suatu pengukuran, agar dapat diketahui apakah kondisi kebugaran jasmani tersebut berada dalam kondisi baik atau buruk (Yohandika, 2013).

Oleh karena aktivitas manusia selalu berubah-ubah antara istirahat dan kerja, maka fungsi peralatan tubuh juga mengalami perubahan sesuai dengan derajat atau tingkat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dengan demikian kondisi sehat dapat dipandang dari sudut fisiologis yang terdiri atas dua tingkatan, yaitu sehat statis dan sehat dinamis. Sehat statis adalah normalnya fungsi peralatan tubuh dalam keadaan istirahat. Sedangkan sehat dinamis adalah normalnya peralatan tubuh dalam keadaan kerja. Dengan demikian seseorang yang kondisi jasmani pada saat istirahat saja, berarti dalam kondisi yang tidak produktif. Untuk itu, pengertian sehat dinamis bersifat selalu berubah ubah antara kondisi saat istirahat dan kondisi saat bekerja.

Setiap jenis pekerjaan memerlukan kondisi dan syaraf faal yang sepadan, sehingga kebugaran jasmani menunjukkan derajat sehat sesuai dengan berat ringannya tugas fisik yang harus dilakukan oleh seseorang. Kebugaran jasmani diartikan sebagai tingkat kesehatan yang sesuai dengan tubuh untuk melakukan pekerjaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam kebugaran jasmani terdapat tiga unsur yang saling berpengaruh, yaitu: (1) sehat, (2) sesuai dengan kemampuan tubuh, dan (3) kerja yang dilakukan. Sehat secara fisiologis adalah normalnya fungsi peralatan tubuh.

Kesesuaian dengan kemampuan tubuh adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan atau mengadaptasi dengan kerja, sehingga tidak cepat lelah dan dapat aktif melaksanakan tugas yang harus diembannya. Kerja pada dasarnya merupakan peningkatan proses faali dan biokimia sebagai jawaban terhadap meningkatnya tuntutan organ-organ tubuh maupun sistem seluruh tubuh.

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani

Kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. Keturunan

Gangguan kesehatan seperti penyakit dapat diturunkan kepada keturunannya, sehingga faktor keturunan akan mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang, walaupun demikian, apa yang kita miliki sampai sat ini patut kita syukuri dan kita pertahankan melalui pemeliharaan dan peningkatan derajat kebugaran melalui aktivitas jasmani.

##### 2. Umur

Semakin bertambahnya umur, tingkat kebugaran jasmani seseorang akan semakin menurun, terlebih apabila tidak dipelihara melalui aktivitas fisik yang menunjang terhadap peningkatan kebugaran jasmani.

##### 3. Jenis kelamin

Jenis kelamin ikut mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang, terutama wanita yang memiliki siklus menstruasi dan osteoporosis. Siklus menstruasi akan mempengaruhi tingkat kebugaran jasmaninya, begitu juga sebaliknya, aktivitas jasmani akan mempengaruhi terhadap siklus menstruasinya. Osteoporosis terjadi lebih cepat terhadap wanita dibandingkan pria. Osteoporosis juga mempengaruhi seorang wanita

untuk beraktivitas jasmani dan sebaliknya melakukan banyak aktivitas jasmani akan memperlambat proses osteoporosis pada wanita.

#### 4. Kegiatan fisik

Kegiatan fisik yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang, semakin rutin aktivitas fisik seseorang akan semakin terjaga derajat kebugaran jasmani seseorang.

#### 5. Kebiasaan merokok

Kebiasaan merokok akan mempengaruhi kesehatan jantung dan paru-paru, dengan demikian kebiasaan merokok sangat beesiko menurunkan secara drastis tingkat kebugaran jasmani seseorang. Oleh karena itu sudah seharusnya kita tidak melakukannya

Dengan demikian yang dimaksud kebugaran jasmani dalam penelitian ini adalah suatu keadaan peralatan tubuh yang mampu memelihara tersedianya energi sebelum, selama, dan sesudah kerja (Sukadiyanto, (2003). Di mana selama dalam aktivitas yang bersifat motorik selalu diperlukan tersedianya energi, baik yang sudah ada di dalam otot maupun yang dari luar otot dan langsung diproses agar menjadi energi untuk gerak. Jadi secara garis besar komponen dasar kebugaran jasmani ditentukan oleh ketahanan kardiorespirasi, kebugaran energi, dan kebugaran otot. Kebugaran energi antara lain ditentukan oleh sistem energi aerobik dan anaerobik (laktik dan alaktik). Sedangkan kebugaran otot antara lain terdiri dari kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya dengan baik dan efisien, tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga, baik untuk mengatasi keadaan

darurat yang mendadak, maupun menikmati waktu senggang dengan rekreasi yang aktif.

Di dalam agama Islam, kita sebagai pemeluknya dianjurkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat lagi sehat baik secara lahiriyah maupun bathiniyah. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal saleh dan beraktivitas di dalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim.

Allah Swt telah melimpahkan kepada hamba-hamba-Nya rezki dan nikmat yang begitu banyak namun semua itu kembali kepada usaha hamba-Nya untuk mencari rezki tersebut. Seseorang ingin berilmu tentunya dia harus belajar dengan giat, seseorang ingin mempunyai harta yang berkecukupan tentunya dia harus bekerja lebih keras begitu pula jika seseorang ingin memiliki jasmani yang sehat lagi kuat maka harus melatih fisiknya dengan cara makan-makanan yang sehat lagi halal, mengatur pola makan, pola hidup dan olahraga secara teratur. Kesehatan seseorang akan sangat bergantung pada individunya, kembali kepada bagaimana ia mengatur pola hidupnya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan jasmaninya. Allah sudah memberikan kita kesempurnaan fisik yang tidak dipunyai oleh makhluk lainnya yaitu akal, oleh karena itu, kita harus mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

Allah Swt telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tangan untuk memegang, kaki untuk berlari, telinga untuk mendengar, serta akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dll. Dengan kesempurnaan itu sepatutnya kita mampu menjaganya dengan baik untuk melakukan ibadah kepada Allah sang khaliq yang telah menciptakan kita di muka bumi ini. Dengan kesehatan kita mampu melakukan banyak

aktivitas, membantu orang lain, beribadah ke mesjid, beda halnya jika kita sedang sakit, tentunya aktivitas kita pun akan terhambat, oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan jasmani kita sehingga mampu melakukan banyak aktivitas yang Insya Allah bernilai ibadah di sisi-Nya.

Rasulullah juga memerintahkan kepada ummatnya untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang kuat karena Allah lebih menyukai dan mencintainya dari hamba yang lemah. Seperti pada hadist di bawah ini, Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ (رواه مسلم) ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ**

Artinya :

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim).

Dari uraian hadits diatas di jelaskan bahwa sebagai hamba Allah sekaligus ummat Rasulullah sudah sepatutnya untuk memiliki jasmani yang sehat dan rohani yang kuat karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita akan mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya, serta dapat juga

melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan atas ummatnya untuk senantiasa melaksanakan ajaran Rasul. Jadi, untuk dapat melaksanakan semua perintah Allah serta Rasulnya yaitu dengan memiliki tubuh yang sehat.

Tingkat kebugaran fisik di tinjau dari :

### 1. VO<sub>2</sub> MAX

#### a. pengertian

Konsumsi oksigen maksimal (VO<sub>2</sub> max) adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi kelelahan. Salah satu cara untuk menilai kebugaran seseorang dalam melakukan aktifitas fisik adalah dengan mengukur VO<sub>2</sub> max. VO<sub>2</sub> max adalah jumlah maksimum oksigen dalam milliliter, yang dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan. Orang yang kebugarannya baik mempunyai nilai VO<sub>2</sub> max yang lebih tinggi dan dapat melakukan aktivitas lebih kuat dari pada mereka yang tidak dalam kondisi baik.

Menurut Yohandika, 2013 bahwa Nilai daya tahan kardiorespirasi yang dicerminkan oleh nilai prediksi kapasitas VO<sub>2</sub>max yang merupakan indikator tingkat kebugaran jasmani. Banyak organisasi resmi menggunakan volume pemakaian oksigen sebagai tolak ukur kebugaran. Ukuran kemampuan kerja *cardio respiratory vascular* sering disebut juga volume oksigen maksimum atau disingkat VO<sub>2</sub>max. satuan VO<sub>2</sub>max adalah milliliter/kg, BB/menit, artinya besarnya jumlah oksigen yang digunakan (dalam satuan ml) setiap kg berat badan per menit aktivitasnya, semakin besar VO<sub>2</sub>max seseorang maka kebugaran jasmaninya semakin prima, dimana kualitas bio motoriknya juga semakin baik. Jadi VO<sub>2</sub> max dapat dijadikan cermin kebugaran

seseorang. VO<sub>2</sub> max mungkin adalah indikator fisiologis terbaik dari kemampuan seseorang untuk melanjutkan pekerjaan berat.

Nilai Vo<sub>2</sub> max bergantung pada:

1. keadaan kardiovaskular,
2. respirasi,
3. hematologi,
4. dan kemampuan latihan.

b. Tabel YMCA *step test*

**Tabel Norma Tes Bangku YMCA- 3 minute step test**

Age	18-25		26-35		36-45		46-55		56-65		65+	
Gender	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Excellent</b>	50-76	52-81	51-76	56-80	49-76	51-84	56-82	63-91	60-77	60-92	59-81	70-92
<b>Good</b>	78-84	85-93	79-85	85-92	80-88	89-96	87-93	95-101	86-94	97-103	87-92	96-101
<b>Above Everage</b>	88-93	96-102	88-94	95-101	92-98	100-104	95-101	104-110	97-100	106-111	94-102	104-111
<b>Everage</b>	95-100	104-110	96-102	101-110	100-105	107-112	103-111	113-118	103-109	113-118	104-110	116-121
<b>Bellow Everage</b>	102-107	113-120	104-110	113-119	108-112	115-120	113-119	120-124	111-117	119-127	114-118	123-126
<b>Poor</b>	111-119	120-131	114-121	122-129	116-124	124-132	121-126	126-132	119-128	129-135	121-126	128-133
<b>Very Poor</b>	124-157	135-169	126-161	134-171	130-159	137-167	131-159	137-171	131-155	141-174	130-151	135-155

Nieman, 2007

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi VO<sub>2</sub> Max

Ada tiga faktor utama yang menentukan maximal oxygen consumption

1. Cardiac output

Adalah volume darah yang dapat dipompa jantung permenit. Jumlahnya ditentukan oleh hasil perkalian antara stroke volume dan heart rate. Sedangkan stroke volume

adalah volume darah yang dikeluarkan pada tiap kontraksi ventrikel. Heart rate adalah frekuensi kontraksi ventrikel per menit yang merupakan akumulasi pengaturan otomatisitas dan pengaturan otomatis syaraf otonom.

## 2. The oxygen carrying capacity of the blood

Adalah kapasitas atau kemampuan darah untuk mengangkut oxygen yang ditentukan oleh kadar hemoglobin sel darah merah. Proses yang sangat diperankan oleh hemoglobin ini mulai dari pertukaran gas dan transfer gas ke perifer. Pertukaran gas di tingkat kapiler paru dan kapiler jaringan terjadi melalui difusi pasif sederhana O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub> mengikuti penurunan gradien tekanan parsial. Tidak terjadi mekanisme transport aktif bagi kedua gas tersebut. Dalam darah O<sub>2</sub> terdapat dalam dua bentuk : larut secara fisik (1,5) dan terikat secara kimiawi ke hemoglobin (98,5%)

## 3. Kemampuan otot untuk menggunakan oxygen yang disediakan

VO<sub>2</sub> max sangat lekat dengan kapasitas fungsi kardiovaskuler respirasi untuk mentransport darah dan menentukan kemampuan pemeliharaan dan homeostasis biokimia otot selama kerja maksimal/submaksimal. Respon kardiorespirasi dapat ditingkatkan dengan suatu program latihan yang berdampak peningkatan fungsi fisiologis. Program latihan yang dapat meningkatkan daya tahan dan VO<sub>2</sub> max dapat dilakukan melalui latihan yang dinamis seperti lari, sirkuit training, dan cross country selama 20 sampai 60 menit persesi, tiga sampai empat kali per minggu, terbukti meningkatkan VO<sub>2</sub> max 50 sampai 80% (Scott et al, 2008 dalam )

Menurut Tony Leyland (2006) bahwa faktor fisiologis yang paling penting yang menentukan VO<sub>2</sub> max pada orang adalah:

1. kemampuan jantung untuk memompa darah
2. kapasitas pembawa oksigen darah (kadar hemoglobin)

3. kemampuan kerja otot untuk menerima pasokan darah besar (jumlah capillarization dalam otot)
4. kemampuan sel-sel otot untuk mengekstrak oksigen dari darah kapiler dan menggunakannya untuk menghasilkan energi (jumlah mitokondria dan aerobik enzim)

### 1. Tekanan Darah

#### a. Definisi tekanan darah

Tekanan darah adalah tekanan di dalam pembuluh arteri ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah dapat di lihat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya di tunjukkan oleh angka seperti berikut : 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung berkontraksi. Disebut dengan tekanan sistolik. Angka 80 menunjukkan tekanan ketika jantung sedang berelaksasidi sebut dengan tekanan Diastolik.

Tekanan darah merupakan gambaran keadaan curah jantung tahanan perifer, volume darah, elastisitas pembuluh darah dan tahanan pembuluh darah perifer baik langsung maupun tidak langsung sehingga akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Factor-faktor tersebut antara lain, volume sekuncup, frekuensi jantung, pembuluh darah, system saraf otonom serta ginjal. Volume sekuncup adalah volume darah yang dipompakan jantung pada satu kali kontraksi dan ditentukan oleh kekuatan kontraksi otot jantung serta volume darah yang kembali ke jantung (venous return) , sehingga bila terjadi perubahan dalam frekuensi kontraksi otot jantung atau perubahan diameter pembuluh darah atrial oleh pengaruh aktivitas system saraf otonom maupun hormonal dan berpengaruh terhadap tekanan darah.

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatis di dalam tubuh. Tekanan darah selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam

arteri, arteriola, kapiler dan sistem vena, sehingga terbentuklah suatu aliran darah yang menetap (Ibnu M, 1996 dalam Febby 2013).

## 5. Jenis Tekanan Darah

Menurut Pearce ( 2009), ada dua jenis tekanan darah, yaitu :

### 1. Tekanan sistolik

Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut *systole*. Pada format penulisan angka tekanan darah, umumnya, tekanan sistolik merupakan angka pertama. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120/80 menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg.

### 2. Tekanan diastolik

Tekanan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung tidak sedang berkonstraksi atau beristirahat. Pada kurva denyut jantung, tekanan diastolik adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara grafik denyut jantung. Klasifikasi tekanan darah bagi orang dewasa usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang dalam pengobatan tekanan darah tinggi dan tidak menderita penyakit serius dalam jangka waktu tertentu menurut *Seventh Report of the Joint National Committee VII (JNC VII) on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi tekanan darah untuk yang berumur 18 tahun atau lebih**

Klasifikasi	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Pre Hipertensi	120 – 139	80 – 89
Stadium I	140 – 159	90 – 99
Stadium II	≥160	≥100

Sumber (Joint Nasional Committee VII, 2015)

#### 6. Cara mengukur tekanan darah

Peninggian tekanan darah sering kali merupakan satu-satunya tanda klinis hipertensi, sehingga di perlukan pengukuran tekanan darah secara akurat. Tekanan darah diukur dengan menggunakan alat sphygmomanometer (tensimeter) dan stetoskop. Ada tiga tipe dari spygmomanometer yaitu dengan menggunakan air raksa atau merkuri, aneroid, dan elektronik. Tipe air raksa adalah jenis spygmomanometer yang paling akurat. Tingkat bacaan dimana detak tersebut terdengar pertama kali adalah tekanan sistolik. Sedangkan tingkat dimana bunyi detak menghilang adalah tekanan diastolik. Spygmomanometer aneroid prinsip penggunaannya yaitu menyeimbangkan tekanan darah dengan tekanan dalam kapsul metalis tipis yang menyimpan udara didalamnya. Spygmomanometer elektrtonik merupakan pengukur tekanan darah terbaru dan lebih mudah digunakan dibanding model standar yang menggunakan air raksa, tetapi akurasiya juga relatif rendah. Sebelum mengukur tekanan darah yang harus diperhatikan yaitu: jangan minum kopi atau merokok 30 menit sebelum pengukuran dilakukan, duduk bersandar selama 5 menit dengan kaki menyentuh lantai dan tangan sejajar dengan jantung (istirahat), memakai baju lengan pendek, kemudian buang air kecil dulu

sebelum diukur, karena kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi hasil pengukuran (Kemenkes RI, 2005).

Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan pada pasien setelah istirahat yang cukup, yaitu sesudah berbaring paling sedikit 5 menit. Pengukuran dilakukan pada posisi terbaring, duduk, dan berdiri sebanyak 2 kali atau lebih dengan interval 2 menit. Ukuran manset harus cocok dengan ukuran lengan atas. Manset harus melingkari paling sedikit 80 % lengan atas dan lebar manset paling sedikit 2/3 kali panjang lengan atas, pinggir bawah manset harus 2 cm diatas fosa cubiti untuk mencegah kontak dengan stetoskop. Sebaiknya disediakan berbagai ukuran manset untuk dewasa, anak dan orang gemuk. Balon dipompa sampai ke atas tekanan diastolik kemudian tekanan darah diturunkan perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mmHg tiap denyut jantung. Tekanan sistolik tercatat pada saat terdengar bunyi yang pertama (kortokoff 1) sedangkan tekanan diastolik dicatat jika bunyi tidak terdengar lagi (kortokoff V). Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan pada kedua lengan, pada posisi berbaring atau duduk. (Kemenkes RI, 2005).

Tekanan darah di tentukan oleh :

1. Jumlah darah yang di pompa oleh jantung
2. Lancar tidaknya aliran darah yang ada dalam arteri tersebut

Pada orang dewasa tekanan normal berkisar 120/80 – 139/80 mmHg, dengan rentan nilai sistolik antara 120-139 mmHg dan diastolik antara 80 – 89 mmHg, Nilai 139 mmHg dan 89 mmHg dinyatakan sebagai normal tinggi yang tentunya mulai punya risiko terkena penyakit jantung pembuluh darah.

Menurut Ridwan (2010), Normalnya tekanan darah itu berubah-ubah sehingga mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Tekanan tersebut bervariasi sepanjang hari,
2. Tekanan akan meningkat seperti : sewaktu latihan, stress mental, dan hubungan seks
3. Tekanan akan menurun ketika tubuh berinteraksi saat tidur
4. Selama fase systole, tekanan ini tertinggi karena jantung bilik kiri memompa darah ke arteri
5. Pada fase relaksasi (diastole), yaitu bilik kiri jantung sedang terisi kembali, tekanannya menurun (tekanan diastole), kondisi ini merupakan saat tekanan terendah.

Terdapat dua macam kelainan tekanan darah, antara lain yang dikenal sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipertensi telah menjadi penyakit yang menjadi perhatian di banyak Negara di dunia, karena hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu di banyak negara. (Febby Haendra Dwi Anggara, 2013)

Metode pengukuran tekanan darah ada dua yaitu :

- a. Metode palpasi

Tekanan sistolik dapat di tentukan dengan memompa manset lengan dan kemudian membiarkan tekanan turun dan tentukan tekanan pada saat denyut radialis pertama kali teraba. Oleh karena kesukaran menentukan seara pasti kapan denyut pertama teraba, tekanan yang diperoleh dengan metode palpasi biasanya 2-5 mm Hg lebih rendah dibandingkan dengan yang di ukur dengan metode auskultasi.

- b. Metode auskultasi

Metode auskultasi adalah akurat apabila dipergunakan secara tepat, tetapi beberapa pertimbangan harus diamati.

### 1. Faktor- faktor Fisiologis yang Dapat Mempengaruhi Tekanan Darah

Menurut Saifuddin (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu :

- a. Pengembalian darah melalui vena/jumlah darah yang kembali ke jantung melalui vena. Jika darah yang kembali menurun, otot jantung tidak akan terdistensi, kekuatan ventrikular pada fase sistolik akan menurun dan tekanan darah akan menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh perdarahan berat. Pada keadaan tidur atau berbaring dimana tubuh dalam keadaan posisi horizontal, pengembalian darah ke jantung melalui vena bisa dipertahankan dengan mudah. Tapi, ketika berdiri aliran darah vena kembali ke jantung mengalami tahanan lain, yaitu gravitasi. Terdapat tiga mekanisme membantu pengembalian darah melalui vena, yakni konstriksi vena, pompa otot rangka, dan pompa respirasi.
- b. Frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Secara umum, apabila frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung meningkat, tekanan darah ikut meningkat. Inilah yang terjadi saat *exercise*. Akan tetapi, apabila jantung berdetak terlalu kencang, ventrikel tidak akan terisi sepenuhnya diantara detakan, sehingga curah jantung dan tekanan darah akan menurun.
- c. Resistensi perifer. Yaitu resistensi dari pembuluh darah bagi aliran darah. Arteri dan vena biasanya sedikit terkonstriksi, sehingga tekanan darah diastol normal.
- d. Elastisitas arteri besar. Saat ventrikel kanan berkontraksi, darah yang memasuki arteri besar akan membuat dinding arteri berdistensi. Dinding arteri bersifat elastis dan dapat menyerap sebagian gaya yang dihasilkan aliran darah. Elastisitas ini menyebabkan tekanan diastol yang meningkat dan sistol yang menurun. Saat ventrikel kiri berelaksasi, dinding arteri juga akan kembali ke ukuran awal, sehingga tekanan diastol tetap berada di batas normal.

- e. Viskositas darah. Viskositas darah normal bergantung pada keberadaan sel darah merah dan protein plasma, terutama albumin. Kadar sel darah merah yang terlalu tinggi pada seseorang, sehingga menyebabkan peningkatan viskositas darah dan tekanan darah, sangatlah jarang, akan tetapi masih dapat terjadi pada kondisi polisitemia vena dan perokok berat. Kekurangan sel darah merah, seperti pada kondisi anemia, akan menyebabkan kondisi berbalik dari sebelumnya. Pada saat kekurangan, mekanisme penjaga tekanan darah seperti vasokonstriksi akan terjadi untuk mempertahankan tekanan darah normal.
- f. Kehilangan darah. Kehilangan darah dalam jumlah kecil, seperti saat donor darah, akan menyebabkan penurunan tekanan darah sementara, yang akan langsung dikompensasi dengan peningkatan tekanan darah dan peningkatan vasokonstriksi. Akan tetapi, setelah perdarahan berat, mekanisme kompensasi ini takkan cukup untuk mempertahankan tekanan darah normal dan aliran darah ke otak. Walaupun seseorang dapat selamat dari kehilangan 50% dari total darah tubuh, kemungkinan terjadinya cedera otak meningkat karena banyaknya darah yang hilang dan tidak dapat diganti segera.

Hormon. Beberapa hormon memiliki efek terhadap tekanan darah. Contohnya, pada saat stress, medula kelenjar adrenal akan menyekresikan norepinefrin dan epinefrin, yang keduanya akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga meningkatkan tekanan darah. Selain dari vasokonstriksi, epinefrin juga berfungsi meningkatkan *heart rate* dan gaya kontraksi. Hormon lain yang berperan adalah ADH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior saat tubuh mengalami kekurangan cairan. ADH akan meningkatkan reabsorpsi cairan pada ginjal sehingga tekanan darah tidak akan semakin turun. Hormon lain, aldosteron, memiliki efek serupa pada

ginjal, dimana aldosteron akan mempromosikan reabsorpsi  $\text{Na}^+$ , lalu air akan mengikuti ion  $\text{Na}^+$  ke darah

### 3. Kadar Hemoglobin

#### a. Sistem dan struktur hemoglobin

Setiap organ utama dalam tubuh manusia tergantung pada oksigenasi untuk pertumbuhan dan fungsinya, dan proses ini berada dibawah hemoglobin. Molekul hemoglobin terdiri dari dua struktur utama, yaitu heme dan globin (Rukman, 2014).

##### 1. Heme

Struktur ini melibatkan empat atom besi dalam bentuk  $\text{Fe}^{2+}$  dikelilingi oleh cincin protoporfirin IX, karena zat besi dalam bentuk  $\text{Fe}^{2+}$ , tidak dapat mengikat oksigen. Protoporfirin adalah produk akhir dalam sintesis molekul heme. Protoporfirin ini hasil dari interaksi suksinil koenzim A dan asam delta-aminolevulinat di dalam mitokondria dan eritrosit berinti, dengan pembentukan beberapa produk antara, yaitu porfobilinogen, uroporfirinogen, dan coproporfirin. Besi bergabung dengan protoporfirin untuk membentuk heme molekul lengkap. Cacat pada salah satu produk dapat merusak fungsi hemoglobin.

##### 2. Globin

Terdiri dari asam amino yang dihubungkan bersama untuk membentuk rantai polipeptida. Hemoglobin dewasa terdiri atas rantai alfa dan rantai beta. Rantai alfa memiliki 141 asam amino, sedangkan rantai beta memiliki 146 asam amino. Heme dan globin dari molekul hemoglobin dihubungkan oleh ikatan kimia.

#### b. Fungsi hemoglobin

Pengiriman oksigen adalah fungsi utama dari molekul hemoglobin. Selain itu, struktur hemoglobin mampu menarik  $\text{CO}_2$  dari jaringan, serta menjaga darah pada pH

yang seimbang. Satu molekul hemoglobin mengikat satu molekul oksigen di lingkungan yang kaya oksigen, yaitu di alveoli paru-paru. Hemoglobin memiliki aktivitas yang tinggi untuk oksigen dalam lingkungan paru, karena pada jaringan kapiler di paru-paru, terjadi proses difusi oksigen yang cepat sebagai molekul transit (deoksihemoglobin). Didalam sirkulasi, molekul ini mampu mengikat oksigen dan membongkar oksigen ke jaringan di daerah yang afinitas oksigennya rendah. Pada proses bongkar oksigen tersebut terjadi perubahan molekul. Perubahan ini dipengaruhi oleh 2,3-DPG, yang berada di pusat molekul. Ketika oksigen dikeluarkan “jembatan” yang dibentuk 2,3-DPG rusak sehingga molekul kembali sepenuhnya untuk mampu mengikat oksigen. Pengikatan dan pelepasan oksigen dari hemoglobin molekul ditentukan oleh kurva oksigen. Karena ini membentuk huruf “S”, kurva ini dirancang untuk menggambarkan kualitas yang unik dari disosiasi oksigen dan menunjukkan bagaimana molekul hemoglobindan oksigen merespon pada keadaan normal dan abnormal.

Darah mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting didalam tubuh, termasuk untuk transpor oksigen ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen (sel darah). Plasma sebagian besar terdiri dari air selebihnya berupa protein dan larutan zat gizi lainnya. Tiga komponen penyusun elemen sebagian besar adalah sel darah merah, dan selebihnya sel darah putih dan trombosit (platelet). Ketiga macam sel ini berasal dari sel yang sama di produksi di sumsum tulang, yang kemudian berdiferensiasi menjadi bentuk yang berbeda-beda. Setelah sel tersebut matang akan keluar dari sumsum ke pembuluh darah dengan jumlah dan fungsi berbeda (Sadikin 2002).

Sel darah merah (eritrosit) merupakan komponen terbanyak diantara ketiga komponen (elemen) darah, dan merupakan komponen yang memberikan warna merah. Selain itu, sel darah merah juga membawa oksigen dari paru-paru, melalui aliran darah ke otak dan kemudian di distribusikan ke seluruh atau jaringan tubuh. Kebanyakan sel darah (termasuk sel darah merah ) di produksi secara teratur di dalam sumsum tulang tubuh (terutama tulang besar). Untuk memproduksi hemoglobin dan sel darah diperlukan zat besi dan vitamin yang diperoleh dari makanan sehari-hari (Koury dan Ponka, 2004).

Fungsi utama eritrosit adalah mengikat oksigen dan membawa oksigen dari paru-paru dan di edarkan ke seluruh tubuh, dan sebaliknya membawa sisa metabolisme berupa CO<sub>2</sub> untuk di buang. Komponen eritrosit yang dapat mengikat oksigen adalah hemoglobin. Hemoglobin tersusun dari senyawa kompleks protein globin dan heme (senyawa porfirin yang bagian pusatnya diisi satu atom besi). Satu molekul hemoglobin terdiri dari empat molekul globin dan empat heme, sehingga satu molekul *hemoglobin* mempunyai empat atom besi (Sadikin, 2002).

Menurut haji-Ali Yertireh Hemoglobin dapat menyimpan 1.34cc O<sub>2</sub> per gram dalam bentuk sepenuhnya jenuh. Struktur molekul hemoglobin ini yang dapat mengikat oksigen, dan zat besi harus berada dalam bentuk tereduksi (Fe<sup>2+</sup> atau ferro). Hemoglobin ini yang mengalami oksidasi akan menjadi metahemoglobin, dan ferro berubah menjadi ferri sehingga tidak mampu lagi mengikat oksigen. Untuk menghindari resiko oksidasi, hemoglobin diikat dan tersembunyi pada ikatan peptida molekul protein globin pada sel darah merah.

### c. Abnormal hemoglobin

Menurut Suthat Fucharoen 2002 Abnormal hemoglobin terjadi dari mutasi genetik termasuk mutasi titik, penghapusan atau sisipan gen globin. Lebih dari 90% dari varian yang dikenal muncul dengan substitusi dari satu residu asam amino pada satu jenis rantai (satu titik mutasi) dan lebih dari 60% melibatkan rantai globin B. Karena seseorang mewarisi hanya dua B gen globin, rantai varian B biasanya merupakan sekitar setengah dari total hemoglobin dalam sel darah merah dan menimbulkan perubahan yang signifikan dalam fungsi sel darah merah. Sebaliknya, sebagian besar individu memiliki empat gen globin  $\alpha$ . Oleh karena varian rantai biasanya hanya menyumbang sekitar 25% dari total hemoglobin dan fungsi sel darah merah akibat lebih ringan daripada yang dihasilkan oleh B

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin

1. Kecukupan Besi dalam Tubuh

Besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga anemia gizi besi akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih kecil dan kandungan hemoglobin yang rendah. Besi juga merupakan mikronutrien esensial dalam memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengantar oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, untuk dieksresikan ke dalam udara pernafasan, sitokrom, dan komponen lain pada sistem enzim pernafasan seperti sitokrom oksidase, katalase, dan peroksidase. Besi berperan dalam sintesis hemoglobin dalam sel darah merah dan mioglobin dalam sel otot. Kandungan  $\pm 0,004$  % berat tubuh (60-70%) terdapat dalam hemoglobin yang disimpan sebagai ferritin di dalam hati, hemosiderin di dalam limpa dan sumsum tulang (Parakkasi, 1992)

Tubuh manusia sehat mengandung  $\pm 3,5$  g besi yang hampir seluruhnya dalam bentuk ikatan kompleks dengan protein, adapun pada bayi baru lahir lebih kurang 250 mg dari jumlah tersebut (60-70%) dinamakan besi fungsional, karena berefek pada fungsi tubuh, sedangkan sisanya disimpan disebut besi nonessential (Wardhini S dan Dewoto H R, 1995).

Kecukupan besi yang direkomendasikan adalah jumlah minimum besi yang berasal dari makanan yang dapat menyediakan cukup besi untuk setiap individu yang sehat pada 95% populasi, sehingga dapat terhindar kemungkinan anemia kekurangan besi. Kecukupan besi (tabel 3) ditentukan berdasarkan bioavailabilitas besi dari golongan makanan (Kartono J dan Soekatri M, 2004).

## 2. Metabolisme Besi dalam Tubuh

Besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa sehat berjumlah lebih dari 4 g. Besi tersebut berada di dalam sel-sel darah merah atau hemoglobin (lebih dari 2,5 g), *myoglobin* (150 mg), *phorphyrin cytochrome*, hati, limpa sumsum tulang (> 200- 1500 mg). Ada dua bagian besi dalam tubuh, yaitu bagian fungsional yang dipakai untuk keperluan metabolik dan bagian yang merupakan cadangan. Hemoglobin, mioglobin, sitokrom, serta enzim hem dan nonhem adalah bentuk besi fungsional dan berjumlah antara 25-55 mg/kg berat badan. Sedangkan besi cadangan apabila dibutuhkan untuk fungsi-fungsi fisiologis dan jumlahnya 5-25 mg/kg berat badan. Ferritin dan hemosiderin adalah bentuk besi cadangan yang biasanya terdapat dalam hati, limpa dan sumsum tulang (Wirakusumah, 1999). Metabolisme besi dalam tubuh terdiri

dari proses absorpsi, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan dan pengeluaran.

Ketersediaan besi pada makanan tergantung pada sumbernya. Protein kedelai misalnya mengandung suatu penghambat dalam penyerapan besi. Makanan orang Asia mengandung sejumlah produk-produk kedelai yang mempengaruhi absorpsi besi. Tanin, fitat, serat tertentu (bukan selulosa), karbonat, fosfat serta makanan lain yang rendah protein juga berpengaruh negatif pada absorpsi besi. Sebaliknya, asam askorbat, fruktosa, asam sitrat, makanan tinggi protein, lisin, histidin, sistein, metionin akan meningkatkan absorpsi besi (Berdanier, 1998).

Besi dari makanan diserap ke usus halus, makin ke distal absorpsinya makin berkurang. Zat ini lebih mudah diserap dalam bentuk ferro melalui pengangkutan ion ferro yang sudah diabsorpsi diubah menjadi ion ferri dalam mukosa usus. Ion ferri akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin yang diubah menjadi ferritin yang disimpan di dalam sel mukosa. Apabila simpanan besi total tinggi dan kebutuhan besi tubuh rendah, maka besi yang baru diabsorpsi dimasukkan ke dalam ferritin dan tidak diangkut ketempat lain. Apabila simpanan besi berkurang atau kebutuhan besi meningkat, maka besi yang baru diabsorpsi langsung diangkut dari sel-sel mukosa ke sumsum tulang untuk produksi hemoglobin (Katzung B G, 2002).

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Besi
  - a. Pola makan
  - b. Zat pendorong dan penghambat
  - c. Protein

## B. Tinjauan Umum Tentang Bulutangkis

### 1. Pengertian

Bulutangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulutangkis dapat di mainkan di dalam maupun di luar lapangan, dengan lapangan yang dibatasi garis-garis dalam dengan ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulutangkis di bagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan jaring/net yang tergantung di tiang yang ditanam di tepi lapangan. Alat yang digunakan adalah raket sebagai pemukul dan kok (shuttlecock) sebagai bola yang dipukul. Permainan dimulai dengan cara melakukan servis, yaitu memukul kok dari petak servis kanan ke petak servis kanan lawan, sehingga jalannya kok menyilang.

### 2. Perlengkapan Permainan Bulutangkis

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulutangkis antara lain :

#### 1. Raket (pemukul)

Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis-jenis raket yang dipergunakan dalam bermain bulutangkis, antara lain :

- a) Raket yang berat dibagian atas (kepala)
- b) Raket yang berat dibagian pegangan (handle)
- c) Raket yang beratnya rata disetiap bagian, cocok untuk semua pemain

(allround)


#### 2. Shuttlecock

Shuttlecock terdiri atas bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan di bungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat Shuttlecock antara 73-85 grains (4,73-5,50 gram) dan harus mempunyai 14-16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1-1/8 inci atau 25-28 milimeter. Bulunya harus berukuran 64-74 milimeter dari ujung atas sampai kepada

bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas Shuttlecock 54-56 milimeter dan harus diikat dengan benang atau bahan lain yang kuat.

### 3. Ukuran Lapangan Bulutangkis

Lapangan bulutangkis berukuran 610 cm x 1340 cm yang dibagi dalam bidang-bidang, masing-masing dua sisi berlawanan dengan dibatasi oleh jaring (net). Ada garis tunggal, garis ganda, dan ada ruang yang memberi jarak antara pelaku dan penerima *service*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambar :



Gambar 2.1 Gambar Lapangan Bulutangkis (wahyu, 2009)

### 4. Teknik Dasar Permainan Bulutangkis

#### 1. Pembelajaran Teknik Pukulan Permainan Bulutangkis

Untuk dapat berprestasi dengan baik dalam permainan bulutangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemain adalah komponen dasar yang salah satunya adalah servis. Dalam permainan bulutangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Salah melakukan servis berarti fatal, sedangkan unggul dalam servis berarti membuka kemungkinan mendapatkan angka. Teknik-teknik dasar bermain bulutangkis sebagai berikut :

a) Pembelajaran cara memegang raket

Cara memegang raket yang benar adalah bila dapat menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Cara memegang raket adalah sebagai berikut :

1) Cara memegang *shake hand (forehand grip)*

Posisi tangan seperti berjabat tangan. Lantai tegak lurus dengan raket, senar menghadap kedua sisi kanan dan kiri

2) Cara memegang gebukan kasur (*american/panhandle grip*)

Dilakukan dengan cara menyerupai pada saat memegang gebukan kasur. Saat dipegang, permukaan raket sejajar dengan permukaan lantai diambil, itulah pegangan gebukan kasur. Pegangan ini agak lemah saat melakukan pukulan backhand

3) Cara memegang backhand grip

Dilakukan dengan posisi ibu jari menekan pada bagian pegangan yang lebih luas dan sejajar dengan permukaan raket tangan, dan jari-jari lain melingkar pada pegangan raket. Tumpuan pegangan terletak pada ibu jari.

4) Cara memegang kombinasi/campuran

Dilakukan dengan cara mengombinasikan dari beberapa bentuk pegangan tadi, dengan cara mengubah-ubah posisi jari telunjuk dan ibu jari, disesuaikan dengan arah dan jenis pukulan.

b) Pembelajaran tehnik pukulan

Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulutangkis dengan tujuan mengarahkan Shuttlecock ke bidang lawan. Gerakan pokok dalam melakukan pukulan mempunyai pedoman yang sama dalam setiap

gerakan. Gerakan dasar melakukan pukulan mempunyai sikap badan yang sama., hanya gerakan tangan yang menghasilkan pukulan yang bermacam-macam, misalnya melakukan pukulan *overhead*, *lob*, *smes*, *dropshot*, dan *chop*.

#### 1) Pukulan servis

Servis merupakan pukulan dengan raket yang mengarahkan shuttlecock kebidang lawan secara menyilang atau diagonal. Servis bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulutangkis. Macam-macam pukulan servis antara lain :

- Pukulan servis pendek (short service)
- Servis panjang (service lob)
- Pukulan servis drive
- Pukulan servis cambuk (service flick)

#### 2) Pukulan lob atau clear

Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk melambungkan shuttlecock setinggi mungkin. Cara melakukan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu overhead lob dan underhand lob.

#### 3) Pukulan dropshot

Pukulan dropshot adalah pukulan yang tepat melampaui jaring dan langsung jatuh ke sisi lapangan lawan. Dropshot merupakan pukulan yang dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke daerah lawan dengan cara menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net.

Pukulan dropshot dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :

##### a) Pukulan dropshot dari atas

- Pukulan dropshot secara penuh
- Pukulan dropshot potong
- Pukulan dropshot secara dicambuk atau flick

b) Pukulan dropshot dari bawah

4) Pukulan smes

Pukulan smes dalam permainan bulutangkis merupakan salah satu pukulan yang sering menghasilkan nilai, sebab pukulan ini merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras serta menukik.

Pukulan smes dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- Pukulan smes penuh
- Pukulan smes potong
- Pukulan smes melingkar
- Pukulan smes cambukan atau *flick smash*
- Pukulan *backhand smash*

5) Pukulan drive atau mendatar

Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock secara mendatar, ketinggiannya menyusur diatas net dan arahnya sejajar dengan lantai.

Menurut kegunaan dan arahnya, pukulan drive ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- Pukulan drive panjang yaitu pukulan dengan mengarahkan shuttlecock ke belakang daerah lawan.
- Pukulan drive setengah lapangan yaitu pukulan dengan tujuan menjatuhkan shuttlecock kebagian tengah samping dari daerah lawan.

- Pukulan drive pendek yaitu pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kok supaya jatuh sedekat mungkin dengan net di daerah lawan.

#### 6) Permainan net (netting)

Permainan net merupakan pukulan yang paling sulit dalam permainan bulutangkis. Permainan net banyak memerlukan kecermatan dan penuh perasaan.

Prinsip permainan sebagai berikut :

- Bola harus diambil di atas atau setinggi mungkin
- Lambungan bola harus serendah mungkin dengan net
- Jatuhnya bola harus serapat mungkin dengan net
- Bola harus diambil sewaktu masih diatas, karena apabila diambil setelah

bola dibawah akan memperlambat tempo permainan dan memberikan kesempatan lawan lebih siap untuk maju.

#### 5. Variasi teknik pukulan dan taktik permainan

Setelah menguasai cara memegang raket dan seluruh teknik dasar dengan baik, selanjutnya dapat membuat variasi pukulan. Anda dapat mengembalikan setiap pukulan yang diberikan oleh lawan mainnya dengan pukulan yang berbeda-beda sesuai dengan arah dan kecepatan shuttlecock yang datang. Selain itu juga dalam satu jenis posisi dan arah datang shuttlecock anda dapat melakukan beberapa pilihan pukulan. Misalnya pukulan overhead, selain lob dengan sedikit mengubah grip dan arah raket/putaran raket, bisa melakukan pada posisi underhand yang baik, selain melakukan netting bisa juga melakukan flick. Penguasaan pukulan dasar dan variasi akan terasa sekali manfaatnya pada saat mulai bermain dalam game (hitungan). Berpikirlah menggunakan taktik apa agar mematikan lawan dan memenangkan pertandingan.

## 6. Jenis permainan bulutangkis

### 1. Permainan tunggal

Pada permainan tunggal, bisa dikatakan berada diatas angin apabila selalu bisa :

- Melakukan pukulan dengan selalu berada di belakang bola
- Sudah berada di tengah lapangan sebelum lawan memukul bola
- Sebaliknya berusaha untuk cepat berada pada posisi memukul sebelum

lawan kembali ke tengah. Dalam posisi ini artinya siap melakukan serangan yang mematikan.

Untuk bisa melakukan ketiga hal diatas, pemain harus memiliki footwork yang teratur dan cepat. Dan gerakan-gerakan yang cepat itu bisa berlangsung untuk jangka waktu lama maka diperlukan stamina yang memadai. Karenanya footwork yang cepat, teratur dan stamina yang kuat menjadi faktor yang dominan diperlukan seorang pemain tunggal

### 2. Permainan ganda

Permainan ganda memiliki tuntutan yang agak berbeda dengan tunggal. Seorang pemain yang footworknya kurang baik tetapi memiliki kecepatan dan refleks pukulan serta power yang besar, bisa menjadi pemain ganda yang baik. Walaupun penguasaan pukulan dasarnya sama dengan tunggal, tetapi seorang pemain tunggal yang baik belum tentu bisa menjadi pemain ganda yang handal.

## C. Hubungan Aktivitas Latihan Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran (Vo2 Max), Tekanan Darah, Dan Kadar Hemoglobin)

Latihan olahraga merupakan suatu aktivitas aerobik, yang terutama bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya tahan jantung, paru, peredaran darah, otot-otot, dan sendi-sendi. Olahraga fisik mempunyai 4 komponen

dasar yaitu kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan daya tahan kardiorespirasi. Pengaruh latihan akan memberikan perubahan fisiologi yang hampir terjadi pada setiap system tubuh. Perubahan akan dicapai apabila sudah mencukupi waktu yang diperlukan untuk adaptasi fisiologis yaitu berkisar antara 6-8 minggu. (arsdiani, 2006).

Latihan fisik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap berbagai macam sistem yang bekerja di dalam tubuh, salah satunya adalah sistem kardiovaskuler, di mana dengan latihan fisik yang benar dan teratur akan terjadi efisiensi kerja jantung. Efisiensi kerja jantung ataupun kemampuan jantung akan meningkat sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hal tersebut dapat berupa perubahan pada frekuensi jantung, isi sekuncup, dan curah jantung (arsdiani, 2006).

Saat melakukan aktivitas aerobik, tekanan darah akan naik cukup banyak. Misalnya, selama melakukan latihan-latihan aerobik yang keras, tekanan darah sistolik dapat naik menjadi 150 - 200 mmHg dari tekanan sistolik ketika istirahat sebesar 110 - 120 mmHg. Sebaliknya, segera setelah latihan aerobik selesai, tekanan darah akan turun sampai di bawah normal dan berlangsung selama 30 - 120 menit. Kalau olahraga aerobic dilakukan berulang-ulang, lama kelamaan penurunan tekanan darah tadi berlangsung lebih lama. Itulah sebabnya latihan olahraga secara teratur akan dapat menurunkan tekanan darah. Jenis olahraga yang efektif menurunkan tekanan darah adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang. Frekuensi latihannya 3 - 5 kali seminggu, dengan lama latihan 20 - 60 menit sekali latihan (arsdiani, 2006).

Penurunan tekanan darah ini antara lain terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran dan relaksasi. Lama-kelamaan, latihan olahraga dapat melemaskan pembuluh pembuluh darah, sehingga tekanan darah menurun, sama halnya dengan melebarnya pipa air akan menurunkan tekanan air. Dalam hal ini, olahraga dapat

mengurangi tahanan perifer. Penurunan tekanan darah juga dapat terjadi akibat aktivitas memompa jantung berkurang (arsdiani, 2006).

Otot jantung pada orang yang rutin berolahraga sangat kuat, maka otot jantung pada individu tersebut berkontraksi lebih sedikit daripada otot jantung individu yang jarang berolahraga, untuk memompakan volume darah yang sama. Karena olahraga dapat menyebabkan penurunan denyut jantung maka olahraga akan menurunkan *cardiac output*, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tekanan darah. Peningkatan efisiensi kerja jantung dicerminkan dengan penurunan tekanan sistolik, sedangkan penurunan tahanan perifer dicerminkan dengan penurunan tekanan diastolik (arsdiani, 2006).


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan arsdiani syatria menunjukkan bahwa tekanan darah pada kelompok control tidak mengalami perubahan secara bermakna. Sedangkan pada kelompok perlakuan, tekanan sistolik mengalami penurunan secara bermakna, sementara tekanan diastolik tidak mengalami penurunan secara bermakna. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi kerja jantung yang menyebabkan penurunan tekanan darah, sementara faktor penurunan tahanan perifer tidak terlalu berperan dalam penurunan tekanan darah. Dalam hal ini, pemberian latihan olahraga terprogram selama 12 minggu lebih cenderung mengakibatkan perubahan bermakna pada efisiensi kerja jantung dibandingkan dengan tahanan perifer (arsdiani, 2006).

Kebugaran jasmani sebagai suatu hasil belajar (output) tidak terlepas dari faktor dan Sebagai produk dari proses belajar atau berlatih, tingkat kebugaran jasmani mahasiswa dari sudut ilmu faal, ilmu kesehatan olahraga, dan ilmu kepelatihan olahraga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) sistem respirasi sebagai organ penyedia oksigen, (2) sistem kardiovaskuler dengan isinya (darah, dalam hal ini


hemoglobin) sebagai pengangkut oksigen, (3) sistem otot sebagai pengguna oksigen, (4) sistem metabolisme energi sebagai penyedia energi, dan (5) status gizi (indeks masa tubuh), serta (6) tergantung pada umur, jenis kelamin, program aktivitas jasmani dan latihan olahraga. Keenam faktor tersebut secara fisiologis dan biologis harus berfungsi normal dan ditingkatkan secara simultan (sarwono,2008).

Latihan olahraga dan aktivitas jasmani selain membutuhkan energi yang cukup, juga memerlukan kadar (kadar Hb) yang tinggi. Hb merupakan zat pewarna merah pada darah, terletak dalam *eritrosit* terdiri atas globin dan bagian nonprotein yang mengandung besi (Fe) dan digolongkan *porphyrin* dalam (Ganong, 1992 dalam sarwono, 2008).

#### D. Kerangka pikir



### E. Kerangka Kerja



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Desain Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian *pra eksperimen* dengan rancangan *One-group pre-post test design*. Peneliti menggunakan desain ini karena penelitian ini akan mengungkapkan sebab-akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi (*pre test*), kemudian diobservasi lagi setelah intervensi (*post test*).

##### ***B. Tempat dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015

##### ***C. Populasi dan Sampel***

###### **1. Populasi**

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang masuk di UKM Bulutangkis UIN alauddin Makassar.

###### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang di pilih dengan cara tertentu hingga di anggap mewakili populasi (Nursalam, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota di UKM Bulutangkis UIN Alauddin Makassar sebanyak 15 orang.

##### ***D. Teknik Sampel***

Teknik sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yang di dasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang di buat oleh peneliti. Pengambilan secara *purposive sampling* ini bertujuan untk mendapatkan sampel penelitian yang memiliki

karakteristik tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan valid ( Notoadmodjo, 2002).

*Kriteria Inklusi :*

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan di teliti ( Azis, 2008). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bersedia menjadi responden
- 2) Anggota UKM bulutangkis UIN Alauddin Makassar
- 3) Anggota yang berusia 18-25 tahun
- 4) Responden berjenis kelamin laki-laki
- 5) Bersedia mengikuti prosedur penelitian
- 6) Tidak ada riwayat penyakit

*Kriteria eksklusi :*

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Anggota yang tidak bersedia diukur VO<sub>2</sub> max, tekanan darah, dan kadar hemoglobin.
- 2) Anggota yang tidak bersedia sebagai responden

**E. Metode Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran secara langsung oleh peneliti. Adapun data yang di gunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu hasil pengukuran VO2 max, tekanan darah, dan kadar hemoglobin dari para responden.

2. Data sekunder

Tidak menggunakan data sekunder.

### ***F. Instrument penelitian***

Instrument yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi, tensi dan alat ukur kadar hemoglobin. Berisi identitas responden, hasil pengukuran VO2 max, tekanan darah dan kadar hemoglobin untuk mendapatkan informasi dari responden. Hasil pengukuran VO2 max, tekanan darah, dan kadar hemoglobin di ukur dilembar observasi yang telah tersedia Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Langkah-langkah yang di ambil dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Editing

Setelah data terkumpul di lakukan pengeditan yaitu dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data dan keseragaman data yang di peroleh dari hasil observasi langsung pengukuran tekanan darah seluruh responden pada saat melakukan aktivitas olahraga bulutangkis.

- b. Koding

Untuk memudahkan pengolahan data, semua data perlu di sederhanakan dengan member symbol-simbol tertentu untuk setiap pengkodean pada seluruh hasil pengukuran.

c. Tabulasi data

Setelah di lakukan editing dan koding dilanjutkan dengan mengelompokkan data kedalam table menurut sifat-sifat yang di miliki data sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisa data

Analisa data yang di gunakan adalah analisa data deskriptif yang merupakan salah satu jenis analisis kuantitatif. Dalam hal ini dapat di peroleh hubungan suatu system serta perkembangan variable-variabel yang di teliti. Mendeskripsikan masing-masing variable yang di teliti meliputi tekanan darah pada saat melakukan aktivitas latihan bulutangkis.

**G. Etika Penelitian**

Penelitian ini berpedoman pada norma dan etika penelitian yaitu dengan:

1. Informed consent

Peneliti memberikan lembar permohonan menjadi responden dan persetujuan menjadi responden pada mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jika responden bersedia diteliti maka mendatangi lembar persetujuan. Jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya.

1. Anonymity

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data. Lembar tersebut hanya diberi nomor kode tertentu.

## 2. Safety

Keamanan responden sangat diperhatikan saat dilakukan penelitian, seperti pada pemeriksaan golongan darah. Tindakan invasif semacam ini perlu dilakukan teknik aseptik secara tepat seperti penggunaan alkohol 70% ketika akan melakukan pemeriksaan golongan darah. Hal ini dilakukan untuk melindungi jiwa responden dari infeksi dan berbagai penularan penyakit.

## 3. Privacy

Menjaga *privacy* responden sangat diperhatikan saat dilakukan penelitian, seperti pada pemeriksaan tekanan darah hasil dari responden di jaga kerahasiaannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

Hasil penelitian ini telah dilakukan pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan jumlah sampel 15 orang dengan jenis kelamin laki-laki yang merupakan anggota UKM Bulutangkis UIN Alauddin Makassar.

Penelitian dilaksanakan di lapangan bulu tangkis kampus II UIN Alauddin yang terletak di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa. Penelitian dilaksanakan selama 3 minggu pada tanggal 17 Mei 2015 sampai 6 Juni 2015, penelitian dilakukan pada setiap pukul 19.00- 21.00 WITA setiap minggunya. Pada waktu penelitian, jumlah total sampel yang menghadiri sebanyak 15 orang dengan kisaran umur 18-25 tahun

#### **1. Deskripsi Variabel**

Deskripsi variabel akan disajikan dalam bentuk tabel, data tersebut akan memberikan informasi tentang: distribusi responden berdasarkan perubahan tingkat VO<sub>2</sub> max, Tekanan darah serta kadar Hb *Pre-Test* dan *Post-Test*. Grafik perubahan VO<sub>2</sub> max, Tekanan darah serta kadar Hb *Pre-Test* dan *Post-Test*, serta standar Deviasi dan Nilai Rata-rata Tanda-tanda Vital *Pre-Test* dan *Post-Test*.

##### a. Distribusi Responden berdasarkan Tingkat VO<sub>2</sub> max

Berdasarkan tabel 4.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan tingkat VO<sub>2</sub> max baik pada saat *pre test* maupun saat *post test*. Saat *pre test* responden cenderung memiliki nilai VO<sub>2</sub> max diatas rata-rata dengan jumlah responden sebanyak 5 orang (33,3%), kemudian terbanyak ke2 adalah VO<sub>2</sub> max baik yaitu 4 orang (26,6%), selanjutnya nilai dibawah rata-rata 3 orang (20%), nilai sangat baik 2 orang (13,3%), nilai kurang 1 orang (6,6%) sedangkan nilai VO<sub>2</sub> max rata-rata dan sangat kurang tidak ada responden yang memiliki.

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden berdasarkan Tingkat VO2 max**

Pengukuran	Hasil	N	%
<i>Pre Test</i>	Sangat baik	2	13,3
	Baik	4	26,6
	Diatas rata-rata	5	33,3
	Rata-rata	0	0
	Dibawah rata-rata	3	20
	Kurang	1	6,6
	sangat kurang	0	0
<i>Post Test</i>	Sangat baik	4	26,6
	Baik	7	46,6
	Diatas rata-rata	2	13,3
	Rata-rata	2	13,3
	Dibawah rata-rata	0	0
	Kurang	0	0
	sangat kurang	0	0
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer 2015

Adapun saat *post test* responden cenderung memiliki nilai VO2 max yang baik dengan jumlah responden sebanyak 7 orang (46,6%), nilai sangat baik 4 orang (26,6%) sedangkan nilai VO2 max diatas rata-rata dan rata-rata masing-masing 2 orang (13,3%) sedangkan nilai VO2 max dibawah rata-rata, kurang dan sangat kurang tidak ada responden yang memilikinya.

## b. Distribusi Responden berdasarkan Tekanan Darah

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden berdasarkan Tekanan Darah**

Klasifikasi	Sistolik				Diastolik			
	<i>Pre Test</i>		<i>Post Test</i>		<i>Pre Test</i>		<i>Post Test</i>	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Normal	3	20	4	26,6	10	66,4	12	80
Pre Hipertensi	9	60	11	73,4	3	20	3	20
HT Stadium I	3	20	0	0	2	13,3	0	0
HT Stadium II	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer 2015

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan tekanan darah baik sistol maupun diastol saat *pre test* maupun *post test*. Tekanan darah sistol pada saat *pre test* responden cenderung dalam klasifikasi Pre Hipertensi sebanyak 9 orang (60%), sedangkan responden dengan klasifikasi normal dan HT stadium I masing-masing 3 orang (20%), dan tidak ada responden dengan HT Stadium II, kemudian saat *post test* responden memiliki klasifikasi normal meningkat menjadi 4 orang (26,6%) begitupula klasifikasi Pre Hipertensi menjadi 11 orang (73,4%) sedangkan klasifikasi HT stadium I dan II tidak dimiliki oleh responden saat *post test*. adapun nilai Tekanan darah Diastol terbanyak pada klasifikasi normal baik saat *pre test* (10 orang/ 66,4%) maupun saat *post test* (12 orang/ 80% dan sisanya 3 orang/ 20% pada kelompok pre Hipertensi).

## c. Distribusi Responden berdasarkan Kadar Hemoglobin

Tabel 4.3

Distribusi Responden berdasarkan Kadar Hemoglobin


Pengukuran HB	Tingkat HB	N	%
<i>Pre Test</i>	Rendah	15	100
	Normal	0	0
<i>Post Test</i>	Rendah	10	66,6
	Normal	5	33,4
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer 2015

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi responden berdasarkan kadar Hemoglobin baik saat *pre test* maupun saat *post test* yaitu responden memiliki 2 kategori Hemoglobin yaitu Hemoglobin pada batas rendah dan batas Normal. Saat *pre test* semua respon memiliki kadar HB yang rendah (100%) sedangkan setelah *post test* kadar HB responden didapatkan bahwa 5 orang mengalami peningkatan ke batas normal sebanyak 33,4% sedangkan 10 orang (66,6%) selebihnya masih dalam batas HB rendah.

## d. Grafik Perubahan Tingkat VO2 max


**Grafik 4.1**  
**Grafik VO2 max- YMCA step test 3 minute**



Sumber: data primer 2015

Berdasarkan Grafik 4.1 tentang grafik perubahan tingkat VO2 max pada responden saat *pre test* dan *post test*, nilai VO2 max responden saat *pre test* rata-rata nilainya adalah 90,4 yaitu berada pada tingkat diatas rata-rata, sedangkan ketika *post test* yaitu nilai rata-rata didapat 80 yaitu pada tingkat VO2 max Baik, nilai *post test* responden didapatkan 1 menit setelah *recovery* sehingga penurunan VO2 max terjadi dari *pre test* ke *post test* sebesar 10,4 yang menyebabkan tingkat VO2 max dengan nilai diatas rata-rata saat *pre test* berubah menjadi nilai VO2 max baik setelah *post test*.


## e. Grafik Perubahan Tekanan Darah (Sistolik)



Sumber: data primer 2015

Berdasarkan grafik 4.2 tentang grafik tekanan darah sistol pada responden baik *pre test* maupun *post test*. rata-rata nilai *pre test* yaitu 129,13 mmHg yaitu pada klasifikasi Pre Hipertensi, sedangkan rata-rata *post test* yaitu 124,53 mmHg yaitu berada pada klasifikasi Pre Hipertensi. Walaupun saat *pre test* dan saat *post test* masih berada pada klasifikasi Pre Hipertensi namun antara *Pre test* dan *post test* terjadi penurunan sebesar 5,4 mmHg.

## f. Grafik Perubahan Tekanan Darah (Diastolik)




Sumber: data Primer 2015

Berdasarkan grafik 4.3 tentang grafik tekanan darah diastol pada responden baik *pre test* maupun *post test*. rata-rata nilai *pre test* yaitu 76,47 mmHg yaitu pada klasifikasi Normal, sedangkan rata-rata *post test* yaitu 72,60 mmHg yaitu berada pada klasifikasi normal. Saat *pre test* dan saat *post test* masih berada pada klasifikasi normal sehingga antara *Pre test* dan *post test* terjadi penurunan sebesar 3,87 mmHg.

## g. Grafik Perubahan Kadar Hemoglobin

**Grafik 4.4**  
**Grafik Kadar Hemoglobin**



Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan grafik 4.3 tentang grafik Hemoglobin pada responden baik *pre test* maupun *post test*. rata-rata nilai *pre test* yaitu 11,67 mg/dl yaitu pada kadar Hb rendah, sedangkan rata-rata *post test* yaitu 13,27 mg/dl yaitu berada pada kadar rendah pula. Saat *pre test* dan saat *post test* masih berada pada kadar normal namun antara *Pre test* dan *post test* terjadi peningkatan sebesar 1,6 mg/dl.

- h. Standar Deviasi dan Nilai Rata-rata Variabel saat *Pre- test* dan *Post- test*

**Tabel 4.4**  
**Standar Deviasi dan Nilai Rata-rata Variabel saat *Pre- testn* dan *Post- test***

Variabel	Pre test	Post Test
	Mean±SD	Mean±SD
Vo2 max	90,4±12,9	80±9,6
TD Sistole (mmHg)	129,1±13,8	124,5±9,7
TD Diastole (mmHg)	76,4±11,7	72,6±8,3
Hb (mg/dl)	11,6±1,4	13,2±0,6

Sumber: Data Primer 2015

## 2. Uji Normalitas

**Tabel 4.5**  
**Hasil uji normalitas dengan *shapiro wilk***

Variabel	<i>P value</i>	Kesimpulan
Vo2 max	0,307	Normal
TD Sistol	0,817	Normal
TD Diastol	0,130	Normal
Hemoglobin	0,616	Normal

Sumber: data primer 2015

Untuk mengetahui normalitas distribusi data penelitian variabelmaka digunakan uji normalitas *Shapiro-Wilk* (Dahlan, MS, 2013). Pada uji Normalitas *Shapiro-Wilk* dengan jumlah responden 15 orang data menunjukkan nilai  $>0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data variabel adalah normal. Karena data terdistribusi normal, maka analisis yang digunakan adalah analisis parametrik, yaitu *paired t test*.

**3. Uji Hipotesis:** Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Latihan Bulu Tangkis) dengan variabel dependen (Vo2 max, Tekanan darah dan kadar Hb) ditunjukkan dengan nilai  $p < 0,05$ .

a. Perubahan terhadap tingkat VO2 max

**Tabel 4.6**  
**Perubahan terhadap tingkat VO2 max**

Perlakuan	perbedaan rerata (CI 95%)		t hitung	Correlation/ sig.	P value*
	Lower	Upper			
Pre est					
Post test	3,306	17,494	3,144	0,384/ 0,011	0,002

\*Uji *paired t test*

Untuk mengetahui Perubahan terhadap tingkat VO2 max dengan diberikan YMCA *step test* dilakukan uji *Paired Sampel t test* dengan menggunakan program SPSS 20, dalam tabel 4.6, nilai *corelation* adalah  $0,011 < 0,05$  menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pasangan data, jika r dikuadratkan maka akan menunjukkan bahwa sumbangan latihan bulutangkis terhadap tingkat VO2 max adalah  $0,384^2 = 0,15$  (15%), hasil *Confidence interval* (CI) menunjukkan wilayah adanya perbedaan kemandirian pada taraf kepercayaan 95%, sedangkan rentang selisih Tingkat VO2 max sebelum dan setelah intervensi dari 3,306 sampai 17,494. Nilai t didapat yaitu - 3,144 berdasarkan ketentuan  $> 1,96$  berarti terdapat kemandirian yang diterima pada taraf 95%. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t test* yaitu *p value*  $0,002 < (\alpha = 0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak berarti latihan bulutangkis berpengaruh terhadap tingkat kebugaran (VO2 max).

b. Perubahan terhadap tekanan darah sistol

**Tabel 4.7**  
**Perubahan terhadap Tekanan Darah (Sistol)**

Perlakuan	perbedaan rerata (CI 95%)		t hitung	Correlation/sig.	P value*
	Lower	Upper			
Pre test					
	1,626	10,826	1,985	0,596/ 0,014	0,004
Post test					

\*Uji *paired t test*

Untuk mengetahui Perubahan terhadap TD sistol dengan diberikan YMCA *step test* dilakukan uji *Paired Sampel t test* dengan menggunakan program SPSS 20, dalam tabel 4.7, nilai *corelation* adalah  $0,014 < 0,05$  menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pasangan data, jika r dikuadratkan maka akan menunjukkan bahwa sumbangan latihan bulutangkis terhadap tingkat VO2 max adalah  $0,596^2 = 0,35$  (35%), hasil *Confidence interval* (CI) menunjukkan wilayah adanya perbedaan kemandirian pada taraf kepercayaan 95%, sedangkan rentang selisih tekanan darah sistol sebelum dan setelah intervensi dari 1,626 sampai 10,826. Nilai t didapat yaitu 1,985 berdasarkan ketentuan  $> 1,96$  berarti terdapat kemandirian yang diterima pada taraf 95%. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t test* yaitu *p value*  $0,004 < (\alpha = 0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak berarti latihan bulutangkis berpengaruh terhadap tingkat kebugaran (Tekanan darah sistol).

c. Perubahan terhadap tekanan darah diastol

**Tabel 4.8**  
**Perubahan terhadap Tekanan darah diastol**

Perlakuan	perbedaan rerata (CI 95%)		t hitung	Correlation/ sig.	P value*
	Lower	Upper			
Pre est					
Post test	3,338	11,072	1,971	0,471/ 0,005	0,002

\*Uji *paired t test*

Untuk mengetahui Perubahan terhadap tekanan darah diastol dengan diberikan YMCA *step test* dilakukan uji *Paired Sampel t test* dengan menggunakan program SPSS 20, dalam tabel 4.6, nilai *corelation* adalah  $0,005 < 0,05$  menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pasangan data, jika r dikuadratkan maka akan menunjukkan bahwa sumbangan latihan bulutangkis terhadap tingkat VO<sub>2</sub> max adalah  $0,471^2 = 0,22$  (22%), hasil *Confidence interval* (CI) menunjukkan wilayah adanya perbedaan kemandirian pada taraf kepercayaan 95%, sedangkan rentang selisih Tekanan darah diastol sebelum dan setelah intervensi dari 3,338 sampai 11,072. Nilai t didapat yaitu 1,971 berdasarkan ketentuan  $> 1,96$  berarti terdapat kemandirian yang diterima pada taraf 95%. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t test* yaitu *p value*  $0,002 < (\alpha = 0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa *H<sub>0</sub>* ditolak berarti latihan bulutangkis berpengaruh terhadap tingkat kebugaran (tekanan darah diastolik).

## d. Perubahan terhadap kadar Hemoglobin

**Tabel 4.9**  
**Perubahan terhadap Kadar hemoglobin**

Perlakuan	perbedaan rerata (CI 95%)		t hitung	Correlation/ sig.	P value*
	Lower	Upper			
Pre est	-2,287	0,926	5,065	0,538/0,003	0,000
Post test					

\*Uji *paired t test*

Untuk mengetahui Perubahan terhadap kadar Hemoglobin dengan diberikan YMCA *step test* dilakukan uji *Paired Sampel t test* dengan menggunakan program SPSS 20, dalam tabel 4.6, nilai *corelation* adalah  $0,003 < 0,05$  menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pasangan data, jika r dikuadratkan maka akan menunjukkan bahwa sumbangan latihan bulutangkis terhadap tingkat VO2 max adalah  $0,538^2 = 0,29$  (29%), hasil *Confidence interval* (CI) menunjukkan wilayah adanya perbedaan kemandirian pada taraf kepercayaan 95%, sedangkan rentang selisih kadar Hb sebelum dan setelah intervensi dari -2,287 sampai 0,926. Nilai t didapat yaitu -5,065 berdasarkan ketentuan  $> 1,96$  berarti terdapat kemandirian yang diterima pada taraf 95%. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t test* yaitu *p value*  $0,000 < (\alpha = 0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak berarti latihan bulutangkis berpengaruh terhadap tingkat kebugaran (kadar Hemoglobin).

e. Pengaruh Latihan Bulutangkis terhadap tingkat kebugaran dependen (Vo2 max, Tekanan darah dan kadar Hb)

**Tabel 4.10**  
Pengaruh Latihan Bulutangkis terhadap tingkat kebugaran dependen (Vo2 max, Tekanan darah dan kadar Hb)

TTV	Latihan	Rata-rata TTV	Rata-rata Perubahan	P Value
Vo2 max	<i>Pre test</i>	90,4		
	<i>Post test</i>	80	10,4	0.002
TD Sistole(mmHg)	<i>Pre test</i>	129,3		
	<i>Post test</i>	124,53	5,4	0.004
TD Diastole(mmHg)	<i>Pre test</i>	76,47		
	<i>Post test</i>	72,66	3,87	0.002
Hb (mg/dl)	<i>Pre test</i>	11,67		
	<i>Post test</i>	13,27	1,6	0.000

Sumber: Uji *Paired t test*

Setelah dilakukan analisis dengan *paired t test* setelah dilakukan latihan bulutangkis selama 3 minggu dengan frekuensi latihan sebanyak 12 kali maka didapatkan hasil yaitu: perubahan terhadap Vo2 max yaitu rata-rata perubahan yaitu 10,4 dengan hasil analisis *p value* 0,002, perubahan terhadap Tekanan darah sistolik sebesar 5,4 dengan *p value* 0,004, perubahan terhadap Tekanan darah diastole sebesar 3,8 dengan *p value* 0,002 sedangkan perubahan pada kadar Hemoglobin sebesar 1,6 dengan *p value* 0,000. Adapun perubahan secara kuantitas paling besar terjadi pada Vo2 max sedangkan secara statistik perubahan signifikan terjadi pada kadar hemoglobin, dibuktikan dengan nilai *p value* terkecil (0,000).

## **B. Pembahasan**

Kebugaran dapat memperpanjang hidup seseorang. Kebugaran dapat diukur dengan YMCA *step test* (*Young men's christian Association*) (Nathalia, 2009). Untuk menilai tingkat kebugaran dengan YMCA *step test* (*Young men's christian Association*) maka seseorang harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang, karena dapat meningkatkan kebugaraan, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot (Abd Halim, dkk. 2011). Berbagai aktivitas olahraga yang dilakukan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik sumber daya manusia, terutama apabila dilakukan secara benar dan teratur. Latihan olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur dengan intensitas latihan ringan sampai sedang dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran tubuh dan kekebalan tubuh (Siti, 2013). Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa aktivitas fisik seperti olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, sehingga peneliti tertantang untuk meneliti tentang pengaruh bulutangkis terhadap tingkat kebugaran yang meliputi VO<sub>2</sub> max, Tekanan darah serta kadar Hemoglobin.

Secara teori, nilai VO<sub>2</sub> Max dibatasi oleh cardiac output, kemampuan sistem respirasi untuk mengantarkan oksigen ke darah, atau kemampuan otot untuk menggunakan oksigen. Dengan begitu, VO<sub>2</sub> max pun menjadi batasan kemampuan aerobik, dan oleh sebab itu dianggap sebagai parameter terbaik untuk mengukur kemampuan aerobik (atau kardiorespirasi) seseorang. VO<sub>2</sub> max merupakan nilai tertinggi dimana seseorang dapat mengkonsumsi oksigen selama latihan, serta merupakan refleksi dari unsur kardiorespirasi dan hematologi dari pengantaran

oksigen dan mekanisme oksidatif otot (Adhikarmika,2009). Menurut (Rowland M.D 1996 dalam Muizzah, 2013), pengukuran VO<sub>2</sub> max dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes maksimal dan submaksimal. Pada tes maksimal, VO<sub>2</sub> max diukur pada kondisi kelelahan maksimal selama melakukan beban aktivitas fisik sehingga sistem kardiorespirasi memang benar-benar sedang mengalami VO<sub>2</sub> max (menggunakan oksigen secara maksimal) sementara itu, tes submaksimal VO<sub>2</sub> max dilakukan dengan pengukuran saat sebelum mencapai kondisi kelelahan maksimum karena individu seperti anak-anak atau usia lanjut akan menghentikan beban latihan fisik saat mereka merasa lelah walaupun belum pada kelelahan maksimal, sehingga penelitian ini dilakukan pada laki-laki dengan tingkat umur 18-25 tahun karena menurut (Siti, 2013), Ketahanan kardiorespirasi pada laki-laki mencapai puncaknya pada umur 18-25 tahun bersamaan dengan puncak massa otot.

Dalam penelitian ini, untuk menjaga homogenitas sampel penelitian, maka peneliti menyeleksi calon responden dengan hanya mengambil para pemain yang baru bergabung dalam tim bulutangkis, selain dari pada itu pada penelitian ini didapatkan responden mengalami Hipertensi stadium II, sehingga peneliti mengontrol pola hidup yang dapat mempengaruhi tekanan darah semua responden seperti status gizi, kualitas tidur, minuman berkafein, rokok maupun obat-obatan selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian dari tingkat kebugaran responden dari hasil *pre test* yaitu tingkat VO<sub>2</sub> max nilai sangat baik 2 orang, baik 4 orang, diatas rata-rata 5 orang, dibawah rata-rata 3 orang dan kurang 1 orang. Tingkat tekanan darah yaitu klasifikasi

normal tekanan darah sistol 3 orang dan diastol 10 orang, pre Hipertensi pada sistol 9 orang sedangkan diastol 3 orang kemudian Hipertensi stadium I sistol 3 orang dan diastol tidak ada responden yang memiliki. Adapun kadar Hemoglobin yaitu semua responden berada pada tingkat Hb rendah.

Setelah diberikan latihan sebanyak 12 kali hasil pemeriksaan yaitu tingkat VO<sub>2</sub> max nilai sangat baik 4 orang, baik 7 orang, diatas rata-rata dan rata-rata 2 orang. Tingkat tekanan darah yaitu klasifikasi normal tekanan darah sistol 4 orang dan diastol 12 orang, pre Hipertensi pada sistol 11 orang sedangkan diastol 3 orang kemudian Hipertensi stadium I dan II tidak ada responden yang memiliki. Adapun kadar Hemoglobin yaitu responden yang berada pada tingkat Hb rendah 10 orang sedangkan tingkat Hb normal 5 orang.

Kebugaran adalah serangkaian karakteristik fisik yang dimiliki atau dicapai seseorang yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Seseorang yang bugar mampu menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa batas daya tahan stress pada tubuh dan memiliki tubuh yang sehat serta tidak berisiko mengalami penyakit yang disebabkan rendahnya tingkat kebugaran atau kurangnya aktivitas (Siti, 2013). Keseriusan mengikuti latihan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penelitian ini, adapun responden dalam penelitian ini.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh latihan bulutangkis terhadap tingkat kebugaran yang dinilai dengan YMCA *step test* maka dilakukan uji *paired t test* yang sebelumnya telah diuji normalitas dengan uji *shapiro wilk* dan membandingkan antara hasil *pre test* dan hasil *post test*.

Setelah dilakukan uji *Paired t test* didapatkan hasil sebagai berikut: Perubahan terhadap VO2 max: setelah dilakukan latihan selama 3 minggu didapatkan *p value* sebesar 0,002  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh latihan bulutangkis secara signifikan. Adapun rata-rata tingkat VO2 max *pre test* sebesar 90,4 dan *post test* adalah 80 dengan rata-rata perubahan yang diberikan adalah sebesar 10,4. Perubahan terhadap Tekanan Darah yaitu Sistole: didapatkan *p value* sebesar 0,004  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh latihan bulutangkis secara signifikan. Adapun rata-rata sistol *pre test* sebesar 129,3 dan *post test* adalah 124,53 dengan rata-rata perubahan yang diberikan adalah sebesar 5,4, sedangkan Diastol didapatkan *p value* sebesar 0,002  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh latihan bulutangkis secara signifikan. Adapun rata-rata diastol *pre test* sebesar 76,47 dan *post test* adalah 72,66 dengan rata-rata perubahan yang diberikan adalah sebesar 3,87. Adapun Perubahan terhadap kadar Hemoglobin: didapatkan *p value* sebesar 0,000  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh latihan bulutangkis secara signifikan. Adapun rata-rata kadar Hb *pre test* sebesar 11,67 mg.dl dan *post test* adalah 13,27 mg.dl dengan rata-rata perubahan yang diberikan adalah sebesar 1,6 mg.dl.

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat perubahan yang signifikan pada VO2 max, tekanan darah maupun kadar hemoglobin. Karena penelitian ini hanya bersifat empirik, sehingga peneliti berasumsi bahwa perubahan tersebut tidak terlepas dari bagaimana peneliti menjaga homogenitas responden yang hanya dilakukan pada kelompok laki-laki dengan umur yang sama yaitu 18-25 tahun serta kriteria inklusi lainnya sehingga didapatkan hasil yang signifikan dengan pengaruh yang kuat serta

waktu latihan yang cukup representatif selama 3 minggu dalam 12 kali latihan yang dapat menyebabkan perubahan pada fisiologis tubuh terutama kebugaran tubuh.

Olahraga atau aktivitas fisik mempunyai kecenderungan memberikan beban kerja yang lebih pada tubuh. Bila beban ini diberikan terus menerus pada tubuh, maka berbagai sistem dalam tubuh akan mengalami perubahan untuk bekerja lebih efisien dibawah tambahan beban tersebut. Beberapa sistem organ yang terlibat adalah sistem respiratori, sistem kardiovaskular, endokrin, dan sistem neuromuskular (Katch, 2011). Saat berolahraga, berbagai mekanisme kardiovaskuler dan pernapasan harus bekerja secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan  $O_2$  jaringan aktif dan mengeluarkan  $CO_2$  beserta panas selama melakukan aktivitas tersebut. Pengambilan  $O_2$  dari darah ke otot yang bekerja akan meningkat, dan ventilasi juga meningkat sehingga jumlah  $O_2$  tambahan akan tersedia, dan sebagian panas serta kelebihan  $CO_2$  dikeluarkan (Ganong, 2008).

Kemampuan kebugaran yang paling penting dan berhubungan langsung dan utama dengan kesehatan adalah daya tahan kardiorespirasi (Fatma, 2011). Daya tahan kardiorespirasi yang tinggi menunjukkan kemampuan bekerja yang tinggi, yang berarti kemampuan untuk mengeluarkan sejumlah energi yang cukup besar dalam periode waktu yang lama. Beberapa prosedur pengukuran kebugaran dapat digunakan. Pengukuran kebugaran yang paling tepat dan sesuai untuk digunakan pada jumlah sampel yang banyak adalah jenis pengukuran dengan tes naik-turun bangku (*step test*). Pengukuran ini didasarkan pada denyut nadi saat atau segera setelah melakukan aktivitas berupa naik turun bangku yang tata caranya telah distandarisasi.

*YMCA 3-minute step test* memiliki waktu paling singkat dan perhitungan paling sederhana dan memiliki tinggi bangku 30 cm sehingga cocok untuk tes yang dilakukan secara massal (Nieman, 2007 dalam Muizzah, 2013), karena hal tersebut maka *YMCA 3-minute step test* sangat proporsional untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia dengan bentuk tubuh yang lebih kecil dibanding dengan masyarakat diluar negeri yang biasa menggunakan bangku Harvard dengan tinggi bangku 50 cm.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa tingkat kebugaran mengalami perubahan baik  $VO_2$  max, tekanan darah sistol dan diastol serta kadar hemoglobin pada frekuensi latihan sebanyak 12 kali latihan. Tubuh manusia merupakan suatu mekanisme yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut (Herman, 2010), Olahraga menurunkan frekuensi jantung, dengan penurunan frekuensi jantung, maka jantung mempunyai cadangan denyut jantung (Heart Rate Reserve) lebih tinggi. Penurunan frekuensi jantung disebabkan oleh peningkatan tonus saraf parasimpatis, penurunan saraf simpatis atau kombinasi keduanya. Juga terjadi penurunan dari frekuensi pengeluaran impuls dari paru jantung.

Begitu juga dengan hasil tentang perubahan tekanan darah. Tekanan darah dikontrol oleh berbagai proses fisiologis yang berkerja bersamaan, serangkaian mekanisme inilah yang memastikan darah mengalir di sirkulasi dan memungkinkan jaringan mendapatkan nutrisi agar dapat berfungsi dengan baik. Jika salah satu mekanisme mengalami gangguan, maka dapat terjadi tekanan darah tinggi (Palmer & Williams, 2005). Tekanan darah diatur oleh serangkaian saraf otonom dan hormon yang memonitor volume darah dalam sirkulasi, diameter pembuluh darah, dan

kontraksi jantung. Setiap faktor ini secara intrinsik berkaitan erat dengan pengaturan tekanan darah di dalam pembuluh darah (Palmer & Williams, 2005). Nilai pembuluh darah bergantung pada kekuatan kontraksi jantung, diameter pembuluh darah, dan volume darah di dalam sirkulasi. Mekanisme kerjanya mirip dengan tekanan air keluar dari selang. Anda dapat meningkatkan kekuatan air dengan memutar air kram lebih besar (sama dengan membuat jantung berkontraksi lebih kuat dan lebih cepat) atau dengan menekan ujung selang dan meningkatkan tekanan selang (sama dengan pembuluh darah yang menyempit dan berkontraksi) (Palmer & Williams, 2005).

Olahraga yang dilakukan dengan teratur, bermanfaat untuk membakar kalori, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi otot, meningkatkan kekebalan tubuh, membuat denyut jantung menjadi sebuah pompa yang lebih efisien sehingga jantung tidak perlu bekerja keras, jumlah volume darah bertambah sehingga tubuh dapat lebih maksimal untuk menyalurkan oksigen sehingga seseorang akan mempunyai daya tahan yang lebih kuat bila berhadapan dengan kegiatan fisik yang berat, kapasitas paru-paru bertambah sehingga frekuensi nafas tidak perlu terlalu cepat dan otot jantung akan lebih kuat serta dapat lebih baik dalam menyalurkan darah. Olahraga dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, dengan berolahraga secara teratur akan menyebabkan otot polos di pembuluh-pembuluh darah akan lebih *relaxed* dan berdilatasi sehingga *TPR (Total Peripheral Resistance)* menurun. Maka dari itu, sering dijumpai tekanan darah pada orang yang rutin melakukan olahraga lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang/tidak melakukan olahraga (Herman, 2010).

Hasil yang mengalami perubahan juga terlihat pada kadar Hemoglobin. Menurut (Herman, 2010), Kemampuan mengangkut oksigen tergantung dari jumlah hemoglobin dan jumlah darah. Apabila hemoglobin meningkat, maka kemampuan mengikat oksigen juga meningkat. Namun peningkatan hemoglobin akan menyebabkan viskositas darah meningkat sehingga akan menyebabkan meningkatnya tekanan dalam pembuluh darah yang berakibat kapasitas mengangkut oksigen justru menurun. Oksigen disalurkan melalui sel darah merah dan hemoglobin. Kita telah mengetahui bahwa kebugaran aerobik sangat berkaitan dengan total hemoglobin dan hemoglobin meningkat dengan latihan (Herman, 2010). Penelitian ini hanya bersifat empirik sehingga menurut peneliti, perubahan yang signifikan pada kadar hemoglobin terjadi karena hemoglobin mengikat oksigen keseluruhan tubuh. Latihan olahraga seperti halnya dengan bulutangkis menyebabkan perfusi ginjal menurun menyebabkan suplai oksigen menurun sehingga sel-sel tertentu pada ginjal menyebabkan keluarnya hormon eritropoetin supaya suplai oksigen dapat meningkat.

Apabila badan kuat dan gerakannya lincah maka akal bertambah kuat dan bertambah rajin serta berkurang penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN  
حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Artinya:

M A K A S S A R

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” Hadits dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* (no. 3289).

Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashash/28: 26.



Terjemahnya:

*"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Olahraga menyebabkan terpenuhinya kebutuhan terhadap obat yang dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi orang yang tidak pernah olahraga. Akan tetapi seorang hamba seharusnya tidak menjadikan olahraga badan sebagai tujuannya dan maksud utama sehingga menghabiskan waktunya dan hilangnya tujuan yang bermanfaat baik bagi agama dan dunianya, sehingga dia merugi dengan kerugian yang besar sebagaimana kebanyakan orang yang tidak punya tujuan mulia, akan tetapi tujuan mereka hanya mengikuti binatang saja, dan tujuan seperti ini sangat hina dan tidak akan membekas.

Sudah lama dikenal tentang manfaat olahraga terhadap kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan efek fisiologis terhadap tubuh. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Alim Abdul, Cerika Rismayanthi 2011) menyebutkan bahwa ada peningkatan yang signifikan ( $p < 0,05$ ) daya tahan kardiorespirasi setelah mengikuti latihan aerobik 3 kali seminggu secara teratur. Pengaruh latihan terprogram terhadap pembuluh darah adalah: pembuluh darah akan melebar (vasodilatasi), saraf simpatis dan parasimpatis pembuluh darah akan didekatnya, panas tubuh akan melebarkan

pembuluh darah, dan elastisitas dinding pembuluh darah yang baik (khususnya pada olahraga yang bersifat aerobik) terjadi pada tubuh. *The American College of Sport Medicine (ACSM)* telah menerbitkan pedoman aktivitas fisik untuk Amerika. ACSM merekomendasikan bahwa orang dewasa sehat berpartisipasi dalam latihan moderat 30 menit sehari, lima hari seminggu, atau melakukan olahraga berat 20 menit sehari, 3 hari seminggu dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyakit kronis. ACSM merekomendasikan berolahraga 40%/50% - 85% dari  $VO_2$  max atau 64%/70% - 94% dari  $Hr_{max}$  untuk membakar 300 kalori setiap satu sesi latihan untuk meningkatkan dan atau menjaga kebugaran kardiovaskular (Mary, 2012).

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh (Alim Abdul, Cerika Rismayanthi 2011) menyebutkan bahwa ada peningkatan yang signifikan ( $p < 0,05$ ) daya tahan kardiorespirasi setelah mengikuti latihan aerobik 3 kali seminggu secara teratur. Pengaruh latihan terprogram terhadap pembuluh darah adalah: pembuluh darah akan melebar (vasodilatasi), saraf simpatis dan parasimpatis pembuluh darah akan didekatnya, panas tubuh akan melebarkan pembuluh darah, dan elastisitas dinding pembuluh darah yang baik (khususnya pada olahraga yang bersifat aerobik) terjadi pada tubuh, sedangkan menurut laporan dari *Joint National Committee 7<sup>th</sup> edition* bahwa Modifikasi gaya hidup terbukti menurunkan tekanan darah meliputi penurunan berat badan pada orang-orang yang berat badan lebih atau obesitas, adopsi pendekatan diet dan aktivitas fisik seperti olahraga.

Menurut Sharkley (2011), aktivitas secara teratur dapat mengurangi beban kerja jantung sehingga lebih efisien yang outputnya akan menghasilkan kebugaran terutama pada kardiorespirasinya. Kemudian hasil penelitian Sassen, dkk (2010),

pada 1298 responden berumur 18-62 tahun pada staf kantor *Utrecht Police Lifestyle Intervention Fitness and Training* (UP-LIPI) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kebugaran dengan kebiasaan beraktivitas ( $r=0,018$ ).

Aktivitas fisik berperan dalam proses pembakaran cadangan lemak tubuh. Seseorang yang kurang aktivitas fisik yang menyebabkan penumpukan lemak dalam jaringan tubuh yang berpengaruh terhadap kebugaran. Namun penelitian lain telah membantah bahwa aktivitas berpengaruh terhadap tingkat kebugaran yaitu penelitian Muizzah (2013), menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran dari hasil uji statistik antara aktivitas fisik dengan kebugaran diperoleh *p value* 0,862. Selain itu, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,018 yang menunjukkan data yang tidak terkorelasi.

Akhirnya, penelitian yang dilakukan selama 3 minggu dengan judul “pengaruh latihan bulutangkis terhadap perubahan tingkat kebugaran fisik (VO2 max, tekanan darah, dan kadar hemoglobin)” dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini memberikan gambaran kepada kita semua baik masyarakat maupun mahasiswa sebagai pelopor peningkatan derajat kesehatan khususnya keperawatan UIN Alauddin Makassar secara universal bahwa latihan bulutangkis atau aktivitas fisik pada umum memberi pengaruh yang positif terhadap faal tubuh dan meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani jika dilakukan dengan baik dan benar. Berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak, berbagai macam hambatan selama proses penelitian yang ditemui dalam penelitian ini dapat teratasi dengan baik, banyaknya aktivitas peneliti maupun para responden terkadang menjadi suatu alasan bergesernya sedikit waktu latihan bulutangkis yang telah disepakati, namun masih dalam jadwal latihan yang terjadwal yaitu mulai pukul 19.00-21.00 WITA.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kebugaran sebelum latihan yaitu VO2 max responden kategori Sangat baik 13%, baik 26,6%, diatas rata-rata 33,3%, dibawah rata-rata 20% dan 6,6% kurang. Kemudian pada tingkat tekanan darah yaitu: Klasifikasi normal pada sistol 20%, diastol 66,4%, kategori pre hipertensi sistol 60%, diastol 20%, klasifikasi HT stadium I sistol 20%, diastol 13%. Sedangkan pada kadar Hemoglobi hanya Tingkat HB rendah yaitu 100% .
2. Hasil penelitian setelah dilakukan latihan bulutangkis selama 3 minggu didapatkan hasil VO2 max responden kategori Sangat baik 26,6%, baik 46,6%, diatas rata-rata dan rata-rata masing-masing 13%. Kemudian pada tingkat tekanan darah yaitu Klasifikasi normal sistol 26,6%, diastol 80%. Klasifikasi pre hipertensi sistol 73,4%, diastol 20%, sedangkan pada kadar Hemoglobin yaitu Tingkat HB rendah 66,6%, tingkat HB normal 33,4%.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada latihan bulutangkis dengan penilaian YMCA *step test* terhadap tingkat kebugaran yaitu VO2 max dengan *p value*  $0,002 < 0,05$ , tekanan darah sistol *p value*  $0,004 < 0,05$  sedangkan tekanan darah diastol *p value*  $0,002 < 0,05$  adapun kadar Hemoglobin dengan *p value*  $0,000 < 0,05$ .

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dibuat, beberapa saran dari peneliti terkait pengaruh latihan bulutangkis terhadap tingkat kebugaran (VO<sub>2</sub> max, Tekanan darah dan Kadar Hemoglobin) adalah:

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian selanjutnya, diharapkan menggali lebih dalam mengenai pengaruh bulutangkis sebagai latihan fisik terhadap tingkat kebugaran, dengan jumlah sampel yang lebih besar serta disarankan untuk penelitian berikutnya agar menggunakan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk dijadikan bahan perbandingan dari tanda-tanda vital kedua kelompok tersebut.

### 2. Bagi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menggambarkan bahwa Berolahraga merupakan salah satu alternatif paling efektif dan aman untuk meningkatkan kesehatan, sebab olahraga memiliki multi manfaat antara lain manfaat fisik (meningkatkan komponen kebugaran), manfaat psikis (lebih tahan terhadap *strees*, lebih mampu berkonsentrasi), dan manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana berinteraksi).

### 3. Bagi Insititusi

Institusi terkait diharapkan mampu menanggapi hasil penelitian ini dengan memasukkan metode ini sebagai salah satu prosedur penilaian status kebugaran anggotanya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan

melakukan penilaian pada calon anggota terutama untuk perekrutan anggota baru UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar.



## Daftar Pustaka

- Al- Qur'an dan terjemahannya. 2014. Departemen Agama RI.
- Adhikarmika, Uliyandari. *Pengaruh Latihan Fisik Terprogram Terhadap Perubahan Nilai Konsumsi Oksigen Maksimal (Vo<sub>2</sub>max) Pada Siswi Sekolah Bola Voli Tugu Muda Semarang Usia 11-13 Tahun: Meta-Analisis*, Universitas Diponegoro, 2009.
- Ali yertireh, Haji dan Hashemian, amir. 2013. *The Effect of Occupational Exposure to Lead on Blood Hemoglobin Concentration in Workers of Kermanshah Oil Refinery*. Vol 6. No 19. Diakses tanggal 21 januari 2015
- Alim Abdul, Cerika Rismayanthi 2011. *Pengaruh Olahraga Terprogram Terhadap Tekanan Darah dan Daya Tahan Kardiorespirasi Pada Atlet Pelatda Sleman Cabang Tenis Lapangan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anwar, Saiful dkk. 2013. *Korelasi Kadar Hemoglobin dan Konsumsi Oksigen Maksimal (vo<sub>2</sub>max) Siswa SMAN 1 Pamotan Kabupaten Rembang Bergolongan Darah A, B, Ab, O*.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Baitul Mukarromah, Siti. 2013. *Pengaruh Latihan Aquarobik Terhadap Jumlah Hitung Lekosit Pada Wanita Obesitas Di Kota Semarang*. Volume 3. Edisi 1. Diakses tanggal 10 januari 2015
- Briawan, dodik. 2013. *Anemia : masalah gizi pada remaja wanita*. EGC. Jakarta
- Enggel Bayu Pratama. 2013. "Pengaruh Latihan Dengan Treadmill Terhadap Tekanan Darah Pada Member Wanita Usia 40-50 Tahun di Planet Gym Aerobic dan Fitness Centre Surabaya". Vol 2, nomor 1. Diakses tanggal 11 januari
- Everlyn, pearce. 2009. *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Fatmah. *Gizi Kebugaran dan Olahraga*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Fucharoen, Suthat dan Winichagoon, Pranee. 2002. *Thalassemia and Abnormal Hemoglobin*. 76. Agustus. Diakses tanggal 21 januari 2015.

- Ganong, William F. 2008. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran ed.22*. Jakarta: EGC.
- Hadziq, khairul. 2013. *Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan*. Yrama Widya. Bandung
- Haendra Dwi Anggara, Febby dan Prayitno, Nanang. 2013. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tekanan Darah di Puskesmas Telaga Murni, Cikarang Barat*. Vol. 5. Nomor 1. Diakses tanggal 11 januari 2015
- Heri purwanto. 2006. *Norma Penilaian Kebugaran Jasmani Siswa SD*. Vol 12. No 1. Diakses pada 9 januari 2015
- Herman. 2010. (*Jurnal*) *Pengaruh Latihan Terhadap Fungsi Otot Dan Pernapasan*. Uiversitas Negeri Makassar.
- Hidayat, Aziz Alimul. (2008). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Kahri, ma'ruful. 2012. "pengaruh pendidikan jasmani terhadap kebugaran jasmani, body mass index(bmi), antropometri, motor educability, dalam kaitannya dengan perbedaan lingkungan sosial dan geografis. Vol. 11, nomor 2. Diakses pada 10 jauari 2015
- Katch, V.L., et al. 2011. *Essentials of Exercise Physiology. Ed 4*. USA: Lippincott, Williams & Wilkins.
- Kiswari, rukman. 2014. *Hematologi & transfusi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kurniawati. 2012. *Hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja perawat dan perubahan tekanan darah pada perawat RS Bukit Asam Tanjung Enim*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 1 (0) H. 134-139. <http://www.jikm,unsrri.ac.id> diakses tanggal 24 Juni 2015.
- Leyland, Tony. 2006. *VO2 max : not the gold standard*. Issue 52. Desember. Diakses tanggal 19 januari 2015

- Mary L, Luetngen. 2012. *The Physiological Effects of Participating in a 40-Minute Zumbao Fitness Session*. University of wisconsin-la crosse Graduate studies.
- Mayang Arum, Virra dan Mulyati, Tatik. 2013. *Hubungan intensitas latihan, persen lemak tubuh, dan kadar hemoglobin dengan ketahanan kardiorespirasi atlet sepak bola*. Diakses tanggal 11 januari 2015
- Muhajir. 2014. *pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Muh. Akmal Almy. 2014. "*Perbedaan Pengaruh Circuit Training dan Fartlek Training Terhadap Peningkatan Vo2max dan Indeks Massa Tubuh*". Vol 2. Nomor 1. Diakses pada 9 januari 2015
- Muizza, Lilik. 2013. *Hubungan antara kebugaran dengan status gizi dan latihan fisik pada mahasiswa program studi kesehatan masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26503/1/LILIK%20MUIZZAH-FKIK.pdf> Diakses pada tanggal 19 juni 2015
- Nugroho, sigit. 2007. *Metode latihan sirkuit (circuit training) dalam pembinaan fisik olahraga bulutangkis*. Diakses pada 26 april 2015
- Nursalam.2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- P. Doijad, Vinayak, dkk. 2013. *Effect of Yogic exercises on aerobic capacity (VO2 max)*. vol 6. Diakses tanggal 21 januari 2015
- Pratama Bagus.S, Wahyu.2009. *Pengaruh Latihan Smash dengan Posisi Net Tetap dan Net Berubah terhadap Hasil Latihan Smash Atlet Putra Kelompok Umur 11-15 Tahun pada Klub Bulutangkis (Eksperimen pada Atlet Putra Kelompok Umur 11-15 Tahun Pada Klub Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara)*". Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Diakses tanggal 1 mei 2015
- Ridwan, M. 2009. *Mengenai Lebih Dekat Darah O*. Bandung : Pustaka Widyamara.

Saifuddin, Abdul Bari. (2006). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Santoso, Djoko. 2010. *Membonsai hipertensi*. Jaring pena. Surabaya

Sarwono. 2008. *Kebugaran Jasmani Mahasiswa Hubungannya Dengan Indeks Masa Tubuh dan Kadar Haemoglobin*. Jilid 1. Nomor 2. Diakses tanggal 10 januari 2015

Sassen, Barbara dkk. 2010. *Cardiovascular risk profile: cross secsional analysis of motivational determinant, physical fitness and physical activity*. Biomedical Central Public Health Syatria, Arsdiani. 2006. “pengaruh olahraga terprogram terhadap tekanan darah pada mahasiswa fakutas kedokteran universitas diponegoro yang mengikuti ekstrakurikuler basket”. Artikel karya tulis ilmiah semarang. Diakses tanggal 7 januari 2015.

Sharkley, Brian J. *Kebugaran dan Kesehatan (Terjemah dari Fitness and Helth* oleh Eri Desmarini N). Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Syaifuddin, Muhmmad. 2013. *Olahraga bulutangkis sebagai solusi mengurangi frustasi bagi kalnagan pengusaha di Yayasan LKK Ngesti Rahayu Sidoarjo*. E. jurnal UNESAOLAH Vol. 2 Nomor 1/2013.

Tiro, Muhammad Arif. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Survei*. Makassar, andira publisher.

Uliyandari, Adhikarmika dan Hadian. 2009. *Pengaruh Latihan Fisik Terprogram Terhadap Perubahan Nilai Konsumsi Oksigen Maksimal (vo2max) Pada Siswi Sekolah Bola Voli Tugu Muda Semarang Usia 11-13 tahun*. Diakses tanggal 10 januari 2015

Wahyu Wibowo, Bobby. 2013. *Media Pembelajaran Tekhnik Dasar Bulutangkis Berbasis Multimedia Interaktif*. Diakses tanggal 26 april 2015

Widodo, Cahyo Nur. 2014. *Olahraga bulutangkis sebagai solusi pengisi waktu luang bagi para pekerja*. Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. *Jurnal Kesehatan Olahraga* Vol. 2/03/2014. 53-63.

Yohandika Riswanga. 2013. *Perbandingan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Kelas IX Rintisan Sekolah Berstandar Internasional SMP 1 Kawedanan dan Siswa Kelas IX Sekolah Standar Nasional SMP 2 Kawedanan Kabupaten Magetan*. Diakses tanggal 11 januari 2015

Zarianis. 2006. Efek Suplementasi Besi-Vitamin C dan Vitamin C terhadap Kadar Hemoglobin Anak Sekolah Dasar yang Anemia di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Diakses tanggal 28 april 2015.



## JADWAL PENGUKURAN

Tanggal :

	VO2max	HB	TEKANAN DARAH	NADI
PENGUKURAN I				

Tanggal :

	VO2max	HB	TEKANAN DARAH	NADI
PENGUKURAN II				

MASTER TABEL

inisial	LAMA PERLAKUAN	PRE HB	POST HB	PRE SISTOL	POST SISTOL	PRE DIASTOL	POST DIASTOL	Pre YMCA	Post YMCA
W	3 MENIT	12.2	12.8	102	121	70	77	88	88
HN	3 MENIT	9.2	13.6	128	123	76	76	80	76
MS	3 MENIT	10.9	13.5	145	133	99	75	88	84
Z	3 MENIT	11.5	12.9	106	100	70	58	84	80
S	3 MENIT	13.6	14	137	133	68	60	116	96
F	3 MENIT	9.9	12.2	126	128	60	73	92	92
MML	3 MENIT	13.4	14	122	118	75	65	92	76
AW	3 MENIT	11.7	12.8	131	116	69	74	68	64
Z	3 MENIT	13.8	14.2	118	123	67	70	76	76
RS	3 MENIT	9.5	12.9	128	131	67	71	108	68
I	3 MENIT	12.4	13.2	138	114	86	73	84	80
SA	3 MENIT	10.9	12.3	145	130	95	67	88	72
A	3 MENIT	11.6	14.3	126	136	71	89	108	72
AG	3 MENIT	11.3	12.9	132	126	88	81	84	80
F	3 MENIT	13.1	14	153	136	84	80	100	96

# Analisis statistik VO2 Max (YMCA)

## Explore

Case Processing Summary

Post test VO2 MAX (YMCA)	Cases				
	Valid		Missing		Total
	N	Percent	N	Percent	N
64	1	100,0%	0	0,0%	1
68	1	100,0%	0	0,0%	1
72	2	100,0%	0	0,0%	2
76	3	100,0%	0	0,0%	3
80	3	100,0%	0	0,0%	3
84	1	100,0%	0	0,0%	1
88	1	100,0%	0	0,0%	1
92	1	100,0%	0	0,0%	1
96	2	100,0%	0	0,0%	2

Case Processing Summary

Post test VO2 MAX (YMCA)	Cases	
	Total	Percent
	64	100,0%
68	100,0%	
72	100,0%	
76	100,0%	
80	100,0%	
84	100,0%	
88	100,0%	
92	100,0%	
96	100,0%	

Descriptives




Post test VO2 MAX (YMCA)	Statistic	Std. Error
Mean	98,00	10,000
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound: -29,06	
	Upper Bound: 225,06	
5% Trimmed Mean	.	
Median	98,00	
Variance	200,000	
Std. Deviation	14,142	
Minimum	88	

	Maximum		108	
	Range		20	
	Interquartile Range		.	
	Skewness		.	.
	Kurtosis		.	.
	Mean		82,67	4,807
	95% Confidence Interval for	Lower Bound	61,98	
	Mean	Upper Bound	103,35	
	5% Trimmed Mean		.	
	Median		80,00	
	Variance		69,333	
76	Std. Deviation		8,327	
	Minimum		76	
	Maximum		92	
	Range		16	
	Interquartile Range		.	
	Skewness		1,293	1,225
	Kurtosis		.	.
	Mean		108,00	8,000
	95% Confidence Interval for	Lower Bound	6,35	
	Mean	Upper Bound	209,65	
	5% Trimmed Mean		.	
96	Median		108,00	
	Variance		128,000	
	Std. Deviation		11,314	
	Minimum		100	
	Maximum		116	
	Range		16	

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre test VO2	,183	15	,190	,933	15	,307

a. Lilliefors Significance Correction



## VO2 MAX (YMCA)

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pre test VO2 MAX (YMCA)	90,40	15	12,900	3,331
Post test VO2 MAX (YMCA)	80,00	15	9,681	2,500

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pre test VO2 MAX (YMCA) & Post test VO2 MAX (YMCA)	15	,384	,011

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pre test VO2 MAX (YMCA) - Post test VO2 MAX (YMCA)	10,400	12,811	3,308	3,306	17,494	3,144	14	,002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# Analisis Sistol

## Explore

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pre test Sistol	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%

**Descriptives**

		Statistic	Std. Error
Pre test Sistol	Mean	129,13	3,582
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	121,45	
	Upper Bound	136,81	
	5% Trimmed Mean	129,31	
	Median	128,00	
	Variance	192,410	
	Std. Deviation	13,871	
	Minimum	102	
	Maximum	153	
	Range	51	
	Interquartile Range	16	
	Skewness	-,351	,580
	Kurtosis	,113	1,121



**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre test Sistol	,144	15	,200*	,967	15	,817

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## Pre test Sistol





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## T-Test

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre test Sistol	129,13	15	13,871	3,582
	Post test Sistol	124,53	15	9,775	2,524

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pre test Sistol & Post test Sistol	15	,596	,014

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Pre test Sistol - Post test Sistol	4,600	11,243	2,903	1,626	10,826	1,985	14	,004

## Hasil Analisis Diastol Explore

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pre test diastol	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%

### Descriptives



		Statistic	Std. Error
Pre test diastol	Mean	76,47	3,024
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	69,98
		Upper Bound	82,95
	5% Trimmed Mean	76,02	
	Median	71,00	
	Variance	137,124	
	Std. Deviation	11,710	
	Minimum	60	
	Maximum	101	
	Range	41	
	Interquartile Range	18	
	Skewness	,825	,580
	Kurtosis	-,195	1,121

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre test diastol	,213	15	,066	,909	15	,130

a. Lilliefors Significance Correction

## Pre test diastol





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## T-Test

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pre test diastol	76,47	15	11,710	3,024
Post test diastol	72,60	15	8,034	2,074

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pre test diastol & Post test diastol	15	,471	,005

**Paired Samples Test**

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Paired Differences				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pre test diastol - Post test diastol	3,867	13,010	3,359	3,338	11,072	1,971	14	,002

## Hasil Analisis statistik HB Explore

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pre test HB	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%

**Descriptives**

			Statistic	Std. Error
Pre test HB	Mean		11,67	,374
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	10,86	
		Upper Bound	12,47	
	5% Trimmed Mean		11,69	
	Median		11,60	
	Variance		2,101	
	Std. Deviation		1,449	
	Minimum		9	
	Maximum		14	
	Range		5	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-,163	,580
	Kurtosis		-,836	1,121



**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre test HB	,105	15	,200*	,956	15	,616

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## Pre test HB





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## T-Test

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre test HB	15	1,449	,374
	Post test HB	15	,654	,169

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pre test HB & Post test HB	15	,538	,003

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pre test HB - Post test HB	1,607	1,229	,317	2,287	,926	5,065	14	,000

Tabel Tingkat VO2 max

<b>Resp.</b>	<b>Pre YMCA</b>	<b>Hasil</b>	<b>Post YMCA</b>	<b>Hasil</b>
1.	88	Diatas Rata-rata	88	Diatas Rata-rata
2.	80	Baik	76	Sangat baik
3.	88	Diatas Rata-rata	84	Baik
4.	84	Baik	80	Baik
5.	116	Kurang	96	Rata-rata
6.	92	Diatas rata-rata	92	Diatas rata-rata
7.	92	Diatas rata-rata	76	Sangat baik
8.	68	Sangat baik	64	Sangat baik
9.	76	Sangat baik	76	Sanagat baik
10.	108	Dibawah rata-rata	68	Sangat baik
11.	84	Baik	80	Baik
12.	88	Diatas rata-rata	72	Sangat baik
13.	108	Dibawah rata-rata	72	Sangat baik
14.	84	Baik	80	Baik
15.	100	Dibawah rata-rata	96	Rata-rata

Tabel Tingkat Sistol

<b>Resp.</b>	<b>Pre Sistol</b>	<b>Hasil</b>	<b>Post Sistol</b>	<b>Hasil</b>
1.	102	Normal	121	Pre HT
2.	128	Pre Hipertensi	123	Pre Hipertensi
3.	145	HT Stadium I	133	Pre Hipertensi
4.	106	Normal	100	Normal
5.	137	Pre HT	133	Pre HT
6.	126	Pre HT	128	Pre HT
7.	122	Pre Hipertensi	118	Normal
8.	131	Pre Hipertensi	116	Normal
9.	118	Normal	123	Pre Hipertensi
10.	128	Pre Hipertensi	131	Pre Hipertensi
11.	138	Pre Hipertensi	114	Normal
12.	145	HT Stadium I	130	Pre Hipertensi
13.	126	Pre Hipertensi	136	Pre Hipertensi
14.	132	Pre Hipertensi	126	Pre Hipertensi
15.	153	HT stadium I	136	Pre Hipertensi

Tabel Tingkat Diastol

<b>Resp.</b>	<b>Pre Diastol</b>	<b>Hasil</b>	<b>Post Diastol</b>	<b>Hasil</b>
1.	70	Normal	77	Normal
2.	76	Normal	76	Normal
3.	99	HT Stadium I	75	Normal
4.	70	Normal	58	Normal
5.	68	Normal	60	Normal
6.	60	Normal	73	Normal
7.	75	Normal	65	Normal
8.	69	Normal	74	Normal
9.	67	Normal	70	Normal
10.	67	Normal	71	Normal
11.	86	Pre HT	73	Normal
12.	95	HT stad. I	67	Normal
13.	71	Normal	89	Pre HT
14.	88	Pre HT	81	Pre HT
15.	84	Pre HT	80	Pre HT

Tabel Kadar HB

<b>Resp.</b>	<b>Pre Diastol</b>	<b>Hasil</b>	<b>Post Diastol</b>	<b>Hasil</b>
1.	12,2	Rendah	12,8	Rendah
2.	9,2	Rendah	13,6	Rendah
3.	10,9	Rendah	13,5	Rendah
4.	11,5	Rendah	12,9	Rendah
5.	13,6	Rendah	14	Normal
6.	9,9	Rendah	12,2	Rendah
7.	13,4	Rendah	14	Normal
8.	11,7	Rendah	12,8	Rendah
9.	13,8	Rendah	14,2	Normal
10.	9,5	Rendah	12,9	Rendah
11.	12,4	Rendah	13,2	Rendah
12.	10,9	Rendah	12,3	Rendah
13.	11,6	Rendah	14,3	Normal
14.	11,3	Rendah	12,9	Rendah
15.	13,1	Rendah	14	Normal