

**KARAKTERISASI ENZIM SELULASE YANG DIHASILKAN DARI  
KHAMIR *CANDIDA UTILIS***



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**ALAUDDIN**  
M NADA PERTIWI P. A R  
NIM : 60500113016

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Pertiwi P.  
NIM : 60500113016  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 17 Januari 1995  
Jurusan : Kimia  
Alamat : BTN Jenekcikonng Blok E/2  
Judul : Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Dari Khamir  
*Candida utilis*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 21 Agustus 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSARA

Nada Pertiwi P  
NIM : 60500113016

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Karakterisasi Enzim Selulase yang Dihasilkan oleh Khamir *Candida utilis***" yang disusun oleh **Nada Pertiwi P**, NIM : 60500113016 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu 23 Agustus 2017 bertepatan 1 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 23 Agustus 2017

1 Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Maswati Baharuddin, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UTN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP : 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat dan kasih sayang penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Khamir *Candida Utilis*”. Salam dan Salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang sabar membimbing umatnya menuju keadaan penuh ilmu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains Jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi maupun penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan motivasi dari segala pihak, terutama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suprianto dan Ibunda Suprapti yang senantiasa membimbing, mendidik, mendoakan dan memberi semangat tak henti-hentinya hingga proses penyusunan skripsi ini selesai, tak lupa penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan wakilnya sejawaran.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan wakilnya sejawaran.
3. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan dan juga sebagai dosen penguji I. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku sekretaris jurusan dan juga sebagai dosen penguji II Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Tasmin Tangngareng, M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, khususnya staf pengajar jurusan Kimia.
7. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terkhusus Kak Fitria Aziz, S.Si., S.Pd.
8. Teman seperjuangan penelitian (Nurul Azizah, Kasmawati, Moh. Ikhsanuddin DG M, Chaerul Umam Adam, Miftahul Jannah, dan Fitriyani Najamuddin ).
9. Seluruh teman-teman Jurusan Kimia angkatan 2013.

Semoga Allah swt menerima segala amal kebaikan kita sebagai amal jariah. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga segala aktifitas keseharian kita ternilai ibadah oleh Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

*Wabillahi taufiq Warrahmah, Wassalamu alaikum Wr. Wb*

Samata-Gowa, Juli 2017

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-5
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6-16
A. Tinjauan Umum Khamir .....	6-8
B. <i>Candida utilis</i> .....	6-9
C. Selulosa.....	9-10
D. Enzim Selulase .....	10-11
E. Mekanisme Kerja Enzim Selulase .....	11-12
F. Aktivitas Enzim Selulase .....	12
G. Metode <i>Dinitrosalisilic Acid</i> (DNS) .....	12-13
H. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim Selulase.....	13-14
I. Spektrofotometer UV-Vis.....	15-16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	17-22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	17
B. Alat Dan Bahan.....	17
C. Prosedur Penelitian.....	18-22

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	23-24
A. Hasil Pengamatan .....	24-33
B. Pembahasan.....	24-28
1. Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase.....	24-28
2. Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Enzim Selulase.....	29-30
3. Pengaruh Jenis pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase.....	32-33
4. Pengaruh Jenis Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase.....	34
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	34
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	35-37
<b>LAMPIRAN</b> .....	38-57
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengaruh Jenis Substart .....	23
Tabel 4.2 Hasil Pengaruh Konsentrasi Substart .....	23
Tabel 4.3 Hasil Pengaruh Jenis pH .....	23-24
Tabel 4.4 Hasil Pengaruh Suhu.....	24



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Reaksi Glukosa Dengan <i>Dinitro Salisilad Acid</i> (DNS).....	26
Gambar 4.2	Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase.....	27
Gambar 4.3	Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase	29
Gambar 4.4	Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selule.....	31
Gambar 4.5	Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase.....	32



## ABSTRAK

**Nama : Nada Pertiwi P.**

**NIM : 60500113016**

**Judul : Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Khamir *Candida Utilis***

---

*Candida Utilis* salah satu mikroorganisme kelompok khamir yang memiliki daya selulolitik, karena mampu menghasilkan enzim selulase yang dapat digunakan untuk menghidrolisis selulosa menjadi produk yang lebih sederhana seperti glukosa. Enzim selulase memiliki peranan penting dalam bidang industri diantaranya digunakan dalam penanganan limbah selulosa, produksi pakan ternak dan pembuatan deterjen. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas optimum enzim selulase yang dihasilkan oleh *Candida Utilis* yang meliputi jenis substrat optimum, konsentrasi substrat optimum, pH optimum dan suhu optimum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar yang dihasilkan oleh *Candida Utilis* memiliki jenis substrat optimum yakni *avicel* dengan aktivitas enzim sebesar 0,0948 U/mL. Konsentrasi substrat optimum 2% dengan aktivitas enzim sebesar 0,033 U/mL. pH 7 optimum dengan aktivitas enzim sebesar 0,0419 U/mL dan suhu optimum 30<sup>0</sup>C dengan aktivitas enzim sebesar 0,0732 U/mL.

**Kata Kunci** : *Avicel, Candida Utilis*, Enzim Selulase, Selulolitik.



## ABSTRACT

**Name : Nada Pertiwi P.**

**NIM : 60500113016**

**Title : Characterization Of Cellulase Enzyme Produced By Khamir *Candida Utilis***

---

*Candida Utilis* is one of group microorganisms khamir that have power cellulolytic because it can result the cellulose enzyme that can use to hydrolyze cellulose become product that more simple like glucose. The enzyme cellulose have an important role in the field of the industry such as used in the handling of waste cellulose, fodder production and manufacture of detergents. This reseasch aimed to know the enzyme cellulose produced by *Candida utilis* which include the type of substrat optimum, concentration of substrat optimum, pH optimum and the optimum temperature. The result of this research showed that crude extract produced by *Candida Utilis* has type of substrat optimum was avicel, with the activity of the enzyme 0,0948 U/mL. The concentration of substrat optimum was 2% with the activity of the enzyme 0,033 U/mL. pH 7 optimum with the activity of the enzyme 0,0419 U/mL and the optimum temperature was 30<sup>0</sup>C with the activity of the enzyme 0,0732 U/mL.

**Keywords:** Avicel, *Candida Utilis*, Enzyme cellulose, Cellulolytic.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi, banyak pelaku industri pangan dan non pangan memanfaatkan enzim sebagai biokatalis dalam proses industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya produksi rendah dan efisien. Pemanfaatan mikroorganisme merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam bidang industri, karena kemampuan mikroorganisme untuk memproduksi beberapa jenis enzim. Salah satu mikroorganisme yang mampu memproduksi enzim yakni khamir.

Khamir merupakan mikroorganisme bagian dari kelompok jamur yang bersel tunggal dan membelah diri secara bertunas (Wijanarka, dkk., 2008: 58). Khamir memiliki beberapa enzim penting seperti selulase, fosfatase, lipase dan proteinase yang menyebabkan khamir memegang peranan penting dalam dekomposisi senyawa organik dan dapat digunakan dalam keperluan industri (Kanti, 2004: 10). Sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah swt dalam QS. Al-Qamar/ 54: 49-50.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۙ ۙ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وُجْدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

Terjemahnya :

“Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadar, dan tidaklah urusan kami kecuali sekali bagiakan kejapan mata” (Kementrian Agama, 2002).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa: kata *kadar* pada ayat di atas dari segi bahasa, kata tersebut dapat berarti kadar tertentu yang tidak berarti bertambah atau berkurang atau berkuasa. Tetapi, karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah adalah lebih tepat memahaminya dalam arti ketentuan dan sistem yang

diterapkan terhadap segala sesuatu. Tidak hanya pada satu aspek saja. Manusia misalkan kadar yang ditetapkan Allah baginya. Selaku jenis mahluk, ia dapat makan, minum dan berkembang biak melalui sistem yang ditetapkannya. Manusia memiliki potensi baik dan buruk. Ia dituntut untuk mempertanggung jawabkan pilihannya. Manusia dianugrahi Allah dengan petunjuk dengan kedatangan sekian Rasul untuk membimbing mereka. Akal pun dianugerahkan padanya kepada mereka, demikian seterusnya yang kesemuanya dan lainnya termaksud sistem yang sangat tepat, teliti dan akurat yang telah ditetapkan Allah swt. Demikian juga Allah telah menetapkan sistem dan kadar bagi ganjaran atau balasannya yang akan diberikan sertiap orang. Selain itu ayat diatas menjelaskan tentang salah satu ketentuan Allah menyangkut takdir pengaturannya terhadap mahluk menyangkut peraturan Allah serta keseimbangan yang dilakukan antara mahluk. Bintang-bintang pemakan burung-burung kecil misalnya jumlahnya sangat sedikit (Shihab, 2002: 265).

Ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu diciptakan Allah swt sesuai kadarnya masing-masing yang memiliki kegunaan dan manfaat yang tepat salah satunya adalah khamir yang telah ditetapkan Allah mampu menghasilkan berbagai jenis enzim yang bermanfaat dalam bidang industri. Salah jenis khamir yang bermanfaat bagi bidang industri yang mampu menghasilkan enzim selulase adalah jenis *Candida*.

*Candida* kelompok dari khamir yang memiliki daya selulolitik, dikatakan memiliki daya selulolitik karena mikroorganisme tersebut mampu menghasilkan enzim selulase yang dapat menghidrolisis ikatan  $\beta$  (1- 4) glikosidik pada selulosa dimana merupakan hasil dari hidrolisis enzim (Idiawati, dkk., 2014: 1), salah satu jenis *Candida* yang memiliki daya selulolitik adalah *Candida utilis* yang merupakan salah satu jenis khamir yang banyak digunakan karena dapat tumbuh dengan cepat, selain itu dapat tumbuh pada media yang miskin akan nutrien (Winugroho dan Widiawati,

2003: 142). *Candida utilis* salah satu jenis khamir yang dapat dimanfaatkan karena kemampuannya untuk menghasilkan enzim selulase.

Enzim selulase termasuk dalam enzim ekstraseluler yaitu enzim yang dihasilkan di dalam sel dan dikeluarkan ke media tumbuhnya untuk mendegradasi senyawa polimer. Enzim selulase merupakan enzim kompleks yang terdiri dari tiga tipe enzim yakni endoglukanase, eksoglukanase dan  $\beta$ -glukosidase. Ketiga enzim tersebut bekerja sama untuk menghidrolisis selulosa yang tidak larut menjadi glukosa. Kemampuan enzim ini semakin dibutuhkan oleh industri yang memproduksi bioetanol dari bahan selulosa (Putri, 2016: 13).

Kerja suatu enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, kondisi suhu, pengaruh pH dan pengaruh inhibitor. Faktor ini akan mempengaruhi kerja enzim dalam menghasilkan suatu produk salah satunya dalam bidang industri. Setiap enzim memiliki kondisi optimum yang berbeda dalam kerjanya (Irawati, 2016: 4). Setiap enzim berfungsi secara optimal pada suhu pH tertentu. Peningkatan suhu secara umum mempercepat reaksi kimia enzim, kenaikan suhu terlalu tinggi menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau perubahan struktur protein (Putri, 2016: 37). Adanya perubahan pH terlalu asam atau terlalu basa pada media menyebabkan aktivitas enzim akan mengalami perubahan (Idiawati, dkk., 2014: 5).

Konsentrasi substrat juga mempengaruhi tinggi rendahnya aktivitas enzim. Tingginya konsentrasi akan menyebabkan meningkatnya kecepatan reaksi, namun kecepatan reaksi akan menurun pada batas konsentrasi tertentu (Poedjadi dan Titin, 2012: 144). Oleh sebab itu perlu dilakukan optimasi suhu, pH, jenis dan konsentrasi substrat untuk aktivitas enzim selulase dari *Candida utilis* sehingga dihasilkan aktivitas enzim selulase yang optimal sehingga dapat diaplikasikan dalam bidang industri.

Menurut penelitian Oktavia (2014: 216), karakteristik enzim kasar selulase kapang endofit dari lamun diperoleh nilai pH dan suhu optimum kerja enzim selulase yaitu pH 7 dan 60 °C. Konsentrasi substrat CMC yang digunakan untuk memperoleh aktivitas optimum adalah 1%.

Menurut penelitian Putri (2016: 65), karakterisasi enzim selulase yang dihasilkan oleh *Lactobacillus planatarum* diperoleh *L. planatarum* menghasilkan enzim selulase pada suhu optimum 65°C dengan aktivitas selulase 0,052 U/mL, optimum pada pH 7 (netral) dengan aktivitas selulase 0,054 U/mL, optimum pada konsentrasi substrat CMC 1,5% dengan aktivitas enzim selulase 0,060 U/mL.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang optimalisasi waktu, suhu, pH dan konsentrasi substrat terhadap produksi enzim selulase dari khamir *Candida utilis*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa karakterisasi jenis substrat, konsentrasi substrat, suhu dan pH untuk aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh *Candida utilis* ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakterisasi jenis substrat, konsentrasi substrat, suhu dan pH untuk aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh *Candida utilis* ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi ilmiah dan pengetahuan dalam bidang industri mengenai aktivitas optimum produksi enzim selulase yang dihasilkan oleh khamir jenis *Candida utilis*
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah literatur penelitian untuk mengembangkan lebih lanjut kepada peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa jurusan kimia terhadap manfaat enzim selulase dari *Candida utilis*.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

### A. Tinjauan Umum Khamir

Khamir merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang memegang peranan penting dalam hidrolisis senyawa polisakarida (selulosa) yang berada di dalam tanah. Keberadaan khamir di dalam tanah telah dilaporkan oleh Spencer dan Kutzman yang menyatakan bahwa khamir dari marga *Debaryomyces*, *Candida* dan *Crptococcus* sangat umum ditemukan dalam tanah. Khamir bukan satu-satunya jasad renik tanah yang mampu merombak selulosa namun keadaan khamir dalam tanah mampu membantu proses perombakan senyawa polisakarida kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana (Kanti, dkk., 2003: 659).

Khamir termasuk dalam kelas fungi yaitu organisme heterotrofik (memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya). Khamir bersifat saparofit yang mampu menghancurkan beberapa sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks dan menguraikannya menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana. Kemudian dikembalikan dalam tanah dan selanjutnya meningkatkan kesuburannya. Khamir dapat menguntungkan bagi manusia. Sebaliknya organisme ini juga dapat merugikan bagi manusia apabila membusukkan kayu, tekstil, makanan dan bahan-bahan lain. Khamir dapat bersifat dimorfistik, yaitu memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, bergantung kepada keadaan lingkungan yaitu fase hifa (membentuk miselium) dan fase khamir (membentuk sel tunggal) (Pelczr, 1986: 190).

Khamir memiliki ukuran yang beragam, berkisar antara 1 sampai 5  $\mu\text{m}$  lebarnya dan panjangnya dari 5 sampai 30  $\mu\text{m}$  atau lebih. Biasanya berbentuk telur, tetapi beberapa ada yang memanjang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt menciptakan segala sesuatu dengan berlain-lainan yang memiliki fungsi dan

manfaatnya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah swt dalam QS. Al-Nahl/ 16: 13.

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ۱۳

Terjemahnya :

“Dan apa yang dia kembang biakkan untuk kamu di bumi dengan berlain-lainan warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran” (Kementrian Agama, 2002).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa: Dan selain aneka anugerah yang disebut sebelum ini, Allah swt juga menundukkan apa yang *dia kembang biakkan untuk kamu di bumi* seperti aneka binatang, *dengan berlain-lainan warna jenis, bentuk dan cirinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda yang jelas lagi agung yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang merenung dan ingin mengambil pelajaran* walau perenungan yang dilakukannya tidak terlalu mendalam. Pengamatan menyangkut makhluk yang bersumber dari bumi memerlukan pemikiran yaitu penggunaan nalar yang menghasilkan ilmu, sedangkan pengamatan terhadap objek-objek yang bersumber dari perkembangbiakan dan yang beraneka macam warna dan jenisnya itu memerlukan pengamatan lebih serius dan objek yang lalu karena ia berkaitan dengan keanekaragaman keadaan, pengembangbiakan dan manfaat-manfaatnya sehingga disini diperlukan adalah *tadzakkur*, yakni pemikiran yang disertai dengan ingatan tentang jenis, perbedaan dan ciri-ciri masing-masing.

Ayat tersebut menjelaskan semua ciptaan Allah swt yang bermacam-macam dapat diamati dan dipelajari baik tentang jenisnya, perbedaan dari ciri-ciri dan apa yang dihasilkannya. Salah satu yang dapat diamati dan dipelajari adalah berbagai jenis khamir yang memiliki jenis dan ciri-ciri yang berbeda-beda.

Khamir salah satu mikroorganismenya yang memiliki masa pertumbuhan yang terdiri dari beberapa fase yakni fase *lag* yaitu fase dimana penyesuaian sel-sel dengan lingkungan pembentukan enzim-enzim untuk menguraikan substrat, fase eksponensial yaitu fase pembanyakan jumlah sel dimana aktivitas sel sangat meningkat, fase stasioner yaitu fase dengan jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang dimana senyawa-senyawa metabolit sekunder dapat dipanen, fase kematian yaitu fase dengan jumlah sel yang mati lebih banyak dari pada jumlah sel yang hidup (Idiawati, dkk., 2004: 6).

Khamir umumnya tumbuh dengan baik jika persediaan air cukup serta pada media yang solut (gula atau garam) lebih tinggi dari pada bakteri. Suhu optimum umumnya pada suhu 30 °C dan maksimum 34-47 °C. Khamir lebih suka tumbuh pada kondisi asam pada pH 4-4,5 (Kamila, 2003: 1).

#### **B. *Candida Utilis***

*Candida* merupakan salah satu kelompok khamir yang banyak dijumpai dan 1/3 dari jumlah khamir telah teridentifikasi. Anggota dari kelompok ini banyak dilaporkan mempunyai penyebaran jenis yang cukup luas, meliputi ekosistem yang diantaranya telah diteliti dan dikembangkan untuk keperluan industri pakan ternak, pengolahan limbah dan agen bioremediasi (Kanti, dkk., 2003: 655). Komunitas *Candida* dapat membentuk asosiasi koloni yang disebut biofilm. Biofilm merupakan alat pelindung bagi mikroba terhadap respon imun sel inang dan zat anti mikroba (Anggarani, dkk., 2014: 49-50).

*Candida utilis* mikroorganismenya yang banyak digunakan untuk mengubah dan membuat makanan. *Candida utilis* salah satu jenis khamir yang bersel satu. Penggunaan mikroorganismenya *Candida utilis* sebagai sumber makan untuk manusia mulai dikembangkan pada awal abad ke 19 (Wulandari, dkk., 2012: 567). *Candida utilis*

banyak digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal (PST) karena protein sel tunggal (PST) dihasilkan oleh mikroorganisme bersel tunggal (Wulandari, dkk., 2012: 567). *Candida utilis* dapat tumbuh pada kisaran suhu pertumbuhan 10 °C hingga 39 °C dengan pertumbuhan optimal diamati pada 35 °C (Anonim, 2016: 8).

Menurut Environment and Climate Change (2016: 1), identifikasi taksonomi dari *Candida Utilis* adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Fungi</i>
Divisi	: <i>Ascomycota</i>
Subdivisi	: <i>Saccharomycotina</i>
Kelas	: <i>Saccharomycetes</i>
Ordo	: <i>Saccharomycetidae</i>
Famili	: <i>Saccharomycetales</i>
Genus	: <i>Candida</i>
Spesies	: <i>Candida Utilis</i>

### C. Selulosa

Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linear dan dihubungkan dengan ikatan  $\beta$ -1,4 glikosidik. Struktur yang linear yang menyebabkan selulosa bersifat kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa tidak mudah didegradasi secara kimia maupun mekanis (Putri, 2016: 13). Selulosa di alam memiliki dua tipe yakni pektoselulosa dan ligniselulosa. (Faudi, dkk., 2015: 186). Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selalu berasosiasi dengan polisakarida seperti lignin, pektin, hemiselulosa dan xilan. Kebanyakan selulosa berasosiasi dengan lignin sehingga sering disebut lignoselulosa (Putri, 2016: 13).

Selulosa senyawa polimer linier glukosa yang membentuk struktur dasar sel dan bagian-bagian berkayu dari tanaman. Struktur polisakarida selulosa bersama-

sama dengan hemiselulosa mencapai 50% dari biomassa tanaman. Adanya selulosa dalam suatu substrat dapat menginduksi terbentuknya enzim selulase oleh mikroorganisme selulolitik. Substrat yang digunakan untuk memproduksi enzim selulase adalah substrat berbahan lignoselulosa (Utarti, dkk., 2012: 17).

Selulosa molekul dalam tubuh tersusun dalam bentuk fibril yang terdiri atas beberapa molukul paralel yang berhubungan oleh ikatan glikosidik sehingga sulit diuraikan (Putri, 2016: 12). Komponen-komponen tersebut dapat didegradasi oleh aktivitas mikroorganisme yang dapat dilakukan secara enzimatik. Beberapa mikroorganisme mampu menghidrolisis selulosa untuk digunakan sebagai sumber energi (Sukumaran, dkk., 2005). Mikroorganisme yang dapat mendegradasi selulosa dikenal dengan mikroorganisme selulolitik (Ulfa, dkk., 2014: 259). Selulosa berperan penting dalam proses pembuatan pulp, kertas, serta serat daur ulang (Utarti, dkk., 2012: 17) dapat dimanfaatkan dalam bidang industri tekstil, farmasi, maupun dalam pembuatan zat-zat kimia lain (Sastri, dkk., 2014: 37).

#### **D. Enzim Selulase**

Enzim adalah sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim dihasilkan oleh organ pada hewan dan tanaman yang secara katalitik menjalankan berbagai reaksi seperti hidrolisis dan pemutusan rantai karbon (Supriyatna, 2015: 19).

Enzim selulase secara konseptual enzim yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi gula sederhana sehingga dapat melalui dinding sel mikroba. Enzim selulase sesungguhnya merupakan suatu kompleks enzim yang terdiri dari beberapa enzim yang bekerja bertahap menguraikan selulosa menjadi gula yang lebih sederhana. Enzim selulase dapat menghidrolisis selulosa dengan memutus ikatan glikosidik  $\beta$ -1, 4

dalam selulosa, selodektrin, selobiosa dan turunan selulosa lainnya menjadi gula sederhana seperti glukosa (Idiawati, dkk., 2004: 1).

Enzim selulase enzim yang sangatlah penting karena enzim selulase dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lingkungan dari limbah selulosa. Enzim selulase mampu menguraikan selulosa menjadi golongan yang lebih kecil yang kemudian dapat diuraikan lebih lanjut menjadi monomer-monomernya antara lain glukosa (Kasmiran dan Tarmizi, 2012: 9).

Enzim selulase memegang peranan penting dalam aplikasi-aplikasi di bidang industri, diantaranya digunakan untuk proses konversi penanganan air limbah berselulosa pada industri pulp, kertas, pembuatan suplemen dalam industri pakan ternak, produksi protein sel tunggal, produksi protoplas, teknik genetik dan lain-lain. Enzim ini juga penting dalam bidang industri tekstil terutama dalam hal aplikasi deterjen untuk mengembalikan sifat-sifat tekstil yang berkaitan dengan selulosa, serta produksi biofuel dari biomassa berselulosa (Ariyani, dkk., 2014: 61).

#### ***E. Mekanisme Kerja Enzim Selulase***

Mekanisme pemotongan rantai ikatan oleh enzim selulase sangatlah kompleks karena melibatkan sinergisitas kerja tiga komponen besar yaitu endoglukanase yang bekerja dengan memotong secara acak pada sisi internal dari rantai selulosa dan menghasilkan oligosakarida dengan panjang rantai yang bervariasi. Efek yang terjadi adalah panjang rantai polisakarida semakin berkurang dengan cepat dan diikuti peningkatan jumlah pereduksi secara bertahap (Putri, 2016: 14).

Eksoglukanase berperan dalam memproses ujung reduksi maupun nonreduksi dari rantai polisakarida selulosa yang menghasilkan glukosa atau selobiosa sebagai produk utamanya. Efek yang terjadi adalah peningkatan jumlah gula reduksi secara cepat dan secara keseluruhan hanya terjadi sedikit perubahan panjang rantai dalam

jangka waktu yang singkat dan pada enzim  $\beta$ -glukosidase menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa (Putri, 2016: 14).

#### **F. Aktivitas Enzim Selulase**

Aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai kecepatan pengurangan substrat atau kecepatan membentuk produk pada kondisi optimum. Satu unit aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang menghasilkan satu mikromol gula reduksi (glukosa) setiap menit. Untuk menentukan aktivitas enzim selulase dapat dilakukan dengan menggunakan substrat yang spesifik. Aktivitas enzim endoglukanase dapat ditentukan dengan menguji pada substrat CMC (*Carboxymethyl cellulose*), sehingga enzim endoglukanase disebut dengan istilah CMC-Ase (Putri, 2016: 16).

Penentuan aktivitas enzim selulase akan sulit apabila filtrat yang akan diukur aktivitas enzimnya merupakan campuran dari berbagai enzim selulase. Enzim-enzim ini tidak hanya dapat menghidrolisis substrat yang sama tetapi dapat bekerja secara sinergis memecah substrat yang sama, sehingga menyebabkan aktivitas yang diukur dipengaruhi oleh proporsi dari masing-masing enzim yang ada (Putri, 2016: 16).

#### **G. Metode Dinitrosalisilic Acid (DNS)**

Metode kuantitatif yang dapat digunakan dalam uji aktivitas enzim selulase adalah dengan mengamati kadar gula tereduksi yang dihasilkan oleh hidrolisis enzim terhadap substrat (Iriawati, 2016). Metode *Dinitrosalisilic Acid* (DNS) memiliki tingkat ketelitian yang tinggi untuk mengukur gula reduksi yang diproduksi oleh mikroba sehingga dapat mengukur gula reduksi dengan kadar kecil sekalipun (Putri, 2016: 16). Metode *Dinitrsalisilic Acid* (DNS) sepuluh kali lebih sensitif dibandingkan dengan metode nelson (Amelia, 2012: 25).

*Dinitrosalisilic Acid* (DNS) merupakan senyawa aromatis yang akan bereaksi dengan gula reduksi membentuk asam-3-amino-5-dinitrosalisilat yang merupakan suatu senyawa yang mampu menyerap dengan kuat radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nm (Putri, 2016: 49). Pereaksi *Dinitrosalisilic Acid* (DNS) dapat bekerja dengan adanya komponen pendukung yang membantu kerja *Dinitrosalisilic Acid* (DNS) yaitu KNa-Tartarat, fenol, sodium bisulfit ( $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ), dan natrium hidroksida (NaOH) (Irawati, 2016: 43).

Prinsip pengujian dengan metode *dinitrosalisilat Acid* (DNS) adalah gugus aldehid pada rantai polisakarida dioksidasi menjadi gugus karboksil, disaat yang bersamaan, gugus aldehid gula akan mereduksi asam 3,5-dinitrosalisilat menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat. Reaksi tersebut akan berlangsung terus-menerus selama terdapat gula pereduksi dalam larutan yang diujikan (Hasanah dan Iwan, 2015: 1114). Adanya gula pereduksi pada sampel akan bereaksi dengan larutan DNS yang awalnya berwarna kuning menjadi warna jingga kemerahan (Irawati, 2016: 42).

#### **H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim**

Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju katalis suatu reaksi enzimatik (Okatavia, dkk., 2014: 6). Enzim tidak memiliki aktivitas yang maksimal pada temperatur yang sangat rendah. Pada temperatur sangat tinggi aktivitas enzim akan naik, namun sebaliknya juga akan mendenaturasi enzim. Ketika temperatur meningkat proses denaturasi dan menurunkan aktivitas enzim. Kenaikan temperatur menyebabkan aktivitas enzim meningkat sehingga mencapai temperatur optimum. Setelah mencapai kondisi optimum menyebabkan aktivitas enzim juga menurun (Bahri, dkk., 2012: 138).

pH merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap struktur dan aktivitas biologi enzim. Interaksi ion yang terjadi di dalam strukturnya akan menstabilkan

enzim dan memungkinkan enzim untuk mengenali dan berkaitan dengan substratnya (Putri, 2016: 19). Adanya perubahan pH pada media akan menyebabkan aktivitas enzim ikut mengalami perubahan, oleh karena itu setiap enzim mempunyai pH tertentu yang menyebabkan aktivitasnya mencapai keadaan optimal. Kondisi pH yang optimal akan mendukung enzim dalam melakukan katalisa suatu reaksi dengan baik, sedangkan pH yang kurang sesuai akan menyebabkan kerusakan atau tidak aktifnya protein dalam suatu enzim sehingga menyebabkan fungsi dan aktivitas dari enzim tersebut berkurang (Idiawati, dkk., 2004: 5).

Konsentrasi substrat pada tahap awal reaksi mencerminkan kenaikan yang terhadap kecepatan reaksi. Sisi aktif enzim mulai berkaitan dengan substrat maka kecepatan maksimum reaksi akan tercapai. Penambahan substrat berikutnya tidak akan mempengaruhi tingkat reaksi, hal ini disebabkan sisi aktif enzim telah jenuh dipakai untuk mengikat molekul substrat (Putri, 2016: 20).

Konesentrasi enzim merupakan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pada konsentrasi substrat tertentu kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim (Poedjadi dan Titin, 2012: 143). Semakin tinggi konsentrasi enzim maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Namun hidrolisis substrat akan konstan dengan naiknya konsentrasi enzim. Hal ini disebabkan karena penambahan enzim sudah tidak efektif lagi (Putri, 2016: 20). Selain itu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah Inhibitor yang merupakan molekul yang dapat mengganggu katalis baik dengan cara memperlambat maupun menghentikan reaksi enzimatis (Putri, 2016: 20).

### **I. *Spektrofotometer UV-ViS***

Spektrofotometri merupakan metode analisis kimia yang berdasarkan interaksi energi dengan materi. Alat untuk analisis secara spektrofotometri disebut spektrofotometer, yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu senyawa secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode analisis yang umum digunakan adalah dengan spektrofotometer UV-Vis (Suharmanto dan Kurniawan, 2013: 1).

Spektrofotometer UV-Vis adalah alat untuk analisa unsur-unsur berkadar rendah secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Penentuan secara kualitatif berdasarkan puncak-puncak yang dihasilkan pada spektrum suatu unsur tertentu pada panjang gelombang tertentu (Yanlinastuti, dkk., 2011: 568). Secara kuantitatif suatu berkas radiasi dikenakan pada larutan sampel dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan akan diukur besarnya. Radiasi yang diserap oleh larutan sampel ditentukan dengan membandingkan intensitas cahaya yang diteruskan dengan kekuatan radiasi cahaya yang diserap (Irawati, 2016: 23).



**Gambar**

Spektrofotometer UV-VIS (Yanlinastuti , 2011: 568)

**2.1:** Alat

Kelemahan spektrofotometer UV-Vis dan sinar tampak dalam analisis kualitatif adalah kurang teliti. Hal tersebut disebabkan karena pita-pita absorpsi yang diperoleh melebar, dengan demikian kurang khusus atau terbatas pemakaiannya. Walaupun demikian, berdasarkan spektrum serapan ultra-violet dan sinar tampak

dapat dipakai untuk mengetahui ada atau tidak adanya gugus fungsional tertentu dalam senyawa organik (Triyati, 1985: 46).



## **BAB III**

### **METODE PERCOBAAN**

#### ***A. Tempat dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Riset Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan waktu penelitian dari bulan desember-februari 2017.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah spektrofotometer UV-Vis, *sentrifuse* kultur dingin *Heraeus*, *autoklaf Astell*, *waterbath shaker Thermo Scientific*, *laminar air flow (LAF) ESCO*, neraca analitik, erlenmeyer 250 mL, gelas kimia 250 mL, labu takar 100 mL, gelas ukur, penangas, cawan petri, pipet tetes 2 mL, pipet volume, gelas arloji, batang pengaduk, tabung, reaksi, Bunsen, spatula, corong, kawat ose, rak tabung.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Avicel*, asam asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ), asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS), aquadest ( $\text{H}_2\text{O}$ ), *Carboxymethylcellulose (CMC)*, glukosa ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ), isolat *Candida utilis*, kalium hidrofospat ( $\text{K}_2\text{HPO}_4$ ), kalium natrium tartrat (K-Na tartrat), kalium nitrat ( $\text{KNO}_3$ ), kalsium klorida ( $\text{CaCl}_2$ ), kapas, kertas saring, magnesium sulfat heptahidrat ( $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ), natrium asetat ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ), natrium dihidrogen fosfat ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ), natrium hidrogen fosfat ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ), natrium hidroksida ( $\text{NaOH}$ ), sodium sulfit ( $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ) dan *yest extract*.

### **C. Prosedur Kerja**

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah

#### **1. Pembuatan Media Inokulum**

Menimbang masing-masing bahan yang digunakan dalam media CMC *broth* 1% terdiri dari 1 g CMC, 0,04 g MgSO<sub>4</sub>, 0,15 g KNO<sub>3</sub>, 0,1 g K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 0,004 g CaCl<sub>2</sub>, dan 0,4 g *yeast extract*, memasukkan semua bahan ke dalam erlenmeyer 250 mL, kemudian menambahkan aquades sebanyak 100 mL. Setelah itu memanaskan media hingga mendidih sambil mengaduk hingga larut. Menutup erlenmeyer dengan kapas, kemudian mensterilisasi media ke dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Mendinginkan media hingga suhu ruang sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya (Irawati, 2016: 30).

#### **2. Penyiapan Inokulum**

Mengambil lima ose isolat *Candida utilis* kedalam media inokulum. Kemudian menginkubasi pada *waterbath shaker incubator* dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 37°C selama 24 jam.

#### **3. Pembuatan Media CMC Broth 1% (b/v)**

Menimbang masing-masing bahan yang digunakan dalam media CMC *broth* 1% terdiri dari 5 g CMC, 0,2 g MgSO<sub>4</sub>, 0,75 g KNO<sub>3</sub>, 0,5 g K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 0,02 g CaCl<sub>2</sub>, dan 2 g *yeast extract*, memasukkan semua bahan ke dalam gelas kimia 1000 mL, kemudian menambahkan aquades sebanyak 500 mL. Setelah itu memanaskan media hingga mendidih sambil mengaduk hingga larut. Memindahkan kedalam 2 buah Erlenmeyer 250 mL. Menutup erlenmeyer dengan kapas, kemudian mensterilisasi media ke dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Mendinginkan media hingga suhu ruang sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya (Irawati, 2016: 30).

#### 4. Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase

Mengambil sebanyak 37,5 mL inokulum ke dalam 500 mL media CMC *broth* 1%, kemudian menginkubasi pada *waterbath shaker incubator* dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 37°C selama 5×24 jam. Kemudian disentrifugasi menggunakan sentrifus kultur dingin pada kecepatan 12.000 rpm pada 4°C selama 10 menit (Putri, 2016: 35). Kemudian menyaring cairan enzim (supernatan) yang dihasilkan dengan menggunakan kertas saring untuk memisahkan dari residu padatan. Mengambil supernatan sebagai ekstrak kasar enzim selulase dan menyimpan dalam lemari pendingin agar dapat digunakan untuk tahap berikutnya.

#### 5. Pengujian Aktivitas Enzim Selulase Menggunakan Metode DNS

Aktivitas enzim selulase diuji menggunakan metode DNS dan dinyatakan dalam satuan internasional unit (U/mL). Adanya gula pereduksi yang terbentuk mereduksi reagen DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat) membentuk senyawa yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm.

##### a. Pembuatan Reaksi DNS

Campuran 1 gr natrium hidroksida (NaOH), 18,2 gr kalium natrium ttrat, 1 gr natrium sulfit (Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) dan 1 gr DNS (dinitro salisilat acid) dilarutkan ke dalam *waterone* hingga volume 100 mL. Campuran dihomogenkan dengan magnetik *stirrer*. Larutan yang sudah jadi disimpan dalam botol gelap dan pada suhu kamar (Miller, 1959).

##### b. Pembuatan Larutan Standar Glukosa

Pembuatan larutan standar glukosa dilakukan dengan cara menimbang 0,025 gr glukosa. Kemudian dilarutkan dengan *waterone* dan dihimpitkan hingga tanda batas 25 mL dalam labu ukur. Kemudian larutan tersebut diencerkan dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mg/mL.

### c. Pembuatan Kurva Standar Glukosa

Memasukkan 1 mL larutan standar glukosa 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 ke dalam tabung reaksi dan 1 mL *waterone* sebagai kontrol. Selanjutnya menambahkan sebanyak 1 mL reagen DNS pada larutan standar glukosa tersebut dan menghomogenkan. Memanaskan semua tabung reaksi selama 5 menit dan mendinginkan (Hasanah dan Iwan, 2015: 1112). Setelah dingin, mengukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Putri, 2016: 37). Selanjutnya, absorbansi masing-masing larutan diplotkan terhadap konsentrasinya sehingga diperoleh nilai slope, intercept, dan  $R_2$  (Sinatari, 2013: 135).

### d. Uji Aktivitas Enzim Selulase

Sebanyak 2 mL substrat ditambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase dan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 50°C selama 30 menit. Sebanyak 2 mL reagen DNS ditambahkan untuk menghentikan reaksi dan dididihkan pada suhu 100°C selama 5 menit kemudian didinginkan. Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan mengkonversi nilai absorbansi yang diperoleh dari konsentrasi glukosa standar, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus (Putri, 2016: 36).

$$\text{Aktivitas enzim (Unit/mL)} = \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol}$$

keterangan :

C = Konsentrasi glukosa (mg/mL)

BM = Berat molekul glukosa (180 g/mol atau g/mmol)

VE = Volume enzim

VS = Volume substrat

t = Waktu inkubasi (menit)

## 6. Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Menyiapkan tiga buah tabung reaksi. Menambahkan 2 mL substrat CMC 1% dalam tabung reaksi pertama, menambahkan substrat 2 mL avicel 1% pada tabung kedua dan menambahkan 0,75 cm kertas saring pada tabung ketiga (Kamila, 2003: 5) Kemudian masing-masing tabung ditambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase dan 2 mL buffer fosfat pH 7 (Putri, 2016: 35). Diinkubasi pada suhu 50 °C selama 30 menit dan aktivitas selulase diuji dengan metode DNS (Kamila, 2003: 5).

#### **7. Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Berdasarkan jenis substrat optimum dilakukan optimasi konsentrasi substrat dengan menambahkan 2 mL jenis substrat optimum dengan konsentrasi yang berbeda 0,5;1,0;1,5;2,0 dan 2,5 %. Kemudian menambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase. Kemudian ditambahkan larutan buffer fosfat pH 7 diinkubasi pada suhu 50°C selama 30 menit dan aktivitas enzim selulase diuji dengan menggunakan metode DNS.

#### **8. Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Berdasarkan konsentrasi optimum substrat dilakukan optimasi pH dengan menambahkan sebanyak 2 mL substrat konsentrasi optimum. Kemudian menambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase dan ditambahkan buffer asetat (pH 4,0-6,0) dan buffer fosfat (pH 7,0-8,0). Campuran dalam pH buffer yang beragam diinkubasi pada suhu 50 °C selama 30 menit dan aktivitas selulase diuji dengan metode DNS.

#### **9. Pengaruh suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Berdasarkan pH optimum dilakukan optimasi suhu optimum enzim dengan menambahkan 2 mL substrat konsentrasi dan pH optimum. Kemudian ditambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase dan diinkubasi pada suhu (30, 40, 50, 60 °C) selama 30 menit dan aktivitas enzim selulase diuji dengan menggunakan metode DNS (Okatavia., dkk, 2014: 3).



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## A. Hasil Pengamatan

**Tabel 4. 1** Hasil Pengaruh Jenis Substrat

No	Substrat	Absorbansi	Konsentrasi	Aktivitas (U/mL)
			Glukosa (mg/mL)	
1	<i>Carboxymethylcellulose</i> (CMC)	0,2848	0,1994	0,0369
2	<i>Avicel</i>	0,5123	0,3707	0,0948
3	Substrat Kertas saring	0,3034	0,2134	0,0526

**Tabel 4. 2** Hasil Pengaruh Jenis Konsentrasi Substrat *Avicel*

No	Konsentrasi %	Absorbansi	Konsentrasi	Aktivitas (U/mL)
			Glukosa (mg/mL)	
1	0,5	0,1128	0,0699	0,0129
2	1,0	0,2015	0,1367	0,0253
3	1,5	0,2557	0,1775	0,0329
4	2,0	0,2567	0,1782	0,033
5	2,5	0,2338	0,1069	0,0297

**Tabel 4. 3** Hasil Pengaruh Jenis pH Substrat *Avicel* Konsentrasi 2%

No	pH	absorbansi	Konsentrasi	Aktivitas (U/mL)
			Glukosa (mg/mL)	
1	4	0,2310	0,1589	0,0294
2	5	0,2314	0,1592	0,0295
3	6	0,2832	0,1982	0,0367
4	7	0,3208	0,2265	0,0419
5	8	0,2338	0,1658	0,0307

**Tabel 4. 4** Hasil Pengaruh Jenis Suhu Substrat *Avicel* Konsentrasi 2% pH 7

No	Suhu °C	Absorbansi	Konsentrasi	Aktivitas
			Glukosa (mg/mL)	(U/mL)
1	30°C	0,5450	0,3953	0,0732
2	40°C	0,3495	0,2481	0,0459
3	50°C	0,3000	0,2108	0,0390
4	60°C	0,2790	0,1950	0,0361

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Pertumbuhan dan perkembangan suatu mikroorganisme membutuhkan suatu media. Media harus mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya (Rosyida, 2016: 36). Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media CMC pemilihan media CMC dalam penelitian ini dikarenakan enzim yang diambil berupa enzim selulase yang bekerja menghidrolisis selulosa. CMC merupakan turunan dari selulosa yang mudah larut dalam medium dan mudah terhidrolisis (Ambriyanto, 2010). Selain itu CMC pada media produksi berfungsi sebagai substrat dan sekaligus sebagai penginduksi (Induser) untuk menghasilkan enzim selulase. Induser adalah suatu senyawa yang dibutuhkan untuk menginduksi gen agar terjadi ekspresi gen, selain itu substrat CMC juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon untuk menghasilkan glukosa (Apriani, dkk, 2014).

Semakin banyak sumber karbon dalam media produksi maka enzim selulase yang dihasilkan juga semakin meningkat, apabila kelebihan sumber karbon dapat menghambat pertumbuhan sel karena akan mengurangi jumlah oksigen dalam media sehingga dapat menurunkan produksi enzim selulase (Saropah, dkk., 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka untuk produksi enzim selulase pada penelitian ini menggunakan konsentrasi CMC 1% berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2016).


Produksi ekstrak kasar enzim selulase diperoleh dengan menginkubasi kultur khamir selama 5×24 jam. Idiawati, dkk (2014: 6) menjelaskan bahwa enzim selulase yang termaksud dalam metabolit sekunder dapat dipanen pada fase stasioner. Sari (2010) menjelaskan bahwa sintesis enzim selulase terjadi pada saat nutrisi organik selain substrat CMC mulai habis, sehingga sekresi enzim selulase memungkinkan sel bakteri tetap bertahan hidup dengan menghidrolisis CMC sebagai sumber nutrisi yang tersedia pada media. Ariyani, dkk (2014: 65) menyebutkan bahwa enzim selulase yang dihasilkan *A. niger* optimum pada waktu fermentasi 120 jam (5 hari). (Putri, 2016) menambahkan bahwa dalam menghasilkan enzim selulase dari mikroba, waktu inkubasi optimum adalah 3-5 hari.

Ekstrak kasar enzim selulase diperoleh dengan memisahkan suspensi bakteri dengan supernatan sebagai enzim ekstrak kasar dengan cara *sentrifuge*. Putri (2016: 13) menyebutkan bahwa enzim selulase termaksud dalam enzim ekstrak seluler yang dihasilkan di dalam sel dan dikeluarkan pada media tumbuhnya sehingga dapat diekstrak dengan *sentrifuge*. Enzim selulase diperoleh dengan *sentrifuge* kultur *Candida utilis* dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit suhu 4<sup>0</sup>C untuk memisahkan sel-sel mikroorganisme yang dan supernatan yang merupakan cairan yang berisi enzim. *Sentrifuge* dilakukan dalam keadaan suhu dingin untuk menjaga agar enzim tidak terdenaturasi. Hasil ekstrak kasar enzim selulase selanjutnya dikarakterisasi.

Pengukuran aktivitas enzim selulase menggunakan metode DNS berdasarkan estimasi jumlah glukosa (gula reduksi) sebagai hasil hidrolisis dari selulosa (Putri,

2016: 49). Metode DNS digunakan untuk mengukur gula pereduksi salah satunya glukosa dengan teknik kalorimetri. Glukosa memiliki gugus aldehid, sehingga dapat dioksidasi oleh asam 3,5-dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil dan menghasilkan 3-amino-5-salisilat pada kondisi basa dengan suhu 90-100 °C. Senyawa ini dapat dideteksi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm (Bintang, 2010). Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm.

Kadar gula reduksi ditentukan dengan membuat kurva standar glukosa yang berfungsi untuk mengetahui konsentrasi larutan dengan nilai absorbansinya. Aldehid




**Gambar 4.1** Reaksi Glukosa Dengan *Dinitro Salisilat Acid* (DNS)

gula dan teroksidasi menjadi gugus karboksil. Bila terdapat gula reduksi pada sampel maka larutan DNS yang awalnya berwarna kuning akan bereaksi dengan gula reduksi sehingga menimbulkan warna jingga kemerahan (Kusmiati dan Agustini, 2010). Semakin gelap warna DNS maka jumlah gula yang tereduksi semakin banyak (Rosyada, 2015). Pereaksi DNS bekerja dengan adanya komponen pendukung seperti natrium hidroksida (NaOH) berfungsi memberi keadaan basa pada pereaksi asam 3,5-

dinitrosalisilat (DNS) dimana pereaksi DNS berfungsi mereduksi glukosa dalam keadaan basa. Kalium natrium tatarat (K-Na Tatarat) berfungsi untuk menghilangkan pengaruh senyawa yang mengganggu sehingga kompleks warna tetap stabil dan sodium sulfite ( $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ) berfungsi untuk menghilangkan pengaruh oksigen terlarut yang dapat mengoksidasi glukosa produk.

Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan mengukur aktivitas endoglukase, eksoglukanase dan  $\beta$ -glukosidase. Menurut Oktavia, dkk (2014: 4) menyatakan bahwa sistem pemecahan enzim selulase yaitu endoglukanase, eksoglukanase dan  $\beta$ -glukosidase. Enzim selulase dapat diproduksi oleh mikroorganisme karena terdapat substrat selulosa dalam lingkungannya, substrat yang umum digunakan untuk memproduksi enzim selulase adalah *Carboxymethylcellulose* (CMC) spesifik pada enzim endoglukanase, *avicel* spesifik pada enzim eksoglukanase dan kertas saring spesifik pada enzim  $\beta$ -glukosidase (Kamila, 2003: 6).




**Gambar 4. 2.** Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Berdasarkan hasil yang diperoleh, substrat *Carboxymethylcellulose* (CMC) memiliki aktivitas enzim lebih rendah dibandingkan substrat *avicel* dan kertas saring dengan aktivitas enzim sebesar 0,0369 U/mL. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pada tahapan pertama enzim selulase yakni endoglukanase memiliki kemampuan menghidrolisis secara acak pada rantai linear menghasilkan oligosakarida, enzim ini sangat aktif untuk memutuskan selulosa amorf yang mengakibatkan terjadi peningkatan gula reduksi secara bertahap (Kamila, 2003: 5).

Hasil optimum diperoleh pada penggunaan substrat *avicel* dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,0948 U/mL. Hal ini disebabkan oleh mekanisme tahap kedua yakni enzim eksoglukanase merupakan enzim yang memiliki kemampuan menghidrolisis selulosa kristalin dan amorf dengan cara memotong unit selobiosa pada ujung reduksi dan non reduksi pada rantai selulosa yang mengakibatkan terjadi peningkatan gula reduksi secara cepat, dengan produk utama yang dihasilkan adalah selobiosa (Putri, 2016).

Pada substrat kertas saring aktivitas enzim selulase lebih rendah dibandingkan dengan substrat CMC dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,0526 U/mL. Hal ini disebabkan oleh mekanisme tahap ketiga  $\beta$ -glukosidase bekerja melanjutkan kerja enzim endoglukanase dan eksoglukanase dengan menghidrolisis unit selobiosa menjadi

unit glukosa. Enzim ini berperan sebagai regulator dengan mengatur konsentrasi glukosa. Menurut penelitian (Kamila, 2003: 8), menjelaskan bahwa tingginya aktivitas *avicel* dibandingkan substrat *Carboxymethylcellulose* (CMC) dan kertas saring menunjukkan bahwa isolat mampu menghidrolisis daerah kristalin pada selulosa dimana substrat *avicel* spesifik kejenis enzim eksoglukanase.



## 2. Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Konsentrasi substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya aktivitas enzim. Penelitian ini mengukur pengaruh konsentrasi substrat menggunakan substrat optimum yakni *avicel* dengan menggunakan beberapa konsentrasi yakni 1%, 1,5%, 2%, 2,5%.

**Gambar 4. 3.** Pengaruh Konsentrasi Substrat *Avicel* Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan aktivitas enzim selulase pada konsentrasi konsentrasi 0,5% aktivitas enzim sebesar 0,0129 U/mL, konsentrasi 1,0% aktivitas enzim sebesar 0,0253 U/mL dan konsentrasi 1,5% dengan aktivitas enzim sebesar 0,0329 U/mL. Besarnya konsentrasi substrat sebanding dengan besarnya aktivitas enzim selulase artinya, pada konsentrasi substrat yang rendah, aktivitas selulasenya juga rendah karena sisi aktif enzim hanya sedikit mengikat substrat sehingga produk glukosa yang dihasilkan juga sedikit. Demikian juga dengan konsentrasi substrat yang semakin tinggi, maka sisi aktif enzim akan semakin banyak mengikat substrat sehingga produk glukosa yang dihasilkan semakin banyak pula. Penambahan diatas konsentrasi optimum akan menyebabkan penurunan aktivitas enzim hal ini menunjukkan bahwa sisi aktif enzim telah jenuh (Putri, 2016: 60)


Berdasarkan Gambar 4.2 hasil optimum diperoleh pada konsentrasi substrat 2% dengan aktivitas enzim sebesar sebesar 0,033 U/mL. Hal ini disebabkan oleh pada konsentrasi substrat optimum substrat yang bergabung dengan sisi aktif enzim semakin banyak, yang menyebabkan semakin besarnya kecepatan reaksi yang sebanding dengan besarnya aktivitas enzim selulase (Irawati, 2016: 53)

Konsentrasi 2,5% terjadi penurunan aktivitas enzim selulase yakni sebesar 0,0297 U/mL. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak konsentrasi substart maka sisi aktif enzim yang bergabung dengan substart juga bertambah banyak, akibatnya semakin banyak selulosa yang dihidrolisis menjadi glukosa. Glukosa yang terlalu

banyak akan mengakibatkan inhibisi produk glukosa karena glukosa akan menempel pada sisi alosterik enzim sehingga enzim tidak dapat ditempati lagi oleh substrat sehingga terjadi penurunan aktivitas enzim (Putri, 2016: 61). Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Kamila (2003) yang juga melakukan pengukuran aktivitas enzim selulase dari khamir *Rhodotorula sp* dengan substrat avisel menghasilkan konsentrasi optimum 0,5%. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan karakteristik dari enzim selulase yang dihasilkan oleh setiap mikroorganismenya.

### **3. Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Faktor pH berpengaruh terhadap struktur dan aktivitas enzim. Enzim sebagai protein maka aktivitasnya dipengaruhi oleh pH (Idiawati, dkk., 2014: 6). Perubahan pH akan menyebabkan denaturasi pada protein penyusun enzim itu sendiri, oleh sebab itu setiap enzim yang dihasilkan oleh mikroba memiliki pH optimum yang berbeda-beda.



**Gambar 4.4.** Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Berdasarkan gambar 4. 4 dapat dilihat terjadi penurunan aktivitas enzim selulase pada pH asam yakni pada pH 4 dengan aktivitas sebesar 0,0294 U/mL, pH 5 dengan aktivitas sebesar 0,0295 U/mL dan pH 6 dengan aktivitas sebesar 0,0367 U/mL. Hal ini disebabkan oleh pada kondisi asam yang rendah dapat menyebabkan perubahan struktur enzim, hal ini terjadi karena gugus bermuatan ( $-\text{NH}_3^+$  atau  $-\text{COO}^-$ ) yang jauh dari terikatnya substrat akan mengalami perubahan muatan pada pH berbeda, hal ini akan menyebabkan terganggunya ikatan ionik sehingga struktur dasar enzim berubah. Perubahan struktur enzim akan menyebabkan aktivitas enzim akan menjadi menurun (Irawati, 2016: 48)


Hasil optimum diperoleh pada pH 7 (netratl) dimana aktivitas enzim paling besar dalam mengubah substratnya menjadi unit sederhana yakni glukosa, dengan aktivitas enzim sebesar 0,0419 U/mL. Pada kondisi pH netral asam amino dapat dapat mengaktifkan sisi aktif enzim dan pada kondisi ini aktivitas enzim meningkat (Irawati, 2016: 58)

Kondisi pH 8 (basa) terjadi penurunan aktivitas yakni dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,0307 U/mL. (Putri, 2016: 57) menjelaskan bahwa perubahan pH basa dapat menyebabkan perubahan molekul enzim, sehingga mempengaruhi aktivitas enzim. Kondisi pH basa dapat menyebabkan asam amino penyusun enzim inaktif (Sari, 2010). Hasil penelitian lain yang melakukan pengukuran aktivitas enzim selulase pada isolat *L. Planantarum* (Putri, 2016) menghasilkan pH yang sama.

#### 4. Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju katalis reaksi enzimatik. Kenaikan suhu hingga batas tertentu dapat meningkatkan aktivitas enzimatik sampai pada kondisi optimum, namun kenaikan suhu yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim (Oktavia, dkk., 2014: 6).

**Gambar 4. 5.** Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase Dari *Candida utilis*



Gambar 4. 5 memperlihatkan aktivitas optimum pada suhu 30°C dengan aktivitas 0,732 U/mL. Hal ini disebabkan pada suhu optimum, tumbukan antara enzim dan substrat sangat efektif, sehingga pembentukan kompleks enzim-substrat makin mudah dan produk yang terbentuk meningkat yang sebanding dengan meningkatnya

aktivitas enzim (Tarigan, dkk., 2015: 742). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2003) yang menyatakan bahwa khamir umumnya memiliki suhu optimum pada kisaran 30<sup>0</sup>C. Kisaran dibawah suhu optimal menyebabkan penurunan aktivitas enzim selulase.

Berdasarkan Gambar 4. 5 memperlihatkan bahwa aktivitas enzim selulase menurun seiring dengan peningkatan suhu. Pada suhu 40<sup>0</sup>C aktivitas enzim selulase sebesar 0,0459 U/mL, suhu 50<sup>0</sup>C aktivitas enzim selulase sebesar 0,0390 U/mL, suhu 60<sup>0</sup>C aktivitas enzim selulase sebesar 0,0361 U/mL. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kinetika molekul-molekul enzim menjadi besar sehingga memecahkan ikatan-ikatan sekunder yang mempertahankan enzim dalam bentuk aslinya, akibatnya struktur sekunder dan tersier hilang sehingga aktivitas enzim menurun. Adanya peningkatan suhu juga dapat mempengaruhi ikatan hidrogen yang berperan dalam menjaga konformasi molekul enzim. Perubahan konformasi enzim akan mempengaruhi sisi aktif enzim, kondisi panas tertentu menyebabkan ikatan hidrogen tersebut akan putus. Putusnya suatu ikatan hidrogen akan menyebabkan mudahnya pemutusan ikatan hidrogen selanjutnya dalam rantai polipeptida, sehingga protein enzim akan mengalami denaturasi (Putri, 2016: 54)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaporkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis substrat optimum untuk menghasilkan enzim selulase dari *Candida Utilis* adalah substrat *avicel* dengan aktivitas selulase sebesar 0,0948 U/mL.
2. Konsentrasi jenis substrat optimum untuk menghasilkan enzim selulase dari *Candida Utilis* adalah pada konsentrasi substrat *avicel* 2% dengan aktivitas selulase sebesar 0,033 U/mL.
3. pH optimum untuk menghasilkan enzim selulase dari *Candida Utilis* adalah pada pH 7 dengan aktivitas selulase sebesar 0,0419 U/mL.
4. Suhu optimum untuk menghasilkan enzim selulase dari *Candida Utilis* adalah suhu 30°C dengan aktivitas selulase sebesar 0,0307 U/mL.

### B. Saran

Perlu dilakukan uji kualitatif sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui aktivitas hidrolisis terhadap selulosa. Selain itu, perlu dilakukan penentuan kinetika enzim untuk mengetahui kecepatan reaksi pada saat enzim telah jenuh oleh substrat.

Al-Qur'anul Al Karim


- Ambriyanto, K.S. "Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Aerob Pendegradasi Selulosa Dari Sarahan Daun Rumput Gajah". *J. Surabaya ITS* (2010)
- Amelia, Aam. "Pengaruh Variasi Konsentrasi Enzim Dan Substrat Terhadap Sakarifikasi Limbah Pengolahan Kertas Menggunakan Enzim Selulase Dari *Bacillus Sp. BBPT CC RK2*". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Anggarani, Mirwa Adhiprahara, dkk. "Identifikasi Protein Spesifik Biofil *Candida Albicans* Sebagai Target Penentuan Protein Spesifik Antigenik". *J. Prosiding Seminar* (2014): h. 49-60.
- Anonim. *Final Screening Assessment for Candida utilis ATCC 9950*. Canada: Environment and Climate Change, 2016.
- Apriani, K. Haryani dan Y Kartika. "Produksi dan Uji Aktivitas Selulase Dari Isolat Bakteri Selulolitik Sungai Indragari". *J. FMIPA* 1, no. 2 (2014): h: 261-267.
- Ariyani, Sukma Budi, dkk. "Optimasi Waktu Inkubasi Produksi Enzim Selulase Oleh *Aspergillus Niger* Menggunakan Fermentasi Substrat Padat". *J. Biopropal Industri* 5, no.2 (2014): h. 61-67.
- Bahri, dkk. "Karakterisasi Enzim Amilase Dari Kecambah Biji Jagung Ketan (*Zea Mays Ceratina L.*). *J. Natural Science* 1, no. 1 (2012): h. 132-143.
- Faudi, AM dkk. "Pengaruh Kadar Glukosa Dan Waktu Inokulasi Pada Optimasi Pembuatan Enzim Selulase Dengan Menggunakan Jamur *Aspergillus Niger* dan Substrat Kertas". *J. Simposium Nasional* 10, no. 4 (2015): h. 186-192.
- Hasanah, Nur dan Iwan Saskiawan. "Aktivitas Selulase Isolat Jamur Dari Limbah Media Tanam Jamur Merang". *J. Prosedim Seminar Masyarakat Biodiv Indonesia* 1, no.5 (2015): h. 1110-1115.
- Idiawati, Nora, dkk. "Produksi Enzim Selulase Oleh *Aspergillus Niger* Pada Amapas Sagu". *J. Natur Indonesia* 16, no. 1 (2014): h. 1-9.
- Irawati, Rosyida. "Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat Pada Enzim Selulase Kasar Yang Diproduksi Oleh *Bacillus Circulans*". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Kamila, Laila. "Pencirian Selulolitik Isolat Khamir *Rhodotorula sp.* Dari Tanah Hutan Taman Nasional Gunung Halimun" *J. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan IPA, IPB* (2003), h. 3.
- Kanti, Atit. "Identifikasi Jenis Khamir Yang Diisolasi Dari Tanah Gambut Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi". *J. Bio Smart* 6, no. 1 (2014): h. 10-14.
- Kanti, Atit, dkk." Aktivitas CMC Ase Khamir *Candida Sp* Yang Diisolasi Dari Tanah Kebun Biologi Waenena, Papua". *J. Berita Biologi* 6, no. 5 (2003): h. 655-660.
- Kasmiran, Ariani dan Tarmizi. "Aktivitas Enzim Selulase Dari Kapang Selulolitik Pada Substrat Ampas Kelapa". *J. Lentera* 12, no. 1 (2012): h. 9-14.
- Miller, G L. "Use Of Dinitrosalicylic Acid Reagent For Determination Of Reducing Sugar". *J. Anal Chem* 31, (1980): 35-428.

- Monica. "Studi Aktivitas Spesifik Selulase Dari *Lactobacillus collinoides* yang Dimurnikan Dengan Pengendapan Bertingkat Amonium Sulfat". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Oktavia, Yulia, dkk. "Karakteristik Enzim Kasar Selulase Kapang Endofit dari Lamun". *J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 6, no. 1 (2014): h. 209-218.
- Pelczar, Michael J dan E.C.S Chon. *Elements of Microbiology*, Terj. Ratna Sri Hadioetomo, Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Poedjiadi, Anna dan F.M. Titin Supriyanti. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Putri, Syarafani. "Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Oleh *Lactobacillus Plantarum* Pada Variasi Suhu, pH Dan Konsentrasi Substrat". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Sari, R. F. "Optimasi Aktivitas Selulase Ekstraseluler Dari Isolat Bakteri RF-10. *Skripsi* Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Saropah. "Kinetika Reaksi Enzimatik Ekstrak Kasar Enzim Bakteri Selulolitik Hasil Isolasi Dari Bekatul". *J. Alchemy* 2, no. 1 (2012): h: 34-45.
- Sastri, I Gst Ayu Ananda Dama, dkk. "Optimasi Konsentrasi Substrat Kulit Singkong *Manihot Esculenta Crantz* dan Lama Fermentasi Terhadap Aktivitas Filter Paperase Dari Kapang *Trichoderma Viride* FNCC 6013". *J. Teknologi Industri Pertanian* (2014): h. 31-37.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinatari, H.M, dkk. "Pemurnian Selulase dari Isolat KB Kompos Termofilik Desa Bayat Klaten menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat" *J. Chem Info* 1, no. 1 (2013): 130-140.
- Suharmanto, Edi dan Kurniawan. "Adapatif Probe Serat Optik Untuk Spektromter Genesys Ion UV-Vis Generasi Kedua". *J. Sains Dan Seni* 2, no. 1 (2013): h. 2337-3520.
- Sukumaran, R.k., Singhanis. R.R, Pandhs, A.S 2005. "Microbial Cellulases Production, Application and Challenges". *JOf Science and Industrial Reseach* 4: 832-844.
- Supriyatna, Ateng, dkk. "Aktivitas Enzim Amilase, Lipase dan Protoase Dari Larva *Hermetia Illucens* Yang Diberikan Pakan Jerami Padi". *J. Biokimia* 5, r (2015): h. 18-31.
- Triyati, ETTY. "Spektrofotometer Ultraviolet Dan Sinar Tampak Serta Aplikasinya Dalam Oseanologi". *J. Oseana* 10, no. 1 (1985): h. 39-47.
- Ulfa, Anggati, dkk. "Kemampuan Degradasi Selulosa Oleh Bakteri Selulolitik Yang Diisolasi Dari Tanah Gambut". *J. Protobioat* 3, no. 2 (2014): h. 259-267.
- Utarti, Esti, dkk. "Skrining Dan Identifikasi Kapang Selulolitik Alkalin Pada Jerami Padi Asal Sawah Pantai Watu Ulo Jember". *J. Ilmu Dasar* 13, no 1 (2012): h. 17-33.

- Wahyuningtyas, dkk. “Studi Pembuatan Enzim Selulase Dari Mikrofungi *Trichoderma Reesei* Dengan Substrat Jerami Padi Sebagai Katalis Hidrolisis Enzimatik Pada Produksi Bioetanol”. *J. Bioproses Komeditas Tropis* 1, no 1 (2013): 21-25.
- Wijanarka, dkk. “Produksi Enzim Inulinase *Pichia Alni Ducc-W4* Pada Tepung Umbi Dahli (*Dahlia Variblis Wild*) Dengan Variasi KOnsentration Ammonium Nitrat Dan Waktu Inkubasi”. *J. Bioma* 10, no 2 (2008): h. 58-64.
- Winugroho, M dan Y Widiawati. “*Candia Utilis* Sebagai Pengganti *Saccharomyces Cerevesiase* Pendamping Bioplus Untk Meningkatkan Produksi Ternak”. *J. Seminar Nasional* (2003): h. 1 42-1 45.
- Wulandari, Endah, dkk. “Limbah Molas: Pemanfaatan Sebagai Sumber Karbohidrat Untuk Perkembangan Biakan Mikroorganism”. 2, no 5 (2012): h. 565-572.
- Yanlinastuti, dkk. “Penentuan Kadar Zirkonium Dalam Panduan U-Zr Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Dengan Mengguanakn Pengompleks Arzenazo III”. (2011): h. 567-576.



### Lampiran I Skema Penelitian





**Lampiran II Kerja Penelitian**

**a. Pembuatan Media Inokulum**

CMC



- Ditimbang 0,1 g, 0,04 g  $MgSO_4$ , 0,15 g  $KNO_3$ , 0,1 g  $K_2HPO_4$ , 0,004 g  $CaCl_2$ , dan 0,4 g *yeast extract*
- Dimasukkan semua bahan ke dalam erlenmeyer 250 mL, kemudian menambahkan aquades sebanyak 100 mL
- Dipanaskan hingga mendidih sambil mengaduk hingga larut
- Diautoklaf pada suhu  $121^\circ C$  dan tekanan 1 atm selama 15 menit  
Ditutup erlenmeyer dengan kapas, kemudian mensterilisa ke
- Didinginkan hingga suhu ruang sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya

Media Inokulum

#### b. Penyiapan Inokulum

Isolat khamir *Candida Utilis*  
yang sudah diremajakan

- Diambil lima ose ke dalam media inokulum
- Diinkubasi pada *waterbath shaker incubator* dengan kecepatan 130 rpm pada suhu  $37^\circ C$  selama 24 jam

Inokulum

#### c. Pembuatan Media CMC Brot 1% (b/v)

CMC

- Ditimbang 5 g, 0,2 g  $MgSO_4$ , 0,75 g  $KNO_3$ , 0,5 g  $K_2HPO_4$ , 0,02 g  $CaCl_2$ , dan 2 g *yeast extract*

- Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL, kemudian menambahkan aquades sebanyak 500 mL
- Dipanaskan hingga mendidih sambil mengaduk hingga larut
- Diautoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit  
Ditutup erlenmeyer dengan kapas, kemudian mensterilisa ke
- Didinginkan hingga suhu ruang sebelum digunakan untuk tahap selanjutnya

Media CMC Brot 1%

#### d. Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase

Inokulum

- Diambil sebanyak 37,5 mL ke dalam 500 mL media CMC *broth* 1%
- Diinkubasi pada *waterbath shaker incubator* dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 37°C selama 5×24 jam
- Disentrifugasi menggunakan sentrifus kultur dingin pada kecepatan 12.000 rpm pada 4°C selama 10 menit


Supernatan

- Disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan dari residu padatan


- Disimpan dalam lemari pendingin agar dapat digunakan untuk tahap berikutnya.

Ekstrak Kasar Enzim

#### e. Pembuatan Reagen DNS



#### f. Pembuatan Larutan Standar Glukosa




#### g. Pembuatan Standar Glukosa

Larutan Standar Glukosa Dengan Variasi Konsentrasi

- Diambil masing-masing 1 mL ke dalam tabung reaksi
- Ditambah 1 mL reagen DNS dan homogenkan
- Ditunggalkan dengan aluminium foil dan dipanaskan pada air mendidih selama 5 menit sampai larutan merah-coklat

Larutan Standar Glukosa

#### **h. Pengujian Aktivitas Enzim Selulase Dengan Metode DNS**



#### **i. Optimasi Variasi Substrat**

2 mL ekstrak kasar enzim

- Ditambah 2 mL substrat CMC, 2 mL substrat *avicel*, 0,75 mL kertas saring
- Ditambah 2 mL buffer fosfat pH 7 pada suhu 50 °C selama 30 menit
- Diuji aktivitas enzim dengan menggunakan metode DNS

Substrat Optimun

#### j. Optimasi Konsentrasi Substrat

2 mL ekstrak kasar enzim

- Ditambah 2 mL substrat optimum dengan konsentrasi berbeda 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 %
- Ditambah 2 mL buffer fosfat pH 7
- Diinkubasi pada suhu 50 °C selama 30 menit
- Diuji aktivitas enzim dengan menggunakan metode DNS

Konsentrasi Substrat  
Optimun

#### k. Optimasi pH

2 mL ekstrak kasar enzim


- Ditambah 2 mL substrat konsentrasi optimum
- Ditambah 2 mL buffer asetat (pH 3,0-6,0) dan fosfat (pH 7,0-9,0)
- Diinkubasi pada suhu 50 °C selama 30 menit
- Diuji aktivitas enzim dengan menggunakan metode DNS

#### l. Substrat pH Optimun

2 mL ekstrak kasar enzim

- Ditambah 2 mL substrat pH optimum
- Ditambah 2 mL buffer fosfat pH 7
- Diinkubasi dengan perbedaan suhu yakni 30-60<sup>0</sup>C selama 30 menit
- Diuji aktivitas enzim dengan menggunakan metode DNS

Substrat Suhu Optimum



### **Lampiran III Pembuatan Larutan Buffer**

#### **III.3.1 Pembuatan Larutan Buffer Fosfat pH 6,7 dan 8**

Larutan buffer fosfat dibuat dengan mencampurkan larutan A dan larutan B. Larutan A dibuat dengan menimbang 17,799 g natrium hidrogen fosfat ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) kemudian menambahkan 1 liter *water one*. Larutan B dibuat dengan menimbang 15,601 g natrium dihidrogen fosfat ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ).

a. Larutan Buffer Fosfat pH 6

Mencampurkan larutan A sebanyak 12,3 mL dan larutan B sebanyak 87,7 mL.

b. Larutan Buffer Fosfat pH 7

Mencampurkan larutan A sebanyak 61,1 mL dan larutan B sebanyak 87,7 mL.

c. Larutan Buffer Fosfat pH 8

Mencampurkan larutan A sebanyak 94,7 mL dan larutan B sebanyak 5,3 mL.

### III.3.2 Pembuatan Larutan Buffer Asetat pH 4 dan 5

Larutan buffer asetat dibuat dengan mencampurkan larutan A dan larutan B. Larutan A dibuat dengan melarutkan 12 mL asam asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) dalam 100 mL *water one* dan larutan B dibuat dengan menimbang 2,7 g natrium asetat ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ) kemudian menambahkan 100 mL *water one*.

a. Larutan Buffer Asetat pH 4

Mencampurkan larutan A sebanyak 80 mL dan larutan B sebanyak 20 mL.

b. Larutan Buffer Asetat pH 5

Mencampurkan larutan A sebanyak 30 mL dan larutan B sebanyak 70 mL.

## Lampiran IV Pembuatan Kurva Standar Glukosa

### IV.4.1 Pembuatan Larutan Standar Glukosa

Cara membuat larutan stok glukosa adalah

$$\frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} = \frac{10 \text{ mg}}{10 \text{ ml}} = \frac{25 \text{ mg}}{25 \text{ ml}} = \frac{0,025 \text{ g}}{25 \text{ ml}}$$

untuk membuat larutan standar 25 mg/mL dibutuhkan 0,025 g glukosa, dilarutkan dengan *water one* sebanyak 25 mL. Kemudian larutan glukosa dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 dan 0,8 mg/mL sebanyak 5 mL. Dibuat sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus pengenceran sebagai berikut:

a. Konsentrasi 0,1 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1.M_1 &= V_2.M_2 \\ V_1. 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL}.0,1 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 0,5 \text{ mL larutan stok glukosa} + 4,5 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

b. Konsentrasi 0,2 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1.M_1 &= V_2.M_2 \\ V_1. 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL}.0,2 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 1 \text{ mL larutan stok glukosa} + 4 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 0,4 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1.M_1 &= V_2.M_2 \\ V_1. 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL}.0,4 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 2 \text{ mL larutan stok glukosa} + 3 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 0,6 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1.M_1 &= V_2.M_2 \\ V_1. 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL}.0,6 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 3 \text{ mL larutan stok glukosa} + 2 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$


e. Konsentrasi 0,8 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1.M_1 &= V_2.M_2 \\ V_1. 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL}.0,8 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 4 \text{ mL larutan stok glukosa} + 1 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

#### IV.4.2 Data Hasil Absorbansi

No	Konsentrasi Glukosa mg/mL	Absorbansi
1	0	0
2	0,1	0,1547
3	0,2	0,2871
4	0,4	0,5720
5	0,6	0,8439
6	0,8	1,0511

#### IV.4.3 Kurva Standar Glukosa



#### Lampiran V Penentuan Aktivitas Enzim Selulase Dengan Metode DNS

Aktivitas enzim selulase menunjukkan kecepatan transformasi substrat yang dapat dikatalis oleh enzim. Unit aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai satu mikromol produk yang dihasilkan oleh hidrolisis substrat pada kondisi tertentu (jenis substrat, konsentrasi substrat, pH dan suhu) per menit. Perhitungan aktivitas enzim selulase dilakukan dengan menggunakan rumus penentuan aktivitas enzim sebagai berikut:

#### a. Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

##### 1. Substrat CMC

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1994 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{199,4 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0369 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0369 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

##### 2. Substrat Avicel

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,5123 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{512,3 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0948 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0948 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

##### 3. Substrat Kertas Saring

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,3034 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{303,4 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0562 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0562 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

## b. Pengaruh Konsentrasi Substrat *Avicel* Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

### 1. Substrat *Avicel* Konsentrasi 0,5 %

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,0699 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{69,9 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0129 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0129 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

### 2. Substrat *Avicel* Konsentrasi 1 %

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1367 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{136,7 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0253 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0562 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

### 3. Substrat *Avicel* Konsentrasi 1,5 %

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1775 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{177,5 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0329 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0329 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

#### 4. Substrat Avicel Konsentrasi 2 %

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1782 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{178,2 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,033 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,033 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

#### 5. Substrat Avicel Konsentrasi 2,5 %

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1609 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{160,9 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0297 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0297 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

### c. Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

**1. Substrat Avicel Konsentrasi 2 % pH 4**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1589 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{158,9 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0294 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0294 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

**2. Substrat Avicel Konsentrasi 2 % pH 5**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1592 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{159,2 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0295 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0295 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

**3. Substrat Avicel Konsentrasi 2 % pH 6**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1982 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{198,2 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0367 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0367 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

**4. Substrat Avicel Konsentrasi 2 % pH 7**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,2265 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{226,5 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0419 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0419 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

#### 5. Substrat *Avicel* Konsentrasi 2 % pH 8

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1658 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{165,8 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0307 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0307 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

#### d. Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

##### 1. Substrat *Avicel* Konsentrasi 2 % pH 7 suhu 30°C

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,3953 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{395,3 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0732 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0732 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

##### 2. Substrat *Avicel* Konsentrasi 2 % pH 7 suhu 40°C

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,2481 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{248,1 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0459 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0459 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$


### 3. Substrat *Avicel* Konsentrasi 2 % pH 7 suhu 50°C

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,2108 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{210,8 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0390 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0390 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$


### 4. Substrat *Avicel* Konsentrasi 2 % pH 7 suhu 60°C

$$\begin{aligned}
 \text{Aktivitas enzim} &= \frac{C}{Mr \text{ Glukosa}} \times \frac{Fp}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1950 \text{ mg/mL}}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{30 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{195 \mu\text{mol}}{5400 \text{ mL.menit}} \\
 &= 0,0361 \mu\text{mol/mL.menit} \\
 &= 0,0361 \text{ Unit/mL}
 \end{aligned}$$

a. Proses Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase



Media inokulum




Media inokulum + isolat



Media produksi + inokulum

Setelah inkubasi



Media produksi + inokulum



Proses *Sentrifuse*



Ekstrak Kasar Enzim Selulase

### b. Proses Optimasi Jenis Substrat



Ekstrak Kasar Enzim Selulase  
+ Substrat + buffer fosfat pH 7,  
diinkubasi

### c. Proses Optimasi Konsentrasi Substrat



Substrat *Avicel* Konsentrasi  
0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0% dan  
2,5%




Ekstrak Kasar Enzim Selulase  
+ Substrat *Avicel* + buffer  
fosfat pH 7, diinkubasi

#### d. Proses Optimasi pH



Buffer Fosfat



Buffer Asetat




Ekstrak Kasar Enzim Selulase  
+ Substrat *Avicel* + buffer  
Variasi pH, diinkubasi

#### e. Proses Optimasi Suhu



Ekstrak Kasar Enzim Selulase +  
Substrat *Avicel* + buffer Variasi pH,  
diinkubasi

f. ]Proses Pengujian Aktivitas Enzim Selulase Menggunakan Metode DNS




Pereaksi DNS



Standar Glukosa



Ekstrak Kasar Enzim Selulase  
+ Substrat + buffer, yang telah  
diinkubasi+ pereaksi DNS



Pengukuran Spektrofotometer

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul “**Karakterisasi Enzim Selulase Yang Dihasilkan Dari Khamir *Candida utilis***” bernama lengkap Nada Pertiwi Papriani dilahirkan di Ujung pandang pada tanggal 17 Januari 1995. Penulis adalah putri pertama dari pasangan Bapak Suprianto dan Ibu Suprapti. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Penulis mulai menekuni bangku sekolah dasar di SD Negeri Center Manggalli pada usia 7 tahun, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP. Negeri 1 Pallangga pada tahun 2007. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 16 Makassar pada tahun 2010 dan penulis melanjutkan pendidikan S1-nya tahun 2013 di UIN Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN dengan mengambil Jurusan Kimia hingga lulus pada tahun 2017 dengan gelar Sarjana Sains (S.Si).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R