

**ABSORBSI LOGAM BERAT KADMIUM (Cd) PADA CUMI
CUMI (*Loligo sp*) DI PULAU LAE-LAE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains jurusan
Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

LINDAWANTI
NIM. 60300113038

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lindawanti
NIM : 60300113038
Tempat/Tgl. Lahir : Gollek, 06 Maret 1993
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Mustafa, dg Bunga Paccinongan
Judul : Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi
(*Loligo sp*) di Pulau Lae-lae.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar,

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lindawanti

NIM: 60300113038

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Lindawanti**, Nim: 60300113038, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama Skripsi yang berjudul, “**Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi (*Loligo sp*) di Pulau Lae-lae**”, Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Makassar,



Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd
Pembimbing II



Sitti Saenab, S.Pd., M., Pd
Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi (*Loligo Sp*)”, yang disusun oleh Lindawanti, NIM: 60300113038, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 September 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 18 September 2017 M
28 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si. M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Fatmawati Nur, S.si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Th. I	(.....)
Pembimbing I	: Siti Saenab, S.S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani Latif A. S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi (*Loligo* sp) Di Pulau Lae-lae”, Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam serta shalawat tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Tandir dan Agustiani, serta saudaraku selalu memberi Do'a, semangat, dukungan dan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi .

3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si.,M.Kes, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Baiq Fahratul Wahidah, S.Si.,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Siti Saenab S.Pd.,M.pd dan Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si.,M.Pd, selaku pembimbing I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan Skripsi.
5. Seluruh staf jurusan, staf akademik, terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Laboratorium Riset dan Laboratorium An Organik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membimbing dan membantu penulis selama penelitian.
7. Angkatan biologi BRACHIALIS yang dari awal sampai sekarang berjuang bersama hingga menuju jenjang berikutnya.
8. Teman-teman seperjuanganku, Muhammad Maslan, Siti Latifah Wulandari, Sriwahyuni, Inna Shintia, Retno Budiati, Dewi Fitiana, Yul Fitriani, Nur Aeni, dan Siti Nurhajja Bakri yang telah membantuku selama pengambilan sampel terkhusus untuk sepupuku Takbir dalam proses pengambilan sampel untuk penelitian ini terima kasih banyak atas do'anya serta dukungannya.
9. Keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Tekhnologi yang sampai sekarang masih sama-sama merasakan suka duka di Biologi.
10. Adik-adik jurusan Biologi angkatan 2014, 2015 dan 2016

11. Teman-teman KKN angkatan 53 Kecamatan Tombolo pao Desa Tonasa
12. Keluarga besar Graha Suranda Permai yang selama ini telah memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa hanya kepada Allah swt. saya menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan dan Ridho dari-Nya, Amiin.



Makassar,
Penyusun

Lindawanti
NIM: 60300113038

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ILUSTRASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang	1-8
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8-9
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	9-12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-42
A. Ayat dan Hadis yang Relevan	13-15
B. Tinjauan Umum Logam Berat.....	15-17
C. Kadmium (Cd).....	17-21
D. Bahaya kadmium (Cd) Pada Tubuh Manusia.....	21-23
E. Dampak Kontaminasi Kadmium.....	23-24
F. Pencemaran Dan Akumulasi Kadmium (Cd).....	24-31
G. Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp).....	31-35
H. Ciri Tubuh Molusca.....	37-38
I. Persiapan Sampel Dengan Destruksi Basah.....	38-39
J. Pulau Lae-lae.....	39-41
K. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43-48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Variabel Penelitian.....	44
E. Defenisi Operasional Variabel.....	44
F. Instrument Penelitian.....	44

G. Prosedur penelitian.....	45-47
H. Teknik Pengolahan Data.....	47-48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49-58
A. Hasil Penelitian	49-50
B. Pembahasan.....	50-58
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
KEPUSTAKAAN	60-63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64-76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas maksimum logam berat kadmium (Cd).....	24
Tabel 4.1	Kadar logam berat kadmium (Cd) pada daging cumi-cumi (Loligo sp)	49
Tabel L 2. 2.1	Data absorbansi sampel logam Cd.....	65
Tabel L 3. 3.1	Sampel pada stasiun I.....	68
Tabel L 3. 3.2	Sampel pada stasiun II.....	68
Tabel L 3. 3.3	Sampel pada stasiun III.....	68
Tabel L 4. 4.1	Rona Lingkungan perairan pulau Lae-lae.....	69



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1	Logam berat kadmium (Cd)	24
Gambar 2.2	Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp).....	37
Gambar 2.3	Peta pulau Lae-lae	41
Gambar 3.1	Lokasi pengambilan sampel.....	46
Gambar 4.1	Grafik logam berat kadmium (Cd) pada daging cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp) dititik 1 (sebelah utara), titik 2 (sebelah barat) dan titik 3 (sebelah selatan).....	50
Gambar L1.1	Alur skema.....	64
Gambar L 5. 5.1	Lokasi pengambilan sampel.....	70
Gambar L 5.2	Tempat penyimpanan sampel.....	70
Gambar L 5.3	Sampel Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp).....	71
Gambar L 5.4	Pengukuran sampel Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp)	71
Gambar L 5.5	Daging Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp) dibersihkan	72
Gambar L 5.6	Daging Cumi-cumi (<i>Loligo</i> sp) dihaluskan	72
Gambar L 5.7	Proses penimbangan sampel	73
Gambar L 5.8	Proses penambahan HNO ₃	73
Gambar L 5.9	Proses dekstruksi basah.....	74
Gambar L 5.10	Dekstruksi basah	74
Gambar L 5.11	Proses penyaringan	75
Gambar L 5.12	Menyimpan sampel di rak.....	75
Gambar L 5.13	Persiapan pembacaan sampel pada SSA.....	76
Gambar L 5.14	Pembacaan sampel pada SSA	76

ABSTRAK

Nama : Lindawanti
NIM : 60300113038
Judul Skripsi : Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi (Loligo sp) Di Pulau Lae-lae

Pangan hewan yang layak dikonsumsi harus memenuhi syarat keamanan pangan yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Cumi-cumi (*Loligo sp*) biota laut yang banyak ditemukan di pulau Lae-lae dan sangat digemari oleh masyarakat sebagai sumber protein, selain memiliki kandungan protein tinggi, cumi-cumi (*Loligo sp*) memiliki juga kemampuan dalam mengakumulasi logam tertentu dalam skala lebih besar dibandingkan hewan laut lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam berat kadmium (Cd) yang terakumulasi dalam daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) di pulau Lae-lae. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sampel diperoleh dari tiga stasiun. Kadar logam berat kadmium (Cd) dalam daging Cumi-cumi diukur dengan menggunakan metode SSA (Spektrofotometer Serapan Atom). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat kadmium (Cd) yang terkandung dalam daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) pada stasiun I sebanyak 0,19 mg/kg, pada stasiun II sebanyak 0,045 mg/kg, pada stasiun III sebanyak 0,06 mg/kg. Hasil ini menunjukkan bahwa daging cumi-cumi (*Loligo sp*) tidak melebihi baku mutu SNI yaitu 1,0 mg/kg dan menurut badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia (BPOM) yaitu 0,5 mg/kg, sehingga masih aman untuk dikonsumsi.

Kata kunci: Kadmium (Cd), Cumi-cumi (*Loligo Sp*), pulau Lae-lae.

ABSTRACT

Nama : Lindawanti
NIM : 60300113038
Judul Skripsi : Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-cumi (Loligo sp) Di Pulau Lae-lae

Animal food that is feasible to be consumed must meet food safety requirement that is safe, healthy, whole and halal. Cuttlefish (*Loligo sp*) of marine biota is commonly found on the island of Lae-lae and is very popular by the community as a source of protein, in addition to having high protein content, squid (*Loligo sp*) has also the ability to accumulate certain metals on a larger scale Compared to other marine animals. This study aims to determine the levels of heavy metals cadmium (Cd) that accumulates in the meat of the Cuttlefish (*Loligo sp*) on the island of Lae-lae. This type of research is qualitative research. Samples were obtained from three stations. The content of heavy metal cadmium (Cd) in Squid meat was measured using the SSA method (Atomic Absorption Specimeter). The results showed that the content of heavy metal cadmium (Cd) contained in the meat of squid (*Loligo sp*) at station I was 0.19 mg/kg, at station II as much as 0.045 mg/kg, at station III of 0.06 mg/kg. These results indicate that the meat of squid (*Loligo sp*) does not exceed the standard of SNI that is 1.0 mg/kg and according to the drug and food supervision body of the Republic of Indonesia (BPOM) is 0.5 mg/kg. Still safe to consumed.

Keywords: Cadmium (Cd), Cuttlefish (*Loligo Sp*), Lae-lae island.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya di dunia termasuk aktivitas berpikir, menelaah, menganalisis dan meneliti. Sebagai seorang ilmuwan muslim sebaiknya menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi untuk diteliti. Karena dalam al Qur'an memuat berbagai informasi ilmiah. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, namun masih banyak informasi yang belum ditemukan sehingga dilakukan pengkajian dan penelitian yang lebih banyak lagi dan diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia.

Allah swt. memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan atas segala sesuatu yang akan dimakan meskipun Allah telah memberikan segalanya kepada manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah/5: 96 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahannya:

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut (Mustafa, 1992), makna ayat menjelaskan halal bagi kalian apa yang diburu dari binatang laut kemudian mati, dan apa yang dihempaskan oleh laut dalam keadaan mati. Hal ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar Qatadah. Ringkasnya, menurut mereka, yang dimaksud dengan ta'amuhu ialah apa yang dapat diperoleh dan diburunya, manusia tidak perlu bekerja keras dan bersusah payah, seperti yang terapung di atas permukaannya, yang didamparkan ke pantai, dan yang terlihat ketika pasang surut, baik yang hidup maupun yang mati.

Sebagai manfaat bagi orang yang bermukim di negerinya di antara kalian, yang menikmati dengan memakan dan memanfaatkannya: di samping sebagai kesenangan bagi para musafir dari suatu negeri ke negeri lain, yang menjadikannya sebagai bekal, berupa ikan asin. Diharamkan atas kalian apa yang kalian buru di darat, sedang kalian dalam keadaan ihram, bukan yang diburu oleh orang lain, bukan pula yang diburu sebelum kalian ihram. Takutlah dan berhati-hatilah terhadap Allah dengan mentaati-Nya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kalian dan dalam meninggalkan segala larangan-Nya, seperti meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, memburu dan membunuh binatang buruan darat di waktu ihram, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada-Nya, lalu menyiksa kalian karena mendurhakai-Nya dan memberi kalian pahala karena mentaati-Nya.

Manusia harus selalu menjaga kelestarian alam di muka bumi dengan tidak membuat pencemaran. Tuhan telah menetapkan hukum keseimbangan dalam lingkungan hidup dan memberikan manfaat. Seluruh organisme merupakan suatu

kesatuan yang saling mempengaruhi, manfaat harus ditempatkan pada tempatnya sehingga memberikan manfaat bagi manusia. Allah swt mengingatkan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, berupa penundukkan-Nya untuk mereka kapal dan perahu, mengilhamkan kepada mereka cara membuatnya, penundukkan-Nya laut yang berombak besar sehingga mereka dapat berlayar di sana agar manusia memperoleh manfaat darinya seperti dapat menaikinya dan dapat mengangkut barang-barang mereka.

Begitu banyak kerusakan yang nampak dimuka bumi, ini baik di darat dan di laut, yang disebabkan karena ulah tangan manusia yang kufur dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberikannya, serta tidak mensyukuri nikmat Allah swt. Di darat terjadi penebangan pohon yang secara liar dan penggundulan tanah, dilaut begitu banyak pencemaran sehingga membuat produktifitas laut semakin menurun, dan pedoman dilaut sehingga kekayaan laut berkurang. Namun pada prinsipnya manusia menyadari balasan yang telah diberikan oleh Allah di dunia, sehingga Allah menghendakinya agar supaya manusia merasakan akibat perbuatannya, dengan menurunkan ujian kepada hamba-Nya yang membuat kerusakan, agar mereka kembali kejalan yang lurus.

Dan dijelaskan pula bahwa agar manusia memperhatikan atas segala sesuatu yang akan mereka makan. Memakan makanan yang halal, berarti bukan memakan makanan yang haram, tetapi makanan yang baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dengan berpedoman kepada al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah Saw bersabda tentang laut:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

Terjemahnya:

“Air laut suci, dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah)

Pangan hewani yang layak dikonsumsi harus memenuhi syarat keamanan pangan yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Jenis produk perikanan yang disukai masyarakat adalah Cumi-cumi (*Loligo sp*). Cumi-cumi (*Loligo sp*) merupakan salah satu filum moluska yang banyak di jual di rumah makan dan pedagang kaki lima (Marganof, 2003).

Moluska merupakan sumber protein tinggi dan dapat dibudidayakan di perairan Indonesia dan perairan tropik lainnya. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani kepedulian masyarakat akhir-akhir ini akan pentingnya keamanan pangan dirasakan lebih meningkat karena adanya beberapa kasus keamanan pangan akibat kontaminasi dari beberapa sumber diantaranya mikroorganisme, peptisida, hormon, antibiotik dan logam berat.

Selain memiliki kelebihan dalam kandungan gizi, cumi-cumi (*Loligo sp*) juga memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat tertentu dalam skala yang lebih besar dibandingkan hewan laut lainnya salah satunya adalah logam berat Kadmiun (Cd). Hewan ini dapat mengakumulasi Kadmium sampai 352 kali tinggi dari pada kadar Cd yang terdapat dalam airnya (Darmono, 2001).

Terjadinya pencemaran di perairan laut dapat disebabkan oleh timbunnya zat polutan yang berasal dari aktivitas pelabuhan, tumpahan minyak dari kapal, limbah rumah tangga dan kegiatan industrialisasi. Limbah-limbah yang tidak dapat terdegradasi selanjutnya akan terakumulasi di perairan laut sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya wilayah reklamasi, perairan pesisir Kota Makassar dan sekitarnya, telah menjadi penyebab tercemarnya perairan laut pesisir Kota Makassar yang bersumber dari kegiatan industri, perikanan, pelabuhan, perhotelan, pariwisata bahari dan rumah tangga.

Pencemaran logam berat di lingkungan dapat terjadi secara alami maupun karena aktivitas manusia. Proses alami antara lain siklus alamiah sehingga bebatuan gunung berapi bisa memberikan kontribusi ke lingkungan, udara, air dan tanah. Kegiatan manusia dapat menambah polutan logam berat di alam melalui kegiatan industri, pertambangan, pembakaran bahan bakar, serta kegiatan domestik. Pencemaran logam baik dari industri, kegiatan domestik, transportasi maupun sumber alami dari batuan akhirnya akan sampai ke sungai atau laut dan selanjutnya mencemari manusia melalui ikan, air minum, air irigasi sehingga mengkontaminasi tanaman pangan. Sedangkan melalui udara dapat terjadi melalui kontak langsung atau inhalasi (Widowati, 2008).

Logam berat Kadmium adalah polutan di laut yang sangat berbahaya (Rompas, 2010). Salah satu sumber (Pb) berasal dari bahan bakar minyak dari perahu-perahu nelayan. Di dalam bahan bakar ini terdapat alkil timbal, logam bersifat tidak dapat diurai dan mudah terakumulasi dalam biota laut. Logam ini

masuk kedalam tubuh biota laut melalui insang, permukaan tubuh dan juga rantai makanan (Johari, 2009).

Logam berat dalam tubuh manusia biasanya terakumulasi pada beberapa organ tubuh seperti ginjal, hati, kuku, jaringan adiposa, dan rambut. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia bereaksi dengan gugus S pada enzim. Enzim yang telah terkontaminasi oleh logam berat tersebut menjadi tidak aktif. Hal ini mengakibatkan metabolisme tubuh akan terganggu. Apabila metabolisme tubuh mengalami gangguan yang lebih lanjut dapat mengakibatkan kematian (Saeni, 2000).

merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Kandungan Kadmium dalam daging cumi-cumi (*Loligo* sp) memiliki perbedaan dengan kerang darah yang memiliki ukuran besar. Tingginya kandungan Kadmium dapat disebabkan oleh banyak sumber logam Cd yang bersumber dari bebatuan dan tanah ke dalam perairan yang selanjutnya mengendap ke dasar. Selain itu, kerang darah *A.granosa* L. hidup di dasar perairan dan mendapatkan asupan makanan dari sedimen sehingga mudah terkontaminasi oleh logam berat dalam sedimen dan air yang memungkinkan logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh manusia ketika mengkonsumsinya. Akibatnya, dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil, sesak dada, kerongkongan kering, kemampuan mencium bau menurun, berat badan menurun dan gigi terasa ngilu serta berwarna kuning keemasan (Luthfillah, 2011).

Sumber kadmium terutama dari biji seng, timbal-seng, dan timbal-tembaga seng. Kandungan logam Cd bersumber dari makanan dan lingkungan perairan yang

sudah terkontaminasi oleh logam berat. Kontaminasi makanan dan lingkungan perairan tidak terlepas dari aktivitas manusia di darat maupun pada perairan. Sifat logam Cd yang akumulatif pada suatu jaringan organisme serta sulit terurai. Kadmium dalam air juga berasal dari pembuangan industri dan limbah pertambangan. Logam ini sering digunakan sebagai pigmen pada keramik, dalam penyepuhan listrik, dan baterai alkali.

Biokonsentrasi maupun bioakumulasi dapat menyebabkan peningkatan kepekaan bahan pencemar, sehingga umumnya berpengaruh masuknya di jaringan makhluk hidup (Connell dan Miller, 1995). Sedangkan menurut Pratama (2002) Biokonsentrasi adalah perpindahan senyawa kimia xenobiotik dari berbagai sumber di dalam lingkungan ke makhluk hidup, yang menghasilkan suatu kepekatan yang umumnya lebih tinggi di dalam makhluk hidup dibandingkan sumbernya.

Pulau Lae-lae merupakan pulau kecil dengan luas wilayah 0,22 km² dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 1639 jiwa. Fasilitas sanitasi yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas jauh dari standar kesehatan. Mata pencaharian penduduk di pulau Lae-Lae berprofesi sebagai nelayan juga berpengaruh terhadap sistem interaksi sosial masyarakat tersebut. Hal ini dapat diketahui karena biasanya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mengalami kerusakan mesin perahu ataupun jaring ikan. Masyarakat tersebut akan menuju atau lokasi mencari ikan sesuai nalurinya dan petunjuk alam dimana akan memperoleh hasil yang memadai untuk kehidupan keluarganya. Interaksi sosial juga biasa terjadi di dermaga dan perahu yang mengangkut masyarakat yang ingin

menyeberang ke pusat kota, interaksi terjadi dengan sendirinya karena berada dalam satu perahu (Nurmaida dkk, 2013).

Toksisitas logam pada manusia yang dapat menyebabkan terutama timbulnya kerusakan jaringan, terutama jaringan detoksifikasi dan ekskresi (hati dan ginjal). Beberapa logam mempunyai sifat karsinogenik (pembentuk kanker), maupun teratogenik (salah bentuk organ) (Darmono 1995). Biota perairan yang mempunyai peranan paling tinggi dalam penyerapan logam berat dalam perairan adalah jenis kepiting seperti kepiting, kerang dan beberapa jenis udang. Cumi-cumi hidup di air laut dengan ukuran yang beraneka ragam. Cumi-cumi merupakan biota perairan yang di habitatnya mempunyai ketahanan hidup yang baik (Bambang, 1995).

Dari uraian di atas maka penelitian mengambil suatu judul “Absorpsi Logam Berat Kadmium pada Daging Cumi-Cumi (*Loligo* sp) di pulau Lae-lae.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kadar Logam Berat Kadmium pada Daging Cumi-Cumi (*Loligo* sp) di pulau Lae-lae ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Kadmium merupakan logam yang lunak, berwarna putih kebiruan dan beracun. Afinitasnya pada golongan sulfhidril menginduksi kelarutannya dalam lemak yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya bioakumulasi dalam hati dan ginjal.

2. Cumi-cumi (*Loligo sp*) dikenal dengan cumi-cumi yang hidup didasar laut yang merupakan salah satu spesies *Loligo sp*. Bagian tubuh yang di uji adalah hati, ginjal dan dagingnya.
3. Sampel Cumi-cumi (*Loligo sp*) diperoleh hasil dari tangkapan nelayan pulau Lae lae.

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

1. Moesriati (1995) yang berjudul kadar logam berat Kadmuim ikan dan kerang di Pantai Kenjeran Surabaya menyatakan bahwa kadar logam berat Kadmium dalam daging kerang adalah 1,21 ppm. Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa kandungan logam berat Kadmium dalam kerang dan ikan di Pantai Kenjeran telah melampaui ambang batas kandungan logam berat Kadmium yang dianjurkan dalam hewan laut dalam hal ini kerang yang dikonsumsi oleh manusia adalah sebesar 0,1 ppm.
2. Trisnawati (2008) yang berjudul Logam berat Kadmium pada Bivalvia (kerang hijau) dipantai kenjeran Surabaya, bahwa salah satu jenis bivalvia (Kerang Hijau) telah terkontaminasi oleh logam berat Kadmium yang telah melebihi nilai ambang batas, yaitu pada insang rata-rata sebesar 50.23–70.39 ppm dan pada hati rata-rata sebesar 31.08–44.53 ppm sedangkan padaair laut sebesar 6.73-7.37 ppm. Berdasarkan penelitian Sulis tyowati (200) Nilai konsentrasi Cd pada otot ikan post juvenile (8-12 cm) sebesar 0,001200 mg/kg, muda (15-25 cm) sebesar 0,005233 mg/kg, dan dewasa (30-40 cm) sebesar 0,010233 mg/kg. Semua hasil

penelitian diatas menunjukkan bahwa kandungan logam berat Kadmium dalam kerang dan ikan di Pantai Kenjeran telah melampaui ambang batas kandungan logam berat Kadmium yang dianjurkan bahwa dalam hewan laut dalam hal ini kerang yang dikonsumsi oleh manusia adalah sebesar 0,1 ppm.

3. Zaki Safitri (2009) yang berjudul kesehatan lingkungan, kandungan logam Kadmium pada kerang hijau dengan menganalisis beberapa logam berat yaitu Hg, Cd, dan Pb. Sampel hasil laut yang dianalisis antara lain kerang hijau, kerang dara, ikan tongkol, ikan peda, ikan kembung, kerang batik, dan ikan pindang. Sampel hasil laut yang didapat dari pusat pelelangan ikan muara angke dan merupakan hasil tangkapan dari perairan Teluk Jakarta. Hasil analisis awal diketahui kandungan Kadmium paling banyak terdapat pada sampel kerang hijau yaitu sebesar 1,48 mg/kg konsentrasi ini telah melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu 1.0 mg/kg (BPOM, 2009): (SIN, 2009). Sedangkan konsentrasi logam Pb dalam kerang hijau sebesar 2,3 mg/kg juga telah melebihi baku mutu yaitu 1,5 (BPOM, 2009): (SIN, 2009). Konsentrasi dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi diperairan. Penelitian yang dilakukan di Teluk Jakarta pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa nilai kisaran rata-rata konsentrasi di sedimen berkisar antara 0,201-0,625mg/l. Sedangkan pada perairan menunjukkan nilai konsentrasi rata-rata sebesar 0,0040-0,010.
4. Winarni (2009) menyatakan bahwa spesies teripang yang tersebar di perairan Timur Surabaya ada tujuh spesies, yaitu: *Phyllophorus* sp, *Paracaudina australis*, *Colochirus quadrangularis*, *Holothuria sanctori*, *Holothuria* sp, *Holothuria*

- forskali*, dan *Holothuria turriscelsa*. Kelimpahan dan distribusi yang paling dominan berturut-turut adalah *Paracaudina australis*, *Phyllophorus* sp. dan *Colochirus quadrangularis* *Phyllophorus* sp. memiliki kelimpahan relatif sebesar 44,44% dibandingkan dengan spesies lainnya di perairan Timur Surabaya (Winarni, 2012)
5. Berdasarkan hasil penelitian Arjah (2012), diketahui bahwa konsentrasi timbal (Pb) tidak dapat terdeteksi, sedangkan logam merkuri (Hg) memiliki konsentrasi 0,1816 ppm pada sampel ikan glodok dan 0,0353 ppm pada sampel ikan bedukang yang berada di perairan Surabaya. Dilihat dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa perairan Surabaya tidak tercemar logam merkuri (Hg) dan timbal (Pb), namun masih memiliki potensi cemarannya. Untuk itu perlu adanya penelitian lagi, sehingga dapat memperkuat penelitian sebelumnya tentang kadar logam merkuri (Hg) dan timbal (Pb).
 6. Penelitian Arifin (2011) untuk analisis logam timbal (Pb) menggunakan sampel biota laut yang berada di Teluk Kelabat. Analisis logam ini menggunakan metode destruksi basah dengan instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Larutan pendestruksi yang digunakan adalah HNO_3 , Proses destruksinya yaitu dengan cara sampel dan campuran larutan HNO_3 dimasukkan ke dalam beaker glass. Kemudian dipanaskan pada suhu rendah atau sekitar 85°C selama 8 jam. Satu jam sebelum proses dihentikan, larutan sampel ditambahkan H_2O tetes per tetes sampai larutan bening. Setelah itu larutan sampel diencerkan dengan menggunakan labu takar 50 mL. Kemudian diuji kadarnya dengan menggunakan

alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil rata-rata kadar logam Pb pada biota laut yaitu sebesar 5,55 ppm. Perbandingan

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Logam Berat Kadmim (Cd) dan Daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) di Pulau Lae-lae.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat selaku konsumen mengenal kualitas cumi-cumi (*Loligo sp*) tentang kandungan logam berat Kadmium pada cumi-cumi (*Loligo sp*) tersebut yang diperoleh dari pulau Lae-lae.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bidang pengetahuan biologi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan literatur tambahan penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi baik yang berupa benda hidup maupun benda mati. seorang muslim seharusnya dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian jika akan melakukan sesuatu harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang ditimbulkannya agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al A'raf / 7 : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut (Shihab, 2010), makna ayat yang lalu melarang pelampauan batas, ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. karena itu, ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan

menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah perbaikan yang dilakukan oleh Allah dan atau siapa pun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyuk, dan lebih terdorong untuk menaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerah-Nya termasuk pengabulan doa kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.

Alam raya telah diciptakan Allah swt. Dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu ayat ini secara tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.

Ayat tersebut menerangkan kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan

lingkungan agar tidak rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah bersihkan kepada manusia semata-mata merupakan amanah.

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di permukaan bumi. Bahwa kerusakan itu mencakup kerusakan terhadap akal, akidah, tata kesopanan, pribadi, maupun sosial, sarana-sarana penghidupan, dan hal-hal yang bermanfaat untuk umum, seperti lahan-lahan pertanian, perindustrian, perdagangan dan sarana-sarana kerjasama untuk sesama manusia.

B. Tinjauan Umum Logam Berat

Logam-logam berat dalam perairan dapat bersumber berasal dari sumber alamiah dan dari aktifitas manusia. Sumber alamiah masuk ke dalam perairan bisa dari pengikisan batuan mineral yang kemudian terbawa oleh air sungai menuju laut. Di samping itu partikel logam yang ada di udara, karena adanya hujan dapat menjadi sumber logam dalam perairan. Adapun logam yang berasal dari aktifitas manusia dapat berupa buangan industri ataupun buangan dari rumah tangga dan juga disebabkan oleh lumpur saluran air kotor, limbah pertambangan, limbah peleburan logam, pemurnian, daur ulang, timbal yang mengandung produk manufaktur (bensin, cat, tinta cetak, pipa air utama, tembikar timbal-mengkilap, kaleng timah, casing baterai,) juga berkontribusi terhadap beban Timbal. Kelarutan logam-logam berat dalam badan air dikontrol oleh derajat keasaman air, jenis dan juga konsentrasi logam serta keadaan komponen mineral (Casas, 2006).

Logam berat berbahaya karena umumnya memiliki rapat massa tinggi dan sejumlah konsentrasi kecil dapat bersifat racun dan berbahaya. Logam berat dapat ditemui pada alat-alat rumah tangga (misalnya baterai), rokok, alat-alat elektronik, pipa air, bensin, udara, keramik, serta material lainnya. Konsentrasi logam berat pada barang tersebut kecil dan tidak berbahaya. Namun menjadi berbahaya bila terakumulasi dalam tubuh sehingga mengakibatkan keracunan, bahkan lebih fatal hingga berakibat kematian (Alloway, 2013).

Logam berat, seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenil (As), Kadmium (Cd), kromium (Cr), seng (Zn), dan nikel (Ni), merupakan salah satu bentuk materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup serius pada perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada perairan biasanya berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan. Logam berat memiliki densitas yang lebih dari 5 gram/cm^3 . Sifat yang menyebabkan logam berat semakin terakumulasi di dalam perairan. Logam berat yang berada di dalam air dapat masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Logam berat di dalam air dapat masuk secara langsung ke dalam tubuh manusia apabila air yang mengandung logam berat diminum, sedangkan secara tidak langsung apabila memakan bahan makanan yang berasal dari air tersebut. Di dalam tubuh manusia, logam berat juga dapat terakumulasi dan menimbulkan berbagai bahaya terhadap kesehatan (Darmono, 1995).

Unsur-unsur logam berat juga dibutuhkan oleh organisme hidup dalam berbagai proses metabolisme untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuhnya. Sebagai contoh, kobal (Co) dibutuhkan untuk pembentukan vitamin B12, besi (Fe) dibutuhkan untuk pembuatan hemoglobin, sedangkan seng (Zn) berfungsi dalam enzim-enzim dehidrogenase. Tetapi unsur logam berat dalam jumlah yang berlebihan akan bersifat racun (Phillips, 1980).

Dalam jumlah debit yang besar logam akan terkontaminasi pada air limbah, industri bantalan logam berat, seperti Cd, Cr, Cu, Ni, As, Pb, dan Zn yang paling berbahaya di antara industri kimia intensif karena kelarutan tinggi di lingkungan perairan, logam berat dapat diserap oleh organisme hidup setelah memasuki rantai makanan, konsentrasi besar logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Jika logam yang terserap di luar konsentrasi, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius (Babel dan kurniawan, 2004).

C. Kadmium

Kadmium (Cd) adalah salah satu logam berat dengan penyebaran yang sangat luas di alam, logam ini bernomor atom 48 berat atom 112,40 dengan titik cair 321°C dan titik didih 765°C. Di alam kadmium bersenyawa dengan belerang (S) (ZnS). Kadmium merupakan logam lunak (ductile) berwarna putih perak dan mudah teroksidasi oleh udara bebas dan gas amonia (Palar, 2008).

Logam berat Kadmium di air kebanyakan dijumpai dalam bentuk ion. Kadmium dalam air berbentuk senyawa klorida (CdCl_2), sedangkan dalam air tawar berbentuk karbonat (CdCO_3). Pada air payau, biasanya pada daerah muara dan pantai, kedua senyawa tersebut jumlahnya berimbang. Logam berat berbahaya terakumulasi oleh biota laut diserap melalui insang dan saluran pencernaan. Logam berat Cd dapat di timbul dalam jaringan dan berikatan dengan protein dimana disebut dengan metalotionein (MTN) yang bersifat agak permanen dan mempunyai waktu yang cukup lama (Darmono, 1995).

Kadmium merupakan salah satu unsur kimia yang banyak di manfaatkan pada berbagai industri, seperti pelapisan logam, pewarnaan baterai, minyak pelumas dan bahan bakar. Kadmiun sering menjadi polutan berbahaya di ekosistem perairan. Akumulasi logam Cd dalam tubuh makhluk hidup yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan berbagai kerusakan dan disfungsi organ serta gangguan metabolisme tubuh, seperti kerusakan ginjal, jantung, kanker paru paru, kerapuhan tulang dan kerusakan sel-sel darah (Vicar, 2007).

Logam kadmium sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Prinsip dasar atau prinsip utama dalam penggunaan kadmium adalah sebagai bahan “stabilisasi” sebagai bahan pewarna dalam industri plastik dan pada elektroplating. Namun sebagian dari substansi logamkadmium ini juga digunakan untuk solder dan alloy-alloynya digunakan pula pada baterai. Umumnya logam kadmium (Cd) senyawa oksida dari kadmium (CdO), hidrat (CdH_2), dan

Khloridanya paling banyak digunakan dalam industri elektroplating. Selain itu banyak digunakan dalam industri-industri ringan, seperti pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan minuman, industri tekstil dan lain-lain, banyak dilibatkan senyawa-senyawa yang dibentuk dengan logam Cd, meskipun penggunaannya hanyalah dengan konsentrasi yang sangat rendah (Cobb, 2008).

Kadmium menjadi populer sebagai logam berat yang berbahaya setelah timbulnya pencemaran sungai di wilayah Kumamoto Jepang yang menyebabkan keracunan pada manusia. Pencemaran Kadmium pada air minum di Jepang menyebabkan penyakit. Gejalanya ditandai dengan ketidaknormalan tulang dan beberapa organ tubuh menjadi mati. Keracunan kronis yang disebabkan oleh Cd adalah kerusakan sistem fisiologis tubuh seperti pada pernapasan, sirkulasi darah, pencernaan, serta merusak kelenjer reproduksi, ginjal, jantung dan kerapuhan tulang (Agustina, 2010).

Logam kadmium selalu dikeluarkan dalam suatu proses peleburan dan pemurnian logam timah, besi, tembaga maupun emas. Suatu pabrik yang memproduksi logam sulfida selalu menimbulkan pencemaran kadmium di alam lingkungannya. Daya penguapan kadmium di daerah industri logam dapat menaikkan pencemaran logam yang bersangkutan, tidak hanya udara bahkan tanah dan tanamanpun dapat tercemar (Darmono, 2008).

Kadmium mudah diserap oleh zat-zat organik dalam tanah dan menjadi sangat berbahaya jika Kadmium dalam tanah tersebut diserap melalui makanan, hal

ini bisa terjadi karena tanah yang mengandung Kadmium akan diserap oleh tanaman dan dimakan oleh hewan yang hidupnya tergantung pada tanaman. Kadmium dapat terakumulasi dalam tubuh hewan yang dimakan manusia (Agustina, 2010).

Pencemaran logam berat pada tanaman sumbernya bisa didapat dari pupuk, pestisida, air yang dipakai untuk menyiram, atau bahkan dari udara sekitar. Masih banyak pemakaian pupuk organik (sintetis) yang mengandung logam berat Kadmium, walau jumlahnya tidak banyak, jika tanah secara rutin diberi pupuk serupa, tentu saja kadar Cd-nya akan terakumulasi dan diserap oleh sayuran yang tumbuh dilahan tersebut. Sementara itu Kadmium dalam ekosistem air dapat terakumulasi dalam kupang, tiram, udang, udang laut dan ikan. Kepekaan terhadap Kadmium dapat sangat bervariasi antara organisme air. Organisme air asin diketahui lebih resisten terhadap keracunan Kadmium dari pada organisme air tawar (Agustina, 2010).

Logam kadmium akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Logam ini masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang dikonsumsi, tetapi makanan tersebut telah terkontaminasi oleh logam Cd dan atau persenyawaannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan. Di samping itu, tingkatan biota dalam sistem rantai makanan turut menentukan jumlah Cd yang terakumulasi. Di mana pada biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi Cd yang lebih banyak, sedangkan pada biota top level

merupakan tempat akumulasi paling besar. Bila jumlah Cd yang masuk tersebut melebihi ambang maka biota dari suatu level atau strata tersebut akan mengalami kematian dan bahkan kemusnahan (Nowrouzi, et. al., 2012).

Logam berat pada umumnya mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi organisme hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Beberapa logam berat banyak digunakan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Secara langsung maupun tidak langsung toksisitas dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Apabila kadar logam berat sudah melebihi ambang batas yang ditentukan dapat membahayakan bagi kehidupan (Koestoer, 1995).

D. Bahaya Logam Kadmium (Cd) pada manusia

Kadmium adalah logam berat yang bersifat kumulatif dan sangat toksik bagi manusia karena dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal serta merusak lingkungan perairan (Marganof, 2003). Sekali Cd masuk ke dalam tubuh, maka akan lama sekali keluarinya dan disimpan dalam ginjal (Darmono, 1995).

Kadmium merupakan logam berat yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Salah satu dampak keracunan Cd adalah penyakit tulang yang menimbulkan rasa nyeri. Keracunan logam Cd dalam waktu lama dapat membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, ginjal, kelenjar reproduksi, berefek pada otak, dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Logam Cd juga bersifat

neurotoksin yang menimbulkan dampak kerusakan indera penciuman (Petrucci, 1987).

Logam beracun kadmium dapat dibawa ke dalam tubuh oleh seng yang terikat dalam protein (dalam hal ini adalah struktur protein yang mengandung rantai seng). Seng dan kadmium berada dalam satu grup dalam susunan unsur berkala, mempunyai bilangan oksidasi yang sama (+2), jika terionisasi akan membentuk partikel ion yang berukuran hampir sama. Dari banyak kesamaan tersebut, maka kadmium dapat menggantikan rantai seng dalam banyak sistem biologi (organik). Ikatan kadmium dalam zat organik mempunyai kekuatan 10 kali lebih besar dibandingkan dengan seng jika terikat dalam zat organik. Sebagai tambahan, kadmium juga dapat menggantikan magnesium dan kalsium dalam ikatannya dengan struktur zat organik (Palar, 2008).

Kadmium bersumber dari aktivitas alamiah dan antropogenik. Secara alamiah Cd didapat dari letusan gunung berapi, jatuhnya atmosferik, pelapukan bebatuan, dan jasad organik yang membusuk. Logam Cd juga didapat dari kegiatan manusia, yaitu industri kimia, pabrik tekstil, pabrik semen, tumpahan minyak, pertambangan, pengolahan logam, pembakaran bahan bakar, dan pembuatan serta penggunaan pupuk fosfat. Dalam kehidupan sehari-hari, mainan anak-anak, fotografi, tas dari vinil, dan mantel merupakan sumber Cd (Darmono, 1995).

Logam berat yang mencemari lingkungan, sebagian besar disebarkan melalui jalur air. Proses ini akan lebih cepat bila memasuki tubuh manusia melalui rantai

makanan. Apabila suatu logam terakumulasi pada jaringan hewan dan tumbuhan yang kemudian dikonsumsi manusia tentunya manusia sebagai rantai makanan tertinggi pada piramida makanan, maka dalam tubuhnya akan terakumulasi logam berat tersebut. Peristiwa ini biasanya dinamakan pembesaran biologi (biology magnification). Pembersihan lingkungan yang tercemar oleh logam berat tersebut sangatlah sukar dilakukan. Oleh karena itu, salah satu pengendalian pencemaran lingkungan akibat logam berat diperlukan melalui pembatasan kandungan maksimum logam berat dalam suatu limbah yang akan dibuang ke badan air.

E. Dampak kontaminasi Kadmium

Didalam tubuh, Kadmium diangkut ke hati oleh darah. Selanjutnya akan membentuk ikatan dengan protein dan diangkut ke ginjal. Dan terakumulasi di ginjal, jika terkontaminasi akan mengganggu fungsi ginjal dan kerusakan ginjal dampak lainnya adalah diare, sakit perut dan muntah-muntah, keretakan tulang, kegagalan reproduktif bahkan ketidaksuburan/kemandulan, Kerusakan sistem syaraf pusat, kerusakan sistem imunitas, gangguan psikologis, kerusakan DNA atau kanker hama (pestisida), alat-alat masak dan penyajian serta kemasan yang mengandung logam berat, pemupukan maupun pembuangan limbah industri. Kontaminasi logam berat pada manusia dapat pula melalui makanan dan air yang dikonsumsi. Hal ini terjadi karena lingkungan seperti udara, air dan tanah terkontaminasi logam berat tersebut. Dampaknya, seluruh makhluk hidup dalam rantai makanan,

termasuk tumbuhan, hewan dan manusia ikut terkontaminasi dan menderita berbagai gangguan kesehatan



Gambar 2.1 Logam berat Kadmium (Agustiani, 2010).

Tabel 2.1 tabel batas maksimum logam berat kadmium (SNI, 2009).

No.	Logam berat	Batas maksimum Hati, Ginjal dan Daging
1.	Kadmium	1,0 mg/kg

F. Pencemaran dan Akumulasi Kadmium

Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya bahan-bahan (kimia) ke dalam lingkungan yang bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup di tempat tersebut. Suatu zat yang mencemari lingkungan dan mengancam kelangsungan makhluk hidup disebut *polutan*. Kemajuan dalam bidang teknologi dan industri sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif dari teknologi tersebut adalah limbah yang dibuang secara sembarangan yang bisa mencemari sungai. Asap pabrik yang menimbulkan polusi udara. Sumber

pencemaran lingkungan sendiri berasal dari alam. Contoh pencemaran yang berasal dari alam adalah asap kebakaran hutan, suara petir, pencemaran karena banjir, abu gunung berapi, dan lain sebagainya. sumber polutan identik dengan hasil aktivitas manusia yang dibuang di alam. Contohnya adalah sisa oli, asap kendaraan, dan sisa zat kimia yang dibuang sembarangan seperti dibuang di sungai. Masuknya bahan pencemar pada lingkungan bisa mengganggu kelangsungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan (Efendi, 2003).

Pencemaran logam berat merupakan permasalahan yang sangat serius untuk ditangani, karena merugikan lingkungan dan ekosistem secara umum. Sejak kasus merkuri di Minamata Jepang pada tahun 1953, pencemaran logam berat sering terjadi dan semakin banyak dilaporkan. Agen lingkungan Amerika Serikat (EPA) melaporkan, terdapat 13 elemen logam berat yang diketahui berbahaya bagi lingkungan, diantaranya Arsen (As), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), dan Kadmium (Cd) (Musyidin, 2008).

Faktor biokonsentrasi atau bioakumulasi dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan makhluk hidup dalam menyerap dan menyimpan suatu bahan pencemar (Connell dan Miller, 1995). Biokonsentrasi dapat dilihat sebagai proses kesetimbangan yang ditentukan jumlah pengambilan (biosorpsi) dan pelepasan (ekskresi) suatu senyawa oleh sel makhluk hidup di lingkungannya. Jadi memberikan proses perpindahan senyawa antara fase-fase di lingkungan dengan sel makhluk hidup. Jumlah pengambilan senyawa ditentukan kemampuan absorpsi.

Sehingga jumlah senyawa yang diekskresikan menentukan konsentrasi senyawa tersebut pada sel. Senyawa dapat ditimbun dalam sel, dapat pula diubah atau didegradasi apabila sel mampu. Penimbunan senyawa persisten maupun logam berat umumnya terjadi karena sifat lipofilik dari senyawa tersebut. Dalam proses absorpsi oleh sel juga melalui membran (Chojnacka, 2005).

Teknik fitoremediasi merupakan metode biokonsentrasi bahan berbahaya (polutan) dalam tanah dan air serta merupakan teknologi pemulihan kualitas lingkungan tercemar yang ramah lingkungan dan murah. Teknik fitoremediasi sering dikembangkan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar logam berat seperti Pb, Zn, Au dan pencemar dalam bentuk radioaktif seperti Cs.I. Teknologi ini potensial untuk diaplikasikan, aman untuk digunakan dan dengan dampak negatif relatif kecil, memberikan efek positif yang multiguna terhadap kebijakan pemerintah, komunitas masyarakat dan lingkungan, biaya relatif rendah, mampu mereduksi volume kontaminan, dan memberikan keuntungan langsung bagi kesehatan masyarakat. Keuntungan paling besar dalam penggunaan fitoremediasi adalah biaya operasi lebih murah bila dibandingkan pengolahan konvensional lain seperti insinerasi, pencucian tanah berdasarkan sistem kimia dan energi yang dibutuhkan. Sebagai perbandingan, sistem pencucian logam membutuhkan biaya sekitar US\$ 250/kubik yard sedangkan fitoremediasi hanya membutuhkan US\$ 80/kubik yard. Teknologi fitoremediasi dikembangkan berdasarkan kemampuan beberapa jenis tanaman dalam menyerap

beberapa logam berat seperti seng (Zn) dan tembaga (Cu) dalam pertumbuhannya (Terry et al., 2010)

Lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya alam menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya, sebaliknya keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Masalah lingkungan hidup, baik dalam bentuk kalangan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya (Notodarmojo, 2005).

Pencemaran dalam lingkungan air saat ini sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia yang kadang kala sangat berbahaya dan beracun. Beberapa logam berat banyak digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan dan apabila sudah melebihi batas yang ditentukan berbahaya bagi kehidupan. Logam-logam berat tersebut diketahui dapat terakumulasi di dalam tubuh suatu mikroorganisme, dan tetap tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun. Peristiwa yang menonjol dan dipublikasikan secara luas akibat pencemaran logam berat adalah pencemaran Merkuri (Hg, Jepang dan pencemaran Kadmium di sepanjang sungai Jinzo di Pulau Honsyu, Jepang yang telah menimbulkan korban manusia (Luthfillah, 2011).

Keberadaan logam berat dalam perairan akan sulit mengalami degradasi bahkan logam tersebut akan diabsorpsi dalam tubuh organisme padahal logam

berat seperti Pb dan Cd ini termasuk golongan logam berat yang berbahaya dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan dan pencernaan (Darmono, 1995;2001). Keracunan logam berat Pb dan Cd dapat menyebabkan keracunan yang akut dan kronis. Keracunan akut logam Pb ditandai oleh rasa terbakarnya mulut, terjadinya perangsangan dalam gastrointestinal dengan disertai diare dan gejala keracunan kronis ditandai dengan rasa mual, anemia, sakit di sekitar perut dan dapat menyebabkan kelumpuhan (Darmono, 2001).

Umumnya logam yang terdapat dalam tanah dan perairan dalam bentuk persenyawaan, seperti senyawa hidroksida, senyawa oksida, senyawa karbonat, dan senyawa sulfide. Senyawa-senyawa itu sangat mudah larut dalam air. Namun, demikian pada badan perairan yang mempunyai derajat keasaman mendekati normal atau pada daerah kisaran pH 7 sampai 8, kelarutan dari senyawa-senyawa ini cenderung stabil (Darmono, 2001).

Kadar logam dalam air selalu berubah-ubah tergantung pada saat pembuangan limbah, tingkat kesempurnaan, pengelolaan limbah, dan musim. Logam berat yang terikat dalam sedimen relatif sukar untuk lepas kembali melarut dalam air, sehingga semakin banyak jumlah sedimen maka semakin besar kandungan logam berat didalamnya (Muchyddin, 2007).

Pencemaran perairan khususnya di laut berasal dari beberapa substansi-substansi baik itu limbah domestik maupun limbah non domestik seperti industri, pertanian, peternakan, perikanan transportasi dan lainnya, secara langsung atau tidak

langsung ke lingkungan laut yang menyebabkan timbulnya pengaruh-pengaruh seperti tergantungnya kesehatan manusia jika mengkonsumsi bahan pangan laut (Fardiaz, S, 1992).

Bahan pencemaran yang masuk ke dalam perairan pantai seperti logam berat dapat menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi logam berat pada perairan tersebut. Keadaan mempengaruhi tumbuhan dan hewan laut yang hidup di dalamnya. Beberapa penelitian pada invertebrata jenis *filter feeder*, seperti filum moluska umumnya mengandung logam berat dalam tubuhnya (sastrawijaya, 1991).

Logam kadmium akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan, dan manusia). Logam ini masuk kedalam tubuh bersama makanan yang dikonsumsi, tetapi makanan tersebut telah terkontaminasi oleh logam Kadmium atau persenyawaannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan. Di samping itu, tingkatan biota dalam sistem rantai makanan turut menentukan jumlah Kadmium yang terakumulasi. Di mana biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi paling besar. Bila jumlah kadmium yang masuk tersebut melebihi ambang biota dari suatu level atau tersebut akan mengalami kematian dan bahkan kemusnahan (pandia dkk, 1996).

Menurut Rompas (2010) Timbal termasuk polutan di laut yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi biota perairan, tetapi akan berdampak bagi manusia

yang memakannya. Faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar ialah :

1. Logam tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik.
2. Logam dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama dalam sedimen sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik, melalui proses adsorpsi dan pembentukansenyawa kompleks. Karena logam dapat terakumulasi dalam sedimen, maka kadar logam dalam sedimen lebih besar dari logam dalam air.

Logam berat Pb yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemungkinan diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan logam berat di suatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan dan berikatan dengan partikel partikel sedimen, sehingga konsentrasi logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Hutagalung, 1991).

Melihat kepada bentuk dan kemampuan atau daya yang ada pada setiap logam, maka dapatlah diketahui setiap logam haruslah memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik (konduktor), memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik, memiliki kerapatan yang tinggi, dapat membentuk alloy dengan logam lainnya serta untuk logam yang padat dapat ditempa dan dibentuk (Palar, 2008).

Pada dasarnya logam sangat diperlukan dalam proses produksi dari suatu pabrik, baik pabrik cat, aki atau baterai, sampai pada produksi alat-alat listrik. Bahan yang digunakan oleh pabrik itu dapat berbentuk logam murni, bahan anorganik maupun bahan organik. Jumlah logam yang digunakan bervariasi menurut bentuk dan jenisnya, tergantung pada jenis pabriknya (Darmono, 1995).

G. Cumi-Cumi (*Loligo Sp*)

Cumi-cumi merupakan produk laut yang banyak terdapat diperairan Indonesia. Sebagian besar cumi diolah menjadi bahan makanan protein tinggi. Cumi-cumi memiliki sifat mudah mengalami penurunan mutu sehingga melakukan pengolahan agar cita rasanya tidak berkurang. Jenis produk olahan cumi-cumi sebagai konsumsi lokal masih terbatas antara lain cumi-cumi kertas, cumi-cumi kering asin, cumi-cumi asap dan cumi-cumi kaleng (SNI, 2011).

Kemampuan cumi untuk memancarkan cahaya ini disebut bioluminesensi. Bioluminesensi adalah suatu fenomena pancaran cahaya tanpa mengeluarkan panas melalui proses reaksi kimia pada suatu organ organisme hidup. Pancaran cahaya tersebut dapat dijumpai pada beberapa kelompok organisme yaitu: bakteri, jamur, plankton (alga), insekta (serangga), invertebrata (cumi atau *cephalopoda*) dan vertebrata (ikan). Sedangkan peranan pancaran cahayanya berbeda untuk masing masing organisme. Dalam kasus cumi, Herring (1977) menyatakan bahwa fungsi organ cahaya yang terdapat pada hewan *cephalopoda*, yaitu berfungsi untuk

penyamaran dirinya, membingungkan dan menyilaukan lawannya serta komunikasi dengan hewan lainnya (Hasting, 1989).

Cumi-cumi (*Loligo Sp*) dikoleksi pada malam hari dengan alat pancing (alat pancing khusus untuk penangkapan cumi-cumi). Sampel cumi-cumi hasil tangkapan yang berukuran antara 12 - 18 cm (dewasa) dimasukkan ke dalam botol yang berisi formalin 4% kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis sampel dengan cara pengamatan terhadap morfologi dan anatomi cumi yang dilakukan dengan menggunakan acuan (Williamson, 1971).

Mantel cumi-cumi *L. duvauceli* berbentuk bulat panjang, langsing dan berbentuk kerucut di bagian posterior. Pada sisi kanan dan kiri bagian dorsal mantel terdapat sirip yang menyatu dengan mantel dan menempati kurang lebih sepertiga bagian posterior mantel (Bullough, 1985).

Cumi-cumi jantan dan betina dapat dibedakan dari bentuk tubuhnya, jantan berukuran lebih panjang dan lebih langsing dibandingkan dengan betina. Perbedaan jenis kelaminnya akan lebih jelas tampak pada cumi-cumi matang gonad karena cumi-cumi betina memiliki bentuk tubuh gemuk di bagian ventral dan warna mantel lebih gelap (Bullough, 1985).

Pada permukaan dorsal mantel, kepala dan tangan terdapat kumpulan kromatofor, sehingga bagian-bagian tersebut tampak berwarna lebih gelap. Bagian ventral mantel berwarna lebih terang karena penyebaran kromatofor tidak

mengelompok sedang permukaan ventral sirip tidak terdapat kromatofor, sehingga sirip bagian ventral berwarna putih (Esti Rudiana dan, Delianis Pringgenies 2004).

Mulut cumi-cumi terdapat di tengah-tengah kepala, dikelilingi oleh kentakel dan tangan yang mempunyai alat pengisap. Bagian dalam mulut dikelilingi gigi kitin yang tajam dengan ukuran bervariasi dan lidah parut (*radula*) di bagian tengah mulut. Bila mantel bagian dorsal dibuka, tampak leher bagian dorsal melekat dengan kepala dan mantel. Pada leher bagian ventral terdapat sifon yang melekat pada kepala dan leher akan tetapi tidak melekat pada mantel. Di leher terdapat *kartilago* sebagai penyangga leher. Di dalam rongga mantel (tampak dorsal) terdapat organ dalam yaitu: insang, lambung, gonad, pankreas, rektum, kantung tinta. Pada kantung tinta terdapat sepasang organ, berbentuk bulat lonjong menempel pada bagian latero-dorsal kantung tinta (Esti Rudiana dan, Delianis Pringgenies 2004).

Di dalam rongga mantel (tampak dorsal) terdapat organ dalam yaitu: insang, lambung, gonad, pankreas, sekum, rektum, kantung tinta. Pada kantung tinta terdapat sepasang organ, berbentuk bulat lonjong menempel pada bagian latero-dorsal kantung tinta. Secara keseluruhan, alat pencernaan cumi terdiri atas mulut, rongga mulut, faring yang panjang, oesofagus, lambung, usus, anus. Bagian mulut terletak di bagian kepala dan anus terletak pada corong di bagian ventral cumi-cumi sehingga makanan dan sisa makanan masing-masing masuk dan keluar di bagian anterior tubuh cumi-cumi. Kantung tinta cumi-cumi melekat dan bermuara pada

saluran pencernaan dekat anus, sehingga cairan tinta dari kantung tinta (Esti Rudiana dan, Delianis Pringgenies 2004).

Organisme yang terespos logam berat Pb dengan konsentrasi rendah biasanya tidak mengalami kematian, tetapi akan mengalami pengaruh sublethal, yaitu pengaruh yang terjadi pada organisme tanpa mengakibatkan kematian pada organisme tersebut. Pengaruh sublethal ini dapat dibedakan atastiga macam, yaitu menghambat (misalnya pertumbuhan dan perkembangan, serta reproduksi), menyebabkan terjadinya perubahan morfologi, dan merubah tingkah laku organisme. Logamberat yang dilimpahkan ke perairan, baik sungai ataupun laut, akan mengalami paling tidak tigaproses, yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan (Bryan, 1976).

Melalui rantai makanan karang mendapatkan logam berat dari plankton. Plankton akan menyerap logam berat yang terdapat di perairan. Menurut Lalli dan Parsons (1993) bahwa di perairan logam berat akan masuk secara difusi ke dalam fitoplanton dan zooplankton yang akhirnya masuk ke dalam polip karang. Melalui proses rantai makanan ini, maka akan terjadi bioakumulasi logam berat pada badan karang. Cara lain masuknya logam berat ke badan karang adalah dengan cara absorpsi langsung air laut yang mengandung logam berat yang terdapat di perairan.

Mekanisme cumi-cumi merupakan jaringan tubuh cumi-cumi harus melalui rantai makanan yang cukup panjang. Yaitu, Kadmium dalam bentuk ion senyawa diserap oleh fitoplankton (misalnya mikroalga), kemudian fitoplankton dimakan oleh

zooplakton (misalnya hewan kecil yang dapat di dalam perairan) dan zooplakton dimakan oleh cumi kecil, serta selanjutnya cumi kecil dimakan oleh cumi yang lebih besar. Karena cumi setiap saat memakan plankton, didalam plankton tersebut terkandung logam Kadmium, proses pencernaan cumi-cumi dimulai dari mulut yang mengandung radula dan dua rahang yang terbuat dari zat dan berbentuk seperti paruh. Gerak kedua rahang tersebut di karenakan kontraksi otot. Terdapat dua kelenjar ludah yang terletak di masa bukal. Kelenjar ludah ke tiga terletak ujung anterior hati dan mensekresi racun yang akan bermuara ke daerah rahang. Kelenjar pencernaan terdiri atas dua bagian yaitu hati yang terdapat di anterior dan pancreas terletak di posterior. Lambung bersifat muscular dan berfungsi mencampurkan makanan dari hasil sekresi dari kelenjar pencernaan. Zat-zat makanan akan menuju ke dalam usus atau ke dalam sektum, organ pencernaan berikutnya adalah rektum dan anus yang bermuara dalam rongga mantel (Suriawiria, 2005).

H. Ciri-Ciri tubuh Mollusca

Menurut (Williamson, 1971) Molusca terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

1. *Kaki*

Kaki merupakan perpanjangan/penjuluran dari bagian Ventral tubuh yang berotot. Kaki berfungsi untuk bergerak. Pada sebagian mollusca kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa.

2. *MassaViseral*


Massa viseral adalah bagian tubuh yang lunak dari mollusca. Di dalam massa viseral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa viseral dilindungi oleh mantel.

3. *Mantel*

Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa viseral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi dan anus.

Sitem syaraf Mollusca terdiri dari cincin syaraf. Sistem syaraf ini mengelilingi esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaan mollusca sudah terbilang lengkap terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mollusca juga memiliki lidah bergerigi yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Lidah bergerigi itu disebut radula. Mollusca yang hidup di air bernafas dengan insang yang berada pada rongga mantel.

1. Cumi-cumi (*Loligo* sp)



Gambar 2.2 Sistem sirkulasi pada Cumi-cumi (*Loligo* sp). Jantung yang menopang darah (warna tua) ke insang-insang yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Jantung sistematik memompa darah kaya-oksigen (warna muda) ke semua bagian badan (Tjitrosomo, 1983).

2. Klasifikasi Cumi-cumi (*Loligo sp*) adalah sebagai berikut ((Suriawiria, 2005):

Kingdom : Amaliah
Filum : Mollusca
Class : Cephalopoda
Ordo : Teuthida
Famili : Loliginidae
Genus : Loligo
Spesies : *Loligo sp*

I. Persiapan Sampel dengan Destruksi Basah

Penentuan kandungan mineral dalam bahan makanan dapat dilakukan dengan metode destruksi basah. Pemilihan cara tersebut tergantung pada sifat zat organik dan anorganik yang ada dalam bahan mineral yang akan dianalisis. Metode destruksi basah untuk penentuan unsur-unsur mineral di dalam bahan makanan merupakan metode yang paling baik. Prinsip destruksi basah adalah penggunaan HNO_3 untuk mendestruksi. Keuntungan destruksi basah adalah suhu yang digunakan tidak dapat melebihi titik didih larutan dan pada umumnya karbon lebih cepat hancur. Adapun destruksi basah yang dapat dilakukan ada 3 cara, antara lain (Wulandari, 2013): Destruksi basah menggunakan HNO_3 dan Destruksi basah menggunakan HNO_3 dan HClO_4 , Destruksi basah menggunakan HNO_3 , dan

Metode destruksi basah lebih baik daripada cara kering karena tidak banyak bahan yang hilang dengan suhu p yang sangat tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa cara basah lebih sering digunakan oleh para peneliti. Di samping itu, destruksi dengan cara basah biasanya dilakukan untuk memperbaiki cara kering yang biasanya memerlukan waktu yang lama. Sifat dan karakteristik asam pendestruksi yang sering digunakan. Meskipun demikian waktu yang diperlukan untuk mendestruksi masih cukup lama (Sumardi, 1981 dalam Mitha, 2013)

J. Pulau Lae-lae

Pulau Lae-lae yang sepertinya hanya dihuni oleh para nelayan tradisional ini bisa dicapai hanya dalam waktu beberapa menit dari Pantai Losari, dengan menyewa perahu motor. Jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 1639 jiwa dengan 346 rumah tangga. Pulau Lae-lae merupakan pulau yang memiliki jarak yang paling dekat dari daratan utama Pulau Sulawesi sehingga diduga sudah banyak mendapat pengaruh dari aktivitas manusia berupa buangan air limbah pencemar, karena laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa aliran air. Pulau Lae-lae juga dimanfaatkan sebagai salah satu tempat wisata pantai di kota Makassar. Luas Pulau Lae-lae $\pm 0,22 \text{ Km}^2$ dimana ketinggian dari permukaan laut < 500 meter. Jumlah RT sebanyak 10 dan 3 RW, dimana Pulau Lae-lae juga di klasifikasikan sebagai Kelurahan dengan di Kecamatan Ujung Pandang.

Pola pemukiman penduduk di pulau Lae-lae umumnya linier dan berbanjar, dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi. Hampir seluruh bagian pulau telah terbangun oleh rumah penduduk, sehingga hanya $\pm 15\%$ dari permukaan daratan adalah ruang terbuka. Umumnya bentuk rumah penduduk masih mengadopsi bentuk rumah tradisional Makassar, berupa rumah panggung, namun sebagian besar telah mengalami penambahan pada bagian kolong rumah. Pola rumah deret yang diterapkan dalam permukiman di pulau Lae-lae hanya diantari dengan jalan lingkungan dengan lebar jalan $\pm 1,2$ meter. Dengan kondisi tersebut makaantisipasi terhadap angin kencang terantisipasi. Perletakan vegetasi juga dapat meredam angin kencang yang sering terjadi di pulau Lae-lae. Rumah yang berada di pinggir laut memiliki jarak sangat jauh, hal ini dipengaruhi dengan perletakan vegetasi. Apabila di perhatikan dengan jarak tersebut seperti masyarakat di pulau Lae-lae tetap mempertahankan sempadan pantai yakni ± 20 meter. Dengan sempadan tersebut ditanami vegetasi jenis kelapa, akasia, dan tanaman perdu. Tingginya tingkat kepadatan bangunan menyebabkan vegetasi dengan tajuk rimbun dan tinggi dominan hanya terdapat pada pesisir pantai (Mutmainnah, 2007).

Pulau Lae-Lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan LaeLae, dengan luas daratan pulau 8,9 Hektar. Secara Geografis pulau terletak pada posisi $119^{\circ} 23' 33,1''$

BT dan $05^{\circ} 08' 16,0''$ LS atau di perairan Selat Makassar. Batas-batas administrasi meliputi (Nurmaida Amri dkk, 2013);

1. Sebelah Barat : Pulau Samalona,
2. Sebelah Timur : Kota Makassar,
3. Sebelah Selatan : Tanjung Bunga,
4. Sebelah Utara : Lae-Lae Kecil




Gambar 2.3 Pulau Lae-lae (Dokumentasi pribadi, 2016)



Gambar 2.4Peta pulau Lae-lae(Sumber: Google Earth, 2013)

K. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kandungan logam berat Cd yang terabsorpsi pada cumi-cumi (*Loligo* sp). Pada stasiun I (Sebelah utara) yang berbatasan langsung Pulau Lae-lae kecil timbunnya zat polutan yang berasal dari aktivitas pelabuhan, tumpahan minyak dari kapal, limbah rumah tangga dan kegiatan industrialisasi. Pada stasiun II (Sebelah barat) yang perbatasan pulau kayangan dan pulau Lae-lae, tidak terdapat banyak sampah domestik yang tersebar di sekitar perairan. Pada stasiun III (Sebelah selatan) perairan pantai tanjung bunga berbatasan langsung dengan perairan pulau Lae lae, banyaknya sampah domestik yang tersebar disekitar perairan

2. Lokasi penelitian

Pengambilan sampel diperoleh dari perairan pulau Lae-lae dan analisis kandungan logam berat Cd dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif yaitu metode pendekatan yang ditujukan untuk menggambarkan kandungan logam berat Cd dalam Cumi-cumi (*Loligo* sp).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini semua jenis Cumi-cumi (*Loligo* sp) yang hidup di perairan pulau Lae-lae.
2. Sampel penelitian ini adalah jenis Cumi-cumi (*Loligo* sp) hasil tangkapan nelayan pulau Lae-lae yang sering diperjual belikan masyarakat pula Lae-lae. Sampel persampling porplusing dan ukurannya berkisar 20-23 cm

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah kadar logam berat Kadmium dalam tubuh cumi cumi (*Loligo* sp).

E. Defenisi Operasional Variabel

Kandungan logam berat Cd dalam *Loligo* sp adalah kandungan logam berat Cd yang terakumulasi dalam dan daging (otot) yang dinyatakan 1,0 dalam mg/kg (ppm).

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas beaker, erlenmeyer, labu ukur, pipet tetes, penjepit tabung, pipet volume, lemari asam, hot plate, kertas saring, ball pipet, timbangan analitik, gunting, kamera, alat tulis-menulis dan spektrofotometer serapan atom (ASS).
2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging cumi-cumi (*Loligo* sp). Bahan kimia yang dibutuhkan untuk analisis logam berat kadmium dengan cara (SSA) yaitu asam nitrat HNO_3 , HCL_4 70%.

G. Prosedur penelitian

Daerah yang menjadi lokasi pengambilan sampel terletak di pulau Lae-lae propinsi sulawesi selatan. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, penulis melakukan observasi di pulau Lae lae. Hal ini dilakukan untuk memastikan sampel tersedia untuk dianalisis dan persiapan alat dan bahan.

2. Preparasi sampel

Pembersihan sampel dilakukan dengan cara mencuci sampel sampai bersih dengan air mengalir kemudian membedah bagian ventralnya setelah itu diambil bagian daging. Selanjutnya mencuci daging pada air yang mengalir kemudian memisahkan daging, hingga hanya daging yang tersisa.

3. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei 2017 yang diperoleh langsung dari hasil tangkapan nelayan pulau Lae - lae. Cumi-cumi (*Loligi sp*) yang diperoleh dimasukkan kedalam *cool box* untuk selanjutnya dibawa kemudian dianalisis di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.



Gambar 3.1 Lokasi pengambilan sampel (survei lapangan, 2017).

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan April-Mei 2017 yang diperoleh dari perairan Pulau Lae-lae. Pengambilan sampel berada pada 3 stasiun yaitu stasiun 1 (sebelah utara) yang berbatasan dengan Lae-lae kecil, stasiun II (sebelah barat) berbatasan pulau kayangan, stasiun III (sebelah selatan) berbatasan dengan tanjung bunga. Jumlah sampel yang diambil pada setiap stasiun masing-masing 10 ekor Cumi cumi (*Loligo sp*). Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara peneliti mengambil langsung disekitar perairan Pulau Lae-lae pada malang hari, kemudian Cumi-cumi (*Loligo sp*) yang diperoleh dengan pancingan nelayan. Kemudian cumi-

cumi (*Loligo sp*) dimasukkan didalam *cool box* untuk selanjutnya dibawa dan dianalisis di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Persiapan Analisis Kadar Logam Kadmium pada Cumi-cumi (*Loligo sp*)

Menimbang sampel daging Cumi-cumi menggunakan timbangan analitik (*Adventure ohaus*) sebanyak 5 gr kemudian sampel daging yang telah ditimbang ditambahkan HNO_3 pekat sebanyak 8 ml lalu didestruksi basah menggunakan *microwave* selama kurang lebih 30 menit lalu diencerkan dengan aquadest sebanyak 50 ml lalu dihomogenkan kemudian menyaring dengan kertas saring. mengambil filtrat sampel yang diperoleh sebanyak 10 ml, untuk dilakukan analisis logam Cd menggunakan metode SSA. Data yang diperoleh dalam bentuk tabel.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Penentuan kandungan logam berat dalam biota dilakukan dengan menggunakan AAS (*Automic Absorption Spektrofotometer*), dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Dengan Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel, Instalasi Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

Sumber: Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel, Instansi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 2016.

Kadar logam Kadmium (Cd) menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$C = \frac{c \times V}{A}$$

keterangan:

C: Kadar logam dalam sampel ($\mu\text{g}/\text{gr}$)

c : konsentrasi larutan sampel (true value)

V: Volume penetapan/pengencer (ml)

a : berat sampel basah (gram)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang kandungan logam berat kadmium (Cd) pada daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) pada stasiun 1 (sebelah utara) yang berbatasan dengan Lae-lae kecil, stasiun II (sebelah barat) berbatasan dengan pulau kayangan, stasiun III (sebelah selatan) berbatasan dengan tanjung bunga. Kadar logam berat kadmium pada ketiga titik masih dibawah ambang batas menurut (SNI, 2009) yaitu sebesar 1,0 mg/kg. Kadar logam berat tertinggi dari ketiga titik pengambilan sampel yaitu pada titik 1 (sebelah utara) yang ditunjukkan pada tabel 4.1


Tabel 4.1 Kadar logam berat kadmium pada daging cumi-cumi (*Loligo Sp*) dititik 1 (sebelah utara), titik 2 (sebelah barat) dan titik 3 (sebelah selatan)

No	Stasiun	Kadar logam Kadmium mg/kg		Rata-rata
		TA	TB	
1.	T I	0,3	0,08	0,19
2.	T II	0,04	0,05	0,045
3.	T III	0,06	0,06	0,06

Keterangan :

- T1 : Pengambilan sampel stasiun 1
TII : Pengambilan sampel stasiun II
TIII : Pengambilan sampel stasiun III
TA : Uji pertama
TB : Uji kedua

Tabel 4.1 memperlihatkan kandungan logam yang terdapat pada Cumi-cumi (*Loligo* sp) di perairan Pulau Lae-lae, kandungan logam tertinggi terdapat pada sampel pada stasiun I dengan nilai konsentrasi sebesar 0,19 mg/kg, sedangkan kandungan logam terendah terdapat pada stasisun II dengan nilai konsentrasi sebesar 0,045 mg/kg, sedangkan pada stasiun III dengan nilai konsentrasi sebesar 0,06 mg/kg.



Gambar 4.1 Grafik kadar logam berat kadmium pada daging cumi-cumi (*Loligo* Sp) di stasiun I (sebelah utara), stasiun II (sebelah barat) dan stasiun III (sebelah selatan).

B. Pembahasan

Pencemaran merupakan keadaan yang berubah menjadi lebih buruk, keadaan yang berubah karena akibat masuknya bahan-bahan pencemar. Bahan pencemar umumnya mempunyai sifat toksik (racun) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu

terjadinya pencemaran. Pencemaran logam berat pada air laut akan menyebabkan terkontaminasinya organisme perairan seperti gastropoda, udang, Cumi-cumi (*Loligo* sp) dan kerang (Haryoto, 1996).

Pengambilan sampel cumi-cumi (*Loligo* sp) diperoleh dari tiga stasiun yaitu stasiun I (sebelah utara) yang berbatasan dengan lae-lae kecil, di stasiun ini merupakan tempat bersandarnya sebagian besar perahu nelayan dan terdapat banyak sampah disepanjang pantai ini, stasiun II (sebelah barat) berbatasan dengan pulau kayangan, titik ini bukan tempat bersandarnya kapal dan tidak terdapat banyak sampah namun hanya terdapat banyak tumbuh bulu babi dimana bulu babi merupakan suatu indikator pencemaran perairan, stasiun III (sebelah selatan) yang berbatasan dengan tanjung bunga, distasiun ini juga terdapat banyak sampah disepanjang pantai.

Cumi-cumi (*Loligo* sp) yaitu binatang yang tidak memiliki tulang belakang yaitu filum *Mollusca*, Cumi-cumi (*Loligo* Sp) yaitu binatang lunak (*Mollusca*), pergerakannya sangat lambat dalam air dan biasanya hidup menetap di suatu lokasi tertentu di dasar laut (Haryoto, 1996).

Berdasarkan tabel 4.1 kandungan logam berat kadmium pada cumi-cumi (*Loligo* sp) pada stasiun 1 sebanyak 0,19 mg/kg, pada stasiun II sebanyak 0,045 mg/kg dan pada stasiun III sebanyak 0,06 mg/kg. Kadar logam berat ini masih dibawah baku mutu Standar Nasional Indonesia (SNI No.7380, 2009) yaitu 1,0 mg/kg. Hal ini berarti daging cumi-cumi (*Loligo* sp) masih aman untuk dikonsumsi

namun seiring meningkatnya kadar logam berat diperairan pulau lae-lae akan meningkatkan pula kadar logam berat yang terdapat pada cumi-cumi (*Loligo sp*).

Banyaknya logam berat yang terkandung dalam Cumi-cumi (*Loligo sp*) juga bergantung pada bentuk senyawa dan konsentrasi polutan, aktivitas cumi-cumi (*Loligo sp*) dan rantai makanan sangat berpengaruh terhadap banyaknya logam berat yang terkandung dalam tubuhnya. Pada perairan yang terkontaminasi logam berat berat kadmium akan terus-menerus terakumulasi oleh jaringan organisme sehingga kandungannya dalam jaringan naik terus-menerus sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air, dan logam ini hanya dieksresikan dalam jumlah yang sangat sedikit.

Mekanisme masuknya logam berat (Cd) pada cumi-cumi (*Loligo sp*) yaitu pada sistem pernapasannya, sistem pernapasan cumi-cumi (*Loligo sp*) terdiri dari sepasang insang berbentuk bulu yang terdapat di rongga mantel. Prosesnya, air keluar masuk melalui tepi lingkaran ujung badan. Kontraksi dan relaksasi mantel menyebabkan sirkulasi air dalam rongga mantel sehingga terjadi pertukaran gas. Pada saat ini kandungan logam berat pada perairan masuk ke tubuh cumi-cumi (*Loligo sp*) namun dalam jumlah yang sangat sedikit karena insang juga berperan untuk menyaring air yang masuk dalam tubuh cumi-cumi (*Loligo sp*), filamen insang juga disuplai oleh kapiler-kapiler darah sehingga logam berat yang masuk akan diedarkan ke seluruh organ tubuh cumi-cumi (*Loligo sp*).

Sistem pencernaan cumi-cumi terdiri dari mulut yang mengandung radula dan dua rahang yang terbuat dari zat kitin, juga terdiri dari dua kelenjar ludah yang

terletak di masa bukal. Kelenjar ludah ke tiga terletak ujung anterior hati dan mensekresi racun yang akan bermuara ke daerah rahang. Kelenjar pencernaan terdiri atas dua bagian yaitu hati yang terdapat di anterior dan pankreas terletak di posterior, kelenjar pencernaan ini berfungsi untuk mendeposit sari-sari makanan ataupun logam berat yang terkandung dalam makanan kemudian didistribusikan keseluruh organ tubuh cumi-cumi termaksud organ daging.

Ketika makanan ditangkap, cumi-cumi menggunakan tentakelnya untuk mencekram mangsa, yang kemudian digigit dengan rahang dan dilumpuhkan dengan racun yang ada didalam ludahnya. Makanan dicengkram dengan kuat sehingga radula, bagian yang kasar seperti lidah yang ada di dalam mulut cumi dapat menusuk-nusuk makanan. Dari kerongkongan, makanan kemudian memasuki kantung lambung dan menuju usus cumi-cumi. Usus cumi-cumi adalah tabung sempit yang keluar dari sekum dan berjalan melalui sisa ruang dalam rongga mantel. Selanjutnya sisa makanan dari usus menuju rektum dan bermuara ke anus yang terhubung ke siphon untuk mengeluarkan zat sisa bersama dengan air yang dipompa dari dalam mantel untuk propulsi.

Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kandungan logam berat dalam daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) masih dibawa ambang batas. Dalam proses Cumi-cumi (*Loligo sp*) menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat makanan tersebut masuk ke dalam tubuh Cumi-cumi (*Loligo sp*), maka partikel logam berat akan ikut terserap ke dalam tubuh, sehingga semakin banyak makanan yang disaring maka semakin sedikit logam berat di dalam daging cumi-cumi yang

terpapar logam berat. Hal ini juga berkaitan dengan logam kadmium yang memiliki konsentrasi dibawah ambang maka logam ini tidak terakumulasi logam kadmium diperairan pulau Lae-lae sedangkan logam lainnya memiliki konsentrasi diatas ambang batas. Pada stasiun I logam berat kadmium berkisar 0,19 mg/kg, sedangkan pada stasiun II berkisar 0,045 lebih rendah dibandingkan Pada stasiun berkisar berkisar 0,06 mg/kg masih aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil Biokonsentrasi yaitu rasio antara konsentrasi logam pada organisme dengan konsentrasi logam pada sedimen, Cumi-cumi menunjukkan kemampuan akumulasi logam Cd yang lebih rendah dibandingkan logam Pb. Hal ini didukung oleh kondisi perairan pada saat penelitian yaitu pengukuran suhu air pada siang hari menunjukkan lebih tingginya suhu pada titik pengambilan kerang darah (29-30°C) di banding pada titik pengambilan kerang bakau (28-29°C), sehingga kondisi ini mendukung. Peranan suhu terhadap akumulasi logam, karena meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju metabolisme pada cumi, sehingga bioakumulasi pada cumi-cumi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Sorensen (1991), menyatakan bahwa peningkatan suhu perairan cenderung meningkatkan akumulasi dan toksisitas logam berat, ini terjadi karena meningkatnya metabolisme dari organisme air. Kondisi ini didukung pula oleh jenis sedimen yang terdapat pada titik pengambilan cumi-cumi yaitu tipe sedimen air yang tidak bersih dan banyak sampah yang tergenang, dimana sedimen dengan kandungan sampah yang

tergenang akan meningkatkan akumulasi logam. Kondisi sedimen dengan fraksi sampah yang akan berpengaruh terhadap konsentrasi logam (Amriani dkk, 2011).

Keracunan yang bersifat kronis yang disebabkan oleh daya racun yang dibawa oleh logam kadmium, terjadi dalam selangka waktu yang sangat panjang, peristiwa ini terjadi karena logam kadmium, yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang kecil, sehingga dapat ditolerir oleh tubuh pada saat tersebut. Akan tetapi karena proses kemasukan tersebut terus menerus secara berkelanjutan, maka tubuh pada batas akhir tidak lagi mampu memberikan toleransi terhadap daya racu yang dibawa oleh Kadmium. Keracunan yang bersifat kronis ini membawakan akibat yang lebih buruk dan penderitaan yang lebih menakutkan bila dibandingkan dengan keracunan akut (Palar, 2008).

Pengaruh bahan toksik dalam suatu organisme akan terlihat dalam waktu pemaparan yang berbeda. Logam berat masuk ke dalam organisme dengan berbagai cara yaitu masuk melalui saluran pernafasan (insang), saluran pencernaan (usus, hati, ginjal), melalui rantai makanan, dan melalui penetrasi kulit. Logam berat di air menimbulkan terjadinya proses akumulasi di tubuh organisme seperti terjadinya akumulasi pada daging Cumi-cumi (*Loligo* sp). Akumulasi biologis dapat terjadi melalui absorbs langsung terhadap logam berat yang ada di dalam air. Akumulasi juga terjadi karena kecenderungan logam berat untuk membentuk senyawa kompleks dengan zat – zat organik yang ada di dalam tubuh organisme (Sumah Yulaipi, 2013)

Permukaan tubuh, mekanisme osmoregulasi dan penyerapan melalui makanan. Pengaruh bahan toksik tersebut ditentukan oleh sifat toksik logam berat kadmium dan keberhasilan tubuh untuk melakukan proses detoksifikasi dan ekskresi, sehingga pengaruh sifat toksik masih dapat ditolerir oleh tubuh Cumi-cumi (*Loligo sp*), jika telah melewati ambang batas maka akan mengakibatkan kematian. Zat xenobiotik dalam tubuh Cumi-cumi (*Loligo sp*) akan merangsang Cumi-cumi (*Loligo sp*) melakukan perlawanan secara fisiologis untuk meminimalisir dampak racun yang ditimbulkan. Sedangkan kematian Cumi-cumi (*Loligo sp*) diduga terjadi karena ikan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terpapar kadmium. Kadmium (Cd) yang masuk ke dalam tubuh Cumi-cumi (*Loligo sp*) akan bersifat xenobiotik yang menghambat kerja Asetilkolinesterasen sehingga terjadi akumulasi asetilkolin dalam susunan saraf pusat. Selanjutnya akumulasi tersebut akan menginduksi tremor, inkoordinasi, kejang kejang sampai dapat mengakibatkan kematian

Allah swt telah memberikan banyak kenikmatan yang tidak terhingga kepada seluruh umat manusia di dunia yaitu berupa hamparan lautan yang berisikan beragam hewan laut yang mempunyai kandungan protein tinggi untuk dikonsumsi. Perkembangan industri dan pembagunan semakin meningkat, sehingga perlu diwaspadai adanya pencemaran yang sebabkan oleh peningkata perkembangan industri. Bagi umat manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan baik. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah an-Nahl ayat 14/16:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahnya:

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Ayat ini menyatakan Allah swt. Yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Dan dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan semansa yang berdiam di sana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yakni binatang- binatang laut itu, dan kamu dapat mengeluarkan, yakni mengupanyakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan darinya, yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai seperti permata, mutiara, merjan, dan semacamnya.

Konsentrasi kadmium berukuran kecil dikedua lokasi memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding yang berukuran besar. Secara teoritis, ukuran cangkang yang besar berkorelasi positif dengan meningkatnya umur, dan meningkatnya umur juga berkorelasi positif dengan meningkatnya konsentrasi kadmium pada tubuh. Namun, pada penelitian ini hal tersebut terpentalkan, karena berukuran kecil justru mengakumulasi kadmium lebih kecil.

Konsentrasi kandungan logam berat kadmium yang tinggi tersebut, baik pada sedimen maupun pada cumi-cumi (*Loligo Sp*) diperkirakan karena letak pulau Lae-lae dengan permukiman penduduk, galangan kapal dan industri yang mengguakan logam berat kadmium. Pulau Lae-lae merupakan jalur lalu lintas yang melalui perahu-perahu penangkap ikan dan juga kapal-kapal lainnya yang menghasilkan buangan oli bekas kapal, tumpahan minyak dan pengelupasan cat kapal yang mengemukakan bahwa aktivitas manusia, industri galangan kapal dan berbagai aktivitas pelapuhan lainnya merupakan salah satu jalur yang mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan logam berat dalam badan air. Oleh karena, itu upaya penyuluhan yang berkesinambungan kepada para nelayan atau masyarakat untuk tidak membuang limbah keperairan laut. Ini merupakan aspek paling penting yang harus dilakukan pada saat ini agar kadar logam berat tidak selalu bertambah dalam jangka waktu yang lama. Salah satu cara untuk tidak memperbaiki atau menghilangkan logam berat di alam dengan menggunakan tanaman seperti eceng gondok tanaman ini hidup di air, eceng gondok ini biasanya dibakar hingga membentuk bubuk. Perairan yang mengandung logam berat dibubuhi oleh bubuk eceng gondok. Penyerapan ini melibatkan pertukan ion pada larutan, yaitu ion logam berat yang menyapu pada eceng gondok serta berbagai macam upaya serta adanya kesadaran untuk tidak mengomsumsi makanan yang sudah tercemar logam berat, dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu Cumi-cumi (*Loligo sp*) memiliki juga kemampuan dalam mengakumulasi logam tertentu dalam skala lebih besar dibandingkan hewan laut lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat kadmium (Cd) yang terkandung dalam daging Cumi-cumi (*Loligo sp*) pada stasiun I sebanyak 0,19 mg/kg, pada stasiun II sebanyak 0,045 mg/kg, pada stasiun III sebanyak 0,06 mg/kg. Hasil ini menunjukkan bahwa daging cumi-cumi (*Loligo sp*) tidak melebihi baku mutu SNI yaitu 1,0 mg/kg dan menurut badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia (BPOM) yaitu 0,5 mg/kg. masih aman untuk dikonsumsi.

B. Saran

Adapun saran pada lokasi pengambilan sampel dapat digunakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan pengukuran suhu, Do, salinitas, parameter. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap keberadaan logam berat. perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap keberadaan logam berat pada biota lainnya yang ada di perairan pulau Lae lae.

KEPUSTAKAAN

- Almeida, J.A., Barreto, R.E., Novelli, L.B., Castro, F.J., and Moron, S.E. 2009. Oxidative Stress Biomarkers and Aggressive Behavior in Fish Exposed to Aquatic Cadmium Contamination. *Neotropical Ichthyology*, Vol 7(1): 103-108, 2009.
- Alloway B.J. 2013. Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. Environmental Pollution. vol 22. 3rd Edition. Netherlands: Springer.
- Amriani, Agus Hadiyanto. *Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Seng (Zn) Pada Kerang Darah (Anadara granosa L.) dan Kerang Bakau (Polymesoda bengalensis L.) Di Perairan Teluk, Kendari: 2011.*
- Arjah, Ahmad Mujaddid, dkk. 2012. Analisis Konsentrasi Gizi Dan Logam Berat Pada Berbagai Jenis Organisme Perairan Kenjeran. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Ahmad Mustafa, Tafsir. 1992.
- Babel, S., Kurniawan, T.A. "Cr(VI) Removal from synthetic wastewater using coconut shell charcoal and commercial Activated Carbon Modified with Oxidizing Agents and/or Chitosan". *Journal of Chemosphere* No. 54 (Juni 2004): 951-967.
- Bambang Y, G. Charmantier, P. Thuét and J. P. Trilles. Effect of cadmium survival and osmoregulation of various development stages of the shrimp *Penaeus japonicus* (Crustacea: Decapoda). *Journal of Marine Biology* 3. (1995): p. 443-500.
- Bullough, W.S. 1958. *Practical invertebrate anatomy*, London, Macmillan & Co Ltd, p. 398-411.
- Casas, J.S., & Sordo, J., 2006. Lead, *Chemistry, Analytical Aspects, Environmental Impact and Health Effects*. Departamento de Química Inorgánica Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago Compostela, Galicia, Spain.
- Cobb A.B. 2008. Cadmium. New York: Marshall Cavendish Benchmark.


- Darmono, 1995. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, UI Press, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2001.
- Devinta, W., and Aunurohim. *Bioakumulasi logam berat kadmium (Cd) oleh Chaetoceros calcitrans pada konsentarsi sublethal*. Jurnal Sains dan seni pomit S vol. 2, No. 2, 2013
- Effendi, Hefni, 2003, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Esti Rudiana, Delianis Pringgenies. *Morfologi dan Anatomi Cumi-Cumi Loligo duvauceli yang Memancarkan Cahaya*. Jurusan Ilmu Kelautan: FPIK Universitas Diponegoro Semarang. 2004.
- Fardiaz, 1992. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: kanisiua.
- Giese, A.C. 1977. *Reproduction of marine invertebrates*. Mollusc:Gastropods and Cephalopod, Academic Press New York, A Subsidiary of harcourt brace jovnovich. Publisher. vol. IV, p. 243-284.
- Hasting, J.W., and J.G. Morin. 1989. *Bioluminescence, in Neural and Integrative Animal Physiology*, C. Ladd. Prosser, Editor, Wiley-Liss, New York, p. 131-168
- Herman, D.Z., 2006. “*Tinjauan terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) dari Sisa Pengolahan Bijih Logam*”. Jurnal Geologi Indonesia Vol. 1 No. 1 Maret 2006: 31-36.
- Jompa.J, Nurliah, dan budiman. *Dampak Eutrofikasi Terhadap Terumbu Karang di Ke pulauan Spermonde Sulawesi Selatan*. prosiding konferensi nasional. 2006. V: 365 – 377.
- Kementerian Agama 2012.
- Kusnoputranto, Haryoto, *Toksikologi Lingkungan*, DirjenDikti,Jakarta, 1996.
- Lestina. *Pengaruh pencemaran Logam Berat Ph, Cd, Cr terhadap biota laut di kelurahan deli belawa*. Sumberdaya alam dan Lingkungan. Universitas Sumetara Utara, 2005.

- Luthfillah. *Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)*. Jurnal Kybernan. 2011;2(1):1-29.
- Marganof (2003). "*Potensi Limbah Udang sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan Tembaga) di Perairan.*"
- Mursyidin H. Didi. *Lingkungan*. Banjar baru: Unlam, 2008.
- Mitha. 2013. *Destruksi Basah*. [Http://destruksi_basah_chemistry_diponegoro_university.com](http://destruksi_basah_chemistry_diponegoro_university.com)(diakses tanggal 23 maret 2014)
- Notodarmojo, S. *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*. Bandung: ITB, 2005.
- Nurmaida Amri, Imriyanti, Besse Evianti & Nur Mutmainnah. *Tatanan permukiman pesisir; ada ptasi terhadap lingkungan fisik dan kondisi alam di kepulauan*. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik: Universitas Hasanuddin. 2013.
- Nur Mutmainnah. *Tatanan permukiman pesisir; adaptasi terhadap lingkungan fisik dan kondisi alam di kepulauan*. Universitas Hasanuddin, 2007.
- Notodarmojo, S. *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*. Bandung: ITB, 2005. Nowrouzi M, Pourkhabbaz A, and Rezaei M. 2012. Bioaccumulation and Distribution of Metals in Sediments and Avicenna Marina Tissues in The Hara Biosphere.
- Palar, H. 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta : Jakarta
- Petrucci. R. H. *Kimia Dasar (Prinsip dan Terapan Modern Edisi Keempat Jilid 3)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1987.
- Phillips, D.J.H. *Proposal for monitoring studies on the concentration of the East Asian Seas by trace metals and organochlorines. Da-lam "South Chine fisheries development and coordinating programme*. Manila: FAO, 1980.
- Unus Suriawiria. *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, P.T. Alumni, 2005.
- Ruppert, E.E. and R.D. Barnes. 1991. *Invertebrate Zooloy, Saunders College Publishing*, Toronto, p. 463-49.
- Sarjono, A . 2009. *Analisis Kandungan Logam Berat Cd, Pb, dan Hg Pada Air dan Sedimen di Perairan Kamal Muara, Jakarta Utara*. 2009, Institut pertanian bogor.

- Sastrawijaya, T.A. 1991. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiaty, Pandi dkk. *Kimia lingkungan*. Jakarta. Pembinaan dan Pengabdian Pada Masyarakat. 1996.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-musbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-quran*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2010.
- SNI 7387-2009. Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Makanan.
- Silas, E.G. 1968, *Cephalopoda of the west coast of India collected during the cruises of the Research Vessel Varuna, with a cataloque of the species know from the Indian Ocean, Proc, Symp, Mollusca, Pt, 1, Mar biol, Ass, India, 3 :277-359.*
- Sumah Yulaipi dkk. *Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Hubungannya dengan Laju Pertumbuhan*: surabaya, 2013.
- Terry N and Banuelos GS. 2010. *Phytoremediation of Contaminated Soil and Water*. Oxford: Taylor & Francis.
- Tinin Agustina. *Kontaminasi Logam Berat Pada Makanan Dan Dampaknya Pada Kesehatan*: teknebuga, 2010.
- Vicar, 2007 . *Dampak Pencemaran Pantai Dan Laut Terhadap Kesehatan Manusia*. Coastal Hazard- Indonesia. <http://www.fajar.co.id>. Diakses pada hari Kamis, 27 September 2012.
- Voss., G.L, and G.R. Williamson. 1971. *Cephalopods of Hongkong*, Hongkong Government Press, Hongkong, p. 277.
- Widowati, W., Astiana S. Dan Raymond J. 2008. *Efek Toksik Logam*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Winarni, D. 2009. *Potensi Dan Pemanfaatan Teripang Di Indonesia*. Surabaya: Buku Panduan Seminar Nasional Biodiversitas III Biologi UNAIR.
- Winarni, Dwi, dkk. 2012. *Kajian Histologi Gonad Teripang Phyllphorus sp. Pada Bulan Februari, Maret dan April 2012*. Surabaya: UNAIR.
- Wulandari, Eka Amelia dan Sukei. 2013. *Preparasi Penentuan Kadar Logam Pb, Cd Dan Cu Dalam Nugget Ayam Rumput Laut Merah (Euclidean cottoni)*. Surabaya: ITS. Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, no. 2.

Lampiran 1

Alur skema



Lampiran 2

A. Data Absorptansi Sampel logam Cd

RUMUS :

$$\text{Mg/L} = \frac{\text{ABS} - 0,0148}{0,3194}$$

Sampel	ABS	Konsentrasi Sampel (mg/L)
T1A	0.0199	0.015967
T1B	0.0161	0.004070
T2A	0.0155	0.002192
T2B	0.0157	0.002818
T3A	0.0159	0.003439
T3B	0.0158	0.003131

Tabel L II. 2.1 data absorptansi sampel logam Cd

Lampiran 3

Perhitungan Kadar Logam Kadmium (Cd) Tiap Sampel

Kadar logam Kadmium (Cd) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$C = \frac{c \times V}{a}$$

Keterangan :

C : Kadar logam dalam sampel (mg/Kg)

c : Konsentrasi larutan sampel (true value)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)

a : Berat sampel basah (gram)

A. Sampel pada Stasiun I pada Daging Cumi-cumi (T1A), (T1B)

$$T1A = 0,016 \text{ mg/L} = 0,000016 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000016 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0016 \text{ mg}}{5,01 \text{ g}}$$

$$= 0,0003 \text{ mg/g} = \frac{0,0003 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,3 \text{ mg/Kg}$$

$$T1B = 0,004 \text{ mg/L} = 0,000004 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000004 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0004 \text{ mg}}{5,18 \text{ g}}$$

$$= 0,00008 \text{ mg/g} = \frac{0,00008 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,08 \text{ mg/Kg}$$

B. Sampel pada Stasiun II pada Daging Cumi-cumi (T2A), (T2B).

$$T2A = 0,002 \text{ mg/L} = 0,000002 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000002 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0002 \text{ mg}}{5,07 \text{ g}}$$

$$= 0,00004 \text{ mg/g} = \frac{0,00004 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,04 \text{ mg/Kg}$$

$$T2B = 0,003 \text{ mg/L} = 0,000003 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000003 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0003 \text{ mg}}{5,09 \text{ g}}$$

$$= 0,00005 \text{ mg/g} = \frac{0,00005 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,05 \text{ mg/Kg}$$

C. Sampel pada Stasiun III pada Daging Cumi-cumi (T3A), (T3B).

$$T3A = 0,003 \text{ mg/L} = 0,000003 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000003 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0003 \text{ mg}}{5,07 \text{ g}}$$

$$= 0,00006 \text{ mg/g} = \frac{0,00006 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,06 \text{ mg/Kg}$$

$$T3B = 0,003 \text{ mg/L} = 0,000003 \text{ mg/mL}$$

$$= 0,000003 \text{ mg/mL} \times 100 \text{ ml}$$

$$= \frac{0,0003 \text{ mg}}{5,03 \text{ g}}$$

$$= 0,00006 \text{ mg/g} = \frac{0,00006 \text{ mg/g}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,06 \text{ mg/Kg}$$

D. Tabel Hasil Analisis Kandungan logam berat kadmium

1. Sampel Cumi-cumi pada Stasiun 1

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	T1A	0,3
2.	T1B	0,08

Tabel 3.1 sampel Cumi-cumi pada stasiun 1

2. Sampel kerang pada Stasiun II

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	T2A	0.04
2.	T2B	0.05

Tabel 3.2 sampel Cumi-cumi pada stasiun II

3. Sampel kerang pada Stasiun III

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	T3A	0.06
2.	T3B	0.06

Tabel 3.3 sampel Cumi-cumi pada stasiun III

Lampiran 4

Rona Lingkungan Perairan Pulau Lae-lae

Sampel	Rona Lingkungan
Stasiun I	Terjadinya pencemaran di perairan laut dapat disebabkan oleh timbunnya zat polutan yang berasal dari aktivitas pelabuhan, tumpahan minyak dari kapal, limbah rumah tangga dan kegiatan industrialisasi. Limbah-limbah yang tidak dapat terdegradasi selanjutnya akan terakumulasi diperairan laut sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan.
Stasiun II	perbatasan pulau kayangan dan pulau Lae-lae, tidak terdapat banyak sampah domestik yang tersebar di sekitar perairan tetapi banyak limbah dari kapal-kapal yang ada disekitar pemukiman.
Stasiun III	Muara perairan pantai tanjung bunga berbatasan langsung dengan perairan pulau Lae-lae, Kondisi air kurang baik karena banyaknya sampah domestik yang tersebar disekitar perairan, kemudian terdapat terjadi pencemaran lingkungan

Tabel 4.1 Rona lingkungan perairan pulau Lae-lae

Lampiran 5

Gambar 5.1 Lokasi pengambilan sampel




Gambar 5.2 Tempat penyimpanan sampel



Gambar 5.3 Sampel Cumi-cumi (*Loligo* sp)



Gamabar 5.4 Pengukuran sampel Cumi-cumi (*Loligo* sp)



Gambar 5.5 Daging Cumi-cumi (*Loligo* sp) dibersihkan



Gambar 5.6 Daging Cumi-cumi (*Loligo* sp) dihaluskan



Gambar 5.7 Proses penimbangan sampel



Gambar 5.8 Proses penambahan HNO_3



Gambar 5.9 Proses dekstruksi basah




Gambar 5.10 Dekstruksi basah



Gambar 5.11 Proses penyaringan



Gambar 5.12 Menyimpan sampel di rak



Gambar 5.13 Persiapan pembacaan sampel pada SSA



Gambar 5.14 Pembacaan sampel pada SSA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA

LABORATORIUM RISET

Jl. Muh.Yasin Limpo No. 36 Gowa.Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/124
Lamp :-
Hal : **Laporan Hasil Analisa**

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si.,M.Si
Waktu analisa : Rabu / 24 Mei 2017
Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
Judul Penelitian : Absorpsi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Cumi-Cumi di Pulau Lae-Lae

A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0003
Standard 1	0.1	0.0380
Standard 2	0.2	0.0735
Standard 3	0.5	0.1924
Standard 4	1	0.3623
Standard 5	2	0.6360


B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs	Sampel	Abs
T1 A	0.0199	T2 B	0.0157
T1 B	0.0161	T3 A	0.0159
T2 A	0.0155	T3 B	0.0158

Samata-Gowa, 28 Mei 2017


Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia


Dra. St. Chadijah, M.Si
NIP: 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh

Laboran


Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
NIP : 19800526 201101 1 004

BIOGRAFI



Nama saya LINDAWANTI. Sering di panggil Linda. Saya lahir di selayar pada tanggal 06 Januari 1993. Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak yang bernama Tandir dan Ibu saya Agustiani.

Bapak saya adalah seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya sekolah SD inpres Gollek dan saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 2 benteng selayar selama 3 tahun dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah Benteng selayar. Setelah saya tamat SMA saya memilih jurusan Biologi melalui Jalur SBM PTAIN kerana sejak saya melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Biologi pada fakultas Sains dan Teknologi dan sekarang saya tinggal di Samata-Gowa.

ALA UDDIN
M A K A S S A R