



PROSIDING

Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran

Seminar Nasional
Peternakan Berkelanjutan 6



**Pengembangan
Peternakan Berbasis
Sumberdaya Lokal Menuju
Kedaulatan Pangan**

Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran
Jatinangor, 18 November 2014

Jatinangor, 18 November 2014

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PETERNAKAN BERKELANJUTAN 6

Jatinangor, 18 November 2014

**“ Pengembangan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju
Kedaulatan Pangan”**

Editor :

Diding Latipudin	Universitas Padjadjaran
Effendi Abustam	Universitas Hassanudin
Sofyan Iskandar	Balai Penelitian Ternak
Edy Kurnianto	Universitas Diponegoro
Mirzah	Universitas Andalas
Henny Nuraini	Institut Pertanian Bogor
Deni Rusmana	Universitas Padjadjaran
Didin Tasripin	Universitas Padjadjaran
Iman Hernaman	Universitas Padjadjaran
Abun	Universitas Padjadjaran
Kurnia A. Kamil,	Universitas Padjadjaran
Linda Herlina	Universitas Padjadjaran
Marina Sulistyati	Universitas Padjadjaran
Arnoldus HW Lengkey	Universitas Padjadjaran
Yuli Astuti	Universitas Padjadjaran
Heni Indrijani	Universitas Padjadjaran
Romi Zamhir Islami	Universitas Padjadjaran

Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran
ISBN : 978-602-14788-8-2

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PETERNAKAN BERKELANJUTAN 6
“ Pengembangan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju
Kedaulatan Pangan”

Hak Cipta © 2014 Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran

Editor : Diding Latipudin, dkk
Tata Layout : Marlis
Penerbit : Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

ISBN : 978-602-14788-8-2

Cetakan pertama, 2014

Diterbitkan oleh:

Fakultas Peternakan

Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21

Telp./Fax. : (022) 7798241/(022)7798212

<http://peternakan.unpad.ac.id>

Dicetak oleh :

FAPET PRESS

Hot line : Wendry Setiyadi P (081394792745)
 Romi Zamhir (082120854649)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang, dilarang mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seijin penerbit

SUSUNAN KEPANITIAAN

Ketua	: Dr. Ir. Diding Latipudin, M.Si.
Wakil Ketua	: Dr. Hasni Arief, S.Pt., MP.
Koordinator Workshop	: Indrawaty Yudha Asmara, S.Pt., MSi., Ph.D.
Anggota	: Johar Arifin, S.Pt., MP.,
Sekretaris	: Endang Sujana, S.Pt.MP. Sahirul Alim, S.Pt. M.Si.
Koordinator Kesekretariatan	: Dwi Suharwanto, S.Pt.M.Si
Anggota	: Anita Fitriani, Spt.,MSc. Asep Kusumah, A.Md. Andry Pratama, Spt., MP.
Bendahara	: Dr. Nena Hilimia, S.Pt., M.Si. Wiwik, SH
Koordinator Prosiding	: Dr. Heni Indrijani, S.Pt., M.Si.
Anggota	Romi Zamhir Islami, Spt, M.Si
Reviewer /Moderator Seminar	: 1. Produksi Ternak Dr. Deni Rusmana, S.Pt, MSi Dr.Ir. Didin Tasripin, M.Si 2. Nutrisi dan Makanan Ternak Dr.Ir. H. Iman Hernaman, Msi Dr. Ir. Abun, MP. Dr. Ir. Kurnia A. Kamil, M.Arg.Sc., M.Phil. 3. Sosial Ekonomi Peternakan Dr.Ir. Linda Herlina, MS Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS 4. Teknologi Hasil Ternak Dr. Ir. Arnoldus HW Lengkey, SU Dr. Ir. Yuli Astuti, MS
Acara dan Persidangan	: Dr.Ir. Hendi Setyatwan, M.Si
Promosi dan Publikasi	: Ronnie Permana, Spt., MSi
Dokumentasi	Bayu Nugraha Saputra, S.Ikom.
Perlengkapan dan Umum	: Ir. Atun Budiman, M.Si. Elin Herlina, S.Sos. Okim
Dana/Usaha	: Dr. Ir. Heri Supratman, MS. Dr.Ir. Rochadi Tawaf, MS
Konsumsi	: Ir. Siti Nurahma, MS. Dr.Ir. Lilis Suryaningsih, MSi Eka Wulandari, SSI, MSi
Protokoler	: Dr. Sauland Sinaga, S.Pt, MSi

POTENSI BAKTERI ASAM LAKTAT ASAL LIMBAH DANGKE SEBAGAI KANDIDAT PROBIOTIK LOKAL

Hafsan, Muhammad Halifah Mustami, Rahmaniah, Khaerani Kiramang
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
Gowa, 92113, Sulawesi Selatan Tel: +62-85216478782
Corresponding Author E-mail: hafsaahbio@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi isolat dari limbah pembuatan Dangke yang merupakan salah satu produk olahan susu secara tradisional khas dari Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Enrekang. Proses pembuatannya menyisakan limbah berupa *whey* yang merupakan serum atau bagian air dari susu yang tersisa setelah pemisahan *curd* sebagai hasil koagulasi protein susu dengan enzim proteolitik. Bakteri asam laktat yang berhasil diisolasi adalah *Lactobacillus fermentum*, dan sebagai kandidat probiotik lokal dilakukan beberapa pengujian yaitu ketahanan isolat terhadap pH asam, ketahanan terhadap garam empedu, kemampuan agregasi dan perlekatan pada permukaan usus halus, serta kemampuan daya hambat terhadap bakteri patogen seperti *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *L. fermentum* yang diisolasi dari *whey* Dangke memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai probiotik, karena memiliki ketahanan terhadap pH asam yaitu pH 2, 3 dan 4 demikian halnya mampu tumbuh pada konsentrasi garam empedu 0,1% dan 0,3% selama 2 x 24 jam inkubasi dengan derajat pertumbuhan yang berbeda. *L. fermentum* dari *whey* Dangke memiliki daya agregasi dengan nilai positif yang diindikasikan oleh terbentuknya didapatkan agregat yang jelas membentuk endapan di dasar tabung dan supernatan terlihat jernih. Selain itu isolat juga mampu melekat pada permukaan usus halus secara *in vitro*, serta memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen yaitu *S. thypi* dan *S. Aureus*.

Kata Kunci: *Lactobacillus fermentum*, Probiotik, Dangke

ABSTRACT

This study aims to determine the potential of isolates of waste Dangke manufacture which is one of the traditional dairy products distinctive of South Sulawesi, ie the district Enrekang. Process of his production has left the waste in the form of *whey*, which is a serum or water part of milk that remains after the separation of *curd* as a result of coagulation of milk protein with proteolytic enzymes. Lactic acid bacteria have been isolated *Lactobacillus fermentum* is, and as local probiotic candidate, conducted Many diagnostic tests ie isolates resistance to acidic pH, resistance to bile salts, the ability of aggregation and adhesion to the surface of the small intestine, and the inhibitory effect on pathogenic bacteria such as *Salmonella thypi* and *Staphylococcus aureus*. The results showed that *L. fermentum* isolated from *whey* Dangke has great potential to be developed as probiotics, because it has a resistance to acidic pH is pH 2, 3 and 4 as well as able to grow at a concentration of 0,1% bile salts and 0,3 % for 2 x 24 hour incubation with different degrees of growth. *L. fermentum* from *whey* Dangke been able to aggregate with a positive value indicated by the formation of aggregates which

obviously forms a precipitate in the base the tube and the supernatant looks clear. In addition, isolates were also able to attach to the surface of the small intestine in vitro, as well as having the ability to inhibit the growth of pathogenic bacteria such as *S. aureus* and *S. thypi*.

Keywords: *Lactobacillus fermentum*, Probiotic, Dangke

PENDAHULUAN

Dangke merupakan salah satu produk olahan susu secara tradisional yang khas berasal dari Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Enrekang. Dangke diolah dengan bahan dasar susu sapi atau susu kerbau yang dipanaskan dan ditambahkan getah pepaya untuk memisahkan *curd* dan *whey* (Djide, 1991). Terpisahanya *curd* dan *whey* berkaitan dengan efek getah pepaya yang mengandung papain dan merupakan salah satu jenis enzim proteolitik. Papain akan memutus ikatan peptida pada residu asparagin-glutamin, glutamat-alanin, leusin-valin dan fenilalanin-tirosin (Nurhidayati, 2003). Proses pembuatan Dangke menyisakan limbah berupa *Whey* yang merupakan serum atau bagian air dari susu yang tersisa setelah pemisahan *curd* sebagai hasil koagulasi protein susu dengan enzim proteolitik. Setiap 10 liter susu yang digumpalkan selama proses pengolahan menghasilkan sekitar 6 - 9 liter *whey* (Almeida *et al.*, 2008). Sebagai limbah, *Whey* masih mengandung sekitar 55% total nutrisi dari susu seperti laktosa, protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. Kondisi tersebut memungkinkan bagi bakteri terutama bakteri asam laktat (BAL) menjadikannya sebagai media untuk tumbuh dan berkembang (Pato, 2003), mengingat BAL merupakan flora alami pada pada substrat yang mengandung susu.

Bakteri asam laktat senantiasa menjadi perhatian bagi peneliti karena pada umumnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai probiotik untuk manusia, hewan ternak daratan dan akuatik. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa BAL adalah penghuni alami saluran pencernaan manusia dengan kemampuan toleransi terhadap lingkungan asam dan empedu (*bile*) dari saluran pencernaan. Bakteri asam laktat juga berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi asam asetat, sehingga menurunkan pH saluran pencernaan dan secara alami mencegah kolonisasi berbagai bakteri patogen (Watson *et al.*, 2008, 4) sehingga secara umum dapat memperbaiki kondisi saluran pencernaan dan akan meningkatkan kesehatan. Selain itu, memiliki kemampuan menurunkan kolesterol yang berlebihan di dalam darah, dengan demikian dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah lainnya (Holzapfel and Schillinger, 2002).

Beragamnya bakteri asam laktat yang telah berhasil diisolasi dari berbagai sumber seperti dari susu maupun produk olahan lainnya memungkinkan bertambahnya jenis BAL yang berpotensi sebagai probiotik dengan kekhasan masing-masing. Kelompok BAL yang digunakan digunakan sebagai probiotik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai probiotik meliputi kemurniannya (menyehatkan saluran pencernaan), bersifat non patogenik, dan tahan terhadap antibiotik. Aspek fungsional seperti kemampuan hidup dan tahan dalam saluran pencernaan, serta bersifat antagonis terhadap bakteri patogen (Sujaya dkk., 2008). Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Pato, 2003). Berdasarkan hal

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi isolat dari limbah pembuatan dangke yaitu *Lactobacillus fermentum* sebagai probiotik melalui pengujian.

BAHAN DAN METODE

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mencit (*Mus musculus*), tabung Ependorf, Inkubator, Oven, shaker inkubator, otoklaf, waterbath, Erlenmeyer, Becker glass, hot plate dan stirer, bunsen, ketamil injection, cawan petri, pencadang, gelas ukur, tabung reaksi dan rak tabung, mikropipet (0,1, 1,0 dan 10 mL), jarum ose, pH meter, termometer, spektrofotometer, neraca analitik, oven, laminar air flow, termometer, kamera digital, kultur *L. Fermentum* asal whey Dangke, *Salmonella thypii* dan *Staphylococcus aureus*, NaOH, HCl, gliserol, Aquadest, Alkohol, Spiritus, medium Nutrien Agar (NA), medium Hilton Muller Agar (MHA), medium *de Mann, Rogosa and Sharpe* (MRS), Bacto agar, Phosfat Buffer Saline (PBS), wrapper, tisu, kapas, kertas saring, aluminium foil.

Metode

Karakterisasi sifat fungsional isolat diawali dengan pengujian viabilitas terhadap pH rendah dan garam empedu. Pengujian ketahanan terhadap pH yaitu dengan menggunakan media MRS cair yang diatur pH dengan perlakuan pH 1; pH 2; pH 3; dan pH 4 menggunakan pH-meter sebanyak 5 mL. Masing masing perlakuan diinokulasi dengan kultur bakteri uji sebanyak 10% dari volume media. Sebagai kontrol adalah media MRS cair tanpa penambahan bakteri. Setelah diinkubasi selama 1 dan 2 x 24 jam pada suhu 37 °C dilakukan pengamatan dengan membandingkan kekeruhan kultur dengan medium kontrol. Uji ketahanan terhadap garam empedu dengan media MRS cair yang ditambah dengan *oxgall* 0,1%, 0,3% dan 0,5%. Masing masing perlakuan diinokulasi dengan bakteri uji sebanyak 10% dari volume media. Sebagai kontrol adalah media MRS cair tanpa penambahan bakteri. Setelah diinkubasi selama 1 dan 2 x 24 jam pada suhu 37 °C pada kondisi anaerob.

Kemampuan lain yang harus diuji adalah kemampuan agregasi dan perlekatan pada permukaan usus halus. Uji Agregasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bakteri untuk membentuk koloni (agregat). Pada uji ini bakteri uji ditumbuhkan pada MRSB selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C. Agregasi dinilai positif jika pada MRS didapatkan agregat yang jelas (partikel seperti pasir) membentuk endapan di dasar tabung dan supernatan akan terlihat jernih (Jankovic *et al.*, 2003). Pengujian penempelan Bakteri Asam Laktat pada Permukaan usus halus secara *in vitro* dimulai dengan pengambilan sampel usus pada tikus yang diawali dengan pembiusan tikus dengan , kemudian dilakukan pembedahan mulai dari bagian dada ke arah abdomen. Usus halus (ileum) dipotong-potong dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}^2$. Sampel usus selanjutnya dicuci dengan PBS. Sampel yang dicuci dimasukkan ke dalam tissue basket yang kemudian direndam dengan larutan PBS pada suhu 4°C selama beberapa menit dan setelah itu dilakukan pencucian sebanyak tiga kali. Uji penempelan dilakukan dengan menginkubasikan sampel usus ke dalam cawan petri yang berisi larutan suspensi bakteri $1,2 \times 10^9 \text{ sel ml}^{-1}$ dalam PBS pada suhu 37°C selama 30 menit kemudian dibilas dengan PBS. Keberadaan bakteri yang menempel dievaluasi secara

kualitatif dengan melakukan cara melihat adanya pertumbuhan setelah dikultivasi pada media MRSA dari suspensi usus pasca inkubasi dalam larutan suspensi bakteri 1.2×10^9 sel ml^{-1} dalam PBS (Kos *et al.*, 2003).

Kemampuan daya hambat terhadap bakteri patogen seperti *S. typhii* dan *S. aureus* masing-masing dilakukan dengan metode dengan terlebih dahulu membuat suspensi bakteri patogen uji yang setara dengan 0,5 unit Mc Farland dengan cara mengambil satu ose koloni bakteri uji dari biakan murni dan disuspensikan ke dalam 5 mL NaCl steril. Sebanyak 50 μL dipipet dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi medium MHA suhu 45°C sebanyak 10 mL. Medium yang berisi suspensi bakteri dituang ke dalam cawan petri yang berisi medium MHA yang telah memadat sebanyak 20 mL. Cawan petri digoyang-goyangkan agar suspensi bakteri menyebar secara merata, selanjutnya diletakkan 3 buah pencandang pada masing-masing cawan petri. Selanjutnya pada masing-masing pencandang dimasukkan suspensi isolat BAL asal *whey* Dangke sebanyak 250 μL . Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C . Zona bening yang terbentuk disekitar sumuran sampel menunjukkan adanya kemampuan isolat BAL asal *whey* Dangke menghambat pertumbuhan masing-masing bakteri patogen uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai kandidat probiotik, suatu isolat mikroba harus memenuhi beberapa sifat-sifat fungsional meliputi ketahanan pada pH rendah, garam empedu, kemampuan agregasi, koagregasi dan perlekatan. Selain itu memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Tabel 1 mendeskripsikan beberapa sifat Isolat BAL dari *whey* Dangke sebagai kandidat probiotik.

Tabel 1. Hasil pengujian Sifat Fungsional *L. fermentum* dari *whey* Dangke

No	Uji Sifat Fungsional	Hasil Pengujian
1	Viabilitas pada pH Rendah	
	• pH 1	- - -
	• pH 2	+++
	• pH 3	+++
	• pH 4	+++
2	Viabilitas pada Garam Empedu	
	• 0.1%	+++
	• 0.3%	+++
	• 0.5%	- - -
3	Agregasi	+++
5	Perlekatan secara in vitro	+++
6	Penghambatan terhadap <i>S. typhii</i>	+++
7	Penghambatan terhadap <i>S. aureus</i>	+++

Pengujian ketahanan isolat terhadap pH rendah dilakukan dengan menumbuhkan dalam media MRSB yang telah di atur pH nya menjadi 1, 2, 3, dan 4, kemudian diinkubasi selama 1 dan 2 x 24 jam. Analisis terhadap pertumbuhan dilakukan secara kualitatif dengan melihat tingkat kekeruhan dari media yang diinokulasi dengan kultur bakteri asam laktat setelah diinkubasi dan membandingkannya dengan media kontrol (pH 6,2 sesuai pH normal MRSB). Tabel 1 menunjukkan bahwa isolat yang teridentifikasi sebagai *L. fermentum*,

mampu tumbuh pada MRSB dengan pH 2, 3 dan 4. Sedangkan pada pH 1 isolat tidak mengindikasikan pertumbuhan yang ditandai oleh tidak terjadinya perubahan kekeruhan medium MRSB yang digunakan (sama dengan kontrol).

Selain diuji kemampuannya untuk tumbuh pada media dengan pH rendah, isolat juga diuji kemampuannya untuk tumbuh pada media yang mengandung oxgall (garam empedu). Keberadaan oxgall dalam media dimaksudkan untuk menciptakan kondisi seperti di dalam pencernaan dimana garam empedu diekskresikan ke dalam saluran pencernaan. Pada pengujian ini, semua BAL yang digunakan ditumbuhkan dalam media MRSB yang mengandung 0,1%, 0,3% dan 0,5% oxgall, kemudian diinkubasi selama 1 dan 2 x 24 jam. Analisis terhadap pertumbuhan dilakukan secara kualitatif dengan melihat tingkat kekeruhan dari media yang diinokulasi dengan kultur bakteri asam laktat setelah diinkubasi dan membandingkannya dengan media kontrol (tanpa oxgall). Hasil yang diperoleh (Tabel 1) menunjukkan bahwa isolat yang diuji mampu tumbuh pada konsentrasi garam empedu 0,1% dan 0,3% selama 2 x 24 jam inkubasi dengan derajat pertumbuhan yang berbeda (berdasarkan tingkat kekeruhan). Pada konsentrasi garam empedu 0,5% dan waktu inkubasi 2 x 24 jam, dari tiga ulangan yang dilakukan, isolat tidak tumbuh (media tidak keruh). Isolat mengindikasikan pertumbuhan pada konsentrasi garam empedu 0,1% dan 0,3% setelah 2 x 24 jam. Hal ini terjadi karena garam empedu bersifat bakterisidal sehingga menghambat pertumbuhan bakteri, dan kemungkinan sebagian dari bakteri yang diinokulasikan mati. Bakteri yang masih bertahan memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama sehingga pertumbuhan baru terlihat setelah 48 jam. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh du-Toit *et al.* (1998) dan Usman and Hosono (1999). Bakteri asam laktat yang ditumbuhkan pada media yang mengandung garam empedu mengalami penundaan pertumbuhan karena memerlukan adaptasi yang lebih lama dibandingkan dengan bakteri yang ditumbuhkan pada media yang tidak mengandung garam empedu.

Uji agregasi yang dilakukan terhadap *L. Fermentum* asal whey Dangke menunjukkan nilai agregasi positif. Hal ini terbukti dengan adanya endapan pada bagian dasar tabung disertai dengan cairan jernih di atasnya. Menurut Jankovic *et al.* (2003), agregasi dinilai positif jika pada media MRSB didapatkan agregat yang jelas (partikel seperti pasir), membentuk endapan di dasar tabung dan supernatan terlihat jernih. Endapan yang terbentuk mengindikasikan terjadinya pembentukan agregat atau koloni pada bakteri asam laktat yang diuji tersebut. Endapan diperkirakan terbentuk karena bakteri asam laktat tersebut tumbuh dan berkembang biak pada kondisi media, suhu dan lama waktu inkubasi serta berinteraksi membentuk koloni. Kemampuan agregasi isolat dalam bentuk tunggal dan berpasangan dipengaruhi oleh produksi Polisakarida Ekstra Seluler (PSE) pada membran luar sel, disamping gaya gravitasi dan motilitas atau pergerakan bakteri. Bila produksi PSE rendah serta lemahnya ikatan kimia dari komponen dinding sel bakteri yang dipasangkan maka agregasi tidak akan terjadi (Elida, 2002).

Kemampuan BAL seperti *L. fermentum* dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen sebagian besar karena adanya asam-asam organik yang terkandung di dalamnya. Asam-asam organik yang dihasilkan oleh BAL mengakibatkan akumulasi produk akhir asam dan penurunan pH yang akan menghambat pertumbuhan bakteri baik Gram positif maupun Gram negatif.

Aktivitas asam-asam lipofilik seperti asam laktat dan asetat dalam bentuk tidak terdisosiasi dapat menembus sel mikroba dan pada pH intraseluler yang lebih tinggi, berdisosiasi menghasilkan ion-ion hidrogen dan mengganggu fungsi metabolit esensial seperti translokasi substrat dan fosforilasi oksidatif, dengan demikian mereduksi pH intraseluler (Asriani, dkk., 2006). Efek penghambatan dari asam-asam organik terutama berasal dari jumlah asam yang tidak terdisosiasi. Asam lipofilik seperti asam laktat dan asam asetat dalam bentuk tidak terdisosiasi dapat menembus sel bakteri. Straford (2000) menyatakan bahwa asam lemah dapat menurunkan pH sitoplasma, mempengaruhi struktur membran dan fluiditasnya serta mengkelat (mengikat) ion-ion dinding sel bakteri. Penurunan pH sitoplasma akan mempengaruhi protein struktural sel, enzim-enzim, asam nukleat dan fosfolipid membran. Selain itu, kemampuan daya hambat yang dimiliki oleh metabolit BAL terhadap pertumbuhan *S. thypi* dan *S. aureus* juga disebabkan oleh produksi bakteriosin (Salvado, 2006).

Mekanisme penghambatan *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri patogen selain menyebabkan gangguan terhadap komponen dinding sel, juga dapat melakukan penghambatan dengan bereaksi dengan membran sel. Kemampuan metabolit BAL untuk mengganggu komponen penyusun dinding sel yang salah satu fungsinya untuk melindungi membran sitoplasma, menyebabkan sel bakteri peka terhadap osmotik. Adanya tekanan osmotik dalam sel bakteri akan menyebabkan terjadinya lisis. Asam-asam organik yang dihasilkan oleh BAL akan menembus dinding sel dan mengganggu permeabilitas membran. Selain itu setelah berada di dalam sitoplasma akan terdisosiasi menghasilkan proton, dan proton yang berlebihan akan menyebabkan keseimbangan terganggu. Gangguan tersebut berakibat pada berkurangnya energi sel untuk pertumbuhan karena dialihkan untuk menyeimbangkan proton dan juga mengganggu transport asam amino dan gula (Asriani dkk, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai yaitu: *Lactobacillus fermentum* yang diisolasi dari limbah pembuatan dangke memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai probiotik, karena memiliki ketahanan terhadap pH rendah dan garam empedu, memiliki daya agregasi dan perlekatan pada permukaan usus halus (*in vitro*), serta memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen yaitu *Salmonella thypii* dan *Staphylococcus aureus*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini terselenggara atas pembiayaan dari hibah kompetitif Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) UIN Alauddin Makassar yang bersumber dari DIPA UIN Alauddin tahun 2014. Olehnya tim peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada LP2M UIN Alauddin Makassar, demikian pula halnya kepada segenap personal yang telah terlibat dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, K. E., Tamime, A.Y. and Oliveira, M.N. 2008. *Acidification rates of probiotic in Minas Frescal cheese whey. LWT*, 41, 311-316.

- Asriani, Jenie BSL, Sedarnawati, Y dan Sudirman, I. 2006. *Kajian Efek Sinergi Antimikroba Metabolit Bakteri Asam Laktat dan Monoasilgliserol Minyak Kelapa terhadap Mikroba Patogen Pangan. Jurnal Agroland XII (3): 242 - 248.*
- Djide, M.N. 1991. *Pengaruh Penambahan Getah Pepaya dan Beberapa Macam Pengawet pada Pembuatan Dangke. Laporan Penelitian Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.*
- Du-Toit, M., C. Franz, U. Schillinger, B. Warles and W. Holzappfel, 1998. *Characterization and Selection Of Probiotic Lactobacilli for A Preliminary Minipig-Feeding Trail and Their Effect on Serum Cholesterol Level and Faeces Moisture Contents. Intern. J. Food Microbiol., 40: 93-104.*
- Elida, M. 2002. *Profil Bakteri Asam Laktat dari Dadih yang Difermentasi dalam Berbagai Jenis Bambu dan Potensinya Sebagai Probiotik. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.*
- Holzappfel, W. H. and U. Schillinger. 2002. *Introduction to pre- and probiotics. Food Res. Int. 35: 109-116.*
- Jankovic, I, M. Ventura, V. Meylan, M, Elli & R. Zink. 2003. *Contribution of Aggregation Promoting Factor to Maintenance of Cell Shape in Lactobacillus gasseri 4B2. J. Bacteriol. 185(11): 3288 - 3296.*
- Kos B., Suskovic J., Vukovic S., Simpraga M., Frece J. and Matosic S. (2003). *Adhesion and aggregation ability of probiotic strain lactobacillus acidophilus M92. Journal of Applied Microbiology. 94: 981-987.*
- Nurhidayati, T. 2003. *Pengaruh Konsentrasi Enzim Papain dan Susu Fermentasi terhadap Kualitas Keju Cottage. KAPPA, 4, 13- 17. ISSN 1411 - 4046.*
- Pato, U. 2003. *Potensi Bakteri Asam Laktat yang diisolasi dari Dadih untuk Menurunkan Resiko Penyakit Kanker. Jurnal Natur Indonesia 5 (2): 162-166.*
- Salvadogo, A. 2006. *Bacteriocins and Lactic Acid Bacteria-a Minireview. African Jour. of Biotech. 5(9):678-683.*
- Straford M. 2000. *Traditional Preservatives-Organic Acid. Encyclopedia of Food Microbiology. Volume 1. Academic Press. London.*
- Sujaya, I N., N.M.U. Dwipayanti, N.L.P. Suariani, N.P. Widarini, K.A. Nocianitri dan N.W. Nursini. 2008. *Potensi Lactobacillus spp. Isolat Susu Kuda Sumbawa sebagai Probiotik. J. Vet. 9 (1) : 33 - 40.*
- Usman and Hosono, A. (1999). *Bile Tolerance, Taurocholate Deconjugation, and Binding of Cholesterol By Lactobacillus Gasseri Strains. J. Dairy Sci. 82: 243-248.*
- Watson A.K., H. Kaspar, M.J. Lategan & L. Gibson. 2008. *Probiotic in Aquaculture: the Need, Principles and Mechanisms of Action and Screening Processes. Aquaculture 274: 1-14.*